





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1783/10/2





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1783/D/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1783/0/2



Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
178370/2

1783¹⁰

D/2


1111 R


Joh. Georgius Hertel.

Daniel Schuster.

Georgius Henrich.

W.
Lorenz
4 Jan 162





PERITISSIMO, ET MVLTIA RERV
 experientia prædito, Doctori Nicolao Capitoni, inclytæ Urbis Ar-
 gent. Medico primario, OTHO Brunfelsius S D.

VETVS, IDQVE ADEO frequēs malū est, ut qui bonos libros edēdos cu-
 rant, tamen ab aliquibus quidem bene, ab alijs uero male mercantur. Siquidem gratiam inēūt
 ab ijs, qui cum rerum cognitione possent, quiduis nouerunt boni consulere. Inuidiam referūt,
 & mille ronchos ab imperitis, qui præterquam quod optimis semper obstreperunt conatibus, tū
 in dijudicandis quoq; rebus, non magis ualent, q̃ talpæ & uespertiliones. Id quod cum iamdu-
 dum persuasum habeam, plane conuiuendum mihi putauī ad calumnias, sannasq; quorundā,
 qui cum toti additi sunt suis ἀλεξιφάρμακῶν, ἀντιβαλλομένων (uel si quid etiam aliud habent sepla-
 fiariorum, & agyrtarum pixides χίρῃς scilicet τῶν θεῶν) sicin suum Auicennam, Serapionem,
 Razemq; & id genus suauissimos autores iurauerūt, ut plane fordeant eis ueterū, Plinij, Theo-
 phrastij & Dioscorid. cōmentarij. Sic enī qdam eorū palam nūc blasphemant, parū hos me-
 dicos fuisse, uerum grammaticos & literatores, uel quiduis potius aliud, q̃ medicinæ peritos.
 Horum itaq; stultissimis, imo pestilentissimis nenijs, tanq̃ Syrenarū perniciosissimis sibilis dis-
 simulatis (doctiss. Capito Nicolae) Dioscoridem nostrum in lucem agimus. Idq; adeo sub tuo
 celeberrimo, & splendidissimo nomine, ut qui autor aliquando nobis tanti consilij fuisti, καὶ ἵσ-
 τὸ ἀρχὸς ἄνθρωπος βουλευτής, ut uerbo Homericō utar, tuis etiam auspicijs (proscriptis barbarorum
 delyramētis) in orbem eat, in Medicorum musæis legatur, inq; manibus habeatur, medicorū
 ἀλφὰ καὶ κορυφαί. Simul ubi prodiderint huiusmodi ineptissimi graculi & coccyces se, tu nihil
 ominis longe optimo autori patronus ut sis, uindicesq; ab malignantium iniuria. De autoris
 præstantia & laude, non uideo quid publice monere debeam, quem tot nominibus commen-
 dat Galenus pharmacorum simplicium lib. 6. quod unus & solus de simplicibus effectibus be-
 ne scripserit & senserit, quodq; non aliunde mutuatus est sua, neq; ex aliorū narratione concin-
 nauit historiam, id quod barbarorum Herbariorum uulgus hæcenus studuit, uerum præsentī
 inspeccione, suisq; ipsius oculis omnia contuitus est, suis manibus singula contrectauit, suoq;
 ore gustauit, neq; unius tantum et alterius regionis herbas, sed magnam orbis partem peragrās
 rebus peruestigandis, ut reuera nihil eum posset latere. Quod initio operis & ipse pariter testa-
 tur his uerbis, ἡμῶς ἰنگذ δι' ὧν ἴσιν ἱππὶν ἐκ πρώτης ἡλικίας, ἀλλυτόντινα ἔχοντες ἱπποθυμίαν περὶ τὴν ἱπ-
 γνῶσιν τῶν ὄλων, καὶ πολλὰν γὰρ ἐπιπρόντια. ἴσα γὰρ ἡμῖν στρατιωτικὸν τὸν βίον, συναγνώχαμεν τὴν πραγματί-
 ας ἐν ἑξ βιβλίοις τοῦ προτρεφένον. &c. Et rursum. παρακαλοῦμεν δὲ καὶ τοὺς ἐντυφόμενους τοῖς ὑπὸ ἡμῶν
 σι, μὴ τὴν ἐν λόγῳ ἡμῶν δυνάμιν σκοπεῖν, ἀλλὰ τὴν ἐν τοῖς πράγμασι μετ' ὑμπερίας ἐπιμελεῖν, μετὰ γὰρ πλεί-
 στος ἀκριβείας τὰ ὧν πλείστα δι' αὐτοφίας γινόντια, τὰ δ' ἐξ ἰσορίας συμφώνη τοῖς πᾶσι καὶ ἀνακρίσει τοὺς παρ'
 ἡμῶν ἐπιχαρίων ἀκριβοῦντες, περατοῦμεθα καὶ τὰ τάδε διαφόρῳ χρῆσασθαι, καὶ τὰ γένεα καὶ τὰς δυνάμεις
 ἐκάστω αὐτῶν ἀναγράφασθαι. Nisi qd de uita eius ab eruditis dubitat, nec ferme quicq; compertū ha-
 bemus præter id quod in Suidæ extat cōmentarijs, cuius hæc sunt uerba. Διωσκουρίδης ἀνακρίσει
 ἱατροὺς ὁ ἱπποκρίδης φακᾶς, διὰ τοῦς ἱππὶς ἀντονίς. γίγραπται αὐτῷ βιβλία, καὶ τὰ πάντα ἱατρικὰ περιέχοντα.
 Vtū autem a Plinio lectus sit, aut post Plinium uixerit, uel uter ab altero mutuatus sit sua, Le-
 oniceni & Pandulphicæ disceptationi cōmittimus, quorū litem dirimere nunc non est consilij,
 & epistolaris breuitas nō sustinet. Quanq; Plinium Dioscorid. libros non uidisse, uel inde conij-
 ci potest: quod multa de plātis, arboribus, lapidibus, metallisq; disputat Plinius, quorum Dio-
 scorid. ne meminit quidem. Multa subinde apud Diosco. de uenis, & id genus alijs extāt, quæ
 Plinius uel dissimulauit, uel certe nunq; uidit. Postremo sic ab utrisq; tractata sunt quædam, ut
 in utroq; alterutrius dicta desyderentur. Interdum Pliniū Dioscorides multitudinem rerum exu-
 perat: sepissime Dioscoridē Plinius. Breuiter, quod in Cathalago autorum, nusq; illius memi-
 nit Plinius, quod tamen facturus erat fidissimus alioqui rapsodus, si ante se celebratus autor fu-
 isset. Sed neq; Celsus ullam huius uiri memoriam facit, quod equidem obseruari. Hæc de au-
 tore ipso, quem nihil tam cōmendat, q̃ suus ipsius candor, atq; rerum portentosa quædam ex-
 perientia, immo mundus ipse quidam rerum omnium cognitu dignissimarum. De ordine tan-
 tummodo, quo aggressi singula sumus, præcium opere est obiter saltem ut quædam præmone-
 amus. Quando igitur quatuor hodie circumferuntur tralationes, scilicet, uetus, Hermolai Bar-
 bari, Ruelliana, & nouissima M. Vergilij Florentini, nos eam selegimus, quæ nobis purior, sua
 uior, atq; familiarior uidebatur. Ea est Ruellij, si non fallimur, idq; ea fecimus modestia, ut inter
 im nullam calumniemur aliarum, nec aliorum iudicijs, quam ipsi magis præferant, quicq; præ-
 scribamus. Et quod sciamus, pleraq; tanti negocij esse, ut interdum omnibus opus habeat, qui

non infelicitèr saltem, uel in hoc autore trerari. Quamobrem et cōmentarios subieci-
mus duos, eodem nimirum delectu atq; consilio. Vnum Hermolai Barbari, qui Corollaria inscribit:
de quibus illud affirmare habemus, nihil eruditius, nihil uberius, nihilq; magis uarium, post u-
num Plinium, latinæ linguæ editum esse a quoq; mille retro quingentis annis, qui non solum
gloriæ suæ, uerum literis etiam, & literans omnibus tam satisfecerit. Dignus plane qui assidue
in manibus teratur ab omnibus studiosis, nedum ab medicis, in quibus sic *ἡσυχία* *ἡσυχία* *ἡσυχία* cernes
contractum Theophrastum, Plinium, Paulum, Aetium, Orobasium: ex grāmaticis uero, q re-
rum uocabula descripserunt, Athenæum, Pollucem, Gellium, Suidam, Victruuium: ex Geo-
graphis Strabonem & Solinum, ut nihil sit abstrusum in singulis (quantum ad rem qdem me-
dicam attinet) quod idem non apertissime legas in Corollarijs. Quæ ob hoc fortasse sic inscri-
psit, ut simplicium quidam quali Colophon existerent. In quibus id solum dolemus, quod in-
castigatiora ad nos peruenerunt: deinde mutila, et uix in Quintum usq; librum porrecta: quæ si
usq; ad Venenorum librum perfectæ fuissent, dñ boni, præter unum Plinium fortasse, quem stu-
duit imitari, quem haberet tamen meliorem thesaurum, seculorum omnium medicorū cœtus &
Alterum Marcelli Vergiliū iunximus, uiri ex æquo docti, & lōge diligentissimi, nec ab eruditiss
etiam minus probati, qui tñ sicubi prolixius ea tractabat, quæ uel non admodū necessaria, uel
non proxime ad rem facere uidebantur (sic em̄ interdū rhetoricatur & ludit homo, uel lynceo
ipso in dijudicādis rebus perspicacior) data opera decurtauimus: ne & in imensum cresceret uo-
lumen, & rhetoricis magis præstigijs, q̄ utilibus & necessarijs cōmentarijs obturbaremus lecto-
ri. Monuerunt id nos initio ipso operis aliquot studiosi, cum alioqui & ipsum quoq; integrum
adscripturi Vergiliū fuisset. Postremo, ne nostra quoq; opera abesset, sic in utrisq; cōmen-
tarijs sudauimus, ut multo emūctiores, luculentioresq; nunc habeas, q̄ ex ueteri editione erāt.
Vterq; sine punctis erat, uterq; sine artificio grāmatico, & ibi desierant periodi, ubi spiritus de-
fecisset lectoris. Ex bonis græcis, mala latine facta tā multa, ut non plures neuos habuerit Ther-
sites. Ex latinis igitur, quæ perperam scripta erant, in ordinem cōegimus, ex græcis quæ manife-
ste deprauata erant restituiimus. Sicubi hiatus erat, uel scrupulus, quem uel instaurare, uel ex-
cutere non ualebamus, * asterisco signauimus, ut et alijs esset ansa diuinandi: eo tamē consilio,
ut omnia latinis literis permitteremus, partim ut consuleremus græcæ linguæ ignaris, partim
q̄ in priuato Lexico retractamus ad uerbum omnia, nouo opere Pandectarum, longe meliori
opera, q̄ si facta recta, quod dicitur, nunc restaurassemus. Præterea ubi illi ad uerbum ex Theo-
phrasto, Plinioq; & alijs mutauerunt quædam, uel transcripserunt (ut in toto fere opere) no-
tas & capita signauimus. Indicem dictauit, & cum quidem locupletis. I O A N N E S
S C H O T T V S *ἡσυχία* *ἡσυχία* *ἡσυχία* operis, ut emūctæ naris, ita uigilantis. Quæ omnia quan-
to labore nobis constiterint, quantūq; alias editiones euicerimus, nulli cœrtius æstimabunt, q̄
qui similem aliquando telam nobiscum texuerunt, aut nostram hanc cum Italiæ editionibus
contulerint. Planeq; falsum esse conuincemus, nullos libros emaculatiores prodire, q̄ qui ex
Italia emerferint. Id totum igitur (mi Capito) in tuum effundimus sint, tibiq; nuncupamus.
Tui erit uicissim uetustissimum, & eundem longe utilissimum autorem nobiscum a barbaro-
rum tyrannide uindicare: ut sicut iam pridem meliores literæ florere cœperunt, ita quoq; uetus &
simplex Medicina caput randē exerat ac regnet. Argent. Anno ab orbe redempto. 1529.

I O. R V E L L I V S S V E S S I O N E N.

Antonio Disomo, Regio Consiliario, utriusque Linguae
peritissimo, S. D.



V M S A E P E mecum reputarem, humanissime simul ac eruditissime Antonio Disome, omnium ferme disciplinarum conditione, illud in primis cum admiratione mihi, tum miseratione dignum occurrebat, quod saluberrimae humano generi artes, uel diuinitus nobis datae, uel mortalium studio adinuentae, ita affectae iaceant, ut ad interitum spectare uideantur: quibus olim excolendis, ueteres usque eo diligentiam omnem, & operam impenderunt, ut intentatum nihil, indisciplinatumque reliquerint. Etenim per aliquot iam secula, & qui discunt, & qui docent, neglecta uera liberalium scientiarum maiestate, ad echinatas capionum, cauillationumque argutias diuercentes, dici docti, haberi, quod esse malunt. Quod ut in ceteris ferri, dissimularique fas sit, in ea tamen arte nefarium est, quae ad tuendam salutem hominum, nata, incorrupta semper, augustaque esse debet. Quae tamen fere iam inde ab auorum nostrorum memoria, tam turpi ac desidiofo consensu deserta exoleuit, ut uerear, ne flagitiosa fortasse suis professoribus, aut inhonesta uideatur, qui principem eius partem, quae cognitione delectat, medicamentorum constat, uel rei difficultate deterriti, uel ingenio diffisi, uel iudicio lapsi, a se abdicarunt, rudique medicamentariorum ministerio delegarunt: existimantes fortasse dignitatem amplitudinis suae non parum detractum iri, suamque auctoritatem eleuari, si ea ipsi tractent, quorum officinae sibi iam cognitionem uendicarunt. Cum ceteri artifices ignominiosum sibi esse putent, si imprudentes sui negotij conspiciantur, aut uniuersam instrumentorum suppellectilem non plane ac memoriter teneant. Proinde ars illa praestantissima, sine qua natura manca merito ac mutila esse censetur, priscis temporibus clara & percelebris, literarumque monumentis diligentissime tradita, posterioribus seculis, adeo a se ipsa degenerauit, ut simulacrum eius tantum, uel potius umbra nomenque remanserit. Quippe cum olim Haerbarij item atque Medici essent, scidit inde se studium: hominumque inertia simul & incuria factum est, ut ab his destituta quorum erat propria, circulatorum, ne dicam impostorum, praeda facta fuerit. Cum igitur pluribus scriptorum monumentis admonerer, apud antiquos gloriae fuisse Simplicium curam, ac memorabiles illos Graecorum duces, hoc illustri studio semper floruisse: huic parti ruinosae, nutantis, breuique casurae, adhibendam esse manum duxi. Nec aliud occurrebat praesentius auxilium, ut a medicis ignorantiae tenebris assereretur, ac errores expiari, innumeraque monstra domari possent, quod ea quae graecis literis hac de re tradita erant, latinis illustrarentur, ac quae sine graui perniciie dissociari non poterant, a ceteris medicinae partibus auulsa, suo corpori restituerentur. Pedacium igitur Dioscoridem, praestantissimum huiusce partis auctorem, tot seculorum suffragijs comprobatum, pro medio citate nostra, latinitate donauimus, tuoque nomini dicamus. Quod te acerrimi iudicij uirum, omnium bonarum literarum, ac utriusque linguae studiosissimum cognouimus: nec parum laudis tibi ex ea re peperisti. Simul ut extaret pignus mutuae inter nos beniuolentiae: simul ut mortales officio cumulatione demereremur. Quod quidem opus non paruo sane negotio a nobis elucubratum, ueluti primitias industriae nostrae & maioris laboris praeludium, laeta fronte suspicias. De quo id constantissime ausim polliceri, esse quasi quoddam naturae promptuarium, ex quo res omnes, herbae, fruges, frutices, arbores, fructus, quibus arua, campi, pascua, montes, conualles, plana confragosaque uestiantur, & uisceribus terrae abdita, in humani generis praesidium depromi facile possunt, ac denique ueluti a quodam rei medicamentariae seminario, in humanum usum transferri, e quo uita omnis ea haurire queat, quibus humanae salutis prospiciatur, & morbis omnibus consulatur. Quae uero meae partes fuerunt, quoniam in propria harena, ut dicitur, uersari uidebar, cum sim professione medicus, dedi operam, utinae & praestiterim, uti omnia ex fide responderent, & ut latina oratio, graeci auctoris sensum fideliter redderet: ne absurda peregrinitas, medicinam quoquomodo pollueret, etiam res ipsa elegantiam ac nitorem non facile admittat. Curaui praeterea, ut idem utrobique sensus seruaretur, nulla uocum nouitas, nec triuialia uerba, aut exposita: quibus quaerendis, latinos fere omnes euoluimus. Cum uero latina me defecerunt, graecis quidem, & fere iam receptis uti malui, quod noua, aut barbara licenter admittere. Sed nihil eque me torset, quod ueterum manu exaratorum exemplarium inopia (illud enim tantum nactus sum, quod bibliopolae typis excusum circumferunt) in quo permulta manifestissime deprauata, ex uaria auctorum lectione, & praesertim in libris Venenorum, ex uetustissimo Pauli Aeginetae codice, ad pristinam sinceritatem restitui-mus. In quibus studiosos omnes rogatos uelim, ut boni consulant. Vale Parisijs. Calendis Maij. Anno Domini, M. D. XVI.



VANQVAM amicissime Ari, complures non ueterum modo, sed recentiorum quoque, de medicamentorum compositione, uiribus, atque probatione commentati sunt, nobis tamen nec uanum, nec a ratione abhorrentem impetum animi ad hoc opus incessisse, tibi ostendere tentabimus. Cum eorum nonnulli absolutum nihil addiderant: alij quae plurima quae auditu percunctando didicere, scriptis tradiderant. Siquidem Bithynus Iolas, et Heraclides Tarentinus, omnia prorsus Haerbaru tractatione, rem sane quae paucis perstrinxerunt. Neque uero omnes illi de metallicis quicquid rebus, aut odoramentis memoriae prodiderunt. Crateuas autem Haerbarius, & Andreas medicus, qui ceteris diligentius hac in parte uersati uidentur, radices multas apprime utiles, haerbasque haudquaquam adnotatas reliquerunt. Nec sic quoque prisci laude sua fraudandi sunt, quos & si pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen impendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum, e quibus Iulius Bassus, & Niceratus, & Petronius niger, & Diodorus, Asclepiadae omnes, medicinalem materiam uernaculam cognitamque uulgo, dignam censuerunt, quae ab eis literis exacte mandaretur, ut medicamentorum uires, probationesque cursim complexi, sic nullo experimento eorum effectus colligentes, inani uero reddendarum caussarum studio uerba fundentes, alia pro alijs scriptitando, rem in acruum congeriemque extulerunt. Siquidem qui inter eos egregius habetur Niger, Euphorbium nascentis in Italia, Chamelae succum esse contendit: Androsamonque eandem haerbam cum Hyperico esse: quinetiam Aloen in Iudaea fossilem nasci, & pleraque his similia citra effectuum explicationem exponit, quae prorsus ueritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non occulta fide, sed narratione potius ab alijs accipisse. In ordine item ipsi aberrarunt, partim eorum discrepanteis, nullaque cognatione coniunctas uireis collidentes: alij per elementa literarum scripta in ordinem digerentes, quo facilius memoriae mandarentur, genera, & eorum effectus, a sua cognatione disiungentes. Nos uero ab ineunte (ut ita dicam) iuuentute, iungi desiderio cognoscendae materiae affecti, permultos Mundi tractus peragrauimus (nec enim nescis, nos militare uitam exegisse) tuoque hortatu commentatione in sex Libros contulimus: quod opus tibi dicamus Ari, grato nostro animo obsequentes, ob eum quo nos prosequeris affectum. Etenim natura cum in omneis eruditione excultos, tum uero in eos, quis

cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse
soles, in nos etiam aliquanto peculiarius. Enimvero non paruum præ-
bet tuæ probitatis argumentum, optimi uiri Licinij Bassi singularis er-
ga te charitas, quam una degentes nouimus, cum mutuam inter uos be-
neuolentiam æmulatione dignam intueremur. Admonitum autem te
uelim, eosque qui in Commentarios nostros incident, ut ne in uerbis fa-
cultatem nostram æstimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritia
curam. Etenim partim res oculis subiectas exactissime cognouimus,
partim narratione omnibus consona, indagationeque rerum apud sin-
gulos uernacularum diligenter accepimus. Dabimus igitur operam, ut
differenti ab alijs ordine utentes, genera Medicinarum, uiresque descri-
bamus. Quod autem necessaria sit Medicamentorum ratio, nemo est fer-
me qui ignoret: quæ & toti arti coniuncta sit, & ab ea expugnandis mem-
bratim uitæ remedia petantur. Quare per medicamentorum composi-
tiones atque misturas, & facta in morbis pericula extendi, & incremen-
tum capessere potest, quamplurimum opitulante singulorum medicami-
num cognitione. Quinetiam uernaculam, familiaremque materiam com-
plectemur, ut perfecta sint quæ scriptis relinquemus. Verum imprimis
curam impendere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur, &
recondantur. Intempestiue enim decerpta, conditaue, aut nullo, aut eua-
nido munere funguntur. Serena etenim cœli constitutione demetenda
sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si uel squallores, uel im-
bres infesti sint: quemadmodum si loca in quibus prodeunt cliuosa, &
uentis exposita sint, & perflata, frigidaque, & aquis carentia. in his enim
locis uires eorum longe ualidiores intelliguntur. Contra, quæ in cam-
pestribus, riguis & opacis, cæterisque locis a uento silentibus enascuntur,
plerumque degenerant, & minus uiribus ualent: multoque magis, si non su-
is horis peropportune colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint.
Neque ignorandum, quod sepe præcoci, aut ferotina loci natura, aut anni cle-
mentia, maturius, aut celerius adolescunt. Nonnulla propria ui hyeme
florent & folia pariunt, quædam bis anno florifera. Quare cui in animo
est, horum peritiam assequi, necesse est ijs prima germinatione solo e-
mergentibus, adultis, & senescentibus adesse. Nam qui pullulanti hæ-
bæ dumtaxat astiterit, adultam cognoscere non potest: neque qui ad-
ultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quo fit, ut propter mu-
tatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum, seminisque magnitu-
dinem, nonnulli qui olim has ætatum uarietates non perspexerunt, ma-
gno in errore uersentur. Quæ caussa etiam nonnullis scriptoribus impo-
suit, qui hæbas quasdam, uerbi gratia Gramen, Quinquefolium, et Tussi-
laginem, emittere florem, fructum & caulē negant. Ergo qui sæpius ad ui-
sendas hæbas & earum loca se contulerit, earum cognitionē maxime conse-

quetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex hærbaceis medicaminibus
Veratri genera, nigrum inquam & candidum, multis edurare annis: reli
qua a trimatu inutilia. Quæ uero ramis scatent, sicut Stichas, Trixago,
Polium, Abrotonum, Seriphum, Absinthium, Hyssopum, & alia id ge
nus semine pregnantia, demetantur, Flores quoque antea quam sponte
sua decidant, Fructus autem ut maturi excutiantur necesse est, & semina
ubi sicari cœperint, priusquam defluant, Herbarum succus, et foliorum
elici debet, germinantibus adhuc cauliculis. Lac & lachrymæ excipian
tur, inciso per adolescentiam caule. Radices, & liquamenta, corticesue ut
recondantur eximere conuenit, cum hærbæ suis folijs exuuntur. Siccant
tur etiam expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quæ
luto, aut puluere sunt obsitæ, aqua elui debent. Flores, & omnia quæ iu
cundum odorem efflât, arculis tiliaceis nullo situ obductis reponantur.
Nonnunquam charta, aut folijs semina, ut perennent, apte inuoluun
tur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, uitreæ, aut cor
nea conuenit. Ficulis, etiam si modo rara non sit, accommodat: & li
gnea, præsertim e buxo: sed ænea uasâ liquidis
oculorum medicamentis, quæ aceto, pice
liquida, aut cedria componuntur.

Adipem autem & medul
las stagnéis uasis
recondi con
uenit,

T H O. D. Aucuparius, can
dido lectori.

Dum uirtus animi, dum mens diuina Deorum
Ad sacra uel solum scandere templa sinunt,
Dotibus his, altâ conscendit Apollinis arcem,
Sancta Dioscorides atria dignus adit.
Magnaq; pro meritis aperire sacraria Phœbi
Dum datur, has medicas arte ministrat opes,
Ille Dioscorides pater antiquissimus, autor,
Pœoniæ largas protulit artis opes,
Rerum uirtutes, rerum cognoscere causas,
Rerum naturas, historiamq; docet,
Antidotū morbis, certissima pharmaca præstat,
Et quæ præsentî cætera multa Libro.

PEDACII

D I O S C O R I D I S

De Medicinali materia. LIB. Primus.

IO. R V E L L I O interprete.

¶ D E I R I S ^{primus seu} CAP. I



R I S, ab aliquibus Illyrica, ab alijs Thelpide, ab alijs Vrania, a nonnullis Cathæron, aut Thaumastos, a Romanis Marica radix, a quibusdam Gladiola, ab alijs Cōsecratrix, ab Aegyptijs Nar appellat. A cœlestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert Gladiolę, sed maiora, latiora, & pinguiora. Flores summo caule, alterno situ incurui euarant. Siquidē candidi, pallentes, lutei, purpurei, aut cerulei conspiciuntur: qua diuersi coloris specie, quedam cœlestis arcus imago representari uidetur. Radices subiacent geniculatę, durę, odoratę: quę frustatim dissectę, in umbra siccantur, & traiectę lino reconduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica, & inter has laudatissima quę pumili fere & densa constat radice, frangenti contumax, subrussa colore, gustu amaro, odore perq̃ suauis ac sincero, ita ut nullum prorsus situm redoleat: quę dum tunditur, sternutamēta mouet. Secundum locum habet Aphricana, candidans, gustuq̃ amara. Teredines in uetustate sentiunt. tunc tñ odoratiores reddi solent. Vis omnib. excafactoria, extenuans. Contra tussim efficac, humorum qui agre reijciuntur crassiciem digerunt, Bilem, crassamq̃ pituitam, ex hydromelite drachmis septem epotę, purgant, Somnum conciliant. Lachrymas cient. Torminibus medentur. Eadem potę ex aceto, auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, cōuulsis, a uento refrigeratis aut rigentibus, & quibus genitura effluit. Menses, ex uino potę pellunt. Decoctum earum, fęminarum fortibus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaq̃ in eis uenarū spiracula. Ischiadicis infunditur. Fistulas ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditę, partus extrahunt. Quinetiam coctę & illitę, strumas, ueteresq̃ duricias emolliunt. Siccę quoq̃ ulcera replent, & cum melle purgant. Nudata ossa corpore operiunt. Dolorib. capitis, cum aceto & rosaceo magna utilitate illinuntur. Admotę cum albo veratro, et duabus mellis partibus. lentigines, & uitia cutis in facie emaculant. Pessis, Malagmatis, & Acopis inferuntur. In uniuersum, magni ad omnia usus.

A
ἰρίσ ἰλλυρικὴ
καθάρων
θαυμαστός

B



H E R M O L A I B A R B A R I

Patritij Veneti, & Aquileiē. Patriarchę
Corollarij Liber Primus.

¶ I R I S Illyrica.

R I S æstate floret. Folio arundinaceo. Caulem habet cubitalem, atq̃ rectum, similem Asphodelo, sed minore, durioremq̃. Sunt qui Hierida appel-

Lib. 21, cap. 7.

Theoph. Libro
9. capite. 7.

Clentunde Consecratrix quoque dicta sit in latino. E rebus in unguenta uenientibus, nihil in Europa nasci, præter Iridem, autor est Theophrastus. In Illyrio commendatissima est parte mediteranea, maximeque septentrionibus, exposita, & ut inquit Nicander, & Plinius, in siluestribus Drilonis ac Narone. Laudatur Iris radice tantum, Macedonica candicat. Illyrica duorum generum est. Raphanitis, a similitudine: quæ & melior. Rizonomos, subrufa. Non improbat & Pisidica Selgensium. Fossuri, tribus ante mensibus mulsâ aqua circumfusa, hoc ueluti placamentum terræ blandiuntur. Circumscriptam mucrone, gladio triplici cum legerint, protinus in celum attollunt: præcipiturque ante omnia, ut casti petant. Nullos cultus exigit, nisi quæ ablaqueatam resiccare solent. Tractu, pustulas ambustri modo facit. Terebinib, non sicca modo, sed in terra quoque celerrime infestatur. Ostendit nobis Iridem in horto suo felix Sophia Padug. Re presentabat eius flos pruna perque matura odore, ob quod mire appetitur a formicis. Radicem quoque uidi rufam extra, intus percandidam. Genus unum eius Troglodyticum appellant: quam qui manducauerit, uinum quibus copioso eo hausto, non oboler: ut Aphricanus scriptum reliquit. In Paulo, non troglodytin, sed Astragalitin legas, in pastilli compositione Pantolimi uocati. Philinus flores Iridis Lycos uocari tradit: quia labiorum lupi speciem reddant. Apollonius, Herophili discipulus, Iridem ex Elide ac Cilicia probabat. Est & orbiculus, pastillusue, Iris appellatus, in medicina: is ex croco, alumine, myrrhæque conficitur.

MARCELLI VERGILII

in Dioscoridem ANNOTATIO.

N E S abbreviate.



PRIMUM in Iride illud animaduertisse oportet, non esse legitimam eius appellationem quod in grecis passim legitur, *ἰρις* ἡ ἰρις. bonitatis enim laus a regione hæc est. Quæ tanta, et apud omnes tam communis illi fuit, ut petita a medico, uillicone, aut unguentario in aliquem usum Iride, non nisi ex ea regione probaretur, & peteretur. Nec sine causa. Frigida enim, & aquilonia regio est, quo cæli statu & afflatu, materia omnis, in omnes usus meliorescit. Indicant id Theophrastus, Celsus, Columella, Plinius, omnesque alij.

Illyrida. Non probamus quod Ruellius reddidit, ab aliquibus Illyrica, nec quem Barbarus in Corolla suo titulum illi adscripsit, Iris Illyrica. Videtur enim alter, bonitatis laudem a regione illi concessam, inter appellationes simpliciter numerasse. Alter uero negasse, alibi quæ in Illyrico Iridem nasci, aut de Illyrica tantum hoc capite agitur: tamen Iris ubique fere nascitur, & hic de omnibus agat, & in eorum censu hanc unam cunctis præferat. Meminisse etiam debuerat Ruellius, nihil pro se adiectum, qualicumque ea sint, significare, substantiæque tantum inbere: in Iride autem indicandam substantiam, quæ patronymico illo nomine, ex quo consensu oim, inter appellationes, laus illa bonitatis referenda erat, nimis obscure & importune indicabat.

DErunt forte qui putabunt sic dici Illyricam, ut Vetonica, aut Gencianam, aut Lysimachiam: quasi prima illa a ueronibus in Hispania, duæ illæ a regibus inuenta, solo possessiui nomine appellatur et celebrant.

Tbalpide. Tbalpide eandem hic etiam dici ait, nulla nobis eius uocis significatione, nisi forte una tantum mutata litera, Tbalpide legendum sit, manifesta congruentem a uerbo *θάλλω*, quod grecis calefacere, & fouere significat, derivatione, quod primum præcipuumque habet Iris.

Quod si suspicionibus etiam contra hæc uicia pugnandum sit, non fuerit abs re forsan monuisse, quod Tbalpidem legitur, Hieridem, siue Hierida legi posse.

Vrania, id est, celestis, ideo dicta ab aliquibus fuit, quæ celestis arcus specie modo floreat.

Tbaumastos, id est, admirabilis, eadem illa ratione, quæ a Poetis idem ille celestis arcus Tbaumanci as dicitur, genus, originemque hanc illi ex admiratione nouæ rei, rudi adhuc sæculo, ut primus Plato indicauit, assignantibus antiquis.

Catheron, id est, purgans, notissimo participio, *καθάρω* τὸ καθάρω.

Gladiolus, quia specimen Gladiolæ herbæ præfert, de qua infra lib. 4.

Consecratrix. Credimus quidem ideo Consecratricem dictam, quæ in sacrificijs, purificationibusque suis antiquitas quondam Iride usa sit: nihil tamen hactenus compertum de ea re nobis est.

Radix Marica. Quoniam autore Nicandro, probatissima nascitur in ripis Naronis, in Illyrico flumini, non Maricam, sed Naronica legendum esse suspitio est. Nicandri uersiculus est. *ἰρις δὲ ἡν ἰστέρε δριτῶν καὶ νεπονοῦ ὁχθῆν*. Relinquimus tamen hoc legentibus arbitrium, satisque sit, suspicionem hanc nostrâ alijs indicasse.

Flos in summis caulibus. &c. Sic uertimus. cum in grecis, nec summi, nec singuli caules, floresque ulli sint. Factumque id a nobis est, non tam, quæ paulo ante diximus, ut certius tota res pateret, quæ in antiquis grecis aliquot, non *ἄνθη ἐπὶ τῶν καυλῶν*, simpliciter legitur, uerum *ἄνθη ἐπὶ καυλῶν*, quæ non singulis caulibus singulos distribuit flores.

Quod erat item *παράλλαξ*, ex propria græcæ uocis significatione, recta, paribusque in se specijs in altum

altum surgentes, diximus. Hoc enim, si Euclidi, & græcorum grammaticis credimus, lineis quas Parallelas dicunt, præcipue comperit. Nec alio pertinet ea uox. ꝓ ut significetur, nō temere, neq; in latera, aliarum plantarum modo, caules Iridis spargi, sed in altum nullo inter se concursu ferri, & flores in bis ita disponi, ne alter alterum impellat, simulue concurrat. Quod totum, ut nobis uidetur, parum feliciter reddidit Ruellius, dicens alterno situ flores in Iride uariari.

Diximus præterea, in arcum flexos, nullo illic arcus uestigio, quoniam floris ea flexura sit, & græca uox ἰριζουμένη, quæ id exprimit, in arcu frequens reperiatur.

Subieciimus deinde, & in arcu illo uariantes tam multos colores, præsentis temporis participio usi: quoniam quemadmodum in cœlesti arcu, colores illi plures ex mathematicorum & speculata docentium ratione, non sunt, sed ex oppositæ lucis accessu, ideo apparent, q̄ refractis lineis uidentur, non dissimili modo & Iris cum luce colores mutet: idq̄ Dioscoridem intellexisse omnes uolunt, cum dixit, ὁραται, id est, uidentur, quia non sunt in arcu illo tam multi colores, sed ratione accedentis lucis uariant & uideantur.

DE ACORO. CAP. II

ACORVM aliqui Choron Aphrodisias, Romani Veneream, aut Radicem nauticam, Galli Piper aqueum uocant. Folia Iridis habet, angustiora tamen. Radices non dissimiles, complicatas, non in rectum, sed obliquum tendentes, & summo cespite sparsas, geniculis inter ceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimū est densum, candidum, plenum, non exesum, odoratum, cuiusmodi colchidicum, & galaticum, quod Asplezion dicunt. Radici uis calfactoria. Decoctum potu urinam cit. Prodest lateris doloribus, & iocinoris, atq; pectoris. Item torminibus, uulsis, ruptis. Lienem absumit. Vrinæ stillicidio, & serpentum ictibus auxiliatur. Ad muliebres infusus Iridis modo utiliter impo-
nitur. Oculorum caligines succo discutit. Antidotis radix magno usu commiscetur.

BARBARI COROLL.

Acorus, & Acorum, folijs Iridis, sed pediculo longiore. Radices ei Dioscorides subalbidas, Plinius nigras, minusq; uenosas reddidit. Ipse rubentem intus uidit, foris colore inter nigrum atq; candidum. Raram inuentu, falso tradit Apuleius. Nec nisi cum florem emiserit cognoscibilem. Locis cultis, & hortis, præterq; nascentem. Legendam Augusto mense, Aphrodisiam, & Sandicem nauticam, & Syngentianam, alio codice Radicem nauticam, & Vnguentianam, & Piperapium uocatam. Ut deprauatum in Dioscoride quis putet, Piperacium, pro Piperapium. Quandoquidem apes, suspensa in uasis earum herba, nunq; diffugere, idem autor proditum reliquit. Arbitrantur & ea parte mendam esse, qua in Dioscoride, Asplezion appellari legitur. Asplenon uerius existimant, q̄ radix Acori lienem comminuat. Optimè Ponticæ, post Galaticæ, mox Creticæ, candidiores Ponticis. Sed primæ in Colchide, iuxta Phasin amnem, & ubicunq; in aquosis. Recentibus uirus maius q̄ uetustis. Siccantur utribus in umbra, digitalibus frustis. Sunt qui radicem Rusci Acoron uocent, proinde ut hanc nonnulli Acorum siluestrem appellare malint. Acoro flores aureos, croceosue attribuunt. Semen spissum, atq; gliscens, non sine odoris gratia. Haberi ferunt in Chio, Hellespontog; & Euxino mari. Radicem Acori subrubentem, uenis intrinsecus peruosis, prætenuibus, & candidis, eaq; indigenas Iridis loco uti.

EX M. VERG. COM.

Acoron, genere neutro. Sunt qui, q̄ herba sit, fœminino Acorum dicunt. Aphrodisiadem. Fortasse, quia in modice uenerem excitat.

Piperapium, Solus Apuleius, quicumq; ille fuit, Piperapium dictam fuisse testatus est, quod ea in alueribus suspensa, nunq; facto examine, apes in colonias fugerent: nec tamen causam reddidit, nec inuenta batenus a me est.

Idem præterea, Sandicem nauticam, & Syngentianam ait uocari, incerta nobis pariter nominum huiusmodi origine & causa. Quæ ego hoc loco non posuissẽ, nisi ante nos, in Corollario suo, bas uoces Barbarus inferuisset, pluriq; q̄ æquum erat fecisse eas uideret, & nisi in antiquo latino Dioscoride, in extrema

A

ἀκρον
χορον ἀφροδι-
σιας

groß galgent mangel.

ἀσπλεζιον

B

Lib. 15. cap. 15.

D I O S C O R I D I S

Capitis coronide, omnia illa ab Apuleio dicta, tanquam legitima proles scriptori huic adiecta fuissent. Obiter quoque monendum cenſeo, quod in Apuleio legitur, Sandicem nauticam dici Acorum, uideri nobis ex Dioscoride acceptum, & si id sit, corrupte Sandicē, pro radice legi, tanque facilis in una litera lapsus, radice in sandicem est, ut id potius, iudicio meo, sic legendum in Apuleio fuerit, quam importuna hoc loco uocis usus inferendus.

Subinde, quoniam Iridi similis, et cognata Acorus sit, eadem illa appellatione potuisse quondam uocari. Et ut in Iride radix Marica, Naronica, donec certius aliquid inueniretur emendata nobis est, sic etiam in Acoro, pro radice nautica, Naronicam legi eodem modo posse. Nec est quod miretur aliquis, latinarum uocum tam graues mendas, cum graecarum in latinis, non dissimiles passim uidere liceat.

Primam habet bonitatis existimationem quae densa, etc. Priuatim illud opinatur, non densam, sed amaram legi quondam potuisse. Monueruntque nos, probatiores in Graecis codices, in quibus una tantum mutata litera, non πικρὸν, quod densum, sed πικρὸν, quod amarum significat, legitur. Quod & Galenus aperte innuit dicens, saporem Acoro acrem, cum amaritudine aliqua esse. Non tamen communem lectionem damnamus.

DE M E O CAP. III.

μῆλον
ἰθαμαντικόν

ἰθαμαντικόν
μῆλον

Plinius lib. 26.
capite. 23.

ME O N, quod Athamanticum uocant, in Macedonia & Hispania plurimum gignitur, Anetho folijs & caule simile, sed eo crassius. Binum ferme cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectumque radicibus, longis, tenuibus, odoratis, lingua ex calfacientibus. Quae feruefacta ex aqua, uel trita citra coctionem, praclusorum renum uescicaeque farcta uitia potu leniunt. Urinae difficultati medentur. Stomachi inflationes discutiunt. Torminibus, commota uulua, articularum doloribus, atque fluxionibus pectoris, trita cum melle in elegmate auxiliantur. Sanguinem per menstrua pellunt, deflectionibus feruefacta. Infantibus autem illita imo uentri, urinas mouent, quod si plus quam deceat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

BARBARI COROLL.

ME V, graeci μῆλον, producta priore syllaba, non diphthongo, sed uocali longa, ex Galeno. Genera eius duo. Nobilius Athamanticum, ita dictum, quod ab Athamante inuentum sit. Siue quod laudatissimum in Athamante reperiatur. In Italia non nisi a medicis serui solitum. Folijs Anisi, caule interim bipedali. Radicibus multis, & obnigris. Alterum rufius. Est & Geum inter herbas longe distans a Meo, radículas, ut inquit Plinius, tenues, & nigras habens, & beneolentes. pectoris & lateris doloribus quaerenda. Cruditaribus quoque discutiendis, Iocundo sapore, Sunt tamen Pliniani codices, in quibus Gethin haec, non Geum scribatur. Quae recte nescio.

EX M. VERG. COMM.

ME O N. Plinius Meo id, non Meon appellat, qua uoce posteriores etiam aliquot usi sunt. Caule, folijsque Aniso similibus. Variant in figura, & historia eius antiqui Graecorum codices. In aliis quibus enim legitur Aniso, in aliquibus, Anetho folijs similibus esse. Plinius Aniso similia dixit. Nosque in ambiguo, ueluti alterius testis accessione, quae pluribus testimonijs confirmabatur, Anisi lectionem magis probauimus.

Quod Athamanticum uocant. Cur Athamanticum diceretur, Plinius eodem loco exposuit. Nisi forte Athamanticum, subraſio t litera, legendum, docuerit Dioscorides, & in Athamania nasci, cuius regionis gentem (autore Byzantio Stephano) aliqui Thessaliae, aliqui Illyrico adsignant. Nec refert, in Macedonia nasci Meon dixisse Dioscoridem: quoniam non longe distant inter se, Macedonia, et Thessalia. Suspicio tamen haec magis, quam decretum sit.

DE C Y P I R O.

κύπριος
ἰθαμαντικόν
μῆλον

Cypirus, quem aliqui Erysisceptrum, ut Aspalathum appellant, Romani lunci radicē, aut luncū. Folia fert Porraceis proxima, sed longiora, & exiliora. Caulem odorati lunci, cubitalem aut maiorem, argulosum. In cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur. Radices, quarum

ces, quarum in medicina est usus, contiguus inter se oleis oblongis rotundiſue ſimiles, nigro colore, ſuaui odore, amaro guſtu. In lacunofis et paluſtribus enaſcitur. Optima eſt grauiffima, denſa, fractu contumax, plena & aſpera, odoris cum quadam acrimonia iucundi: qualis eſt Cilicia, Syriaca, & quæ a Cicladibus inſulis petitur. Huic calida uis ineſt. Venarum ſpiracula laxat. Vrinam ciet. Ad calculos, aquamq; ſubtercutem utiſſime bibitur. Aduerſus ſcorpionũ ictuſ remedio eſt. Perfrictionibus uuluæ, & præcluſionibus, ſotu prodeſt. Pellit menſes. Contra ulcera oris, etiam ſi depaſcant uorentq; farina eius efficax eſt. Malagmatiſ calfacientibus, et unguentorum ſpiſſamentiſ adijci ſolet. Aliud Cypiri genus tradit in India naſci Gingiberis effigie, quod manducatũ croci uim reddit, & illitum præſentem Piſilotri uim exhibet.

BARBARI COROLL.

Cypirus Gladioli nomine apud noſtros, aliud eſt q̃ Cyperus is, quem latini radicem Iunci, ut Dioſcorides hoc loco, Columellaq; teſtatur, uel Iuncum quadratum, ut Cornelius. Cyperus pro Gladiolo, ut Theodorus Gaza uertit, a Theophrasto peculiarem habere quandam æqualitatem in caule deſcribitur. Radice tamen inæquali, partim craſſa, carnoſaq; partim gracili atq; ſurculofa. Hanc & in altum agi. Ideoq; contumacem emori atq; uelli. Naſci e latere huius radiculam, unde cauliculus erumpat alius. Sunt qui non diſtinguant, uicinitate nominis fallente, ſed diſcrimine multo ſeparatur. Cyperus, ſiue Cypirus is, qui latine Gladiolus, & Xiphion a Dioſcoride ſuo loco dictus, radice bulbofa. Laudatiſſimus in inſulis Creta, dein Naxo, poſtea Phœnice uiſitur. Cretico eſtor odorq; propinquus Nardo. Acrior hic Naxio, exilis Phœnicio, nullus AEgyptio. Nam & ibi puenit. Tradunt, non egredi barbaros domibus, niſi ab hoc ſuffitu. uegetiores enim, firmioreſq; ſic fieri. Dulcis huic radix, & quæ decocta panem etiã gratiorem faciat, ut inquit Theophrastus, unde ſumpſit Plinius. Ponderoſior utiq; ſimul ſubacta. Hoc ipſo nomine paluſtris alter Cypirus, ſiue Gladiolus oſtenditur, quem Iulio menſe ad radicem ſecari præcipiunt. Tertioq; die in ſole contineri, dum candidus fiat. Quo tidie autem ante ſolem occidentem in tectum referri: quoniam nocturni rores paluſtribus officiant. Sit paluſtris hic qui floreat uere cum Viola nigra, ſed utiq; poſt Anemonem, quæ Timonia uocatur, comitatus Hyacinthis, & Gladiolus appellatus, an, quod magis puto, Xiphion, Theophrastum ſecutus, quærendum & æſtimandum relinquo. Eſt enim uagum & commune multis nomen Gladiolus. Folium ſimile nomini. At Cyperus, de quo nunc agitur, Iunci triaguli, ut Plinius interpretatur, ut Celfus, quadrati ſpecies, iuxta terram candidus, cacumine niger, pinguiſq; proſilit, cuius radicem cū oblōga eſt, Cyperidem appellat. Laus prima Hamoniaco, ſecunda Rhodio. Tertia Thracio, ſi Plinium ſequare. Nouiſſima AEgyptio, qui & cōfundit intellectum, quoniam et Cypiros ibi naſcitur, qui eſt Gladiolus. Sed & Cyperus pro Iunco duriffima uixq; ſpirans in AEgypto. Cæteris odor ipſam Nardum imitat. Nonnulli diſtinctionis gratia Cypiron pro Gladiolo, Cyperon pro Iunco triangulari, ſiue quadrato nominant. Non deſunt qui Pſeudocypirum uocent Gladiolum: de quo Plinius, ſemel quod meminere, dixit. Ocyſſima omniũ Cypirus, & Pſeudocypirus frutex. Protinus enim, inquit, floret, ſemenq; profert. Quadratus & angularis, ad differentiam rotundi Iunci, quem Schoenon græci uocant, cognominatus intelligitur. Penultimam Cyperi, q̃q; diphthongo longã, q̃q; uocali breuem græci ſcribunt. Dicitur hæc & neutro genere Cyperum a Paulo. Habetur & Cyperus Indica: quam Plinius, Cyperin appellat, etiamſi quibuſdam exemplaribus Cypera legitur. Non poſſum non mirari, quamobrem Laurentius Valla, Cyperum in Herodoto, Siler, conuerterit.

EX M. VERG. COMM.

Cyperon. Non poterunt hoc loco facile ſecerni, Cyperus, Cypirus, & in feminino genere Cyperis, quæ tria, multa nominum ſimilitudine, genere, & ut a toto pars inter ſe differunt. Cyperus ſiquidem, de quo nunc agimus, in Iuncorum genere, anguloſo caule, & odorata radice eſt. a Celſo. lib. 7. cap. 22. quadratus Iuncus, a Plinio lib. 21. cap. 18. triangularis primo, mox anguloſus dictus, grani, inter granes autores, in angulis eius

A

Celfus Lib. 7.
cap. 22.
Theophrastus
lib. 9. cap. 7.

B

Plinius lib. 21.
cap. 18.

D I O S C O R I D I S

C discordia. Nisi Dioscorides, cum dicens, utriusque bystoriā confirmasse, & omnem inter eos, ueluti litē di-
remisse uideatur.

Cyperus autem palustris herba est, Gladiolus quondam, a cultellati folij figura, ut credimus dictus, mul-
tis locis laudatus, & in Aegypto, si Plinio credimus, nullius odoris.

Cyperida postremo, foemino genere, radicem Cyperi ueteres dixerunt, non omnem, sed eā, quam hic
oblonge oliuæ similem, præcipui in medicina usus, laudauit. Quæ una fuit causa, ut posteriores medici Cy-
perin, siue Cyperida tantum nouerint. Sic enim Paulus ægineta multis locis appellat. Quam uero Plinius eo-
dem capite dixit, per se Indicam herbam esse, quæ Cyperis uocetur, Zingiberis effigie, & commanducatam
Crocium reddere, diuersæ a Dioscoride traditur. Non enim Cyperida, sed Cyperum dicit appellari. quæ in
India nascatur Zingiberis effigie. Credimusque nos, ab utroque idem dici, uarietatemque uocē, non aliud esse, quā
quæ a potiore parte, & quæ sola usum habet, tota quondam etiam dicta fuerit planta. Quod a Romanis tri-
dem factum est, qui Iunci radicem Cyperum dixerunt, totam plantam, et utiliorem eius partem simul signan-
tes, quā appellatione usus Columella aliquando est.

Sunt qui Erysiceptrum uocent. Nulla a nobis deprehensa hætenus appellationis huius origo est, & cau-
sa: quando, ut ex utriusque bystoria patet, nihil simile inter se habent, Cyperus & Aspalathus, & licet ali-
quas habeant in medicina pares uires, non tamen ætī καλλόμεια sunt, id est, æqualia, uel quæ bodie sic uocant,
quid pro quo. Nisi fortasse multis quoque plantis commune sit hoc nomen. s. Aspalatho, Cypero, Verbenaci,
alijsque. Ex quo enim per multas uagatur plantas, oportet in eo commune aliquid intelligere, quo se diuersis cō-
ciliet rebus.

DE CARDAMOMO CAP. V.

Cardamomum optimū est, quod ex Comagene, Armenia, Bos-
phoroque deuehitur. India quoque & Arabia prouenit. Eligi debet
plenum, frangenti contumax, contractum, quod em̄ huiusmodi non est,
intempestiuum iudicatur, & gustu acre, subamarum, & odore caput ten-
tans. Excalfactoriam uini habet. Potumque ex aqua, facit ad comitiales, is-
chiadicos, tussis, neruorum resolutionem. Item ad rupta, uulsa, tormina.
Latas uentris tineas excutit. Ex uino aut potum renibus, difficultati uri-
næ, a scorpione ictus, necque non omnibus uenenum uiibrantibus auxilio
est. Cum cortice radicis Lauri epota drachma, calculos comminuit. Par-
tus suffitu enecat. Scabiem ex aceto illitum adimit. Et ad unguentorum
spissamenta additur.

Cardamomum, Theophrastus refert, alios e Media putare, alios ex India cum Amomo at
que Nardo, et plurimis id genus aduchi. Simile Amomo, frutice toto prædicat, semine ob-
longo. Quatuor eius genera, uiridissimum, & pingue, acutis angulis, fricanti pertinax, quod
& maxime laudatur. Proximum ruffo candicans. Tertium minutius atque nigrius. Peius, uari-
um & friari facile, odorisque parui. Id quod uerius est, uicinius esse Costo debet. Præcisi optimi,
ait Plinius, in libras denarii. 2. Recentiores Mauritani, hoc non Cardamomum, sed Cordume-
ni, et syluestre Caros uocant. Cardamomi uero nomine genus aliud intelligit, in geminas di-
uisum species. Alterum lentis amplitudine. Alterum cicoris obnigri, in quo granum albū sit,
gustu mordaci. Vtrunque odoratum. Quid, quod officinæ Cardamomo utuntur alio, quod quod a
Mauris, & a Dioscoride perscribitur, duplicis fastigij, minus & maius appellantes, cui simile
id semen sit, quod uulgo Melligera dicitur, prælatum uiribus?

A D D I T I O

Author Pandectarum, nescio quid hic lepidum somniat de Cardomomo & Cardumeni, indicans ali-
quid esse corruptum in Dioscoridis textu, & apud Plinium. Mirum, quomodo hic tam lyncens fuit, in alijs to-
tus talpa. Quare posthac illius nenij immorari, uel eas reprobare, omitemus.

DE NARDO CAP. VI.

Duo Nardi genera, unum Indicū, alterum Syriacū appella-
tur. Non quod in Syria proueniat, sed quod montis in quo ori-
tur, pars una ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Syriaci gene-

Εἰς Καλλόμειαν

καρδὰ μωμον

Διὰ μὲν
κατὰ τὴν

Theophrastus
Lib. 9. cap. 7.

Plinius lib. 12.
capite. 13.
Gale. 7. simplic.

κατὰ τὴν ἰνδιάν
κατὰ τὴν συρίαν

re præcipuum est recens & leue, largam gerens comam, flauum colore, perç odoratum, ac Cyperum redolens. breui spica, amaro sapore linguâ siccante, q̃ diu in sua odoris gratia permaneat. Ex Indicis autem Nardū quoddam Gangitis uocatur, a fluuio Gange, apud quem enascitur, montem præterfluente: quod genus ob multam loci in quo prodit uliginem, uiribus infirmius est, atque procerius adolescit, oppletas ferēs spicas, ab radice comatas, unaque conuolutas, ac grauiter olentes. Montanum autem odoratius, spica breui, odore Cypero uicino, cæteras habens Syriaci dotes. Est & genus quoddam, cui Sampharítico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, cãdidiore caule, Hircorum uirus supra modū redolente: quod improbat. Madefactum uendi solet. Quod uitium ex eo deprehēditur, q̃ cãdida sit spica & squalida, nulloq̃ puluere obsita. Adulteratur * Stilbio cū aqua, aut Palmeo uino, inspissationis ponderisq̃ causa inspirato. Intueri autem oportet, si lutum radici bus infideat, & incerniculo puluerem excutere, eluēdis manibus utilem. Vim habent excalfactoriam & exiccantem. Vrinam mouēt. Aluum potu sistunt. Vuluæ profluuiā, sanieq̃ apposita supprimunt. Nauseæ ex aqua frigida auxiliantur. & cardiacis, inflationi, iocineri, regio morbo, renum uitjs. Aquæ autem incoctæ fotu ad infessum, uuluæ inflammationibus medetur. Ad glabras oculorum genas ualent: siquidem eas ad densiorem pilum reuocant. Perfusis humore corporibus insparguntur. Miscentur antidotjs. In fictili non picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum uino in pastillos coacta.

NARDUM, siue Nardus, in Thracia exili odore nascitur, siue ut Theophrastus scripsit, radiculæ potius quædam imitantes odore Nardum, sed leuiter. Quamquam Plinius, inuentam in Thracia nuper herbam dicat, cuius folia nihil ab Indica Nardo specie dissentiant. Principatus in unguentis Nardo apud ueteres fuit. Frutex est graui & crassa radice, sed minuta nigraq̃ ac fragili, quamuis pingui, situm redolente, qualem Cupressi, aspero sapore. folio paruo, densoque. Cacumina in aristas se spargūt. Ideo gemina dote Nardi spicas, & folia concelebrant. Alterum genus apud Gangem in totum reijcitur. Adulterat Pseudonardo herba, quæ ubiq̃ nascitur crassiore atque latiore folio, colore languido, in candidum uergētē. Sit hæc fortasse quæ Dioscorides Samphariticam appellat. Item sua radice permixta, ut Stilbio ponderis gratia, & Gummi, & Argenti spuma, & Cyperi cortice. Precium spicæ in libras denarij. 90. foliorum uero eius quod maiora hæc habet, Hadrospheron uocatur, denarij. 30. Eius autem quod minima & Mesospheron dicitur, denarij. 60. At eius quod minima, & ob id Microspheron appellatur, laudatissimumq̃ est, denarij. 75. Odoris gratia omnibus maior recentibus. Nardo color, qui inueterauerit, nigriori melior. Indica, Syriacæ præfertur a Galeno. Nigrior, & ualidior etiā nonnunquam Syriacæ. Reliqua genera in mēione gallici Nardi, montaniquē dicemus. Sed poscimus identidem, quæ sint illæ nouem species, quas Nardum Indicum representare Plinius existimet. An Gāgetis prima, Ozenitis, ab odore uirulento dicta. Secunda, Pseudonardus. Tertia, Syriacæ. Quarta, Gallica. Quinta, Cretica, id est Phu. Sexta, Baccharis. Septima, Hirculus. Octaua, Alfaron. Nona, Thracia. Quidā usum Nardi omnē abdicāt, ob ancipitē ex ea medicinā, propterea q̃ in Nardo quiddā ueneni delibutorij uice nasci ferāt, e quo Pison illud uocatū Indi cōficiant. Exitiale nō potu modo, sed in sudore corporibus appositū, etiā si ab leuibus purgari, & elui curiosissime, moris sit, fortasseq̃ hoc sit aut nō dissimile quod Pharicō a Dioscoride, ac Plinio, Phariakon ab Atheno dicitur, gustu Nardi omnino, sed resolutionē faciens neruorū, cū alienatiōe mētis, atq̃ spasmo. Aduersari autē huic ueneno maxime Cydoni-

A

ἐν τῇ πλὴν χροῶν

γερῆτις

καυθιστικὴ

*Barbat. σίμυς

καρδιαγυγισ

ὀφθαλμικὴ

B

Pli. lib. 12. cap. 12.

Theophr. lib. 9

cap. 7.

Nouem species
Nardi.

Nardus in uenenum.

Cam, Philarcus prodidit. Notatu dignū, a Dioscoride, ceterisque ueteribus, Nardū Cyperi odore comēdari, a Plinio Cupressi. Malim qdem librarij fuisse culpā. Sed si Plinio tribuendus error foret, affinitate uerbi lapsū esse dicerē, Cyparissizin, pro Cyperizin legentē. Nec dici potest, cōtra deceptū esse Dioscoridem, non Plinium. Quando quidem Cyperum idem ipse Plinius odorē Nardi referre alio loco scribat. Aduertēdum est & illud, omnia Nardi gener a herbas esse, prāter Indicū. In ijs probatio una, ne sint fragilia, & arida potius q̄ sicca folia. Hirculus porro, qua uitiari Nardum sinceram dicunt, nō grauitate odoris modo, sed similitudinē etiā nonnullam animalis eius nomen accepit. Græci τρῶν uocant. Illud, ne quem fallamus, nō scendū. Syriacam Nardum duplicis esse generis, Vnum in India, sed parte montis in Syriam spectāte, quam Plinius sub Indicē uocabulo complectitur. Alterum in orbe nostro, id est, Syria, Ciliciaque. Hoc aliqui Gallico præponunt. Aliqui contra, Gallicum Syriacū tali præferunt. De Gallico mox dicemus. Calenus Indicam Nardum accipit quoties absolute Stachyn, id est spicam Nardi nominat, quasi spicam cæteræ non habeant, sed herbā dumtaxat, quē admodū & Plinio uidetur. In Gedrosia quoq; Nardum est. Sed sub Indico cōtineri credimus.

EX M. VERG. COMM.

Altera Indicam spectat. Credimus, statim in ipsis foribus, perisse hūc capiti alteram regionem, Indicam scilicet. Siquidem incipiens hoc caput Dioscorides, duplicem esse Nardum ait, uocariq; Indicam alterā, alteram uero Syriacam: subiecitq; statim, non ideo Syriacam dici, quia in Syria nascitur, sed quod montis in quo nascitur, altera pars Indiam, altera Syriam spectat: exigebatq; rei, & distinctionis sequax necessitas, ut quē admodū dixerat, non ideo Syriacam. &c. sic etiam de Indica aliquid diceretur: nec aliud dici posse uidebatur, ob ea quæ statim sequuntur, q̄ quod de Syriaca dictum fuerat, non ideo scilicet Indicam dici, quia in India nascitur, sed quod. &c. Quam ob causam nos Indicam etiam reddidimus, & si in nullo grecorum inuētum id a nobis fuerit.

Desyderari eodem loco etiam hic potest mōris nomen, & situs in quo Nardus nasci dicitur, siue in India, siue alibi is esset: & si ob ea quæ Plinius libro. 12. rettulit, & hic paulo post de Gange dixit Indiæ Nardi nates assignandi sint. Leniora tamen hæc sunt.

D Illud in medio capite grauius, in quo non diuersa tantum, sed contraria penitus omnia leguntur. In pluribus siquidem, sed minus probatis legitur. Auferendum in usu Nardi, si quis huiusmodi radicibus eis haerit, cum eribro eximendus puluis. In paucioribus autem, sed probatior fidei, ut nos, & c. mus, Auferendæ scilicet in usu eius primum radices. &c. Videturq; prior lectio illa, Nardi radicibus, medicinam uti, ex quo in eum usum purgari eas iubet: idque Paulus Aegineta libro sexto etiam confirmat, iussitq; hanc Serapionis ætate huius loci lectionem.

Profunt & stomachi erosionibus, quas Græci Cardilogmos dicunt. Sciendum illud est, quam Græci ex multo tempore τῆς δυν, id est, cor dicunt, antiquissimis in ea gente Peloponnesiacis belli tempore, quo Hippocrates, medicinam suam commentatus est, non cor, sed uentriculum & ostium stomachi significasse, eaq; uoce intellexisse antiquissimos Græcos, stomachum & eius ostium tantum, non cor penitus aliud ab eo. Testis significationis eius est Hippocrates grauis autor, & qui pro oraculo in hīs merito habendus sit, pluribus locis ea pro stomacho usus est. Hæc multis etiam alijs in commentario suo Vergil.

A D D I T I O.

Cyperum imitante, id est, angulosum luncum.

Hircum spirante, id est, bircinum, uel Hircorum uirus.

Frutice pumilo. Breui, uel decurtato. Adulterant flatum Stibio. Δολοῖται δὲ αὐτὸν ἐμψυαῖς αὐτοῦ σιμ. Est autem Stimmi, ut inquit Plinius lib. 33. cap. 6. lapis spumæ candidæ, nitentisq; non tamen erans lucens. Stimmi appellant alij Stibis, alij Alabastrum, alij Larbason. Duo enim genera, mas, & femina. &c.

Abundantia feminarum, id est, uulue fluxiones & proflumina.

Nono fistili, cui testorium non sit obductum. ἰν ἀγγλῷ καὶ αὐτὸ ἀνατρεῖται, uase nouo picato.

De NARDO Celtico.

CAP. VII

Celticum Nardum nascitur in Liguriæ alpibus, Saluınca patrio nomine appellatum. Prouenitq; in Istria. Exigue fruticat, & cū radice uellitur. Alligatur manualibus fasciculis, manipulatimque componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido. Florem luteum. Foliorum, ac cauliculorum dumtaxat usus est, & odoris suauitas. Vnde pridie fasciculos aqua abluerē expedit, & exempta terra, pauito solo atque

lo atque humenti subiecta, charta reponere, postridie repurgare. siquidē
 utile ab acroso, alienoq. propter humoris uim, non excutitur. Adulter
 ratur imposita herba simili, quæ Hirculus uocatur, ab odoris grauitate.
 Sed facilis cognitio. Namq. herba candidior est, sine cauliculo, minorib.
 bus folijs, radice neque amara, neque odorata, uti uerum Nardum est.
 Itaque radices atque cauliculi, abiectis folijs triti, uino excipiuntur, dige
 runturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asseruari de
 bent. Laudatur maxime recens, iucundi odoris, radice numerosa cohæ
 rens, plenum, nec fragile. Ad eadem quæ Syriacum pollet, sed uehemen
 tius urinam cit, & stomacho utilius est. Inflammationibus iocineris, &
 felle suffusus auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum Absinthij de
 cocto bibitur. Item aduersus lienem, renum & uesicæ uitia, & uenenatos
 ictus ex uino. Additur in malagmata, potiones, & calfaciētia unguenta.

BARBARI COROLL.

Nardum Gallicū, siue ut Græci appellant, Celticū, laudatur in orbe nostro post Syriacum.
 quippe quod Syriaco sit leuius, neq. multū ab Indico differēs, ut Plinius existimat. Preciū scilicet
 u. Hoc & Aliucā uocari, Dioscorides Alpinis populis tradit. Credo Saliuncā legendū, a uici
 nitate pro Saliuncā. Quam nostri foliosam quidē, sed breuem, & quæ necdū non possit, descri
 bunt. Radici numerosæ cohæret herba uerius q. flos. Densa, ueluti manu pressa. Breuiterque
 cespes sui generis, Pannonia gignit hanc, & Norica, & Alpiū aprica. Urbium Eporedia tan
 tæ suauitatis, ut metallum esse coeperit. Vestibus interponi eam gratissimū. Seruius hanc uul
 go appellari, Orci tunica. De Hirculo herba, cuius Dioscorides hoc loco meminit,
 superius mox absoluit.

EX VERG. COMM.

Celticam Romanis, Id est, nascit in alpihus Lyguriæ Celtica Nardus, sed ab incolis regionis
 suæ uocabulo Gallica ap. ex. est. Suspicionemq. & coniecturam hanc nostram confirmauit, quod est illic
 aduerbium ἡπικαριος, i. e. iesta in Græcis significatione, quasi dicas, regionis modo & nomine, quod totū
 nos reddidimus, ab incolis græcis suæ nomine appellata. Nec aliud est quod certū & pro comperto nobis de ea
 dici possit, & Genuates quidā Herbaria pro celtica Nardo, quæ est spicati floris colore inter ceruleum &
 purpureum, Lauendulam exhibuerit, notam passim herbam. Aequè sic dicta, quoniam magnum uetigal gen
 ti illi hæc herba est, quotannis in Apricam eam ferentibus mercatoribus, ubi lauandis, fouendisq. corporib.
 bus in balneis Lybes ea utuntur, nec nisi decocto eius abluti mane domo egrediuntur. Eadem, nullam talē her
 bam hircini odoris nouisse dicebant. Quo fit, ut peritioribus censendum relinquamus, an Celtica Dioσκο
 ridi Nardus ea sit, quam Genuates Celticam spicam, & Lauendulam, dicunt. Nobis nō uidentur alteri alte
 rius respondere notæ. Nam Dioscorides suam luteo flore describit, Genuates suam colore inter purpureum
 & ceruleum ostendit: ob quas causas suspicantur proprii generis herbam, Gallicam hanc Nardum esse.

ἀλινύνη. Ruellius, Saliunca. Sed omnē, ut uidetur, doctissimorum nostra ætate uirotum, pro Saliunca,
 & Gallica Nardo disceptationē excitauit una Dioscoridis in hoc capite uox, quæ nec una, nec eadem in an
 tiquis græcis est, sed in aliquibus Saliunca, in aliquibus Aliunca, in aliquibus etiam geminato, ll, Alliunca le
 gitur. Ex qua tam multiplici lectione, oborta nobis suspitio est, uirum in ea uoce esse, ut plerumque fit in his
 quæ latina a Græcis, & a latinis græca imperitis alterius lingue librarijs scribuntur: nec Saliuncam illic le
 gendum esse, uerum ex quo sunt in quibus duplum ll est, & in omnibus totam dictionem finit ea syllaba, Gal
 lica, pro Saliunca legi posse.

Prodest eodem modo & lienī. In aliquibus græcis non prodesse simpliciter scribitur: ut non tantum enī
 parti, uerum in quo eius partis malo etiam mederetur, intelligeremus.

Demontano NARD O. CAP. VIII.

Montanum NARDVM, quod ab aliquibus Thylacitis, & Ni
 ris appellatur, in Cilicia & Syria nascitur, caule & folijs Eryn

A

ἡπικαριος

ἀλινύνη

ἀλινύνη ὑπόλοιπ

Lib. 21. cap. 7.

Lib. 20.

B

Lauendula qua
re sic dicta est.

ἀλινύνη ὑπόλοιπ

θυλακίτις νίρις

D I O S C O R I D I S

C gio similibus, minoribus, minime tamē spinosis, asperisq. Radicibus bi
nis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu Hastulae regiae, sed lōge gra
ciliorib. & exilioribus. Neq. caulem, neq. fructum, neq. florem profer t.
Ad eadem quæ Celticum efficax.

N B A R B A R I C O R O L L.

Nardus montana, quam & Syriacam, & Ciliciam uocare possis: a Galeno Pyritus appella
ta est, nec priuatim a Plinio describitur, sed inter Nardi genera promiscue refertur.

E X M. V E R G. C O M M.

A Quibusdā Thylacitis, θύλακας, θύλακον q. masculino, nec minus θύλακον neutro genere, græci uocāt ex
animalium corio factum sacculum, peramq. & utrem: ab his nominibus adiectiua forma θύλακτις uox fa
cta est, qua ueteres Nardum hanc dicebant. propterea, q. ex Cilicia, Syriaq. mercatoribus in Græciam sac
culis bis clausa, uenalis afferretur: eratq. id nomen quasi nota gentis, & a gente bonitatis in hac herba. Indi
cant id meliora græcorum Lexica, in quibus uox θυλακοφόροι, exponitur, θύλακας περιέχει ποτα τὰ ἀρώματα,
quod est, ex corio sacculis circumferentes aromata.

Folia cum Eryngio similia habet. Dissidet hoc quod mox a fine subiungit. Non caulem, non florem,
non semen fert. Quomodo caulem habet, & non caulem? Sed quod nouisse huic capiti credimus, rerum uo
cumq. similitudo & uicinitas est. Habent siquidem græci κλάσας κλάσας, & κλάσας, quibus diuersas in plan
tis germinationes ostendant, ut aliquando certius nos etiam docebimus. Factuq. facile fuit, ut in priore il
la parte qua nunc legitur κλάσας, id est caules, non id, sed κλάσας, aut κλάσας quondam legeretur. & a pa
rum perito, diligentiq. homine, altera pro altera uox accepta fuerit: ideo nos ramulos illic reddidimus. nam
in posteriore illo, caules necessario reddēdi erant. In pluribus siquidem naturæ ordo hic est, ut ad florem &
semen, caulem prius proferri oporteat. Quæ duo in montana Nardo hic negaturus, tertium etiam negare co
gebatur. Qui autem ab nobis ramuli in herbis dicuntur, bi sunt qui infructuoso genere, quale Absinthii, Ru
ta, Thymus, pluratq. alia sunt conferti ab uno principio, pluresq. oriuntur, eadem altitudine fere inrer se
crescunt.

D Minora tamen, nec Eryngij modo aspera. In paucioribus græcis, θύλακας, quod asperum, sed πύλακας,
quod crassum significat legitur. Nec aliud Serapionis ætate legimus. Foras uersabatur, asperita
tem ne, an crassitudinem, Dioscorides excepisse uideatur. Nos quoniam θύλακας, peritas, & aculei a Dio
scoride assignantur, illud malimus, quod eiusdem scriptoris auctoritate desumimus, confirmari poterat.

D E A S A R O

A S A R V M, quod & ipsum aliqui siluestre Nardum appellant,
Magi Sanguinem Martis, Latini Perpescam, alij Bacchar, Otha
nes Thesam, Aegyptij Cerea, alij Nardū rusticū, Galli Bacchar, Aethru
sci Succinum. Odorata herba est, qua in coronamentis utuntur, Hedere
folijs, minoribus multo, rotundioribusq. Floribus Cytini Hyoscyami,
purpureis, inter folia proxime radicem emicantibus, odoratis, in quibus
semen acinosum. Cauliculos habet angulosos, asperos, & molles. Radi
ces nune rosas, geniculatas, tenues, obliquas, gramine nō dissimiles, lon
ge tamē graciliores, odoratas, quibus odor inest Cinnamon proximus.
Asperum siccumq. solum amat. Eius radix, ruptis, conuulsis, in tussi ue
tere, & spirandi difficultate, & si urina ægre redditur, opifera est. Menses
ciet. Contra serpentū ictus, eam in uino bibere, salutare est. Folia, ut quæ
astringant, illita, capitis doloribus, oculorum inflammationibus, incipi
entibus ægilopijs, mammis tumentibus a partu, i gribus sacris auxilian
tur. Odor somnum gignit. Crateuas herbarius de eo ita scriptū reliquit.
Asarum excalfactoriam uim habet. Urinam cit. Hydropicis, & uetusto
coxendicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulsa pote
menfes

Ἰσχυρὸν
ἀσπιδίον
θίακ
βάνχαρ
σοκκινία
ἰσχυρὸν κατὰ τὴν
βασιλικήν

Asarum amat loca
aspera & siera.

Radix Asari pota in
uino est salutaris
contra ictus ser
pentum.

Crateus her
barius.

menſes trahūt, & Veratri albi modo purgant. In unguenta additur. Vm broſis montibus prouenit, ſed plurimum in Ponto, Phrygia, Illyrico, & Italiae luſtinienſi agro.

BARBARI COROLL.

Aſaron, præter cæteras differentias, molliora quoq; folia obtinet q̃ Hedera. Radice Galli ci Nardi, Semine, ſaporis calidi ac uinoſi. Bis anno floret, Autumno, & Vere. Optimum in Ponto, proximum in Phrygia, tertium in Illyrio. Effoditur cū mittit folia, ſicut oclyſſime trahens, ac ſeneſcens. Error librariorum eſt in Plinio, qui alicubi iubere uidetur ſiccandū in ſole, alicubi in umbra. Niſi quis poſteriorē locum ita legat. Nō q̃ ſiccandum ſit in umbra, ſed q̃ ſi tū celerrime in umbra ſentiat. Non ignorandū, Baccarē aliud omnino eſſe q̃ Aſaron, etiāſi me dicinas, quas Dioſcorides Aſaro dicauit, Plinius apud nos Baccari magna ex parte acceptas retulit. Nec mirum, cū ſit earum natura uiribus & effectu proxima. Ceterum Perpenſam, ſiue Perpreſam (nā utrūq; legitur, ut in Baccare latius expoſui, non Aſaron, ut Dioſcorides, ſed Baccarē intelligi Secundus noſter uoluit. Cōtra quoq; deſcriptio Aſari a Dioſcoride facta, cōgruit Baccari multis partibus. Primū, q̃ odor ei Cinnamomo uicinus redditur, ut Aſaro. Deinde, q̃ grācilis, nec humidio ſolo prouenit, ut Aſaron. Alioquin reprehēdūtur a Plinio, q̃ Nardum ruſticū, radicē Baccaris appellauere: quia Nardum ruſticū proprie ſit Aſaron. Quod uero Dioſcorides Coronamentariā eſſe dicit herbam Aſaron, id Baccari potius q̃ Aſaro conuenit. Propterea, q̃ Aſaron uocari ſcribunt, quonjā in coronas atq; ſerta nō addatur. Legebatur in Dioſcoride, Romanos Aſaron Peritrefam uocare: nos Perpenſam, aut Perpreſam ex Plinio correxiſimus. Auctor is eandē opinor herbam. 21. libro Perpenſam. 26. Perpreſam nominat. Codices etiānum ſunt, in quibus non Perpreſa, ſed Sparſa legitur, ut exiſtimo corrupte. Legitur & Aſarus, non pro Aſaro, ſed pro Ariſaro mendose. Quid enim incolume relinquit Medico- rum imperitia? De Ariſaro agemus ſuo loco.

EX M. VERG. COMM.

Aſaron. Græciſtiſimum eſt, ſignificatq; illis idem quod ἀσπάρτον, id eſt, quod in ornatu non ue- niat, & quo ornari nequeamus. Auctor Plinius. Cæterum obſtat quod ſequitur, Coronaria & odorata herba, Aſaron eſt. Reſpondeo, q̃ aduerſatur. Poſſunt enim plantæ, earumq; partes, ob præcipuam eius uſus cauſam, coronariæ eſſe, & tamen, & nihilominus quia aliquid aliud impedit, in coronas non addi. Sunt qui ruſticam Aſaron appellant. Haud dubium, quin ob odoris ſimilitudinē. Cæteræ appellatio- nes nobis incognitæ, ideo exentendas poſt nos alijs relinquitur.

Cogor uel nolens appellare Ruellium: quoniam & ipſe, & alijs interpretes, intelligunt in Aſaro caulicu- los aſperos & molles, contrario (niſi mutata ſit latinarum uocum antiqua eſtimatio inter ſe) & ob id ſimul impoſſibili habitu. Qui enim poſſet ſimul aliquid aſperum & molle eſſe? & cur poſt ſeminis hiſtoriam, qd̃ in his quæ cauleſcunt, in caulibus, plerūq; abſoluit Aſari caules, importuna, & parum congrua ſermonis ſerie in Dioſcoride deſcripſerunt? cū nec molles, ſed raras græci omnes illic habeāt, nec caules eo loco, ſed cuſa- pides, acuminatq; aliqua, quæ in eo ſemine ſe proferunt, hic ſcriptor deſcripſerit. Video lapſum. Crediderunt illi, nihil aliud græcis, & huic præſertim ſcriptori, καυλός, uel καυλίς ſignificare, quam in oleribus, plantiſq; alijs, ad ſtorem, & ſemen in altum ſurgentes, ueluti uirgas, cum tamē Homerus καυλὸς δέντρος ſuos dixerit, et omnia eius gentis Lexica indicent, καυλός, et eadem ratione καυλίς, præter cōmunem illam in plantis ſignifi- cationem, in extremo baſili ferramento acuminatam ſummam partem, in quam caua deinde cuſpis ferrea inferitur, ſignificare: qua uocis non illa eſtimatio reddendus, iudicio noſtro, fuerat hic locus. Hic enim poſt totā ſeminis figuram, quam nucleis acinorum ſimilem, dicebat habere idem ſemen, oſtendit uelut in cebina- ro caſtaneæ calice, acuminata quædam, nō tamen ut in illo conſerta & denſa, ſed rara, nec mollia, uerū a ſpe- ra, neque anguloſa idem, ſed angulorum figura modo et ſpecie. καυλὸς δὲ enim ea appellat, non καυλὸς δὲ, qd̃ ab illis fuerat diligentius obſeruandum. Nō enim parū refert in pīctura, ſeu modo uel ſpecie. In illo ſiquidem manifeſti anguli erunt, in hoc quod angulis ſimile ſit. Videatur tamen Plinius hoc aliter indicaffe, cum ait, Aſaro ſemen acinoſum & uenoſum eſſe, nec extare in eo acuminatū quid, ſed per longitudinē uenas extendi.

A D D I T I O.

Subtiles, obliquæ, &c. Quæ ab hoc loco ſunt, uſque ad id, Aſarum excaſſatoriā habet naturam. &c. in Vergilio deſyderatur, putatq; idē, ab ſciolo quopiam fuiſſe inſerta, qui ut Plinij ætate etiam aliqui inue- niebantur. Baccarem ruſticum Nardum credidit, & appellauit eadem appellatione, deceptus, quod Aſa- ron ruſticum, Nardus etiam dicebatur, Aſarum et Baccarem ſimul miſcuerit, diuerſis alioqui foliorum, radi- cum, & in quibus utraq; naſcitur locorum notis a Dioſcoride deſcripſis.

Plinius lib. 12.

capite. 13.

Aſarum hic floret
anno.

Deſcriptio Aſari conuenit
Baccari in multis partibz.

Idem libro. 21.

capite. 6.

D I O S C O R I D I S

De P H V.

C A P. X

PH V, quod & aliqui siluestre Nardum appellat, nascitur in Pon-
to, folio Olufatri, aut Elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, leui,
cauo, molli, in purpuram uergente, geniculis intercepto. Floribus Nar-
ciso proximis, maioribus, teneris, & in albicante purpureis. Radice su-
perius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo uillosa, in nigri Vera-
tri, aut lunci odorati modum, capillamentis inuicem contextis, flauescen-
tibus, odoratis, cum quadam odoris grauitate Nardum emulantibus. Ex
calfacit. Urinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem prestare
potest. Ad lateris etiā dolorem efficax. Menses ciet. Antidotis inseritur.
Adulteratur radice Rusci ammissa: sed maleficium deprehenditur, quā
hæc dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia.

Lib. 12. cap. 12.
G lib. 20. ca. 21.

PH V, Creticum Nardum nonnulli uocant. Radice uillosa, imitanteq; autium pedes. In
Plinij codicibus corrupte Aliphu, pro Phu legitur.

QU A M pro Dioscoridis Phu, ætatis nostræ Herbarij ostendunt, s. Valerianam herbam, longe mi-
nor ea est quæ ab hoc scriptore describitur. Nec omnes omnino utriusq; inuicem sibi respondent
notæ, quæ tamen præcipue a Dioscoride numerantur, conuolutæ glomeris modo, & ut Plinius ait, uillose ra-
dices, earumq; Nardi odor, & albicans in caule purpura, in nostra pariter sentiuntur. Credimusq; nos, ut in
animalibus etiam fit, quæ non eadem mole corporis, ingenijq; sui natura ubiq; uidentur, in alieno orbe cæ-
li, aut terræ beneficio, Phu hanc proceriorem nasci. Quoniam & in nostris habitatis aliqui uisa fuerit.

D
μαλαβάρου

φού
μαλαβάρου
νέριον

MALABATHRUM arbitratur aliqui esse Indici Nardi foliū, falsi qua-
dam odoris cognatione. Per multa enim Nardi uirtutes olent, quem
admodum Phu, Asarum, Niris: secus autem res se habet. Namq; Mala-
bathrū foliū sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, Lentis palu-
stris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum, statim lino transsu-
itur, & siccatum reconditur. Tradunt, siccatis æstiuo feruore aquis, hu-
mum aridis fruticibus uri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidē re-
nasci. Laudatur recens, cum nigredine quadam candidās, integrum, nec
fragile, odore caput feriens, quod diu insuauis odore permaneat, & Nar-
dum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirum uero & minutim con-
tusum, præsertim si cariosum uirus olet, uitiosum est. Easdem Nardo for-
titur uires, sed efficacius omnia præstat. Urinam uehementius ciet, ac sto-
macho magis pdest, Malabathri uis. Lippitudinibus, inflammationibus-
q; tritum, & in uino seruefactum, cōmode illinitur. Subditum linguæ,
oris halitum & suauitatem cōmendat. Vestium quoq; odorem interpo-
situm seruat, & ab erosione tuetur.

Lib. 12. cap. 26.
G de medica-
mētis eius Lib.
23. capite. 4.

MALABATHRUM Plinius arborem Syriæ affirmat esse, folio cōuolutro, arido colore. Ferti-
lis in Aegypto. Laudatius in Indiæ paludibus, sine radice fluitans. Improbant candidū. Ce-
lerrime situm in netustate sentit. Odor in uino sufferuefacti antecedit alios. In precio quidem
prodigio simile est, a singulis denarijs ad tercentum peruenire libras, ut idem inquit auctor, o-
leum autē ipsum in libras. 60. Sunt codices in quibus non oleum, sed folium scribatur. Si hæc
uera sunt,

uera sunt. Malabathri gemina conditio. Alterum palustre, ut Dioscoridi uidetur. Alterum ex arbore. Nunc medici nec primum, nec secundum, sed tertium Malabathri genus nouere, appellatum a Mauritanis suis Tenbul, cuius furculi cum folio, quale Arbuti siue Lauri est, pollicares plerumque ad nos ferantur, & fructus quoque laurinis bacchis simillimus. Omnia tria genera folij appellatione significari consueuerunt, sed priora duo maxime. Foliatum inde unguentum, quo foeminas locupletes oblini Romae solitas, Galenus auctor est. Graeci Phyllon, hoc est, folium uocant. Herbæ genus in saxosis montibus repertum. Nostri uulgo Folium syluestre nominant, ut suo loco differemus. Notandum, uariare Dioscoridem a Plinio, quod alter Malabathrum probari scribat, quodam salis gustu, alter nullo.

EX M. VERG. COMM.

Malabathron, Primum illud nouisse omnes uolumus, hoc ipsum ab antiquis graecis folium simpliciter fuisse dictum. Sic Plutarchus in libello cui titulus est. Quod bruta ratione utuntur, appellat, odoramentis alijs coniungens, simulque numerans Cinnamomum, Nardum, Arabicum Calamum, & folium Malabathrum. f. hoc. Quæ uox ex antiquo & probatoris mihi fidei graeco codice, instaurata a nobis illic est, ubi legitur. Et nisi id fiat, non nasci folium, quæ in cunctis alijs debeat. Ab hac appellatione Malabathrinum unguentum foliatum Marciali, & plerisque alijs, & graecis & latinis scriptoribus dictum est, & ob odoris similitudinem idem Nardino esse creditum aliquando.

Et Niris, quæ montana Nardus. &c. Non *νῆρις*, quæ montana Nardus ab eo dicta est, uerum *νῆρις* in aliquibus legitur. Sed nos maluimus, quod ex eodem scriptore seruari poterat. Et si forte utroque loco *νῆρις* legi quondam potuerit, non adeo tamen similis odor est, ut mutanda temere ea uox fuerit.

Probatur recens & nigredine albicans. Habet plures Graecorum codices descriptas his uerbis Malabathri notas. *ἴσῃ δὲ καλὸν τὸ πρόσφατον καὶ ὑπόλευκον*. probatur scilicet recens, & quod albidum, non omnino album, id enim *τὸν ὑπόλευκον* significat. Sequitur deinde. *ἐν τῷ μελανισμῷ τὴν ἀραιότητα καὶ ὀδυνηρὸν*, quæ latinis uocibus reddi quidem possunt, sed parum sequaci & congruente sensu. Si enim dicas, in nigrescendo infragile, nec in partes discerptum, quis erit sensus? & quæ rei natura? Si quidem nulla in colore causa est, cur magis, minusque frangatur aliquid, & in suis partibus integrum seruetur. Accedit & illud, quod copula illa *τι*, uerbo subiecta, alterius in sermone membris incipium facit, quique in lectione Graecorum consueuerunt, facile in alijs obsequiuntur. Quod nisi Plinius, aliique omnes, nigricantem colorem Malabathro adsignauerunt, & uicium hoc loco testemur, & ut consueuimus in integrum etiam restituerimus. Unus igitur tantum inuentus mihi est codex, in quo legitur *ἐν τῷ μελανισμῷ τὴν ἀραιότητα καὶ ὀδυνηρὸν*, quorum uerborum sit sensus. Et in mollescendo infragile, & in suis partibus integrum, ut nihil de colore illic agatur, sed de tenaci lentore: doceatque Dioscorides, probari Malabathrum id, quod recens & albidum sit, quodque cum mollescit lentore admiscit, tenaces uires tunc acquirat, fiatque infragile, & in suis partibus integrum seruetur. Quod in multis humor natius, & accedens facit, fiunt enim eo firmiora, & ualidiora. Quemadmodum contra arefcentia franguntur.

Prodest oculorum inflammationibus. Sunt exemplaria graeca in quibus legitur, *καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμίας καὶ πρὸς τὰς φλεγμονὰς ὀρμῶσι*. & ad oculorum præterea lippitudines & inflammationes accommodatum est: ut duo intelligantur mala. Sunt itidem in quibus, *καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμίας καὶ φλεγμονὰς*, id est, ad oculorum inflammationes, ut unum tantum mali genus intelligatur. Nos posteriorē hanc lectionem, monente Plinio, magis probauimus. qui de unguento Malabathrino legit epiphoris, id est, inflammationibus uino expressum, utilissime imponitur.

DE CASIA CAP. XII.

Casia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam cognitur, crassi corticis sarmento, folijs Piperis. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, Coralij æmula, perque angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens, & cum aliquanto feruore astringens, aromatica, uinoso odore: cuiusmodi est quæ ab incolis Achy appellatur, ab Alexandria negociatoribus, Daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine: quæ Rosam odore imitatur, præcipui in me-

A

φύλλον

B

κασι

αχ

διαφύτι

γης

b

D I O S C O R I D I S

C dicina usus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Museletico blasto cognomē est. Reliquæ uiles, & quæ Aphemū dicitur, nigra, insuauis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ Darcā & Citton uocāt barbaro nomine.

Ελάστερ μουσελίτιο
Δάρκα καὶ κίττον

Theoph. li. 9.
capite. 4. 5.

Plin. lib. 12.
capite. 20.
Item lib. 122
capite. 19.

B A R B A R I C O R O L L.

Cassiam Theophrastus fruticem magnitudine Salicis Amerinæ prodidit, sed multis furculisq; brachiata ramis. Crassiore q; Cinnamomum sarmento, præterea nervosissimā, & solo cortice commendabilem, qui ei cutis tenuitate obducitur. Neq; aliter detrahitur, q; si præstas corio bubulo uirgulas bicubitas, enati uermes eroderint, cortice tuto, intactoq; propter amaritudinē, odorisq; acrimoniā futuro. Hæc iuxta Cinnamomi cāpos in Ethiopia, Trogodytis permixta connubio, sed in mōtibus nascitur. Dissentita Dioscoride Plinius, Theophrastū (ut arbitror) secutus, q; Dioscorides crassum eius corticē esse scribat. Illi cutē uerius, q; cortice uestiri tradant, quem conteri, atq; in Cinnamomo leuari exinaniriq; precium sit. Amplitudo fruticis cubitorum trium, ut idem Plinius existimat. Color triplex. Cum primum emicat, cādī dus pedali mēsurā. Deinde rubescit, additō sequepēde. Ultra nigricans: quæ pars inquit maxime laudatur, ac deinde proxima. Damnatur uero candida. Eligendam recentem maxime, & quæ sit odoris mollissimi, breui tunicarum fistula, & non fragili, quæq; plurima, minimū ponderis faciat. Cæteræ notæ congruunt. Lactam uocant talem, barbaro uocabulo. Alia est Balsamodes, ab odore dicta, sed amara, ideoq; utilior medicis. Hanc esse, quam Dioscorides Zegir, et Galenus Gizer, Aetius Ozem uocarūt. Haud multum absum quin credam. Nominat & Mottoden Galenus speciem Cassiæ uiribus proximam, appellatæ Gizer. Nigra unguentis expetebatur. Precia nullis tam diuersa. Optimæ in libras. xl. cæteris, xv. His addidere Mango nes, quam Daphnoidem uocant, Isocinnamon cognominatam, preciumq; eius faciūt, ccc. Ad ulteratur Syrace, & propter similitudinē cortice Lauri furculis tenuissimis. Forteq; Daphnoides eadē sit Cassia, quam Daphnitā a mercatoribus uocari scribit Dioscorides. Fabulæ sunt, Cassiam, Cinnamomumq; nidis auium decuti plumbatis sagittis, aut circa paludes quasdā col ligi, propugnante diro serpentium genere, ut Theophrastus ait, uespertilionumq; ut alij. Sci endum, q; ubi nos in Dioscoride conuertimus, quandam haberi Cassiam redolentem hyrcinū uirus, Mauritanii odorē Porri transfulerunt, pralizusam, nō tragisufam legētes. Vtra lectio sit uerior, experti iudicent. Nō conuehitur modo Cassia, præter q; rarissima inter Xylōcinnamo mi fasciculos quandoq; inuenta, nigriciæ argumēto. Cassiam latini correpta priore syllaba pronunciāt, etiam si apud Græcos fere omnes geminata cōsonante scribitur. Vergilius. Nec Ca sia liquidi corrumpitur usus oliui.

E X M. V E G R. C O M M.

D Ab incolis quæ talis est Lada. In cunctis fere legitur. Ab incolis quæ talis est Achy. Et in aliquibus non ἄχυν, uerum ἄλιν legitur, quæ uox quoniam in aliquas literas eius, quam Plinius Ladam uocari dicit, incurrit, Lada a nobis restituta est, nulla tamen certa ratione. tam enim nobis ἄχυν nunc barbara uox, quam Plinio tunc erat, & nobis modo Lada est.

Tertia est, quæ rubus Mosylyticus appellatur. Cum in cunctis fere legeretur Ελάστερ. cōmunī omni germinum appellatione ex melioribus græcis Ελάτον, idest, rubum reddidimus. Neq; (ut credimus) ab re. in fruticoso enim genere Cassia censetur, in quo & rubi numerantur, uerisimileq; est, contractiore hac rubi uoce, magis q; ampliore illa & cōmuniore germinis Cassiæ signari solitam, præsertim a regione: non aliter q; Lygusticum, Piper agreste, multaq; alia in plātarum genere appellamus.

Mosylyticus. A promontorio & emporio Ethiopiæ Mosylo, unde afferebatur, dictus est.

Vt quæ Aphysfemon uocatur nigra. & c. ἄφυσμων in multis legitur, ἄφυσμων in melioribus inuenitur: potuitq; ob eam appellari caussam, quod tenui & disrupto eius cortice tibiariū & fistularum more inflari non poterat. id enim φουσάν Græci dicunt, & φουσάντρηρα ἀνδρὸς, idest, tibi as uocant, & hic φουσάντρηρα, follium, fistulam, de Cinerula, & bulla in metallicis agens, appellat.

In odorifera Arabia. Ea est, quæ inter Persiciū, & Arabicū mare a geographis describitur.

Habet crassi corticis Cassia omnis sarmentum. In græcis est, πάχυν παχύφλοιον, quod significat uirgam, qualem. s. in uitis, multisq; alijs uidemus. Eam crassi corticis dicit Dioscorides. pro crassitudine. s. totius materiæ, in qua crassissimus sit cortex, exigua interior medulla. In ali quibus hoc loco legitur, ὡς περ ἰνὸν, uoces duæ, nihil, nisi emendatur significantes: credimusq; ex Theophrasto restitui posse ὡς περ ἔχυν, ueluti uitis.

Et Piperis folio est. Legitur in aliquibus ὡς περ ἰνὸν, in aliquibus, ὡς περ ἔχυν. Potiorem illā

Iectionem sequutus est Mauritanus Serapiō. Nobis in tam multa in plantarum folijs naturæ uarietate, difficilis coniectura & ratio fuit: et licet utraq; lectione dici plura potuissent, tutius tñ uisum est, ex cognatiōe locorū, uicinitateq; Piperi folio similē potius facere; credimusq; omnē hanc uarietatem ab imperitia librariorum & incognitæ rei dubitatione irrepsisse.

Daphnitim. Si Plinio credimus, a Lauro facta appellatione, quoniam scilicet ob similitudinem Lauri cortice adulteratur, & a Mangonibus Daphnoides dicitur. In quo certe dissidet a Dioscoride. Verū id alijs excutiāt. Aut certe sic dicta Daphnoides, a portu Arabiæ, cuius meminit Strabo, lib. 16. qui thus, myrrham, & alia odora menta fert.

Odore Porraceo. Mutauimus & hoc, quod in quibusdam habetur *τραγίσαν*. Nā in melioribus, porraciore odore habetur. Et Mauritanus Serapion quoq; sic legit.

De Pseudocasia CAP. XIII.

Similior huic est Pseudocasia, q̄ ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, hæretemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiā lata quædam fistula, mollis, leuis, plena, ab alia distans. Damnatur candicans, scabra, hircinū uirus redolens, & quæ tenui fistula & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, urinam ciendi, siccandi, & leniter astringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, et malagmata, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur. Lentigines tollit, cum melle illita. Menses trahit. Cōtra uiperarum ictus pota auxiliatur. Aduersus intestinas, inflammationes omnes, et renū uitia, pota proficit. Foemina in solia desidentibus, aut suffimētis, prodest ad dilatationem uulvæ. Ea duplo pondere medicamenti mixta, Cinnamomi uicem supplet. Nā eosdem effectus præbet. Ad plurima perq; utilis.

ψευδοκασία

BARBARI COROLL.

Habetur & Cassia odoratæ genus herbæ, ut in Thymelæa, siue potius Chamelea demonstrabimus. Aliud etiā nū genus est, quā ætas nostra Cassiam appellat, & cognomento fistulæ. Ab aromatica, ligneauæ discriminat, ueteribus ignotā, p̄inde ut fere nobis mō lignea, aliqñ in nostro quōdā orbe feri cōpta, extremiq; impj Rom. margine, qua Renus alluit. Viuere in aluearijs apum solita. Etiā si color aberat ille torridus sole, atq; ob id simul idē odor. Ceterū scire oportet, si qñ Cassiā syringa, hoc ē, fistulā, in antiq; autorib. legere cōtigerit, nō p ea capiendā esse, quæ nūc Cassiā fistula dicatur, colore rubro nigrās, laminis intus carnosīs, quas parietinē discludunt, seminibus siliquæ Ceratiæ, ad deſciendā bilē uisā mire ualēs, sed p lignea, siue aromatica, cuius una quoq; species ab ipso Dioscoride platea Syrinx, idest, lata fistula nuncupari cernitur. Cassius certe Felix, si mō liber eius est, qui circūfertur, appellationē Fistulæ, simpliciter Cassiā odoratā, siue aromaticā intelligit. Inuenio tñ apud græcos autorē, q Paulū, et Oribasiū ita loquentes induxerit. Cassia Syrinx aduersus flauā bilē pdest: & itē eos, q p̄ter naturā palleſcunt: itē anginas, & laterū dolores, & peripneumonicos. Hæc Paulus. At Oribasius. Refrigerari ea inquit iecinoris calores intempatos. Hæc recētiōres græci calidā, & humetā abscessū primo phibent. Idē fere Mauritani. De Cassia qua bilis per aluū detrahitur, & p̄pterea Cathartice dici potest. Nam aromatica, siue lignea excalfacit, atq; siccat abscessū fere tertio. Porro Cassia Cathartice partim in India, partim in Aegypto nascitur, folio Iuglādīs. Alexandriæ sibi uisam Pōticus Facinus retulit, dū ista pderē. Siliquas habet plōgas, ac teretes, utrinq; fastigatas, duo fere pedes p̄ceras, carne intus nigra, gustu p̄dulci, sed plane medicato, ligneis distinguētibus mēbranīs, & ossibus siliquarū intercurſantib. ut p̄dixi. Eligūt ponderosā, collucentē, plenā, & quā si cōculſeris, inclusa intus ligna nō sētias. Negociatores in hortis Alexandriæ nascentē pferūt. Iam & Asiē cōmunis facta dicitur. Seritur & apud nos, uerū frustra. q̄a nec ad frugē puenit, & celeriter opprimitur. Quid sit Myrrha Cassia Hippocrati, cuius semē laudat uolumiē, sēminarū morbis dicato. *συμπυον* inquit *κακείας τὸν καρπὸν*, haud scio reddere. Nisi quis p Smyrri herba cepit, cuius cibo menstrua foeminarum iuari constat. Strabo Cassiam odoratam e stagnis colligi, non solum ex arboribus in Arabia felice, quosdam in India, maiorem eius partem existimasse prodit.

B

καθαρτική

b ij

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

C Vam hodie nostræ ætatis medici ligneam appellant unguentarii, vitæque delictis magis quæ medicinæ quondam quæsitus frutex, ideoque ab omnibus Poetis passim celebratus, diuersus omnino ab ea arbore, quæ eadem nunc Cassiæ appellatio, filiquas potius quam fistulas fert Cylindraceas, longitudine fere cubitales, lignosas, colore nigro, & quasi ex sole ignitæ torridas, intra quas lignosi itidem per intervalla orbiculi sunt, & inter orbiculos semina concreta, ceu pulve nigra inuoluta: cuius tanta in mollienda aluo usus est, tam multus, tamque quotidianus, ut sine ea uix possit nostrorum temporum medicina stare. Quo magis ueterum negligentia, aut fortunam demerari licet, qui aut eam ignorauerint, aut uti noluerint. Neque enim hæc de ea quæque, aut in hoc, aut in cæteris inuentum a nobis est, quod merito miremur, & uix credibile uideatur.

Ei quoque parum recte fistulæ nomen, et ex eo diuersitatis nota adiecta est. Siliquæ enim magis, quam fistulæ nomen illi congruit, propterea, quod undique clausa, aliarum filiquarum in leguminibus modo semina sua intra se claudit, medica hæc Cassia, et ad maturitatem perducit.

Cauendum igitur, ne in antiqua medicina, uidelicet, quæ supra Galeni ætatem tractata est, fistulam Cassiam inuenientes, medicam hanc nostræ ætatis credamus, eandemque credentes, graui periculo ea utamur. Ligneam enim illi semper intelligunt, quæ medicæ & posteriori huic nomini & appellationem suam ex similitudine largiri potuit.

D E C I N N A M O M O C A P. XIII.

Cinnamomi genera plura patrium sibi nomen uendicantia. Præfertur tamen Mosyllum, quod Cassiæ, cui Mosolyti nomen est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere, recens, nigrum, ex uinoso in cinereum uergens, leue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perque iucunde olens.

D Optimi fere tempamenum odoris proprietate constat. Inuenitur enim in optimo, quodque seorsum nascitur, odor Cardomomo proximus. Insuper, acre et mordens, & cum calfactione quadam tenus salsum, quod non cito confricanti hirsutum, aut friatum lanuginosum, leuibus tamen internodijs apertum. Si certior fieri uoles, uellito ab radice surculum. Facilis est homini probatio. Namque fragmenta, adiecticia quædam sunt. Quæ aut potētius spirant, suo halitu cum nares confuluntur, olfactum explentia, deterioris dignotione impediunt. Est etiam Mositanum, crassum, pumile, fuluescens admodum. Tertium a Mosylo, perque suauiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fungosum, cædicum, aspectu tuberosum, uile, ac friabile, magnam habens radicem, Cassiam plane representantem. Quintum genus, gustu amarum, et cortice fuluæ Cassiæ simile, tangenti firmum, minus neruosum, densa radice firmatum. Iis quæ Thuris, Cassiæ, aut Amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrum, rugosum, leue, lignosum. Radicem autem ut inutilem reijcito.

B A R B A R I C O R O L L.

Cinnamomum in partes quinque concidunt. Præcipua bonitas tenuissimis ad longitudinem palmi, paulo amplioribus. Secunda proximi breuiore mensura. Vilissimæ, quæ radicem antecedunt, quoniam ibi minimum corticis, in quo summa gratia. Quæ de causa præferuntur cacumina, ubi plurimus cortex. Ipse frutex duorum cubitorum altitudine amplissimus, palmicæ minimus. Quatuor digitorum crassitudinis. Statim a terra sex digitis surculosus, arido similis. Cum uiret, non odoratus. Folio Origani, siccitate gaudens. Sterilior imbre, ceu contraria ceteris natura. Gignitur quidem in planis, sed densissimis in uepribus, rubisque. Difficilis collectus. Verior sententia est, nasci in Aethiopia, Troglodytis conubio permixta; Non ut Herodorus, quo sibi Liber pater educatus esset, ex inuicem rupibus, aut quæ nidis peti, & priuatum Phœnicis. Neque, ut alij, in Arabia. Igitur mercatores illi a coterminis uehunt per maria uastis ratibus sine gubernaculo, sine remis ac uelis, sed hyberno per brumam, euris tamen maxime flantibus. Primus his portus Gebenitarum Ocila, siue Acila ut Strabo, Ptolomeus Ocelis, Produ-

tur

Plin. libro. 12.
capite. 19.
Theophrast.
lib. 9. cap. 45.

ur uix quinto anno reuerti mercatores, & interire multos. Contra reuehunt uitrea: & aenea; uestes, fibulas, cum armillis, ac monilibus.

EX M. VERG. COMM.

Mosylicum. Ita legit & Plinius lib. 6. capite. 29. Quod colore nigro, & cum uino diluitur Cinereo. Duplex in grecis eius partis lectio est. *τερρῖον*. i. in τὸ οἶνον. quod si uerbum uerbo reddatur, in uino cinerefcens significat. Sunt itidē in quibus una adiecta syllaba τῖν, alius indicetur sensus. *τερρῖον ἐν τῷ οἶνῳ*. i. in uinoso colore cine rescens, quasi mixtum describens colorē, & ex eo uarium Cinammū, in quo Cinereus, & ex uino rubens color esset, pariterq; ac nigrū probaretur. Quam lectionē secutus est Mauritanus Serapion, priorem uero illam antiqua Dioscoridis tralatio. Cur aut in alteram partem magis inclinauerit animus, ea ratio est tota ex sermonis serie. Numerat hic probatoris Mosylici plures notas, laudatq; recens & colore nigrum, cūq; de colore eatinus egisset, nulla interiecta copula, aut diuisionis nota alia, subiicit statim *τερρῖον ἐν τῷ οἶνῳ*. &c. idest, ut nos reddidimus, & cū uino diluitur cinereo, ut non ad uarium in eo colorem pertineat, sed ad mutatum, cum uino maduerit, qualia multa uidētur quotidie oleo, aceto, humoribusq; alijs cōspersa, ex alio in alium mutari colorem. Nam si uoluisset uarium, & ex uini cinerisq; colore mixtum Cinammū pariter ac nigrum laudare, copula, diuisionisq; alia nota aliqua alterum ab altero fecerni oportebat. Cetera in commentario latissime.

Rutæ, Cardamomoue similis odor. Fuisse aliquē huius loci eam lectionem in latinis testatur Serapion, in grecis uero probatissime mihi fidei antiquissimus codex, in quo manifeste nulla mutationis alicuius suspitione adhuc feruatur & legitur, ἡ δὲ μὴ πηγινοῦσα ἡ καρδαμώμου ἐμπεριον. quasi latine dicas, rutescens, aut Cardamomo equalis odoris. Suspecta mihi præterea eodē loco Cardamomi uox est. Siquidē inoleuit toto hoc opere multis locis idem, frequēsq; uicium, in quo sepius uel uocum uicinitate decepti, parum diligētes grecorum librarij, uel ob uirium similitudinem aliquam, equalia rati ueteres eiusdem gēis medici, Cardamon, quod significat Nasturcium, pro Cardamomo: inuicemq; pro Cardamo, idest, Nasturcio, Cardamomū scripserint. Auxit suspitionem, q; in antiqua tralatione Nasturcij, nō Cardamomi: præterea q; Cardamomum odorem tenet, Cinnamomum autem suauis odoris laudatur.

DE PSEUDOCINNAMO. CAP. XV.

Est etiānum genus aliud, cui Pseudocinamo cognomen est. Inualidi odoris, solutariq; uirum. Vocatur etiā Zingiber, cū tñ sit Xylodinamomū, præbens quandā Cinamomi faciē. Est aut lignosū Cinamomum, sarmenta longa robustaq; ferens, odore longe Cinamomo inferiorē. Sunt qui Xylodinamomū, a Cinamomo differre dicant, q; a natura eius abhorreat. Cinamomum omne excalfacit, emollit, et cōcoquit. Vrinā ciet. Tam menses q; partus potū, aut ex Myrrha imposuū pellit. Contra bestias quæ uirus ei aculantur, uenenatq; cōuenit. Caliginē, pupilis oculorū obuersantē, discutit. Crassiciem extenuat. Lentigines, & uitia cutis in facie ex melle illitū detergit. Contra tusses, defluxiones, aquā subtercutē fusā, renū uitia, & urinæ difficultatē efficax est. Vnguentis preciosis inseri solet: & in sumā, magni ad omnia usus. Tritum uino excipitur, umbræq; siccātū, quo diutius eduret, reconditur. Est & quoddam Cinamomum, quod aliqui Pseudocinamomon appellant, perq; denso atque crasso sarmento, longe tamen inualidius Cinnamomo et odore et gustu.

BARBARI COROLL.

Ipsum lignum in fastidio est, propter Origani acrimoniā. Xylodinamomum uocatur. Preciū in libris. 20. Quidam Cinnami (nam & Cinamū dicitur) duo genera tradidere, candidius, nigricansq;. Et qñdam præferebatur candidū. Nunc contra, nigrum cōmēdatius, autore Plinio, atq; etiam uariū præferunt candido. Certissimo argumento, si sit scabrum, atq; ut inuicem tritū cōtumaciter frictur et inhorrescat. Improbatur molle imprimis, aut cui albicat cortex. Ius eius

ψευδοκιννα-
μόμον

ζιγγίβερ

B

D I O S C O R I D I S

C a Gebanitarū Rege solo p̄ficiscitur. Is edicto mercatu uēdit. Precia q̄ndā fūere in libras denario-
rum mille. Auctum id parte dimidia est, incēsis (ut ferunt) syluis ira barbarōrum: aut etiam for-
te fortuna, quoniam austri tam ardētes ibi afflare solent, ut aestatibus syluas accendāt. Coronae
ueteribus fiebant ex Cinnamomo interrasili auro inclusae. Radicem eius magni ponderis aureae
paterae impositam uidisse, Plinius meminit, ex qua guttae edite, annis omnibus in grana dura-
bantur. Pseudocinnamomum, Galenus Cinnamomidem quoq; appellari scribit.

DE AMOMO. CAP. XVI.

A Momū exigue fruticat, ex ligno se cōuoluēs in uuā modū, flore
ceu cādide Violae, paruo. Folijs Viuis albę similib. Laudatur q̄
q̄ maxime Armeniacum, fuluo auri colore, ligno subruffo, ualde odo-
rato. Medicū, qm̄ in cāpestrib. et aquosis enascitur, infirmius esse cōstat.
Est aut magnū, subuiride, tactu molli, frutice uenoso, odore Origani. Pō-
ticū uero subruffū, paruū, fragile, racemosū, fructu turgēs, et odore nares
feriēs. Deligito recēs, cādidiū, uel subrubrū. qd' nec astricū cohereat, nec
cōuoluatur, sed solutū diffūdatur, seminis plenū, uuis paruis simile, gra-
ue, odoratū, mō cariē nō cōtraxerit, acre, gustu mordēs, simplici colore,
nō euariāte. Vim habet calfaciēdi, astringēdi, exiccādi. Somnū allicit, et
illitū frōti, doloris sensū aufert. Inflammationes & meliceridas cōcoq̄, discu-
titq;. Iuuat q̄s scorpius p̄cussit, ex Ocymo illitū. Et podagricis confert. In-
flammationes oculorū uiscerūq; lenit ex uua passa. Ad uuluarū uitia in pes-
sis, aut in sessionib, utile ē. Decoctū iocineri, renibus, podagre potu cōue-
nit. Antidotis imiscetur, & p̄ciosissimis unguētis. Adulteratur herba A-
momo simili, quae Amomis uocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur
in Armenia, flore Origani. Quare in huiusmodi p̄bationibus, fragmē-
ta fugiēda sūt. Eligenda aut quae ab una radice integros surculos emittūt.

BARB.
Plin. libro. 12.
capite. 17.
Theophrast.
lib. 9. cap. 7.

A Momum quidā ex India, aliq̄ ex Media importari narrāt. E uīte Indica, quę sit labrusca, ex
istimatur nasci, frutice uenoso, palmi altitudine. Carpitur cū radice. Manipulatiui leniter
componitur. Protinus fragile laudatur. Punici mali folijs simile, nec rugosis, colore ruffo. Se-
cunda bonitas pallido. Herbaceum peius. Pessimūq; candidum: quod & uetustate uenit.
Precium uuā in libras sicli. 70. friato uero Amomo. 4s. Nascitur & in Armenia parte, quę uo-
catur Ocene. Adulteratur mali granati folijs, & gumi ligdo, ut cohareseat uuę modo, conuo-
luatq; sese. Est & quę uocatur Amomis minus uenosa, atq; durior, ac minus odorata, quo ap-
paret aut aliud esse, aut colligi imaturū. Nec mirādū, siquādo Plinius a Dioscoride nostro dis-
sonāt. qm̄ sicut p̄cia rerū, ita & notę, & experimēta quoq; uariatur. Neq; ulla medicīne pars in-
certior, q̄ quę ab alio orbe q̄ nostro petitur, id qd' & ratio p̄suadet. Amomum q̄le nūc officinę
p̄ferunt fabulosa specie, nec odoris argumēto, nec alia rōne cōgruit cū eo qd' hic describitur.
O rigani odore sentitur. In pluribus Origani, in melioribus aut Rutę legitur, Rutęq; anti-
quam lectionē fuisse ex iunioribus indicat Serapion: licet & de Origano in eo aliquid le-
gatur. Nos in parum diuerso odoris duarū plantarum sensu, cōmunem in gręcis lectionē, &
antiquam Dioscoridis interpretationem secuti, Origani odore sentiri diximus.

VERG.

DE COSTO. CAP. XVII.

P Recellit Arabicus, cādidius, leuis, eximia odoris suauitate. Secūdu
locū sibi uēdicat Indicus, leuis, plenus, ut ferula niger. Tertius est
Syriacus, grauis, colore buxeus, et odoe feriēs. Optimus ē recens,
albus, abūde plenus, dēsus, a teredinib. nō erosus, sine graueolētia, gustu
calidus ac mordēs. Vis ei excalfactoria. Vrinā ciet. Menses pellit. Viuis
quę uuluā male hñt, tā imposito, q̄ fotu auxiliatur. Cōtra uiparū morsus

sextatē bibere pdest. Itē aduersus pectoris dolores, cōuulsa, inflatiōesq; **A**
ex uino & Absynthio. Venerē ex mulso stimulat. Latas uētris tīneas ex
aqua pellit. Rigētibus, ex oleo, ante febrīū significatiōes, & neruorū reso-
lutiōib. oblinitur. Vitia cutis i facie, cū aqua, uel melle illitus emēdat. Ad-
ditur in antidota & malagmata. Sūt q amīstis Helenij Comageni p̄du-
ris radicibus, adulterēt. Qd̄ deprehēsu facile est. Siquidē neq; gustu fer-
uet Heleniū, neq; ualidum odorem uibrat, ut caput tentare possit.

Costus, & Costū dicitur, & per diminutiōē a Strabone, Costariū. Huius radix in precio.
Fructus inutilis. Plinius Indicum dumtaxat uidetur nouisse Costū. Primo statim introi-
tu amnis Indi, in Patale insula compertum. Duo eius genera faciens, nigrum, & quod melius
eo iudicat, candidum. Preciū, 10, in libras singulas.

Ex aqua et melle. Quē in grēcis est, cōiunctio i, nos mutauimus in *χρῆς*, uertimusq; ex aqua
& melle, nō ut alij, uel p̄pterea, q; Mel molliēdi & exterēdi uim per se etiam habet: sic in
uetustissimis etiā legitur, & ratio etiā nō repugnat. Asperā, & discolorē ceu a sole cutē. Id
enim sic, græca habent, *ἰσχυρὰ*, *ἰσχυρὸν* em̄ illi solem, coniunctaque prepositione, *ἐκ* *ἰσχυρῶς*, quasi
in aduerbio sub sole sit, & ephelidas, multo sole adustas, namq; origo & causa a sole fuit.

De ODORATO IUNCŌ. CAP. XVIII.

Odoratus Iuncus, in Africa & Arabia nascitur. Laudatissimus ex
Nabatheis. Proximus Arabicus, quem aliqui Babyloniū cogno-
mināt, Alij Teuchitin. Pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens,
floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis. qui manibus confrican-
do Rosæ odorem emittit. Ignē mordacitatis ad linguā. Floris, & arundi-
num, radicisq; est usus. Vim urīnē ciundæ habet. Menses pellit. Discutit
inflationes. Caput aggrauat. Modice astringit, cōminuit, excoquit, ac ue-
narum spiracula laxat. Vrinā mouet. Flos eius in potu utilis sanguinē re-
ijcientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iocineris, & renum. Miscetur
antidotis. Radix astringentior est: ideo fastidijs stomachi, hydropicis, cō-
uulsis, cum pari pondere Piperis, per diēs aliquot datur. Decoctum uul-
uæ inflammationibus, ad desidentium foras, utile est.

Iuncū odoratū Schoenon græci uocāt, & Hippocrates Schoenō myreplicō, & Schoenō He-
idyosmō: & florē eius Schoenū anthos. Cornelius Celsus Iuncū rotūdū, ut ab angulari diffe-
rat, Cypero a grēcis appellato, Rotūdū & in Cāpania inueniri tradit, utiq; minus pollentē. In
Arabia sane cū Calamo odorato nascit, cōualle quā dicemus, nihil aspectu differens a ceteris.
Prouenit & in Syria, Cœle cognominata. Iuncū rotūdū uinosæ mordacitatis ad gustū sentiri
perhibēt. Preciū in libras, denarij qnq;. Noscendū uero Babyloniū, & Teuchitin a Dioscoride
pro eodē genere intelligi: nō sic a ceteris, q̄ppe qui Teuchitin, eundēq; nobilissimū, qui e Naba-
thea sit, appellēt. Proximū Babyloniū. Pessimū ex Africa, ac sine odore. Dicit et Lēiscus ar-
bor siue frutex, a grēcis Schinos, nō Schoenos, ut quidam e p̄tioribus falso interpretati sunt.
Vulgaris porro lūcus quo ad utiliū nexus utimur, itē rotūdus, & odoratus, nō Schinos, sed
Schoenos, unde, funes appellati. Recētiore lūcum odoratū cū funario palustriq; cōfundunt.
Græci quanquā & palustre & odoratū Schoenō uocāt. Quoties tamē de odorato intelligi uo-
lunt, Schoenū, i. Iuncū, absolute nomināt. Alterū uero genus Helis, hoc est, Palustris, adiectio
ne discrimināt. Dicitur & Schoenos mensura quædā sicut astarus, & parasanga barbarorū.
Schoenon. Græci cōmuni aliorum Iuncorum uoce *χρίον*, diphthongo, ut a Lentisco arbo-
re differat, quam *χρίον* idem appellant. Priuatim tamen in hoc tantū genere, seruata hæc uox
ab illis est. Nam ceteros Iuncos additis cōmuni omniū nomini notis aliquibus, Oxychoe-
non, & Oloschoenon dixerunt. Præterea cū ceteros masculino genere plerumque dixē-
rint, hanc feminino dixerunt. Nos, quia non licebat discriminē hoc uti, docentibus Plinio &
Celfo, in Iuncorū genere eum constituimus. Deinde, quoniam non satis id erat, sed oportebat

BARB.

VERG.

χρίον

τευχίτιον

B

BARB.

Plin. libro. 12.
capite. 18.
Theoph. li. 9.
capi. 13. de na-
tura Iuncorū,
& li. 9. cap. 7.

VERG.

D I O S C O R I D I S

C ab alijs ratione aliqua secerni, eodem Celso autore rotundum diximus. Neque explentibus his etiam rem totam, odoratum adiecimus. Locus in eo autore est libro. 2. cap. 21. suntque eius hæc uerba. Iunci quadrati & rotundi semine. Illud Cyperum, hoc schœnon græci dicunt. Pauloq; post. Quæ quoties posuero, non quæ hic nascuntur, sed quæ inter aromata afferuntur significabo. Ex quibus ratiocinari facile est, quia Schœnos a græcis uocetur Iuncus, quia tereui forma sit rotundū, quia inter odorata numeretur, odoratū dici oportere.

Capitis grauedines tamen facit. Variat hic antiquiores græci libri. Nam in aliquibus καρι-
καριδν, in aliquibus καρωτικν legitur, neq; sensu in scriptore hoc, neq; eodē in homine periculo. Siquidē prior illa uox, caput aggrauās, simpliciter significat, quod multa possunt, & inter cæ-
tera ebrietas; altera nō dissimile lethargo somnum indicat. Inexpugnabilis enim somni plura genera sunt: inter ea & καρος est, a lethargo tātum differens, quod in lethargo sequitur, in Caro somnus præcedit. Hunc Plinius semper soporem reddidit. Quæ autem uerior sit, & ex re ma-
gis lectio, nō satis pro cōperto nobis est.

Frangit præterea, maturat & aperit, μαλακτικν, quod mollire est, in pluribus legitur. Credi-
musq; adiectā forte eam uocē, quoniam maturet hic Iuncus. Quod etiam θρυπτικν passiuē legi-
tur, i. frangere. Sunt in quibus legatur θρεπτικν, i. uutrire. Sed parum nobis id probatur, ideoq;

Cum pari Piperis pondere. Videtur pōderis huius mensura hic de- (nihil mutauimus.
esse, nisi forte æstimandam medicis eam reliquit.

Decoctio eius præterea insidētibus. Antiquiores aliqui græci habebāt ἀποψμα, quod deco-
ctum, alqui ἀποθευμα, quod dilutū autore Plinio significat. Est autem dilutum, aqua. humor
ue aliquis, in quo maduerit quippiā. Nos quoniam maiore ui decoctum, q̄ dilutū est. illud
seruauimus quod communius erat.

καλαμος
καρωτικόν

C De CALAMO ODORATO. CAP. XIX.
Alamus odoratus in India nascitur. Melior est fuluus dense geni-
culatus, & qui assulose frangitur, plena araneorū fistula, albicās,
lentus in mandendo, & astringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus.

D Vrinam potu ciēt. quare cum Graminis, aut Apj semine coctus, in aque
subter cutem fusæ morbo, renū uitij, stillicidio urinæ, ruptisq; cōmode
bibitur. Menses & potu & appositu pellit. Tussi suffitu medetur per se,
aut ex resina Terebinthina, hausto per arundinem fumo. Ad muliebres
inseffus decoquitur. Et clysteribus imponitur. Suffitionibus, malagma-
tisq; odoris gratia, commiscetur.

Plin. lib. 12. ca-
pi. 22. & de a-
lijs generibus
Calamorum.
lib. 16. cap. 16.

C B A R B A R I C O R O L L.
Alamus aromaticus, siue ut Hippocrates Myrepficos, id est, unguentarius & odoratus,
in Arabia nascens, cōmunis Indiæ, atq; Syriæ est. In qua uincit omnis a nostro mari stadijs, ut
Theophr. inquit. cl. Inter Libanū montē, aliūq; ignobilem, nō ut Strabo, & aliū quidā existima-
uere Antilibanū, lacu Gennefaretide, ubi conuallis amplissima, et pulcherrima, quā Aulonem
cognominant, sed in cōualli modica prope stagnū, palustribus per cōstatē siccatis. In eo tricenis
stadijs Iuncus & Calamus odorati gignuntur. Sed præstantior odore Calamus, statim e longin-
quo inuitat. Mollior tactu, meliorq; qui minus fragilis. Araneū eius, ut ait Plin. in fistula florē
appellant, magno Domitij errore in quadā Papinij poetæ syluula, non distinguētis harundi-
nem saccharū fundentem, ab odorata. Calamo preciū in libras denarij. ii. Reliqua probatio, ut
niger sit. Dānantur aliubi. Nobilior, quo breuior & crassior, lentusq; in frangēdo. Succū eius
Elaterio similem excipiūt. Legi, & in Meotide odoratū nasci Calamū, radice subalbida, & sine
fistulis, plena intus, & amara, specie Acori. De quo & falsi quidā sunt, Acorū eam putantes.
Quanto autē amarior, tanto & calidior est Indico. Vtrūq; tamē genus Acorū odore superat.
Teredinibus ut Acorū incessitur. Omninoq; uicariū pro Acoro est, ab Ionia, & Ponto, & Her-
culis columnis, prorsusque apud omnes, qui mediterranea colunt Aphricā, ut si eadem non
sunt plane, maxima tamen germanitate uisuntur, ut autores pleriq; tradunt.

E X M. V E R G. C O M M.

C A L A M V S odoratus a Dioscoride appellatur. A Plutarcho in libello cui titulus est.
Quod bruta ratione utuntur, Arabicus dictus est: & quam hic natale solum illi Indiam
assignat,

assignat, ille Arabiā. Quod & Theophr. indicat, et Plinius, qui in Arabia nasci eū cōfirmat. Communem tū Indis esse, & Syriæ, nostra græte etiā adeo notū est, ut nō sit lōgius de eo agendū.

Relinquimus pręterea qđ ad amaritudinē ptinebat, ppter ea, qđ in meliorib. ea uox nō legitur. Dubitauimus etiā, legendū ne esset, simul cū gramine, & Apñ semine decoctū odoratū calā mū mederi. &c. an distūgi duo illa oporteret, cū gramine scilicet, aut Apñ semine: ppter ea, qđ utriusque lectionis certæ essent in antiquis Græcis uoces.

Dubitauimus itē, reddi ne oporteret, cū gramine, aut graminis semine. Neq; ab re. cū seminis uox illa utrūq; facile cōplecti, & ambobus cōpetere posset. Placuitq; nobis in similibus, & quæ easdē uires haberent disinctione uti, relinquereq; utentibus alterutrius electionem. propterea, qđ in pluribus disinctim ea legebantur, & si nō satis alterū utentibus esset in usu, geminanda, & cōiungenda medicis relinquere. Placuit etiā, gramē magis, qđ graminis semen reddere, propterea, qđ in decretis, & medicina graminis, hic ipse post docet decoctum eius, urinæ an gustijs mederi.

Affulose fragitur. Plinio, Vitruiusq; & plerisq; etiā alijs antiqua & honesta uox est: quæ primū significant, quæ marmorarij in cædendo marmore fragmēta dispellunt, & quæ in frangendis alijs rebus in longitudinē magis, qđ in latitudinē fragmenta disijciuntur. Et quoniā Calamus hic in frangēdo affulas huiusmodi ex se mittit, ideo a nobis sic redditus locus est. Id enī significant quos hic græce *συνδαλυνός* appellat.

Decoquitur foeminis ad insidendū. Nullum habetur certum muliebris mali genus, facile tamen est, ex curationis & remedij ratiōe muliebrīū locorū affectionē aliquā intelligere. Iuniores dolores, eius partis reddiderūt. Nos quoniam nihil a Diosc. certum precipitur de ea re, medicis censendū relinquimus, nō omittentes tamen, uideri nobis ex hīs quæ alibi in similibus obseruauimus, menses, & quod ad menses pertineat magis ea uoce, qđ dolores significari.

B De BALSAMO CAP. XX
Balsamum, arbor albæ Violę, Lycij, aut Pyracāthæ magnitudine cōspicitur. Foliū Rutę proximū, longe cādidius, perpetuo uirēs, in Iudęa solū quadā ualle et Aegypto nascēs. Iis differēs modis, scabricia, pperitate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, Theristū uocat, quasi demessile. Fortassis, quoniā ob gracilitatē facile demetatur.

BARSAMICOROLL.
Balsamo aliq; Punicæ magnitudinem reddunt. Ramis frequentibus, semine Terebinthi, colore, ex curatōis & remedij ratiōe muliebrīū locorū affectionē aliquā intelligere. Iuniores dolores, eius partis reddiderūt. Nos quoniam nihil a Diosc. certum precipitur de ea re, medicis censendū relinquimus, nō omittentes tamen, uideri nobis ex hīs quæ alibi in similibus obseruauimus, menses, & quod ad menses pertineat magis ea uoce, qđ dolores significari.

VEXM. VEGR. COMM.
Violæ, aut Lycij magnitudine crescit. Cum suspecta nobis fuisset hæc uox quæ est in græcis *λυκίος*, id est, Violæ, cuius magnitudine Balsamū cōspici Dioscorides hic ait, nihil tamē mutauimus. propterea, qđ in cūctis græcis, quos hætenus uidere licuit, integra et aperta uox illa inuenitur, nullaq; diuersę lectionis, nec obsoleta quidē uestigia aliubi uidētur: cū tamē parū uerisimile sit, Dioscoridē arborē frutici plerūq; cubitali in magnitudie exquasse: Et quā Plinius Viti, Theophrastus uero Punicæ similitē dixerūt, Violæ cōparasse. Nō dico autē Violā florē, sed eius plantā, quæ ramosa, pendētib; ex uno pediculo pluribus aliqñ, & diuersi coloris floribus, in Italia cubitalis, pauloue altior floret. Nisi, forte cœli terręq; bñficio speciosior Viola alibi nascitur. & arborefcit. Sed parū id uerisimile est, nec sine ueterū autoritate credēdū. Caret ratiōe etiā, ad similitudinē tertij alicuius generis, duo alia inæqualia cōiunxisse, dicereq; Balsamū arborē Violæ, aut Lycij magnitudine uideri. Siquidē Lyciū, siue Pyxacantham, i. buxēā spinā dicere eandē malis tricubitali altitudine hic paulo post esse dicit, quæ in nullis Violis mensura hætenus uisa, aut audita est. Ex his, quoniā nec Theophrasto, nec Plinio, nec sibi ipsi cōueniret hoc loco Dioscorides, suspicati sumus subesse uicium. Quale autē id sit, & quomodo instaurandū, nō ausim ego adferere: qm̄ nulla sit uitis, aut Punice cū Viola in græcis appellatiōibus similitudo, nullęq; cōcurrat eadē literę, aut syllabę, ex quibus licuisset sequaci cōiectura uerę lectiōis uestigia odorari. Non tatebimus tamē, quod hoc ipso momento scribētib; in mentē uenit, potuisse ab imperitis librarijs & herbarijs locū misceri. Quodq; unū, ac simplex erat *λυκίος*, i. geminari, & qm̄ notior Viola qđ Lyciū sit, cū Lycio Leucoion etiā scribi, quę tota Lycij similitudinis ad Balsamū in magnitudine relatio legitima est, & aliorū hystorię respōdet.

A

B

βάλανος
πυρακάνθος

βίσιον

Theophr. lib.
9. cap. 6.
Plinius lib. 12.
cap. 25.

C Quod Pixacautha, id est, buxæ spina dicitur. Non dixissem ego hoc loco, *πυξάουθα*, id est, buxæ spinam, non *πυράουθα*, quæ nulla in plantis est, legendū in Dioscoride esse, nisi interpretes alij uoces magis q̄ res secuti, numerum illic plantarum auxissent Violæ, aut Lycij, aut Pyracanthæ, &c. tria quæ, duo alioqui erāt cōnumerātes. Lycium liquidē & Pyracantha idem sunt, si huic ipsi cum de Lycio agit credēdū est. Quæ enim inter Lycium & Pyracantham disti-
ctiua legitur particula, appellationes Lycij alterat, non disiungit, & numerat plantas.

ἐποβάλσamon

De OPOBALSAMO. CAP. XXI.

A Estiuus sub ortu canis ardoribus, arbos unguibus ferreis inciditur, manatq; e plaga succus, quem Opobalsamum uocāt: sed tā exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem q̄ senī, septeniue congij cogantur. Inibi q; pōdus duplo repēditur argēto. Succī probatio est, ut sit recens, ualidi odoris, syncerus, non ad acorem uergens, pellucidus, leuis, astringēs, ac modice mordēs gustu. Sed uarie uitriatur, misto ab ali quibus Terebinthi, Cypri, Lentisci, Balani unguento. Itē Susino, Meto pio, Melle, aut cypria Cæra. Quod maleficiū facile deprehenditur. Nāq; merus in lancem uestē fusus, neq; maculam facit, neq; si eluatur notā relinqt. Vitiatus autē inhæret, & ut lac instillatus coagulat, qd' adulteratus nō efficit. Quinetiā syncerus in aqua, aut lacte celerrime liquatur, lactescit q;: uitriatus uero olei modo innatat, se cōuoluēs, aut in stellę modū diffundēs. Syncerus, senescēs crassescit, deteriorq; redditur. Allucinātur q; aqua concretū pessum ire, ad ima sidere arbitrātur, postea dissipatū supnatare.

D BARBARI COROLL.

C AEdiur sub canem, parte qua maxime uideatur esse pregnās, & caudice, & cacumine. Sudor e plaga manat æstate tota. Sarmēta quoq; eius & furculi odore prestāte, amputātur, & uenēt magno, alioquin grandesceret arbuscula, nisi succideretur. Balsamum Syluestre, Theophrastus reperiri nūq; testis est. Omnibus odoribus Balsamū præfertur: quōdam in duobus tantum hortis, utroq; regio, altero iugerū, xx. altero pauciorū. Hiericunta nomināt, quanquā & Palmetis constitū, tāto quæstus, ut Iudæis opes ex Opobalsami uestigalibus creuissē, Trogus p̄dar. Is humili Picæ, quidā Cyaso Terebinthoq; ut Strabo, quidā Myrto similē dixere. Sed Viti similiore esse, Plinio cōstat. Maleolis feri cepta. Impletq; colles, uinearū modo, quæ pedatæ nō sunt. Tondetur, nitescitq; rastro. Intra tertiu annū a satū fructifera. Folium Tuberis (id genus mali est) a Plinio reddi putant. Sed mendosum in eo locū esse arbitror. Nec tuberis scribēdum, sed Rutæ, nam & exēplaria sunt, in quibus ita legitur, foliū proximū rubet, cotrupte, ut plerāq; alia, pro Rutæ. Alioqn Theophrastus, & Dioscorides Rutæ folio, sed exalbido Balsamū describūt. Pausanias nūc Myrto, nunc Sampfuo, a quo nō per b. sed per p, Balsamū pronūciatur. Id ipse in Arabia gigni scribit, arbore uiperis obfessa, quarum morfu nemo extinguitur: quoniā succo eo pastæ, noxiū uirus habere definunt. Ab Hierosolymis captis ferere fiscus Balsamū cepit. Proceritas intra bina cubita subsistit. Arbori tria genera. Capillaceū, Theristū uocāt. Alterū scabrū, incuruū, fruticosum, odoratius, Ostracō. Tertiū Eumeces: quia procerius leui cortice. Huic secūda bonitas. Nouissima Theristū. Semē eius est uīno proximū gustu, colore ruffo, nec sine pingui, peius in grano, qd' leuius, atq; uiridius. Ramus crassior Myrto. In cidebatur ante ferreis unguibus, sed qm ferro uitalia lederetur, trāsijt usus ad uitrū, & lapides, osseosue cultellos. Incidētis manus artifice libramēto tēperatur, ne qd ultra corticē desquamet laessatue. Succus lanis parua colligitur in cornua, ex hīs nouo fictili conditur, crassiori similis oleo, & in musto cādīdus. Rubescit deinde, simulq; durefcit trāslucidus. Sub Alexan. & Theophr. tēporibus toto die gēstuo unā conchā impleri iustū erat: omni uero foccūditate maiore hortō semicōgios bisfenos, e minore binos. At Plinij æuo etiā singularū arborū largior erat uena. Ter omnibus pcutitur æstatibus. Postea deputatur. Amputatio ipsa & furculus. soo. uenit. Intra qntū demū annum, corticis ad medicamēta precīū est etiam ante q̄ ligni. Ex hoc buxosum est optimū, qd' est odoratissimū. Ex semie aut maximū, & pōderosissimū, mordēs gustu, feruēs que in ore, Lachryma debet esse pinguis & tenuis modice ruffa, & in fricādo odorata cū austero. Secūdus

ro. Secundus eadē color, Peior uiridis, crassusq; Pessimus niger, quippe ut oleū senescit. Ex oī incisura maxime pbatur, qđ ante semel fluxit. Vitiatur semie suo, ut uix possit dephēdi fraus. Itē & oleo Rosę, Myrti, Resina, Galbano, neq; sime gūmi: quoniam ipsum quoq; inarescit manū inuerſa, & in aqua fider ut Balsamū. Quod Cera & Resina pmutatū est, in carbone nigriori flāma detegitur. Nam mentitum melle, contrahit muscas. Metopio adulteratum, in aqua circulo candido cingitur. Nec aliubi Seplassiā maior improbitas, quippe sextarius, qui mille denarijs uendente fisco emebatur, mox, 300. tantum denarijs constabat.

EX M. VERG. COMM.

SECTA ferreis unguibus. &c. Credimus nos unguēs ferreos a ueteribus Græcis Ferramenta dicta fuisse, quæ humani unguis figura cōuexa acie essent: qualia quotidie in fabrica uidentur adhuc multa, quæ dimidiato orbe lunata ab eius partis similitudine, nomen inuenisse potuerunt. Sed quid, quod Plinius ferri adhibitionem omnino damnauit, in Balsamo colligendo?

Rependitur, quo loco nascitur, duplo ad pondus eius argento. Ideo scilicet, quod nullū in eo adulterium committitur, id quod in alijs gūmis, oleis, & unguētis fit. Author Theophr. lib. 9. qui inter cætera testatur, uendi purum & sine admixtione aliqua, duplo ad pondus eius argento. Quod monuisse legētes placuit, ne cui frigidum id & sine ratione dictum uideretur. Idq; etiam Plinius significasse uidetur.

Qui citissime penetret. In Græcis habetur *ὑδαίνω*, quam uocem nouissimus interpres, pelucidam interpretatus est, ex Plinio ut uidetur eam auguratus, qui Balsami lachrymam, ipse cætera dixit translucidam esse. Antiquus Dioscoridis interpres, serenam, nulla, ut nobis uidetur, in Balsami notis significatione. Serapion, uelocis resolutionis, quasi *ὑδαίνω* tunc legere tur. Nobis in eadem Græcorum lectione, nihil mutare placuit, sed bona fide, nec absurdo sensu reddere ut legitur, qui citissime penetret. quando græcis uerbū notissimum est *διανύειν*, quo *διανύειν* ὑδὸς *διανύειν*, ab altero extremo p mediū aliqd ad alterū transire, & absolui, moueriue aliquid significet, quod tenuitate sua potest Balsami liquor, qui a Plinio etiā tenuis laudatur.

Lactis modo albefcit. *γαλακτοῦται* uertimus, lactis modo albefcit, ne si lactescit simpliciter dixissemus, incertum legentibus esset, quæ nam ex tam multis lactis qualitatibus, sapore. f. candore, substantia, liquore, & hoc aut fluido, aut coagulato intelligenda esset. candoreq; elegimus: quoniam lac omne, semper, et in cunctis animantibus candido colore sit, deceatq; & tutus sit, ex eo magis, quod inseparabile, præcipuū, necessariū, & sine quo nullū id erit, qđ ex cunctis alijs ostendi & indicari aliquid. Sic enim lacti candor competit, & inest, ut terræ pondor & cessatio. Nec est qđ credat aliquis, posse eo uerbo significari fluidū lactis liquorē, debuisseq; a nobis reddi, lactis mō liqueſcit: qm id etiā indicarat Dioscorides, celerrime disiungī, disijciq;.

DE XYLOBALSAMO. CAP. XXII

ELigni genere, quod Xylobalsamum uocāt, probatur recēs, tenue, fuluū, odoratum, quadam tenus Opobalsamum spirās. Necessarius etiam seminis erumpit usus. Quare eligatur flauum, plenū, grande, pōderosum, mordens gustu, feruens in ore, modice Opobalsamum ofens. Adulteratur semine Hyperico simili, quod a Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, uiriū ignauia, sapore Piperis. Efficacissima uis inest succo, & qđ maxime calfaciens. Abstergit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt. Medetur perfrictionibus uulua, cum rosaceo cærato appositus. Mēses quoq; secundas, & partus extrahit. Rigores illitu discutit. Vlcerā sordida expurgat, & cruda concoquit. Urinam potu ciet. Aegre spirantibus prodest. Datur in lacte contra aconitum haustum, aut serpentium ictus. Miscetur acopis, malagmatis, & antidotis. In summa, præcipua autoritas succo, secunda semini, minima ligno. Semen commode potui datur doloribus lateris, pulmonum uitijs, tussi, ischiadicis, comitialibus, uertiginosis, orthopnoicis, urinæ difficultati, torminibus, ac serpentum morſibus. Ad muliebres sus-

ξύλοβάλσαμον

C fitus perquam utile est. Vulvam aperit in defeffionibus balnearum decoctum, & humorem euocat. Lignum eafdem habet vires, aliquanto minores. Ex aqua potum cruditatibus, torminofis, uulſis, uenenatorū icibus opitulatur. Vrinam cit. Ad capitis uulnera cum ſicca Iri conuenit. Squamas offium extrahit. Et ad unguentorum ſpiſſamenta additur.

X B A R B A R I C O R O L L.

Xylobalfamo precii in libras ſex. Romæ in triūpho Impatoris Veſpaſiani arbuſculā oſtendere. Plæriq; in Aegypto naſci perhibent, regione quæ nunc Solis oculus, ſiue fons dicatur, quondam Heliópolis. Incidi autumnno ad liquorem, qui & oleum Balfaminum uocatur. Strabo et in Syria Cœle naſci prodidit, ualle illa fertili quæ Libanum & Antilibanum interiacet iuxta lacum Gennefaritin. In Arabia quoq; Sabæorum tractu maritimo. Admonendi ſumus, Dioſcoridem in huius mentionis calce dicere, Xylobalfami decoctum cum Iride ſicca mederi capitis uulneribus. ἀνὰ γὰρ αὐτὴν καὶ κατὰ δακτύλους. nos ſquamas detrahete cōuertimus, ut uel porriginem intelligas. Eſt enim porrigio, ut Celfus ait, ubi inter pilos quædam quaſi ſquamulæ furgūt eæ, quæ a cute reſoluūtur, modo ſine ulcere, modo exulcerato loco. Vel quemadmodum recentiores, de ſquamis fractorum offium. Sed & caruncula quæ inter uiuam & emortuam offis ad uſti partem ſubit expletura quod abſceſſit, quaſi teſta tenuis & anguſta, ut idem Cornelius teſtatur, ſquama, id eſt, lepis, a Græcis appellata eſt. Liberum eſtimaturis eſto.

De A S P A L A T H O. CAP. XXIII.

Aſpalathus, quem alij Eryſiſceptron, alij Phaſganon, Syri Diaxylon uocant, frutex eſt ſurculofus, multis ſpinis horres. Naſcitur in Iſtro, Niſyro, Syria, & Rhodiorum inſula: quo ad unguentorum ſpiſſamenta pigmentarij utuntur. Optimus eſt grauis, detractio cortice rubes, aut in purpuram uergens, odoratus, guſtatu amarus. Eſt & alterū genus candidum, lignoſum, ſine odore, quod deterius habetur. Vim caſfacienti cum aſtrictione obtinet. Vnde decoctum cum uino ad oris ulcera coluenda conuenit. Ad nomas genitaliū, & ſordida ulcera infunditur. Subiectum in peſſo partum extrahit. Aluum ſiſtit eius decoctum. Et ſanguinis reiectionem potu cohibet. Vrinæ difficultatem inflationeſq; diſcutit.

B A R B A R I C O R O L L.

Aſpalathus in Aegypto quoque naſcitur, ſpina ſylueſtris, magnitudine arboris modicæ, cædida flore roſæ: cuius radix unguētis expetitur. Idē frutex humilior in Syria, & Niſyro, Rhodiorumque inſulis prouenit: quam alij Sceptrum Eliſei, alij Adipſatheon, alij Dipſacon, alij Diacheron, ut Plinius, uel Diaxylon, ut Dioſcorides, uocant. Naſcitur & pluribus locis, ſed non perinde odoratus. Tradunt in quocunq; frutice, ſed in Aſpalatho amplius, cœleſti arcu in eum innixi ſuauiſſimam odoris inenarrabilem fieri. Laudatur colore ruſſo, uel igneo, et odore Caſtorei. Permutatur in libras quindecim. Sane per Hiſpanias multi & ad odores, & inter unguenta utuntur ſpina, quam uocant Aſpalathum. Sed ea uulgaris eſt, ex qua fulloniæ implentur urnæ. Radiciſq; uſus tantum habetur: nec dum comperī, ſit idem uulgaris ſpina, & topiaria, de qua in Acantho diximus. Radicem nigram Hippocrates cum uocat, radicem Galeo ſignificat Aſpalathi, criſæo Phocidis agro commendatiſſimam.

E X M. V E R G. C O M M.

Aſpalathon. Admodū procliuius eſt hic lapſus in Aſphaltū. quod monemus ppter indiligētes librarios. Aſphaltus bitumē eſt, Aſpalathon inter odoratos frutices, & ſpinas cenſetur. Sunt qui Phaſganon appellant & Sphagnon. Quorum prior diſtictio Gladium indicat, altera autem ab iugulando, quod ῥαδιον greci dicunt, potuiſſe fieri uidetur. Credimusq; nos ſic dictum Aſpalathū ab aliquibus, quod aculeatus frutex gladij modo aculeis ſuis pungat et uulneret. Quod in Theocriti bucolicis paſtor, a ſpina in pede percuffus, ab alio monebatur, ne diſcalciatus per montem ingrederetur, qui Rhamnis & Aſpalathis fronderet.

Ἰπποκράτης
ἐν περὶ αἰσθητικῶν
ἐν φάσγανον
ἐν ἀσπάλθου

Theophr. lib. 9.
cap. 7.
Pli. li. 12. ca. 24.

Syri, Dyaxilon. Eadem dicēdi forma, qua nos in Plinio eius florē Diaporphyron dici monuimus. Neq; hoc loco Diaxylo aliud significat, q̄ mediolignū. ex eo, q̄ lignosior est frutex.

Et contra narium ozenas. Ozenas nos adiecimus, quoniā & Plinius ita legit. Sanat oris ulcera, & ozenas, ut in pluribus græcorum adhuc legitur.

De MUSCO

CAP. XXIII

BRyon, id est, Muscus, a quibusdam Splachnon appellatur. In Cedro arbore, Populo alba, & Quercu inuenitur. Optimū est Cedrinum. Proximum Populneum. In quo genere cādidum & odoratius præstat, nigricans improbat, Astringendi uim habet. Decoctum insidentium uuluis utile. Vnguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inferitur. Thymiamatum, acoporumq; compositionibus cōueniens.

BARBARI COROLL.

BRyon, hoc est, Muscus, uerbum ex uerbo. Dicitur & Ipnnon. In Cyrenaica prouincia maxime probatur. Secundum locum obtinet Cyprium, ab eo Phœnicium. Fertur & in Aegypto nasci, quin & in Gallia: nec dubitatur. Sunt & hoc nomine panni arētes muscoso uillo, quales e glādiseris sola fere, quę uocatur Aegylops, fert, non in cortice modo, uerū e ramis dependētes cubitali magnitudine, sed odore præstantes. Candidissimis, atq; altissimis prima dignatio, proxima rutilis, nulla nigrantibus, & in insulis petriscq; nati damnantur, omnesq; quibus Palmarū, atq; non suus odor est. Ex Bryo & balanino oleo expeditissimū, primūq; unguētum fuisse ueteribus tradunt. Differentia hæc: q̄ Bryon aliarū arborum cani quidam sunt, ut dixi, Brion uero Populi candidæ uua circa Gnidum optima, aut Cariam, insipientibus, asperisq;. Secundā in Lycia Cedro pertinentem ad unguentum prædicat, Paulus & in Picea uel Larice Bryon nasci prodidit a Galeno priore scriptum. Est & Bryon θαλάσιον, hoc est, marinū, ut suo dicitur loco. Muscus. preciosissimum odoris genus est, & quod Muscus uulgo nominatur ab Actio, itēq; Paulo, sed & a Phocione grāmatico. Recentior Moschus odoratus capree, seu quod idem est, dorcadis peregrinæ sanies ē ex umbilico eius, aut uōmica. Gazellā uocant animal id barbari, ut uerba Hieronymi ad Demetriadem, hoc nōnullis significant. Muscus inquit, & Oenāthe ex peregrini muris pellicula. Sed Muscus Hieronymo aliud non est q̄ Bryon, de quo hic agitur. Nam & Plinius eadem fere mentione de Bryo & Oenanthe disputat. Quis autē sit peregrinus mus, odorata celebratus pellicula, non uideo, nisi quis animal hoc intelligat, ex quo Zibetti, siue ut recentiores græci uocant Zapetion excipitur: quanquam & compositionis quoddā genus est Zapetion ex animalis Musco, Agalochō, & orientali succino. Hæc ipsa cōpositio etiā Ner uocari solet a græcis quibusdā. Sed uox est Arabica. Inuenio & Muscilion dici quandam herbam, ab odore Musci, ut conjicio, quam & Dorcida uocant, naribus uiriosis & foetentibus accommodatā: ut Aetius existimat. nisi quis pro Distāno accipiat, q̄ & Dorcidiū appellat.

EX M. VEGR. COMM.

Splachnon. Ex qua ratione, nullam nobis habet manifestam rationē. Siquidem græci, θαλάσιον, quæ latinis exta sunt, appellauerūt, nec ē q̄ animatiū extis: & Musco arborum cōueniat. Cedro. Illud animaduertendum, quas hic Cedros dicit, Aeginetā Pinos dicere, sed uiciū subesse credimus, quoniam statim Dioscoridi subscribens, omnibus alijs cedrinum Museum, & ipse antefert.

Populo alba. Non uidetur & uicio carere. Cedri tantum meminit, & albę Populi, desyderatur enim Quercus. Nisi legētib; damnatam uoluerit esse, quam tacitus arborem præterisset.

Habet adstringendi uim. Ne hic etiam conuenit Dioscorides cum Paulo, quoniam hic adstringere, ille discutere, & mediocriter mollire dixit. paruo, ut uidetur, discrimine: quod peritioribus cōsultandum relinquimus.

De AGALLOCHO

CAP. XXV

AGallochum, lignum est, quod ex India atq; Arabia deportatur, Thuiæ ligno simile, maculatum, odoratum, gustu astringens, cū quadam amaritudine. Cute uestitur aliquantulum uersicolore. Manditur, aut decocto os colluitur, cōmendandi halitus gratia. Sudores arcet to

A

Bryon

θαλάσιον

Plin. lib. 12. capite. 25.

B

αγαλλοχον

θυμία

D I O S C O R I D I S

Cto corpori insparsum. Pro Thure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachmę unius pondere, humida stomachi uitia, et imbecillitatē, feruō rēq; mulcet. Si lateris, iocinerisue dolor excruciat, si dysenterię, aut tormina infestāt, ex aqua bibere pdest.

B A R B.

A Galochon Aetius & medicorum uulgus Xylaloen idest, lignum Aloes appellāt: a nonnulla similitudine coloris Aloes, ut arbitror. Nō animaduerto ubi de hoc genere loquatur Galenus. Recentiores gręci tradūt sub terra condi solitū Agalochon, nō alias odoratū futurum, q; ubi teredinibus computruit. Fastigia eius summa quatuor. Indicū, Sapphicum, ex urbe Sappho. Speon, & Hygron, idest, humidum, quod ipsum deinde in species quatuor conciditur. Arabes nonnulli semen huius arboris esse uolunt, id quod Haormiam ipsi uocāt, similitudine Piperis minuti, colore subrubēs, quapropter & Piperellam dixerē. Agalochon Aetius in thymiamate myreplico idē esse, quod & Tarum putat. De Taro Plinius. Ex Casia inquit, et Cinnami cōfinio Cancamum, & Tarum inuehitur per Nabathos, Troglodytasq; ijs uicinos.

VERG.

Quod, scribente & commentante hęc Dioscoride, barbara appellatione Agallochon dicebatur, secuta Gręcorum ætas Xylalœm, facta ab amaritudine nomine, quasi Aloes lignum appellauit. Tradideruntq; id posteriores Gręci, quibus quantum credendū sit, ex huius scriptoris historia & notis facile erit nouisse. Paulus Aegineta, nihil non idē, Dioscoridi de eo tradit, etiā usq; ad uerbum; in hoc uno tantū diuersus, quod non πλεῖστον πόνοσ, ut Dioscorides, lateris doloribus, uerum πλεῖστον, idest, laterali dolori opitulari eam ait, quæ quantum differant, alibi diximus.

Thyie ligno simile. Quæ sit hęc arbor, non facile nobis fuit couñcere, Theophrastus eam libro primo, inter siluestres arbores, quæ perpetuo frondent, numerauit, nec Cupressō dissimilem alibi descripsit. Credideruntq; aliqui, eam esse, quam Homerus quinta Odissę rhapsodia, a Circe ad odorē sumi & lucē incendi dixit. Et quā Plin. lib. 13. Trogetem, ab alijs uocari ait. Licet non iisdem literis in Homero, & Theophrasto unaq; scribatur, liceatq; ob id, non esse in utroq; eundem suspicari. Variantq; antiquiores gręci etiā hoc loco. Suntq; in quibus non Thyiæ, sed Sorbo simile Agollochō legatur: quod more nostro, ne quid, f. relinquantur, dictis hactenus a nobis adijcitur.

De Narcaphtho. CAP. XXVI.

D
νάρκαφθον
νάρκαφθον

Narcaphthum ex India defertur, corticosum, simile Sycomori libro: quod iucundi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis compositis. Constrictionibus uulue suffitu prodest.

B A R B A R I C O R O L L.

Narcaphthon prætermisum a Plinio arbitror consulto, q; incerta esset natura eius, ut aliorū quoq; pluriū: quæ ille orbi nostro tantū nominib. cognita esse tradit, ut sericatū, gabaliumq;. Paulus & Lacapthō nominat, inter ea, quæ a qbusdā in Cyphi heliacū addūtur: et corticē Picæ, uel alterius arboris existimat. Ego Lacaphthon idē esse cū Narcaphtho ratus sum.

E X M. VERG. COMM.

In antiquissimo quodam codice sublatū erat hoc caput, nec deprehendi aliquod eius uestigium potuit, sed ne Plinius quoq; meminir: quod equidem sciam non leui suspitione, nisi Paulus id confirmaret, qui habet fere omnia, quæ hic dicuntur.

Quod torminibus subuenit. Variant ab impresso duobus locis hoc capite antiquiores gręci. In aliquibus enim legitur, ὁ σπορὸς μένεις ἀρήγει, idest, quod torminibus subuenit, nullo eius remedi antiqui alicuius scriptoris testimonio. Siquidem nec Paulus Aegineta in Narcaphtho meminit, neq; antiqua Dioscoridis translatio, ideo nos id negleximus.

Astictis foeminarum locis. Sūt in quibus μύτραν ὑπνωμένην, & in quibus ὑπνωμένην legatur: significatq; altera uox, quod angustum præclusumq; sit, altera quod astictū, nec humores remittens: qualia sunt nulla uitio curta, aut rimosa fistilia, primumq; illud angustiarū & præclusionis uitium, quod gręci φίμων dicunt, in ostio muliebrium locorum, ex præcedente exulceratione, aut durata illic inflammatione sit. Alterū ad suppressos menses, et eius partis fluores pñet. Nos in ambiguo id maluimus, qd ab antiquo medicę, autore Pau. Aegineta cōfirmabatur.

De Cancamo. CAP. XXVII.

κάνκμον
ξύλινον

Cancamum Arabici ligni lachryma est, Myrrhæ quodammodo similis, olidi gustus, quam ad suffimenta usurpant. Vestes

eo ex Styrace & Myrrha suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto, aliquot dies ebibatur. Lienosis datur, comitialibus, & suspiriosis. Menses cum aqua mulsa pellit. Oculorum cicatrices confestim emendat. Vino madefactum medetur eorundem hebetudinibus. Aduersus gingiuas humore pregnanteis, doloreq; dentium, non aliud efficacius.

B A R B A R I C O R O L L.

Cancamum ex collimitio Casiae, Cinnamigi; per Nabathaeos, Troglodytasq; confines aduehitur. Qui confedere ex Nabathaeis, nomine solo compertum Plinio. Nec sum nescius Laccam a barbaris hoc genus uocari aliam, q; quae de Purpurarum floccis conficitur tinctoribus. Est & gummi quoddam arboris Lacca dictum, & tinctoris utile. Nec an ea Cancamum sit hoc de quo agitur, satis habeo compertum. Democritus certe, si modo eius liber est qui de tingenda Purpura circumfertur, Lacchan nominat inter colores hoc, et florem Achaicum appellat; idē autor, sicut florē Syriacū, quod Rhiziō priuatim uocari tradit ad eundē usū. Sit autē flos Achaicus, aut Syriacus id quod nos modo Cremes dicimus, an diuersum, nō cōstat. Paulus odoratum esse Cancamum prodidit. Differt Cancamum a Cancano, q; Cancanus herba est a Galeno dicta, a Dioscoride Cacalia. Nam Caucalis alia est, ut post dicitur. In quo foedissime neoterici diffiluunt, Graeci lignum quoq; aridum Cancanon appellant.

E X M. V E R G. C O M M.

Laxandi uices ultra odoris usum Cancamo AEgineta tribuit. Nec relinquit etiam, quod hic ait, potu eius ad gracilitatem obesos contrahi.

Cicatrices oculorum exterit. Cicatricem uocat Galenus, cum in nigra oculi parte ex profunda ulceratione crassior oculo membrana superuenit, & candido colore conspicitur.

D E C Y P H I. C A P. XXVIII.

Cyphi, thymiamatis compositio est, dicata Dijs, qua abūde AEgyptij sacerdotes utuntur. In antidota misceri solet. Suspiriosis datur in potu. Permultae cōponendi rationes, quarū una haec est. Sumitur Cyperi dimidiū sextariū, cū pari Iuniperi adultae modo. Vuæ passae pinguis, exemptis uinaceis, minas duodecim. Resinae repurgatae minas quinque. Calami, & Iunci odoratorum, & Aspalathi, singulorum minam. Myrrhē duodecim. Vini ueteris sextarios nouem, cum duabus Mellis minis. Vuā detractis uinaceis tufam, cū uino & Myrrha subigito. cetera tusa & cribrata adijcito. die uno humorem conbibere finito. dein mel coquito, dum sibi glutinis ascescat crassitudinem. eliquatam Resinam accurate permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictile uas recondito.

B A R B A R I C O R O L L.

Cyphi urebantur uestiginis omnibus AEgyptij, Matutinis Resina, Meridianis myrrha. Ea erat miscella, ut Plutarchus inquit, sexdecim literis sacris contenta, ex melle, uino, uua passa, cypero, resina, fefeli, aspalatho, myrrha, bitumine, iunco, bryo, calamo, utroq; iunipero, cardamomo, lapatho. Quamquam Lacaphtho forte, non Lapatho scribendum sit in Plutarcho, ut ex ijs quae in Nascaphtho diximus comprehendere potest. Confundebantur haec non temere, aut fortuito, sed praecuntibus de scripto, qui rationem & ordinem praecinerent, quo quicq; loco, tempore, mensura, consociendū esset. Placuit uero numerus sexdecim, q; is e quadrato quadratus existeret. Talis n. linea circumcurrens per oras, aequalem cum area sua mensum habet. De quo latius in libello dictū est, quem ex antiquis autoribus de Iside & Osiride condidimus. Sunt & aliae thymiamatis huius, & pro arbitrio cuiusq; rationes, sed duae in medicina cognominis insignibus, Heliacum & Seleniacum, hoc est, solarium & lunare.

E X M. V E R G. C O M M.

Erant Cyphaeos huius confectiones uariae, quod hic a principio statim testatur. Videturq; c ij

Plin. libro .12.
capite. 20.

278

B

*

*

D I O S C O R I D I S

C hoc loco ea describi, quæ in frequentiori medicinæ usu, forte & notior omnibus erat. Nā quæ a Plutarcho describitur, amplior est. Hæc decem, illa sexdecim rebus constat, ad explendum quadratum numerum. Non tacendum etiam hoc loco, quod suspicati sæpe sumus, non esse Dioscoridis legitimum hoc caput, quod in antiquissimo omnium mihi & probatissimo codice non legitur, nec eius meminerit Paulus Aegineta, cum medicam omnem materiam lib. 6. p. curreret, quod agendum nō erat homini, qui in curandis morbis, usus eo sæpenumero fuisset. Quodque in eam suspicionem nos magis traxit, illud est: quod parum uerisimile est, simplicem medicam materiam docentē hominem, compositam illi miscuisse. Nec est quod miretur aliquis, in græcorum scriptorum codicibus, tam multas & tam græues labe. Quo em̄ malo facto latina res iam pridē periit, eodē & Græca collabefacta est, et qd' adijcēdi cōtinue antiquo rū decretis aliqd, uiciū nunc oēs tenet, idē antiquores tenuit: dū uolumus oēs aut sapientiores uideri, aut ocio consulentes, parata & exposita eodē loco omnia habere. Suspitiō tñ, non decretum hoc sit. Neq; enim nos rem damnamus, nec legētib; inutile fuerit, tā multa de Aegyptiorum Sacerdotum & medicorum Cyphi narrata a nobis, & ex antiquitate repetita fuisse.

DE CROCO. CAP. XXIX.

C Rocum ab aliquibus Castor, ab alijs Cynomorphos, a magis Herculis sanguis appellatur. Optimū in medēdi usu Coryceū, recēs, et boni coloris, paulū cādidi gerēs in capreolo, oblōgū, oibus suis partibus cōstās, nō fragile, plenū, a quo detractū ē nihil, qd' madefactas manus inficit, nec sitū redolet, aut cariē sentit, subacre. Sin huius generis nō ē, aut uetus, aut humore pfusum creditur. Secūdus locus datur Coryceo, e tractu Lyciē cōtermio. Tertius Lycio, e mōte Olympo. Dein ex Aegibus Aetoliē. Cyrenaicū e Centoria, inter sicilica oīa uiribus p̄stat. Omnīū ad obsonia usus. Itali tñ ob succi copiā, et coloris uenustatē, ad Thuiē infectus u =
D surparūt. qbus de causis magno uēditur. Utilissimū in medicina qd' ante descripsimus, Adulteratur imisto Crocomagmate tuso, atq; etiā Sapē sublitu cōtrita, q pōdus adijciatur, simul argēti spuma, aut Plumbagine. Sed maleficū declarat insidēs puluis, p̄serti si Sapā oleat. Thessalus ipm̄ tñ odoratū esse uoluit. Alij exitiosū, trib. drachmis ex aqua potis. Proculdubio uim coquēdi, emolliēdi, atq; substringēdi habet. Vrinā cit. Elegātē colorē p̄stat. Qui ex Passō biberint, crapulā nō sētiēt. Oculorū fluxiōes, illi tū cū humano lacte, cohibet. Additur in potiōes, quę interaneorū caussa tempantur. Ad uulug etiā, sedisq; cataplasmata comode pmiscetur. Venerē stimulat. Vergentes ad ignem sacrum inflāmationes mulcet. Auricularijs collectionibus utile. Quo facilius conteratur, in calido ficuli sole siccati oportet, celeriterq; uersari. Vrinam mouet radix ex Passō pota.

BARBARI COROLL.

Plin. lib. 21.
capite. 6.

C Rocum folio angusto, adusq; capillamenti exilitatem, germine ac flore serotino, per autumnum occasu uergiliarum: qui paucissimis diebus marcescat. Cum folio florē expellit obiter, quin & prius uidetur. Subest radix multa, carnosa, peruicax. Calcatum melius surgit, & quasi pereundo lætius prouenit: semitas eo fontesq; amat. Seritur radix Bulbo. Duo genera eius, montanum, & fatiū. Prius hebes, posterius odoratū, utrunq; primis imbris. Emicat autumno, ut dixi, post Aphacen. Inodori duo genera, candidum, ac spinosum. Viret bruma, & colligitur, siccaturq; in sole. Sed in umbra melius est Hyberna. Crocū syluestre optimū. Sere in Italia nō expedit, ad scrupula usq; singula areis decoquentibus. Satiū maius, nitidiusq; sed leui momēto degenerat. Omnino infecundū natura ubiq; uel Cyrenis, ubi laudatissima oīa, Quidā Phlegreō Croco sedm̄ locū adsciscūt. Probatio, synceri, ut manu impōita crepet,

ueluti fragile: dilutum et humidū sedet. Altera phatio, si manu plata ad os, leniter faciē, oculosq; mordeat. Esse inquit Plinius, & per se genus fatui blādisimum, uulgo cum sit medio sui candidū Dialeucon uocatū. Cyrenaico uitiū, q; omni Croco nigrius, & q; celerrime corūpitur. Laudatur breuib; capillis in Lycia. Año septimo, uel octauo transfertur in locū subaestū: atq; ita degenerans reuocatur. Vitis eius in coronis nuscq; ppter angustia folij, nisi quē ad mulcendā ebrietatē fieri a quibusdam soleat. Vīno mire congruit, p̄cipue dulci, quo & aqua facillime soluitur, nulloq; alio dulci. Tritū ad theatra replenda, utq; hoc nonnulli apud Dioscoridem intelligant, cum *στρίαν* dicit, errore librariorum *στρίαν* pro *στρίαν* scribentiū. Sed nos imutare lectionem antiquam, ausi non sumus. Ideoq; mortarijs tingendis, conuertimus. p̄sertim cū de mortarijs atq; Croco mentionem quodā loco habitam a Plinio sciremus. Asseruatur pixidecula e cornu. Acerima Croco uis tribuitur; ut illatū manus palme, cōtinuo pueniat ad cor.

EX M. VEGR. COMM.

Croci appellationum nulla est a nobis certa ratio, quē plures etiam, quam in impresso Dioscoride, in antiquis alijs græcis leguntur. nihil igitur de his agemus.

Integer, friabilis. In aliquot græcis legitur, *ἄσπερος*, quod est fragile, & tenaci lentore durū. In aliquot uero, *ὑδρακνος*, quod friabile significat, contrario penitus sensu: prioremq; illam lectionem, secuti sunt iuniores omnes. Plinius alteram his uerbis cōfirmat. Probatio synceri imposita manu, crepat ueluti fragile, nosq; in ambiguo hanc magis probauimus, non tam Plinij auctoritate, q̄ necessitate & usu eius admoniti, friato em̄ Croco plerumq; in medicinis utimur.

Et sine unguine plenus. &c. Sequitur eam mox uocem alia, quā penitus corrupta est, *ἀνελπίος*. s. cum *ἀνελπίος* legi oporteat, idest, qui nullo unguine uuescat, non cui nihil deficit: idq; meliores græci adhuc habent. Nec obstat quod Plinius decreuit, optimū ubicunq; quod pinguisimum. Crassitudinem enim, non unguem ea uoce significauit.

Et cum malefcit, manus inficiens. Obseruauimus, non eodem modo in cunctis legi *ἐν τῷ ἐν δίσκῳ τὰς χεῖρας*. Sed in alijs, ut modo scripsimus, manifesta significatione, infici attritu Croci manus: In alijs, *ἀνελπίος*, idest, cum humore diluitur: quod quoniā uni uerso Croco cōmune est, minus ideo nobis placuit.

Restituimus idem idem non multo post, uocem quā in cunctis alijs, praterq; in eo qui mihi omnium codex probatissimus est, perierat, illic. s. ubi hic ait. Qui enim talis non fuerit, &c. Deerat enim, *ἄσπερος*, quod hos in tempestiue lectum diximus, manifesta eius uocis iactura, & necessaria instauratione. Incertus ab hoc loco, nec sequax sermonis cursus est; non tñ intellectum adeo confundit, ut non facile dissimulari, aut ex Plinio in integrum restitui non potuerit.

Et ex Olympo Lyciæ monte afferitur. *ἀντὶ τῆς ἀλὲ ὅτι τὸ πρὸς λυκίαν κορίκιον, καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ λυκικοῦ δάμπερ*. Articulus præpositiuus, & Coricij in genitiuo casu, illic accurrentes, legitimam sermonis seriem, miscunt. Ideoq; nos secundæ bonitatis, a Coricio, ex Cilicio esse diximus, eum qui nis seriem, miscunt. Ideoq; nos secundæ bonitatis, a Coricio, ex Cilicio esse diximus, eum qui ex agro ad Lyciam, & Lyciæ Olympo monte afferatur, nullā earum uocem perire nobis utilē patientes. Cum alioqui licuisset ex Plinio, breuius & certius totam absolvere rem. Siquidem ille etiam sic decreuit. Prima nobilitas Cilicio Croco, & ibi in Corico monte, dein Lycio monte Olympo. Sed nos qualē nostra habet ætas, Dioscoridē interpretamur, nō Pliniū exscribimus.

Gravius in Cyrenaico Croco. A librarijs peccatum est. nihil enim illi redditur. Verum statim ad eos qui in Sicilia nascuntur translatus sermo est, tam incerto intellectu, ut nos hiatum illic reliquerimus, qui a doctioribus aliquando expleatur. Credimusq; nos, uitiū aliquod in Cyrenaico significasse Dioscoridem, quod tamen nunc non legitur, quale Plinius in eo nigredinem damnauit. Mox de Siculis egisse, omniumq; in ea insula nascentium Centuripinū ignauissimum, fatuosq; omnes hos esse, ideoq; ignauiores. Quoniam autore Plinio, optimum siluestre sit. In antiquorib; græcis aliquot, certissimo sēsu & intellectu hic locus adhuc inuenitur.

Miscetur præterea, &c. Desyderatur hic certi morbi genus, quod facile conijcitur.

De Crocomagmate. CAP. XXX

Iteriā ex p̄ssis unguenti crocini odoramētis, qd̄ Crocomagma uocat. Optimū ē odoratū, modice Myrrhā olēs, graue, nigrū, ligni expers, leue, subamarū, qd̄ madefactū Croci colorē reddit, gustatūq; uehemētior dētes ac linguā inficit: multis durās aṅis. Quale ē qd̄ a Syria deferretur. Habet suas uires ad delēda quē caliginē oculis obuersant. Vrinā cit,

A

Subaestus

B

κροκόμαγμα

c. iij

D I O S C O R I D I S

C Calfacit, concoquit, & emollit, Vires Croci proportionem representat. quandoquidem plurimam Croci partem sibi Crocomagma uendicat.

Pli. li. 21. ca. 20

C R O C O M A G M A uerbū ex uerbo sex olei Crocini est, nam feces unguetorum Magmata greci appellāt, & conspersionem, siue massam quæ subacta sit, Ecmagma, quo nomine inquit Galenus, ipsum quoque Crocomagma significamus.

E X M. V E R G. C O M M.

S Vnt grecis Magmata, quæ expressa materia aliqua, supsunt, crassa, feculentā, & lignosa. Verbi causa, Si tusa Plātaginis folia in usū aliquem manib. aut p̄lo exp̄sserit medicus, quod supest terrestre, lignosūq; id Magma dici posset. Sed qm̄ nullus similitum usus ē, ideo in nullo huiusmodi id nomē inuenit: seruatū tñ id est tñ in ijs, q̄rū et humoris, et exp̄sse substantiā alicuius usus est: ut in Rosacio, alijsq; huiusmodi multis. Ex hoc genere Crocomagma est.

Fita autē sic. Oleū primū inspissatur, idq; aliquibus aromatis, mox Crocus infunditur. post alii quot dies oleum colatur, exp̄presso oleo. quod superest, Crocomagma dicitur. Vnde sunt palli, Celsus lib. 7. uocat Recrementum. Plinius, Vnguenti fecem.

Et mediocriter myrrhatum est. *μῆρ κατὰ σμύρνον*, id est, non odore solum, sed tota Myrrhæ substantia mediocriter myrrhatum.

Dētesq; et linguā ad aliquot horas inficit. Nō significat qd̄ statī seq̄tur, ἀπὸ μῆρτος οὐχ ὅσον ὅρα qd̄ ex Gallia interps dixit, multis añis perennare Crocomagma. Non em̄ quas hic ὅρα dicit, Poetarū more años significat, sed de colore eius agit Dioscorides, quē testatur, cū linguā et dētes semel infecerit, aliq̄t continuis horis p̄manere, cū aliq̄n cōtinua oris pituita dilui deberet.

¶ De Helenio. C A P. XXXI.

heleni

H Eleniū, qd̄ Symphitō aliq̄ uocāt, alijs Persicā, alijs Medicā, alijs Ore stiū, alijs Nectariō, alijs Cleoniā, alijs Idēa Batō, aut flomū, Latini Terminaliū, aut Enulā cāpanā, Aegyptij Lenē. Folia habet Verbasci, angustioris folij, asperiora, oblōga. Caulē q̄busdā in ijs nō emittit. Radicē subalbidā, interdum subruffam, odoratā, acrē, uegetā, magnam, ex qua agnatae appendices Liliorum, aut Ari modo feruntur. Montibus in umbrosis, siccoq; solo prouenit. Foditur æstate radix, particulatimq; dissecta siccatur. Potum radice decoctum, menses & urinas ciet. Ipsaque in eclegmate ex melle, pdest tussī, orthopnoeā, ruptis, cōuulsis, inflatiōib. et serpētū morsib. In suūa, excalfaciēs. Folia ex uīno cocta utiliter ischiadicis illinūtur. Heleniū stomacho utile, ī passio cōditū. siq̄dē salgamarij paululū siccata radicē, mox decoctā, & frigida aqua madefactā, in Sapā cōijciunt, et ad usus recōdūt. Trita, potaq; ad cruentas excreatiōes efficax est.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 21

H Eleniū, Enula, siue Inula, sed duplici natura, folio Serpilli: de qua statū post dicef. Altera folio Verbasci exilioris, de qua nūc agitur. Brevior hęc q̄ Pasūnaca ē, sed torosior, amariorq; et nisi tēpetur liq̄do dulci, stomacho inimicissima. Sed plurib. modis austeritate uicta, gratiā inuenit. Nā & Vuis passis, & defruto, & melle subigif in pollinē tusa: et pinguib. quoq; Caryotis, iam Coroneis, Malis, Sorbis, et Prunis, aliquando Pipere atq; Thymo illustrata, maxime Iuliū augustū quotidiano cibo. Superuacūū eius semen, qm̄, ut Dioscorides meminit, paginibus feritur, modo quo harundines, magnisq; interuallis, neq; ullo minus quaternorū pedū: quoniam spaciose fruticat.

E X M. V E R G. C O M M.

E Lenion. Siue a lachrymis Helē, siue ut alijs dixerunt, quoniam contra serpētes ex eo primum a muliere illa remedium inuentum est.

Symphyton. Inuenisse id nomen uidetur, ex sobole adnatisc; illis, quæ in radicibus Liliorum modo

rum modo *συμφορται*, idest, conuascuntur, & herent.

Sunt q̄ medicā & Nectareā. Scilicet factō a regiōe noīe, et a dulcedine. Sic Persicam, sic Cleonā dictā etiā conijcere licet. Etsi in probatissimo mihi codice, non simpliciter *κλεώνιον* legitur, sed *κούλωνιον κλεώνιον*, idest, Buglossum Cleonium.

Apuleius etiā Chironion Panacen dicit uocari. Vt in alterutro uidum sit; adiectumque hoc a nobis est, ne quid obseruatum & inuentum haecenus relinqueretur.

Orestium. Causam ignoramus. Nisi forte Orestis & Helenæ propinquitās, communem eius plantæ laudem & honorem ambobus fecerit.

Sunt qui Rubum Idæum. Verbasum Idæum, ex sola similitudine (ut toto hoc opere infinitæ aliæ) factæ sunt. Et quoniam copiosum in mōte Ida nasceretur, ideo loci, & regionis discrimine, a proprie dictis, de Rubo & Verbasco, discretum est.

Terminaliū. Vnde Romani sic dixerint, modo integra ea uox est, nihil cōpertū habemus.

Inulam campanā. Inulam dici antiq̄ omnes testātur, nullibi tamē ex Campania magis, q̄ aliūde ab illis laudatur. Suspiciamusq̄ nos, multas in scriptore hoc, nō legitimas esse appellationes, deincepsq̄ p̄ tēpora inferas, aliena & pegrina admiratibus cūctis, eoq̄ magis in Romanæ gētis fortuna et impio, hāc græcis miscere p̄p̄rijs placuisse, & ex p̄p̄inā urbi regione laudauisse.

Folia habet angustiora folio Verbasco, &c. Id ex Verbasci historia patebit. Qd̄ utinā in caule pariter liceret, quoniā hic ait, aliquibus locis in Inula nō proferri, nulla eorū locorū certa indicatione, quā meritō omnes desyderēt, multoq̄ magis ubi caulescat hoc olus, & caulis, & floris, & semini certam rationem & historiam, quam iuniores aliqui non ex se, sed ab hoc scriptore acceptā rediderūt. Quod enim in impresso, cunctisq̄ alijs fere græcis nō legitur, in antiquissimo & probatissimo mihi codice adhuc seruatur, describiturq̄ in eo caulis appellatione, quod in Inula crescit, his uerbis. Caulem ex se mittit Heleniū crassum, hirsutū, cubitalē, & aliq̄ maiorē, angulosumq̄, flores luteos, et in hīs semē Verbasco simile, tactu pruritū faciens. Licetq̄ hæc, ut diximus, tam aperte in Græcorum aliquo legatur, nō ideo tamē ceteros omnino dānamus. Obseruauimus enim, diuersitati huic causam dedisse, mediam quandā in Inula crescentium naturam, quæ nec in caulium genere, nec fruticum ramulorūue censerī penitus possent. Siquidē caules plerūq̄ in singulis plantis, singulares sunt, nec nisi appetente flore & semine surgūt, ut in Lactucis, ac Betis, alijsq̄ oleribus huiuscemodi sit. Inula autē raro, & a principio statim fruticatu p̄dit. Ramuli cōtra, fruticesue copiosiores & graciliores, q̄ in Inula sūt, quales in Ruta, Serpillo, alijsq̄ iunioris uidētur. Columella frutices, qd̄ in Inula extollit, dixit lib. 12.

Radicem habet intus albescētem, foris rubescētem. Sic ex melioribus græcis legendū est.

Radicem habet odoratam, grandē, acrem. Sunt in quibus *ἰσχυρὰ*, quod est speciosam & crassam, & in q̄bus *ἰσχυρὰ*, quod nos facili lentore mollem reddidimus, *ἰσχυρὰ* enim, τὸ ἰσχυρὸν significat. Probauimusq̄ hanc ratione magis, quod ad ostendendā eius quantitātē satis erat, qd̄ hic *μεγάλων*, id est, grandem dixerat. Liberum tamen hoc legentibus relinquatur.

Suspectum est nobis, quod in græcis omnibus legitur, cruentis sputis utilem esse Inulam. Non tam quia meliores græci nihil huiusmodi habent, quam quia non legitimo loco, se id ostendit. Debuerat enim in medicina, nō in extremo capite post eam tractari, a quo loco distractum, additum magis & aduentitium, quam natium & antiquum Dioscoridi uidetur: relinquiturq̄ peritioribus de eo censendum.

De ALTERO HELENIO. CAP. XXXII.

Alterū Helenij genus in AEgypto gigni Crateuas tradit. Herba est cubitalibus ramulis, Serpilli modo per humum repentibus. Folijs Lenticulæ, sed longioribus, crebrisq̄. Radice pallida, digiti minoris crassitudine, p̄ ima tenui, sup̄ne crassa. Cortice nigro. Nascitur in maritimis, collibusq̄. Radix una in uino epota, cōtra serpētū ictus auxiliatur.

HEX M. VERG. COMM.

Helenium hoc posterius, nostris Inulam appellari posse, non uideo. Theophrastus interim Velenion, Aristoteles Belenion scripsere: si modo liber eius est, qui de plantis ad autorem Aristotelem refertur. Belenium inquit, delibutorij in Perside uenenum erat, & in AEgyptum & Palestinam translatus, sine periculo mandī coepit. Hæc commentatio Græcis perierat. Habebatur in arabico, demū cōuersa est in græcum sermonem a quodā, ut ferūt. Maximo.

D I O S C O R I D I S

C propterea quedam in eo libro barbara fruticū & radicū leguntur nomina, ut sunt, Benteli, Nenuphar, Opinais, & aliquot huiusmodi. Nenuphar pro Nympha quidē capitur Arabia: sed Benteli, & Opinais quid sit, parum liquet. Nisi quis Opinais pro Silphio intelligat: quoniam succum ex eo manare lentiusculum dicat, quem priuatim uocamus Opon. Bentelos autem initio spicata esse traditur, mox in arborem grandescere. Sed redeamus ad Helenium. Plinius hoc Helenæ lachrymis enatū refert, dum gubernatorem Canopum, Hæmorrhæ serpentis ictu exanimatum fleuisset, Hilaritatem, Hippocratis testimonio facit. Prædulcis in eo cremor. Radix cōtrita, mures necat. Cādida intus est, & dulcis, Dioscoridi uero pallida. Laudatissimū in Helenā insula. Huius rami dodrātales a Plinio, cubitales a Dioscoride feruntur. Addebatur in coronamenta folium.

E X M A R. V E R G. C O M M.

Credimus etiam in Aegyp̄tia Inula corruptam esse illic uocem, quo loco in extrema totius capitis coronide, hic ait, uires illi esse, ut cū uino pota radix eius una, serpētū moribus subueniat. Cur enim una magis, q̄ duabus, tribusue: & si quantitas in ea uoce decernenda fuerat, pondere potius q̄ numero, quod alioquin inæquale est, constitui debuerat. Id nos, una & altera litera mutatis, quod erat *μία*, id est, una, *λίαν* quod tritum significat, legendum esse arbitrati, tritam cum uino potam Inulæ radicem, remedio esse diximus.

ἐλκισιν
ὀμφακίνον

O De OMPHACINO OLEO. C A. XXXIII.
Leum quod ex immaturis Oliuiis exprimitur, ad multos usus recte ualentibus accommodatissimū, Omphacinum id appellatur. Præstat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale unguentorū compositionibus idoneū intelligitur. Stomacho utile est, q̄ astringat. Gingiuas contrahit. Dentes firmat, si contineatur in ore. Sudores cohibet. Et quo uetustius ac pinguius, eo ad medicamenta aptius est. Et ut reliqua in commune dicātur, onine oleum calfacit. Emollit uentrem. A perfrictionibus corpus tuetur, ipsumq̄ promptius ad obeūda munera reddit. Aluū leuigat. Vlcerationū medicamentū uires permistū lebetat. Cōtra uenena datur, assidue potum, redditumq̄ uomitionibus. Soluit aluum hemine mēfura, cum pari Pūsanæ succo, aut aqua potum. Ad tormina, calidum si mul decocta Ruta tribus sextariis in potu datur. Ventris animalia pellit. Idem maxime Ileii intestini morbo laborātibus infunditur. Vetus magis calfacit, & uehementius discutit. Oculorū claritati sublitum cōfert. Si uetusti non sit occasio, in uase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut uetustatem representet.

Plin. lib. 15. ca.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
de omni oleo,
Gale. 6. simp.
pharma. capi
te. 19. 20.
Ad Paternia-
num. cap. 199.

Galen. 6. sim.
cap. 19. 20.

B A R B A R I C O R O L L.

OLeum Omphacinū fit duobus modis, Olea adhuc alba expressa, Cādida deterius ex Druppa (ita enim uocatur a græcis, latinisq̄, priusquā tenera esui sit) iam tū luteola, coloremq̄ demutans. Hoc uiride Caro appellat, atq̄ utilius est. Est & Omphacinum siue Omphaciū e uite, de quo post Galenus Oleum nō Omphacinū, sed dulce fieri ex Druppa scribit. Alterū uero genus, qd ex immaturis, albisq̄ premitur, & Omphacinū, & Omotribes appellari tradit, unguētis utilissimum e Phaulia, ut Theophrasto placet. Simile Omphacino fit Oleum, si oleæ ramus in condituram adijciatur. Quibusdam natura soli, nō conficiēdi ratio astringentiorum uim, qualis in Omphacino sentitur, dat, ut Hispaniensis nominato. Omphacinum, ab Omphace ducitur, unde acor ex uuis, græce appellatur Omphacium, & acerba uua Omphax, & acerbum mel Omphacomeli, ab eodem omnia uocabulo.

Oleum ex Druppa fieri dulcissimum, Galenus testis est, utiq̄ si ex maxime Druppa fiat, nō si ex Druppa tantū. Olei probi notæ apud Galenū sunt, ut sit q̄ dulcissimū, tenuissimū, purissimū, translucidum, quodq̄ modico eius cuti superfuso plurimū sese fundat, & facile combibatur. Cuiusmodi est, inquit, quod Sabina bacca premitur. Oleū cum aqua mixtū Hydrelcon uocatur, & Chydon: quanquā posterius hoc Homero lustrationem fere significat. In Baetris iuxta

I B E R P R I M V S

iuxta flumen Ochum, effossa terra fons manauit olei, quod quidem traditum ab his qui Alexā A
dri res scripserunt: & Strabo credidit.

E X M. V E R G. C O M M.

Oleum Omphacinum, ὀλαιον ὀμφοκρινον, ὀμα enim cruda significat, & ὀμφοκρινον
omniū plantarum acerbos adhuc fructus græci appellant.

Datur contra lœtalia uenena, &c. Id est, cōtra Cicutam, Nigellam, herbā Apollinarē, Mā-
dragorā, Elateriū, &c. Nam his mixtum oleum hebetat operationem & maliciam eorum.

Cyathorum sex pondere. In cunctis, excepto probatissimo mihi codice, cotylarū sex pon-
dus legitur. In illo Cyathorū: fuisseq; & ueterem lectionem, & antiquam mēsuram, testatur Plī-
nius lib. 27. dicēs tormina pellere oleum calidū, porū cyathis sex, magisq; Ruta simul decocta.

O De O L E O siluestris Oliuæ. C A P. XXXIII.

Oleum quod siluestres Oliuæ fundunt, uehementer astringit, & ad sanorum usus secundū sibi locū uendicat. In doloribus capitis
utiliter pro Rosaceo substituitur. Sudores arcet. Defluētes capillos inhi-
bet. Furfures, ulcera capitis manantia, scabiem, leprasq; abstergit. Tardius
caniciem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Candidū oleum
fit hoc modo. Album colore, nec anniculo uetustius, in nouū fictile oris
patuli funditur, centū heminarū mensura, & sub solem media quaq; die
cōcha refunditur: ex altoq; demittitur, ut assidua deuolutione, ictusq; agi-
tatum respumet. Octaua die Fcenū græcū mūdum quinquaginta drach-
marū pondere, calida aqua madefactū, donec emollescat, in supradictum
oleū deiicitur, ita ne exstillet aqua. Postea tedē præpinguis Piceæ, affula-
tim cæse, æquale pōdus adijcitur, & trāfactis octo diebus, oleū cōcha mo-
uetur. Si intentū finem assequatur, in uas nouum uetere uīno affusum re-
condi debet, substratis fertulæ Campanæ corollis drachmas undecim pen-
dentibus, cum pari Iridis pondere. Sin minus, rursus soli mandandū, &
idem munus obeundum, usq; dum inallescet.

ἄλειον ἐκ τῆς
ἀγρίας ἑλαιου

ἑλαιον λευκόν

O B A R B A R I C O R O L L.

Oleum ex Oliua siluestri, tenue, multoq; amarius q̄ ex satiuā. Vtile hoc ad medicamenta
fere tantū, de quo alio quoq; Dioscorides in ratione Oleastri & Oliuarum cōmemorat. Ari-
dissimū hoc Galenus inter olea describit: post hoc Histricū: mox Hispanū. Pinguissimū, Liby-
cum, & Cilicium. In pingui uero tenue Sabinū. Inter hæc media fere natura eorum, quæ Græ-
cia, & Asia, & Cyclades mittunt. Pausanias Tithoreum e Phocide cōmendat, Hispaniensi præ-
tulit & Histrico. Pingue lenticia, tenue, perspicuitas, & puritas consequuntur.

Gale. 6. simp. .
cap. 19. 20.

Oleum cādidum aliud spōte, ut quod ex Oliua adhuc alba exprimitur, Omotribes uoca-
tum. Aliud factitium, ut de quo nunc agimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Estillud ex Columella, alijsq; rei rusticæ scriptoribus sciendum, plures antiquis fuisse oliui-
tates. Primam, in qua acerbum oleū exprimebatur, quod estiuū a tempore etiam dicebatur. Se-
cundā, quæ ante decembris Calend. fieret in qua uiride oleū a colore, quod ex uiridi adhuc
bacca exprimeretur, uocabant. Tertiam decembri mēse, quam mediam Colomella dixit, & in
qua maturum oleum exprimebatur. Quartam ianuario mēse. Erantq; singularum bonitatis
& usus laudes aliquę. In uiridi autem id maxime laudabatur, quod satis fluere, & precio dupli-
caret domini redditum. Credimus q̄ nos, ob hanc causam album exigī a Diosco. oleum, ut a
uiridi ea colo ris nota distingueretur, quoniam a natua uiriditate non facile ad candorem mu-
tari id posset, & ad contrahendam olei Sycionij naturam, mītus aptum esset.

Super iniuncto ex pinguislima Picea, &c. Vt parum cognitum nobis est, quid hoc sibi ue-
lit ita uehementer suspectum; dubitamus autem deesse aliquid, aut quæ sequuntur non sine uf

D I O S C O R I D I S

Cio esse, Est enim illic nō πίνος substantiue, id est, Picee arboris, uerū adiectiue πίνινος id est, qđ ex arbore aliquid significet. Verbi causa, frondē Resinam, Onicā, aut huiusmodi quippiam. Secus Iōge author Pandectarū, qui album dici existimat, quod est uetus, quoniam quo antiquius, eo quoq; albius apparet, quod subinde quoq; lotum a Myrepticis est.

σικυώνιον ἔλαιον

De OLEO SICYONIO. CAP. XXXV.
Sicyonij componendi ratio hæc est. In lebetem oris lati stanno inducitur, funditur olei albi, quod crudæ Oliuæ reddiderūt, cōgius unus, aquæ congius semis. leui id igne coquitur, leniter mouēdo. At ubi bis efferbuit, & subtracto igne refrixit, innatans oleum concha tollitur. & adiecta noua aqua conferuescit, & reliquis ut diximus peractis reponitur. In Sicyonia maxime fieri consuevit, Sicyonij inde accepto cognomine. Calfactoriam ad quēdam usq; modum uim habet. Febri ac neruorum uitijis prodest. Fœminæ, ad commendandum faciei nitorem, eo utuntur.

EX MAR. VERG. COM.

Dealbatum oleū Sicyonium, ideo facere Diosco. docuit, quod medicis & fœminis quondam multus esset usus eius, illis in aliquot malorū curatione, his in lenocinio formæ passim eo utentibus. A Sicyone antiquissima Peloponēsi urbe prope Corinthum, gentile sibi nomē inuenit, incertumq; medici ne prius, an fœminæ eius confectiōem docuerint, uoluptas ne, an necessitas. Vtebatur eo passim in aliquot malis antiquitas. Sæpeq; Paulus Aegineta aliquid eo curari præcepit. Et libro sexto Samium magis, non Sicyonium in usu medicinæ cōmendet.

ῥυπος θαλασίου
ῥυπος ἐν τῇσ πα-
λαιοῖσιν
ῥυπος γυμνασίων

De Strigmentis balnearum. CAP. XXXVI
Strigmenta a balneis calfaciunt, molliunt, discutiunt. Ad sedis rimas & condilomata illinuntur. Illa uero quæ ex Palæstris puluerem sibi afciuerunt, in fardis speciem redacta, articulorū nodos imposita adiuuāt. Ischiadicis in fatus, aut malagmatis locum, calida commode sufficiuntur. Derasæ Gymnasiorum parietibus, simulacrisq; sordes calfaciunt. Tubercula, quæ agre ad coctionem perducuntur, dissipant, Desquamatis, & ulceribus senum profunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Strigmenta
balnearū.

Strigmenta, hoc sunt, quod Græci Rhypon, & Glocon appellant. Id quod ex Celfo, Plinio que colligimus. Aurium certe fordecular, Græci uocāt Cypsellas, Rhypon Iulius Pomus pro cera quoq; sigillari, acceptum quandoq; tradit ab authoribus. Nisi quis Typon, non Rhypon in Polluce lectitet. Sed & apud Ciceronē in epistolis ad Atticum, Rhypos scriptū est pro ceris, siue formis, unde sigilla fingeantur, fortasse a situ uetustatis, appellatas: ut Plinianum quoq; illud, & expressi cera uultus, singulis disponebātur armarijs, ut essent imagines quæ comitarētur Gentilicia funera, defuncto em aliquo totus aderat familiæ eius, quinquā fuerat, populus.

Strigmenta
Palæstrarū.

Strigmenta, hoc genus aliud non sunt, qđ puluis, qui luctantium corporibus inspergitur: et oleo superuenit. Hæc pulueris insperisio, a græcis ἀψι dicebatur, puluis ipse, conis. Cū ipso te, inquit Plautus, puluisculo conueram. Et geometricū est Puluisculus. Palæstris quidem, optimum e Nilo Sabulum, tenuissima sui parte. Oleum quo luctaturi perfundebantur, Cerosma dicitur, & Patos. Quanquā Patos proprie cœnū est, atq; lutum cerosmati permixtū: cui si sudor accesserit, Conisalon uocari, ab ijs qui nimis Attici uideri uolunt, autor est Galenus. Locus in Xystis huic operi dicatus priuatim, Coniserium appellatur Vitruiuo.

Strigmenta
Gymnasiorū.

Strigmenta a Parietinis, & a Palæstra significare Plinium existimo, cū ita loquitur. Vsum olei in luxuriam uertere Græci, uitiorū omniū genitores, in gymnasijs publicādo. Notū inquit, est magistratus honoris eius octogenis sesterijs Strigmenta olei uendidisse. Item. Quin & sordes inquit, hominis, in magnis fecere remedijs, quæ fuosorum gymnasia Græcorum: quippe, ea Strigmenta molliunt, calfaciunt, complent sudore & oleo, medicinam facientibus. Item alibi. Et in gymnasijs inquit, oleū cōditur odoribus, sed uilissimis. At Strigmenta statuis gymnasijs

fiorū detracta: in quibus Galeno autore, multū olei cōburebatur: quia puluere ingere carent. & cum erugine permista colligerentur, acrioris naturæ q̄ strigmenta cætera noscuntur.

EX M. VERG. COM M.

Strigmēta dicuntur, quæ oleo illitis capitibus post sudorē, una cū sudore, reliq̄sq̄ humani corporis cōcreta, & in balneorū pauimentis relicta, in eos usus quos hic docet Diosc. seruabatur.

De ELEOMELITE. CAP. XXXVII.

IN Palmyris Syriæ, quod Eleomeli uocant, ex quodā caudice manat, crassius melle, sapore dulci. Bilem, cruditatesq̄ detrahit, sextario cū una aquæ hemina dato. Sed qui sumptere, torpescunt, & uiribus deficiunt: quod minime uereri oportet, uerum crebro excitare, ne ueterno pressi, somnos captent. Fit & oleum e pinguitudine furculorum Oleæ. Optimum uetus, crassum, pingue, non turbidum. Calfacit. Priuatim caliginibus oculorum illinitur. Lepras, neruorumq̄ dolores, illitum emendat.

BARBARI COROLL.

Eleomeli fuit ex ipsis Oleis in Syria, tenuius Resina, sapore Mellis: unde nomen. Nō sine nausea emollit aluū. Pugnatores certaturi, præsumūt ex eo cyathum. Plinius in maritimis Syriæ nasci prodit, cū tamē Palmyra longe a mari absit. Forte non maritimis, sed Palmyris legendum, nisi quis locum, unde id excerptū, non Palmyris, sed Almyris legisse Plinium existimet: quod in tanto uiro dubitare, nullo modo possum. Eleomeli medicinæ tantum gignitur. sit hoc idem quod & Aeromeli dicitur, quasi mel æthereum ac cœleste, quod sacræ literæ Manna uocent: ut nō plane cōtendo, ita certe, ppenissimus sum, ut credam. Sed ita tamen, ut intelligatur aliquod discrimen esse inter id quod mandipotuerit, & id quod medicinæ tantū nascitur. De cerpi hoc Amyntas scribit, una cū ipsis quibus hēsit frondibus. Et in offas, pastillosue, aut etiā orbiculos conuolui, ut cū usus postular, in lignea pocilla, quæ Tabaitas in Asia cognomināt, aliquo humore diluatur. Plane ab exortu sideris cuiusq̄, sed nobilium maxime, ut Plinius existimat, aut cœlestis arcus, si nō sequantur imbres, sed ros tepe scat solis radīs, Medicamēta potius q̄ mella gignuntur oculis, ulceribus, internisq̄ uisceribus dona cœlestia. Quod si seruetur inquit hoc, Sirio exoriente, casuq̄ congruat in eundem diem, ut sæpe Veneris, aut Iouis, Mercurij ue exortus, non alia suauitatis ususq̄ uis mortalium malis a morte reuocandis, q̄ diuini nectaris fiat: nisi hoc ut alia fraus hominum perniciē corrumpere.

EX M. VERG. COM M.

Non sunt Plinio, & huic de Oleomelle omnia eadē. Plin. in maritimis, hic in Palmyris Syriæ spōte sua manare, nō leui diuersitate, dicūt. Nō multi tñ faciēdū id est. Illud grauius, q̄ hic arborē ex qua manet, ignorare uidetur: Plinius Oleas eius regionis esse testatur: et hic spōte sua fluere, & opere humano ex summa arboris parte confici docet, Plinius per se tñ duobus locis manare ait. Nō uidetur hic ipse etiā sibi cōuenire. Primo enim ex quodā trunco fluere, tanquā cuius arboris hic trūcus esset ignoraret, mox humano opere cōfici etiā dixit, ἡ τῶν θαλάσῃ, quā si olearū furculos indicaret, id em̄ præter cōmunē in plātis nouorū germinū significationē, priuatim ea uox Atheniēsis quondā significauit: auditaq̄ τῶν θαλάσῃ uoce, Olegramulos adhuc plerūq̄ intelligimus, & si eius uocis maior sit ambitus, significetq̄, ut diximus, nouas aliarum etiā plātārū germinationes. Nō facile ideo est, præsertim in re tēporibus nostris ignota, unde asserat, qd̄q̄ Oleomel hoc sit indicare. Eā ob causā, nō dissimulatis, uerū præteritis quæ a Plinio dicuntur, Dioscoridē latinū fecimus. Et ut primis respōderēt ultima, nō magis Oleq̄, q̄ alterius arboris furculos, et germina indicare uoluimus. Verum quęcūq̄ ea arbor sit in Syria, ex eius etiā furculis Oleū cōfici diximus, eodēq̄ in loco naturā rei magis, q̄ quod legebatur secuti, qd̄ erat ἡ πικρὴ, quę uox gręcis unguē oē indicat, ἡ πικρὴ, una tñ mutata litera, qd̄ corticē significat, mutauimus: neq̄, ut credimus ab re. qñ ubi ex trūco arboris humor per se fluit, expressus eiusdem corticibus fluere etiā poterit. Persuasitq̄ id præcipue, q̄ cōficere uerbū, eā hominis operā indicat, quę qd̄ nondū est efficiat. Vnguē autē p se propius ad olei naturā & habitū accedit. Nec rōne caret, ut qd̄ in ima arboris pte p se fluit, in sumo lateat, nec nisi ui, et humāo ope extra hi et colligi possit: p̄serti ex corticib. q̄ copiosiore q̄ interiores partes in pluribus humore abun-
Veruntamen quasi Veter- (dant. Nō tamē hoc adeo decernimus, ut illud damnemus, nosi torpent. Est in ea re sciendum, in cæteris scriptoribus, et in communi eius uocis æstimatione, ὑσφρόν καὶ ὑσφρότα, tardum, pigrum, hebesque Gręcis significare, dicicq̄ ad iter ὑσφρό-

A

ἡλικιανή

Plin. libro. 13.
capite. 4.

B

D I O S C O R I D I S

C ad agendum, intelligendum, uigiliam, motumq; omnem alium, somno, pigritia, & languore marcentem. In medicina autem, ad capitis malum, grauemq; & profundiorē somnum contracta est eius uocis significatio. Estq; *ὑωρόπνο* quātum inexpugnabilis somni genus: quod ex humida materia fit. Nunc satis signasse sit, quos nam hic *ὑωρόπνο* dicat, & nos ueteri torpore diximus.

De Manna.

Melligo.

Non probamus quod aliqui suspicari se dixerunt, esse Oleomel hoc quod antiquiores græci *αερομέλι*, idest, aerium mel uocauerunt: id scilicet quod ab Hebræorum sacris literis acceptū ueteres Man, nunc uero passim medici Maña appellāt, qđ ex huius scriptoris historia nō facile conijcitur. Siquidem ab oleo statim de eo agitur, & quasi cōgener oleo subijcitur: in censu mellis alioqui constitutum, si mellis magis q̄ olei naturam referret. Nec dixisset hic, ex trunco arboris manare, &c. cum aerium illud mel non ex trunco manet, sed in arborum folijs inueniatur. Sunt præterea in medicina, quę aerei mellis euentibus parum conueniant. Nec nobis pro cōperto est, quod antiquioribus quibusdam aerium mel fuit, quod nostra grās Manna appellat, sed Melliginem (sic enim nūc uoco) sub Lucanis temporibus, in arborū folijs concretum, rosidum sapore mellis humorem, quem deinde legentes apes, mel in aluearibus suis coactuant. Nec tamen negamus, quod nunc Manna uocant, ex eadem, uel simili substantia esse, uerum nihil, ut nobis uidetur, ad Oleomel hoc. Aerium omne id mel facit, quod incensū, et nomē mellis sola saporis dulcedine adscritum est, cum tū præcipua olei uis in eo intelligatur.

αἰκινὸν ἔλκιστον

De Cicino Oleo.

C A P. XXXVIII.

Cicinū oleum hoc modo tēperatur. Maturi Ricini qua uoles quātitate torrido sole flaccescunt, & instrati tantū sper insolantur, dū uestiens cortex fractus decidat. Caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur. Postea in lebetem stanno illitum, qui aquam habeat demittitur, subiectoq; igni feruescunt. Et ubi insitū prorsus humorem reddiderunt, sublato ab igni uase, innatans oleum concha tollitur, & recōditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit usus, longe secus fieri solet. Nam repurgatos Ricinos molæ mandāt, & accurate molitos per sportulam organo exprimunt. Tū quidem ematuruerunt Ricini, cum continētibus orbiculis exuuntur. Ad psoras, & ulcera capitis manātia ualet. Prodest inflammationibus, uuluis conuersis atq; præclusis. Item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus. Emplastra efficaciora reddit additum. Potu aquam aluo extrahit. Ventris animalia pellit.

Plinius lib. 15.
cap. 7. li. 23. ca
pit. 4.

B A R B A R I C O R O L L.
Oleum Cicinū, e Cici arbore fit, in Aegypto copiosa: ubi sine igni & aqua sale aspersum exprimitur, cibus foedū, luminibus lucernarū ppter nimiam pinguitudinem, ineptū & obscurū.

E X M. V E R G. C O M M.
Cici quondam fruticem aliqui dixerunt, quem plures græci Crotona, & Romani Ricinū, a figura seminis appellauerunt. Rura autem nostra, & omnis fere Thuscia nunc Romanū Phaselum uocat. Illi a notissimi insecti, nos a leguminis similitudine, eandem rem indicantes. Frutex hic tantum non arborefcit, feriturq; in hortis nostra ætate, ad spectaculum magis, q̄ utilitatem, altitudine, ut hic in historia eius humilis Fici, Platanī folio, & si Plinius uirigineo, nullo discrimine tamen indicat, quando Platanus uirigineo folio a cunctis describitur. Ricinū Plinius sua ætate uocari dixit, a foedissimi insecti similitudine, quod græci *κρότων* appellant. Sunt q̄ latinis Ricini, & græcis *κρότων* insecta, quæ animalibus alijs, canibusq; præsertim inherent. sine motu, cum semel inhaerint, quibus cibi nullus exitus est, colore liuido, nullis discretis mēbris, in globum continue crescentia, donec plenius saginata, post aliquot dies, sponte sua decedant. Ideoq; nos, autore Plinio, fruticem, eiusq; semen, & ex eo confectum oleum, Ricini appellatione indicauimus. Et nisi Plinium libro. 15. sine igne & aqua in Aegypto exprimi Ricinū oleum, suspicaremur, nec sine ratione, non esse hoc loco integrum Dioscoridē, qui in prima illa huius olei confectiōe, auxilio aquæ ideo uteretur, quod ob Ricinorum ariditatem aliter

aliter exprimi nequiret, mox autem in Aegypto confici, sine humore aliquo testaretur. Oportet itaque duobus, hisdemque grauissimis authoribus, in eadem re idem testantibus, constituere uuidiores in Aegypto Ricinos quam Italia nasci, eaque unguinis sui copia, nullo etiam adperso humore exprimi posse.

De Amygdalino oleo. CAP. XXXIX

Amygdalinum oleum, quod aliqui Metopium uocant, hoc fit modo. Semodius ex amaris nucibus repurgatis, siccatisque, in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas. aquae quae ferbuerit sextarius adijcitur. & ubi dimidia hora humorem hauserit, uehementius quam antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digitis haesit, concha excipitur. Pressis nucibus rursus hemina aquae inspergitur, & postquam ebiberint. idem opus prosequendum. Singulas heminas reddunt singuli modij. Contra uuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundem locorum inflammationes efficax est. Vitijs renum, calculosis, difficili urinæ, suspiriosis, lienosisque proficit. Dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, tinitusque discutit. Maculas tollit in facie, er cutem erugat cum melle, radice Lilij, & cypria Cæra, aut rosaceo Cærato. Et oculorum hebetudines emendat. Vlcera capitis manantia & furfures cum uino abstergit.

BARBARI COROLL.

Oleum ex Amygdalis, Neopum uocari legitur in Plinio. Puto corruptam esse lectionem, & aut Netopum, ut Hippocrates, aut Metopium, ut Dioscorides legendum. Adde, quod unguentum Aegypto familiare quod Metopium appellatur: ipsum quoque de nucibus amaris conditur, ut post liquebit. Paulus Amygdalinum inquit. Metopium quoque dicitur, propter Galbanum, quod Metopum in Aegypto nominatur, & in oleum hoc adijcitur. Aetius oleum hoc etiam Halion uocari tradit, ab amaritudine, ut opinor.

EX M. VERG. COMM.

Metopium quidam dicunt. Siue a Galbano, quod Aegyptij Metopion uocant, & huic oleo miscebatur: siue ab Aegyptiorum proprio unguento, quod amaris Amygdalis conficiebatur.

Feruentes aquae heminis duabus. Variant hic antiquiores graeci in mensura. In aliquibus enim, ut nos reddidimus, heminae, in aliquibus, cyathi, leguntur. Fecitque hoc, ut credimus, notum in utraque hac mensura similitudo. In eo nihil nos decernimus, monemus tamen. quoniam facilis & lubricus in ponderibus lapsus fuerit, coniectura, sensusque etiam uti oportere. Nobis inclinatus auius, modij quadra tibus, cyathi magis, quam heminae mensura congruere, etsi contra redditus a nobis locus fuerit.

Cypriaque Ceræ. Non Cypriam a regione uoluit dicere, sed Ceroma, siue Ceratum, quod Ligustrino unguento maceratum & subactum esset.

De Balanino oleo. CAP. XL.

Simili modo fit Balaninum oleum: quod repurgat maculas, lentigines, uaros, et cicatrices nigras. Aluum soluit. Stomacho aduersatur. Contra aurium dolorem, sonos, & tinitus auxilio est cum anserino adipe instillatum. Similis Sesamini ratio. Fit etiam e nucis Iuglande oleum, quod Caryinum uocant. Eandem uim habet quam Balaninum.

BARBARI COROLL.

Balaninum oleum e glade fit Aegyptia: quae Myrobalanus quoque dicitur. Simplex huius compositio diu fuit, deinde Refina quoque mixta.

Oleum Sesaminum Indis refertur acceptum, qui e Castaneis quoque atque Oryza conficiant. Oleum e iuglandibus iners, & graue corpori est, sapore ingrato. Etenim si quid in nucleo conputruit, totus modus deperit. Nunc tota fere, Liguria Insubriaque promiscuum & cibus & luminis, haud magnopere molestum.

A

ἀμυγδαλινόν
ἐλαιον
μυτώπιον

Pli. lib. 29. capitulum 4.

B

καλάμινον ἐλαιον

Pli. li. 39. ca. 4.

D I O S C O R I D I S

E X M A R. V E R G. C O M M.

C P Aandectarum Rhapsodus interpretatur, Balaninū, idest, de Ben: cui id studiū fuisse uide-
ri potest, nō q̄ utile consueret Rhapsodium, sed quam locuples, & ingens.

Videtur & repugnare his quæ dicuntur hic ab Dioscoride. Quæ Theophrasto dicuntur lib.
4. capite. 2. Glans a fructu nomen accepit. Folium ei simile Myrto, oblongius ramen. Illæsa ma-
gnæq; arbor est, uerum non recta, sed contorta. Fructus putamine contuso. Vnguentarij uti so-
lent, est enim boni odoris, sed fructus ipse inutilis. Aut igitur in re nunc notissima dicendū est,
conficiendi modum tantum demonstrasse Dioscoridem, aut aliā unguenti ab oleo confectio-
nem fuisse, & in altero corticis, in altero fructus usum fuisse.

De Hyosciamino oleo. C A P. XLI.

Ἑλκινον ὑοσκυμνῶν

H Yosciaminum sic fit. Semen candidum, recens ac siccum tundi-
tr. & calida aspergitur aqua, ut in Amygdalino diximus. dum-
q; insolatur, siccata partes madidis permisceantur: hoc autem fieri opor-
tet, dū nigrescat & grauiter oleat. Mox pressum atq; excolatum recondi-
tur. Ad auriū dolores efficax est. Pessis miscetur. Ad emolliendum utile.

De Hyoscia-
mo herba Pl.
lib. 25. cap. 9.

H Yosciaminum oleū ex seminibus Apollinaris herbae conficitur, quam Hyosciamon græ-
ci uocant. Cauendum in potu, quoniam cerebri motus faciat.

E X M. V E R G. C O M M.

D E eo oleo illud tacuisse inhumanum & iniustum fuerit, quod potum, cerebri motus fa-
cit, & inter lætalia semen eius in cibo sumptum numeratur.

De Oleo e grano Cnidio. C A P. XLII.

F it & grano Cnidio purgato & tuso. Vis ei aluum soluere potu.

BARBARI COROLL.

C Nidium oleum ex Gnidio grano, idest Gnidio Cocco fingitur.

E X M. V E R G. C O M M.

D C Hamælez, quam Cneoron Theophrastus uocat, granum, Cnidium, semen est. In histo-
ria plantæ lib. 4. plenius de eo agitur.

De Cnicino. C A P. XLIII.

Ἑλκινον κνικίνου

N On secus Cnicinum oleum temperatur. Cui facultas eadem est
quæ facta e Cnidio grano, uerum inualidior.

BARBARI COROLL.

Plinius lib. 25.
capite. 15.

O Leum Cnicium, ex Cnico herba, quam celebrant Aegyptij, oleo tantum, non cibo gra-
tam. Italiae ignota Plinij temporibus.

E X M. V E R G. C O M M.

C arthamum nostræ ætatis medici, Græcorum Cnicon uocant. Rura autem nostra, Cro-
cum Saracenum. De eo plenius libro quarto.

De Raphanino. C A P. XLIII.

Ἑλκινον ραφανίνου

R haphaninum e Raphani semine fieri solet cæterorum more.
Phthiriasis mala ualitudine contractas tollit. Scabricias cutis in
facie emendat. Ad opsonia utuntur Aegyptij.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 23. ca. 4.

R aphaninum oleum, ex radice latinis appellata, Aegyptij Raphanum maxime cupiebāt
serere, modo licuisset: quia & quæstus maior q̄ e frumento redibat, & minus tributi pende-
bat, nullumq; copiosius erat oleum.

V E R G.

C ontra oēs pediculos Raphanino oleo utitur Paulus. Plinius q̄q; addit, Scorpionibus ac
Cerastris aduersari, posseq; impune tractari, si quis uel semine, uel oleo perunctus sit.

DE MELANTHINO. C A P. XLV.

Ἑλκινον μελάνθινου

M elanthinum idem quod Raphaninum potest.

BARBARICOROLL.

Melanthinum oleum, nomē habet a Melanthio, quod est Git, quasi Nigellā uerbum e uerbo dicas. Nam Melanthemon, Anthemis est, quam modo Chamæmilon uocari frequentius animaduerto, quā Plinius utrāq; Melanthiō appellat, nisi lectio deprauata ē, qd' & crediderim.

EX M. VERG. COMM.

Nigella qualis sit, et quo colore et ordine, in purpureis uasculis conspiciatur eius semen, certius in historia ostendetur.

De Sinapino CAP. XLVI.

Tritum Sinapis semen, & calida aqua madefactū, adiecto postea oleo exprimitur. Id ad diuturnos dolores efficax est. Trāsfert humores qui in aliqua parte concreuerunt,

A D D I T I O.

De Sinapi natura & medicinis Plinius libro. 20. cap. uicesimosecūdo, & 19. capite octauo.

EX M. VERG. COMM.

Variant antiquiores græci hoc capite. Alij enim calida, alij frigida aqua Sinapim aspergunt. Nos ad molliendam, soluendamq; feminum duriciem, aptiorem calorem existimamus. Plinius in eadem confectione, etiam Dioscoridi idem nō est, & aliter conficit. In medicina etiā pluribus morbis quam hic, mederi dicit, locus est lib. 20. cap. 22.

De Myrteo. CAP. XLVII.

Myrtei faciendi ratio hæc est. E Myrto nigra, siluestri, aut satiuā, foliorum mollissima quæq; tusa premuntur. Succo pares Omphacini olei portiones adiunguntur. subiectisq; carbonibus inferuescunt, donec concoquantur. Innatans oleum deraditur. Sed longe facilius hæc compositio. Tēnera folia contusa coquuntur in oleo & aqua, & quod innatat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleum folia in sole macerant. Alij prius oleum inspissant Malicorio, Cupresso, Cypiro & lunco odorato. Efficacius est amarū gustu & oleosum, uiride, translucens, & olens Myrtum. Astringit, & indurat. Ideo medicamentis miscetur quæ cicatricem obducunt. Prodest ulceribus in capite manantibus, ambustis igni, & papularum eruptionibus. Facit ad attrita & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis sudores, & ad omnia quæ astrictionem inspissationemq; desyderant.

BARBARICOROLL.

Myrteum oleum, & hoc e latifolia nigra, siluestriq;. Prestantius, quam Oxymyrsinem, alij Chamemyrsinam uocant. Aliqui Acoron, a similitudine. Est enim breuis, & fruticosa, minore semine. ut docebimus. Fieri et aliter oleum Myrteum solet. Tunduntur Baccæ aspersæ calida aqua, dein coquuntur. Myrtas Cato baccas huius arboris appellat. Interest, uinū, an oleū facias. Ad uinū Baccæ in ariditate siccant, ad oleū nō siccant. Inest huic oleo uini qdā sapor, simulq; pinguis liquor, præcipua uī ad corrigenda uina saccis ante perfusis. Retinet quippe fecē, nec præter purum liquore transire patitur: datq; se liquatis cōmendatione mira quasi comitē.

De Laurino. CAP. XLVIII.

Laurinum fit hoc modo. Maturæ Lauri baccæ in aqua coquuntur. Liquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinem reddunt: quæ manibus expressa, cōcha excipitur. Alij Omphacinum prius oleum Cypiro, lunco odorato, & Calamo inspissant. deinde mollia Lauri folia concoquunt. Alij etiā Baccas, donec oleū odore cōtraxerit. Alij Styracē,

d ij

A
Pli. lib. 20. ca. 17. & 22. ca. 21.

ἐλαιον σινάπινον

μυρτίον ἐλαιον

B

Pli. li. 23. ca. 4.
& alias de
Myrte lib. 15.
cap. 29. & 23.
cap. 9.

λάφρινον ἐλαιον

Cet Myrtū addūt. Optima Laurus ad id latifolia, et mōtana. Oleum Lauri nū utilius q̄ recētius, q̄q̄ uiridius colore, amarissimū, et acre. Vis ei exca-
factoria, emolliens. Venarū spiracula laxat. Lassitudines discutit. Oibus
neruorū uitijis, horrorib. de stillatiōib. auriū doloribus, malis renū fri-
gore contractis, illitū non aliud iuuantius. Attñ potum, nauseam parit.

Plin. lib. 13. ca-
pite. 4. de ipsa
arbore lib. 15.
capite. 39.

B A R B A R I C O R O L L.
Oleum Laurinum e Druppis inquit instituitur. Nam Druppa nō olearum modo, sed ali-
as quoq̄ Baccas uocamus, grēcos imitant, *ἀρνέτιος* appellantes. Quidam folium & corticem
Baccarum adhibent. Laudatur siluestris & nigra baccis. Ex Delphica uero ad acopum & ce-
rata utilissimum.

E X M. V E R G. C O M M.
Aliam huius Olei confectionem tradit Palladius lib. 2. Nempe talem. Lauri Baccas quā-
plurimas & maturitate turgētes, in aqua calida bullire facies, & ubi diu ferbuerint, olei qd̄ ex
se dimiserint, super natantis undam pennis leuiter cogentibus, in uasa transfundes. Sunt aut-
em Druppe in Olea & Lauro.

Parum deinde sequax sermo est in grācis, ubi nos diximus, quam manibus in conchulam
exprimentes colligunt. Quod enim est illic participium *διακρίαντες*, nullum habet sensum: i-
deoq̄ nos rem magis quam uocem secuti, sic reddidimus. Volumus tamen id tam diu legenti-
bus placere, quousq̄ ex minus corrupto codice, certior confectionis huius ratio cognoscatur.
Suspiciamus & illic uitium esse ubi legitur, Miscent aliqui Styracem, & Myrthum. Credimusq̄
pro Myrtho frutice, Myrrham legi oportere. Styraci enim Myrrha aptius copulatur, quam
Myrthus, & in spissando oleo maiorem uim, & frequentiore usum habet. Facilis ab altera in
alteram uocem in grācis lapsus fuit. Et antiquus latinus Dioscorides, Myrtham adhuc habet,
potestq̄ una tm̄ mutata litera, in hunc sensum trahi. Cuiq̄ tm̄ suum iudicium sit, & arbitrium.

D**De Lentiscino.** **C A P. XLIX.**
Similis Lentiscini ratio. Nam e maturo fructu temperatur, factis pri-
us spissamentis, ut in Laurino diximus. Hoc scabiem iumentorū, ca-
numq̄ sanat. Vulissimum pessis, acopis, et leprarū medicamētis. Sudo-
res cohibet. Nec secus Terebinthinū fieri solet, qd̄ refrigerat et astringit.

χίτων χίτων
Pli. li. 15. ca. 7.
lib. 24. ca. 7. li.
15. cap. 26.

B A R B A R I C O R O L L.
Lentiscinum oleum, e Lentisco fit. Grēci schinon uocant. Nam schoenos Iuncus est: de qua
uicinitate nominum sēpiuscule decipimur. Durius hoc paulo q̄ Rosaceum. ceterū eiusdem
effectus. Nec mihi plane certum est, an hic Iuncinum potius, q̄ Lentiscinum interpretari debe-
am. Quandoquidem & Iuncinum Rosaceo simillimū esse predicant. Duobus quoq̄ locis Pli-
nius hac similitudine Rosacei, altero Lentiscinum describit, altero Iuncinum: alioquin falsum,
aut lapsum affinitate, autorem illum diligentissimum, qui putem̄ p̄sertim cum fieri possit, ut
Rosaceo fit utrunq̄: natuta proximum. Nam & Therminum, quod ex Lupinis cōstat, proprie-
tatem Rosaceo sororiam habere Plinius idem testatus est.

E X M. V E R G. C O M M.
Libet hoc loco addere, Lentiscini olei diuersam ex Palladio confectionem lib. 2. his uerbis
ab eo traditam. Grana matura Lentisci, quam plurima colliges, & una die ac nocte supra se a-
ceruata esse patieris. Deinde sportam granis iisdem plenam, cuiq̄ uasculo superpones: tunc ex
eo humore qui defluxerit, supernatans oleum Lentiscinum, sicut Laurinum colligetur. Me-
mento autem, ne frigore possit adstringi, aquam calidam saepe suffundere.

μαστόχινον ἔλαιον

M**De Mastichino oleo.** **C A P. L.**
Astichinum e trita fit Mastiche, quod contra omnia uulū ma-
la efficax est. Mediocriter calfacit, astringit, & emollit. Aduer-
sus prominentes stomahi duricias, coeliacorum, dysentericorumque cru-
ciatus, utile. Faciem emaculat, & colorem nitidum facit. Optimū in Chio

insula componitur.

MASTYCHINUM oleum e Mastychē, cuius species multæ suo loco numerabuntur. Resinam Lentiscinam Dioscorides appellat.

MISCETUR idem ceratis, quæ stomacho, celiciacis, & intestinorum torminibus imponuntur. Græce πῶς τὰ περὶ τὸν στήμαχος ἐπισηπτόμενα συνήματα. &c. Qui dicendi modus, nec rei, nec seriori huic legitimus, aut honestus est, non enim stomacho superponuntur duricies. Cum autem decerneret ille stomachi, alui, intestinorum, & iecoris inflammationibus accommodatam esse Mastychen, facile opinati sumus, ex rei & sermonis ductu, quod erat συνήματα, quæ uox omnium generum duricies, in humano corpore significat, κηρώματα. id est, Cerata, siue Ceromata legendum esse: decreuissēq; hunc scriptorem subactam Mastychino oleo, ceram partibus illis imponi, contra earum partium mala, ad quæ ex uiribus suis Mastychē faceret. Indicat Paulus Aegineta his uerbis. Mastychē præsertim ex Chio insula, in secundo calefacit, & siccatur: mixtas habet uires, adstringit enim simul & mollit: ideoq; stomachi, alui, & intestinorum & iecoris inflammationibus accommodata est. Aegyptia quadam tenuis nigro colore, siccatur magis et discutit, minus autem adstringit, discutiendis strumis ideo accommodata. Quæ longius cōmentarijs his nostris adieciimus, ut ratio mutæ uocis a nobis intelligatur: obiterq; illud testemur, confirmari ab eo, quod in hoc scriptore suspectum forte uideretur, cum ait, Mastychē adstringere simul & mollire: quod aduerbium non temere. sed ex melioribus græcis additum illic a nobis, in quibus legebatur σύρον ὁμοίως καὶ μαλακτον.

DE RATIONE VNGUENTORUM consequenter tractandum existimauimus. quandoquidem ea in nonnullis corporum uitijs, aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum profunt. In quorum probationibus consulere nares oportet, an ea oleant, ex quibus temperantur. Optimum huiuscemodi iudicium, quod in quibusdam plane obseruari non potest, propter ea quæ admiscuntur, odore cæteris præualentia. ut in Amaracino, & Crocino, Telino, & plerisque alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conueniet.

VNGUENTA græci myra uocant, a Myrtha, siue quasi mora, ut Chrysippus inquit, q̄ infatua ti uino & crapula fere uti soleant unguentis. Etenim cum bellarijs & corollis Vnguenta secundis mensis inferebantur, quod & Socrates apud Xenophontem, ut meretricium accusat, ut uestem ita odorem, alium pudicas, alium impudicas decere prædicās. Lacedæmonij certe unguentarios eiciebant urbe, quasi corruptentes Oleum, quemadmodum & infectores: ut qui candorem uellerum accersitis medicamentis inquinare uiderentur. Prohibuit & Solon, ne quis unguenta uenderet. Proinde Sophocles et Callimachus Veneri speculum & unguenta tribuunt, oleum Mineræ, q̄ illa uoluptati, hoc uirtuti natum esset. Primus omnium Archilochus usurpauit unguenti nomen, hoc est, Myron: & si res Homero quocq; nota fuerit, oleum, non myron appellant. Vnguenta sane, quæ non de floribus, sed de aromatibus conficiebantur, Thyomata uocabant: quod & Homerus nouit: cum Thethyomenon, hoc est, delibutum eo genere Iunoni corpus fuisse cecinit. Dicuntur & Myromata, non myrisomata. Hippocrates odoramenta, hoc est, aromata & suffitus appellauit. Nomen & a patria unguentis est quibusdam: ut Panathenæicon, Athenis factitari solitum, & Babylone Babylonicū. Quæq; Appollonius auctoritatem & præstantiam unguentorum non locis, aut regionibus, sed peritiæ artificum, & industria acceptam retulit. Nam Ephesina quondam in precio habebantur: nunc exoleuere. Habebantur & Alexandrina, propter duas Reginas, opibus & luxu diffluentes, Berenicem, & Arsinoem. In Cortyna quoq; diu laudatum est Rosaceum, Berenices maioris temporibus, Cœnæthinum Adramyti modice cōmendabatur: postea ob Stratonicem, primum Eumenis nomen obtinuit. Syriacis, præsertimq; Telino summa fuit olim autoritas, sicut & Asiaticis e Pergamo. Vnguentarij occasione Libanotion e Thure cōmendantis: quod antea nusq; fuisset. Vnguentarij

A

De Mastiche
Pli. lib. 12. ca-
pite. 17.

B

*

D

d in

Cum porro preciosum innatat in fusum uili, contra mel probum, uitioso melli additum fidei. Nec omnia sane unguenta onanibus placebant. Quin sua singulis fere partibus corporis erant dicata, ut in Baccari monstrauimus. Infames huius luxuriæ Lydi sunt, a quo Sardianum mundum, Poetæ pro unguentis capiunt. In mentione sunt & Brethyon ex Lydio, pro crasso & pro Anthino quoque acceptum. Et Sagda, siue Plagdan: etiam si Nicander in uerbo Sagdanon unguentum, sed homines effocinatos & profligatos moribus intelligit: alij uero suffimenti genus. Helæi celebrant, ab inuatore dictum Plagoninon. Athenis unguenti hemina quinque: prodo argenti uenibat. Aliqui decem produnt. Vnguentum frequens, ut inquit Aristoteles, caniciem oblinentibus siccitatis uitio conciliat. Icelius, qui de odoribus scripsit, unguentorum duo facit discrimina. Deliciarum, quod & Chrima, siue Chrisma dicitur. Et uulgare ac promiscuum, & fere palestris dicatum, quod Alima cognominatur, et Aloemon, & Epalelima. De quo uerbo Festus quoque apud nos: unde Aliptes, & Exalptes, quos nostri unctores, & reuictores uocant. A grecis frequentius Coniatæ christæ, ac Paedotribæ nominatur: ut quod a limo dictum Epalima, ob uilitatem scripserunt, errauerint, etiam si mediastini, non medicorum ipsi medici reungerent. Habentur & quæ sicca unguenta, hoc est, Ceromata dicuntur: ut liquida, quæ Hygromyra, foeminarum auribus expetita. Sunt & Moschata, quæ alij Moschiomyra, Paulus Moschelea uocauit. In quæ sicut in Arabica quoque unguenta, genus illud quod Arnabone Paulus & Aetius appellant, queritur. Sed quid sit Arnabo, nondum comperimus. De Moscho, siue Musco diximus alibi. In multa odora menta uenit & Camphora: quam Aetius Caphura nominauit: in eo unguento quod Salca dicitur, axillis & auribus foeminarum dicato. Nam & suffimentum Moscharum in eodem Aetio legas: in quod & sandala, & Nuces Indicæ defyderantur, comitante orientali succino. Est autem Nux Indica, fructus ut Mauri putant, Palmæ cuiusdam Indicæ premagnus atque pinguis, cuius oleum butyro quoque preferunt, bonitate succi. Sandalorum uero tria genera, candidum, rubrum, luteum. Camphoræ quaternaria: arboris ea gummi est. In quibusdam locis medulla non aliter prouentu magno, quam si terremotus & tonitrua multa fuerint. Initio maculis rubentibus, post uel calore solis tosta, uel ignium candescit. Inuenio & Alua, et Sarua, & Scylmatis folia, siue Scymatis odores suffumigandis domibus idoneos. Primum in eorum rhyniamate quod Cyriæ Romuli ascribitur. Sequens in eo, quod ad Embolarchum refertur autorem. Tertium in eo, quod Myrepicon uocatur. Scylma certe hoc etiam ad Calliblepharon probatur Aetio. Nominatur inter suffitus & Masucha, siue Masuaphion a Paulo. Sed ea compositio est, non facultas simplex aliqua. Vnguenta sane quæ cerâ, uel resinam, uel aliquid huiusmodi recipiunt, non Myra simpliciter, sed Myracopa dicuntur: quoniam similia sint acopis. Talia sunt Amaracinum, & Decamyron, a decem rebus unde constat appellatum: sicut a quinque Pentamyron.

D

De Rosaceo.

C A P.

LII.

ῥοσάκειον ἔλαιον

Rosaceum oleum sic fit. Lunci odorati quinque libras et bessum tundito, & subactas aqua in duabus olei libris & quincuncem subinde mouendo coquito. Dumque percolaueris, in olei libras uiginti & quincuncem adijcito Rosas non madefactas numero mille, & manibus melle perunctis identidem moueto, sensim premens. Sin ito nocte tota macerari, postea exprimito: & ubi recrementum pessum ierit, mutato uase, in craterem melle illitum recondito. Caterum Rosas quæ antea pressæ fuerint, in labellum demittito, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, iterum premito: eritque secundarium oleum. Quod si tertias usque, quartasue perfusiones infundens exprimere uoles, secundarium fiet, tertiarium, & quartarium unguentum. Sed quoties id feceris, uasa melle oblini debent. Si uero secundam adiectionem instituere liber, in expressum oleum, numero pari recentes Rosas nullo humore imbutas inijecto, manibus melle premadefactis, agitans premito: & iterum, tertio aut quarto, simili modo exprimens facito, totiesque recetis Rosas detractis unguibus immittito. si

et enim

etenim ita oleū multo ualidius. Nā septies oleū Rosarū infusionē admittit, nec amplius. Prælu melle perungatur. Oleū a succo diligenter secerni oportet. nā si minimū quid relinquat, unguentū corrūpet. Alij autem de tractis unguibus, Rosas tantū oleo macerāt in sole hoc modo. Rosæ quæ selibram pōdere æquant, in sextario olei diebus octo madescūt, & usque tertiā perfusionē quadraginta diebus insolanē, & sic oleū recōditur. Alij Calamo, aut Aspalatho prius olei spissamēta faciunt. Alij coloris caussa Anchusam admiscunt, & salem, quo minus oleat. Vim astringendi & refrigerandi obtinet. Fomētis & cataplasmatibus utile. Potum soluit aluū, Stomachi odorem restinguit. Vlcera caua replet, & mulcet, quæ Cacōes the uocantur. Vlcerebus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur. Caput dolens eo perfunditur. Dētes inter initia doloris colui prodest. Ad genarum duricias illitum efficax est. Ad lacecita interanea & cōcitatas uulvas utilissime subijcitur.

V B A R B A R I C O R O L L.
Nguentum Rosaceū, id est, Rhodinon Phaseli, maxime diu placuit. Commendabatur & Neapolitanū, & quod in Sepalsia Caputæ diuendebatur: ut inquit Apollonius. A quibusdam addi salem, & anchusam, & rosaceum, & Dioscorides & Plinius auctores sunt. Disiunctim hoc fortasse capiendum est, cum ea sit unguenti faciendi regula, quibus anchusa adiecta est, sal uti ne addatur. Simplicissima eius mixtura diu fuit, additis Omphacio, flore Rosæ, Crocino, Cinabari, Calamo, melle, Iunco, salis flore, aut anchusa, uino. Huic cādīdus colos erat. Qui macerant in sole Rosas oleo conditas, uitreis uti præcipiuntur. Vnguētū Cyrenis, e Rosa preciosissimum Theophrastus prædicat: quoniam Rosa ibi odoratissima sit. Inuentum est, & Rhodomeli facere, hoc est mel, Rosaceum: & aquam Hydrosolatā appellatam recentioribus græcorū.

Q U O D F A C I M I N I P S I S F O R I B U S U T I U M S E N O B I S O B T U L I T, huiusmodi est. Iubet hic in Rosacei confectio ad olei spissamentum sumenda esse, rotundi odorati lunci pōdo quinque, & uncias octo: statimque subijcitur, sumenda pariter olei pondo duo & quincuncem: nec male, incertoue sensu hætenus, si odoratus ille rotundus luncus spissando huic oleo satis esset: & nisi quod sequitur participium *ἀρσεν*, male rei responderet. Et præter hoc alterum illud participium *ῥοδόσας* nulla ratione oleo competere posset. Qui enim turidi oleum, & macerari aqua potest: quod duo illa participia significant. alterū enim in duris & aridis tantum fit, alterum in his solum dicitur, quorum arescit alterum, liquefcit uero alterum, ut cum dicitur Transquillus, lutum sanguine maceratum, & quotidie auditur aqua macerari farinam. Accedit, quod iniusto pondere, & mala rerum inæqualitate, in spissando humore præcipitur, maiori copia sumi quod spisset, minore autem quod spissatur. Spissatur enim oleum, spissant uero aromata, quæ si copia abundant, non spissare dicuntur, sed oleo dilui. Cogerunt postremo nos, non suspicari iam, sed pro comperto uitium hoc loco habere, quæ plura in antiquioribus aliquor græcis in spissando Rosaceo numerantur. Elenium, quam nos Inulam, angulosum odoratum luncum, & odoratum itidem Calamum. Credimusque, quod oleum statim a rotundo odorato Iunco legitur, non oleum, quod græci *ῥατον*, sed *ῥατον* Inulam, antiquam lesionem fuisse, deesseque alia deinceps, quæ prius aqua macerata, in oleo coquenda essent. tum per colum traiecto oleo, uiginti sic spissati olei pondo, & uncis quinque inqciendas esse Rosas numero mille. &c. Quæ omnia confectura tantum nostra dicuntur, quam alij etiam relinquentes, nihil mutauimus, suspensiones, suspensionumque causas diligentioribus ostendisse contenti.

Et quia toto hoc opere passim pōderum metio est, testari semel id uolumus, si quid maius, minusue, pro rei natura & necessitate dici forte uidebitur, non ideo dammandū esse laborē hūc nostrū. Lubricus enim in antiquis ponderū, & mensurarū notis, ad uitium lapsus est. Multa etiam in antiquis græcis uarietas, & nos cōdictū fidem, nō experientiam sequimur, quā medicis relinquitur, quibus licebit semper, ex aliorū decretis, aut iterū factō rei periculo, in melius conuer-

d. iij

A

Plin. libro. 21.
cap. 4.

B

D I V O S C O R I D I S

C tere, quod ex hoc scriptore parū apposite dictum a nobis fuerit.

ἑλάνιον ἑλάνιον

De ELATINO. CAP. LIII

FRACTA Elate, tusa, & scarificata in labellum deijcitur. Omphacinū oleū triduo infundit, mox p sportulā exprimit. Verū pares esse debent utriusq; portiones. dein mūdo uase ad usū recōditur. Viribus Rosaceo proportionē respondet. Aluum tamen non mollit.

E Latinum e Palma fit Elata: quam nostri Palmam Abietem uocāt. Dicēda per se, in loco. Lachrymam eius in unguentis miseri tradūt, ad oleū domandū, id est, Styimatis uisce: huius & furculos, & lachrymam uocauimus. Abietē certe grāci arborē ipsam Elatem & Spathen nominant: lachrymam fere Spathen. In Theophrasto nomen huic unguento, Phoenix.

EX M. VERG. COMM.

A Columella Elate lib. xij. Cortex Palmæ appellatur.

ἑλάνιον μέλιον

De MELINO. CAP. LIIII.

MELinum oleū hoc modo temperatur. Olei congius, decē aquæ serati uncia, quæ die uno macerata coquuntur. mox in uas oris patuli oleū excolatur, & indita harūdinacea crate, aut uetusta tegete, Cotonea mala superponuntur, & uestimentis operta tantisper inibi residēt, dum malorum uires ad se oleū alliciat. Aliqui Cotonea, decem dierum spacio operimentis inuoluunt: ut cōtineatur odor, nec euanescat. Postea biduo macerata oleo, exprimūtur, oleumq; reconditur. Id uim refrigeratōriam & astringentem habet. Contra scabiosa ulcera & quæ serpunt, ac furfures, perniunculosq; effectum præbet. Exulceratis uuluis infunditur. Citatam urinam sistit inditum. Sudores cohibet. Contra cantharidas, buprestin, pinorum erucas, bibitur. Laudatur maxime quod Cotonea mala olet.

Plin. libro. 23. cap. 6.

MELinum prælatum in Coo, cotoneis malis, & struteis fit. Quidam genus hoc, tum demū in unguentum trāsire perhibent, admixtis cyprino, sesamino, balsamo, casia, abrotano. Quæritur, uti ne in humidis nata fiat, quæ in hoc parentur: Ideo utilissima esse quæ in Sicilia nascantur. Minus probari Strutea, quamuis cognata.

ὀνάνθιον ἑλάνιον

De Oenanthini compositione. CAP. LV.

OENāthe elabrusca, optime olēs postquā emarcuit, deiecta in Omphacinum oleum mouetur, uoluiturq; & cum biduo manserit, exprimitur: oleum reconditur. Astringit, proximum Rosaceo effectum præbēs, sed aluum non resoluit, aut mollit. Probatissimum est quod odore Oenanthem refert.

Pli. lib. 11. ca. 1. & 22. ca. 4.

OENanthinum in Cypro, deinde in AEGypto, præpositum est ex Adramytto. De Oenanthē in loco agetur. Sit hoc unguentum idem cum Anthino, ab Hippocrate uocato, muliebribus malis utile, an diuersum, & Anethinum potius, non liquet. Alioquin uidetur Anthinum dici posse unguentum omne, quod ex floribus componitur lilio, narcisso: rosa, iride. Cuiusmodi maxime in Boeotica Cheronea fingeantur, cōmēdata Pausaniæ. Vinum porro Anthine, siue Anthinon, aliud est q̄ uinum Oenanthinum: ut in uua Oenanthē diximus. Vn-
guentum

guentum Oenanthion, etiam Oenantharion dici posse, testis est Paulus, qui nō eo nominatū putat, q̄ accipiat Oenanthem, cum sæpe fiat sine ea, sed a uino, & floribus Lilij. Vtebantur, inquit, hoc ueteres a balneis, spargebant eo mensas, & nares linebant, & contra pestilentiam ualere iudicabatur: præsertim Possidonianum, cognomento Mesopotamites.

A

De Telini componendi ratione. CAP. LVI.

Foeni græci libræ quinque, Calami libra una, Cypiri libræ duæ, olei libris nouem: septenis diebus macerantur, quotidie ter mouentur, postea premuntur. Aliqui pro Calamo, Cardamomum substituant, & Cypiri loco, Xilobalsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato, Fœnum græcum macerantes exprimunt. Hoc Telinū abscessus emollit, & concoquit. Omnibus uuluarum duricijs magnopere cōuenit. Fœminis difficile parientibus subijcitur, ubi præ excretis humoribus loci siccitatem cōtraxerūt. Sedis inflammationes lenit. Tenesmo subditum prodest. Vlceras capitis manantia, fursuresq; expurgat. Ambustis & pernionibus addita cæra proficit. Vitia cutis in facie emēdat. Pigmentis ad conciliandū faciei nitorem inseritur. Eligi oportet recens, quod nō uehementer Fœnigræci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato. Tale enim optimum iudicatur.

τὴν ἰνὸν ἔλαιον

BARBARI COROLL.

Telinum e Silicula, id est, Fœnogræco nomen rationemq; habet. Addebant huic & mel, & fertam campanicam, & cypirum, & mellum, & maron, & amaracū. In Telo insula etiam Menandri etate celeberrimum. Quid sit Mellum Plinio, quod & in uina fictitia, & in Sufinum addi meminit, hæc ita dum inueni. Forte non Mellum, sed mel in his locis scribendum sit. Nam Amellum, de quo & Virgilius, & Columella, frutices fert apibus gratissimos, aureo ac luteo colore; ab imo foliosos: floribus purpureis, aspero gustu; cuius radices succus egroto examini cum Amineo uino dari præcipitur. Dicitur uero Amellum, q̄ pastores eum curua legant, prope flumina Mellæ: is Galliæ annis est. Quæadmodum a Lemano lacu, Alemanni, ut Seruius existimat. Est & Amilla flos apud græcos autores quosdam, gallico uocabulo: herba ea quæ uocatur Anthenis: siue Chamemilon: ut forte Amilla, uel idem, uel similis sit Amello, nihil asseueramus, sed in medium posuisse nihil officit.

Plin. 13. cap. 11.

EX M. VERG. COMM.

Id q̄ in extrema Capitis huius coronide est in græcis, σμύχον τὰς χεῖρας, id est, manus abstergens, eodē modo in cunctis eius gentis codicibus legitur, nec nisi manus ea uoce intelliguntur. Oborta tamē suspitio nobis est, nō χεῖρας. i. manus, uerū τριχας. i. capillos legi oportere. Suspitionis huius causam nobis fecit, q̄ in Fœnogræci historia, & medicina, quæ secūdo uolumine tractabitur, idē hic scriptor ait, σμύχαι δὲ χεῖ, τριχας καὶ πύτυρα καὶ ἀχώρας, quod est, abstergere Fœnogræco decoctū, capillū, fursures & capitis manantia ulcera, omnia eius partis uitia, ideoq; deinceps numerata, quibus uerisimile est, nō debuisse misceri manus. Ex eadēq; ui credimus, hunc nō manus, sed capillū Fœnogræco ungueto abstergi præcepisse. Nisi quod in ungueto est bene, quod autem in Fœnogræco male legatur, sitq; illic, non hic uitium. Nobis capillum legi magis placet. Non enim uidemus, cur, solam manus cutem abstergere hoc possit, reliqui uero corporis consimilem illi nequeat. Suum tamen cuiq; iudicium sit.

B

De SAMPVSCHINO. CAP. LVII.

Serpilli, Casiæ, Abrotoni, florum Sisymbrij, frondium Myrti, Sampluchi singulæ portiones, quadam pro uiribus singulorum cōiecta tione, una tunduntur. atque is Omphacini olei modus adijcitur, qui madentium uires non euincat. Hæc post quatrīdium exprimuntur, denuo alia, simili mensura & æquali tempore macerata premuntur. ita enim uas

σαμψύχινον ἔλαιον

lidius

C lidius reddi solet. Eligi oportet Sampsuchum colore nigrū, plurimū redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem. Aduersus uuluae præclusiones, conuersionesq; efficax est. Menses & secundos partus extrahit. Vuluae strangulatus recreat. Lumborum, inguinumq; dolores lenit. Sed cum melle uti eo præstat: quādoquidem uehementi astrictione locos indurat. Lassitudines illitum discutit, in opisthonicorum, uulforumq; cataplasmata utilissime additur.

B A R B A R I C O R O L L.
Sampsuchino Calamus accessit. In Cypro, & Mitylenis optimum, ubi plurima Sampsuchus. Differt hoc Dioscoridi ab Amaracino: q; aliæ res in Sampsuchinū, aliæ in Amaracinum quærentur. Dubitationem Pliniana uerba faciunt. E Sampsucho inquit, oleū fit, quod Sampsuchinum uocatur, aut Amaracinum.

VERG.
Pli. 22, cap. 22.
& 11.

Nota omnibus in quotidiano sanitatis usu Amaracus est. Eam cōmuni appellatione græci Sampsuchū neutro genere uocāt: nec certe differunt, nisi diuersarum gēuū nominibus, ut in historia eius in tertio uolumine certius parebit.

Eligito Sampsuchū, qui colore nigro in uiridi sit. In cunctis fere græcis legitur. μελαχρον. Nos meliorū codicū fide secuti, atq; naturam rei & sensum, μελέγχρον, qd̄ nihil significat aliud, q̄ cōiunctos mistosq; simul colores duos, q̄ a nobis, ut legit, in uiridi nigro colore, redditū sunt. Et fortis, Adieciimus eadem fide, & fortis, quoniam menses & secundas trahere dicit.

De Ocimini compositione. CAP. LVIII.

οκίμινον

Ocimum oleum fit ut Cyprinum. Ocimi folia detrahens librarum undecim & bessis pondo, die noctuq; uiginti olei libris macerato, premito, colato. Cumq; exhauseris quallum, rursus parē olei modum fundito, & exprimito. Vocatur autem id secundarium. nam tertiæ perfusionis non est capax. Deinde recens Ocimum æquali pondere, ut in Rosaceo diximus, maceratur: & cum tanto temporis spacio maduerit, exprimitur, & oleum reconditur. Quod si in animo fuerit, ter, aut quater madefacere, semper Ocimum recens addes. Potest ex Omphacino confici, sed illo modo melius. Idē qd̄ Sampsuchinū potest, sed inefficacius.

E X M. V E R G. C O M M.

Quod hic a principio statim dixit, confici Ociminū oleum Ligustrino, similiter ad spissamentū & odorem olei pertinet, id est, præparationem illā, de qua longius non multo ante egimus, breuitatisq; causa ad alterius unguenti rationem olei spissamentū, in hoc Dioscorides reiecit: patetq; id quod nullis in hoc aromatis oleū præparat, quod alioqui cōmune omnibus fere est. Indicatq; id aperte, qd̄ in capitis extremo calce additū est, posse & ex acerbo oleo Ocimum fieri: quali dicat, non posse simplici oleo Ocimum fieri, sed aut spissato Ligustrini modo, aut ex maturis oliuis expresso faciendum esse. Qualis autem Ligustrini spissatio & confectio quondam fuerit, certius non multo post patebit.

αβροτόνινον

De Abrotonini compositione. CAP. LIX.

Olei Cyprini odorib. imbuti libris nouē et quincūce, foliorū Abrotoni libras octo, die noctuq; madefactas, premito. Quod si in longum tempus oleū uelis asseruari, eiectis prioribus folijs, noua appones, & macerata exprimes. Calfacit. Ad uuluae duricias, præclusionesq; efficax est. Menstrua & secundas pellit.

ανήθινον

De Anethini compositione. CAP. LX.

Olei libris octo & dodrante, florū Anethi libras undecim & bessis maceratas, manibus premito, & recondito. Quod si iterum perfundere

perfundere uelis, recentes Anethi flores consimiliter madefacito. Vulua **A**
rum duricias emollit. Venarum spiracula laxat. Contra rigores febrium
circumitu redeuntis auxiliatur. Calfacit enim, & lassitudines discutit.
Prodest articulorum doloribus.

EX M. VERG. COMM.
Acerbum, in aliquibus græcis in unguento hoc quæri oleum, præcipitur. Sed an cōfectio
nis eius antiqua hæc ratio esset, incertum nobis. Id genus olei certe quōdam laudatissimū fuit,
& inter unguenta facile receptū. Paulus Aegineta utitur eo cōtra uigilias ad somnū. Et in ad-
frita cute corporis, iubet eo inungi, præsertimq; ex uiridi Anetho confecto.

De Susini compositione. CAP. LXI.
Susinum, quod alij Lilinum appellant, sic temperatur. Olei librę no
uem cum quincunce, Calami librę quinque & quadrans, Myrrhæ
uncie quinque, permixto odorifero uino decoquuntur. & colato oleo,
Cardamomi tusi & coelesti aqua madefacti librę tres & semis macerantur,
premunturque. Tres librę cum semisse spissati olei assumuntur. Mille Li-
lia decerpitis folijs in latum labellum demittuntur. Iniectum oleum, mani-
bus melle punctis agitur. die noctuque cōquiescunt, & in pixidem ma-
tutinis exprimuntur. Oleum protinus ab aqua, quæ simul expressa fue-
rat, colo incerni oportet. Non enim ut Rosaceum moram tolerat. Nam
concalfactum feruet, & computrescit. Quare sæpius decapulandum. Va-
sa melle illinenda. Tenuis sal inspargendus, & si qua sordes uasis fauci-
bus hæsit, eximenda. Odoramentis iam expressis, ex quasillo in label-
lum transfusis, rursum olei prius odoribus imbuti, quod primum pon-
dus æquet, & Cardamomi tusi drachmæ decem coniunguntur. Hæc ma-
nibus scite pressa, interiecta breui mora exprimuntur. Quod profluit re **B**
purgatur. tertio eadem infunduntur, adiecto Cardamomo & sale, & ma-
nibus melle madefactis. Longe optimum erit quod prius exprimitur.
Proximum quod sequitur. Tertium locum sibi uendicat, quod nouissi-
mum prodijt. Denuo in mille Lilia euulsis folijs, expressum primo ole-
um infunditur. Tum porro prosequendum, eademque facienda ut pri-
us, addito Cardamomo, dein expresso. Et quo frequentius recentia Li-
lia maceraueris, eo ualidius unguentum efficies. Deniq; cum factum ab-
unde uidebitur, singulis compositionibus miscere conuenit Myrrhæ q̃
optimæ duas & septuaginta drachmas, & Croci decem, Cardamomi
quinque & septuaginta. Croci uero & Cinamomi pares portiones tun-
duntur, & cribratę in labellū cū aqua demittuntur. Expressumq; primo un-
guētum infunditur. & paulopost excipiuntur, uasculis siccis Myrrha, aut
gūmi antea perfusis, & Croco, melle & aqua madefactis. Eadē fiunt in al-
tera aut tertia expressione. Aliqui simplex ex Balanino, alioque oleo, et Li-
lijs componunt. Optimū esse cōstat in Phœnice, mox AEgypto factum.
Sed cū primis laudatur qđ Lilia redolet. Excalfacit. Emollit. Vuluæ præ-
clusiones laxat, & collectiones aperit. Vtilissimum ad muliebria mala.

Vlcera

D I O S C O R I D I S

C Ulcera in capite manantia, feruidas eruptiones, uaros, fursuresq; emendat. Vibices, cicatricesq; celerrime ad colorem reducit, ita ut sepe fallant. In summa, extenuat. Potum bilem per aluum extrahit. Vrinam ciet. Sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Plin. lib. 13. ca.
p. 1.

B A R B A R I C O R O L L.

Susinum omnium tenuissimum est. Hoc & Phyllinon, & Lilion, & Lilinum, & Lirinum, & Lirium (ut Galenus inquit) & Syrium quoq; uocabatur; & Cinnomyron. Vnguinofum erat hoc, & e Lilio quoq; sub diuo, sole, luna, pruina maceratū, fiebat. Ipse quoq; succus floris Lirium dicebatur, atq; mel. Lilia purpurea, oleo faciendo, maxime præferuntur, quæ in Syria & Pisidia Pamphiliæ Dioscorides commemorat. Hinc Syrium appellatū crediderim. Nūc omnes fere succi, unde Syrupi uulgo, nam Syrupa Oliuæ condiendæ genus est Columelle. Susinum porro dicitur, a Suso, quod Liliū significat. Vnde Susa Persarū regia, ut inquit Athenæus, ob amœnitatem uocata fertur. Theophrastus Liliū Aegineticum, & e Cilicia cōmendat.

E X M. V E R G. C O M M.

Susinum. Testantur Græcorum Lexica, ex Lilijs factum unguentum, Susinum dici, nullā tamen eius nominis causā & originem docent.

Sunt qui Crininon, Manifestum hoc habet intellectum. Crina enim Lilia uocant.

Excolatq; oleo Cardamomi tusi, &c. Græce, ὡς ἀπὸ καρδίου καὶ ἀπὸ κρίνου. Nos deflexo in certiorē sensum, rerū & uocum ordine reddidimus. Nulla tamē melioris co-
dicis fide adiuti, sed sola usus, necessitatēq; in ea coniectura: quæ quam uera sit, peritorum cen-
suræ æstimandum relinquamus. Nobis, ut aliquam rationē harum reddamus, uisum est, bis
diuersa spissatione iubere Dioscoridem, ad Liliū unguentum præparari oleū. In prima, odo-
rato Calamo, & Myrrha, quæ uino prius macerata, in oleo coquenda sunt. absoluta que co-
ctura, & excolato ab illis oleo. In secunda Cardamomum inijci præcepisse, & cum aliquādiu
in illo oleo maduerit, exprimi, &c.

D Post hæc translatis in labrum ex fiscelli expressis aromatis, &c. Non satis certū habet ex uer-
borum ordine sensum, facilis tamen rei cōiectura est. Iubet enim Dioscorides, iudicio nostro,
ut minore sumptu, maior olei copia spissetur, expressis semel aromatis illis superinfundi rur-
sus oleum, sic iterum, tertium, & quartum faciendū esse. Credimusq; participium quod illuc
est ἀρωματισμὸν, quod aromatis odoratum significat, abundare, aut pro præterito futurum le-
gendum esse ἀρωματισμὸν, scilicet, quod odoratum significabit, unaq; hac uoce tantum muta-
ta, facilis sequaxq; totius rei deinceps intellectus erit: quod signasse satis sit.

Reliquimus præterea ab hoc loco statim, quod instaurari, impleriq; a nobis nō potuit, nec
debut. Priuationis enim nulla est mensura, periculosaq; temeritate, quod sic deest expletur, fa-
cillimumq; omnibus erit ex græcorum codicum lectione uitium deprehendere. Numero enim
plurali inceptū mēbrū, singularis numerus excipit, miscetq; adeo sensum & incerta reddit quæ
sequitur, ut nihil nobis eo loco cōmodius uisum fuerit, quā relicto hiatu aliq, legētes uitium mo-
nuisse, ut aut cognitū nō fallat, aut instaurādo eo felicius posthac laborare aliquis cogitet.

De Narcissini compositione.

C A P. LXII.

αρωματισμὸν

Narcissini olei spissamenta ita fiunt. Sex libræ Aspalathi cum se-
xtante tunduntur. Olei eloti libræ septuaginta cū uncijis quinq;
assumuntur. Aspalathus aqua madefactus, in tertia Olei parte coquitur,
quo exempto, Calamus quinque libris & besse, cum Myrrhæ gleba con-
tunditur: cribratusq; ac uino ueteri odorato immistus decoquitur: simul
ac autem cum ijs efferbuerit, eximitur. Refrigeratum Oleum excolatur,
cuius portio in labellum mittitur, Flores Narcissi q̄ plurimi conijciuntur,
qui bidui spacio, ut in Susino dictum est, per motu exprimuntur. Oleum
subinde decapulandum, siquidem celerrime putredinē sentit. Valet hoc
ad emolliendas uulvæ duricias, præclusionesq; sed capitis dolores facit.

De Crocini

B A R B A R I C O R O L L

NARCISINUM ex Narcissi flore componi, desit Plinij ætate. Id de unguento eius dictum accipio. Nam de oleo Narcissino medicinas idem Plinius persequitur.

E X M. V E R G. C O M M.

E X M. V E R G. C O M M.

Variant Græcorum antiquissimi codices, quo loco hic ait, *καὶ τὰς τρίτας τῆς ὕλης*, Indicant enim alij senuum, qui sit, Alpalathum coequandum esse in tertiam alij parte: quod sine causâ dictum uideatur. Cur enim, 70. pondo olei hic accipi iussisset, si tertias tantum partis futurus erat usus? Alij concinniores ostendunt senuum, qui sit, ad olei tertias fundendam esse aquam, in aqua Alpalathum maceretur. Quâ lectione rei magis congruente nos secuti sumus.

Non habet deinde certum pondus, quod nos diximus, Myrrhæ grumum. Intelligenda tñ in eo, ea quantitas est, quæ exigua potius quam grandis sit. Siquidem græci *χρόδος*, dicunt in sale exigua frusta, & quasi quantum summis cōtractis in unum digitis capere aliquis possit. Tota res in conjectura unguentarij posita erit.

Credimus præterea deesse olei pondus, quo loco ait. Sumito postremo ex oleo, &c. Non enim decernit quantum olei sumi oporteat. Nisi forte & hoc in eiusdē coniectura relictū fuit.

Erant & alia de Narcissi flore dicenda, Sed omnia quarto uolumine in hystoria eius copio-
sius dicuntur.

De Crocini olei compositione. CAP. LXIII.

C De Crocini olei compositione. CAP. LXIII.
Vm Crocinum cōponere uoles, prius olei, ut in Susino diximus, spissamenta facies, eisdem ponderibus & mensuris. cuius olei, li-
bras treis & semissem, Croci unciam unam assumes. identidem in die mo-
ueto. & sexta die quam hoc assiduo peregeris, oleum a Croco colis incer-
nito. Eidem Croco parem olei modū adijcito. Moue triduo. Dein contu-
sæ Myrrhæ atque cribratæ drachmas quadraginta permisceto, & in pila
agitans recōdito. Aliqui parem Cyprini portionem oleo aromātibus ad
Crocinum imbuto adijciunt. Optimum est quod abunde Crocum spi-
rat, in medendi usu expetitur. Proximum, quod Myrrham refert. Cal-
facit. Somnū allicit. Quare persæpe phreniticis subuenit, aut persusum,
aut naribus admotum, aut illitum. Pus mouet. Vlcerā purgat. Contra
uulvæ duricias atq; præclusiones, & ulcera quæ cacœthæ uocantur pro-
dest, cum croco, cæra, medulla, duplicato olei pōdere. Concoquit enim,
emollit, humectat, & permulcet. Ad oculorum glaucitates ex aqua illini-
tur. Huic autem simile est Butyrinum, Onychinum, & Styracinum: quæ
& si nominibus distant, uiribus & compositione cognata sunt.

B A R B A R I C O R O L L.

CROCINUM, in solis Ciliciæ diu laudatum: mox Rhodi. Additū huic & Cinnabari, et Anchusæ, & uinum. Theophrastus & ex Aegina cōmendauit.

E X M. V E R G. C O M M.

EX M. V E R G. C O M M.

Indinar animus nobis, quod in omnibus græcis pariter legitur, eidemq; Croco par olei pondus superinfundito, non sic, sed contra legi oportere: mutatq; inuicem a libtarijs, aut imperitis Medicis, oleum & Crocum fuisse, nullam enim id causam habet, rationemue, cur sic faciendum. Si quis autem multo rerum ordine legat, eidemq; oleo, par Croci pondus superinfundito, cōmunē alijs cōfessionibus causam & rationē ostendet, ut geminata scilicet Croci quantitate, maiores continue & efficiores vires Crocinum acquirat unguentum.

Confidentius non multo post literas mutauimus aliquas, quo loco hic ait, *ἔνισσι δὲ τὸ πυνον κέ-
πρινον*, quod significat, sunt etiam, qui par Quyrinum oleum. &c. Instauratusque nobis certio-
re sensu hic locus est, *ἔνισσι δὲ τὰ πυνον ἔστ' ὅτι κέπρινον*. Quod est, sunt etiam qui ad Ligustrinum unguiferum
aromatiz. &c. Neque enim aliter intelligi res potest. Quemadmodum Paulo ante etiam quod e-
rat, *καὶ κίτριον ἐν ὀλίμῳ χρῆσθαι*, quod est, in pila, seu mortario miscero, non pilam, mortariumue

D I O S C O R I D I S

C diximus, uerum in oleo, quod uerissimile erat, cogitantes, pro ἰλαίω, ὀλίγω factum esse. Qui enim sensus potest esse, & quis rei usus, si quis tusam et excussam cribro myrrham in mortario miscat: Quod enim mortario erat tusum, iam et cribro excussum erat, nec bene sumi, et in mortario misceri praecepiebatur, in quo non recte misceri aliquid dicitur. In tundendo enim, non in miscendo mortarij usus est. Miscetur autem oleo bene, quod tusum iam est. Nec aliter, si quis locum bene odoretur, intelligi res poterit. Barbarus in cunctis his comunem lectionem securus, qualia se illa ostendebant, talia etiam uertit.

Styracinum, idest, ex Styrace.

Butyrinum, ex butyro, quod ut apparet olim pro oleo adijciebatur, miscebaturque his quae suppuraciones adiuuabant.

Onychinum, ob Onyche in testaceo genere pisce, cuius adeps pro eodem oleo in usu erat. Indicauitque id Plinius lib. 22. cap. 6.

O De Cyprini spissamento & olei compositione. CAP. LXIII.
Lei Omphacini eloti pars una, aquae coelestis dimidium, cuius una parte oleum diluitur, altera adijciendis odoramentis amiscetur. dein assumptis Aspalathi libris quinque & semisse, Calami libris sex & semisse, Myrrhae libra una, Cardamomi libris tribus & dodrante, olei libris nouem & uncijs quinque. Aspalathus tusus & aqua affusus decoquitur in oleo, donec efferuescat. Myrrha autem uino uetere odorifero subacta, cotusque Calamus digeruntur in offulas, quae exempto Aspalatho immittuntur, & ubi efferbuerint, sublato ahæno, oleum percolatur. Cardamomum tusum reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agitur, nulla dum refrixerit interpellatione. Post hæc colato oleo, in uigintiocto libras olei, floris Ligustri, quod Cyprum uocant, sex et quadraginta librae cum besse instillantur, quae sufficienter madefactae, per sportulam exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem florum pondus iniectum simili modo prematur, & iterum, aut tertio si quis uelit madefacere, poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui Cinnamomum addunt. Calfacit. Emollit. Venarum spiracula laxat. Vulgus, neruorumque uitijs conuenit. Pleuriticis, fractisque, p se, uel Cærato imistum. Malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationique inguinum opitulantur. Item acopis.

Pli. li. 15. ca. 7.

B A R B A R I C O R O L L.
CYprinum, in Cypro commendatissimum: deinde in Aegypto. Huic et Abrotonum quidam adijciebant. Alij Panacem. Optimum postea Phœnicion, e Sidone fuit, mox Aegypto. Si non addatur Sesaminum oleum, durat quadriennio. Excitatur Cynamomo. Viris dicebatur Cyprinum & Rosaceum. Colos Cyprino candidus Theophrasto, uiridis Plinio. Precium in libras quinque. E Cypro Canopica, in ripis Nili nata, laudatissimæ. Ascalonem, Iudææ proximam. In Cypro tertium. Ita mutatur sæpe autoritas. Vnguentum ipsum a Theophrasto, non Cyprinum, sed Cyprus quoque dicitur. Nam Cyperinon, e Cypero, quæ Cyclades fuerunt insulae, componitur, Euegricon, a Theophrasto nominatum.

E X M. V E R G. C O M M.
Desideratur in hoc capite certum temporis spacium, quo dimittendo in oleo flores illi essent. Idque non minus, quam cætera monuisse oportebat. In antiquo sane Dioscoride latino, notem & diem adhuc legimus, quod tempus, implendis oleo floribus, miscendisque simul uiribus, satis fore uidetur. Sed nescimus, quanta illi fides habenda sit. Qui id agent, sagaci coniectura utentur, obseruabuntque, ne breuiore tempore, abortiuum fiat unguentum, longiore uero referueant, & uitiuentur humentes & succosi flores.

Quod si

Quod si copiosius facere uolueris, &c. Non caret suspitione hic locus. Credimusq; com-
paratiuum nomen *πλῆθος* quod illic est, aut aliud quiddam fuisse, quod non copiam, sed effica-
ciam, & uires significaret, aut uocē aliquam deesse, quæ illi coniungeretur. Verbi causa, *δύναμις*,
ut esset sensus, quod si maiores uires illi addere uolueris, &c. Eo enim, non ad copiam per-
tinent quæ sequuntur, ad quas augendas uires, nō bis tantum, sed ter flores addi etiam iubet:
causamq; ipse adfert, efficacius ea ratione fieri dicens. Nihil tamē his quæ passim leguntur ad
didimus, commentatione hac nostra, quod desyderari potuit, explentes.

De Irini spissamento.

CAP. LXV.

Spathæ quam minutissime contusæ sex libras cum beffe, in tribus &
septuaginta libris & quincunce olei, æreo uase, additis decem aquæ
heminis incoquito, quoad odorem acceperit. postea in craterē melle ob-
litum colato, ex eo aromatibus imbuto oleo, Irinum primo temperatur,
macerata Iride, ut scripsimus. Sed alia est componendi ratio. In olei septu-
aginta libris & quincunce, Xylobalsami, ut dictū est contusi, libras quin-
que & sextantem excoquito. Postea detracto Xylobalsamo nouem li-
bras & dextantem adijcito, & Myrrhæ glebam uetere uino odorato per-
fufam, & in olei odoribus imbuti quatuordecim libris tantum dema-
tusæ Iridis, binis diebus ac noctibus madefacito, strenue et uehemēter distrin-
gito. Quod si uis ualidius fieri, par pondus iterum ac tertio maceratum
exprimito. Longe optimum est, quod solam Irin olet: quale est in Perge,
in Pamphilia, & Elide Achaia natum. Vim habet calfactoriam, atque e-
mollientem. Crustas adimit. Sordida ulcera & putrida purgat. Confert
fœminis uulug affectionibus obnoxiijs. Item inflammationibus eiusdem
atque præclusionibus. Partus eijcit. Hæmorrhoidas laxat. Contra auri-
um sonitus ex aceto, Ruta, et amaris nucibus, prodest. Diuturnis destilla-
tionibus naribus illitum, & contra graueolentia earum ulcera, quas oze-
nas uocant, auxiliatur. Aluum purgat cyathus epotus. Facit ad llei cruci-
atus. Urinam mouet. Difficileis uomitiones adiuuat, perunctis eo. digi-
tis, & immixtis, uel ijs quæ ad uomitum ciendum induntur. Angina etia
illinitur, aut ex aqua mulsa, gargarisatur. Item contra faucium scabrici-
am. Datur ijs qui Cicutam, Coriandrum, aut uenena Fungorum hau-
serunt.

BARBARI COROLL.

Irium Corinthi, postea Cyzici placuit: ipsa quoq; per se Iris illyrica nobile unguentum fa-
cit. Sunt qui unguentum hoc, Catirion quoq; uocent.

Pli. li. 19. ca. 2.

EX. M. VERG. COMM.

Quam hic Achaia Elidem dicit, Arcadiae credimus legendum esse. Illi enim, non Acha-
ia, altera a geographis Elis assignatur. Quæ uero Medici uiderunt, graeci *ἰχάρα* nomi-
nant, relictas ab igne carbonis modo & colore crustas.

Nec sunt paulo post, Ruta & Amygdalæ a nobis instillari dictæ, nisi etiam succo & oleo in-
telligendæ. Sic em hic docere multa consuevit, medicis necessitatem usus in tractatione cogno-
scendam, relinquens.

De Gleucini cōpositione.

CAP. LXVI.

Gleucinum absolute constat Omphacino, Iunco, Calamo, celti-
co Nardo, Spatha, Aspalatho, Sertulā campana, Costo, & Mus-

γλευκίον

e ij

D I O S C O R I D I S

Cito, circumdatis interim uinaceis uasi, quod aromata uinum & oleum co-
ceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur. postea expressum oleum re-
conditur. Calfacit, emollit, cohibet. Rigoribus, & neruorum, uuluaq; ui-
tijs auxiliatur: omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

Pli. li. 23. ca. 4.
Colu. lib. 12
cap. 51

B A R B A R I C O R O L L.
Gleucinum dictum est, quia ex musto conditur: ab alijs Mustum incoquitur, uapore len-
to. Alij permittunt, sine igne consumatur oleo mustum: alioquin non Sampsuchum tantum
admiscens, sed preciosiora quoq; odoramenta.

E X M. V E R G. C O M M.
Alteram, diuersamq; ab hac fuisse quondam Gleucini confectionē, hic ipse indicat. Et Co-
lumella libro. 12. capite. 51. copiosiores eius confectionem indicat. Postremo Plinius, qui lib. 10.
capite. 4. de Gleucino agens contra Dioscoridis decreta, astringere Gleucinum et refrigerare
dixit, aut manifesto errore, quod in re tam manifesta non facile credendum est, aut de altero
Gleucino eas uires testatus. Ea nulla haecenus in græcis inuenta a nobis est. Desyderauimus e-
tiam Musci olei, aromatūq; illorum mensuras & pondera: poterit tamen qui id nouisse cu-
piat, ex Columella eodem capite uestigia eorum aliqua odorari.

De Amaracino. CAP. LXVII.

de amaracino

Amaracinum longe optimum in Cysico fieri solet ex Omphacino
& Balanino, spissamentis e Xylobalsamo, Iunco odorato, & Ca-
lamo factis, ascitaque suauitate Costi, Amomi, Nardi, Casiae, Carpobal-
sami, & Myrrhae odoribus. Aliqui, quo preciosius fiat, Cinamomum ad-
dunt. Mel autem & uinum assumuntur, hoc in uasorum illitionem, illud
ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinum calfacit. Soporem
Dmouet. Venarum spiracula laxat. Emollit. Feruorē excitat. Vrinam cit.
Putridis ulceribus ac fistulis perquam utile, necnon humētib; hernijs,
postquam medica manus operam suam impenderit. Crustas, & tetra ul-
cera, quæ theriomata uocant, rumpit. Difficili urinæ illita sede, & eius in-
flammationibus auxiliatur. Hæmorrhoidas illitu soluit. Vuluæ subdi-
tum menstruos cursus euocat. Duricias, ac utuluæ tumores, discutit. Vul-
neratis neruis, lacertisq; confert, leniter astringentibus madefactum &
impositum.

Pli. li. 21. ca. 23

B A R B A R I C O R O L L.
Amaracinum duplex, uulgare, & quod priuatim componebatur in Co: cui & nomen pe-
culiare inditum Hedychrum: ideoq; seorsum agitur de utroq; quanq; non distinguat Plinius.
Laudabatur & e Melo insula, ut scribit Apollonius. Hedychrum a colore dictum uideri po-
test. quoniam Theophrastus in hoc tradidit radice Syria, quæ Chroma uocant: unde Chro-
masius forte color nomen uulgo traxit. Quamuis & aliā originem dicemus in Saxifraga. Me-
minit & herbæ cuiusdam Syriæ uocatæ Aristoteles, quam Theodorus Suriam cōuertit. In Co-
lumella radix Syria, genus quoddā, ut nonnulli tradunt, Rhaphani significat. Et in carmine
Assyriam radicem uocauit, quam Zythum commendari cum Lupino macerata cecinit. Ipsi-
us quoq; Amaraci Cyzicenæ succo preciosum unguentum fiebat. Paucarum, ut ait Plinius,
accessione specierum, melle, salis flore, omphacio, agni folio, uel ut quidam legunt, agno, po-
lea, panace. Plinius & alij Amaracum hac parte pro Sampsucho uolunt intelligi, ex quo Ama-
racina unguenta nominentur. Seruius grammaticus, Puer fuit inquit unguentarius Amara-
cus, qui casu lapsus, maiorem ex confusione odorem creauit: unde optima inquit unguenta
dicuntur Amaracina. Alioquin Amaracus proprie Galeno & Paulo, est herba illa quæ a Dio-
scoride Parthenion uocatur.

E X M. V E R G. C O M M.
VNum idemq; polus Amaracus, & Sampsuchum est, non eadem tamen ubique bonitas, &
unguenti

unguenti ex eo confectio. Neq. idem omnibus locis nomen. Omnis fere græcia Samsuchum, **A** Cyziceni, hoc ipso autore in eius historia, Siciliaq. & ut in uicino sit, Sicilia propinqua Italia, Amaracum uocant. In Cyzico & Cypro laudatissimum, probatissimumque nascitur. Et si Plinius Cyprium tantum laudauerit, communiterque tota Græcia, sed minus probatum presumq. ut supra traditum.

Quotidianum eius unguenti usum in delicijs fuisse, Lucretius indicat cum canit. Aut Amaracini blandum, Staeteq. liquorem. Et in plebe notissimum pro uerbium. Quid cum Amaracino sui? Multum & ubiq. notum hoc olus est. Rura nostra Persam, reliqua omnis fere Italia Maioranam appellat, quæ appellatio in Græciam aliquando perlata, historiaq. huius scriptoris, pro romano nomine inserta, uera esse ostendit, quæ a principio de appellationibus his dicta a nobis fuerunt. Creuisse scilicet, per tempora earum numerū, adijcientibus continue medicis, herbarijsq. de codicibus suorum temporum, suæque gentis, & alienas appellationes. Nomen enim Italiae id nomen est, ideoque historiæ Samsuci, non a Dioscoride, sed a posterioribus additum est.

De Megalino. CAP. LXVIII.

Factitabatur olim Megalinum, sed nunc compositio exoleuit & prorsus oblitterata est. Cuius ad historiæ complementum meminisse non fuit alienum. Mistura cum Amaracino eadem erat, sed Resina exuperabat, excellebatq. Quare leuiter emolliebat. Resina unguentis, neq. tutelæ, neq. uoluptatis gratia adijciebatur, sed coloris crassamenti q. causa. Ea tantisper coquebatur, dum desineret olere. Cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de Resina differemus.

MEGALINIUM BARBARI COROLL. Megalium propter gloriam appellatum ferunt, q. excusserit Telinum, ante se cantatissimū. Alij, ut a Megalio inuentore, qui Siculus, siue Atheniensis fuerit, existimant. In qua sententia & Aristophanes, & Pherecrates, & Stratis, comici Poetæ sunt. Huic nonnulli & Cassiam asciscabant. Huius proprietates, ut uentiletur in coquendo, donec olere desinat. Rursus refrigeratum, odorem suū capit. Iulius Pollux & Metallicon, a Metallo Siculo inuentore celebrat. Nisi quis mendose, pro Megalio, scriptum Metallicon existimet.

EX M. VERG. COMM.

AB honore, qui unguento huic ob feliciorē eius usum a ueteribus datus est, *μεγαλίων* græci uocauerunt. Nec aliud Plinius indicauit dicēs, propter gloriam sic appellatum fuisse. Idem. Excepta, inquit, resina, Amaracino erat quondam primæ bonitatis æstimatum, mox damnatum, meliorem, & aptiorem Amaracini confectioe inuenta, qualem hic paulo ante duobus capitibus tractauit.

De Hedychroo. CAP. LXIX.

Quod Hedychroon uocāt, in Co fieri solet, eisdem præditum uiribus & misturis, quibus Amaracinum, sed suauius spirat. *ἡδύχρον*

BARBARI COROLL.

Hedychrum, & Hedychroon, a coloris hilaritate dictum, ut præfati sumus. Idem uidetur esse cum Amaracino, nisi q. nomen hoc proprie habet in Co, ubi nobilissimum. Hinc, pro uerbio locus. Nihil cum Amaracino sui, ut est apud Gelium. Inuenio & in Theriacen, requirit Hedychroon: quanquam diuersa eius compositio probatur. Andaracoron, peruersè appellant Arabes. Ingrediuntur in Hedychrum, ut græcos sequamur, asarū, amaracus, aspalathus, carium semē, calamus odoratus, iunci flos, xylobalsamum, opobalsamum, phu ponticum, cinamomum, costum, myrrha troglodytica, feniculum, spica nardi, amomum, mastiche, uinū uetus odoratum.

EX M. VERG. COMM.

Nobilissimum in Co unguentum hoc quondam fiebat. Incertum tamen, quam nam hic *e in*

D I O S C O R I D I S

Co dicatur an Hypocratis patriā, & Cariam quondā, autore Stephano appellatam: an in AEgypto ciuitatem eodem nomine, cuius idem meminit autor, et quam antiquiores aliquot greci, maluisse uidentur. in quibus adhuc legitur, *σκυδάμην δὲ ἢ καὶ ἐν αἰγύπτῳ*. Quod sequentis capitis principium quadam tenus confirmare etiam uidetur, in quo uelut in continua rerū historia hic ait, *σκυδάμην δὲ καὶ ἐν αἰγύπτῳ*. quod est, conficitur in Aegypto etiam: cum tamen nec superiore capite, nec ab eo altero Aegypti Dioscorides meminerit.

Capite de oculorum medicamentis.

A coloris nitore & hilaritate Hedychroon factum huic unguento nomen est, neque in ratione nominis dubitandum. Illud potius querendum, an sic uocaretur, quia haberet ipsum, an magis, quia in alijs coloris eam hilaritatem faceret. Si cōfectio eius, & quæ id aromata, semina, multa; alia ingrediebantur a grecis tradita, diligētius expendatur, nihil erit quod ab egregia coloris bonitate laudari possit, mistisq; tam multis colore dissimilibus, gratum oculis & hilare expectari possit. Inclinat ob eam causam animus, quoniam his, qui eo inungerentur, coloris bonitatem & nitorem adderet, sic quondam ueteres id nominasse, rarumq; aut nullū eius in medicina usum fuisse, historiæ breuitas, & capitis decurtatio ostendit. Nec facilis nūc coniectura est, docuerit ne tam breuiter de eo Dioscorides, an posteriores medici, quia sanādis morbis exiguas haberet uires, quotidianosq; alios usus, ad eam breuitatem contraxerint. Galenus certe his uerbis rem absoluit in sua Isagoge. Quæcūq; autem ad meliorem uultus speciem inunguntur, qualia sunt quæ Sandiæ, & Hedychroo cōstāt, non medicinæ, sed fucatorix, & magonici lenocinii propria sunt. Quibus manifeste ostenditur, facere in homine, non habere in se coloris hilaritatem Hedychroon.

De Metopio. CAP. LXX.

Metopion

Fit in AEgypto unguetum, quod Metopion patrio nomine appellatur, propter Galbani mistionem. Nam lignum in quo Galbanū enascitur, Metopion uocant. Cōstat amaris nucibus, Omphacino oleo, Cardamomo, odorato Iunco, Calamo, melle, uino, Myrrha, Balsami semine, Galbano & Resina. Probatum pingue, graui odore, quod magis Cardamomum & Myrrham quā Galbanum resipiat. Calfacit uehementer, & adurit, atq; extrahit. Ora uenarum aperit. Ulcera purgat. Ad præcisos nervos, & lacertos, ad hernias putri humore contractas, efficax est. Caratis & malagmatis inseritur. Rigoribus, conuulsisq; præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & retorsum cōtracta est, utile habetur. Sudores ciet. Vuluæ spiracula laxat, & eiusdem duricias discutit. In summa, molliendi naturam habet.

BARBARI COROLL.

Metopium in AEgypto, præferebatur quondam Cyprino. abstulit deinde gloriam Phoenice, hoc e uilissimis erat.

EX. M. VERG. COMM.

Non ferulam in Syria nascentem, ex qua Galbanum stillat, Metopium in historia eius hic ait appellari, sed liquorem, siue lachrymam eius. Credimusq; ideo, non fān hoc loco, quod lignum, & materiam, uerum *ὁπὲν*, quod liquorem significat, legendum esse. Nisi forte in historia, non hic uitium sit.

Sequitur mox, quod in cūstis grecis legitur, ex amaris Amygdalis, confici unguentum hoc. Quod non sic intelligendum est, ut Amygdalarum carnem credat aliquis illi misceri, uerum oleo ex illis expresso, confici hunc docere. Indicatque id, quod hic idem, in Amygdalino oleo dixit Metopium dici, quoniam scilicet priuatim in hoc unguento usus eius esset, eamque ob causam, nos certius rem indicantes, ex nucibus illis expresso oleo fieri diximus. Itēq; acerbo oleo, ut alterutrum eligi oporteat.

Non uidetur nobis deinde integer locus, ubi diximus, Emplastris additum, quas greci ab exedendo,

excedendo, septas uocant. Nec uolumus id pro certo legentibus accipi. neque enim sequax rei & sermonis ductus est. Nec accipiendi sunt hoc capite rigores in scapulas, ut non alijs etiam rigoribus hoc ipsum remedium utile sit; alijs enim rigoribus pariter proderit. Nos autem quod in Dioscoride legitur, qua debemus fide reddidimus.

De MENDESIO. CAP. LXXI.
Mendesium cōstat Balanino oleo, Myrrha, Casia, & Resina. Alii μυρδάνιον
 qui tamen post singulorum pondera, Cinamomi exiguum addunt, nullo compendio. Nam quæ simul contrita non fuere, uim nullam exhibent. Similem Metopio uim obtinet, sed inferiorem multo.

BARBARI COROLL.
Mendesio colos niger: a loco ubi Mendes, hoc est, caper colitur. Veteribus inter laudatissima, & post Deliacum in Aegypto, praelatum quandoque uel Cyprino. Celebratur & Mendesium uinum ex Aegypto. Item Mendæuum, ex Thracia Hippocrati, contrā renum uicia.
EX M. VERG. COMM.

In Aegypto fieri cōsueuisse Mendesium unguentum, & in ea Aegypti parte in qua Caper, qui Mendesios genti illi appellatur, coleretur, nomen indicat. Eiusq; rei testis Plutarchus est in libro quem scripsit, quod bruta ratione utuntur. Plinius Metopium & Mendesium, propria fuisse Aegyptiorum unguenta ostendit.

Nobis in hoc capite suspectum est, quod hic ait *μὲν τὸν κατὰ τὸ μυσμὸν*, significat enim singulorum per sua pondera adiectionem: cum tamen hic mox dicat, non communicare uires, quæ non fuerint simul decocta. Quibus colligere ratiocinariq; facile est, de coctura aromatū in oleo, aliquid egisse Dioscoridem, & quod ponderis illic significationem habet, cocturæ naturam & rationem habiturum fuisse.

De STACTE. CAP. LXXII.
Stacte, uocatur pinguitudo recentis Myrrhæ cum exiguâ aqua tuse, στακτὴ
 & organo expressæ. Ea perquam odorata, ac præciosa est. atque unguentum per se facit, Stacte nominatum. Maxime probatur, quæ nullam olei mistionem admisit, cuius minima portio compos est uirium plurimarum. Vim Myrrhæ calidis unguentis correspondentem habet.

BARBARI COROLL.
Stacte dictum, quoniam e stillaticia dūtaxat Myrrha fiat: colore pallido, suauitate mira, sed amaritudine præcipua. Constabat & Myrrha unguentum regibus Persicis dicatum, quod illi capite, cetera diadematis uice impositum gestabant. Sed addebatur Myrrhæ, Labyzos appellata, quam multo præciosiorem, q̃ Myrrham esse, Dinon scribit. Appellatione unguenti Aegyptij, Stacten uenire, autor est Athenæus. Hippocrates, pro eo, q̃ ex Acanthes uocatæ floribus conficitur, & Pæderos ab alijs uocatur. Olei uero Aegyptij uocabulo, idem Hippocrates Cincinum significat. Vbi uero adijcitur, candidum Aegyptium, pro Libino capitur, ut Galeo placet.

EX M. VERG. COMM.
Non uidetur Theophrasto, Theophrastumq; secuti scriptoribus, & Dioscoridi huic nostro, eadē Stacte esse, nisi forte, quod in Theophrasto legitur *τὸ σμῆνος δὲ μὴ στακτὴ ἢ δὲ πικρὴ*, non ad genera eius, sed ad partes & usus referendum sit: diuiseritq; Theophrastus, nō Myrrhæ genera, sed docuerit in expressa Myrrha primam destillationem, ad unguentum Stacten, reliquam uero Plasten, quasi ficticiam, eo q̃ conformaretur, appellari. Hic enim, & hoc capite, & mox in Myrrhæ historia, Stacten indicat, primam cum exprimitur, Myrrhæ destillationē esse, significareque hanc uocem, simplex ex ea factum, qua ratione præmonstratum est unguentum. Neque enim aliter intelligi potest eo loco, qua expressa Stacte excipitur, & mox, quæ etiā multam Stacten dat: omnia, si diligentius res expendatur, non ad Myrrham simpliciter, sed ad bonitatem, usumque eius pertinentia.

A destillando, quod græci *σῆν* dicunt, Stacte dicta est, significariq; ea uoce non simpliciter Myrrham, uerū ex expressa Myrrha pinguisimā eius destillationē indicat Lucretius, dicēs.

D I O S C O R I D I S

C Aut Amaracini blandū Staſteq; liquorem. Odoramento, & unguento eam coniungens. Meminit Columella etiā in carmine ſuo, cum cecinit. Et melior Staſte, ponatur Achaica Myrrha. Quin etiam antiquorum græcorum lexica, non Myrrham, ſed τὸ ἀπὸ τῆς σμύρκης γίνεται μύρον, Staſten diffiniunt. Ob quæ inclinatur animus, & in hoc, & alijs ſcriptoribus non Myrrhæ aliquod genus, ſed quod optimum et pinguiſſimum ex ea deſillet primum, hanc Staſten eſſe, quæ per ſe nullo alio aromate adieſto, unguentum fit. Neq; obſtat quod Plinius ait. Sudat autem ſponte prius, quam incidantur Staſten dictam. Et paulo poſt, Precia ex occasione ementiū uaria. Staſte a ſex ad quinquaginta. Potuit enim Myrrhæ genus unū, eadem hac uoce a deſillado facto ſignificari. Quemadmodū idem Plinius lib. 17. cap. 11. de Refina agens ait. Hanc mares dumtaxat ferunt, & eam græci Staſten uocant, odoris grauiſſimi. Ex quo facilis cōiectura eſt, non Myrrhæ tantum propriam uocem Staſten eſſe, ſed aliorū etiam liquorū lachrymarumq; ex arborum truncis deſillatium. Quæ autem dicta a nobis hoc capite ſunt, ad unguentum, non ad Myrrhæ genus; ut certius adhuc in Myrrha oſtendemus.

De CINNAMOMINO. CAP. LXXIII.

κινναμόμινον

Cinnamominum e Balanino oleo, & Xylobalfami, Calami, Iunci odorati ſpiſſamentis, atq; Cinnamomi, & ſeminis Balfamini ſua uitate, quadruplaq; Myrrhæ ad Cinnamomum portione cōſtat. Mel ad cogēda omnia adiicitur. Laudatur acre, molli odore, plane Myrrham reſdolens, craſſum, odoratum, guſtu perquam amaro. Id non a Refina, ſed myrrha craſſitudinem obtinuit. Refina enim neq; amaritudinem præbet, neq; ullam odoris gratiam adiicit. Vim habet admodum acrem, amarā, & calfacientem. Itaq; ora uenarum aperit. Calfacit, diſcutit, diſſipat. Humores & ſpiritus attrahit. Caput aggrauat. Contra uulua uitiā cum duplo oleo, cæra, & medulla efficax eſt. Ita enim fere acrimonia exoleſcit, & quædam emolliendi uis contrahitur. Alioqui adurit, & præ cæteris unguentis indurat. Facit mirum in modum ad fiſtulas, & ulcera quæ putredinis uitium ſenſerunt. Item ad hernias humidiores, carbunculos, febriliū rigores, tremores, gangrænaſq; cum Cardamomo. Aduerſus ſerpentium morſus, illinitur. Scorpionum & phalangiorum icubus cum tritis groſſis imponitur.

Plin. lib. 17. capi. 11.

Cinnamominū, quod mel accipit, odoratum ſit, a nōnullis quaeritur. Precia eius prodigioſa a denarijs. 35. ad. 310.

EXMVERG. COMM.

Caret certo intellectu, quod in omnibus græcis legitur hoc capite, δύναντι δι' ἡμετέρας ἀρμίας καὶ ἡρμαντικὴν καὶ πικρὰν, a nobis contra communem τοῦ πικροῦ. i. amari ſignificationē his uerbis. Acerrimas habet uires, calefacit, maturatq; Nec abſurdo, ut nos credimus, in mutatione eius uocis conſilio, & rei ſenſu. Paulo enim ante de amaritudine eius hic egerat. Incontinuumq; eſt, ſi quis dicat, amaras alicuius rei uires eſſe, præſertim, cū de calore, acrimonia, aperiendi diſcutiendiq; ui, & poteſtate agitur, quæ in diuerſo penitus genere a ſaporibus ſunt.

Eam ob cauſſam, ex hiſtoria Cinnamomi πικτικὴν δύναντι. i. maturādi uim, pro illo πικρὰν, id eſt, amaram, in hoc caput tranſtulimus: quod q̄ bene, et ex re factum ſit, aliorum cenſuræ reſinquimus, quibus licebit ſemper cum libuerit ad amaritudinem redire.

νάρδιον

De Nardini unguento. CAP. LXXIII

Ratio Nardini faciendi euariat. Nam aut Malabathrino folio, aut ſine eo fit. Complurimum autem Balanino oleo, aut Omphacino.

phacino. Iuncus odoratus spiffamenti gratia adijcitur, sicuti propter odoris suauitatem Costus, Amomum, Nardum, Myrrha, Balsamū. Laudatur tenue, non acre, Nardi aut Amomi odorē referens. Vis ei extenuans, acris. Expurgat. Excalfacit. Humorem extenuat. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi Resinam recipiat. Fit etiam simplex ex Omphacino oleo, Iunco, Calamo, Costo, & Nardo.

BARBARI COROLL.

Nardinum, Galenus spicatum Romæ dici solitum, & foeminis, præcipue diuitibus famillia re, prodidit. Nardus uero Psittica, siue unguentum, de quo mentionem literę sacrę faciūt, probam & fidelem, & quæ adulterata nō sit, Nardum significat Hieronymo. Quidam a loco, nomen id fuisse putant Nardinum e Tarso Ciliciæ commendatissimum. Unguenti nomen est & Nardus Cyzicena, in quod tamen Nardum quandoq; non quæritur, nisi Gallicum. Ingredis & Arnabo, Iulius Pollux, & Babylonicum Nardum, pro unguento uidetur accepisse.

Galen. lib. ij. cap. 11.

EX M. VERG. COMM.

Probatur in Nardini unguenti confectioe - &c. Græce, ἡ ἀλγυσὶς ἡ νάρτις. In foeminino genere rem indicauit, quæ ad unguentum, nulla ratione referri potest: oportetq; ad aliquid referri, quod foeminino genere non longe inueniatur. Nihil autem aptius nobis uisum est, q̃ ad Nardum, quæ nomen unguento dedit, referre: monuitq; in eo nos omniū probatissimus mihi codex, in quo non νάρτις, sed νάρτις legitur, quasi ignaua, & uulgaris Nardus, in unguenti confectioe probetur. Quam certius adhuc describēs, acrimoniā illi abstulit, & siccæ Nardi, & ob id minus olētis, aut Amomi odore pbauit. Qualia autē hęc fuisse quondā cōjicimus, talia etiā docemus, qd̃ sepe alias testati sumus, liberā legētib; pbādi, & impbādi nostra hęc relinquētes.

Quod autem Dioscorides ait, uariam Nardini unguenti confectioem esse, eo pertinet, ut ostendat Nardinum ideo dici, quod non uera Nardo tantū conficeretur, sed alijs etiā, quæ odore Nardo similia essent: quale Malobathrum est, quod Folium quondam dictū fuisse testati sumus: ideoq; factū fuisse, ut Nardinum aliquādo Foliatum diceretur. credereturq; a multis idē esse: cū tamen diuersa materia confectum, alterum ab altero manifesta uarietate differat.

Quod etiā in Euangelio legitur Spicatū, eandē causam habet, ut ex spica Nardi confectū, ab alijs discerneretur. Indicauitq; id Pau. Aegineta, quō loco de aurīū uicij & remedijs agit, inter quæ foliatum & spicatum diuersa numerat unguenta: uerisimileq; est, ex omnibus quæ odore Nardi essent potuisse fieri, ideoq; hunc dixisse, multifariam confici Nardinū unguentū.

B

De Malabathrino.

CAP. LXXV

Malabathrinum spiffamenta Nardini habet. Insuper Myrrha additur, qua de causa calfacit, Crocino, aut Amaracino, uiribus correspondens.

μαλαβάρτιν

BARBARI COROLL.

Malabathrinum succo folij eius, nullo præterea coniecto, nobile unguentum, precium in libras. 60. Foliatum quoq; appellari diximus. Quamquam dicat aliquis, Nardinum quoq; Foliatum uocari posse: quia folium Malabathri quandoq; accipiat, quod & Dioscorides in Nardino meminit, Paulus quandoq; Foliatum, pro Foliato appellat. Idem Foliatum, Spicatū, Moschaleon, & Commagenum, foeminis ad odorem tantum quæri affirmat.

Plin. lib. 13 cap. 4.

EX M. VERG. COMM.

Foliatum proprie unguentum hoc dicitur. Succo enim folij, quod idem Malobathro est, conficitur. Cætera eadem illi, & Nardino sunt.

De IASMINO.

CAP. LXXVI

Apud Persas fit, quod Iasminum cognominatur, ex albis floribus Violæ, quorum sextans, in italicum sextariū Sesamini olei demittitur, Violis ut in Lilino diximus, uicissim permutatis. Apud Persas in

ιδρυται

D I O S C O R I D I S

Cter epulandum usurpatur odoris causa. Nam toti corpori conuenit, præsertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus quæ calfactionem, laxationemque desyderant. Grauius enim spirat, quæ ut libenter a plæriscque recipiatur.

B A R B A R I C O R O L L.

IAsme si quis interpretetur, Violaceum significat; quanquã Violaceum illud quod triviale est Iaron potius appellant græci. Theophrastus Leucoion. ut ipsam quoque Violam. Aliud hoc quod Regale nominatur, a Persis conditum atque Parthis. huius forentis animæ uirus, multitudine ciborum & ebrietate natum, accersita odorum commendatione summuet. Vnguentum hoc & Iasiminum, & Iasimeleon, & Iasme dicitur. Quæ uox admonet me, ut ex ea fere Viola compositum intelligam, quæ uulgo Iesiminum uocatur, distinctiones & harundineos parietes in hortis opere topiario conuestiens, flore candido, præcipuæ suauitatis, folium in uiridi nigricans, ob longum, fastigiatum, mucrone languido, magnitudine Rosæ, sed angustum. Hoc Violæ genus Persicum, & Particum, & omnino peregrinum uocauerim, ab alba Viola, nostrate longo intervallo distans, ueteribus (ut arbitror) incognitum, saltim Italiæ. Recentiores tria Iasmes siue Iesimini genera constituunt, albam colore, ceruleam, & in Aegypto luteam, qualem & in Venetiâ nasci modo cernimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Florem quem omnes Iesiminum dicimus, colore candido, Violis figura non dissimilem, Violam antiqui uocabant, ignotum diu Italiæ, ut uidetur, nunc autem plæbis hortos etiã gratum odore commendantem, tam notum omnibus, ut nulla descriptione nostra indigeat. Credimusque nos de eo egisse hunc scriptorem, cum communis Violarum historia tertio uolumine ab eo tractatur. Numeratis enim albis, luteis, seu purpureis Violis, quæ communes & notæ omnibus sunt, quartum genus colore ceruleo addidit, quæ nullæ in Violarum genere nunc cognoscuntur, necesseque est ad Iesimini huius florem referri ceruleum colorem illum. Posteriores enim & inter eos Serapion, tria Iesimini, ex colore discrimina, & genera fecerunt, Candidum, Luteum, quem ille Citrinum, & Ceruleum, quem celestis coloris uocat, omnes quoddam peregrinos, & Italiæ ignotos, nunc omnibus communes; uideturque Italiæ & haberi iam non candidos tantum, sed luteos etiam Iesiminos. Nec in alio Violarum genere Iasme hæc, & Iasminum unguentum intelligendum est. Nam quod Palladius Violaceum docet, a græcis dictum, ex Violis proprie nunc dictis, conficiebatur. Violasque nos græcorum more dicimus eas, quæ primæ uerum nunciantes, plures uno ramulo florent, paucis & exiguis folijs, colore triplici, candido, luteo, & purpureo, præcipui in medicina usus. Quam enim Theophrastus nigram dicit, in alio genere ab antiquis numerata est, de qua suo loco dicemus. Videntur postremo nobis male sibi inuicem respondere, in Iesimini huius cõfectione, olei sextarium, & flores uncie duæ. Credimusque, in florum pondere uitium esse, nec tam exiguo flore, tantæ olei mensuram satis posse odorari.

De M Y R R H A. C A P. LXXVII.

MYrrha lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis. e cuius uulnere defluit lachryma in subiectas tegetes. Alia circum caudicem concreuit. Dicitur ex his aliqua Pediasimos, præpinguis, qua expressa Stacte emittitur. Alia Gabirea, pinguis, læto & pingui solo nascens: ea copiosam sudat Stactem. Omnium prima est, quæ Troglodytica appellatur, accepto cognomine ab tractu, in quo prouenit, splendens, subuiridis, ac mordens. Quinetiam legitur tenuis quædam, quæ Troglodyticæ secunda est, Bdelij modo mollis, uerum odore grauiuscula, apricis nascens. Alia Caucalis cognominatur, scabra præter modum, nigra, & retorrída. Omnium deterri-
ma, quæ Ergasima dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi

gummi imaginem uergens, & uiribus eius proxima. Improbatur Am^A minea cognomine. Ex his pastilli fiunt, sed e pinguibus pingues, & odorati, e siccioribus haud quaquam pingues, & inodorati. Minus uiribus pollet, quæ oleum non admittit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gummi aqua, in qua Myrrha maduerit. Eligenda est recēs, squallore obsita, leuis, undiq; concolor, quæ contracta internatos quasi ungues, cādidos & leues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens. Superuacua & inutilis est grauis, coloris Picei. Calfacit, cohibet. Soporem gignit. Siccit, astringit. Vuluam emollit, & præclufam laxat. Menses & partus celeriter extrahit, cum Absinthio, Lupinorū cremore, uel succo Rutæ admota. Tuberculo fabæ deuorat in uetere tussif, orthopncea, in laterū pectorisq; doloribus, in alui profluuiio, & dysenteria. Rigores discutit, duabus horis ante febrium accessiones, fabæ magnitudine pota cū pipere & aqua. Subdita linguæ, liquataq; scabriciem arteriæ expolit. Et densam uocem expedit. Ventris tineas enecat. Contra grauem oris halitū manditur. Et aduersus alarum tædia cum liquido alumine illinitur. Gingiuas & dentes stabilit, colluto cum uino & oleo ore. Vulnere capitis illitu glutinat. Medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus. Item purulentis auribus, inflammatisq; cū meconio, castorio, & glaucio. Ad uaros autem cum casia & mele illini. Impetigines ex aceto purgat. Defluētes capillos cum Laudano, B & uino myrteo illita, firmat. Diuturnas distillationes lenit, illitis pinna naribus. Oculorum ulcera complet. Albugines tollit. Caliginem discutit. Scabriciem leuigat. Fit e Myrrha perinde atque Thure fuligo, & ut postea ostendemus, ad eadem conueniens.

M BARBARI COROLL.

Myrrha græce *μύρρα* dicitur, & Zmyrna: ob id & notis duabus, z, scribi solet a Medicis. Hanc & Myram uocat Hippocrates. Minor altitudine, sed fruticosior est Thure. Ad. v. tamen cubita crescere arborem Plinius meminit, caudice duro, intortoq; & crassiore q; hominis sura, & ab radice etiam q; reliqua sui parte, corticem leuem, proximumque Vnedoni, Andrachnæue. Folium Olulatri, quidam Oliuæ tradunt, uerum crispus, aculeatum, extremitate ut Iligneū, Theophrastus Vlmeo simile. Nisi quod suspicor, librariorum menda sit, pteleas, pro aleas contrarie scribentium. Scabrum alij, spinosumq; dixere, cætera similem Terebintho, aut Iunipero, etiā gustatu. Foliū etiamnum rotundius. Veteris odorator lachryma est, ut in Vite. Prima eius partitio, ut aliam Statem, hoc est, stillaticiam, aliam Plasten, hoc est, ficticiam a Theophrasto nominatā sciamus. Permixtam arboribus Thuris nasci tradūt. Alij separatim. Sed & alijs Arabiæ locis proueniunt. E siluis quoq; laudata, quam a Troglodytis Sabæi transitu maris petunt. Satiua siluestri præfertur. Gaudet rastris & ablaqueationibus. Melior, radice nuda, refrigerataq; Falsum est, e Thuris arbore utraq; gigni. Inciditur bis, q; dēq; cū Thure tēporibus, sed a radice usq; ad ramos, qualeāt. Sudat spōte antequā incidat, Statē uocatā: cui nulla præfertur. Post hanc satiua, & in siluestri quoq; melior æstiuā. Regi Gebēnitarū quartas partes Myrrhē pendent. Deo nō dant, quia & apud alios nascatur. Coemptā passim, ac pluribus locis in folles confarciunt, ipsiq; unguētarij probitates digerūt odoris & pinguiudinis argumētis. Aliter nomina generū tradidit Plinius q; Dioscorides, hoc ordine. Prima Statē, cui precium a. i. ad. 50. Secunda satiua, cui precium summum ad. 22. Tertia siluestris. Siluestrium genera complura, Primusque inter eas locus Troglodyticæ: cuius nucleo precii ad. 15.

Plin. lib. 12. ca
pice. 15.
Theophrast.
lib. 9. cap. 3.

C probatur pinguedine, aspectu aridiusculo, sordida, et plane barbara, acrior cæteris. Proximus Erythræ, quam intelligi Arabicam uolunt, Mineam uocant alij, preciumq; eius ad. 16. Huius species quatuor. Staetea, Atramitica, Gebenitica, Ausiritis. In quibusdam exemplaribus non habetur Staetea, Tertius Dianitidi. Quartus Collaticæ. Quintus Sembracenæ, a ciuitate regni Sabæorum, mari proximæ. Hæc hilaritate insignis est, sed uiribus infirma. Sextus Drusitidi. Est & candida uno tantum loco: quæ in Messalum oppidum confertur. Diuersa sita prædictis, Odoraria cognomine atq; Sea, quoniã pleriq; sextam in Plinio, nō Seam legunt, haud constat: cui precium redditur ad. 14. In plenum probatio Myrrhæ, glebis exilibus, nec rotundis in concretu, albicantis succi, & tabescentis. Secunda bonitas, intus uaria. Pessima, quæ in tus nigra. Peius, si sit etiam foris. Adulteratur Lentisci glebis, & Cucumeris succo, amaritudinis causa, sicut ponderis, Spuma argenti. Reliqua uitia deprehenduntur, sapore gummi dense lentescens. Fallacissime autem Indica Myrrha, quæ ibidem quadam e spina colligitur, multo deterior: atq; hoc solum peius affert India. Nascitur & in Gedrosia, ut inquit Strabo. Argilosa uero terra, crustosaq; puenit in Arabia. Describitur a Dioscoride, & uocata Caucalis, colore atro, retorrída, *ὑπέρωρον*, conuerti, maturitate insignis. Quemadmodū & exoleta dicimus, quæ græci *ἔστωρ*, & *ἔστωρα*. Quidam corruptum locum putant & *ὑπέρωρον* legendum arbitrantur, hoc est, prædurum atq; scabrum: quod & barbara illa Mauritanij Serapionis interpretatio secuta est. Quanquã & *τὸ ὑπέρωρον*, etiam hilaris, speciosaq; transferri potest: qualem Sembracenam fuisse diximus ex Plinij sententia. Hæc inquit, ante alias hilaris est, sed uiribus tenuis. Seorsum indicabitur & herbæ genus apud nos Myrrhis & Myrrha nominatū. Itemq; apud græcos. Quanquam pro aromate illi quidem proprie non Myrrham, sed Smyrnam uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus non multo ante, cum de Staete unguento ageremus, uideri nobis Staeten, pinguiorem, melioremq; expressæ Myrrhæ partem, huic scriptori esse, cum tamē Plinius Staeten, Myrrhæ genus manifeste faciat. Et Theophrastus libro. 9. idem testari credatur: quod tam certum hoc capite nobis sit, ut nō aliter intelligi a quoquam, Staete in medicina possit, q̃ expressæ Myrrhæ prima distillatio, et quasi pinguisimus flos. Aliter enim, alijsq; appellationibus a Plinio hic Myrrhæ genera numerat, numeratq; duobus, Peliasma scilicet, & Gabirea, quas pinguisimas appellat, ex utraq; expressæ, copiosam reddi Staeten dicit. Quo ductu sermonis, quarumq; uocum significatione, nihil certius audiri potest. Nec aliud colligi, quam esse huic Staeten pinguisimam, & primam expressæ Myrrhæ destillationem, cuius in unguentis & medicina, præcipuus & laudatissimus esset usus. Nec obstat quod Plinius ait, Sudat autem sponte, priusquam incidatur, Staeten distam. Id enim plenius, ut in Resina lib. 7. forte appellauit, a destillando facta appellatione, & quoniam intelligeret, ut in expressæ Myrrha Staete reliquis partibus antefertur. Sic in fluxu eius ex arbore, probari magis sponte sua, q̃ in ciso arboris corrice destillantem. In multis enim naturæ hic ordo, & quasi lex est, ut quæ prima, & sponte sua fluxerit, meliora & minus sæculenta excipiantur. Quodq; & Theophrastus ait. *τὸ δὲ σμύρνον ἢ μὲν σικτὴ ἢ δὲ πλαστὴ*, id est, in Myrrha alia Staete, id est, stillaticia, alia Plaste. i. ficticia, non satis pro comperto nobis est, ad genera ne eius, an ad artificiosam expressionem referendum sit. *πλαστὸν* enim, artificium & opus humanum habet. Siue enim fingere, siue conformare dicas, utrumq; hominis est. Confirmareq; hoc uidetur non multo post Dioscorides cum ait, fieri ex Myrrha expressiones, ex pingui odoratas & pingues, Mox ignauā, & inefficacem esse expressam, quia oleum eius *τὴν ἀνάπλασιν*, id est, in confirmationem nō admiserit. Eodem uerbo usus, quo et Theophrastus in diuisione illa usus est. Quæ omnia longius a nobis dicta fuerūt, ut qd' Dioscoridi & Plinio idem non est, certius a legentibus agnosceretur: scirentq; omnes, huic scriptori, Staeten primam expressæ Myrrhæ destillationem tantum esse, neq; in medicina uoce illa aliud significari.

Non sunt præterea Plinio & huic eadem generū nomina. Hic in primo ordine Pediasmon, id est, campestrem numerat, Theophrastum ut uidetur, secutus, qui de Thure & Myrrha longiorem historiam sic incipit.

Nascuntur autem Thuris & Myrrhæ arbores, aliæ in monte, aliæ ad radices montis, in priuatis agris. Ideoq; aliæ coluntur, aliæ cultura carent. Feruntq; montis excelsam altitudinem esse, siluestrem habitum, & niuibz conspergi, ex quo in planiciem profluunt flumina, quæ quoniam a græcis *πεδίον* dicitur, hic Pediasmon, quasi in campestri solo natam Myrrham appellauit, ut ea appellatione, a montana distingueretur.

Cæteræ generū in Dioscoride appellationes, quæadmodū & suæ, Plinio incertæ nūc sunt.

Interpres

Irrepsit inter hæc genera uitium etiam. Nam quod hic ait, συλλήγεται δὲ τὸ καὶ λεπτὸν μετὰ τὴν τραχυλοφυτικὴν ἀριθμημένην, &c. non λεπτὸν, idest, tenuis, uerum, λευκὸν, idest, candido colore legendum est. Sic quoque nos reddidimus, Plinio & alijs autoribus accedentes, qui inter alia candidum numerant: idque palam testatus est dicens. Est & candido uno tantum loco. Nec nos in eo tantum ueterum autoritas mouit, quam quod tenuitas, parum Myrrhæ competere uidebatur, quæ glebosa, & in offas conuoluta, longe ab ea forma abest: & quod frequentissimum toto hoc opere hic error est, ut ubi λευκόν, quod candidum est legi oporteat, illic λεπτόν, quod tenue legatur.

Quod deinde ὑπέρωρον, & nos uertimus, eorum modo quæ exoleuerunt arefcens. Non a deo difficilem habet intellectum, ut dubitandum ratopere, in Corollario suo, de uocis eius significatione Hermolao fuerit, qui maturitate insignem conuertens, parum proprie rem significauit. Inter cætera enim, quæ græcis ὤρα significat, & speciosus habitus est, & quasi ἀκμή dicitur ὠραία, quæ nec citius, nec serius in usum ueniunt. Sic Plinius Horem mel uocauit, alterum eius genus, quod præcipua tempestate conficeretur.

Variant antiquiores græci in ea quam erga simon dicunt, quam alij gummi, uiribus & aspectu, alij uiribus & odore referre testantur. Nos quod in pluribus legebatur, illud reddidimus.

Coniungitur huic parti statim quod omnino uitiosum est, & in quo male sequax & incertus sensus occurrit, a neutro in comune genus traiectus. Idque huiusmodi est, καὶ πύσματα δὲ ἔξ αὐτῶν γίνονται ἀπὸ μὲν τῶν λιπαρῶν ὑγρόν καὶ λιπαρὸν, ἀπὸ δὲ τῶν ξηρῶν ἄλειψήν καὶ ὀκνὸν ὑγρόν. Quod totum a nobis sic redditum est. Exprimuntur omnes, quodque ex pinguibus expressum fuerit, odoratum pingueque est, quod uero ex squalenibus & aridis, nec pingue, nec odoratum. His tam aperte & tam certo sensu dispositis, nulla foemini generis intercedente uoce, succedunt hæc statim, ἄτονος δὲ καὶ μὴ προσεληφέναι ἵλατον ἕως τὴν ἀνάπλασιν. Quod si uelit aliquis, ut res habet, latinum facere, non aliud aptius, quam si a masculino, uel foeminino nomine incipiens (comune enim illic genus est) dicat.

Infirmum, quod oleum in conformatione non acceperit, &c. Quæ uoces superioribus coniunctæ, nullum indicant legitimum sensum. Nec suspicari, sed pro comperto habere uitium illic esse, oportet. Videtur autem nobis, potuisse quondam hic sensus & rei series esse, ut quoniam in Myrrhatint crassiores aliquæ parteis, doceret hoc loco Dioscorides, faciendâ ex omni Myrrha Staeten, idest, exprimendâ, adfusa aqua, myrrham, ut in Staete unguento præmonstratum est, seruandumque, & in pastillos conformandum quod expressum destillasset: & quoniam in Myrrha bonitas odoris, & ad sanitatem in morbis uires essent, sic expressam Myrrham alteram odoris, scilicet commendationem & usum amittere, fierique ἄτονον, infirmam & ignauam, non in uiribus ad sanitatem, sed in odore ad uoluptates, & delicias uitæ. Indicatque id, quæ subiecta statim causâ est, quod oleo careat, quo, experientia docuit, diutissime seruari odores, & facile citissime perituros, nisi unguine & humore eius contineantur. Testantur id Plinius, Plutarchus, mille alij, ne longiores simus. Ex hac itaque causâ, facilis coniectura fuit, de infirmitate odoris agere illic Dioscoridem, neque ἄτονον forte antiquam, ueram fuisse lectionem, ἄνοσμον, idest, sine odore legendum esse, ut una uoce infirmitatem & rem indicaret. Coniicimus tamen hoc, non decernimus.

Quo loco deinde legitur, contra alarum dolores, cum liquido alumine pari utiliter intungitur, iniectus mihi scrupulus, non dolores forte, sed uirosus & hircinus odorem illum qui ea parte sentitur, legendum esse. Suspitioni huic nostræ causam dedit, quod hic ipse in metallis, de omni alumine agens contra ingratos alarum, & uirosos odores intungi eo præcepit, quoniam illi astringendi, & repurgandi uis sit: nunc autem Myrrha illi adiecta, non tantum uidetur ea præcipere, ut absit malus odor, quam simul etiam nouo & meliore odore qualis in Myrrha est, tetrum & hircinum ille delere.

B De Bœotica Myrrha. CAP. LXXVIII.
Bœotica Myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia nascantis. Melior est quæ Myrrham odore representat. Vis ei calfactoria inest. Emollit, discutitque. Suffimentis commodissime inseritur.

Βοιωτικὴ μύρρα

S De Styra. CAP. LXXIX.
Styrax lachryma est arboris malo Cotoneæ similis. Præfertur fordescens, flauus, resinofus, albicantibus grumis, quamplurimum in

στυράξ

D I O S C O R I D I S

C sua odoris gratia permanens. qui dum mollitur, melleum liquorem reddit: qualis e Castabala urbe, Pissidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, furfurosus, canoq; situ obductus. Caterū lachryma inuenitur gummiū similitudine, perlucida, & Myrrhæ amula. Verum per pauca manāt. Adulteratur ligni Scobe, quam uermiculi erodentes excusserunt, melle, & Iridis crassamento, & quibusdam alijs. Alij cæram, aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis solibus cum Styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua uermiculos exprimunt, uenundantque. Styracem hunc, quoniam in uermiculorum speciem contrahatur, Scoleciten cognominant, quem tanquam syncerum imperiti approbāt: non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam. Siquidem acer admodum est, qui adulterationis uitio caret. Styrax calfacit, emollit, & concoquit. Medetur tussi, destillationibus, raucedini, grauedini, & retusæ uoci. Vuluæ præclusæ, duriciæ laboranti conuenit. Cit mentes potu, apposituque. Aluum leuiter mollit, si exiguum cum Resina terebinthina bibatur. Miscetur utiliter discutientibus malagmatis, acopisque. Adoletur autem & igni torretur, ut fiat ex eo ueluti ex thure fuligo, ad eadem conueniens ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria Styracinum oleum componitur: quod calfacit uehementer, & emollit. Verum caput dolore afficit, adgrauatq; & soporem adfert.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 12. capi.
27. 25. libro. 24.
capite. 6.

D Styracem Syria supra Phœnicem gignit, ad Gabala, siue ut Dioscorides scribit, Catabala & Maratbunta, & Cassium Seleuciæ Pieriæ cognominatæ montem. Arbor & lachryma eodem nomine est. Hæc illi ex austero iucundior. Intus arbori similitudo harundinis, succo prægnas. In eam sepe per Canis ortum aduolant pennati uermiculi erodentes, ob id in Scobe fordescit. Laudatur & e Sidone, Cypro, e Creta uero minime. Ex Amano Syriæ medicis, sed unguenta rurs magis. Placet maxime purus. Improbatur colos cano situ obductus. Adulteratur Cedri Resina, uel gummi, aut amygdalis amaris: omniaq; ea gustu coarguuntur. Exit & in Pamphilia, aut Pissidia prope Selgam Lacedæmoniorum in eo tractu coloniam. Sed acrior, minusque succosus, ut Helianus autor est post Strabonem. Ibi siluam eius ligni fertilem fuisse tradunt, e quo missilia corneis similia conficerentur. Vnde ortum, ut Tonsillæ præpilatæ, quas greci alio nomine Vroscos uocāt, Styraces appellari consueuerint. Ibi caudicem uermiculus, rametq; congerit ad radicem, deinde fluit humor, & scobi se ad radicem collectæ miscent. Pars quæ nō leprosa modo, sed terrosa quoq; est, odoratio, ut inquit Strabo, est. In Aethiopia quoq; Styracem provenire scribunt. Precium optimo. Qualitatem eius non unam esse, argumento sunt cognomina in compositione medicinarum frequentia. Chrymatias. Calamitis. Aspros, hoc est (ut puto) candicans. Chrymatiam Arabes interpretantur eum, qui rarus inuentu, & gummi similis describitur. Iidem Calamitin, quanquam harundine sua mixtus, ipso nomine significatur. Pro liquido tamen accipiūt, & fastigia Styracis duo faciunt, siccum, & liquidum, confusione magna: q; aliquando liquidum Styracem pro Myrrha statim sumunt: aliquando ex eadem arbore colligi utrunq; putant, liquidum, atq; siccum. Aiunt Arabes Styracem e Syria petentes, in pellibus hircinis urere, ut odorum suorum Thuris & Myrrhæ satietatem acrimonia peregrini ligni redimant. Iidem petunt Elimæos arborem brutam Cupresso Susæ simile, ex albidis ramis, iucundi odoris accensam, & miraculo, ut inquit Plinius, historijs Claudij Celsi celebratā, cuius Parthi folia potionibus inspergant, odore Cedri. Fumum eius contra ligna alia remedio esse prædicant. Nascentur ultra Phasim, Tigrimq; in sibus oppidi Scinæ, in monte Scanthro. Sunt autem Elymaei Assyria gens, Sufianæ Persiæ cōtermina. Petunt & in Carmanos arborem Strobum, quam uino Palmeo perfusam urunt, suffiuntq; tectā. Nidor a lacu naribus

naribus ad solū iocundus reciprocatur, q̄ citra dolorē caput aggrauet, & somnū aegris cōciliet.

EX M. VERG. COMM.

Bonitate in eo excellit, qui rufus & pinguis. &c. Non ut in impresso sic in cæteris *ὑπαγός*, quod pingue significat, quod sordidum est legitur, sed una tantū & altera mutatis literis.

De Bdellio. CAP. LXXX.

Bdellium, alij Bolchon appellant, alij Madelcon. Lachryma est saracenice arboris. Probatur gustu amarum, translucentum taurini glutinis in morem, intus pingue, liquefcens facile, ligni ac sordis expers, suffitu odoratum, ungui simile. Est etiamnum Bdellij genus sordidum, nigrum, in offas conuolutum, Aspalathi odore, ex India aduectum. Desertur etiam a petra oppido siccum, resinofum, liuefcens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi: sed ita uitiatum non perinde gustui amaritudinem representat, nec usqueadeo suffitionibus odoratum. Calfacit & emollit. Duricias, & turgentia guttura, humidasq; hernias discutit, cū ieiuna salua impositum. Vuluæ spiracula laxat appofitu & suffitu. Et partus, humiditatemq; omnes extrahit. Calculos potu comminuit. Vri- nam mouet. Tussientibus, a serpente percussis utilissime datur. Valet ad rupta, uulsa, intentas laterum membranas, & discursantes spiritus. Mala- gmatibus inseritur, quæ contra duricias & neruorum nodos profunt. Con- tusum resoluitur affuso uino, aut aqua calida.

BARBARI COROLL.

Bdellium, in nomine est, ut Galenus inquit, Scythicum & Arabicum. Scythicum nigri- us, resinofiusq; Arabicum translucentius et siccus. Vbi nos Sambracenice cōuertimus, in Dio- scoride, saracenice legebatur. Sed nos Plinium secuti sumus: quanquam de Myrrha commen- tantem. Cæterum optionem do, utrū probent, qui hæc cognoscunt; ut obiter criticos effugiā.

EX M. VERG. COMM.

Antiquæ & communes Plinio Bdellij appellationes, omnes hæc sunt, barbaræ tamen, ideo q; nec græcis, nec latinis, ex ui noninis certum aliquid indicantes. Solum adrobolum, a gle- barum crassitudine, nominis certam habet in græcis rationem, idemq; est, quod Plinius ait, in offas conuolutum.

Non est deinde scriptori huic legitima uox, Saracenice arboris lachrymam Bdellium esse. Quo enim tempore, hæc ille commentabatur, nullum erat Saracenorum nomen, nec nisi post multum tempus, mutata appellatione, Lybes ad Aethiopiam Saraceni dicti sunt.

Non placet item, quod Barbarus mutauit Sembracenice. Licet enim inter Myrrhæ genera Sembracenam Plinius numerauit, non ideo tamen sola nominis uicinitate mutanda uox erat, sed numerantibus laudantibusq; Scythicum & Arabicum Bdellium Galeno & Paulo Aegine- ta, ex altera duarum regionum, gentile instaurandum illic nomen fuerat, Scythiceque, aut Arabicæ arboris lachrymam dicendum. Quod nos tamen facere ausi non sumus, cōtenti ha- ctenus, legentes monuisse. Inclinar enim animus, utraq; legi oportere, fuisseq; antiquam le- ctionem, *συνθικόν καὶ ἀραβικόν*, coaluisseq; simul librariorum uitio, & medicorum negligentia, ut toto hoc opere multa alia, duarum gentium nomina. Vtq; ad eam opinionem argumen- to, quod hic in medicina utriusq; uires, nullo gentium discrimine numerat, quod alij, Aegi- netaq; in primis post egerunt. Cuius lib. 6. de Bdellio hæc uerba sunt, Mollendi uires, quæ du- rata fuerint, habet Scythicum & Arabicum Bdellion, præcipueq; recens, Arabicum hoc am- plius, ut urinam pellat, calculos frangat, & concoctiones adiuuet, quorum priora illa duo, ab hoc scriptore pariter docentur.

Quod etiam non multo post corrupte legebatur, *παλαβόδις*, antiquo latino Dioscoride monente, in quo ueræ lectionis aliqua uestigia nonnunquam deprehenduntur, confidentius mutauimus, diximusque, Aspalathi odore, *ἀσπαραβόδις*. Sed hoc mihi cum alijs commune sit, tam facile inuentum fuit.

A

Adhuc

B

Pli. li. ii. ca. 9.

f ij

D I O S C O R I D I S

De Thure. CAP. LVIII.

THus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primum tenet in eo genere masculinum, Stragonias appellatum, suapte natura rotundum. Tale autem indiuiduum est, candidum, cum frangitur intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum uero fuluescit, & colore liuet. Sed rotundum industria factitant. Nam in quadrangulares formas dissectū dolijs uersant, donec rotunditatem contrahat. Verum huiusmodi thus tempore flauescit, quod Atomum, aut Syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & in Smylo nascens, quod aliqui Copiscum uocant, minus multo & fuluius. Est & genus aliud cui Amymitæ cognomen est, alioqui candidum, quod dum molliitur, Mastiches more digitis cedit. Adulteratur Pini resina & gummi, quod facile deprehendi potest. siquidem suffitum gummi flammam non eiacularur, & resina in fumum euanescit, Thus uero statim ardet. Idem maleficium odor prodit. Ad calfaciendum & astringendum pollet. Oculorum caliginem discutit. Caua ulcera complet. Et ad cicatricem perducit. Cruenta uulnera glutinat. Infrinatque sanguinis eruptiones, etiam si cerebri membranis effluat. Vlcerata quæ Cacæthe uocantur, & sedis, & reliquarum partium permulcet, tritum cum eo & lacte linamentum. Formicantes uerrucas inter initia, impetigenesque, ex aceto & pice illitum tollit. Ambusta igni, pernionesque cum suillo adipe, aut anserino, & ulcera in capite manātia cum Nitro, si infricetur, sanat. Paronychijs cum melle, auribus fractis cum pice, medetur. Ad reliquos aurium dolores cum dulci uino infunditur. Inflammata a partu mammae cum Cimolia, & Rosaceo magna utilitate perunguntur. Additur ad arteriæ, uiscerumque medicamenta. Prodest sanguinis excreationi potum. Sed in secunda uale tudine haustum insaniam mouet, & largius cum uino potum interficit. In fictili mūdo Thus crematur flagrante glebula succensum a lucerna, donec exuratur. Post perfectam uestionem operire oportet, usque dum restinguitur: sic enim in cineres redigitur. Aliqui ollulam æneo uase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem: ut in eius mentione mox ostendemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in furnum indito, cremant. Fictili etiam nouo uiuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut uaporem emittat. facile enim comminuitur, quod perustum non est.

Pli. li. 12. ca. 14.

B A R B A R I C O R O L L.

THuris arboris altitudo, ad quina fere cubita, ramis frequentibus, folio Piri, sed multo minore, coloris herbacei, modo Rute, leui cortice, ut Lauro. Alij foliū Lauri, leueque pdiderūt. Alij Lētisco similē, etiā fructu, folio subrutilo. Nonnulli proximam Terebinthio faciunt. Alij Terebinthū esse. Et hoc uisum Antigono regi, allato frutice. Sūt qui ex eadē arbore Thus, & Myrrhā manare putēt. Diodorus paruā, Aegyptiæ spinæ albæ, similē folio Salicis, flore aureo. Placet Theophrasto & Plinio sententia eorū, qui Lauro similē tradūt, qm̄ talis arbor fuerit Sardibus studio, Regum Asiæ delubro quodā fata, Iuba Rex contorti esse caudicis, siue ut placet Sō

lino, uiminis scribit, ramis Aceris, maxime Ponti: succum Amygdalæ modo emittere, talesq; in Carmania apparere, atq; Aegypto, cura Ptolomeorum regnantium confitas. E uirgis certe ad nos commētib; credi potest, matrē quoq; teretem, & enodi fructicare trünco. Thus col- lectum, & Myrrha quoq; Sabotam camelis conuehitur, porta una ad id patente, in delubrum Solis, quē Sabin uocant, armatis ibi custodibus, tabella sup struem posita, descripto, quemad- modum attulerint, quantq; indicent: mercatores tabellis perlectis, precium Thure sublato, de- ponunt: idq; absentibus dominis fit. Sacerdotes partem pecuniæ tertiam Deo reponunt, reli- quum dominis redeuntibus numerat: autore Theophrasto. Thus Spontinum præter Arabiā, nullis, ac ne Arabiæ quidem uniuersæ. Commendatissimum, quod spectat ad Persas, ut Stra- boni placet. Cæterum in medio fere eius Atramiyæ sunt pago Sabæorum, qui caput regni est. In Sabota mōte arduo, ab hoc mansionibus octo distat regio eorum thurifera, Sabaq; appella- tur. Solum id rubrum, e lacteo traditur. Siluarum longitudo passus. C. millia, siue ut aliq; pas- sus. V. & L. millia. Terra ibi argillosa, crustacea, raris fontibus ac nitrosis, p Mimeo, pro- ximum pagum euehitur, tramite uel singulis angusto. Hinc & Thus Minieum uocatur, ius in Thura. 300. esse familiarum dicunt: quæ ob id sacre dicuntur: & cum arborem uulnerant, nec foeminarum congressu, nec funerum pollui. Quidam promiscuum ius his populis esse perhi- bent in siluis. Alij per uices annorum diuidi. Duplex eius uindemia. Prior canis ortu cortice, qui pregnans & tenuissimus tenditur. Laxato, plaga non adempto, quod hæsit in arbore ferro depectitur. Ideo Corticosum. Tāta inter barbaros fides. Saucias arbores nemo custodit. Con- tra Alexandriæ, ubi Thus rude interpolatur, renouaturq; nihil tutum a fure. Autumno legi- tur, ex partu æstiuo. Hoc purissimum, & candidum, Carphiatum uocant. Sequens uindemia uerna, incisis per hyemen arboribus. Ruffum hoc exit, nec comparandum priori, Dathlathum appellant. Nouellæ arboris candidius, ueteris odoratius. In insulis melius, in Arabia suauius: quanq; in insulis nasci, negatur a Iuba Rege. Masculum Thus a specie testium uocari, sunt qui credat. Precipua gratia mamoso, cum hærente lachryma priore consecuta. Alia miscuit se. Sin- gula hæc manum implebant, cum tardius depecteretur. Hoc modo Stagoniam, & Atomum Thus uocabat. Minores guttas Orōbiām appellant. Inueniuntur tamen etiamnum guttæ quæ denariorum. 33. pōdus equent. Conuehentibus Thura, capitale est digredi uia. Decimas Deo mensura, non pondere sacerdotes Solis accipiunt: nec ante mercari licet. Inde impēse publicæ tolerantur. Nam et benigne certo dierum numero, Deus hospites pascit. Euehi nō potest, nisi per Gebanitas. Horum Regi penditur uestigal. Caput eorum Thomā, abest a Gaza, nostri lit- toris Iudææ oppido. 30. 38. millia passuū, quod diuiditur in māiones Camelorum. 62. Thure q conuehant commutant. Si quid in itinere opus est, queri in singulos camelos sumptus. Denari- um. 633. ad nostrum littus colligit: precium optimi, siclorum. 6. secundo. 12. tertio. 14. Refina Piceæ, nō quacuncq; adulteratur. Sed gemma ea quæ interuenit ei, tam similis Thuris, ut mixta uisu discerni non queat, & inde fraus. Laudatur in Thure candor, amplitudo, fragilitas. neu- dentem recipiat, potiusq; in micis frangatur. Omnia hæc cum Theophrasti, tum Plinij tem- poribus. Thus aut a uerbo græco, deos, aut sacrificiū significante, flectitur: aut certe a tulsis gle- bis, ut tunc latine scribi debeat. Porro cum dicat in fastis Ouidius, Thura nec Euphrates, nec miserat India Costum, uideri potest aliūde, q̄ ex Arabia in urbem comportari solitum. forte quoniam in Carmania quoq; nascebatur, unde ad nos inuehi non poterat: nisi transmissio amne illo: aut certe quia Chara oppidum Arabiæ nundinarium, haud procul Euphrate situm erat sinu Persico.

E X. M. V E R G. C O M M.

N Villas, qd̄ huiusmodi est sectiones habet. Græce, ἡ δὲ τοιοῦτος ἄκμος, manifesta signi- ficatione uocis eius, in cunctis quæ secari nequeat, aut nunq; secta fuerint. Estq; Dioscoridi sen- us. Thus, qd̄ natuiam habet guttæ rotunditatem, carere sectionibus. Diciq; ob id atomum, et testiculorum figura masculum appellari, primēq; bonitatis esse, qm̄ qd̄ uoluntatione, aut, ut Theophrastus ait, sectione in rotunditatem conformatum fuerit, in tāto bonitatis honore nō fit, & alijs ab illo differat notis. Prima em̄ Thuris laus est in eo, qd̄ sponte sua, rupro arboris cortice fluxit, & stillicidij rotunda forma, in arbore pependit. Quapropter & Stagonias. i. stilli- cidiare dictū est, σαγονας enim græci aquarum stillicidia dicunt. Eoq; tota res pertinet, ut osten- dat Dioscorides, quod huiusmodi fuerit Thus, nullo artificio hominis, sed spōte sua ea for- ma factum uideri. Quod etiam tale non erit, adulterinum habendum.

Vocantq; id Stageron, aut Entomon. &c. ἄκμος ἢ στάγρον καλούμενον. Apertum uictum est. Qui em̄ potest hoc loco atomum Thus dici, qd̄ in alio genere paulo ante decretū est. Aut quā

A

Theoph. lib. 9. cap. 4.

B

D I O S C O R I D I S

C sectionibus conformatum non dicitur: quod hic testatur in quadrangula figura secari, coniectumque in fictile, usque dum rotundetur, uolutari. Videor igitur constituere posse, non ἀπομύρ, sed contraria significatione ὑπομύρ legendum esse, ut rei conueniat nomen.

Et quoniam hic ait, in quadrangula fragmenta secari, sectionis etiam in nomine significatio sit. Indicaui sed nobis Theophrastum, qui de hac ipsa re agens, eadem uoce usus est, dicens, ὅταν ἂν βούληται ποιεῖν ὑπομύρ.

Varie præterea legitur, quæ in grecis aliquot huic coniuncta uox est. σάκρον, in alijs, hisque melioribus, stageros inuenta, habetque prima illa a Syagro Arabie promontorio, secunda a destillando rationem. Nobis in ancipiti, potior uisa quæ a destillando facta est. Videtur enim hic duo Thuris genera contrarijs appellationibus, aut diuersis saltem inter se discreuisse, cum prius illud Stagoniam & Atomum, secundum uero hoc, Entomum & Stageron uocari dixit. Differt autem Atomon, & Entomon, manifesta contrarij habitus significatione. Stagonia uero, a Stagero, quo a stillatio stillacidium. Optionem tamen in Stagero legentibus relinquimus, hoc ne malint, an ab Arabie promontorio Syagron, ita tamen, ut non Syagron, sed Syagrium gentilis nominis adiectiua forma legendum esse id sciant.

Quod sequitur deinde, in secundo bonitatis ordine. Orobias dictum, a quantitate nomen inuenit, & quod minoribus guttis concreascit erui, semen non excedentibus, sic appellatum est.

Quod autem illi coniectum est, καὶ ὁ ἴν σμίλω, ut fere in omnibus, siue ut in melioribus, καὶ ὁ μιλω legatur, diuersam coloris, aut loci in quo nascitur rationem habet. Nobis inclinatum animum, ut a colore sic dictum fuisse putemus: quando hic statim subiicit, quantitate minimum esse hoc Thus, & κισσέτιον, idest, ruffo colore, quarum uocum altera Orobias, altera melino, idest, luthco colori respondere uidetur, cui idem esse credimus, quod hic melioron.

Quid Copiscus significet, incertum nobis est. Nisi adulterinam ea uoce indicauerit Dioscorides, κοπίσκον enim grecis ψεύδεται, idest, mentiri significat.

Contra incipientes formicas, & impetigines cum aceto & pici inungitur, &c. In plerisque grecorum cum Rosaceo inuenitur, tria; deinceps numerata sunt, acetum, rosaceum, & pix. Et si Paulus ægineta capite de formicis, his aceto tantum utatur.

D Coacti sumus non multo post, negationem illic restituere, ubi de cremando Thure hic ait. In quo nunquam satis admirari alios interpretes possum, qui non senserint, cum præcipiat Dioscorides, incensum & ardens operculari, usque dum extingatur, ideo id iubere, ne cinesiat Thus, sed crematum integrum permaneat: ut in carbonibus ad ignem seruandis, quotidie fieri uidemus, qui igniti terra operiuntur, non enim cinerem, sed crematum Thus querit hic scriptor, cuius consumpta pinguitudine, reliquum medicinae usibus seruiat. Eum etiam sensum probatissimus mihi codex habet, ὅτω γὰρ οὐκ ἐκτεφροῦται, quod est, sic enim non cinesit.

Credimus etiam in extremo capite male legi, ὁρμήται δὲ ἰν χιρῶν μὴ κατακεκαυμένον. rei enim non responderet sensus. Non enim facile ob lentorem, & pinguitudinem suam, friatur non crematum Thus, ut indicant uoces illæ, sed quod igne omne id unguen amiserit, & coctura aridius factum fuerit, id facillime friatur, & perfectam cocturam Dioscorides hic ostendere uoluit.

Θαυρὸν λιβάνου

De Cortice Thuris.

C A P.

LXXXII.

P Ræfertur Thuris Cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, leuis, minime scaber, sine membranis. Adulteratur admisto Pini, aut nucis eius cortice: sed horum index ignis est. Siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam inceduntur, sed sine odore fumum eructant. Thuris uero cortex ardet, & cum odoris fragrantia uaporem eiacularur. Thuris modo uritur. Et uis eadem quæ Thuri, sed ualidior, astringentiorque. Quare cruentis excreationibus, uuluis fluctione laborantibus, in pello confert. Ad caua oculorum ulcera, cicatrices, sordescque efficax est. Tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Cortex Thuris. Plinius medicinas, nec Thuris, nec Myrrhæ priuatim exequitur: cum tamen Syracis & peregrinarum rerum multarum describat. Credo, quod usus horum uagus & amplior esse uidebatur, quæ ut loco uno includi posset. Arbor porro ipsa Libanos, & Dendrolibanos, lachryma uero Libanotos a Galeno dicitur. Interim, confundi usum cum cōperias. Sophocles, ut Galenus,

nus,

nus, Euripides contra Libanum pro lachryma, Libanaton p arboze Thuris accipit. a futeue Assyrio, cui nomē esset Libanos, in hūc fructū cōuerso, dictā grēci fabulant, quē, Deos studiosissime colētē, inuidi occiderit, hinc nihil esse Dīs Thure gratius. In Sabcis, & Larimnū odoris, ut inqt Strabo, prēstātissimi genus oritur: nec quale id sit demonstrat: quemadmodū, nec herbā illam in ora littoralī eiusdem tractus nascentem, suauissimi odoris, sed qui celerrime uānescat.

E X M. V E R G. C O M M.

Non male Thuris Corticem, corticosum Thus, dixerit aliquis. Quod enim in eo laudat, & medicinā insēruit Thus est, quo nisi turgēat cortex, inutilis erit: non ideo tamen sic intelligēda res, ut ex quacumq; parte arboris corticem hic laudet, sed ex ea tantum, in quam interioris lachrymæ impetus ingruerit, ruptoq; cortice destillauerit: quo loco omne quod in arbore hēsit, ferramentoq; auulsum, corticis aliquam crustam secum detulit, thuris Cortex dictus est, qui multo humore, a Thure non magnopere differt, ideoq; medicinā utilis est. Ea crusta lachrymæ coniuncta, simulq; allata a medicis, in proprios quos hic docet usus, a Thure separatur, priuatimq; aliquid magis, minusue poterat, quemadmodum eiusdem Thuris manna.

Tria enim hæc simul plerumq; in officinis & earum acerris inueniuntur, Thus, Cortex, & concussu elisæ Thuris micæ, quas latini uetēres aliquando Manna, aliquando Pollinem thuris dixerunt: substantia idem, aut non penitus diuersum, aspectu autem, & rei euentu diuersa.

De Manna Thuris. C A P. LXXXIII.

Manna Thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & Thus, sed in ualidiusculam. Sunt qui cribrata Pini refina, ac Polline, aut cortice Thuris contusi adulterant: sed hæc igne deprehenduntur. Neque enim æque suffitu aërium uaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, & permixtum suaue olentia odoris uirus habet.

B A R B A R I C O R O L L.

Manna Thuris, est Hypossina: quod Plinius, micæ concussu elisas interpretatus est. Vbi deprauata dictione, Mammæ, non Manna uulgo legitur. Id autem sit, gestarum arrentibus se glebis, ut inquit Aelius. Differt a Thure Manna, q̄ plus astringit, propter corticis fragmenta quæ remanent. Nam quod Thuris Chondros a grēcis dicitur, nos Thuris granum interpretamur, secuti Plautum in Penulo, Qui nullum inquit Thuris granum sacrificant. Est & genus Mannæ recentioribus dictum, & a sacris quoq; literis acceptum. De quo superius in Elæontē lite. Manes certe, uasis nomen est, & in Cottabo pars extantior ac prominula: quam Sophocles alieneum caput uocauit. Erat autem Cottabus, siue Cottabis uasarium, iocularis in conuiuio iactus conceptaculum, propositis uictori præmijs, quæ Cottabica uocabant: id quod ei iaculabantur, liquida erat materia, hoc est, id quod in poculo reliquum obmanserat, Latagæ, itemq; Latax appellatum. In eo uase pars, quæ sonitum reddebat percussa casu Lataginis, Plastrinx nominabatur. Sinistro cubito innixos, dextra molliter, & per gyrum iacere legimus erat. Cottabi mentionem in Plauto quoq; habes. Medici, Cottabum ex imperitia uocabuli, ut Athenus inquit, potionem a balneis, siue ut Phocion, uomitionem ante balneas uocabant, nō pridem inuentam, & sanitatis usu detestabilem, & ab Erasistrato uehemēter damnatam.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus superiore capite, omnem Thuris substantiam, in antiqua medicina trifariam diuidi, in Thus, Corticem Thuris, & eiusdem Māna. Nec aliud est, quod nunc dicimus, quā uoce hac in Thuris puluere tantum uetēres usos fuisse. Satis rem Plinius indicauit, cum ait, esse concussu elisas Thuris micæ, quæ attritu glebarum, in acerris subsiderent. A concussu etiam grēci ὑπόσιμα dixerūt, nihilq; illi simile cōmuneue est cū aërio melle. Quod posteriores a sacris Hebræorū literis accepta similitudine, Mannam dicūt, in alio genere, & diuersa potestate rem. Illi enim soluedi, huic adstringēdi uis est. In quo cauendum, ne similitudine nominis decipiatur aliquis, in antiquis, quibus in Thure semper, in aërio autē melle nunquā usus eius uocis fuit.

De Fuligine Thuris. C A P. LXXXIII.

Fuliginem Thuris sic facito. Forcipicula, lucernis accensas singulatim Thuris glebas, in nouam fictilem ollam concauam imposito.

C & æreo uase in medio perforato, deterfa diligenter forde, obtegito. Aliã admoueto, in altero aut utroq; labro, subiectus quaternũ digitorum altitu dine lapillis, quo facilius perfpici queat, fi urantur. Et qua locus capax fu erit, glebular alias fupponito. & antea quam prorfus prior gleba reftrin guatur, aliam imponito. donec fufficientem fuliginem uidearis aggregaf fe. Continuo tamen externæ æramenti partes fpongia aqua frigida made facta, abftergantur. Ita enim temperato æris feruore, fuligo omnis inhæ rebit. Quæ alioqui per leuitatem decidua, Thuris cineribus admifcetur. Derafa itaq; fuligine, cinis cremati Thuris feorfum fubftrahendus eft. Idem opus quoad fatisfactum tibi uidebitur, obeundum. Oculorum in flammationes mitigat. Fluctiones fufpedit. Vlcerata purgat. Caua explet. Carcinomata fiftit.

B A R B A R I C O R O L L.

Fuligo Thuris græce Lignys, & Aethalon, & Ethal nominata. Nam Lychnis herbæ coro namentariæ genus eft, ut liquebit. Et alio modo fcribitur dici Aetalida. Et Rubiginem fatorũ lego, & Achymiftis quoq; uideo Aethalen uocari diuinum laticem, unde philofophicũ illud pharmacũ, fiue lapis cõfiftit: a quibufdã Etefios, & Androdamas quoq; dictos, & aurũ poru lentũ, & alijs nominibus innumeris, ut Mazys, & p diminutionẽ Mazygion, & Chalcyriõ. Ali oq; Maza es ipm Iudeis fignificat. lidẽ fuligines Hemifomata, hoc eft, femi corpora appellat.

E X M. V E R G. C O M M.

Plutibus, ut obferuaffe facile fuit, fumos & hæretes ex eo parietibus & tectis fuligines græ ci appellationibus difcreuerũt. καπνὸν αἰθέραν λιγνὸν καὶ αἰσέραν dicentes. Nos fumi, & fuliginis tantum appellationibus, omnia indicamus, eamq; ob cauffam non licuit alia, quam fuliginis uoce Dioscoridis αἰθέραν uertere. Quæ eo differt ἀπὸ τοῦ καπνοῦ, i. fumo, quod fumus crallior nigriorque, & ex materia nondum fulgente flamma, aut ea deficiente furgit: αἰθέρα uero hæc tenuior, leuiorq; nihil aliud eft, quam ignis & flammæ impetus, qui quoniã fumi modo ni gra, contactu fuo reddit quæcunq; lambit, fumus etiam dicitur, eodem modo & fuligo a no bis dicitur. Tam quæ a græcis αἰσέραν a fumo facta eft, quã quæ λιγνὴ a flamma alicubi concre fcens eo colore materia aliqua. Ideo in græcis etiam, quorũ eft ditior lingua, promifcue p fu mo, fuligineq; omni, uoces illæ in ufu funt. Apollonius in Argonauticis fuis, appellauit καπνὸν fumum, qui ex attritu lignorum inter fe fieret.

De Fuliginis compofitione. CAP. LXXXV.

Simili modo e Myrrha, Refina, Styraçe, reliquisq; lachrymis fuligo excipit, ad eadem conueniens.

B A R B A R I C O R O L L.

Fuligo Myrrhæ, Styraçis, Refinæ lachrymarum omnium.

De Pinu & Picea. CAP. LXXXVI.

πίτυρ πικρά

Pinus & Picea generi eidem afcribuntur, fed quandam flagitat fpe cierum diftinctionem. Arborea uulgo cognitæ. Quarum cortex astringit. Prodeft tritus et illitus intertrigini, ulceribus summũ corpus oc cupatibus, ambuftisq; cũ fpuma argenti, & māna. Vlcerata delicatuloꝝ acri moniã recusantiũ cærato myrtino exceptus, ad cicatricem perducit. Tri tus cũ futorio atramento, ferpētia cohibet. Suffitu partus & fecũdas ei cit. Potus aluũ fiftit. Vrinam mouet. Folia eorũ trita & illita inflammatio nes leniunt. Vulneta ab inflammatione uindicant. Trita autem & decocta in aceto, feruenti collutione, dentium dolores mulcent. Hepaticis utilia

utilia sunt, drachmę pōdere in aqua, aut mulsa pota. Pineæ nucis cortex, A
& folia potu eadem præstant. Teda particulatim secta, si in aceto coquat,
& decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiam fit Spatha acopo-
rum, pessorumq; compositionibus idonea. Quinetiam earum cremata-
rum fuligo, ad librarij atramenti confectionem excipitur. Ea circumlitio
nibus efficacissime imponitur, quibus palpebras ornāt, coloremq; men-
tiuntur, calliblephara græci uocant. Arrofis oculorum angulis, callosis
glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulatur. Pityides appellantur
Pinorum, Piceæq; fructus, qui in conis inueniuntur. Vim astrictoriā ha-
bent, & aliquantum exalfacientem. Tussi, & pectoris uitij auxiliantur,
per se, aut ex melle sumpti.

B A R B A R I C O R O L L.

Picea ueteribus est, quam græci *πίτυς* fere uocant. Huius speciem Theophrastus. & Plinius
Phtiroponon, hoc est, pediferam, tineosamq; appellant, quia totis paniculis, non prima tan-
tum in parte, ut abietes, nucleos & minores & nigros habeat, sed ipsas quoq; paniculas mino-
res gracilioresq;. Sunt autem Paniculæ, nucamenta quædam, quæ e ramis arborum, Resinam
fundentium, callo squammatim compactili dependent in Larice. Negant aliqui florere Pi-
ceam, sed uice floris esse nucamenta illa, quæ *κίτλας* græci uocant, grossis præciduis, fici pro-
portione respondentia. Hæc compressiora maribus sunt, ac minus Resina madet, q; foeminis.
Præuenit germinatio huius, florem Abietis. quia paulo ante solsticiū erumpit, diebus fere
11. & ad proportionem fructificat post uergilias. Differt a Pinu Picea, q; pinguior ac tenuior
folio est, q; minus alta, minusq; recta, q; Pinus assurgit. Præterea, conū minorē, & magis al-
gentē, nucleos quoq; Resina pufos, obtinet. Vtriq; foliū capillamenti modo, prætenue, ac bre-
uifera uillosum. Vtraq; crassior, duraq; ceu Cupressus. Materies cādida, et Abieti similior. Pi-
nus uitis radicibus, nō repullulat, Picea repullulat, ut in Lesbō accidisse, Theophr. scribit, incē-
so Pyrræi mōtis nemore, qd Piceis scatebat. In quo scire oportet, Pliniū Larici tribuere, quod
Theophrastus de *πίτυς*, hoc est, de Pinu prodit. Decacuminatio, quā græci *ἐκακμήνη* appellāt,
Piceæ, Pino, Abieti, Palmæ, aliqui addūt & Cupressō, & Cedro, perniciem asferre phibetur.
Picea nauigij spectatur. In Cypro præstantior etiam, q; Pinus. Eadem & ad fabricas ceteras,
malleos grandiores, scādulas, cupas, & alia secamēta utilis: celerius tamē q; Abies, corrupti
tur. Vfus & in carbone metallis argenti. Montes amat & frigora. Feralis arbor, & funebri in-
dicio, ad fores posita, ac rogis uirēs. Iam tamē & in domos recepta, tonsili facilitate, rami penē
statim ab radice modici, uelut brachia lateribus inhærent. Hæc plurimā Resinam fundit, inter
ueniēte cādida gēma, tam simili Thuri, ut discerni uisu nequeat: & inde Seplasiariorū adulte-
ria, ut in Thure diximus. In Hispania & Piceastri sunt, ex qbus Resinā, unde Pix coquat, colli-
gunt. Pinus procera est. Hæc uectē sollicitatā, octo cubitis lōgiore effici, Theophr. affirmauit,
at ne sic qdem solida radice, sed abrupta. Germinatio coepta in Pinu, sicut in robore, Abieteq;
intermittitur: ideoq; turget ter, & terna edit germina: quod genus arbores *πριλόπων* appellan-
tur, qui ter inchoatum opus intermissumq; repetāt. Theodorus gaza, ter squamosas, interpre-
tatus est. Credo eum *πριλόπων*, non *πριλόπων* legisse. Germinatio prima Februario ineunte:
q; in mōte Ida serius, ac fere idibus. Secūda, mēse Martio, qua & omnis Galla gignitur. Apri-
li tertia, paucioribus interiectis diebus q; inter primam secūdāq; fuerant. q; tempora hæc
ad rationē latinā translata nō cōgruunt, ut in Galla de robore disputauimus. Ceditur uere:
ubi cortex tantum detrahēdus est, ad operū rotūda. Nā ad quadrata, ubi germinatio desierit,
& si ualidior quærat, etiā ubi fructum excoxerit. Sed rū uermiculi quidā sub cortice nascun-
tur, q; summo tenus caudicem nō erodāt, sed uelut inscribāt, unde quibusdam sigilla. Hoc nō
in Pino, uel Larice tantum euenit, sed in omnibus, quæ post fructus maturitatem cedūt. Et
illa cōmunis omnibus quæ cæduntur in arte, fabricæ distinctio, ut aliæ quadrifidos uenarū
cursus habeāt, bipartitos aliæ, uel omnino simplices, hoc est, ut Theophrastus inquit *τετραδ-
ων*, quæ Gaza meus quadriuiuas, & biniuiuas, & uniuiuas conuertit. errore manifesto, q; *τε-
τραδων* *δισων* *μονων* legisset. Nos in ea re Plinium, & Victruium autores habuimus.
Ex Pino nauigiorum rotunda fiunt, & onerarij carinæ: quanquam nec ex quercu negligunt.

καλλιόφρα

Plin. lib. 16. ca-
pice. 10.
Theophr. li-
bro. 5. cap. 10.

Theophr. lib.
5. cap. 2. & lib.
9. cap. 1. 2.

B

*

D I O S C O R I D I S

C Sed illa trirēibus idonea magis est, ut diximus. Aesculiores carbonem Pini querno praeferrunt: non quia uiribus parem, sed quod ad flatum commodius respondeat, nec ut quernus marcescat. Resina huius a germinatu tollitur, detracta prius teda. Ex omnibus resinas ferentibus, scadulas e Pino firmissimas esse constat, ex ceteris faciles omnino, sed imbecilles. Folium Pino, Pinaestroque aculeatum mucrone, praelongum, exile. Pinus fert minimam Resinam, interdum ex ipsius nucibus, uix ut ascribatur generi. Pinaester nihil aliud est quam Pinus siluestris, mira altitudine, & a medio ramosa, sicut Pinus in uertice. Copiosiores dat haec Resina. Gignitur et in planis eodem modo, Peuce dicta. Easdem arbores alio nomine esse per oram Italiam, quas Stibulos uocari Plinius existimat. Ego Strobilos legendum arbitror, e natalium cognatio ne ita dictas: sed graciles, subcinasioresque, & enodes. Liburnicarum ad usus pene, sine Resina, cura degenerant. Florem Abietis, Taxique praueeniunt diebus circiter .15. ab occasu uergiliarum. Eadem proportionem fructus suos afferunt. Aliqui genera duo faciunt. In Troade montanum siue Idaeum, recta, celsa, crassa materie, nucibus oblongis, uiridibus, sero dehiscens, utpote siluestrior, pice copiosa. Maritimum folio tenuiore, infirmioreque, cortice leuiore, & corijs utiliore quam Idaei. Nuce rotunda, breuique aperienda, ualida, & robusta materie. Alij, ut Macedones, marem intelligunt sterilem, breuiorem, folio duriore. Foeminam proceram, & folijs pinguius mollioribus, & simplicibus, atque non rigentibus. Lignum maribus retortidum, praecinctum medulla, durum, & ad fabrorum opera contortum. Nigrior radix foeminae, mollius, & omnino tractabile securibus. Pinus foeminam habet, quam graeci uocant agida, mellei coloris, pictorum tabellis immortalis, nullisque fissilem rimis, proximam medullae, cor Pinus a Theophrasto nominatum: quae in Abiete Luffon appellatur. Nascentur haec in foemina ditaxat, ut quae minus tedacea sit quam mas, leuigatior quoque, ac prior cursu meatuum. Ficem uocant Idaei tedarij, cum graduum arborum medullae securis adigitur. Quibus prostratis partes candidae ambienteque computruerint, colore uehementer abiectione, et neruo preternui. Nam id quod in Pinu rubidius Peda nascitur, mares potius habet quam foeminae: hoc maribus tantum accidit, & odore grauissimo est: neque tedam redolens, nec ardens, sed ab igni resiliens, Syce, non Statice dicta, ut in Plinio correximus. Pini morbus est, ut teda fiat, tam parte caudicis externa, quam corde, id quod abundantia succi, & ubertate larga luxuriantis naturae puenit. Mares hanc tantum ferunt. In quo noscendum, superiora, quae de Pino Theophrastum secuti diximus, omnia fere ascripta esse Larici a Plinio, ut premonuimus. Nec mirum, quando & perpetua fronde uiuent omnes, & in Macedonia, & Arcadia. Circa Elin permutat nomina: nec constat autoribus, quod cuique generi attribuatur. Larici ergo situs idem qui Piceae in montibus, eademque facies. Mareria praestantior longe, incorrupta uis, emori contumax, rubens, odore acrior: nec ardet, nec carbonem facit, nec alio modo ignis ui consumitur quam lapides: cum caetera quae pice & resina fundunt, immodice accensa, carbonem expuant, cum eruptionis crepitu, eiaculanturque longe. Plusculum huic melleo colore, atque lentiore nunquam durascentis. Teda uero proprie dicta & a graecis *δαρ νηδ*, *δαδιν* uocata. Sed & sui generis arbor in Illyrico est, redudantior humore quam reliqua, parior, liquidiorque, quam Picea, flammis, & lumini sacrorum quoque grata. Improprie uero, tedas appellamus, tum clia quoque ligna, quae flamma olei uel picis illitu concepta, faculae modo luceant, tum piceae satuae partes imas, qualem in Nucleorum pincorum capite monstrauimus. Ex his quae dicta sunt, constat in Europa sex haberi genera cognatarum arborum, quae resinam ferant, Pinum, Pinastrum, Piceam, Abietem, Laricem. Tedam. Addi potest & septimum, Piceaster in Hispania. Pinum uoco, piceas nuces ferentem: quam graeci *χαρον* appellant. Pinastrum & Laricem, quam *πικρίν*, in Troade uisenda, magnitudine .14. pedum ambitu, altitudine duorum iugerum, praetereaque cubitorum quindecim. Piceam, quam *πίτυς*, & poetae blorem, ut quidam rentur. Tedam porro, quam *δαρ* & *δαδιν*. Atque omnia haec Plinium sequentibus. Nam Theophrasto, Pinus atque Larix idem, quemadmodum saepissime testati sumus. In Palladio corrupte legitur Tinus, pro Pinu. Idem autor Lignum gallicum uocando, aut Laricem, aut ei simile quid significat, ut multi sentiunt.

Theophr. li. 9.
capite. 1. 2.

Pityda fructum Piceae, Dioscorides uocari scribit, itemque Pini: sed improprie, ut Galenus intelligit. Plinius e Pinaestro nuces ita nominat. Hippocrates Pityda, pro resina e Pinu, siue Picea potius intelligit, ut eidem Galeno placuit.

E X M. V. E. R. G. C O M M.

Arborum quae mastichem, resinamque, & pices destillant, tanta est in destillado similitudo, & tam multa in natalibus, earumque appellationibus mixtura, ut nihil in Theophrasto, Plinioque, et alijs incertius legatur, alijs temporibus eiusdem rei, non eiusdem appellationibus utentibus, & inuicem eas commutantibus. Nos diligenti obseruatione eorum, quae Theophrastus, & post eum Plinius, amboque pluribus locis tradiderunt, graecam Pityn tuto, & communi omnium in ea uoce consensu. Piceam

ceam uertimus, & πέννη tedam: eo, præter multa alia argumento usi, quod hic ipse scriptor, A non multo post hæc de liquida pice dixerit, συνάγει μὲν ἐν τῶν λιπαρώτων φύλων πίνακα καὶ πί-
tuos, quod est, collige præcipue picem, ex pinguiissimis lignis peuces & pinyos. Quod totum Plinius pariter indicauit, copiosiotem resinam, & liquidam Picem fieri ex teda & picea testa-
tus. Poterat & multis alijs argumentis idẽ confirmari, sed nos his quę in Theophrasto, Plinioq; & gicis, latinisq; alijs legi possunt, Cõmentationes has nostras, impudenti alienarũ opum co-
aceruatione augere nolumus. Poterunt uolentes lib. 16. cap. 11. Plinium, & Theophrastũ, omni-
bus fere libris, de Plantarum historia uisere, omniaq; cognatarum arborũ discrimina, in tam
grauibus scriptoribus certius cognoscere, & cognita grauius censere.

Quod deinde Dioscorides ait, Picæ Tedæq; corticem, in teneris corporibus ulcera ad ci-
atricem perducere, τριφιδόχρωτων, non ad genus uitæ tantum, ut Ruellius uertit, sed ad illud
& sexum & ætatem referendum etiam est, pueros inquam, & in delicijs et umbra agētes, qua-
les foemine sunt, eorumq; corpora. Sic enim antiquiores gręcorũ medici usi ea uoce sunt, ἀπα-
ρὰ σαρκὸς καὶ σκληρόσαρκα, id est, teneræ & duræ carnis, ex ætate sexuq; & delicijs appellantes. Sic
Paulus Aegineta capite, de uulneratis neruis, uocibus illis usus est.

Diu post hæc nos torfit, qđ in græcis omnibus legitur, σάβη δὲ τῆς αὐτῶν γίνεται εἰς ἀνόπλιον
συνάγας καὶ πινύων ἐπιθήσεις. Et nos uertimus. Quinetiam densandis in cõfectione acopis, pel-
fulisq; eadem omnia materia apte utuntur, concinniorẽ sensu, qđ si rude, quæ ad subigendum
liquida, nõssimum instrumentum est, ex his arboribus facta, subigi in cõfectione ea dixisse-
mus: pro quo sensu, non σάβη foeminino genere, sed neutro σάβημα legendum illic erit. Est au-
tem σάβημα, ut græcorum leuica indicant, πύνωμα, id est, defatio: factaq; ea uox est, quod quæ
telarum modo texuntur cultellata, huiuscemodi spathe percutiuntur, percussaq; densantur. ex
qua similitudine hic ait, harum arborum materia densari acopa & pessulos. Non tamen dāna-
mus aliam illam lectionem. Potuit enim antiquitas, in his quæ ad acopa & pessulos coqueren-
tur, rude ex his arboribus facta, uti: sed illa aprior uisa sententia est.

De Pineis nucibus.

CAP. LXXXVII.

N Vces Pineæ cum repurgatæ manduntur, aut cum passo, aut Cu-
cumeris semine bibuntur, urinam ciēt. Acrimonias in renibus,
aut uestica hebetant. Stomachi rosiones leniunt, datæ cum Portulacæ suc-
co. Virium infirmitatem roborant. Corruptorum quoque humorum la-
bem obtundunt. Pineæ nuces recenter arboribus decerptę, in passo fran-
guntur, & decoctæ, uetustæ tulli ac tabitudini conferūt, si quotidie ex eo
liquore terni cyathi bibantur.

BARBARI CÖROLL.

N Vlei Pinci, græce Strobili dicuntur. Quāquam Strobilos, & tripudn̄ genus est, siue sal-
tationis, apud Iulium pollucem. Galenus etiam Coccalos uocat, nucleos eos in Hippocrate.
Sunt qui Coccalos, non pro nucleis Pineis, ut cæteri, sed pro Cocco gnidio accipiāt, ut idem
Galenus ex alterius Dioscoridis sententiā testatur. Arbor ipsa Conos &, quandoq; Strobilos.
Cũ decocti melle sunt in taurinis, Aquiceli nominātur. Dulciarij quoq; genus quoddam ex
uua passa, Nucleus pineus, ex amygdalis una tostis, Conos, appellatur apud eundem Iulium
Pollucem. Nuces ergo Pineæ, grandissimæ, altissimæq; a terra suspensæ, Intus exiles nucleos,
lacunatis toris, ferruginea tunica uestitos, contegunt. Nuclei Pineę quaterna genera. Durum,
qđ & uulgare. Tenerũ, & putamine digitis fragile. Ideoq; auibus expositũ, Tarentinam uoca-
bant. Tertiũ e Picea satiuā, nucleorũ cutē mollissimum, adeo ut simul mādatur: qđ attore Plī-
nio Sapiũ uocetur, & Nucleis. quanq; uerbũ Nucleis in eo melius fortasse pro nucibus Sapi-
neis, qđ pro arbore ipsa capitur. 16. uolumine. Pliniani cerre codices, libro quinto decimo, non
Sapium, sed Apinum habet. Nos Apium, & Indicis, & inscriptionis, & exemplariũ, quæ ma-
nu scripta sunt argumento, legimus, & Columellę, apud quem nux Sapinea legitur. Quidam
Apinas, a uilitate dictas arbitrat̄es, literam, S, dictioni ueræ detrahūt. Imas arboris huius par-
tes, ut idẽ inq; Plinius, tedas appellamus. Omninoq; nihil aliud, qđ Picea est, feritate paulũ mi-
tigata satiu. Nā Sapius, siue Sapinea, Fusternæ pars est Abietis inferior: nõ ut Seruius scribit,
species Abietis apta nauibus. Nā sup̄na eius arboris, a duricia nodorũ, Fusternę simpliciter ap-

B

Theophr. lib.

3. cap. 10.

Pli. li. 23. ca. 9.

et lib. 16. ca. 26

Theophr. lib.

3. cap. 10.

Pli. li. 23. ca. 9.

et lib. 16. ca. 26

D I O S C O R I D I S

C pellatur. Vtriusque meminerunt, & Plin. & ceteri. Mouit hominem gramaticum, Varronis credo autoritas parum intellecta: qui dixerit in moranis, plixiores uenire Abietes, et Sapinos, firmioresque propter frigus. Quantum Pityides: quas proxime descripsimus. E nucibus quoque Pineis non nihil Resinae colligitur.

De LENTISCO. CAP. LXXXVIII.
Lentiscus nota arbor est, cui uis inest astringendi. Semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusque cognatae insunt uires. Liquamentum autem ita fieri solet. Folia, cortex, & radix in aqua coquuntur, & ubi abunde cocta sunt, folia abijciuntur. Aqua denuo coquitur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua astringendi dote, ualet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item contra eruptionem sanguinis e uulua, & eiusdem, aut sedis procidentia. In totum acacie & hypocyttidis uice representat. Idem facit succus e tritis folijs. Decoctum fotu caua explet. Et fracta ossa ferruminat. Vulvae fluctiones sistit. Nocturnas arceat. Urinam pellit. Motus dentium collutione stabilit. Virentes surculi calamulorum uice dentibus repurgandis affricantur. Fit e semine oleum, quod prodest cum quid astringi opus est.

B A R B A R I C O R O L L.
Lentiscus, *σχίνος* a graecis uocata, Resinam ubique sudat. Mastiche uero dicta in Chio tantum insula. Lentisci fructum, Hippocrates Schinida nominauit etiam, si tamen (librariorum culpa) non Schinides, sed Schoenides legendum esse, sicut & Cechrides pro Cedrides. Lentisci folia, quibus modo pelles excoriarij conficiuntur apud nos, iudaico lunco, plurima ex Illyrio conuecta, & uulgo Folia dicuntur. Plinius Lentiscum Italicam dicendo, uidetur praeter Chiam alia quoque genera nouisse. Fructus initio rubet, post nigrescit: qui & Sabuci specie, in racemis depedit, folio Pistacij, sed minore, per extremitatem rubente. In summo siliquae Pisorum, sed corniculi modo intortae: in quibus Resina odoris iucundi continetur. Romae demonstratur in ruderibus. monumentisque Lentiscus, folliculis inanibus & deformibus. His confractis, culices euolant frequentes.

E X M. V E R G. C O M M.
Potior quam nunc sit, quondam Lentiscus fuit. Et si, testante id Plinio, Ciceroni credendum est, rustici plebi necessaria, quae coeli, et in eo syderum imperita, arandi suorum operum auspicia ex propinqua arbore certius cognoscere posset, nihil enim nobis occultum natura, in discipula ruris esse uoluit. Ciceronis uersiculi hii sunt.
Iam uero semper uiridi, semperque grauata
Lentiscus, triplici solita est grandescere saetu,
Ter fruges fundens, tria tempora monstrat arandi.
Exprimitur succus e radice &c. Non in omnibus legitur refrigeratis, sed obiectis tantum. Nos autem illud adiecimus, in probatissimo omnium codice inuentum, in quo legebatur. μετὰ τὸ ἰσχυταί καὶ φηναί τῶν φύλλων ῥιπτομένων.

De Resina Lentiscina. CAP. LXXXIX.
Lentiscus resinam gignit, quae Lentiscina cognominatur, & ab aliteri. Stomacho auxiliatur, sed ructum mouet. Additur in dentifricia, & illitiones faciei, ad nitorem cutis conciliandum. Palpebras oculis incommodas replicat. Manducata halitum oris commendat. Gingiuas contrahit. Optima & copiosissima in insula Chio prouenit. Praefertur Nitedulae modo resplendescens, & candore Tyrrhennicae Ceræ similis, adulta, friabilis,

bilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur A
Thuris, Resinæq; mistura.

BARBARI COROLL.

Resina Lentiscina, in Chio Mastiche est. Importatur & ex India, quadā e spina Mastiche. Pli. li. 12. ca. 17.
Item ex Arabia, Lamā uocat. Sed ex Asia et Græcia ueræ q̄ simillima Exixme herba; quā The
odorus gaza Chamæleonem album intelligit, & Carduum Pineam appellat; id autem q̄ re
ste, diximus inter herbās. Ex Lentisco Chia, gummi modo nascitur, nigra, & candida. Preciū
candidæ in libras. 10. nigræ. 12. Ex Ponto quoq; uenit mastiche, bitumini similior atq; nigra, ui
no cōdendo. Cæterum laudatissima inter omnes, Chia, candida. Adulteratur ut thura, resina,
ut Plinius ait. Sed ut Dioscorides, Thure et Resina. Galenus in duo genera colligit. Nigram, et
Candidam. Nigram Aegyptiam, Candidam Chiam, uocari prodens. Ex Aegypria unguentū
aut oleum fieri solere negat. Non arbitror quēq; monendum, q̄ longe a uero sint, qui Masti
chem & Silphio non separant.

EX M. VERG. COMM.

Rassa, friabilis & odorata. Græce sic, ἀσπὰ, καὶ πύρα, καὶ ὑσπύρις, καὶ ὑδάρις. Vitiosum no
bis uidetur, credimusq; secundam illam uocem πύρα, aut aliam quandam fuisse. Aduersatur
enim superioribus, nec potest aliquid simul candidum, quo colore hic Mastichem, & aliq̄ oēs
laudauerūt, & πύρα, idest, ruffum, coloreq; ignis esse. Quam ob causam nos eā expunximus,
non inuenientes, quam similem illi aliam uocem substitueremus: ibidemq; monstrante id re
ipsa, in fraude & adulterio Mastiches, resinā Pineam adiecimus, sic in melioribus græcis legen
tes, disiunximusq; Thus, & Pineam resinam, eadem ueterum codicum fide admoniti. quoniā
alterū satis esset, nec omnis resina id præstare possit, sed Pineam tantum, quæ colore candido in
concolore Mastiche facilius falleret.

Quam diximus præterea acum harundineam, nihil intelleximus aliud, quam in purgan
dis a cibo dentibus, acuminatam harundinis festucam, pro qua ex Lentisco facta, usi ueteres
sunt, & nostra ætate adhuc elegantioris uitæ homines utuntur. Nam κακὰ ἰδιώτα græci, proprie
dixerunt acus ex harundine factas, quibus mulieres cincinnos & uelamenta capitis firmarēt,
quod nunc æreis, aut argenteis fit.

De Terebintho. CAP. XC.

Terebinthus cognita arbor est, cuius folia et semen & cortex astrin
gunt, & ad eadem ad quæ Lentiscus conueniūt, simili parata mo
do, sumptaq;. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur. Excalfa
cit. Vrinam mouet. Venerem excitat. Contra phalāgiū morfus con
uenienter in uino bibitur. Resina eius ex Petra Arabiæ oppido deferatur.
Prouenit etiā in Iudæa, Syria, Cyprio, Aphrica, et Cycladibus insulis. Sed
præualeat candida, perlucida, uitreo colore. & in cæruleum uergente, odo
rata, Terebinthum olens. Terebinthina resinas omneis antecedit. pro
xima Lentiscina, & e Pinu, & Abiete. Has sequitur e Picea & Pineis nu
cibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare.
Tussi ac tibi conueniunt per se, aut in eclegmate ex melle. Vitia pectoris
expurgant. Vrinam cient. Cruda concoquunt. Ventrem emolliunt. Pal
pebras commodissime replicant. Lepras tollunt, cum erugine ac sutorio
atramento, nitroq;. Auribus saniem emanantibus, item in pruritu geni
tium utiles. Malagmatis, acopisq; ammiscentur. Laterum doloribus il
litu, aut appositu auxilio sunt.

BARBARI COROLL.

Terebinthus, τερβινθος græce dicta. Messibus tritici, aut Paulo serius fructificat. Mas sterlis.
Femine distinguuntur. Aliæ fructum protinus rubentem, magnitudine Lentis edunt; qui con
coqui non potest. Aliæ uiridem, pallidumue primo, demum rubentem, nouissime cum uua

D I O S C O R I D I S

C maturefcentem & nigrefcentem, qui & odore iucundior, amplitudine fabæ. Interim maiorem, & refinofum tactu, fulphurofumq;. In Troade, circa Idam, et Macedonia, brevis, et fruticofa, & contorta. Damafco Syriæ in fignis, copiofa, decore afpectu, ubi mons Terebintho, nec alia filua fcatens. Materies admodum lenta, radicibus ualidis, adfifq; in profundum, fidelis ad uetuftatem. Flos racemofus, oliuæ modo, fed rubens. Folium numerofum, ab eodem pediculo. Figura Lauri, digefio in uerfus, ut Sorbo. Vnicum ad cacumen exit, & numerum parem cõ-
turbat; minus tamẽ angulata funt q̃ Sorbo, & fimiliora per ambitũ Laurinis uidentur. Oleo fa quoq; ut fructus. Fert & nucumenta quædam caua, ceu folliculos, Vlmi exemplo. In qui-
bus animalia quafi culices erũpunt. Et refinofus lentor, qualis e ligno, unde fit refina. Fructus q̃dũ maturus non eft, in aqua fere fupernatat. Niger fidit. Vulneribus pfundis, ut Abies, & quæ refinã tedamq; ingerunt. Fecundior efficitur contra quam cæteræ arbores. Materia uehe-
menter nigra, fpiffa, fplendida. Præcipue in Syria tantum, ut Hebenum quoq; prouocet. Cul-
tellis ex ea capulos, & calices Thericleos detornant, tam feliciter, ut a Figlinis internofci ne-
queant. Thericlei porro calices Athenis clari habebantur. Nomen ab inuẽtore datum, qui
Aristophanis ætate fuerit: fũe, ut alij putant, a detornatis in eo beluarum pellibus, facrũ Bac-
cho poculum facere. Cæterum falfo quidam extimauerunt idem effe quod Carchefium, cum
hoc confet antiquiffimum pateræ genus fuiſſe. Nam poculum, quod Alcmenæ Iupiter, in fa-
ciem uerfus Amphitriõis eius coniugis dono dediffe fertur, Carchefium uocatum perhibet,
multis poſt feculis Lacedæmone feruatũ. Terebinthus ad refinam tollendam poſtq; germi-
nauerit, inciditur: id quod in omnibus refinam fundentibus cuſtodiendum eſt.

E X. M. V E R G. C O M M.

Quia extremæ iniuſtitiæ eſt, ſua gloria aliquem defraudare, nec magis in homine lau-
dandum conſtantia animi, & reddendi unicuique quod ſuum eſt, non pigebit, The-
ophraſti manibus & nomini hanc gratiam habentes, ex quo cunã diuerſis locis de Terebin-
tho ab eo tradita, præterito eius nomine, Barbarus pro ſuis in Corollarij commentationibus
edidit, græcam eius ſcriptoris de Terebintho, mox latinam omnem hiftoriam huic capiti adij-
cere: ut poſſint uolẽtes (quod reſati paulo ante ſumus) aperte cognofcere, obiterq; in telligere
græcarum literarum peritiõres, in uertendis græcis, hominis neſcio celeritatem, an negligentia
am potius dicam, qui Plinium & Theophraſtum ſimul miſcens, *θυάδιον*, ex Plinio iucundi-
orem, ex Theophaſto, fulphurofum uertit, non animaduertens ab utroq; idem dici.

In quo parum caute egit, ratus *θυόν*, quod græcis ſulphur ſignificat, idem effe quod *θυά*, &
θυάδιον græci idem dixerunt, quæcunq; ſ. in ſacrificijs et aris ad fuſſitus & uapores incendendi.
Quod tam manifeſte patet, ut probari non oporteat, uideturq; Gazam, Theophraſti inter
pretem, in ea re ſecutum eſſe.

Idem etiam, quod erat *ἀντρον*, uertit, qui concoqui non poſſit, cum tamẽ de coſtura ci-
bi quæ in ſtomacho fit, Theophraſtus eo loco non agat, ſed de maturitate quæ calore fit, & ſi
milis coſturæ ſtomachi eſt: parum memor, *πικτυν* utrunq; ſignificare, & Theophraſto in hijs
quæ maturantur peculiarem hanc uocem eſſe. Nam & in medicina *πικτυν* etiam dicuntur,
quæ abſceſſus, & collectiones maturant.

Poſſemus & multa alia hijs adijcere, ſed hæc ſatis nobis eſſe uolumus: ut hoc quaſi guſtu
meminerint legentes, & ubiq; ſciant, nihil non alienũ in eo eſſe. Nec morte præuentum potuiſ-
ſe extremam & ſalutarem illam manum his quæ conceperat appoſuiſſe, oportereq; eos, qui in-
tegram rem nouiſſe uelint, primos eius autores conſulere, nec nouis ſcriptoribus tm defer-
re, ut ueterum obliiti, quemadmodum in cantu & muſica fieri Homerus dixit, nouiſſe quæ tan-
tum amemus & admiremur.

Terebinthum poſteriores grani uiridis arborem dixerunt, facto illi nomine ab eo eius ge-
nere, quod fructus ſuos in uiridi pallidos fert: quod Theophraſtus *χλωρόν* dixit, quaſi herba-
ceum. Ex ea Terebinthina deſtillat refina, omnibus notiſſima, in quotidiano medicinæ uſu, de
qua cum ſemel agere Dioſcorides cepiſſet, de reliquis etiam egit, cognata congeneribus ſuis
coniungens. Noſq; ut in melioribus græcis adhuc legitur, conũuata hiftoria, uno tm titulo et
capite omnia complexi ſumus Refinæ genera, inter quæ Larignam ex Larice collectam hic nu-
merat, a Viſtriuio præcipue in architectura, & medicina laudata. Qui libro. ii. de materia a-
gens, Laricem his uerbis commendauit.

Larix uero, qui non eſt notus, niſi in his municipalibus, qui ſunt ad ripam fluminis Padi,
& littora maris Adriatici, folijs eſt Pini ſimilibus, habetq; refinam liquidam mellis Attici colo-
re, quæ etiam philiſcis medetur. Credimusq; nos, eam nunc eſſe, quam Venetijs deſlexa a La-

D Nos breuitati
cõſulẽtes, da-
ta opa eũ locũ
abbreviaui-
mus: ne & in
imẽſũ creſce-
ret cõmentari-
us, & q̃ ne ad
eruditionem
quoq; nobis
aliquid facere
uidebatur.

rice appellatione, Larga, officinae & uulgi appellant. Si quis autem uelit totam Laricis historiam naturamque nosse, Victruium libro illo, & Plinium pluribus locis lib. 16. & 24. Palladiumque in Nouembri mense legat. Sunt enim scriptoribus his, & huic, omnia fere communia. Quod in coctura Picis passim legitur, *ἄλλο δὲ χύμας οὐκ ἔστιν ἰσχυρόν* ἢ *ἰσχυρόν*, ex meliorum codicum lectione, *ἢ οὐκ ἔστιν*, idest, alienum uertimus, praesertim ostendente id Plinio, qui libro. 16. hoc modo coqui praecipit. Verba eius sunt, Alij utilius putant, sine aqua coque-
 relento igne tota die, utriusque uale aeris albi.

Deliquida Resina e Pinu & Picea. CAP. XCI.

Liquida Resina e Pinu & Picea, a Gallia & Hettruria conuehi solet, atque olim a Colophone petebatur, hinc Colophoniae sibi cognomentum uendicauit. A Galatia quoque Alpibus contermina, quam uernaculo nomine Laricem appellant incolae. Ea in linctu magnopere praestit tussi ueteri. Colore inter se distant. Siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, ut Larigna. Cupressus etiam liquida fundit resinam, quae ad eadem pollet. Quae uero spissarum generi ascribuntur, quaedam ex Pineis nucibus, aliae Abiete, aliae Picea & Pinu exierunt. Eligi debet longe omnium odoratissima, translucens, non ruffa, nec humida, quandam cerae faciem praebens, & friabilis. E Picea et Abiete resinae, ceteras antecedunt, odoratae enim sunt, atque Thus odore imitantur. Praestantiores a Pyriusa insula deferuntur, quae secundum Hispaniam sita est. Sed quae e Picea, nucibus Pineis & Cupresso manarunt, nihil ad illas, nec tantis uiribus potiuntur. Verumtamen eorundem gratia ut illae sumi solent. Lentiscina Terebinthinae correspondet. Vritur Resina omnis liquida in uase quadruplae capacitatis ad humorem, qui in funditur. Itaque Resinae congius, in duobus aquae pluuiarum coquitur, subiectis leuibus prunis, Resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & stridula reddatur, ac digitis cedat. Ceterum ubi refrigit, infictile non picatum, quod Aconitum uocant, idest, non illitum, recoditur. Fiet etiam eximij candoris, si Resina omnis eliquata praeoletur, quo faculenta sordes excernatur. Vrantur quoque sine aqua, primum lento igne, & ubi coire coeperunt, maior carbonum strues supponitur, & tri duo citra intermissionem discoquuntur, usque dum suum odoris uirus exuerint, mox ut dictum est, reponuntur. Spissam unius diei spacio decoxisse satis est. Vnde odoratis malagmatibus, & acopis, & unguentorum colorationibus magnopere utiles sunt. E Resina perinde atque Thure fuligo excipitur, ad circumlitiones idonea, quibus palpebras fucant, & colore metiuntur. Prodest glabris genis, collachrymationibus, erosisque oculorum angulis. Ex ea fit atramentum scriptorium.

BARBARI COROLL.

Resinae, multis arboribus leguntur, omnibus incilis a germinatu. Sed uarie. De Pinu, teditum detracta, de Abiete, ac Picea, ligno prae gustato: de Terebintho, radicibus, ramis & caudice uulneratis. Sed melior, quae defluxit in caudice. Optima Terebinthina est spissitudine, leuitate, odore. Secunda bonitas Abietinae, ac Piceae. Copiosissima, ponderosissima, Picis propria, e Pinu est. Portatur utriusque liquida. Tum sponte crescit, autore Theophrasto. Nam Plinius.

D I O S C O R I D I S

C nius, minimum Resinæ de Pinu colligi scribit. Credo, quia Pinus Theophrasto Larix est, ut diximus. Resinam piceam, quæ sicca sit, aridissimam inter omnes prædicat Aetius: eamq; Pitynon Physema, priuatim dici meminit.

Resinam greci *πίτυν*, *πύριν* quandoq; Paulus uocauit. Hanc ex Pinu & Picea siccam esse, Plinius intelligit. Dioscorides ex hisdem arboribus alias esse siccas, alias haberi liquidas uult. Item, liquidas e Terebintho, Larice, Lentisco, Cupresso. Nam & ex ferunt in Asia, Syria q;. Falluntur uero, qui eandem esse putant, e Picea atq; Larice. Picea pinguem, & Thuris modo succosam fundit, Larix gracilem, colore mellis Attici, ac mellei etiam liquoris uirus redolentem. Illud notauimus, tam arborem ipsam, q; eius Resinam uocari Laricem. Potest & Larigna ut Illigna dici: nam & castellum in fluminis Padi ripa ex eo ligno conditum, Vitruius Larignum appellauit. Oribasius, atq; Paulus Resinæ genus Italiæ tm nascentis, *ξύλα δρυ*, hoc est, lignosam comendant in Dropacem. Fortasse hanc intelligentes quæ Dioscorides Tyrreniâ, siue Gallicam uocauit, uel Corticatam Columella. Resina laudatur, nationum Cypria, Syriaca. Vtraq; mellis Attici colore. Sed Cypria carnosior sicciorq; antecedens omnes. In sicco genere candida. In omni montana & capestri, præfertur Aquilonia. Terebinthi tenuissima est. Cupressi acerrima sapore, trassior Cedri, & faciendis picibus idonea. Arabica alba est, acri odore, difficilis coquenti. Iudaica collosior. In Asia, quæ fiat ex Picea, admodum, ut Plinius inquit, candida Sphagos, siue ut legi maluimus, Epargos, a candore dicitur. Liquida, raro utuntur medici, et in ouo fere. Nec Pineæ magnopere in usu. Cæteris, non nisi decoctis. Resina oleo dissoluitur: utiq; ad malagmata, ufuscq; uulnerum. Quidam & creta figlinarum hoc fieri arbitrantur, in portiones amaris amygdalis. Colophonia, præter cæteras fulua. Si teratur, alba fit, grauior odore: & ob id ab unguentarijs neglecta. Abietis resina, ut Larici teda, uisum est. Exiguam Abies sudat, aliquando contactu solis. Inuenio & Acernam resinam, hoc est, Zygian, in compositione, cui nomen est Baion. Est enim Zygia tertium genus Aceris, rubens, ligno fissili, cortice liuido et scabro: quod alij Carpinum uocare maluerunt, ut Vitruius, a iugis, quæ hucus ex hac arbore fieri solent.

D Resina Picea, si cum aqua leuius decoquatur, coleturq; lentescit, colore ruffo, Stillaticiaq; dicitur. Eliguntur autem in id fere uitia resinæ, corticesq; Picea uase aeris albi. Terebinthina in fartagine referuenti coquitur. Est & illa temperies ad crapulam. Flos crudus Resinæ cum multa assula tenui, breuiq; auulsus conciditur ad cribrum minutum. Deinde feruenti aqua, donec coquatur, perfunditur. Huius expressum pingue præcipua Resina fit atq; rara: nec rursi paucis in locis subalpina Italiæ, conueniens medicis Resina: quæ coquenda sit candidissima, requiritur. Porro sciendum est, aliud esse resinam comburi, aliud coqui. Si proprie loquaris, uritur ad fuliginem: coquitur uero, quia crudæ usus in medicina fere nullus, nec extra quæ in ouo, teste Plinio.

De Piceliquida.

C A P. XCII.

πίτυν, κωμην

P ix liquida, quam alij Conum uocant, e pinguiissimis Pini Piceaq; lignis congregatur. Optima est splendens, sincera, leuis. Contra uenena, phthisin, purulentam excreationem tussim, suspiria, et pectoris humores qui difficile extussuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonsillarum, & uuarum inflammationes, anginaq; utiliter perunguntur. Purulentis auribus infunditur cum Rosaceo. Et illinitur cum trito sale serpentium moribus. Adiecta uero pari cæra, scabros ungues extricat. Tubercula uuluarum, & duricias sedis, discutit. Cum farinaq; hordeacea, & pueri impubis urina decocta, strumas rumpit. Cohibet ulcera quæ serpunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut furfuribus illita. Cæterum cum thuris manna & cærato subductos ulcerum sinus conglutinat. Rimis sedis & pedum, magno auxilio illinitur. Vlcerâ replet, & cum melle purgat. Quin & cum uua passa & melle carbunculos, & putrida ulcera emarginant. Erodentibus medicamentis, quas Septas uocant, probe immiscetur.

B A R B.

BARBARI COROLL.

Pix, nihil aliud est q̄ fluxus combustæ in teda sua Resinæ. De Pinu fere omnis, ut Theophrastus inquit. Quamquam in Syria Terebinthi quoq; picem ferunt: quia desint ibi Pinus. E Picea quoque, Cedro, Palma colligitur. Pix hyeme frigida, dererior, minus copiosa, decolor. Vbiq; optima, ex apricis Aquilonis situ. Ex opacis horridior, uiriusque preferens. Ex Idæa & montana Pinu largior, coloratior, dulcior, odore gratior, utiq; cruda: quoniam decocta multum deperdit: propter serum, quod in ea continetur abundanter. E Paralia, hoc est, maritima, flauentior & crassior, q̄diu Resina est, uidelicet q̄diu cruda: sed decoctio ex ea, prius absumit. Idæa Tedosior, e pari modo tedæ. Imbribus admissis, q̄ squaloribus, pix abundantior & liqui dior excipit. Hæc Idæi, priora Macedones. In Ida Pinus aperiuntur parte solari, ablato p uulnus cortice, binis, ternisue a terra cubitis, cum plurimum, singulis cum minimum. Postea confluit, e tota pix, in ulcus, non sine teda, cum manare humor desit. Simili modo ex alia parte cedit, ac deinde alia & sequenti semper anno teda locum implet. Extenuata per hæc arbor, facillime subuertitur uento: quod cū sit, tota succiditur: & cor. Id est, medulla eius, urit. In qua, & in radice plurimum tedæ semper est. Expletur uero in Pinu caua uulnerum, non cortice, nec cicatrice, quæ in hac arbore non coit, sed resina, seu pice, anno maxime ab incisu proximo, si pinus frugi sit: aut secundo aut tercio, si pessima. Probæ uices multas perferunt. Vitiosæ, nisi qs modice inaniat, prouentumq; dispenfet, detractionem quartam non tolerant. Pinus nouellæ, fructificant. Veteres teda, nō fructu sunt fertiles. Plinius hæc de Pinu a Theophrasto dicta, transtulit ad Laricē, partim ad Piceā, cuius assulas terræ p̄ximas laudat. Altiores amaritudinē afferre scribit. In Syria Terebintho quoq; ad picē, detrahunt cortices, e ramisq; etiānum, ac radice uindemiantur, cum resina tū damnetur n̄s partibus. In Hispania e Piceastro quoq; fit, minime laudata, qm̄ resina eius arida, uirosa, & amara sentiatur. Pix conficitur hoc modo. Pavitur area canali præparato, per quem humor in medium confluat. Tum lignū in hastulas cōcisum, locatur struis congerie, uelut in carbonis usu: mox igni succenditur, terra undiq; circumdata: ne flamma erumpat, perit enim pix, si hoc eueniat. Quod si fumus se parte aliqua extulerit, sca lis p̄tinus ad motis, locum terra sep̄iunt, lutoq; obstruunt, ne euolet. Canalis subiectus Picē fluentem corriuat in scrobes, *

Strues ipsa sexagenis, aut quinquagenis cubitis, centenis & octuagenis alta patet p̄ ambitū. Sunt q̄ per utrumq; mēsu, cubitos centenos agant. Humor qui fluit, obiter frigescit contactu. Vritur fere biduum. Op̄is p̄fecti signum, si rogi decumbat, subsidatq; & quasi latus det. Sum̄a hoc illi diligentia, & religione peragunt, ceu feriantes, & cum appreciatione præsentiu solenni, ut Pix ea tum copiosa, tum p̄ba euadat. Ac primus quidē sudor, q̄ aquæ modo fluxit in canali, Cedriū uocat, utiq; in Syria: ubi Pinus non sunt: quo in Aegypto corpora defunctorum persufa custodiunt. Sequēs liquor, Picem fundit, quæ in cortinas æreas cōiecta, aceto spissatur, & coagulata, Bruticē cognomen accipit, dolijs dumtaxat utilis, lentore ab aliā pice differens, item colore rutilate, et q̄d pinutiore est. Autore Plinio, Brutiam a brutijs dici constat, ubi nascitur, ad oppidum Mamertium feraci nemore, ut Strabo inquit. Nec Brutianam silam, quamobrem uocari eam Picem dicat comperi. Non enim silatum uinum, pro picato significari crediderim, etiam si Plinius quodam loco spissarum utilissimam medicinæ Brutiam, & ad uasa quoq; in Italia condendo uino, tradidit, quoniam pinguisima & resinosisima utraq; præberet utilitatem. Hinc ex mascula arbore meliorem esse adijciunt. Id quod intelligi non posse, Plinius existimat. Theophrastus certe, uri Pinum in Macedonia, non omnem, sed marem scripsit, Piceis gratia. Nec feminae tamen radices negligi, q̄ ea tantum pars in femina tedam habeat, ex qua omnia illa sunt. In Asia Syri non detrahunt tedam, sed machinamento quodam in arbore ipsa Picem urunt. Fit Pix e resina quoq; sola piceq; feruentibus cocta lapidibus in alueis ualidi roboris: aut si aluei non sint, congesta strue, ut in carbonis facendi ratione. Hæc in uinum additur, farinæ modo rufa, colore nigrior, ut ait Plinius. Vitia Piceis acor, aut odor fumidus, aut Piceis adustio. Expimētum, si fragmenta subluceant, ac sub dente lentescat, acore iucundo. Asia picem Indicam maxime probat. Græcia e Macedonia Piericam, Virgilius Narintiam, condiendis uinis. Columella et Nemeturicā commendat: quæ in Liguria conficitur. Et Allobrogicā, quæ corticata dicitur. Siccata hæc uetustate in puluerē resoluitur, cribraturque. Idem autor Piceis quoddam genus crudæ, Tasm uocari tradit, in defrutum Neapolitanum addi solitam. Sunt qui Rheeticam, Palladius Coracinam picem nominat, contra formicas arborum. Sed mendosa lectio est, & Coracinum picem legendum: id quod ex græcis rei rusticæ scriptoribus elicias.

g iij

A

Theoph. li. 9.
capite. 1. 2.
Pli. lib. 14. ca.
20. Item li. 26.
capite. 12.

B

*

D I O S C O R I D I S

C R E X M. V E R G. C O M M.

Resinis coniunxit natura Pices, ideoq; legitimo historiae ordine, post eas Dioscorides de omni Pice docuit. Quod enim ex uiuentibus plantis resinae nomine destillat, id incensa in furnis eadem materia, appellatione Picis, fuit, simplex a principio, & liquida tantum, mox ea de cocta, sicca etiam, non dissimili penitus potestate: & hoc tantum diuersae, ut testatur est Paulus Aegineta, quod sicca in secundo ordine, desiccet, minusq; quam liquida calefacit: contra uero liquida. Habentq; ambae, quod purget, maturet, discutiat, & acre sit. Ad omnia tamen liquida efficacior, sicca uero glutinandis uulneribus aptior. Ob quas uires, hic mox dicet, uulnerum remedijs utiliter siccam misceri.

Conon a quibusdam uocari liquidam Picem hic Dioscorides ait, quae uox, & rei in ea estimatio, q; uetusta, & uera sit, non ausim ego affirmare. Id certe pro comperto est, graecis κωνον dici Pineam nucem, & ab ea forma mathematicis, terrae umbram, Conum dici, & Coni forma describi, & ab eo fructu, Pinum arborem, etiam Conum dictam posterioribus graecis fuisse, posseq; hoc loco, quoniam ex cognatis Pino arboribus Pix fiat eius appellatione censer: alioqui nihil habet ea uox quod ad picem referri possit. Dubitamusque nos, non κωνον prima producta, sed κωνον prima correpta, legi quodam potuisse, & ex usu Pici id nomen accreuisse, quia scilicet in uindemia, dolia, & in alijs uitae nostrae usibus fictilia pice ex interiore parte linirent, ideoq; picata passim dicerentur, & non picata. Qua uoce hic sepius utitur, ut in superiore capite cum ait, in uase non picato seruandam Resinam, &c. Quod totum graeci κωνον uocant, qd est, illinire: licetq; κωνον proprie puluerem graeci dixerint, nihilominus cinerem, calcem, & quaecumq; alia dicebant, quibus leuigari asperitas, & obstrui raritas posset, quod in dolijs uini, fictilibusq; alijs, quondam passim fiebat, & nunc uitro etiam fit: ideoq; graeci κωνον, calce, glutinoq; & maltha aliqua illinire adhuc dicunt, & aconita fictilia cuncta illa, quae picata non fuerint, & aliquo huiusmodi obstruata leuigataq; Nec nos mouet, q; in hac significatione prima producta κωνον aliquando, & κωνον inuenitur, facilis enim eiusdem soni litera, ad uitium in scribendo lapsus est.

D Quod deinde impresso codici deerat post λεπρὸς ὄνυχας, id est, scabros ungues, instaurauimus, καὶ λευχῖνας, id est, impetigines.

Nec multo post dubitauimus qd legitur, φύματα τι ὑστέρῃ καὶ σκληρίῃ διαφέρει, quae uoces si sic legantur, significant, uuluae abscessus, & sedis duricies discutit, non sic forte legendum esse, sed mutatis locis, aut malis uuluae duricies, & sedis abscessus legi potius oportere, quando communius malum sedis abscessus quam duricies fit. Non tamen mutare rem ausi sumus, satisq; fore credidimus, signasse locum.

De Picino oleo. C A P. XCIII.

πιρρῆλαιον

Pice fit quod Pisselæon appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat Pici, sicut serum lacti. Nam expansa quamdiu Pix coquitur supra cortinam uellera madescunt, acceptoq; halitu eius exprimuntur in uas. Quas Pix liquida, praebet utilitates. Alopecias capillo replet, cum farina hordeacea illitum, quibus & liquida Pix medetur. Iumentorum ulcera, scabiemq; emendat.

Pli. li. 23. ca. 4.

Oleum picinum, graeci πιρρῆλαιον uocant. Probatur maxime e Brutia, ut quae resinosisima, & pinguisima sit. Color oleo fuluus.

C O N F U N D I T I N T E L L E C T U M. E X M. V E R G. C O M M.

Confundit intellectum, quod ultimū foeminini generis participium, in graecis claudit hoc caput, contra quadrupedum ulcera, & scabiem utiliter inuncta. Non enim certum est, Picem ne, an Picinum oleum praestare id Dioscorides decernat: nec nos audemus de ea re censere, cum Picino oleo id Plinius tribuat lib. 23. capite. 4. dicens Picino oleo usum passim esse ad quadrupedum scabiem. Et Columella lib. 8. cap. 5. idem testatur, quo loco liquamen Picis oleum hoc nominat. Maro autem Pici id adsignat, cum in Georgicis suis cecinit, Idemq; Pices, &c. Et Columella lib. 8. cap. 30. etiam confirmet, bitumen, sulphur, & pleraq; alia, liquida Pici in hunc usum miscenda praecipiens. Nos communem, & fere omnium lectionem secuti, Pici id tribuimus nihil, quod eiusdem uices Pix, & Picis oleum habent, in ea re periculi timentes: potuitq;

Dioscorides

Dioscorides forte, quod in Pice a se relictum fuerat, hoc loco restituere uoluisset.

¶ De Fuligineliquida Pice. CAP. XCIII.

Flt hoc modo eliquida Pice fuligo. In lucerna noua quæ ellychni-
um habeat, nonnihil Piceis incendio, lucernamque fictili uase in
clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius
perforato ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito, consumptoque
liquore nouum infundito, quoad sufficentem usui fuliginem collegeris.
Vis ei astringens, acrisq;. V sui est ad pigmenta, quibus palpebras linunt
& uenustant, & ad circumlitiones, item ubi glabris genis pilos restitui o-
portet, ad imbecilles, lachrymososq; oculos. Insuper ad eorundem ulce-
ra non inutilis est.

BARBARI COROLL.

Fuligo Piceis, cremata Pice fit; quod quidem aliud est, q̃ Picecocta, ut in fuligine refinarum
diximus.

EX M. VERG. COMM.

Facile est, græci clibani, quem nos furnum uertimus, ex descriptione, picturaq; hac Diosco-
ridis formam non dissimilem his intelligere, quas nostra ætas Campanas dicit, & quibus offi-
cinæ passim utuntur, ex floribus, herbisq; subiecto igne, exsudatum humorem colligentes.

¶ De sicca Pice. CAP. XCV.

Liquida Pix decocta in spissam coit, quam uocant aliqui Palimpis-
sam, quo in genere quædam uisci modo lentescit. Boscas cogno-
minata. Altera sicca est. Probat purior, pinguis, odorata, subrufa, resi-
nosa. Calfactoriam uim habet. Dura emollit. Pus mouet. Tubercula, pa-
nosq; discutit. Vlcera replet. Vulnerarijs medicaminibus commode per-
miscetur.

BARBARI COROLL.

Palimpissa, nihil aliud est, q̃ cocta bis Resina. Nam prima decoctione Pix fit. secunda bis
pix, hoc est, παλμπισσα.

EX M. VERG. COMM.

Quod moneamus hoc capite unum tantum est, adiecisse nos illi scilicet, & instaurasse amif-
sas, incuria librorum uoces illas. Talis Lycia est, & Brutia, cōiuncta simul picis et resi-
næ natura, quæ in aliquot melioribus græcis his uerbis adhuc leguntur, *πικρὰ δὲ
ἐστὶν ἢ λυκακίη καὶ βρυτιὰ διὸ φέρων ἔχοντα πικρὰ ἅμα καὶ ῥητινὴν*. Accessitq; nostro huic consilio
& Plinius libro. 24. capite. 7. dicens. Spissarum utilissima medicina est Brutia, quoniam pin-
guissima, & resiniosissima, utraq; præbet utilitates. Idem fere Dioscorides testatur.

¶ De ZOPISSA. CAP. XCVI

ZOpissam aliqui aiunt derafam nauibus resinam cum cera, quam
aliq; Apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet, quoniã
marino sale macerata fit. Alij Pineam resinam hoc nomine uocauerunt.

BARBARI COROLL.

ZOpissa, efficacior omni Resina & Pice traditur. Ad omnia; quibus illæ, profunt, uidelicet
adiecto salis e mari callo. Optima hac, a tyrocinio nauium.

EX MAR. VERG. COMM.

Quod Zopissæ adiicit nomen, Apochyma, a Paulo Aegineta Hypochyma aptiore nomi-
nis cōpositione dicitur; nulla tamen nobis in ea uoce certa rei significatio est.

g iij

A

λυγνὸς τῆς
ὕλης πικρὰς

παλμπισσα καὶ
ἐστὶν πικρὰ καὶ
βρυτιὰ

B

ζόπισσα
ἀπόχυμα

Plin. lib. 16.
cap. 12.

C De Bitumine. CAP. XCVII.

ασφαλτος

Bitumen Iudaicum cæteris anteponitur. Cuius probatio est, ut purpuræ modo splendeat, sitque graue, ac ualidum odorem ut breu. Nigrum autem & sordidum, uitiosum est. Adulteratur Pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Agrigentino Siciliæ, fontibus innatans, quo utuntur ad lucernarum lumina olei uice. Hallucinantur qui id Sicilicum oleum nominant. Namque liquidum Bituminis genus esse constat.

Pli. li. 35. ca. 17.
Herodotus
lib. 1.
Iustinus lib. 1.

B A R B A R I C O R O L L.
Bitumen, græci ασφαλτος dicunt. Vnde lacus Iudææ, ubi nascitur, Asphaltites uocatus, quo Iordanis amnis, & Tiberiade lacu altero profectus, influit lacum Asphaltitem. Galenus in Syria Cœle, salsum, & propterea Mare mortuum uocari prodidit. Vitruius sub Babylone (inquit) lacus amplissima magnitudine, Asphaltides appellatur. Habet supranatans bitumen liquidum, quo Semyramis sit usa, cum Babylonem circumdedit muro. Itē Ioppe. In Syria, Arabiaque lacus, inquit, sunt, immani magnitudine, qui emittunt Bituminis maximas moles. Ex Iudæa bitumen oritur, certo anni tempore supernatans, nec potest ibi tunc euelli, ad omnem contactum sequax atque lentum, præterquam filo, quod menstruum mulieris infecerit. Bitumen, alibi limus, ut in Iudæa, alibi terra est, ut in Syria, circa Sidonem oppidum marinum. Spissantur hæc, addensanturq. Liquidum sunt Zacynthinum & Babylonium; cui detracto, subest sal: & ad lucernas utuntur. Babylone nigrum & candidum gignitur: ubi & sicum fonte quodam, ut inquit Eratosthenes, Euphrati proximo. Liquidum est, & in Apolloniatarum agro inuentum: etiam si coire in glebas a Dioscoride dicatur. Fortasse defertur hoc a montibus liquidum: post conerescit. Siculum ex Agrigentino lacu pingue, liquorisque oleacei est. Incolæ harundinum paniculis id colligunt, ocyslime ita adhærescens. Bitumen illitur æramenis, munipq. ea contra uim ignis. Statuas ex eo inungi solitas ferunt. Placet in ferarijs fabrorum officinis, tingendo ferro, clauorumque capitibus. Nam calcis usu, constructos eo Babylonios muros, nouimus. Bitumen ex fulmine oriri dicitur. Vnde iuxta Babylonem redundant eo lacus, q. frequentia ibi cadant fulmina, ut Seruius grammaticus existimauit. Haud procul, Sufis putem haberi scribit Herodotus, unde Bitumē, sal, & oleum extrahitur: id oleum Persas appellare, Rhadinacem.

Herodotus li
bro. 6. Erato,

V E X M. V E R G. C O M M.
Vitruius libro octauo architecturæ suæ, cum de medicamentosis aquis agit, ait, bituminosas aquas interioris corporis uitia potionibus purgādo sanare. Licetq. uitiorū certum genus ille non dixerit, ex uiribus tamen & potestate bituminis, coniiciendum id est, Iudaicumq. hoc Bitumen ideo a Dioscoride omnibus alijs præferri.

πιττασφαλτος, id
est, Pici bitu
men,

C De Pissasphalto. CAP. XCVIII.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidamnum, quæ Pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuque in littus expuitur, illic coacta in glebas. Mixtam bitumini picem redolet.

P I S S A S P H A L T O N, aliud naturale, ut Apolloniaticum, Babylonium, Zacynthium e quodam lacu: Nam græci omnia ea modo Asphalton, modo Pissasphalon nominant, quandoq. resinam. Naturale optimum. Ex eo, quod cum feruet, innatat. Aliud factitium, mixta Pice bitumini. Hoc genus bituminis in Apolloniatarum agro inuentū, picem fossilem a Theopompo dictam auguror.

P E X M. V E R G. C O M M.
Linus Pici bitumen hoc, aliquādo Fossilem picem appellat, parum certa rei indicatione, & in qua sibi ipsi parum conuenit. neq. enim potest simul aliqd fossile, & liquidū esse. Quod enim liquidū ex terra in lucem protrahitur, hauriē. Testantur autē, Paulus Aegineta, Epyriq. incolæ omnes, & res ipsa, concreta substantia pici bitumen hoc esse, quod nostra ætate adhuc picandis

picandis nauigijs, illic in usu est, ex quo uestigial ea gens non negligendum sibi fecerit. Nasctur autem ad Apolloniam antiquam ciuitatem, quam Strabo Epyroticam nominauit. Stephanus *Ἰλλυρία* dixit esse, *ἡντὰ ἐπιδάμνον*, ut ab alijs, quæ quondam eodem nomine, uigintiquatuor diuersis locis fuerunt, ea regionis nota distingueret. Fuit autem mos antiquis scriptoribus, homonyma locorum, regionis adiectione certius indicare. Quo fit, ut passim legitur, *ἐν ἀπολλωνίᾳ ἢ ἐν ἐπιδάμνῳ*, non sic, sed aut, *ἢ ἐν ἑπείρῳ*, legendū sit, ut Strabo ait: aut qd Paulus Aegineta, *τὴν πρὸς ἐπιδάμνον*, aut quod Stephanus *τὴν ἡντὰ ἐπιδάμνον*, id est, in Apollonia, quæ est apud Epidamnū, eiusdem Epyri aut Illyrii significatione, in qua & Epidānus ciuitas antiquissima fuit, de qua Thucydides, Paulus, pluresq; alij longius tradiderunt.

A
Strabo. lib. 16.

De Naphtha.

CAP. XCIX.

Naphtham uocant Babylonij, bituminis colamen, colore candidum. Inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita ut ex spacio protinus in eam transiliant. Ad suffusiones oculorum, & albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit. Ab inflammatione tuetur. Vuluarum procidentias, strangulationesque, olfactu, suffitu impotui, emendat. Comittales morbos suffitu deprehendit, Gagatis lapidis more. Purgationes mulierum cum uino & Castorio potum elicit. Tussum uetere, & anhelitum adiuuat. Serpentium morsibus, coxædicum, laterumq; doloribus auxiliatur. Datur coeliaci in catapotio deuorandū. Cum aceto potum discutit sanguinem concretum. Dysentericis cum pitana liquatum infunditur. Distillationibus suffitione medetur. Mitigat dentium dolores oblitum. Cæterum pilos incommodos siccum replicat. specillo impositum. Concoctum autem & cum farina hordeacea nitro & cæra illitum, podagris, articulorū doloribus, lethargicisq; prodest. Pissasphaltos eadem quæ Pix & Bitumen, si misceantur, potest.

deph

cap. 104.

B

BARBARI CÖROLL.

Naphthen, Erathosthenes generi Bituminis liquidi ascribit. Sed ardēs eius uis, ignitū natura cognata. Procul abest ab omni usu. Ita appellatur circa Babyloniam & Susidem & in Austagenis Parthiæ, profluens Bituminis modo liquor. Crematam ea, pellicem Creontis filiam a Medea ferunt, ad axes accedentem, corona igne correpta. Etiam si radicis cuiusdam ui, a Circe doctam, incendium id creasse Diodorus meminerit. Similis est naturæ limus, in Commagene urbe Samosata, stagno emergens, Maltham uocant. Flagrat ea protinus, & cum quid attigit solidi, adhæret, & sequitur fugientes. Ita defendere muros suos municipes, oppugnante Lucullo, flagrabat miles armis suis. Aqua magis accenditur, utique nō admodum copiosa: pulueris tantum, & luti iactu refingitur. Itemq; aceto, uisco, sulphure. Possidonius in Babylone fontes Naphthe geminos esse tradit. Alterū candidi, quod & liquidū sulphur sit, ignes in se cōtrahens. Alterum nigri, quod liquidum sit Bitumen, & olei uice ad lucernas utile. In Mutinen si certe agro Italiæ similis Bituminis, seu Naphthæ potius liquor. Nasctur, & candidus, & rufus: quē circulatores ad præstigias suas utilem circūferunt. In terra Moena Pannoniæ iuncta, inquit Solinus, parte qua pontum attingit, herba nascitur, qua cum inficitur oleum, quod uocant medicum: diræ naturæ, aqua enim exardescere, terra exingui.

Plinius lib. 2.
cap. 105. & lib.
37. cap. 15.
Idem. lib. 2. ca.
pit. 104.
Plutar. in uita
Alexandri.

Solinus de mirabilib. mundi.

De CVPRESSO.

CAP. C.

Cvpressus refrigerat & astringit. Cuius folia ex Passō & exigua Myrrha uesciæ rheumatismis, & urinæ difficultati auxiliantur. Pilulæ autem ex uino tusæ in dysenteria, alui fluctione, tussi, & orto

καπρίσιον

D I O S C O R I D I S

C pncea, aut si reſciatur ſanguis, conuenientiſſime bibuntur. Earum decoctum eoſdem præbet effectus. Tuſæ cum Fico duricias omolliunt. Nariumque polypo medentur. In aceto coctæ, & cum lupinis detritæ, ſcabros ungues eſciunt. Hernias inteſtinorum prolapſu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præſtant. Pilulæ cum arboris coma ſuffitæ, culices abigere exiſtimantur. Folia trita, & impoſita, uulnera conglutinant. Sanguinem ſupprimunt. Capillum ex aceto tingunt. Illinuntur per ſe, aut cum polenta ignibus ſacris, ulceribus quæ ſerpunt, carbunculis, & oculorum inflammationibus. Admota cum cærato, ſtomachum corroborant.

Plin. libro. 16.
cap. 33.

B A R B A R I C O R O L L

C Vpreſſus, longa, ſubrecta caudice attollitur, cætero quidem orbe ſatu, hoc eſt, ſemine ſuo naſcitur. In Creta etiam trunco, præſortim in montuoſis Tirafenſium, ubi cædua eſt, & cæſa regerminat: modo ab terra, modo a parte media, modo ſumma, raro ab radicibus. Semē ei perexiguū. Non enim galbuli, qui naſcuntur, ut Theophraſtus reſert & Varro mutuatur, tanquam pilæ paruæ, cortice cupreſſini, dictæ Coni, ſed iſs intus primigenia ſemina dedit natura, Laricis proxima, perquam minuta. Hæc pilula dehiſcente, illa cum matureſcit, diſſtantur & euolant. Neque facillime colliguntur, præterquam a peritis. Aduena Italiæ quondam, & natu moroſa, baccis torua, folio amara, odore uiolento, materie rara, ac pene fructicoſi generis. Diu ſacra, funeribus indicandis, ante domos poni ſolita. Sterilis ſœmina diu, ſed metæ aſpectu, quæ in faſtigio ei conuoluta eſt, grata, diſtinguendis Pinorum ordinibus, facilem ſe tonſili culturæ præbens, hiſtoriales picturas, tenui folio, breuiq; & uirente ſuperueſtiens. **D** Contra mas, ſpargit extra ſe ramos, deputaturque, & accipit uitē. Vterque ſexus, in perdicas, aſſereſq; admittitur, amputationē ramorum: qui tertio decimo anno, ſingulis denariis ueneunt. Proinde filiarum dorem Plantaria, ueteres appellauerunt. Tarentinam Cato nominat, quoniam, ut Plinius arbitratur, primum e Creta uenerit Tarentum Cupreſſus. In AEnaria quoque ſuccifa regerminat. In Creta quocunq; loco quis mouerit ſolum, niſi ſeratur alia, hæc ſponte gignitur. In Idæis albiſque montibus etiam non appellata ea, proſilit, ibiq; ſummis iugis, ubi niues nunquam abſunt, plurima. Alibi non niſi in tēpore prouenit, magno altricis faſtidio ac labore. Commendari maxime Cupreſſum Meliſiam inuenio. Fructum Cupreſſi, Galbulos, & Nuces Cupreſſi recte uocaueris. Nam Galbæ, ut ait Suetonius, animalia ſunt exilia, quæ in æſculis naſcuntur. Cupreſſos a partu ramulorum pariliū uocatas græci uolunt ἀπὸ τοῦ παρίοντος τοῦ ἀκρίμαντος. Eaſdē & Charites appellari ſolitas, Eteoclis fuiſſe filias adnarrant: quæ dum tripudio Dearum ſubſiliunt, in puteum ceciderint.

Sueton. lib. 7.
in Galba.

E X M. V E R G. C O M M.

Q Væ in Cupreſſo pilulæ, autore Plinio, dictæ a nobis fuerunt, Galbuli, nuces, & cōſi, eiſdem rei appellatione, ab alijs etiam dici poterunt, omnibus in ea arbore notiſſimæ, in quibus exigua ſemina ſunt, dehiſcentibus iſs euolantia magis, q̃ decidētia. His, folijs q̃ cæteri omnes in medicina addiderunt βλαστούς, id eſt, ſumma germina, & ſummos coliculos. Neſcimufq; nos, an deſyderari hoc in Dioſcoride debeat. Paulus certe AEgînetæ, huius arboris coma in aliquibus utitur, hic tantum in fugandis cūlicibus uſus eſt, licetque in uniuerſum de totis folijs hoc loco agatur, poſſunt tamen ſummæ illæ parteis, teneritudine ſua diuerſa a folijs natura eſſe: quæ omnia peritiōribus cenſenda relinquimus, ut interim quod commentationis huius noſtræ curſum in foribus ipſis remoratum eſt, breuiter ſignemus. Decernit hic pora in paſſo, adiecta exigua Myrrha Cupreſſi folia ſuccurrere, & urinæ anguſtijs: quorum ulimū hoc manifeſtam habet ſignificationem, prius illud ex ui græci uerbi, quod eſt ἐνματιſθαι, fluxum mali & noxi alicuius humoris in eam partem ſignificat: quemadmodū in podagris fit, in q̃bus græci dicūt, articulos ἐνματιſθαι, i. fluxu humoris in eā partē tentari. Quibus ſic habebitis, dubitatū a nobis, ex uiribus Cupreſſi, q̃ adſtringere, & refrigerare hic tū. Gale. autē & Pau. præter hæc ſiccare etiā dixerūt, ſi in ueſicā deſtillationib. ſiccādo adſtringendoue cōferūt, quomodo

quomodo urinæ angustijs, quibus contraria ratione succurrendum est, conferre poterunt.

Accedit suspitioni huic nostræ, etiã quod Plini. lib. 24. cap. 5. de his agens ait. Cupressi radicem & folia, uescicæ & stranguriæ pota mederi: quasi, quod hic in uescicæ destillationes dixit, id Plinius ad urinæ stillicidium transtulerit. Non tamen in medicinæ decretis, Plinium anti quis græcorum medicis comparamus, sed in re parũ certa, suspitioni nostræ, ex eo authore fidẽ aliquam adijcere uoluimus.

Aut igitur constituendum, in uescicæ destillationes illas, pro uescicæ & urinæ stillicidio intelligendas esse, ut cognata simul urinæ duo mala, hic coniunxerit, stillicidiũ scilicet, & difficultatem. Quod nos non probamus. quoniam quod paulo ante diximus, significat græcis *πυκνὴ ὕδωρ*, aut angustias illas urinæ, i. *στυγνὰ*, nõ pro his quæ uere & ex difficili urina urinæ angustie sunt, sed pro labe, & noxa aliqua alia, quæ ex destillatione humoris in eam partẽ urinæ accedat. Quod ex aliorum sententia erit. Nam & Serapion sic uertit, & Cupressi uiribus magis conuenit, quæ ut diximus, in siccando, adstringendo, refrigerandoq; sunt.

Quo loco etiam legitur, tritas Cupressi pilulas cum uino potas. & c. in antiquioribus græcis, non pilulæ tantũ sunt, sed folia etiam, legiturq; pilulæ & folia, & si Plinius pilulis tantum id tribuat. Nos græcos secuti utrunq; diximus.

Dubitauimus præterea non procul a totius capitis sine, coniungendũ ne in denigrando capillo, an in sistendo sanguine acetũ Cupressi folijs esset, alijs græcorum codicibus id, alijs aliud indicantibus. Neq; ab re penitus, quoniam sistendo sanguini acetũ in usu est. In ambiguo tamẽ, accedente Plinio, qui eodem libro & capite ait, capillum denigrant ex aceto, ad capilli denigrationem & nos contraximus.

De Iunipero parua.

CAP. CI.

Iuniperum paruam græci, Arceuthyda, aliqui Mnesitheũ, alijs Acatidem, Aegyptij Libium, Galli lupicellum, Romani Iuniperũ uocant. Eius duo genera. Altera maior, altera minor. Vtraq; acris est. Excal facit, & urinam mouet. Accesa serpẽtes fugat. Baccarũ nonnullæ, nucis iuglandis magnitudine nonnũquam grãdescere, aliæ nucem ponticã aqua re inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, subamaræ, quæ Arceutidis etiam nomẽ, id est, Iuniperi retinuerunt. Modice calfaciunt & astringunt, stomacho utiles. Contra pectoris uitia, tussim, inflationes, tormina & serpentium ictus efficacissime bibuntur. Urinam cient. Vnde ruptis, conuulsis, & uulua strangulatui subueniunt. Folia acrimoniam habent. Ideo tam ipsa, q̃ eorum succum ex uino contra uiperarum morsus illini, aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus, lepras eximit. Ramenta ligni deuorata, interficiunt.

BARBARI COROLL.

Iuniperi, duo genera quidem constituunt, Vnum, quod floreat. nec fructificet. Alterum qd fructificet, nec floreat. Solam fere arborum, prorogare fructus suos in biennium, qui ne maturi rescant quidem, sed decerpantur, & aliquandiu conditi seruentur. Et si in arbore relinquatur, marcescant. Materia fabricis conueniens, tam futuris sub dio, q̃ terra obruendis. Plinius hac descriptione Cedrum maiorem, non Iuniperum demonstrauit, ut indicabimus in Cedro.

NEX M. VERG. COMM.

Non leuiter in instaurando hoc capite laboratũ nobis est, tam uarie corrupteq; in antiquioribus græcis totum hoc caput legebatur, alijs in prima parte statim maioris, minorisq; Iuniperi diuisionẽ & appellationes describentibus, alijs alterã ab altero separantibus, & quæ ad minorem pertineret in principio, quæ uero ad maiorem in extremo calce docentibus, cunctis uero in reliquo capite parũ sibi ipsis cõuenientibus. Sed nos meliorem ordinẽ, latinorumq; autoritatẽ & fidẽ secuti, qua nunc legis formã instaurauimus, ita tñ, ut nihil additũ, subtractũue a nobis fuerit, nihil ab impresso mutatũ, quod non in reliquis omnibus, aut in pluribus saltẽ legeret.

A

B

ἀρχαὺς ἰνίφα
μνηθεῖον
ἀκατιδία
λινθία

Plin. lib. 16. ca
pite. 25.

D I O S C O R I D I S

C Credimusq; in Gallia minoris Iuniperi appellatione, ex obsoletis incertisq; notis, & uestigijs quibusdam, quæ in antiqua lectione adhuc apparent, non Iucipellus, quod caret sensu, sed Iuniperellus legendum esse. Nōtamen hoc multifaciendum.

Illud in Iuniperi fructus historia grauius & diligentius curandum, quod in antiquis ab impresso codice: diuerse legitur. Hic enim ait, alterius fructum nucis magnitudine provenire, nullo nucis genere adiecto, quod merito desyderandū est: alterius nucis Ponticæ, i. auellanae quantitate. At in antiquioribus, hisq; melioribus, in primo nucis Ponticæ legitur, in secundo fabæ: quā lectionem etiam Serapion secutus est. Quo fit, monente id re ipsa, ut etiam primo Ponticæ nucis magnitudinem, secundo fabæ adsignauerimus. Lapsus hic librarij fuit in exscribēdo, in τῆς νύκτος & κερύον errantis.

Pli. li. 24. ca. 8.

Suspiciamur & illic uitium esse, quo loco hic ait, Urinā idem etiam trahit, quapropter conuulsis, ruptis, &c. Non enim uidemus, cur hic inferat, ex eo quod ciende urinæ proffit Iuniperi fructus, ob eam causam conuulsis ruptisq; prodesse debeat, potest quidem omnia illa, autore Plinio, qui hoc ipsum agens, ait urinam ciere, illiniri & oculis in epiphoris, & dari conuulsis, ruptis, uuluis, &c. Verum nos id non damnamus, sed suspectam nobis sermonis seriem dicimus esse, desyderamusq; illic aliquid, a quo certius fieret illud.

Quæ deinde in morbis & medicīna pectoris uitia dicta a nobis sunt, a Plinio, Serapioneq; ad dolores eius partis contrahuntur.

ἡ κινὴς μεγάλη
μνησθῆναι
ἀκατῆρα

De Iunipero magna. CAP. CII.

Iuniperus magna, quam aliqui siluestrem Cupressum appellāt, alij Mnesitheum, alij Acateram, Romani Iuniperū, uulgo cognita est. Cupresso assimilis. Asperis, maritimisq; locis plæruncq; nascitur, easdem quas supradicta uires habens.

BARBARI COROLL.

Iunipero uirtute similem, Capidam a Catone dictam inuenio, ad lotium mouendum: nec quid sit, dicere coniectura possum.

D
βράθυς
βάρυτον
βάρυν

De hærba Sabina. CAP. CIII.

Græcis Brathy, alijs Baryton, alijs Baron, Romanis hærba Sabina appellatur. Duorum generum est. Vna folijs Cupresso similis, spinis horridior, grauius olens, acris & feruens. Arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit. Huius folijs nonnulli pro suffitu utuntur. Altera Tamaricæ folio similis est. Vtriusq; folia nomasunt. Collectiones illitu mitigant. Et cū melle nigricias sordescq; repurgant. Carbunculos cum uino pota rumpunt. Sanguinem per urinam eliciunt. Partus apposita extrahunt. Et suffitu idem præstant. Vnguētis calfacientibus immiscentur, & priuatim gleucino.

Pli. lib. 17. capi
te. 13. & lib. 24.
cap. 11.

BARBARI COROLL.

Herbæ Sabinae, aut etiam Sauinae genus id, quod simile Cupressi folio est, Cupressum Creticam nonnulli uocauere. Notum est contra gallinacei generis pituitas remedium, ut cubet in fimo qui ex herba Sabina fiat. Dioscorides hoc loco Baryton uocari eam tradit a nonnullis. Ut fortasse de hac intelligant scriptores, præsertimq; Diodorus, cum in Arabia nasci dicunt, Boraton, Iuniperū, Cedrumq; quasi Boraton p Baryto, uel cōtra exemplariorū uitio legatur.

EX M. V E R G. C O M M.

Non est, quod in Sabinae herbæ, tam græcis q̃ latinis appellationibus legentes moneamus, nisi forte, quod a Diodoro in Arabia nasci dicitur Borathon. Sabina herba est, quā hic Barython, & Barathon uocari a quibusdam dixerit. Quod suspicari penitus ab re non est. cognatæ enim plantæ, & ab hoc deinceps descriptæ Iuniperus & Cedrus illi coniunguntur. Sed non omnino literis Diodoro, & huic scribuntur: hic Barython, ille Barathon uocant.

Sic

Sic dicta est a regione qua multa nascitur. Et herba dicitur, quoniam non arborescit, sed in latera caulium modo se explicat.

In curandis morbis, nō bene in græcis legi suspicamur, καὶ ἀνθρακας περιρρόπτισιν οἶνον πο-
δίζοντα καὶ αἵμα διόσπον ἔχει, quod paucis mutatis uersum a nobis est, carbunculorum crustas ex uino imposita exterunt, & cum urina sanguinem ducunt. ad exterēdas enim carbunculorum crustas, foris magis quam intus remedia afferunt, & ad duceadum cum urina sanguinem, ap-
us aliquid bibitur.

De Cedro. CAP. CIII.

Cedrus arbor magna est, ex qua Picem colligunt, quæ Cedria uo-
catur. Iuniperi modo baccas parit, baccarum Myrti magnitudi-
ne, rotundas.

BARBARI COROLL.

DE Cedro autores uariant. Theophrastus alteram Phœniciam, alteram Lyciam appellat, similes Iunipero, nisi qd folium Cedro acutū, spinosum & durum, Iunipero simplicius ac mol-
lius. Excelsior & hęc quam Cedrus. Alij utranq; Cedrum, inquit, nominant, sed quæ proprie sit Cedrus, acutam Cedrum uocare malunt, idest, Oxycedrum. Nodosæ ambæ, alis frequen-
tibus, ligno contorto. Sed in Iunipero, spissiore, putrescenteque. Cedro æterna materies. Vtri q; medulla rubens. Sed odorata in Cedro, sicut & fructus: qui & flauus, & magnitudine bac-
carum Myrti cernitur, esculentus, hilaris. Iunipero niger, acerbus, ingustabilis, durans añum, prius non decidens q; subnascatur alius. Arcades fructus in ea ternos eodem haberi tempore confirmant. Satyrus utranq; sibi allatam sine flore, Cupressō similes, scabriore tantum cortice. Radices solutę summa cute ambabus herent. Saxosa loca & algentia sequuntur. Plinius lō-
ge aliter: quippe qui notas Iuniperi, Cedriq; confundat. Fortasse uerius, q; priores. Cedri sum-
ma genera duo facit, maius, & minus. Maioris iterum duo: quæ floret, fructum non fert: quæ fructifera est, non floret, & in ea antecedentem fructum occupat nouus. Semen eius Cupressō simile. Quidam Cedrelaten uocant. Ex hac resina laudatissima. Minoris quoq; species binæ. Lycia, & Phœnicia, Iuniperi similitudine. Differunt folio. Nam quæ acutum, durum, spino-
sumq; habet, Oxicedros (inquit) appellatur, ramosa, & nodis infesta. Altera odore præstat. Fructum ea ferunt, Myrti amplitudine, dulcem sapore. Dioscorides fructus Myrti similitudi-
nē Cedro maiori, ex qua pix fiat, nō minori tribuit. Crassiuscula Cedri resina est: & ad facien-
das pices comodissima. E Cedro simulacra, Djs p̄cipue, sicut in Cupressō, Loto, Buxo, atq; etiā nū oleaginis radicibus minora. Optima nauigijs, Syriæ, Pyœniciæq; Nā Syriacę, in mōti-
bus natę, tanta crassitudo ferī, ut homines terni caudicē amplecti nequeāt. Solēt Cedri humo-
rē quendā reddere, ut simulacra etiā Deorum quandoq; sudent. Similis in Arcadia est arbor, Cedris nomine. Frutex in Phrygia pusillus, frondis æternę, arborescensq; nunq; a Theodoro Gaza uocatus Cedrula. Hęc & Cedriā a Theophrasto dici puto, quatenus arbor est, nō quate-
nus frutex, tunc enim Cedris sit, non Cedriā. Cedriā Theophrastus inquit, differt a Cedro. Arbor folio pungēte mucronibus perinde ut Cedrus. Hippocrates Cedrin creticam, & Hede-
ram creticam foeminarum incommodis auxiliari scribit in uino lacteo, idest, repido. sic enim διονυλλία interpretantur nonnulli.

EX M. VERG. COMM.

Excelſa quædam Iuniperus, Cedrus est: ob quam cauſſam, alternatis quondam nomini-
bus deſcriptæ ab aliquibus ſunt.

Omitteremus libenter, quæ Plinius diuerſis locis miſcuit, quæ Iunipero debebātur Cedro, & quæ Cedro Iunipero tribuens. Omitteremus & quæ ab Theophrasto dicuntur lib. 6. quæ ſi quis diligentius expendat, facile intelliget cauſſam, quare olim conſuſæ, miſtæque fuerint hæ plantæ.

De Cedria. CAP. CV.

Cedria optima est crassa, perlucida, ualidi odoris, quæ dum effun-
ditur, guttatim, nō dissipata coit. Cui ea uis ineſt, ut deſuncta cor-
pora cōſeruet, & uiuentia corrumpat. Qua ex cauſſa, mortuorum uitam

A

κεδρος κεδρία

De arboribus
odoriferis,
Theophrast.
lib. 4. cap. 6.
& de Cedro
amplius ca. 12
& lib. 5. ca. 9.

Pli. li. 13. ca. 19.

B

Theoph. li. 3.

κεδρία

D I O S C O R I D I S

C aliqui appellauere. Vestimenta quoque & pelles, eximia calfaciendi & siccandi dote, corrumpit. Magni ad ocularia medicamenta usus. Quippe illita oculis claritatem affert. Albugines, cicatricesque detergit. Instillata autem cum aceto, uermes aurium necat. Cum Hyssopi decocto infusa, sonitus, sibilosque sedat. Cauis dentium indita, eos frangit, & dolores leuat. Quapropter cum aceto colluere eosdem prodest. Peruncto ante coitum genitali, abortiuum fieri constat. Anginae ea perunguntur. Tonsillarum inflammationibus auxilio est. Lendes, pediculosque illitu enecat. Cerastræ moribus cum sale imposita subuenit. Contra hausta leporis marini uenena, in passo sumpta auxiliatur. In elephantia, aut linctu, aut peruncti one proficit. Pulmonum ulcera purgat, & si cyathus eius sorbeatur, persanat. Tineas, & cætera uentris animalia necat. Infusa partus extrahit. Fit & oleum, a Cedria separatum dum coquitur, uelleribus supra halitum eius expassis, ut in Pice. Eiusdem ad omnia usus. Priuatim uehementer perunctum, scabiem quadrupedum, canum. boumque persanat. Inhaerentes ricinos enecat. Ulcera quæ ex tonsura accæperunt, ad cicatrices perducit.

Pli. li. 16. ca. 11.

BARBARI COROLL.

D Cedria modo Cedri Pix, modo Cedri Resina uocatur, e Cedro magna, quæ Cedrelate dicitur, nihilque aliud est, si proprie loquendum sit, quæ cruda Cedri lachryma. Cedrium uero, succus Cedri est, e teda eius, concisa furnis, quæ primus aquæ modo fluxerit in canali. Nā sequens liquor, Pix iam, non Cedrium est. Sed confundunt autores, nunc p Resina, nunc p sudore tedarū, nunc p Pice, Cedriā & Cedriū uocantes. Interim p oleo cedrino, quod Cedrelcon, ex malis Cedri, ut ait Plinius, appellat. omnibus enim istis, quancumque diuersis, eadē tamen natura inest. Columella, cedrinū liquore uocauit. Libri Cedrio inuncti, a tinea et carie uindicantur. Damnat usum Plinius, propter ancipitem eius proprietatem, uiuentia perimendi, perempta custodiendi. Cuius tamen ratio præclare a Galeno redditur: quia tamen adurat, ita ut ordine quarto calfacientium censeretur meruerit, inter omnia tamen erodentia medicamenta, quæ græci Septica, & Septas cognominant, infirmissimum esse cõstet. Proinde uiuentibus appositum, uitali calore adiuncto sumit uires, & quasi accendit, atque ita iugulat. Sed defunctis additū, putredinem tamen & uitiosos humores exterit & absumit: quibus detractis, incorrupta seruatur. Galenus & Paulus non cedriā, sed Cedream uocabant.

med. p. 120

De Cedride.

CAP. CVI.

Cedrides Cedri fructus uocantur. Calfactoriam uim habent. Stomacho aduersantur. Auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguariae. Menses ciunt, ex polline Piperis poti. Contra haustum leporem marinum in uino sumuntur. Serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino, aut medulla, corpore. In antidota adduntur. Fuliginem quo modo ex Pice, congeri oportet, quæ eandem quam Picea fuligo uim præbet.

BARBARI COROLL.

Cedrides fructus Cedri sunt: ut Daphnides Lauri. Minus urunt, quæ Cedrus gustantis os: ut mandu quoque possint. Soporifera tamen ui. Si copiosius edantur: caput tentant, inflantque. Interanea quoque torquent, Galenus autor.

ad. q. 12

De Lauro.

CAP. CVII.

Laurus quædam tenui folio constat. Altera latiore. Vtraque excalfactoriam naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earū

in muliebres inſeſſus additum, uulua & ueſicae uitij conuenit. Virentia A ſolia ſenſim ſubſtringunt. Illita quoq; ueſparum, apiumq; icribus opitu-
lantur. Eadem cum polenta, ut pane illita, inflammationem omnem miti-
gant. Sed pota ſtomachum effundunt, & uomitiones mouent.

B A R B A R I C O R O L L.

Laurus, cortice tenui deſcribit. Degenerat ut Quercus & Myrtus pertinaciter, adeo, ut in Antandro, fruſtus e rubro niger eueniat: quod & in Myrto ibi accidit. Fert & uuam ſuam Lau-
rus, tam ſecunda q̄ ſterilis: nec tamen ſecunda omnis. Copioſius ſterilis, quam marem apel-
lamus. Genera Lauri præter ea quæ in ratione Daphnoidis & Alexandrinæ monſtrabimus,
Delphica, ex albo uiridior, maximis baccis, atq; e uiridi rubentibus. Diſta, q̄ uiſtores Delphis
coronarentur ea, ut triumphantes Romæ: unde & triumphalem uocabant, ad Cæſaris Augu-
ſti tēpora, ut mox dicemus. Delphicā, Helianus e Theſſalia tranſlatā Delphos, ab ipſis Tempe
ſcribit: tum cum Pythius Apollo, draconē ſagittis interfecit. Hanc Lactantius gramaticus etiā
Tripodem uocari dicit, quoniam radices, inquit, ternas habeat. Apollini dicata, ppter uim tri-
plicē diuinationis, pteritorum, futurorū, præſentium. Cypria folio breui, nigro, per margines
imbricato, criſpa: quam Laurum ſilueſtrē aliqui intelligunt. Nonnulli ſui generis arborem, q̄
bacca ei cerulea ſit, Muſtax, folio maximo, albicāte, flaccido appellata, q̄ Muſtaceis ſubijceret.
Muſtacea quid ſint, & qua ratione ſiāt, Catonem conſule. Diximus & in Amylo, Regia, quæ &
Auguſta dici cœperit, ampliſſima folio, baccis, arbore, guſtatu quoq; nō aſpo. Aliq̄ ab Augu-
ſta Regiā diſperſunt, longioribus folijs, latioribusq; q̄ anguſta. Baccaliam uero dicunt hanc,
quæ uulgaſſima eſt, baccisq; fertiliffima. Sterilē earū triumphalē, q̄ ea putant triumphantes
uſos a Cæſare Auguſto, reſecta Delphica, Sterilem & Laurū eam eſſe phibēt, quæ miſſa ſit e cœ-
lo eidē Cæſari, altitudine minima, folio criſpo ac breui, rara inuentu. Eſt & quæ Taxa dici, To-
pſarij generis, excreſcente in medio folio, paruula uelut lacinia folij. Habet & Spadonia opa-
citatē patientiſſima. Itaq; quantalibet ſub umbra ſolum implet. Extra Herculis columnas, in
mari naſciſ frutex, folio Laureæ: q̄ eiectus, in pumicē tranſfiguratur, in Heroo ſinu pare aquis
excante lapidea eſt, ſimilis tñ uirenti. Magnitudo frutici bipedalis. In mari quoq; Rubro uiuere
aſſerunt eā, ſed ſimilē Ariæ. Aria ſilueſtris arbor eſt, hyemis initio fruſtificans, materie durif-
ſima, ut necelle ſit, anteq̄ terebretur, macerari eā prius aqua. Quod & in Robore, Carpinoq;
ſeruaf. Honos ei ad carbonē argentarij officinis, ut Robori, Vne doni, Piceq; utiq; ad coctio-
nem primā. Eſt & Aria, ſiue Agria, quā p Illice aquifolia Dores habēt, ut in Fago diximus. Ex
ea Lauro quæ in mari rubro naſciſ, inſtrumentū muſicū Pandura factum a Troglodytis legi-
mus. In Corſica Laurus diu nulla fuit, nunc ibi ſatu prouenit. Ramo Laurum ſeri poſſe, con-
ſtat, quod ueteres dubitauer. Manu ſatarum receptarumq; in domos, fulmine ſola nō icitur.
Ignes abdicat, ſalis modo, crepitu. Interaneorum etiā uitia, & neruorum, ligno torquente.
Folium eius Lauream uocamus, et Cato Loream. Vna arborum, latina lingua nomen impo-
niſ uiris. Nam Tullius Ciceronis libertus Laureæ nominabatur: qui Ciceronianas aquas epi-
grammate celebrauit. Laureolos quofdā ueteribus dictos, Iuuenalis & Martialis poetæ ſatis in
dicant. Sunt qui Lora hinc dicta exiſtunt, quæ antiqui Laura nuncupabāt, a Laureæ triūpho-
rum: ſub qua ſolerent captiuos uincire, ducendos in pompam, Vri lignum eius pphanis uſi-
bus: ſed ne aras quoq; ipſas accendi eo ſas erat: ut quidam mirētur. Vnde Horatius, et Papini
us Laurum ipſam, non ſolum Imperatoribus, ſed Vatribus dicatā cecinerint. Cum Hedera Po-
etarū, Laurus Ducum fuiſſe legeretur. Quidam ſeniles baculos, e Lauro quoq; faciūt. Cæſarū
Pontificumq; domos, militum arma, faſces Impatorum ornare quōdam ſolita. Pacis ut Oleæ,
ſic uictoriarum Laurus ſemp index. In lauro uetere Spartani libi et bellaria iacentes rodebant
poſt cœnā, ob id ſolia eius, Camaridas ἀνὸ τοῦ κἀντρί, quod eſt, rodere uocabant, & placentas
ipſas Camarata, ſiue Pſeſta, hoc eſt, polentā, oleo conſperſam: quarū loco nobilioribus, Epēcla,
ſiue quod idem eſt, Martye dabant, ceu ſportulę quēdā maiores precioſioresq; ut turdi, palum-
bi, merule, turtures, et anſercs, & alia h̄s ſimilia. Poſt obtinuit, ut omne paulo ſuauius atq; lau-
tius edulium, Martya diceretur: ſiue ab eo uerbo, qd̄ pinſere, unde Magides, & Maze quoque
ſint appellatę: ſiue ab eo, qd̄ mandere ſignificat, unde Maſtiche dicat. Hæ quia in poſtremo cœ-
narum dabantur, ab alijs Epidorpiſmata, & Epidiphnides appellari ſolent. Hinc iuris cuiuſdā
p̄cioſi genera Magis et Capis appellant, in Plauti poetæ Pſeudulo. Nam & uafis genus eſt Ma-
gis, quod tamen Varro a magnitudine deducit, ut Capis quoq; nō captis legi poſſit. Fuit em̄

Plin. li. 15. ca.
30. & alibi paſ-
ſim.
Theoph. li. 3.
capite. 12.

B

h ij

D I O S C O R I D I S

C hoc moris ueteribus, Iurulēta ipsa nominibus uasorū appellare: ut Paropside, et Triblio. Sed & Tragematis uice Laurum in secundas mensas inferri solitā, Callias & Diocles, ut Athenus ingt, autores sunt. Ramus Lauri, aut etiam Oliuæ, a quibusdam uocatur Arfacus. Quancq; & aucula Erythacus, hoc ipso nomine appellari solet. Est aut Erythacus, a Theodoro dictus, Tubecula. Est & Tubetra quēdam uolucris ab eodem, confictio nomine, quam Aristoteles Batini uocauit.

Vide Cēlium
lib. 3. cap. 7.

EX M. VERG. COMM.

Primū id legentes monemus, nescire nos, quanta sit eius loci integritas, & fides, ubi in omnibus græcis pariter legitur, πολυτα δὲ πρᾶνται τὸν σόμαχον καὶ ἰμῖτος κινεῖ, quarum uocum manifestus est sensus. Non tamen antiquiores latini, Serapion scilicet, & antiquus interpres, quicūq; ille fuerit, sic quōdam legebant. In omnibus enim est, Stomachum subuertunt, & nauseas, uel uouitiones faciunt, non diuerso tamen, sed contrario penitus sensu. Ex quo oborta nobis suspicio est, potuisse quōdam illic πρᾶνται legi, quod lenire et mitigare est. Non em quod lenit uouitiones facit, sed aliud similiter desinens, aut non ideo dissimile uerbum, qualia sunt πρᾶνται, πρᾶνται, aut ἀνανεῖ, uel his simile aliquod aliud, quod subuertendi, miscendi, & exasperandi uim haberet.

Illud etiam ex melioribus uetustioribusq; græcis instaurauimus, quod in impresso multisq; alijs deerat, ob id ex melle, passoue concisæ. &c. Deest enim in pluribus λῆται, quod est concisæ, & cum melle aut passo subactæ.

Eadem fide etiam aurium duobus malis grauitati scilicet, & dolori tertium addidimus, qd incertos uocum sonos, indiscreta significatione ad aures peruenientes pertinet. ἀναλυσται enim est, καὶ ἀναλυσται, καὶ ἡχοῖν quos ueteres incertos, & indiscreta significatione sonos inter aurium uicia dixerunt, de quibus alibi certius dicemus.

D
daphnides

De Baccis Lauri. CAP. CVIII.

LAuri Baccæ magis q̄ folia calfaciunt. Ergo in eclegmate cum melle, uel passo profunt tibi, ortopnceæ, & omnibus thoracis rheumatismis. Contra scorpionum ictus ex uino bibuntur. Vitiligines emaculant. Succus Baccarum utilissime aurium dolori & grauitati instillatur, cum uino uetere & Rosaceo. In medicamenta autem adijciuntur quæ neruorum lassitudines reficiunt, acopa uocant, & ad unguenta quæ calfaciunt & discutiunt. Cortex radices calculos rumpit. Partus necat. Hepaticis prodest, tribus obolis in uino odorato potus.

DAPHNIDES, & DAPHNOCOCCI, BACCÆ LAURI SUNT, DAPHNOIDES UERO FRUTEX.

πλάτανος

De Platano. CAP. CIX.

TENERRIMA Platani folia in uino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt. Tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilulæ in uino potæ, serpentium moribus auxiliantur. Exceptæ aut adipe igni ambusta sanant. Incidens foliorum pilularumq; lanugo, oculos & aures defendit.

Theoph. lib.
4. capite. 7.
Pli. li. 12. ca. 2.
Herodo. li. 7.

PLATANO in quantam uis altitudinem radicans se natura, modo nihil obstat, & aquæ superpetat. Qualis in Lycio Athenis fuisse traditur: quæ iuxta aquæductum, nouella adhuc, in drantes fere centum progressa est. In Creta insula, ad Cortyniam, Platanus stetit dicitur, ad fontem quendam, quæ folia hyeme non amitteret, sub qua Ioui compressam Europen indigenæ fabulantur. Itemque in Cypro una, simili esse natura, uisam aliquando, Platanum in æreo tripode nasci credit Theophrastus. Vna hac maxime tolerat securim, & subuersa flatu ab radicibus, reponi potest: ut Salix & Populus alba. Ideoq; actionem dabat Labeo arborum furum casarum, contra eos, qui prostratas uel subcidissent, uel asportassent. quoniam nomine arborum

arborum continerentur quæ possent resurgere. Hæc Italiæ aduena, diuq; in ea, Theophrasto etiamnum prodente, rarissima: per mare Ionium, in Diomedis insulam primum inuecta. Communicata quoq; barbaris occidentis, & ad Morinos usq; imperij Romani terminos perducta. In Lycia unius specu, Plinij ætate, octuaginta, atq; unius pedum cauo, prædicata. Huius umbra delectatum Xerxem, in terra Lydia reperio, qui diem integrum cum exercitu consumpsit sub ea; atq; ut capti amore solent, multis donauit arborem muneribus: quodq; ridiculo proximum est, custodem ei tanq; pellici, Meledonium quendam reliquit, autor Helianus. Nutritur mero Platanus infuso radicibus. Commendatio eius summa. Solem æstatibus arcere, per hyemes admittere. Platani satæ, ut Plinius inquit, regenerauere uitium. Sunt & Platani pumilæ, Chamæ Platani uocatæ. Id & genere ferendi & recidendi fit. Ratione inuenta, sub Augusto Cæsare, quemadmodum nemora tonderetur. A Platani foliorum amplitudine Platanistos græci uocant, loca spaciola, lateq; patentia, ut Photioni credamus. Platanionem uero Hippocrates saxum mari extans leuigatumq;. At Platanos uasis genus est, e quo popana fingeant. Platanum Italia modò rarain habet, Romæ uisam, & in Venetia puincia Bassiano agro, in uiculo cui Sogia nomen sit. Theophrastus e Platano Aegyptia unguentum fieri solitum scribit commendatum uestibus, non per se, sed additum in alia, presertimq; Irinum.

EX M. VERG. COMM.

A Mabilis & expetita omnibus quondam hæc arbor fuit. Peregrina primum Italiæ, mox omnibus in ea locis, & hortis uirens. Iterum neglecta, paulominus q; ad antiquam gratiam ætate nostra restituta est, uiretq; & in delicijs in Aethiopia etiã habetur, magno ipsorum & hominum argumento, quibus uoluptas & uitæ oia, aut contra sollicitudo, & utilitas in precio & honore fuerint. De ea qui plura nosse uelit, Plinium consulat lib. 24, cap. 8, nos ea, breuitati consulentes, relinquimus.

De Fraxino. CAP. CX.

F Raxinus arbor nota est, cuius folia cum succo peruncta, aut ex uino pota, uiperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ramenta scobemq; potu, perniciem afferre traduntur.

BARBARI COROLL.

F Raxinum, Mileam, & Meliam quoq; græci uocant: Trinodemque cognominant, hoc est, Triozon, quia ramos habeat prægrandes, ordinatos, paresq; numero: quod genus arborum, græci ἀφροδισιακόν, hoc est, ut quidam interpretantur, egregias appellant, copiosissima, proceras, teres. Fructificat ætate. Quancq; in duo genera diducitur. Excelsum, procerumq; ligno candido, molliore, crispiore, neruoso, enodi. Alterum humilius, scabriore, duriore, fusciore, sed folio Laurus, Latifolia acutiore, leuiterq; per ambitione ferrato, et ut Theodorus inquit, subsidenti, quia legisset ὑπὸ ἀκρωτίστρι, nos ὑπὸ ἀκρωτίστρι, hoc est, non sine quodam marginis, uel cacuminis aculeo. Ramulum totum, ceu folio singulari credas consistere, quoniam ab pediculo uno, folia simul cuncta erumpunt, & per ampla uersum interualla, tanq; per genicula continentur, ordineq; pendeant, perinde ut in Sorbo, unde Pennata dicitur a Plinio. Internodia latiora candida, coniugationesq; plures, & folia longiuscula. & magis angusta, coloris herbaei. Cortex leuis, spissus & tenuis, rubro colore. Radices crebrae, sublimes & crassæ. Carere hanc flore ac fructu, in Troadis Ida, credunt falso. Etenim fructum fert minutum in siliquis, nucosum, qualem Amygdalæ, gustu subsalsum. Fert & Lauri modo Fraxinus muscū, & alia quædam astrictiora gustu, circinnataq; ut pilulæ Platani. Hæc partim cum fructu emergunt, partim multo post nascuntur ei, et quæ Plesta, hoc est, plicameta, siue, inuolucra dicuntur. Leuis exire amat cauis, madentibusq; locis, scabra sitiētibus & saxosis. In Macedonia Bumeliām appellant, raro corpore, minusq; crispo, amplissimam & lentissimā. Fraxinus, Pirus, Piraster solæ in planis, & materia & fructu commendantur. Oportuna cedi autumnus est. Materies ad plurima utilis. In Ida Troadis, intantū similis Cedro, cortice ablato, ut Plinius, Taxo, Theophrastus ementes uti fallat. Quidam situ diuisere Fraxinum. Campestem crispam, Montanā spissam. Folia earum iumentis mortifera. Cæteris ruminantium innocua, idque in Græciā. Nihil iumentis nocent in Italia. Et hoc de Taxo, Theophrastus interpretatur, nō de Fraxino. Fortasse nominum uicinitas fefellit prodentes, Græcis Fraxinum Mileam, Taxum Milon uocantibus. Matutinas occidentesque umbras eius, quæ sint longissimæ, nulla serpens attingit. Expertum se Plinius dicit, Si fronde ea, gyro claudat ignis, et serpens, in igne potius, q; in Fraxino.

A

Meminit &
Celsus lib. 13,
cap. 31.

μολία

B

Plin. li. 16. ca.
13. lib. 24. ca. 8.

h ij

C xinum fugere serpentem. Fraxinus, anteq̃ serpentes prodeant, florer, nec ante conditas folia dimittit. A Fraxini foliorū similitudine, Fraxinula, siue Fraxinago herba dicit̃, ueteribus nūquam dicta, quod equidem sciam. Mauritania, uel hanc, uel similem Fraxinulę, Secaculum appellat: in compositiones ad uenerem excitandam quęritas, adhibitam, radice candida, & nodosa, flore uiolaceo, fere inter candidum & ceruleum, semine rotundo, ut Iuniperi. Folio inter Pisum, atq; Fraxinum. Non desunt tamen qui Secaculum, ex India tantum inuehi putent, notis quas modo exposui, quandoquidem Fraxinago hæc, quę in nostris habetur manibus, inefficax & infirma sentiatur ad medicinam.

De Populo alba. CAP. CXI.

P otus albę Populi cortex uncia unius pondere, ischiadicis ac urinae stillicidio prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cum mulino resne bibatur. Folia quoque cum uino post purgationes pota, idem præstare produntur. Tepens foliorum succus utiliter aurium dolori instillatur. Pilulę quę primo foliorum partu exiliunt, illitę cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoriae prodiderunt, corticem albę Populi particulatim cęsum, & fulcis stercoreatis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre.

Pli. li. 24. ca. 3.
Theoph. lib.
2. cap. 14.
Columel. lib.
5. cap. 5.

BARBARI COROLL.

P opulus duplex, alba, & nigra. Alba λευκή, nigra, ἄγριος gręcis appellata. Vtriusq; folia ut Crotonis, in iuuenta circinata rotunditatis sunt, uetustiora in angulos exeunt. Eccontrario, Hęderę angulosa rotundantur. Propterea meminit Theophrastus, putare quosdam, mutari candidam, ut Croton & Helix, in Hęderam uetustate, quemadmodum & Pirus in Pirastrum. Habet candida cum quibusdam perpaucis proprietatem illam, ut ab æstiuo solstitio circumagatur, hoc est, partes supinas foliorum conuertat, sicut Olea, Salix, Vlmus, & Tilia, quod quidem sideris confecti, ruficis argumentum est. Vtrunq; genus erectum, sed nigra procerior & leuior. Folium simile ligno. Intus utriq; par candor. Neutra uidetur florere. Populorum folijs grandissima lanugo, gręci χυόν appellāt. Euolat candida, ut Iulus. Nostri tria genera Populi fecerūt. Albę: quę uuas, Bryon uocatas, ferat unguentis, folio numerosiore, bicolore, superne candido, inferiore parte uiridi. Nigrę: quam Arcades sterilem putauerunt. Sed in Creta fructificat in ipso Idę specus aditu, & ad fontem quoq; Sauri, duodecim ab eo loco stadijs. In Cindrio quoq; proximo ab Ida monte, & circa Tirasiam, parte montuosa. Tertium genus Libyę, folio minimo ac nigerrimę, fungisq; enascētib; laudatissimę. Populi ferunt in folijs guttam, ex qua apes popolim suam faciunt. Inter nigras efficacissima Populus est, quę in Creta nascit̃. Aristoteles autor est, Acherein uocari nigram Populum. Pausanias, candidam ita nominatam, q̃ Hercules in descensu ab inferis, apud Acherontem uidisset eam, ramumq; extulisset. Proindeq; non alio ligno, cremari uictimas in Elide, Ioui olympio. Aristoteles omne satum siluofum, arborosumq; Acherusion dici, prodidit. Ad quod forte alludens poeta festiuissimus, Vlmorum Acheruntem dixerit in Amphitrione. Resina Populo exigua est, humor e cauis huius effluit, medicinę utilis. Oleum fit & e Populo nigra, semine. Populeū uulgo, Aegirion, a gręcis appellatum. Verno id conficitur, cum plurimum grauis est, prægnansq; resina. Nam unguentum Populeum ex uua Populi, quę Bryon est, conficitur.

EX M. VERG. COMM.

Exposita omnibus in Theophrasto, Plinioq; & plarissq; alijs, utriusq; Populi albę scilicet, & nigrę, de qua mox dicemus, omnis historia est. Poteruntq; uolentes ab illis certiora & plura audire, q̃ excerpta ex eis, et exscripta ab aliquibus nostra fuerint.

De Macere. CAP. CXII.

M Acer ex Barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu perq̃ astringens: qui contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.

M A B R B A R I C O R O L L. **A**
 Acir, græce Macer, & Xylomacer, cortex est rubēs, radice magnæ, nomine arboris suæ. Conuehitur ex India. Gustu acerbo, & cum quadam acrimonia, iocunde odorato, ut Galenus inquit. Qualis ea sit, incompertum habet Plinius. Recentiores, non radice, sed nucis odoratæ corticem, ac folliculum esse affirmant: idq; uero propius est, & plane ita modo cernitur. Hanc nucem græci modo Carion myristicon appellant, hoc est, nucem unguentariam: quæ sane diuersa est a glande unguentaria, ut post constabit.

Plin. lib. 12. cap. 8.
 Galen. lib. 7. simpliciū far. capite. 89.

E X M A R. V E R G. C O M M.

Multa sunt, quæ inuentum hoc loco Macer, peregrinitatis in hoc scriptore, & alienæ educationis arguant. Siquidem, quod in aromatum cēsu, & ordine est, nasciturq; in India procul a nostro orbe, inter uillosos, & nostræ orbis arbores, tractari non debuit, nec certam habere generis historiam, si quod in India nascitur, apud Barbaros nasci dicatur. Græcis enim Germani etiam Barbari sunt, quibus in frigido cœlo nihil huiusmodi nascitur. Neq; Dioscoridis etate consueuerant ad orientem, & meridiei mundi partēs Barbariam nominare. Quo fit, ut credamus, a proprijs sedibus, quæ illi inter aromata erant, in alienum locum temere translātū fuisse Macer hoc, & quod legitur in rō capēpō, in rō indūhō legendum, aut intelligendū saltem esse. De ligni cortice Galenus multa, & post eum Paulus Aegineta, pluresq; alij.

Nostra etas ex India aduectum aromatis appellatione nouit, non ligni corticem, sed odoratæ nucis, corticosum operimentū, et quasi uillosum folliculū, qualis in Ponticis nondū penitus maturis nucibus uidetur. Qui si idē cū hoc, & eo quod Galenus Xylomacer uocat, sit, peritiorū iudicio relinquimus. Nobis, ut a primo diximus, in scriptore hoc, suspecta omnia facit, loci breuitas, incōcinna elocutio, & quod in pbatissimo mihi codice, nusquā Macer hoc legitur. Cæteri tamen omnes de eo tradiderunt. Nosq; eorū fidē & autoritatē secuti, hætenus de eo egimus.

De VLMO. CAP. CXIII.

Vlmi & folia, & cortex, & rami uim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur. Vulnere glutināt, sed multo magis corticis Tilia, si fasciæ loco intorqueat. Nam lori more flecti potest. Crassior cortex in uino aut aqua unciatim potus, pituitas trahit. Fracta ossa celerius solidescunt, si decocto foliorū corticis aut radice foueantur. Humor in folliculis enascēs prima germinis eruptiōe, cuti illitus nitore inducit, faciēq; splēdidiorē prestat. Qui dū siccat, in animalia abit, quæ culi cū formā gerūt. Folia cū tenerescunt, olerū more ad obsonia usurpantur.

Medic.

B

V B A R B A R I C O R O L L.
 Vlmi *ῥῆλιν* græci uocant, utiq; campestem, quæ & fruticosior. Alterū genus montanæ, *Oripteleam* nominant. Folium indiuisum, leuiter per oram serratum, oblongius q̃ Piro, scabrum. Arbor grandis & celsa, irriguis amica, ligno flauo, neruoso, robusto, ut quæ tota consistit. Vtitur eo ad fores lautiores, ad cardines, assamenta portarum, & torcularia, sonitum caueas, & ad carpentarium quandoque opus. Viridis facile ceditur, sicca difficile. Sterilis habetur arbor. Cratæ Vlmo, ut Fico, Robori, Platanoque gignuntur. Vuam fert, & in petiolis lachrymæ modo gummi, & bestiolas culicibus caprifici similes, in folliculis & autumnio *Cachryes* uocatas, cōplures, minutas, atq; nigras, ut Theophr. scribit. Italiæ quatuor Vlmi sunt genera. Nostrates densiore folio, & ab eodem pediculo numerosiore. Gallicū. Siluestre. Quartum *Attinias* uocant. Excelsissimas, & in ijs *Sicanas* illis præferūt: quæ nō sunt riguæ. Steriles *Attinias*. Ideo plantis seruntur, autumnio uiribus, & *Maritas* appellamus. Reliquæ proueniūt. *Samara*, siue *Amara*, ut *Columellæ* placet (ita nominat Vlmi semen) colligitur circa martias *Kalendas*, cū flauescere incipit, priusq; folio uestiantur Vlmi. *Columella* *Vlmorū* duo tantum genera putauit. Gallicū, & *Vernaculū*: illud *Attiniam*, hoc *Nostratem* uocari: qui & *Tremellium* *seropham* reprehēdit, q̃ *Attiniam* *Vlmi* nō ferētem *Amaram* falso sit opinatus: Nam rariorem, inquit, sine dubio creat: & idcirco plarisque sterilis uidetur, seminibus inter frondem primæ germinationis latētibz. Itaq; nemo inserit ex *Amara*, sed ex *sobolibus*. Est au

Theophr. lib. 3. cap. 14.
 Plin. lib. 24. cap. 1. s. & lib. 17. cap. 11.
 Columella lib. 5. cap. 5.

h iij

D I O S C O R I D I S

Crem Attinia lōge letior & procerior nostrate, frōdemq; iucūdiorem bubus præbet. Amara, ut dixi, dicit semē eius latina uoce. Nā græce, ἀμέρα nō hoc significat, sed riuulū & incile rigandis hortis. ita dictū, quia marcescere phibeat: sed & aurū cauernæ, dicuntur a græcis Amara.

T H E O P H R A S T U S P L I N I U S L O N G I S S I M E D E H A C A R B O R E T R A C T A U E R U N T, I D E O Q; N E C A N O B I S D E S Y D E R A N D A. I L L U D T A T U M M O N E M U S, U O L U I S S E N O S T I L I A M C O R T I C I S I L L I C D I C E R E, Q U O L O C O L E G I T U R, C O R T E X P R O U I N C U L O & F A S C I O L A U U L N E R I. & c. Q U A R E I D E S C R I P T I O N E P L I N I U S A N T E A U S U S F U E R A T, N E T I L I A A R B O R E M V L M O M I S C U I S S E N O S A L I Q U I S D U B I T A R E T. S C I M U S E N I M & N O S, A T I L I A A R B O R E, C U I U S M A T E R I A L E N T A & T R A C T A B I L I S E S T, Q U O D A M L E T I S C O S, F A S C I O L A S Q; I N C O R O N I S E X E A A R B O R E P E N D E T E S.

Non omitemus præterea, in deicienda aluo, Plinium frigida aqua tantū uti, nec pituitā solum, sed etiā aquā deicere: quæ nescio an Dioscoridi deesse possint, & abundare uinū, quo hic in eadem purgatione utitur.

Et cum nihil osseum in Dioscoride illic legeretur, ubi dictum a nobis est, solidescunt celerri me ossea succedente cicatrice, & c. non sine causā ad fracta ossa contrahendam esse rem cogitauimus: cum illic πωροί uerbum esset, quod id tantum significat, ut paulo ante testati sumus, & præterid κάταγμα, quod in fractis tantum ossibus, ab antiquis medicis receptum est.

Quas deinde bestiolas culicibus similes in Vlmi folliculis nasci Dioscorides ait, a Theophrasto Cnipes dicitur, quæadmodum ex Caprificis euolātes. Similes his, aliq; bestię Plenes ab eodem uocantur.

De Lignorum marcore,

C A P. CXIII.

ἀπό τῶν παλαιῶν καὶ πρῶτων σαπρία.

Incidens caudicibus lignisque ueteribus caries congeritur, quæ fari nā modo illita, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Serpētia cohibet, si cum pari aniso & uino subacta, linteisque imposta, illinatur.

BARBARI COROLL.

Cariam lignorum, σαπρότητα græci uocant, & Embion poeta.

T H E O P H R A S T U S P L I N I U S L O N G I S S I M E D E H A C A R B O R E T R A C T A U E R U N T, I D E O Q; N E C A N O B I S D E S Y D E R A N D A. I L L U D T A T U M M O N E M U S, U O L U I S S E N O S T I L I A M C O R T I C I S I L L I C D I C E R E, Q U O L O C O L E G I T U R, C O R T E X P R O U I N C U L O & F A S C I O L A U U L N E R I. & c. Q U A R E I D E S C R I P T I O N E P L I N I U S A N T E A U S U S F U E R A T, N E T I L I A A R B O R E M V L M O M I S C U I S S E N O S A L I Q U I S D U B I T A R E T. S C I M U S E N I M & N O S, A T I L I A A R B O R E, C U I U S M A T E R I A L E N T A & T R A C T A B I L I S E S T, Q U O D A M L E T I S C O S, F A S C I O L A S Q; I N C O R O N I S E X E A A R B O R E P E N D E T E S.

DRedidissim ego facile, de Vlmi carie tantū a Dioscoride agi hoc loco, nisi Paulus Aegineta his uerbis subscripsisset. Lignorum caries, eorūq; præcipue, quæ medio crem adstringendi uim habent, qualis Vlmius est, humentia purgat ulcera, & explet.

De Populo nigra.

C A P. CXV

ἀγρίος

Populi nigræ folia cum aceto illita, magna utilitate podagricis doloribus illinuntur. Resinam Populus fundit, quæ in malagmata additur. Semen potum ex aceto comitialibus utile est. Lachrymam commemorant, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinū, quod Electrum uocant, aliq; Chrysophoron. Id attritu iucundum odorem spirat, & aurum colore imitatur. Tritum, potumq; stomachi uentrisque fluctiones sistit.

BARBARI COROLL.

Theophr. libro. 3. cap. 14.

Populus nigra, qualis ea sit, indicatum est in candida. De ipso autem Electro, sunt qui tria eius genera constituent. Ex arborum succo primum, quod inde Succinum dicatur: ut non hoc sit quod Homerus nouerit. Secundum naturale, quinta parte argenti, ut in canaliensi auro. Tertium cura fit, ex tribus auri partibus, & una argenti: quanquam quod quintam partem argenti excedit, incudibus non resistat. Errare Plinius existimat, qui melius esse putant naturale. Cuius probatio, ut ueneno accepto, & stridorem emittat, & uarios quasi arcus cœlestis in dissimilitudinem reddat colores. Narratur & hæc ad lucernarum lumina clarius argento splendere. Electrum inquit Strabo, purgamentum ipsum auri est, coctura prima qd' ex sulphurosa cuiusdā cretæ comitatu fit. Argentū aurūq; in se cōplexū, chymistæ Phaetontem uocant. Diuersum ab hoc uidet genus esse qd' Ambra, siue Ampar caninū dicit. Aetius Ambar, nos Succinum oriētale primi nominauimus: incōpeatum ueteribus ut arbitror, multis locis scaturiens, bituminis & sulphuris modo. Discrimen eius triplex, Ruffum, & pingue præferunt.

runt. Selachiticū, a municipiō quodam Indiæ uocatum, ubi nascitur. Subalbidū ex Arabia felici. Minus probatur e maritimo quodā oppido, cui Sechra nomen est. Deterrimū nigrescit, quod pisces deuorauere. De hoc tamen alij aliter. Nos græcam fidem sequimur.

VERISIMILE est, debuisse in scriptore hoc etiam coniungi Populū albam, & nigram, & neutram absq; altera tractari. Nos tamē, quoniā locis omnibus in antiquissimis græcis reperitur, eas relinimus, nō ausi mutare, qd' antiquorū omniū codicū fide immutabile esse debuit. De Succinō, quod Electrū ueteres, nostri Ambram dicunt, qui nosse uelit plura, apud Plinium legat libro ultimo, cap. 3. & 4.

Nos etiā illud adiicimus, credere nos, nō ex utraq; Populo succinū fluere, sed ex nigra tantum; ideoq; non *ἡ ἀπὸ τοῦ* numero multitudinis, sed *ἡ ἀπὸ τοῦ* numero singulari legēdum esse locum. Nihil tamē testantibus omnibus græcis, mutatū a nobis est, cognoscendumq; id diligentioribus relinquimus.

De Harundine.

CAP. CXVI.

IN Harundinum genere quædam Nastos uocatur, ex qua sagittæ fabricari solent. Alia foemina, qua tibiærum ligulas efficiūt. Alia quod fistulis addicta sit, Syringias, cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concaua, apud amnes nascens, quæ a quibusdam Cypria, ab alijs Donax appellatur. Alia Phragmites, seu Valltoria, gracilis, candicans, uulgo cognita: cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosq; corpore extrahit. Luxata, lumborumq; dolores, cum aceto mulcet. Virentia folia tusa, & imposita ignibus sacris medetur, & ceteris inflammationibus. Corticis cinere peruncte cū aceto alopecie sanant. Panicule lanugo si aures intrauerit, exsurdet. Eundē effectū implet Harundo quæ Cypria dicitur.

BARBARI COROLL.

HARUNDO *ἡ ἀλυσσός* a græcis dicitur, a Phœnicibus Gingros, ob Adonin, quem Gingrem uocant, & lugent. Radices eius uiuaces, geniculatæ, ac fere in solæ, similes hīs partibus, quæ supra terrā eminet. Huius duo summa genera. Tibiariū. i. Auleticon. Vulgare posterius. Hoc in Characiam, hoc est, Vallare, crassam & ualidā, quæ Græcanica quoq; uulgo dicitur, & a Vitruuio Cerdone græca. Et in Plotiā, siue Plocimon, diducitur, hoc est, flutam, uel nexilem, graciliore & imbecilliore priore, utraq; Orchomeniū circa lacū. Superior, in ripis expansatis stagni, et in Comitibus (sic enim Harundinetū prædensus & factū appellat) sequens subtilis, in insulis fluitantibus, quas græci Ploadas uocāt, in immensum prælatis hīs, quos Cephissus amnis abluisset, ut cecinit Pindarus. Interim cū Auletico nascitur Characias, sed longior cæteris, & uermibus obnoxia. Tibialem hyeme legūt, uere tunicas eximūt, æstate per internodia cecidunt. Optima fieri armamēta e medio geniculo, mollissima e superioribus, durissima ex imis asserunt. Persuasum erat, & ligulæ ex sua quancq; tantū harūdinis parte cōgruere: & eam: quæ radicem antecesserit, leuō Tibiariū lateri cōuenire, quæ cacumē, dextero cæterū internodio, in duas partes dissecto, utriusq; ligulæ os incisuræ cōmittebat: alias negatur congruere: Theophrastus autor. Plinius magno nominū ambitu, Calamos numerat: Aegyptios chartis seruatos: probatior tamen Gnidios: & qui in Asia circa Aneticū amnē nascatur. Nostratibus fungosior natura, bibulos, cauo intus corpore, tenui superne ligno fissiles, præacuta semper acie geniculatos. Gracilitas nodis distincta, leui fastigio tenuat in cacumina, crassiore paniculæ coma, qua pro pluma implentur strata cauponarum. Et hæc ad nauum commissuras in Belgis, glutino quocunque si delior rimis explendis. Bōnonienses e Rheno amne, quibus plurima inest medulla, pondusque uolucris. Contra flatus quoque peruicax libra, ut nullus sagittis aptior sit calamus. Post hos Cretici & Belgici laudantur. Creticus carnosissimus, longissimus internodij, lentissimus si calsiat, Toxicus, id est, sagittarius, ob excellentem eius usum, a Theophrasta dictus. Nunc scriptorius, ex ea insula præcipuus, nec aliūde fere expetit. Omnibus præferitur Indi, ut q' hastarū quoq; uicē præparati, hoc ē, cuspidibus additis, præbeāt. Iis amplitudo arborea est: nec dubitat.

Theophrast.

lib. 4. cap. 11.

Plin. lib. 16. ca.

pi. 36. Lib. 24.

ca. 11. lib. 17. ca.

pite. 10. & 28.

D I O S C O R I D I S

Vide Celiū li
bro. 7. cap. 26.

C E quarū radicibus, ut Solino placet, succus exprimit ad suauitatē mellis, quasi Saccarum interpretari possis. Longitudo subreāru, 30. fere passus, humi uero serpentiū, 50. crassitudo cubito rū ternū, interim senū: quā tamē Strabo nō credidit. Diodorus in australi quadā insula, ægno etiali plaga scribit harūdines haberi plurimas, fructū candidum, Eruo similē ferētes, e quo sua uissimus panis cōficiū. AEque fabulosum atq; illud, q; in eadē insula, duas nasci tradit herbas, supra quas iacētes, placidissimo somno moriānt. In AEthiopia certe populi, radicibus Harundinum in farina tritis, uiscitant, & ob id Rhizophagi nominantur. Spissius mari corpus Indū tradūt. Fœminæ capaciū. Nauigiorū etiam loco, singulis eorū internodijs circa Acetifnem maxime amnem, ternos homines capiēte alueo. Syringias, totus concauus, ita dictus, quia fistulis utilissimus, quoniam nihil sit ei cartilaginis atq; carnis, ut Plinius existimat. Dioscorides crassa eum carne descripsit. Tibialis, Orchomenius, idēq; Auleticus, cōtinuo foramine paruus est. Fruticosissimus Donax, nō nisi in aquaticis natus, latine Canna. q̄q; Canna apud nos, ut inqt Columella, gracilē & degenerē significat harundinē. Apud græcos fiscellę genus Cāna dicit, ut est apud Pollucē. Præferē aquaticis, siccus. Laconicus foliū uariū, & ab ima parte densius, tunicis longioribus; quales circa stagna, dissimiles amnicis. Est & obliqua Harido, nō excelsa, sed iuxta terrā fruticis modo se spargēs. Suauissima in teneritate, pecori. Ab aliquibus uocatur Elegia, Zeugita, calami dicunt, Armauentarios Theodorus interpreta tur, cū in amplitudinē aucupatoriā adolecūt. Auletici, lacu Orchomenio, influente Cephiso amne, pmanenteq; anno, celerius autē recedēte. Graciliores, Bombycinæ appellabantur. Horū generū fœminæ, Spadones et Eunuchæ uocari solitę, folio latiore, candidiore, nulla, uel modica lanugine. hinc erāt armamēta ad cātus inclusos, quę gręci Iugamēta, siue Paria, hoc ē Zeuge, ad dexterā & sinistra tibiā uilia uocabāt; qđ ita essent cōiunctę, ut altera eiusdē carminis incutitua, altera succētua foret, ad Bacteriā a Theoph. (nisi fallor) appellatos. De Bacteria meminit & Plutar. & Pollux, gestamēq; id theatraliū psonarū demōstrant esse, ut Scipionē Plautus, rectū insignibus, curuū ignobilibus. In sacris certe literis Bacteria dicitur inuocatio ea, quę post præceptio nem addi solet. Quid si q; in Theophrasto, nō ad βακτηριαν, sed ἡμετέριαν legendū putet: Erat autem hoc & loci nomē, ut inqt Pollux, & theatralis cuiusdā operę cationisue genus, statariū, & citra saltationē, ac tripudiū: quo Lacedæmonios & Arcades uti solitos incinēte modulos & frequentamēta quædā simplicia tibicine Atheneus cōmemorat: qđ & Enoplion uocauerint: etiā Embasim, hoc est, ingressiōē incessionēq; ut ē apud Gelliū. Ob id inclusos cātus a Plinio dictos inrelligo, qbus antiquitas in theatro cōtēta erat, simplici adhuc musica, hoc est, ut Theophrastus inqt, Aplasto, cōprimētibus se tibiārū ligulis, quia tempestiue caderēt, ideoq; ad uarietates, flexusq; sonorū inutilibus. ad hoc exēpli, πάλιν καθήριον uocabāt: cuius inuētor Aristonicus fuisse dicitur, ut Atheneus meminit. Illos autē, quibus operosa ratio canēdi placuit, Campraulos, a uocū inflexione appellauerūt: quod nomē in Carini Cæsaris uita deprauatum, correximus. Correxerit hoc luxuria, & per solsticia cēdi placuit, ut in trimatu demū utiles fierēt apertioribus earū ligulis, ad flexēdos sonos. Armamēta sane, Plinio est, ubi p Iugamētis uine arū, Pedamētisue accepit. Tibicines gręci, et Monaulos, & Calamaulas, et Rhapsaulas quoq; dicūt. Habēt & illa distinctio. Tibiārū aliæ uirginales & puellares. Aliæ uiriles: quas & pfectas & plusq; pfectas cognomināt. Sūt & citharisticæ quædā Tibiæ: item quę Daustilicę uocātur, & quę Lyliodicę, & Tragicę. Lyliodi uero dicebātur, q mimos qsdā sub psonis muliebribus agebant, ut uirilibus Magodi. Nā Elimi tibiæ apud Sophoclē in Niobe, nihil aliud uident esse, q Phrygię: quas & Scytaleas, ob crassitudinē appellāt, et obliquas, ut inqt Varro, siue impares, quęadmodū Serranas, quę pares essent & æqualibus cavernis, cū in Phrygijs dextera unū haberet foramē, sinistra duo: quarū inuētor Midas. Nominant & Diopi, hoc est, biforę, qbus & nos utimur, sed e buxo, aliæ materia. hæ corniculorū tubarūq; sunt, & semp fuere comites. Hebebātur olim & HemioPi, hoc est, semiforę: quas & minores, & impfectas, & puellares uocabant, atq; terrenas, hoc est Moluculas, epulis adhiberi solitas. Vt hoc uideat Plautus intellexisse, cū semifonarios arūfices quosdā nominat. Itē Mesocope, & Hypotretæ, qđ alterę in medio foratę, alterę ad imū ptusę forēt. Tityrina quoq; tibia eadē est quę harūdinea. Nā Magadis & Palæomagadis ea est, quę acutū grauēq; sonū reddit, genus citharisticę tibiæ: q̄q; Magadis & Psalteriū nomē est idē cū Sābucā & Pecūde, ut multis placet, nec tñ omnibus. Alias quoq; Tibias in arbore Loto diximus. Singularē tibiā Monocalamō, & Monaulū uocāt: sicut multi plicē Polycalamō. Priorē Marfias Celanis, aut Mercurius inuenit. Alij Seuthen, & Rhonacen Medos homines inuenisse quidē, sed Marfiā uinxisse cera putāt. Alteas Silenus, siue Marfias, quorū Poetę gręci, tibiā plærūq; Lebyn uocāt, ab inuētoris patria, ut Duris scriptū reliqt. Varro Præcentiuas

ro Præcitiuas & Succetiuas cōnumerat: quarū sit usus ad puluinaria præcinendi subcinediq; a quo & Præcentores & Subcētores appellant. Item Vascas, foraminibus q̄ præcentiue pluri bus. Lydias porro, easdemq; Turarias uocabant, q̄ inter Tura adhiberentur. Gingrinæ, tenui orem sonū edebāt, q̄ Vascæ. Clarissimū AEgyptiæ, Garrulū Arabicæ. Ob id græci nugacent hominem, Arabicū tonariū, pro uerbo facto nomināt. Acutissimæ Gingrinæ habebantur & Corinthiæ, ut inquit Solinus. Gingrinas, ab anserina uoce dictas putāt. Nam & græci, *χινδιν* pro eo quod est, tibia sonare, dicunt. Ego a Ginge, qui sit Adonis, ut huius capitis initio mon strauimus. Erant & suæ funerū tibiæ, siue tubæ, ut inquit Gellius, quarū peritos, Sircinas uocabāt, non quasi sicciniestas, a genere tripudij, sed q̄ ad sitos, hoc est, uita functos, & terra cōdi tos sonarent. Erant & Tonaria, quibus uti Gracchus solebat, ad cōponendā in cōcione uocē eburneis. Nota est historia. Est & in Italia nascēs, ex quā sit Adarcha nomine, de quā post dicē mus. Aucupatoria sane harundo, a Panormo laudatissima legi, & Panorito, Piscatoria abari tana ex Africa. Mulicæ harūdines, ex insula Siciliæ, Thermitano agro sita laudātur, ut Solinus ait. Sunt & aliæ sine nominibus harūdines, proceritate, breuitate, crassitudine, exilitate simili busq; distinctæ: adeo, ut. 29. earū genera demonstrasse Plinius se dixerit. Harūdo omnis, ex una stirpe numerosa, atq; etiā recisa, deustaq; foecūdiōr. Folia Indicis tantū breuiā. Omnibus a nō do cōplexus initū est membranīs per ambitum tenuibus, raroq; non a medio genu procum bentibus. Latera in rotunditatem bina, sup nodos alterno semper inguine, hoc a dextra, illō ab leua, superiore per uices. Inde exeunt aliquādo rami, qui sunt calami tenues. Mira huius & Fi lici discordia. Vtriusq; radix cōtrita & imposita, stipem alterius eicit infixū corpori. Ad hūc usum, ex Harundinis radice medicamentū Hippocrates, Epispastron Orchomeniū, uidet quī buldā appellasse. Magna cū altero genere concordia. siquidē ut Cato præcipit, optime corru da seritur, ubi sint harūdines. Harūdini bus septentrio, domos suas operit: duratq; ita in altitu dine tegulū earum. In reliquo orbe cameras leuissime suspendunt. Harundinis Italiæ usus ad uineas quoq; ut Arpino agro. Paniculæ florē illū, auribus infestū, Anthelem græci appellāt.

E X M. V E R G. C O M M.

Q Vos cum radice Harūdinis bulbos diximus, oculos eius intelligimus, quo nomine etiā ueteres in radice Harūdinis eā partē dixerūt, unde noua eius soboles quotānis nascit.

De P A P Y R O.

CAP. CXVII.

Papyrus, qua chartæ fiunt, nullis non cognita, præcipue in medici na utilitatis ad laxandas fistulas. Madefacta lino inuoluitur usque dum inaruerit. Constricta enim atque immissa in hiatum completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix. Itaque AEgyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes, & mansam expu unt. Iplis radicibus pro ligno utuntur. Crematæ Papyri cinis depascen tia ulcera cum omnium partium, tum oris maxime cohibent. Verum me lius id combusta Charta præstat.

B A R B A R I C O R O L L.

Papyrus, et Papyrū, latine dicit. In palustribus AEgypti, aut gescentibus Nili aquis nascit; quæ regio, Delta, & inferior pars uocat. Item Syriæ, circa quæ odoratus ille Calamus lacti nasci tur, & in Euphrate circa Babylonē. In AEgypto, nō excedēte bina cubita gurgitiū altitudine, uolari hominis robusti, brachialiq; radicis crassitudine. Obliqua hæc, atq; densa, nō amplius q̄ cubitorū decē longitudinis. Triagulis Papyrorū lateribus, qui a terra multis partibus tollun tur, pedibus, ut inquit Strabo, decem, uel ut alij, cubitis quaternis. In gracilitate fastigiati, susti nentes comata, ac Thyrsi modo cacumē includentes exile. Ad nihil utile, præterea nullo semi ne, aut usu eius alio, q̄ floris ad Deos coronados. Radicibus incolē utunt, nec ignis tm gratia, sed ad alia quoq; utētilia uasorū: ut q̄ p̄ba & alta materie sint. Ex ipso quidē Papyro nauigia te xunt. E libro uela, tegetesq; necnō & uestis genus, & stragula & funes. Mādunt crudū elixū, succo deuorato, corpus expuentes. Scitur & usus ex eo ad chartas ueteribus. Nūc alia earum officinis inuēta ratio est. Habēt & in AEthiopia & Italia Papyrus uel p̄miscue, Ciminio lacu plurimum, sed alterius forte generis, nec ad chartas utile. quandoquidem AEgypto propria tribuitur, & Biblos appellatur. Alioquin Strabo, in India quoque nasci Biblum scribit. Idem autor, in parte Nili, quæ dicitur inferior, abundare tradit eam; quoniam ibi præcipue colatur.

A

Arabicus to narius. Pro uerbium. Gell. li. 10. ca pite. 2.

B

π ά π υ ρ ο ς

Plinius. lib. 17. cap. 11. 12.

D I O S C O R I D I S

C & duorum esse generum: deteriolem, & meliorem: quæ Hieratica dicatur: unde & nomē Char-
tæ Plinio, Herodotus ueteri consuetudine pelles quoque hircinas, & ouillas, Biblos uocari tra-
dit, quæ in penuria chartarum uteretur uice.

De MYRYCA.

CAP. CXVIII.

MYrica, seu Tamarix arbor, uulgo cognita est, cum apud pigras
& stagnantes aquas enascatur, fructum quasi florem ferens com-
page muscosum. Aegyptus, Syriaque alteram gignunt mitiorem, silue-
stri cætera similem. Fructum parit Gallæ proximum, inæqualiter, aspe-
rum gustu, quo conuenienter utimur uice Gallæ in medicaminibus ocu-
lorum orisque. Datur cruentæ excreationi in potu, & coeliacis, & con-
tra profluuiâ foeminarum, regium morbum, & phalangiorum morsus.
Illitus tumores inhibet. Cortex in eisdem usus adhibetur. Decoctum fo-
liorum cum uino potum, lienem absumit. Ad dolorem dentium in collu-
tionibus salutare, & mulieribus fluctioni uulua oportuni in deflectioni-
bus. Phthiriasi, lendibusque circumfusus prodest. Abundantiam foe-
minarum sistit impositus arboris cinis. Potorios calices e caudice lienosis
moliuntur, quo datus in his potus proficiat.

BARBARI COROLL.

Plin. lib. 13.
cap. 11.

MYricen, Tamaricem uocant Corinthi. Et in Achaia quoque est, & Bria dicitur: & cum
plus iusto adoleuit, Promala utique poetis, siluestris, & sterilis forte, quia fructus ei bryodes,
hoc est, muscosus. Nam satiuæ similis Gallæ prouenit: quæ in Syria, & in Aegypto copiosa
etiam est. Hanc & Amaricem nonnulli appellant: similem scopis amerinis prodentes. Neque ta-
men omnibus eandem esse Tamaricem & Amaricem placet. Myrices certe infelicia ligna uul-
go nominantur: quoniam nihil ferat præter flosculum, de quo diximus, muscosum: nec seriat
unquam. Huius cum uno uiscerum liene tanta dissidentia est, ut affirmet, a Democrito lumen
res, si ex ea alueis canalibusue factis bibant sues, sine liene inueniri. Et ideo homini splenetico,
cibum potumque dant in uasis ex ea fabricatis. Illud obiter indicandum est Columellæ studiosis,
ut locum in octauo eius libro corrigant, ita scriptum. Succurritur, inquit, si fabricentur Cana-
les Tamaricis & Rusco. Legendum est, Tamaricis e trunco, author Dioscorides. Nec illud non
docendum, qui uitro soluendo firmandoque accurrat, ex hac arbore potissimum igni suo escā
ministrat. Cuius radicem officinæ Casiam uocare solent: & quæ palam imperitiâ medicorum est,
pro Casia odorata utuntur. Folium Miricæ sunt qui Sabinæ herbæ non nihil simile præcipient.

EX M. VERG. COMM.

QUam cæteri græcorum appellatione Myricen, potius quæ Tamaricen dixerunt, nos autho-
re Columella, plantarum & Romani sermonis grauissimo teste, Tamaricen libere &
intrepide diximus. Is enim de suillo pecore, eiusque morbis lib. octauo agens, Solere ait sues ui-
tiosi splenis dolore infestari, accideretque id malum magnis siccitatibus, quo tempore stratis pas-
sim sub arbore pomis, sues dulcedine pabuli cōfectates, splenis incremento laborant: succurritque
huic malo dixit, si e trunco Tamaricis fabricentur canales, impleanturque aqua, deinde sitientibus
admoveantur. Quippe ligni succus medicabilis eporus, intestinum lienis tumorem com-
pescit. Quo uno testimonio satis fore nobis credidimus, ut quæ græcis μυρίκη est, latinis Tama-
rix quondam fuerit, & adhuc sit, eodem in duobus autoribus eiusdem mali conueniente reme-
dio. Sterilem Tamaricen in Theriacis suis Nicander esse testatus est, speciosumque eius fruticet:
ideo μάστιγιν, i. uatem uocari, quoniam iusserit Apollo uates Tamaricis ramulū, manutenen-
tes uaticinari. Verficuli eius sunt.

καὶ μυρίκη λάξιν νῖον πανακαρπία θάμνον,
μάστιγιν ἐνὶ ζώοισιν χερσαμίον ἢ ἐν ἀπόλλων,
μαγτοσύνας κορυπταῖος ἰθὺκατο καίθιμιν ἀνδρῶν.

Quæ sic facile uertat aliquis. Sumito præterea Myrices fruticem, uatem inter uiuentes ho-
noratum. In qua Apollo Corypæus uaticinia posuit, & iura mortalium. Ob quam causam,
ex historia

ut ex historia collegimus, Magi & Scythæ ad uaticinia sua Myrice utebantur. Quod genus diuinationis ab alijs gentibus etiam seruatum est. Herodotus siquidem sepe in diuersis gentibus Myriceis ramulis uaticinia fieri testatur. Ob quam causam & Apollo Myriceus quondam dictus est. Quoniam ex eadem arbore in pompa Iouis coronari solitos in Aegypto sacerdotes, & in Media Magos, ex antiquioribus scriptoribus plures retulerunt.

De Erica. CAP. CXIX.

Erica fruticosa arbor Myricæ similis, longe minor, cuius flore apes reprobum mel efficiunt. Tam flos, quam coma serpentium ictibus illitu medetur.

BARBARI COROLL.

Ericem, colore tradunt Roris marini, ac pene folio. Propterea Theophrastus uberrimam Libanotide Ericem nasci refert. Mel quod è flore huius, apes faciunt, Ericum uocatur, simile arenoso, siluestre, improbumque. Conuehitur post primos autumnus imbres, cum Erica. Sola floret in siluis. Asiæ, Græciæque fruticibus ascribitur. Athenienses hanc, ut ait Plinius, Tetradicem, Eubœa Sisarum, siue ut Varro Sisaram, unde liquidum mel fiat, putantque apibus esse gratissimam. Fortassis, quia tunc nulla alia sit copia. Theophrastus, Tetralicem, non Tetradicem, nisi mendosus codex est, appellat, in genere fruticum aculeatam, & germinantem æstate. De hac Ericem intelligat, nec ne, haud scio. Quia tamen bis anno floret Erica, prima uidelicet & ultima siluestrium, nec inter aculeatas ponitur, fieri potest, ut alia sit Tetralix sua Theophrasto, alia quæ pro Ericem Athenis capitur: nisi quis hanc Tetradicem, illam Tetralicem uocari malit. Meminit & Tetragoniam uocatæ Theophrastus, sed inter arbores quæ tardissime germinant, ut Thyia, Taxusque. Theodorus Quadratoriam interpretatus est, melius si Quadrangulam. Columella Ericem intelligit, cum amaricum, siue amaricem, & amaricinòs flores commemorat. Quancumque ibi lectio corrupta in eo fertur. Nam & amaranthini, pro amaricinis, & tamaricem pro amarice, scriptum fere inuenias. Cum sit Tamarice, non Erica, sed Myrica. Confundit hoc Palladius: qui tertiam mellationem, Tamarisci floribus (ita enim uocat ipse Tamaricem) constare tradidit: cum Ericem, idest, Amaricis ea, non Tamaricis pabulo fiat, autore Plinio. Nisi quis Tamaricis appellatione, ueteres & Ericem, & Myricem significare uoluisset dixerit. Plinius Ericem illic similem descripsit. Credo Myricem, non Illicem legendum, cum Dioscoridis auctoritate, tum quod ita modo cernitur in Patauinis montibus: non quidem folio, quod ei Roris marini simile tribuitur, sed musco, quem floris uice habet, ut Myrica. Quod autem Ericem uideatur etiam uocata Siderites, libro Plinij undecimo, nos cum locum in castigatione Pliniana, deprauatum ostendimus.

EX M. VERG. COMM.

Vitilibus plerisque. Qualis Salices, Vitex & Genistæ sunt: ueluti congenerem illis plantam libro uicesimo quarto Plinius Ericem adnumerat. Omnes Tamarici similem tradiderunt, floreque eius, qui solus extremo autumnus ab apibus inueniatur, ultimam mellis uindemiam fieri.

Theophrastus Libanotidi, quam Rosmarinū Romani dicunt, similem fecisse uidetur. Ex quibus omnibus, non fuerit difficile notas has omnes diligenter obseruantibus, quæ nam ea nunc sit ostendere. Nobis inclinatur animus, in Genistarum genere, siluestrem a nobis dictam Ericem hanc esse. Vidimus enim aliquando septembri & octobri mense, utriusque Genistæ flores. Non tamen quotannis, & ubique apud nos eo tempore florent. Quod cæli maiore beneficio alijs potest competere locis.

Ericem in Aegypto quondam fuit, grata Isidi arbor, quæ tempestate electum Osyridem excerpisset, subitoque in cremore intra se clausum operuisse. testis et autor Plutarchus libro de Iside et Osyride. Paulus Aegineta dicit discutiendi uires sine erosionem habere, foliaque & flores in usu præcipue esse.

De Acacalide. CAP. CXX.

Acacalis fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis Myricæ quadam tenus similis, cuius aqua in qua maduerit ad collyria ad-

D I O S C O R I D I S

C datur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

A B A R B A R I C O R O L L.

Acacalī, Paulus Atallida nominat. Galenus ubi meminerit, nondum comperi. Nomen fructi, a nymp̄ha datum crediderim Acacali, quæ ab Apolline compressa, Phylacidē & Phylandrum ediderit in Creta, miraculo ab Elyreis in sulā populis confecto: nutritos a capra eos fuisse: cuius rei monumentum in Apollinis quoq; delphici delubro monstrabatur. autor Pausanias. Apollonius poeta, in Argonautico, Acacalī Minōis regis filiam, ab Apolline quidem uitiam cecinit: sed quæ in Aphricam relegata, filium ediderit nomine Amphithoon, qui & Garamas quoq; uocaretur, Nasamonis & Caphauri pater, ex nymp̄ha Tritonide.

De Rhamno. CAP. CXXI.

Rhamnum alij Persephonion uocant, alij Leucacantham, Romani Spinam albam, aut Cerualem, Aphri Atadin. Rhamnus fruticat in sepibus, ramos ferens rectos, & aculeos in acutæ spinæ modū, folijs paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus, latioribusque folijs constat, & quadam tenuis rubentibus, cuius rami quinum cubitorum longitudinem implent, infirmioribus horrentes spinis, innocentioribusque. Fructum ædit latum, candidum, tenuem ueluti folliculum, Hastulæ regiæ similem. Omnium folia igni sacro, & serpentibus ulceribus efficaciter illinuntur. Fama est, ramos huius ualuīs, fenestrisue impositos, ueneficia depellere.

Pli. li. 24. ca. 4.
Theoph. lib.
1. cap. 17.

A B A R B A R I C O R O L L.

Rhamnum, igniarijs utilem ferunt, presertim conceptaculo et craticulæ. In duo genera diuiditur, nigrum, & candidum. Vtriq; fructus parentum colore. Nigrum folliculos fert, siluestreque habetur. Huius radice decocta in aqua, fit medicamentū, quod uocatur Lycium. Rhamnos inter Ruborum genera describitur. Hæc Theophrastum Pliniumque secuti, diximus. Aliter a Dioscoride monstratur. Photion Rhamnum, a quibusdam Agnon, a uirtutis similitudine uocatam scribit, quæ uenerem coerceat, ut Vitex. Rhamnum Dioscorides, a nostris Spinam cerualē dicit appellari. Quo argumento uideri potest, haud dissimile huic genus esse quod hodie uulgo Spinam ceruinam uocamus, fructu Myrti, foris nigro, intus uiridi, ob id uel ad colorem eum pingentibus idoneo. Cortex arbori subniger, & nitidus, quasi Ceraso, intus uires, post luteus, lignum extra candidum, interior medulla ruber.

E X M. V E R G. C O M M.

Spinam antiquiores græci Rhamnum, posteriores alterius spinæ nomine, ob candoris similitudinem, Leucacantham, Romani modo hac, modo illa appellatione indicant, quæ alterius erant, alteri etiam tribuentes. Quod Plinius, ut nobis uideatur, fecit: qui amuletum contra ueneficia Rhamno fuit a græcis assignatum, Aquifoliæ spinosæ pariter arbori assignauit, libro suæ historiæ. 24. testatus, Aquifoliam arborem in domo, aut uilla satam, ueneficia arcere. Nisi forte eadem uis Aquifoliæ quondam inesse etiam credita fuerit. Naso certo in Fastis suis, græcam fidem secutus, spinam albam Rhamnum dixit: ex re ipsa, & altera in græcis Rubi huius appellatione rem ostendens. Locus non longe a principio sexti libri est.

ἄλμυρος

De Halimo. CAP. CXXII.

Halimum alij Damasonium uocant, alij Erymon, alij Brettanicam, alij Rhabdion, alij Basilion, Magi Mercurij basim, aut Osyridis diadema, alij Elystephanon, aut sacrum caulē, Pythagoras Anthenoron, Aegyptij Afontiri, alij Asphen, alij Asealuri, alij Asariphen, Latini Albutium, aut Ampeluciam. Halimus frutex est sepimentis idoneus, similis Rhamno, sine spinis, folijs Oleæ, sed latioribus. Nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Radix con-

uulsa, rupta, torminaque mitigat, drachmæ pōdere in aqua mulsa pota. A
Eadem lactis ubertatem facit.

B A R B A R I C O R O L L.

Halimon, nostri, ut ait Plinius, Aureonem uocāt. Conuoluit se ut Hedera. Locis salis nascitur, falsilaginemq̃ p̃fert. Sit hæc, de qua Dioscorides, & Plinius, a quibusdam Asphodelon, siue Albucum existimatam p̃hibent, an alia, mihi parum constat. Reperio autem in autoribus, modo afflatā, modo nude scriptam primam literam. Placet aspiratio, quoniam maritimum olus credatur, & Almytis etiam a falsilagine dicitur ab Actio. Asphodelon appellari Halimon ab Hesiodo, quidam falso interpretantur: qui tamen error a græcis ortus, peruenit & ad latinos. De Halimo discrepant sententiæ. Alij fruticem esse uolunt, densum, candidū, sine spina, folijs Oleæ mollioribus, latioribus, quæ cibo coquantur. Addunt in maritimis natum. Alij separant, maritimum olus dicentes Halimon, & falsum: unde nomen folijs, in rotunditatem longis, quod & mandatur, condiaturq̃. Duorum præterea generum, siluestre, & minus. Folium siluestri tenuius, maioris effectus. Crataeis tertium genus facit, longioribus folijs, & pilosioribus, odore Cupressi, nascens sub Hedera. Galenus Halimum in Cilicia prouenire copiosam, ibique folia recentis in cibos recipi, & in usum condita seruari, scribit. Solinus Alimon in Creta nasci tradit, mirabili, si credamus, effectū: quod aduersa ea, fames interdum nulla sentiat, ut nomen inde impositum ei sit, quasi famem arceat, proptereaq̃ nec aspirationem prima litera recipiat.

Pli. li. 22. ca. 22

E X M. V E R G. C O M M.

Nasci maritimis locis Halimū, quem Plinius Aureonem nominat, hic ipse testatur. Salso autem sapore esse, & inter olera quondam in usu fuisse, præter Dioscoridem idem Plinius indicauit, falsum olus a quibusdam dici affirmans, & Plinio, Dioscoridique subscribens Paulus Aegineta libro primo. Theophrastus libro quarto de historia, & libro quinto de causis, encandipinquis, & adnatas plantas uim illi adsignauit: quales multæ in natura sunt, quæ sub tracto alimento, alias perimant arbores. quales Hedera, & Cytisus est.

B

Fecit in sanitatis usu, & medicina Halimi quondam usus, ut in multo ambitu nominum et appellationū, antiquis græcis fuerit hæc planta: quæ omnes appellationes, aut superstitiosæ, aut ab illis excogitatæ sunt, aut a similibus factæ.

Credimus nos (quod Plinius. 22. ait) existimasse quosdam Asphodelon ab Hesiodo Halimon uocari: ideo factum esse, quod in sepibus nasceretur: et Hesiodus in cibis etiam Asphodelum laudauerit, cum ait, nescire iniuste agētes, quanta in Asphodelo & Malua utilitas sit. Quæ opinione semel illata, facile factum est, ut Halimus non aliter, q̃ Asphodelus Albucus diceretur. Albucum enim, si Plinio credimus, antiqui Asphodeli radicem dixerunt.

Quod deinde passim & in cunctis Ampeluciā dici etiam Halimon, ab alba uite, quam græci in sepibus nascentem uitam albam nominant, factum fuisse credimus. Quæ tamen omnia coniecturam, non decreta uolumus esse.

DE PALIVRO. CAP. CXXIII.

Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum inuenitur. Quod potum tussi opitulatur. Vesicæ calculos comminuit. Serpentium ictibus aduersatur. Folia & radix astringentioriam uim habent. Quorum decoctum potu aluum sistit. Vrinam trahit. Contra uenena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresq̃ omnes discutit, trita & imposita.

πάλιυρος

B A R B A R I C O R O L L.

Paliurus, ut in fruticum genere collocetur, in magnitudinem arboris assurgit. Ab occasu uergiliarum fructificat. Fert in siliquis terna & quaterna semina, lentorem quendam pinguem emittentia, ut lini semen confusa. Amat nasci aridis, quemadmodum & Rubi, nec minus dilutis. Folium exciduum sicut Rhamno. Cyrenis laudatissima: ubi Loto quoq̃ præferunt, eodem folio, sed fructu diuerso, ut qui non latus, sed rotundus, ruberque sit nucleo, qui non simul mādatur, ut in Punicis. Magnitudo ei quæ fructibus Cedri, pauloue amplior. Nominatur ab Afris Zura, iocundus per se, atq̃ suauior etiā uino affusus: contra quoq̃ uina succo suo com-

Pli. li. 24. ca. 14
Theoph. li.
bro. 3. cap. 17.
& lib. 4. ca. 4.

C mendans. Paliurus, spinosa ramis, ut Rubus. Agathocles Paliurum ab Alexandrinis Connarum uocari tradit, enatam scribens icto fulmine sepulchro. Vlmi atq; Pinus amplitudine, ramis frequentibus, prylongis, subaculeatis. Folio uiridi, rotundo, molli. Biferam. Nam & uere & autumnno fructum parit Oliuæ, Phauliæ uocatæ magnitudine: cui & nucleo & carne similis est, sapore uincens. Crudus uirensq; manditur. Vbi exoleuit, farinam ex eo fieri, atq; ita estari, nec subactam, nec conspersam aqua. Ichthyophagi, piscium carnes semine Paliuri conditas inueterant. Troglodytæ, succo Paliuri pro uino utunt uulgo. Nam proceres florem quandam exprimunt, cuius liquor nostrati Musto similis aspicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

P Aliuro nulla certa est nota, propter multiplicem eius crescentiam. Nam in aliquibus locis arborefcit, in aliquibus fruticis naturam non excedit. Ideo diuersa eius historia legitur. Numerassem et ego aliquas eius notas, nisi copiose ab alijs de eo collecta et tradita omnia fuissent. Illud tantum adijcimus, nostratem Paliurum, non ideo dissimilem Canis sentibus esse, quos greci Cynosbatos dicunt, cognatasq; et ueluti congeneres plantas esse Rhamnum, Paliurum, Oxyacanthum, & Canis sentem: ideoq; a Dioscoride deinceps tractatas, aculeatas omnes & muniendis sepibus aptas, & ob id tantum priuatim descriptas, quoniam proprie singularum notæ aliquæ essent; quod in Oxyacantho mox etiam dicemus.

De Acuta spina. CAP. CXXIII.

ἄγρια
πυρίνη
αἰξάνθη

A Cuta spina, quam Pyrinam, aut Pityanthen aliqui uocant, arbor est Piraastro similis, spinosa, & minor. Baccas profert Myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum. Radicem multifidam, alte descendentem. Huius baccae potu, aut cibo, alui profluuium, & abundantiam foeminarum sistunt. Radix illita, aculeos & spicula extrahit. Abortum fieri tradunt, si terradice uenter, aut sensim feriat, aut perungatur.

De spinarū
neribus plura
Theophrast.
lib. 4. cap. 1.

B A R B A R I C O R O L L.

O Xycāthos quæ sit, in Plinio non comperi. Medicinas certe, quas Dioscorides ei tribuit, Paliuro Plinius dicauit. Dicitur hæc et Oxyacantha, Olympo mote plurima, siluestrium arborum, frondis æternæ, ab occasu uergiliarum, fructifera, flore coronario, fructu Cedri atq; Myrti. Rura modo hanc Crispinam, quasi acrem spinam uocant, ut multis placet: ex cuius acinis uinum etiam conficitur, Crispinum uocatum, eodem fere usu quo uinum ex malo Punico. Singulares in acinis quibusq; nuclei sunt. Acini oblongi, & racemosi, congesti, folia quoq; oblonga. Diuersum genus est quod uuam fert, Crispinam uulgo dictam, ueteribus præterita, acinis candidis, & in maturitate dulcibus, aculeato frutice, folio apij fere, in hortis frequens. Habetur & alter frutex, æque spinis horridus, sed topiarius magis, & uitis pusillæ, folio rubentis uuæ fertilis: nec in Italia modo, sed in Germania quoq; mihi uisus.

E X M. V E R G. C O M M.

F acilis cognita & inuentu Oxyacantha hæc, tam certæ eius notæ sunt, & tam multis locis nascitur. Ab agrefu Piro diminuta appellatione rura uostra eam uocant. Florem fert muscosum, & post florem racemosum fructum, nō dissimilem Ligustro. Non fuit latinis cura, quidd hæcenus inuenerim, illi nomen dare, nec Plinius, quod meminerim, sub hac uoce eius meminuit. Græci a spinarum acuminatis cuspidibus, Oxyacantham dixerunt; meminuitq; eius pluribus locis Theophrastus, aculeatis spinis infestam, & post uergiliarum occasum, hyeme fructus suos maturantem.

Quæ mox adiectæ illi sunt appellationes Pyrine, & Pyrianthe, a græca, aut a latina appellatione fieri potuerunt. Si a latina, a Piro id erit: ut quemadmodum nos Pirastrum agrestem Pirum dicimus aliquando, sic græci etiam latinam uocem mote suo diminuentes, πυρίνη dixerunt. Si a græca, tunc a nucleis, quos plures intra se fructus claudit, nominis ratio erit. In Pomis enim græci πυρήνας dixerunt nucleos omnes, quibus exterior et ambiens caro substinetur: ut in Cerasis, & Prunis.

Quod legebatur deinde in impresso, pluribusq; alijs, ἡ ἀγριώδης ἄμυα, ex melioribus mutatum a nobis est, in ἀγριώδης ἄγαν. Neq; ab re, quando hic ait, agresti Piro similem Oxyacantham, minorem tantum & spinosiorum.

LIBER PRIMVS.

Quo loco etiam in grecis legitur, *Αἰσχροίαν ἰσχυρὴν καὶ ποτὶν γυναικῶν*, in aliquibus, non tamen melioribus hoc amplius inueniebatur, *ὅσα τὴν ἡγρὴν καὶ θανατοῦ καὶ ἐπιδημίας* *Condit*, idest, uirnam etiam trahit, uenenisq; & uenenatorum moribus succurrit: ea nos facile negleximus, ad stringendi uires *Oxyacantham* habere inuenientes. Et quod Paulus *αἰγινετα* agresti similem, si gura & uiribus exequauit, quam nihil eorum posse, neq; ille, neq; hic testati sunt.

De Rubo canis. CAP. CXXV.

Rutex est arboris instar, Rubo longe maior. Folia fert multo latiora Myrto. firmis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo Oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit. Feruesfacti enim ij in uino, mox poti, arteriam infestant.

BARBARI COROLL.

Cynosbatos, Caninus uulgo rubus. A Theodoro, Canirubus. Columella Sctem canis. fructu malo granato simili, subrubido, media inter arborē, fructemq; natura, & proxima Punice. Folium Salicis amerinae, Theophrasto Agni. Quancp legendum puto in *ἰσχυρὴν*, hoc est, ut uestigio humano simile dicatur, qd Plinius ira uerterit. Et sane uisam a se Rubum, quidam testantur, in siluis, hac specie, ut quasi solea esse uideretur. Flatu aucto fructum huius legedum precipiunt, alioquin periclitantur oculi. Plinius hanc ab alijs Cynosbaston, ab alijs Neurospatum uocari scribit. Vuam fert nigram: in cuius acino neruus fit: unde Nerutus passus, dicat. Idem fit hoc, nec ne cum eo quod Dioscorides, itemq; Theophrastus deliniant, considerandū peritioribus existimo. Rubus certe, qui similitudinem Rosæ fert, et Castaneæ similem pilulam, Cynosbatos a Plinio dicta est. Alia uidetur esse Cynorhodon, de qua diximus inter Rosas. Nec illud constat, nunquid Rubi huius sit Rosa, quæ Coroneola uocatur, rautus autumnī, odore iucundo, sed exili, an potius Cynorhodi appellata. Nec illud omittere constitui, Cynorhodon a Cynosbato, non flore roseo, quem fert utrumq; sed spongiolis distingui, quas Cynorhodon habent, Cynosbatos non habent. Parit & uuam nigram Cynosbatos, ut prædiximus ex Plinij sententia. Quod quidem nemo, præter eum (q sciam) confirmat. Hoc si error est, fortasse natus inde fit, quoniam Hedera Cilicia, hoc est, Similax aspera, Labruscæ modo ferēs uuas, Cynosbatos a quibusdam uocari soleat, ut Dioscorides testatur.

EX M. VERG. COMM.

Satis docuit Columella libro duodecimo, qualis Cynosbatos hic esset uastissimis spinis, Pa liuro, Rubisque eam coniungens, cum in conferenda sepe præciperet, semina uastissimarum spinarum solo credenda esse: cuius generis etiam sunt Cynosbati, quos sua ætas Sentem canis appellauit.

Idem Cynorhoda, idest, Canis rosa quondam dictus est. quoniam flos eius roseus fit, & rabidi canis moribus medetur, si Plinio credimus, quod sua ætate admonente Deo inuentum sit. Rura nostra passim eum nouerūt, maximum inter Rubos omnes, & qualem in cunctis hic descripsit.

De Ligustro. CAP. CXXVI.

Ligustrum arbor est Oliuæ, folijs circum ramos latoribus, mollioribus, & uirentioribus. Flore candido, muscoso, odorato, semine Sambuci, nigro. Optimū nascitur in Canope et Ascalone. Folia astrictioriam uim habent. Quare commanducata ulceribus oris medentur. Illita feruidis inflammationibus, carbunculisq; profunt. Decocto eorundem igni ambusta fouentur. Capillum ruffant trita folia, quæ in radiculæ succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprinū oleum, quod ex eo fit, exalfacit, emollitque neruos: quoniam mista quæ feruenti natura prædita sint, assumat.

BARBARI COROLL.

CYprum, quidam, ut Plinius inquit, esse dicunt arborē, quæ in Italia Ligustrū uocat, semina in

A

κυνόβατος

Pli. li. ii. ca. 22.
Theoph. lib. 3.
ca. 17. & 18.

*

*

B

λίστρο

D I O S C O R I D I S

C ne Coriandri, folio Ziziphi. Prefertur Canopica, post Ascalonica, ultimus locus Cypriae. Seruius grammaticus, Ligustrum florem scribit esse candidissimum, ac uilissimū. Fortasse hunc intelligens, qui e Conuoluolo herba nascitur, nam & hic barbare, ac uulgo dicitur Ligustrū, ut in Clematide secūda monui. Cyprus & Hemicypus, uasis & mensuræ genus est, coquis, ut placet Iulio Polluci, cognitum.

E X M. V E R G. C O M M.

Q Vos Maro cecinit, a pastoribus negligi, & inutiliter perire Ligustri flores, medicinæ, & unguentariorum officinæ libenter exceperūt: quanq̃ tamen nostra ætate, nulla eius, aut exigua ratio est, cum alioqui uulgaris, & ubiq̃ paratus frutex hic sit. Notum omnibus Ligustrum, Cisalpina Gallia omnis adhuc sic uocat. A Æthiopia autē corrupta, deflexaq̃ penitus ab antiqua appellatione Ruuisticum dicit, sine labore cognoscendum in sepibus maio mense, cum floret, autumno autem, cū maturis baccis nigrescit. Paulus Aegineta, ultra ea quæ a Plinio tradūtur, dicit etiam lieni plurimum conferre.

D E T I L I A. C A P. C X X V I I.

912 lupia

Tilia arbor est Ligustri magnitudine. Folijs Oleæ, nigrioribus & latioribus. Fructu Lentisci, nigro, subdulci, racematim cohærente. Asperis nascitur. Huius folia astringunt. Ad eadem utilia ad quæ Oleaster, cum astrictione est opus: maxime ad infantium ulcera in ore, commanducata, aut si decocto colluantur. Pota urinam ac menses cient.

B A R B A R I C O R O L L.

Plin. lib. 19. 29.
lib. 16. ca. 14.
lib. 21. cap. 8.
Theoph. li. 3.
cap. 4.

Tiliam, græci Phelyream, nostri quoq̃ Phelyream, & Philyram. Sed tunicas ex ea tenuissimas appellant. coronarum lemniscis celebres ueteribus, inter corticem & lignum membra-na multiplici contentas, e quibus uinacula Tiliæ uocantur. Materies mari senticosa, dura, nodosa, ruffior & odorator. Cortex crassior, ac detractus statim inflexibilis, sine semine, sine flore. Crassior foeminae arbor, & materies candida est, atq̃ præcellens, e qua Tiliæ, Philyræq̃ utiles: quas diximus. Arbor hæc ferotina, folijs dulcibus, esculentisq̃ pecori, sed fructu animalibus omnibus ingustabili. Teredinem non sentit, proceritate perq̃ modica, uerum utilis, & operibus intestinis uel obedientissima: etiam si Abies, ut Theophrastus inquit, pulcherrima defenditur. E cortice, foeminarum & cunæ fiunt, atq̃ cistæ, nauium longarum asseres, & arcule, mensurarumq̃ nonnulla genera e ligno. Probatu & igniarijs. Medulla exigua est, nec magnopere cætero corpore mollior. Est enim materia eius tota mollis, ut inter carnosas mollissima, calidissimaq̃ dicatur, quoniam citissime retundat ascias, tineturam earum, caloris sui ui resolues. Cæditur autumno. Cinefias poeta flagitiosissimus, in quem Lyfæ oratoris plena conuictorū & stomachi legitur oratio, tam gracilis fuisse dicitur, ut Tinaceis asseribus corpori circūdati, imbecillitatem suam fulciret, ut Philetas alter poeta, plumbeis orbiculis circum pedes adalligatis, ne uento subueri posset. Theophrastus quādoq̃ nominat & Philycam. Siluestris, inq̃, arbor est Philyca, fronde perpetua, Olympo monte, fructum suum ab occasu uergiliarū edit, Celastris modo cādida. Theodorus Philycam hanc a Tilia, siue Philyra differre censuit. Vtranq̃ tamen & candidam, & alendo pecori utilem demonstratam. Legebat & ferotinā. Celester porro siluestris arbor perpetuo uiuens. Fructum sero perficit, atq̃ hyemis superuentu perdit, ut quidam putāt. Cacuminibus montium gelidissimis nascitur: cura deterior efficitur. Vfus ad baculos senibus. Plinius odoratiorem Tiliæ mari corticem q̃ foeminae, Theophrastus contra, foeminae quā mari tribuit. Flos caliculaceus, pediculo quisq̃ suo annexus, uiridi, q̃diu Alabastro includitur. Dehiscens n̄ flauescunt. Flores pariter cū mitibus & urbanis. Fructus oblongus, & ad fabæ magnitudinem rotundus, similis acino Hederæ, maiusculus, angulis quinis, ceu neruis quibusdam in acutum depressis extuberat. Partitionem hanc exilior indigesta: & omnino confusioiem habet, maior si scabatur. Semina emittit pusilla & prætenuia, ut uideri possint Atriplicis. Folium Hederæ, nisi q̃ se in acutiorem angulum rotundat, incuruum. Qua pediculo innectitur e medio sui prodir in acumen, crispum per orbem molliter ac ferratum. Laurentius Valla in Herodoto, conuertit Tiliam falso, q̃ autor ille Iream uocauit, quæ Salix est, non Tilia.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ in Corollario Barbari Tiliæ adiunguntur, ex Plinio, Theophrastoq̃ n̄sdem uerbis

exscripta, nihil præter compendium laboris habent, multa sane, sed tam noua, & affectata elocutione a græcis uersa, ut græcarum literarum imperiti non facile intelligant, quid sibi tinctura ferri eo loco sit: quasi Plinius, quem ille tantum amauit, ut totum iterum in Corollario suo exscripserit, non temperaturam ut celaturam dixerit, & quia græci βαφει dicant, ideo tincturam dicere nos oporteat, plurisq; faciendum sit quomodo aliquid fiat, quā quod & quale fuerit factum dixisse. Illud ego magis ostendi operosum, sit ne nostrati Tiliæ, antiqua illa eadem. Dico autem nostratam, quæ in Æthiopia nunc ab omnibus Tilia nominatur, ex qua secādis coriis eius paratam ubiq; tabulam habent, in nullam partem rectis pectinibus, sed quacūq; parte ferramentum agatur, sequacem & cedētem. Ideoq; Tiliam, ut credimus, dictam, q̄ quæ proprie quondam Tilia dicebatur, per longitudinē rectis pectinibus, tractabilis & fissilis sit, & ob id, ut inquit Theophrastus, texendis cistis & corbibus idonea. Plura Theophrastus lib. 1.

DE CISTO. CAP. CXXVIII

Cistus, quem aliqui Citharon, aut Cissaron uocāt, ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens. Folijs rotundis, acerbis, hirsutis. Flos masculo ut mali punici, fœminæ albet. Vis astringens. Vnde flores in uino austero bis in die poti, profunt dysentericis. Et nomas illiū cohibent. Vetus tati ulcerum, & igni ambustis cum cerato medentur.

BARBARI COROLL.

Cistos, & Cissaros, a Cisso differt, q̄ Cissus Hædera tantum est, Cistos sui generis frutex. Quæ uicinitas, nisi quis aduertat, facile confundet intellectum. Describitur maior Thymo, folijs Ocimi. Et sane inter Hederas mentio eius a Plinio habita est. Præterea Hæderæ speciem uidentur auctores existimasse, qui Ladanum capris depecti tradant: quæ florem Hæderæ paucunt: cum constet ex Dioscoride fruticem, unde id fiat, Ciston uocari, speciem alteram Cisti huius, de quo nūc agimus, ut in cōmentatione post Hypocistidem proxima explicabitur.

EX M. VERG. COMM.

Certarūt olim doctis, uiri Nicolaus Leoniceus, & Herm. Barb. de Cisto, qd̄ tādē esset. Verū extat de ea re inscriptū de erroribus medicorū opusculū, unde nos plura dicere omittimus.

Quod uero in textu legitur, sed in fœminino, colore cādido, hoc membrum sequaci sermone serie certo carebit sensu. Nisi intelligatur, Ciston diuississe antea Dioscoridem in marem & fœminam, marisq; alium, fœminæ uero aliū adsignasse floris colorem, desiderariq; in omnibus græcis, totam eā diuisionē, cuius ultima tantū pars seruata sit, quod iam necessario, ex his quæ sequuntur, constituendum legentibus est: ut tantū non ego eam restituerim diuisionem, præsertim indicat Plinio lib. 24. cap. 10. Cuius hæc uerba sunt. Ciston appellat fruticem maiorem Thymo, folijs. Ocimi. Duo eius genera, flos masculo rosaceus, fœminæ albet. Quasi ex hoc scriptore uertit, ἡ μὲν τοῦ θύμυρος λευκὴ, quod debuerant alij interpretes, hiatu saltem aliquo illic relicto legentibus indicare, ne credētes integrū esse locū, inutiliter in eo laborarent.

DE Hypocistide. CAP. CXXIX.

Hypocistis Robertron, aut Cytinus a nonnullis cognominata, iuxta Cisti radices nascitur, floris Punici similitudinē. Quædam flaua. Altera uirens. Tertia candida. Liquatur Acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fractamque macerant, & incoquunt, reliquaq; ut in Lycio prosequuntur. Vires Acaciæ habet. Verum aliquanto magis siccatur, & astringit. Prodest dysentericis, coeliacis, sanguinem excreantibus. Fœminarum profluuiū & pota & indita.

BARBARI COROLL.

Hypocistis, & Hypocisto, triplex huius ratio a Dioscoride proditur. Alij ruffa & candida sunt contenti, ut Plinius. In montibus Patauinis Hypocistin uidere licet, et Ciston, sub qua nascitur Ocimi folio, ut prædiximus. Flore candido quasi Rosæ siluestris. Radice lignosa & prædura: cuius fere medio Hypocistis uelut infixæ pullulat.

A

κισσα
κισσαρον
κισσαρον

Plin. lib. 24. capite. 10.

B

ὑποκυσία
ὑποκιστος
κύντινος

D I O S C O R I D I S

E X M A R. V E R G. C O M M.

C Quid Cisto adnascitur Cyrtinos, aut ueluti Cyrtinos, Paulus ægineta appellauit, Hypocistidem uero ex his expressum succum. Hic contra Hypocistidem, quod adnascitur, et Cyrtinos etiam uocari dixit. Hic natuam rem, ille humano opere ex eadem expressum in medicinæ usum remedium appellans: non multifacienda diuersitate, si quis utriusque consilium et propositum diligentius animaduertat. Quid autem græcis, & in natura Cyrtini sint, in Punica certius cognoscetur.

Non prætereundum & hoc, quod dicit hic eius genera esse, rufum, uiride, & candidum, Plinius uero rufum, & candidum colorem illi tantum tribuit. Quo fit, ut aut in alijs uiridis ille color desit, aut in hoc abundet: & quam Orobethrum hic ait appellari, nescimus nos, an corrupta uox sit, & Erythranum, ut in Plinio legitur, uocari eam oporteat.

De LADANO.

C A P. C X X X

284

E St & alterum Cisti genus, Ledō a nonnullis appellatum, frutex si emili modo nascens, longioribus folijs & nigrioribus: quæ uerno tempore quiddam contrahunt pingue. Foliorum uis astringens, atque effectus Cisti præbens. Fit ex eo quod Ladanum dicitur. Siquidem cum Cisti frondes pascuntur capræ, hircique, pinguitudinem conspiciue barba carpunt, & suo lentore uillosis cruribus adhærescentem reportant: quæ depectentes incolæ, colantesque, cogunt in offas, & ita recondunt. Alij uero attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantque in Ladanum. Maxime probatur odoratum, subuiride, facile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec squallore obsitum est, resinosum: quale in Cypro gignit, Arabicum uero, Lybicumque uilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi. Laxat ora uenarum. Capillum fluentem continet, addito uino myrrha, aut myrteo oleo. Cicatricibus decorem reddit cum uino illitum. Medetur aurium doloribus cum hydromelite, aut rosaceo infusum. Suffitu secundas eicit. Pessis immixtum, uulua duriciem sanat. In medicamenta quæ dolorem tussimque finiunt et malagmata utiliter inferitur. Aluum sistit cum uino uetere potum. Et urinam ciet.

Pli. li. 12. cap. 7.
& lib. 16. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

C isthos, siue Ledon, & Lada, sed Ladanum in Arabia Nabathæis tantum nascitur, qui sunt contermini Syriæ. Iniuria illa qua diximus caprarum: sed non e Lada herba, uerum ex omni silua. Hoc genus Strobon uocari placuit. Est & genus aliud in Syria & Africa, Toxicon dictum: quia neruos in arcu lana circumdatos trahunt per siluas, adhærescente roscida lanugine. Sed uerum Ladanum Cypri in insula fit, quod Celyphum, hircorum in pascendo genus atque barbæ hest, hæderæ, ut Plinius inquit, flore derafo, pastibus matutinis cum est rorulæta Cyprus, siue funibus tractis, quo dictum est modo. Non omittendum, Hæderam quidem putari Cisthon a Plinio, de cuius flore colligatur Ladanum. Non quod Cisthos aliud non sit quæ Hædera, quæ Cissos a græcis appellata, sed quod species eius una etiam sit, a nostrate multum diuersa. Quandoquidem & Paulus Aegineta scribit Ladanum ex Hædera Ladone cognominata fieri. Et Dioscorides Cisthon a quibusdam, Cissaron quoque dici tradit: quasi Hæderaculæ interpreteris, aut Hederaginæ. In Carmania & super Aegyptum fruticem esse narrant, per Prolomeos translatis platis, ex quibus Ladanum fiat. Sunt qui Ladanum gummi modo ex arbore laxati corticis uulnere, ut Tura colligi, & caprinis pellibus excipi commemorant. Adulteratur Myrræ Baccis, & animalium sordibus. Sinceri odor debet esse ferus, & solitudinem redolens, ipsum accessum fulgere, odorque iuctum reddere. Myrrata in igne crepitant. Placet, cui e rupibus calculi potius, quam pulvis inherat. Precia laudatissimo in libras, asses. 40. Aetius Cisthon, e qua Ladanum fit, eandem esse cum Cistho nostrate, sub qua Hypocisthis nascitur, affirmat: sed calidioris naturæ, ob qualitatem soli.

E X M.

Totam colligendi Ladani historiam, omnesq; eius in medicina vires, breuissime complexus est Paulus Aegineta, testatus ex Cistho Cyprio frutice fieri, quem Ladona dicit, quem capræ pascentes, barbis femoribusque suis, quod pingue & lentori simile in eo est, secum auferunt, idq; collectum Ladanum esse.

Neq; ut in Corollario suo Barbarus retulit, ex Hedera Ladone Ladanū fieri is dixit, sed ex Cistho Cyprio frutice, qui Ladon uocetur. Verba eius libro sexto hæc sunt, *λάδων ἀπὸ κισθοῦ λάδωνος λεγομένη γίνεται ἐπὶ δὲ ἐν κύπρῳ*. Quod nescio ego, an Plinio fauēs, sic uertere magis ille amauerit, an quæ Plinium Hederam & Cisthum simul miscere coegerat uocum similitudo in eo, quoniam ille Aeginetam forte habuit, pro Cistho Cisson fecerit. Lubrico ab altera in alteram uocem lapsu, præsertim in imperitis & parum diligentibus librarijs, qui incognitam, neq; ubiq; nascentem Cisthum, una tantum mutata litera ad Hederam transfulerint, quæ Cisson greci passim dicunt. Nec esse Cisthon Hederam notæ, omnisque eius historia satis ostendunt. Cypriamq; hanc a priore illa diuersam Dioscorides descripsit foliorum longitudine, nigredine, & pingui lentore: quoniam folia eius priuatim sibi inhaerent, ad Ladani confirmationem per uer ostendant. Fecitq; coloris nigredo, quæ folijs huius a Dioscoride tribuitur, ut in priore illa, quod erat *σπορὴν μέλανα* dixerimus, testantibus id aliquot ex antiquioribus grecis, in quibus *μέλανα*, i. nigra, non *σπορὴν*, i. acerbi saporis adhuc legitur. Et quod hic ait, in altera hac Cistho, longiora, & nigriora folia esse: quam comparandi uim & rationem si quis diligentius animaduertit, facile intelliget, cōgenera esse oportere, quæ inuicē cōparant nigro colore folia esse.

Addidimus præterea, mellis modo per colum liquant. Sic in antiquioribus grecis legētes, *ἐν ἀραιροῦντι ὅς μέλιδυνάσσει*, non ob aliam ut nos credimus causam, nisi ut qui caprarum & hircorum pili in Ladano erant fecernerentur.

Quomodo autem per se Saligneum qualum castratis alueis liqueatur, purgeturq; mel, undecimo libro satis Columella ostendit, & ab eo liquandi purgandiq; Ladani similis ratio poterit cognosci. Quam deinde adstringendi uim, Ladano Dioscorides tribuit, Paulus Aegineta ad capilli defluuia tantum contrahit.

De Hebeno.

CAP. CXXXI.

Hebenus optima habetur Ethiopica, & nigra, nullos habens ueneris B
narū discursus, factitij Cornus leuitate. Cum frangitur, deſa ap-
paret, mordens gustu, atque astringens. Suffitur iucūdo odore supra car-
bones sine fumi tēdio. Recens autem ad ignem prolata ob pinguitudi-
nem accenditur, & trita ad cotem flauescit. Altera est Indica internatis se-
gmentis candicantibus, & modice fuluis, item frequentibus maculis. Cæ-
terum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea li-
gna Hebeni uice ueneunt: quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt,
& in purpureas assulas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec re-
dolentia in suffitu præferentia. Caliginem oculorum abstergit. Ad uete-
res distillationes, pustulasque mirum in modum pollet. Si quisquam fa-
cta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medi-
camenta efficax est, si scobes, ramentaue uino Chio die noctuque mace-
rata, in collyria digerantur. Nonnulli prætrita ramenta excolant, reli-
quaque eundem in modum peragunt. Alij pro uino aqua utuntur. Vri-
tur in fictili nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi modo,
& ita siccis lippitudinibus conducit.

BARBARI

COROLL.

Ebenus, siue Ebenum, spissitudine ligni & pondere, in aqua non innatat, sed mergitur tan-
tum, non tota ut Buxus, cui similis esse dicit, sed pars eius medullacea. Decorticato summa ni-

D I O S C O R I D I S

C grices. Ebenus cēsa durefcit in lapidē, ut iam uideat hodie quoq; parti faxū, parti lignū, ceu inchoato opere, non perfectō. Duo genera eius. Rarū id, quod melius, arboreum, trunco enodi. Alterum fruticosum, Cytisi modo, tota India difperfum. Ebenus Ethiopica, nō alia, q̃ Palmarum generis eſſe traditur. Lignū Ebeni, Galenus, ſi quis aqua infuſa terat, in ſuccū inquit reſoluitur, ut nonnulli quoq; lapides. Magnus Pompeius in triūphum Mithridatico bello duxit Ebenum. Pauſanias a Cyprio quodam medico accepiſſe tradit, Ebenū radicem tantum eſſe terra cōditam, nec folia, nec fructus ullos edere, propterea nec omnibus inuentu facilem, ſed in Ethiopia quosdam eſſe huius operis artiſices, hoc eſt, Ebeni ſcrutandi gnaros.

M E X M A R. V E R G. C O M M.

Maro Indiam tantum ſerre eā arborē cecinīt. Vnus Pauſanias in Atticis nec folia, nec fructus ſerre prodidit, neq; a ſole conſpici, ſed ſub terra tantum radices eſſe, quas fodiant Ethiopes, ſintq; in ea gente erufcandæ Ebeni peritiſſimi aliqui.

Hanc Theophractus, arborem cortice Buxō ſimilem teſtatur eſſe, decorticatā deinde nigro colore fieri.

Interim legentes monebimus, ſuſpicari nos, nec leui argumento in cunctis græcis uitū illic, ubi nos uertimus, pro Ebēno uendi a quibuſdam, Spinæ Indicæ, & mori materiā. Quo loco, Spinæ Indicæ addidimus, & pro Sefamino ligno, mori mutauimus. Spinæ enim nihil ad ieſtum legebatur, nec legentibus licebat ex tam multis ſpinis, quæ diuerſæ toto orbe naſcunt, quam hic diceret intelligere. Idq; autore Plinio fecimus lib. 11. dicente ibi. Et Spinæ ſimilis eſt, ſed deprehenſa uel lucernis igne protinus tranſiliente, quod uera Ebēno fieri hic apte teſtaſt.

Præterea quod erat, *σινάμιν*, a Sefamo in frugum genera adiecti uo nomine *σινάμιν* legendum eſſe arbitrat, mori materiā uertimus. Quid em̃ frugi ſimile cū arbore? aut qd potest Sefamum lignū intelligi? Fuit autē facilis in tanta uocū ſimilitudine ab altera in alterum lapſus.

De R O S A.

C A P. C X X X I I.

Rofa refrigerat & aſtringit, ſed ſicca multo magis. Succus recenti bus ſolijs exprimitur, defectis forſice unguibus, ſic appellantur **D** cādida foliorum partes, reliquum in pila premi & teri debet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculorum circumſiſiones recondi. Siccantur etiā annuum folia Roſarum, continuo uerſata, ne muceant, ueue ſitus in ijs in fideat, Aridis Roſis & in uino decoctis, expreſſus liquor, facit ad dolores capitis, auriū, oculorum, gingiuarum, ſedis, recti inteſtini, ac uulua, pina illitus, aut infuſus. Eadem ſine expreſſione tuſa, præcordiorum inflammationsibus, humidis ſtomachi uitijſ, igni ſacro illini prodeſt. Siccis ac tritis femina aſperguntur. Miſceri ſolent uulnerarijs antidotis, atq; compoſitionibus quas Antheras uocant. Folia uruntur in calliblephara. Flos qui in medijs Roſis inuenitur, ſiccatus, gingiuarum ſtuctionibus efficaciter inſpergitur. Capita pota citam aluū, & cruentas reiectiones ſiſtunt.

R O S A R B A R I C O R O L L.

Plin. li. 11. ca-
pite. 4.
Theophr. lib.
6. cap. 6. & 7.

Roſam, græci Rhodon, & Poetæ Brhodon, ſed plantam eius Rhodoniam, ut nos Roſariū appellant. Eſt & condimēti preciōſi genus Rhodonia, quam & Rhodontiam Patellam uocāt, ex cerebellis auiū & porcorū, in multa Roſa coctis, in ſuſo garo, oleo, uino, pipere, ouorum luteis. Differt a Patella Rhodonia, quæ Rhodiaca olla dicitur. Figline genus hoc. Permixtis, ut inquit Ariſtot, myrha, iunci flore, croco, baſamo, cinamomo, amomo, coquit ad arcendā ebrietatem, ſi excaſtaſis ijs uinum infundatur. Origo huius e Copto prima, ut inquit Athenæus; unde Coptica fidelia. Sed redeo ad propoſitum. Roſam, Timachidas, qui de cœnis ſcripſit, in Arcadia Eumphalon, ab odoris præſtantia uocari tradidit. Ergo Roſam aculeatam ramus nemo ignorat. Folia interna, quæ admodum exigua ſunt. Item ex maioribus, externa minus odorata. Inter amplas odore præſtant, quibus ima pars ſcabra & corticia eſt. Uſta reſiſa, tranſlata ſit melior. Silueſtres ex toto aſperiores, odore, colore, magnitudine ſuperantur. Roſa ut nouiſſima erumpit inter omnes flores, ita prima deſinit. Satiua excepta. Roſæ uita

uita quinquenniū, non incisæ, nec adustæ. Illo enim modo iuuenescit. Flos senescētis deterior. **A** Capita foliorum eius, partesq; candidæ, Vngues uocant. In flore aliud Semē, aliud Capillus. In capite, aliud Correx, aliud Calix. Coronas e Rosa, quæ pacilibus & sutilibus successerūt, Rosalia dixerē ueteres. Nec erat ijs gratia, nisi folio solo nexis. Recens a longinquo olet. Sicca propius. Serenis diebus lecta odoratio. Itē siccis, ruderatis, gracilibus. Omnis Rosa germinat granoso primū in clusa cortice; quo mox intumescēte, & in uirides alabastrōs figurato, sensim ad rubescit & panditur. In medio calicis lutea stamina, sub quibus semen insidet. quæ proprie flores dicuntur. Desitum est feri semine, cum alioquin p̄silit, quoniam sero ita nascatur. Genera eius propē nimia. Celeberrimum Prænestinæ, quæ nouissime deficit. Campanæ, quæ præquox est. Milesiæ, cuius color ardentissimus. Serotinæ, duodecim folia nō excedentis. Proximam fecere Trachiniam minus rubentem. Mox Alabandicam uiliore, albicantibus folijs. Viliissimam pluribus, sed minutissimis, Spermoniam. Malo Pliniū sic legi, q̄ spinolam, aut spinosam. Ita enim, siue q̄ minutissimo folio, siue q̄ uilissima sit omniū, rectissime uidet appellari. Sunt qui Sycioniam legendū putent. Nulli folia quinque pauciora. Campaniæ Cēnfolia tribuntur. Et Philippi in græcia, a Pangeo monte uicino translaticia, numerosis folijs ac paruis. Nec tamen talis odoratissima, nec cui latissimū, maximūq; folium. Ideo nec coronas intrat Centifolia, nisi extremos uelut ad margines. De Lichny Quinquefolia, quæ inter Rosas quoq; numerari solet, & græca, seu græcula uocatis, suo loco dicit Quinquefolia. Est & alia Græcula appellata, conuolutis foliorū paniculis, nec dehiscens, nisi manu coacta, semperq; nascenti similis, latissimo folio. Alia funditur e caule Maluaceo, folia oleacea habens, Musceton (est ubi acetone legatur, & Mosceuton, a propagine, Viuiradiceue, quā græci Mosceumā dicūt) uocata. At que inter has media magnitudine, autūnalis Rosa, quā Coroneolam uocamus, in Rubo natā, iocundi odoris, sed angustā, ut in Cynosbato monstrauimus. Reliquæ sine odore, hoc est, Maluacea, et duæ græculæ. Semen Rosæ in ipso cortice est sub flore, optimum lanugine. Precor Rosa emergit, si pedali serobe ab radice facta, calidam infuderis. germinare incipiente calice. In Hispania Chartagini, præcor Rosa, hyeme tota uisitur. Vnū genus inferitur pallidæ, spinosæ, longissimis furculis Quinquefoliæ, quæ Græcula altera est. Nisi quis hoc quoq; loco, spermonie, nō spinosæ legerit in Plinio. Satis ambigo, Coroneola sit Cynosbati, an Cynorhodi flos. Quamquam Cynosbati magis puto. Cynorhoda porro, siluestres Rosæ sunt, spongiolis penicillifue inter medias eius spinas nascentibus, unico aduersus expauescentes aquā, a morsu canū, remedio, nec fere ante Plinium comperto: unde nouatū ei nomen crediderim. Quamquā Aristoteles hanc uideretur appellasse Cynacanthē, hoc est, Caninam senticem, Cantaridū feracē, ut dicitur secundo libro, in mentione Cantaridum. Est & Cynorhodos alia, sed Liliū, ut monstrauimus. Nihil dubito, Cynorhodon aliud esse, q̄ Rhododaphnē. Esse aliquos flores, Rosas colore similes, arboribus in externo mari natis, autor est Theophr. Columella punicā Rosam uocando, aut rubentē, aut ex Africa translata significat. Rosam triplex comitatur fabula. Nō nisi candidā per initia fuisse. Mox uulnerato Veneris pede, dū Adonidē, quē Mars zelotypus, interfecerat, opē latura, p̄cipiti cursu per dumeta rapit, adrubuisse. Alij sanguine Cupidinis, ut Ausonius, alij nectare affuso, ala Cupidinis, in Deorū conuiuio lasciuientis, illisa poculis.

EX M. VERG. COMM.

Genera Rosarū multa Theophrasto primū, mox Plinio fuerūt, ex foliorū numero p̄cipue discreta. Post quē nō male aliq; forte credat, alia etiā extitisse, et nostra ætate adhuc quoq; esset tantopere diuersis locis per se, & humano ope coacta, uariat natura suas opēs.

In cūctis fere græcis a principio statim deerat, ῥόδα ψυχρὰ καὶ σφοῦτα, ἢ ἡ κρὰ μᾶλλον σφοῦτα, cū tñ ex melioribus legi oporteret, παρὰ ψυχρὰ καὶ σφοῦτα, ut sit sensus. In rosis refrigerare, & adstringere recētes: siccas uero amissa refrigeradi potestate solū & efficacius adstringere. Indicat id, præ antiquorū fidē, res ipsa, & sermonis ordo, in q̄ altera pars p̄ contrariā diuisione illata, cōtrariā sibi alterā exigit: cūq; in posteriore de siccis ageret, oportebat in priore de recētibus actū fuisse.

Sequitur deinde non multo post, quod penitus corruptum sit, facilem cōiecturam habet. Docet enim Dioscorides, de secētis foliorum Rosæ unguibus, terendum in mortario reliquum corpus, exprimendumque, & in umbra habendum succum donec densetur. Sed non potest, ex his quæ nunc leguntur hic sensus colligi. Nos quoniā illic, mortarium, & umbra est, & do nec densetur, eo sensu qui legitur, Serapionis ope reddidimus. Quod donec certius aliquid ab alijs inueniatur, a legentibus accipi uolumus.

Quod deinde erat, ῥόδα δὲ λίγα παρὰ μὲν πρὸς προσώπῳ, nullo sensu ex antiquorum & meliorum codicum fide instauratum est, παρὰ τριμυκτὶ μὲν, id est, femorū intertriginibus.

De Rhofeis

D I O S C O R I D I S

C De Roseis pastillis. CAP. CXXXIII.

Pastilli quos Rhodides uocāt, hac ratione cōficiūtur. Rosarū uiridiū, quę nullo antea humore madefactę exaruerūt, drachmę. xxx. Indicę Nardi drachmę. x. Myrrhę drachmę. vi. tritę digerūt in pastillos, q̄ obolorū pondus æquent. Siccantq̄ in umbra, in fictili non picato, atq̄ obturato reconduntur. Alij adijciunt Costi drachmas duas, Iridis illyricę totidem, & uinum Chium cum melle miscent. Mulieribus monilium loco usui sunt, ad retundendum graue sudoris uirus. Tritis etiā utuntur ad illitiones, & diapasmata quę fiunt ad sudores coercendos, ita ut a balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Similem, non tamē eandē Dioscoridi Rhodiorū confectiōē Pau. Aegin. lib. 6. docet, neq̄ eodē genere eā appellat: hic fœminino Rhodias, ille neutro *ῥοδιῶν* uocat, iubetque recētibus Rosis et eodē pōdere ipse etiā cōfici. Latini, qđ eodē inuenerim, de his nihil tradiderūt, Romana grauitate blāditias amorum, & uoluptatū illecebras docuisse, indignum existimantes.

De LYCIO. CAP. CXXXIIII.

Lycium, quod aliqui Pyxacanthan uocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus, folijs Buxi, densis, fructu Piperis, nigro, leui, amaro, densoq̄, cortice pallido, non dissimili Lycio madefacto, radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascit plurimum in Capadocia, Lycia, & plerisque alijs locis. Aspera loca amat. Coquuntur rami cum radiculis tusi, & ante per aliquot dies macerati, tū abiectis lignis denuo liquor coquitur, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id Lycium adiecta decoctioni Amurca, aut Absinthij succo, aut felle bubulo. In natans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamētis additur. Reliquo ad alia utitur. Simili modo fit Lycium, semine expresso & insolato. Optimum quod uri potest, restinctumque rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus cum freris ruffis, ingustabile, cum amaritudine astringens, crocino colore, cuiusmodi Indicum est, cæteris præstantius. Lycium astringit. Caliginem oculorum discutit. Genarum scabiem, pruritus, ueteresq̄ fluctiones sanat. Facit ad purulentas aureis, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusque illitum. Cœliacis, dysentericis, potum inditumq̄ conuenit. Datur sanguinem excreantibus, & tussi ex aqua. Contra rabiosi canis morsus in catapodio deuoratur, aut in aqua bibitur. Flauos facit pilos. Paronychijs, ulceribus quę serpunt aut putrent, medetur. Fœminarum profluuiā appositum sistit. Rabiosorum ictibus ex melle potum, aut uice catapodij deuoratum, auxiliatur. Tradunt Indicum fieri Lycium, ex fructu *Λόχίτιδε* appellato. Ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos habens, ternum cubitorum longitudine, maioresue, Rubo crassiores, a radice numerosos. Fructus cortex rubescit. Folia Oleæ similia. Herba in aceto decocta proditur lienis inflammationibus, & regio morbo mederi. Et fœminarum

foeminarum purgationes elicere. Aſſeuerant etiam crudam in potu, eoſdem effectus præſtare. Semen cyatho dimidio potum, pituitam expurgare. Venenis quoque auxilio eſſe.

B A R B A R I C O R O L L.

Lycij, tum ſpina ipſa, tum ſuccus ex ea, dicitur Pyxanthos. Chironias in Græcia uocatur. Frutex, unde Lycium fit, adulteratur alſphodeli radice. Item ſpina, in Pelio monte nata. Medicinæ aptiſſimum intelligitur, quod eſt ſpumofum. Indi Camelorum, aut Rhinocerotum (hi boues Aegyptij ſunt) ut Feſtus inquit, utribus condunt. Lycium foris nigrum, intus ruſſum, cito nigreſcens cum frigeris, optimum ex indico frutice. Aliter Dioſcoridis Lycium, ex radicibus quoque ſylueſtris Rhamni coctis conficitur. Nomen Lycio inuentum puto, quoniam e Lycia inueheretur, præcipuum urbe Patara, quanquam Indicum omnibus præfertur.

Plini. lib. 24.
capi. 14.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ a Plinio lib. 12. & 24. longius dicta ſunt, parata & expoſita omnibus relinquitur. Lycium ideo dictum eſt, quod probatiſſimum, & quotidie ex Lycia ad alios importaretur. Quod in impreſſo legebatur, *ῥίζας δὲ πολλὰς πλεῖστας*, radices numeroſas & obliquas, una tantum mutata litera, *πλεῖστας*, id eſt, latas uertimus.

Expunximus deinde aliqua. bis enim idem importune repetebatur, in quo iterum contra rabidi canis morſus ſum Lycium Dioſcorides iubet. Et quoniam in uetiſtioribus aliquibus, pro melle eo loco lac legebatur. Ex Plinio remedium aliud illic inſtaurauimus, dicentes ſiſtere Lycium foeminarum profluuium appoſitum, aut cum lacte potum. Locus eſt libro uiceſimo quarto, cap. 14.

Suſpicamur præterea ab eo loco quo ait, fertur Indicum fieri Lycium, ſequentia parum eſſe legitima, qui cum ſemel in India naſci buxeam ſpinam dixiſſet, idque pro comperto docuiſſet, ad famam & aliorum fidem transferre rem non debuerat, nec quod ſemel a ſe decretum fuerat, ex aliorum dictis infringere. Suſpicionem noſtram auget, quod plures illic uoces ſunt parum proprie, & huic ſcriptori inſolite, potuitque ab antiquiore aliquo medico ex alicuius hiftoria, omnis ea pars Dioſcoridi accreuiſſe, et paulatim in unum corpus coaluiſſe.

De Acacia.

CAP. CXXXV.

AAcia in Aegypto naſcitur inſtar arboris, frutice ſpinoſo, non ſe in rectum attollente. Florem habet candidum, & ſemen Lupino ſimile in folliculis, ex quo ſuccus expreſſus ſicca in umbra, niger ex maturo ſemine, ſubruffus ex uiridi. Eligatur modice ruſſus & odoratus. Aliqui folia cum ſemine exprimunt. Manat & gummi ex ea ſpina. Viſei ad ſpiſſandum, refrigerandumque efficax. Succus oculorum medicamentis utilis. Valet ad ignem ſacrum, ulcera quæ ſerpunt, perniones, pterygia, et oris ulcera. Procidentes oculos reprimi. Menſium abundantiam liſtit. Prociduam uuluam cohibet. Citam aluum ſupprimi, aut potus, aut inditus. Capillos denigrat. Lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuſo quod concreuerat, donec pura extet aqua. Et ita cogitur in paſtillos. Vritur etiam in fictili nouo fornacibus, torreturque in carbonum halitu perflata. Spinæ decoctum ſolutos artus fotu committit. Præfertur eius ſpinæ gummi, quod in uermiculorum ſpeciem contrahatur, & uiri modo perluceat, ligni expers. Proximum eſt candidum. Sordidum uero ac reſinoſum inutile. Cutis meatus obſtruit. Et medicamentoꝝ rum quibus ammiſcetur, acrimoniam hebetat. Ambuſtis ex ouo illitum puſtulas non patitur erumpere.

B
ἄκανία

k

D I O S C O R I D I S

C A C I A B A R B A R I C O R O L L .

Pli. li. 24. ca. 12

C Acacia fundentem, idem uideo accepisse autores, cum spina ægyptia. Testis Oribasius, & Aetius. Nisi quod acacia, etiam aliubi quod in Aegypto nascitur. Hæc & syria quoque spina dicitur. In Aegypto, alba, nigra, & uiridi arbore conspicitur. Arbor tota horret aculeis, excepto caudice. Pretendit eos & germinibus & folijs, ligno in duodena sæpe cubita procero. Cedit testis & nigra, nauium costis, in corrupta, etiam in aquis ui. Candida facile putrescit. Semen in Siliquis ad coria perficienda, Gallæ usu. Flos & coronis addi blandus, & medicamentis petitus. Marnat & gummi ex ea, cum sponte, tum plaga, non e cortice, sed e uase. Præcipua utilitas, quod cæsa, anno tertio refurgit. Numerosa omnino arbor: ingenti sylua eius Thebaica præfectura: ubi & olea, & quercus, & textilis persica. Prouenit & in Galatia, teneritudinis summæ, spinosior arbore. Colligitur autumno semen: quoniam collectum maturius, nimis uehemens. Spissatur succus ex folliculis, aqua pluuiæ, maceratis mox in pila tufis exprimitur. Tum densatur in sole mortarijs in pastillos. Acacia uocatur, arboris uidelicet suæ nomine. Fit & e folijs per se, minus efficax. Galatiæ Acaciæ nigerrimus improbatur. Itæ qui ualde ruffus. Placet purpura, aut leucophea, & quæ facillime diluitur. Nunc Acaciam ex syluestri Pruno colligit officinarum desideria. Illud meminerimus, semine ægyptiæ, a Dioscoride lupino simile reddi ponticæ, seu quod idem puto, galatiæ lenticulæ. Plinius nihil distinguit, sed utrumque semen, lenticulæ par existimatur, minore tantum grano & folliculo. Demetrius adserit in Aegypto spinam, quæ sit arbor, ramos coronarum specie natua effundere, in quibus semen rotundum sit, flore subobscurum. Ex hac Tindicæ, & Abyleas coronas in ægypto fieri, docuimus in Myrto. Spinam porro ægyptiam, sunt qui & arabicam uocarint, ut Dioscorides & Galenus. Non est superfluum, ut spinarum hoc loco genera subiiciam, quæ nominis comunione greci, legentibus dubitationem afferunt. Acanthos, siue quod idem est, spina uulgaris, ut quidam coniectantur, acantha, pyxantha, oxyacanthos, leucacanthos, acanthaleuce, tragacantha, acantha arabica, uel ægyptia, acantha indica, acantha ariana, acantha babylonia siue regia. Adduntur a latinis, spina sitiens, spina pennata in ægypto, spina appendix, spina bunia. Diuersa omnia, decem & septem numero. Accedat ijs Galatica, siue Pontica, siue Cappadocica: de qua proximo capite disseritur. nam syluestris quæcumque spina, Calabrix uidetur esse nominata.

E X M . V E R G . C O M M .

D Oniunximus in Acacia, ueterum grecorum fidem secuti, quæ male in duas secesserant partes, unoque capite, ut res ipsa etiam exigebat, fecimus de omni Acacia a Dioscoride doceri. De qua non eodem modo, Oribasius, Aetius, Pliniusque & alij docuerunt, sed non facilis nostra ætate commentatio est.

De Acacia altera. C A P . C X X X V I .

A Alterum Acaciæ genus in Cappadocia, Pontoque prouenit, ægyptiæ spinæ similitudine, longe minor, tenerior, humilis. Aculeorum uallo munitur, folia habens Rutæ. Semen lenticula minus fert autumno, in loculis ternum quaternumque seminum capacibus. Succus eius adstringit, uiribus inferior. & ocularibus medicamentis inutilis.

Pli. li. 24. ca. 12

A C A C I A B A R B A R I C O R O L L .

ACACIA hæc, a Plinio Galatiæ tribuitur.

ἡ μόγη

De Amurca. C A P . C X X X V I I .

A Murca expressæ Oliuæ recrementum est. Decocta in cupreo uase ad crassitudinem mellis, adstringit, cæteros præbens Lycij effectus. Insuper dentium dolori, & uulneribus, cum aceto, uino aut melle, commode illinitur. Additur in medicamenta ocularia, & meatus obstruentia. Vetustate meliorem fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitalium, & uulvæ exulcerationi. Si uero cum omphacio recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit. Lumentorum scabiem cum decocto lupini & chameleonte illita sanat. Cruda & recenti amurca po-

dagras, articulariosq; dolores foueri utilissimum. Peruncta in uillosa pel
le, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimi.

BARBARI COROLL.

Inter inumeras Amurcae laudes, agricolarum usibus a Catone praedicatas, illa maxime me
morabilis, q; ligna macerata liquore eo, nullius fumi tedio ardent. Graeci ἀμύργην uocant, etiā
fecem quādoq; uini. Item genus herbe purpuree, qua uestes tingantur, Amorgine a graecis ap
pellata. Sed & tenuissima pars harundineae paniculae, dicitur Amorgis, autorem habeo Pho
nionem grammaticum.

Pli. li. 15. ca. 8.

EX M. VERG. COMM.

COC Turam Amurcae, certius primo rusticarum rerum libro docuit Mar. Varro, quam
condi in domesticos usus iussit. Si quis praeterea Amurcae laudes alias, & multiplices usus no
uisse uelit, poterit auctoribus Mar. Catone, & Plinio diuersis locis quod cupit inuenisse: eritq;
illud homini saltem laboris huius opere precium, ut naturam discat, nihil tam sordidum esse,
& ingratum genuisse, quod in hominis usum beneficio aliquo non instruxerit.

De Vitice. CAP. CXXXVIII.

AGNON aliqui Agynon, alij Lygon uocant, alij Amictomiænon,
alij Tridactylon, magi Semnon, alij Hæma ideos. Aegyptij Sū,
Romani Salicem marinam, alij Piper agreste, alij Lecristicū. Vitex, seu
castus frutex est, in arborem assurgens. Nascitur in fluminum ripis, aspe
risq; locis, ac torrentium alueis. Ramos gerit praelongos, fractu peruica
ces, folia Oliuæ, sed molliora. Duo genera eius. Vna harum album florē
mittit cum purpureo, altera tantum purpureum, et semen ut piper. Excal
factorias uires habet, & astrictorias. Semen eius potū, uenenatis ictibus.
aquæ quæ cutē subiit, lienosisq; auxiliatur. Lac euocat. Menses ciet, dra
chmæ pondere in uino potum, Genituram exoluit. Caput tentat, & so
porem affert. Decoctū hærbæ & seminis in defensione, mulieribus uul
uæ malo oportunis opitulatur. Item inflammationibus. Purgationes mo
uet semen cum Pulegio potum, etiam suffitu, uel appositu. Capitis dolo
rem dissoluit illitum. Instillatur cū aceto & oleo capiti in letargo & phre
nitide. Folia suffitu, aut substratu fugant uenenata. Illita quoq; serpen
tium moribus auxiliatur. Testium duricias cum butyro et folijs uitium
emolliunt. Rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat, & cum folijs me
dæ luxatis, uulneribusq;. Virgā qui manu teneat dū iter facit, negat inter
triginē sentire. Agnū, quasi dicas purū, uocāt Graeci. qm̄ matronæ in thes
mophorijs Atheniensium castitatem custodientes, folijs cubitus sibi ster
nunt: et Lygon, quasi uimen, propter inuictā fere ramorum flexilitatem.

ἀγνος ἀγνος
λύγος
ἀμικτομίανος
τρίδακτυλος
στέμνος
ἡμα ἰδέω

BARBARI COROLL.

AGNOS, siue ut Hippocrates appellat, Agne, dicitur latine Vitex. Non habeo tñ plane cō
pertū, an salix amerina, idem qd Agnos Vitexq; sit, & si Dioscorides hoc affirmat. Et ipse ita
censo. Vitex, non multum a Salice uulgarī distat, usu uinculorum, foliorum q; aspectu, ni
si odore gravior esset. Semen potum, uini quendā saporem habet. Duo genera eius. Maior in ar
borē Salicis mō assurgit, flore candido, unde Candida quoq; dicitur. Minor ramosa, folijs al
bioribus, lanuginosis, purpureo flore, Nigra nūcupata. Nascuntur in palustribus cāpis. Se
men uiticis, Galenus mandi cum bellarijs solere scribit, usu tragematis. Ita em̄ minus officere
capiti. Lygon, Lygeanq; graeci uocāt & arborem, & quoddam herbe genus, qd, ut inquit A
theneus, in nidos suos parituri cygni ferant. Nec tñ satis habeo compertū, hanc, quam cygni
petant herbam, aliud genus oportere intelligi q; uiticem, Inuenio & scopas amerinas, spartis

k ij

D I O S C O R I D I S

C similes describi, folio tamen minore, sed lenticia uirgularum maiore, quas, sunt qui genistilla amerinam uocent, hoc tempore. Corolla e Lygo ufos esse ueteres, Anacreonti poetę credimus: cuius originem Samij, Careſq; dederint, diuerſis cauſſis. Nam & Lacedęmones arundine certis ſacris, ut autor eſt Soſibius, coronabantur. Ariſtophanes quoq; autor eſt, coronas ex arundine factitari ſolitas Athenis: quas & dioscuris, hoc eſt, Caſtori et Polluci dicatas fuiſſe cõſtat, ut frugales atq; ſimplices. Lygõ & Aegylin qñq; dici lego. Itē Moſyn, & Oeſyan, et Oeſõ, et Oeſocarbon, ut Polluci & Photioni uidet. Vñ Gerra oeſyma, hoc eſt, quadrata quẽdã tugu-
riola ex huius ſalicis uiminibus: quę Ligella qñq; nominant a Plauto in Aulularia, forte a Lygo. i. uirice, aut a ligãdo. Adijciendũ illud uidet, q; hic a Dioſcoride ſcriptũ e, Viticẽ a qbusdã Lecrifiicum uocari, putare me in eo uerbo mendã eſſe. Nec lecrifiicũ, ſed a ſimilitudine ſaporis & acrimonię Liguſticũ legendum. Nam & piper agreſte dici uiricem, idem autor affirmat.

E X M. V E R G. C O M.

Vocatur Agonos, non alia ratione, quam quod ſemen genitale diminuit.

In Amictomię uoce, & ſi non ſint integra omnia, antiqua tamen integritatis, et ſignificationis aliqua adhuc ſuperſunt ueſtigia, ex quibus facile coniectura eſt, fuiſſe eius uocis com-
poſitionem, quã ad uenerem miſceri cum mare prohiberet.

λγος quoq; i. flexilis, *από τοῦ λυγίστου*. A rubore uirgarũ ſanguis dictus eſt. Itē Semnos, i. deſt, uenerandus, qđ incontinentiã arcet. Liguſticum, a ſimilitudine ſaporis. Piper agreſte, qđ piperis naturam explet.

Amerinam ſalicem a Romanis gręcorum Agnum dici, aperte Dioſcorides teſtaſt. Sed uerum id ſit, in Plinij & Columellę lectione diligentioreſ facile cognoscent. Nobis inclinari-
mus, ut negemus gręcorum *ἄγρον*, Romanorum ſalicem eſſe, ſuſpicamurq; adiectam ab impe-
ritis latinarum rerum gręcorum medicis eam Dioſcoridi appellationem accreuiſſe. Tam enĩ
Viticis, quam Amerinę ſalicis uocem nouiſſe quõdam Dioſcoridem, ueriſimile eſt: & ex quo
Plinius aperte docet, Viticem latinis eſſe, quę gręcis Lygos & Agnos, nec multum a ſalice
uiriũ uſu diſtare, non credendum, in ea appellatione deceptum diligentiffimum alioquin &
ex profeſſo hæc agentem hominem.

Theophrastus, quod Oleę folia habet, compoſito nomine *ὀλεάδρον* uocauit.

De Salice. CAP. CXXXIX.

D^{iria} **S**alix uulgo nota eſt, cuius ſemẽ, folia, cortex, & ſuccus ſpiſſandi uim
habent. Trita folia cum exiguo Pipere & uino pota, ileoſis ſubueni-
unt. Sumpta cum aqua, præſtant mulieribus ne concipiant. Salignum ſe-
men, in potu ſanguinem expuentibus prodeſt. Cortex eoſdẽ præbet effe-
ctus. Corticis cinis admiſto aceto illitus, clauos & callos tollit. Ex folijs &
cortice ſuccus, cum roſaceo in calice punici calfactus, aurĩũ dolorib; auxi-
liaſt. Decocto eorũ podagras foueri utiliſſimum. Furfures purgat in cor-
pore. Excipit ſuccus q; manat ex ea cũ floret, exciſo cortice. In plaga enim
cõcretus humor inuenit, q; ad purgãda quę obſtãt oculis, ſuã uim præbet.

Pli. li. 24. ca. 9.
li. 17. ca. 20. li.
16. cap. 37.

B A R B A R I C O R O L L.
Reuiſere & cõrorto caudice arbor, & ut nouimus, aquatica, *ιρίκν* gręci uocãt. Aſia tribus
generibus hæc diuidit. Prima nigro cortice, aut puniceo, nigra nominatur. Secunda candido,
candida uocata. Tertiam coactę breuitatis, & ſponte naturę, pumilã, ſœcundo, ut qđã putat
fructu, Helicẽ appellãt Arcades. Virgas ad nexus, e nigra cõmodiores & pulchrioreſ, e cãdi-
da ſpiſſioreſ, & agricolarũ utẽſilibus aptioreſ eſſe. Plinius apud nos quoq; tria Salicis eſſe no-
mina commemorat. Viminalẽ, eandẽq; purpureã. Vitellinã, a colore luteo, graciliore priore.
Gallicã, quę ſit tenuiſſima. L. Columella Gręcã, Gallicã, Sabinãq; reddit: gręcã flauĩ coloris:
gallicã obſoleti, purpurei, tenuiſſimi; uiminis: ſabinã gracilibus uirgis atq; rutilis, quã pluri-
mi uocãt, ingt, amerinã. Plinius gręcã rubentẽ, amerinã candidiorem aſſerit. Porro quam dixi
* Vitellinã, in exẽplaribus nicellinã, & itellinã corrupte legimus. Inuenit & alia diſtinctio. Proce-
rę, uineis iugãdis pticales uocãt, balteo corticis uincula p̄bentes. Alię p̄renues, a uiminibus,
appellatę uiminales. Alię uirgas, ſequacis ad uinctum lenticę ſerẽtes. Alię corbibus et ſupel-
lectili uillicę firmioreſ cãdidioreſq; detracto cortice, leuiq; tractatu; mollioribus inde uſis, q;

e corio & cathedrarum delitijs apuissima. Fructum Salix fert, abeuntem in araneam, anteq̃ o-
mnino maturitatem sentiat. Ob id, ante maturitatem colligitur, dicta Homero ὀλισίκαρος,
hoc est, frugi perda. Vna tm̃ prodiit, ad maturitatem proferre solita, in Creta insula, ipso de-
scensu Iouis speluncę, toruum ligneumq̃, magnitudine ciceris. Succus Salici triplex. Vnum
arbor ipsa, gummi modo sudat. Alter cortice triū digitorū magnitudine ablato manat. Tertius
detruncatiōe ramorū, a falce distillans. Salix fertilior & densior recisione fit, ac tonsura ex bre-
ui pugno, uerius q̃ ramo, puentu certissimo. Tertium locum in æstimatione ruris, Cato ei tri-
buit. Salicū non hoc tantum. Seruio grammatico significat qd̃ oliuetum, arbutum, uine-
tum, sed & uirgulti quoddam genus, dictum ita, q̃ saliat surgatq̃ cito: ut Lupum fortasse sali-
etarium intelligat, de quo suis locis egimus.

EX M. VERG. COMM.

Gravissima huic arbori inuidia Homerus, p̃p̃modū fecit, qd̃ ὀλισίκαρος hāc uocauit, frugi
perdam. De hac, omniq̃ eius medicinę usu aliter magis q̃ alia Plin. lib. 24. pleraq̃ tradit, quæ
in medio posita omnibus relinquimus.

De Syluestri Olea. CAP. CXL.

Syluestris Olea, quam aliqui Oleastrum appellāt, ali j æthiopicam. ἄγριος
Oliuam. Folia adstringūt. Trita autē & imposita ignem sacrum, ul-
cera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, paronychia, nomasq̃ cohi-
bent. Crustas emarginant cū melle illita. Quinetiā sordida repurgant. In-
flamnationes, panosq̃, cū melle imposita discutunt. Cutē a capite uulsam
conglutinant. Oris ulceribus cōmanducata medentur. Succus & de-
coctum, eosdem habent effectus. Sanguinis eruptiones, ac muliebre pro-
fluuium, admotus succus inhibet. Vuæ oculorum, pustulisque pro-
dest. Vlcerā, & ueteres defluctiones sistit. Quapropter in collyria addit,
ad genarū erosiones perq̃ utilis. Exprimitur succus tuis folijs, affuso ui-
no ex aqua, siccatusq̃ sole in pastillos digeritur. Sed longe ualidior ad re-
condendū succus habetur, qui cum uino q̃ cum aqua expressus est. Au-
ribus subuenit, siue ulcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter coeli-
acis cum farina hordeacea illinuntur. Vruntur cum floribus folia, ut spo-
dij uicem cinis præstet. In cruda olla oblito ore luto, usq̃ dum figlinum
percoquatur, restinctaq̃ uino, & rursus subacta, eodem modo uruntur.
Postremo cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cine-
rem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere. Sed eisdem
uiribus præditum esse putandum est. Foliorum satiuæ olea eadem uis
intelligitur, sed aliquanto inferior. Vnde ocularibus medicamentis ob-
suam mitiorem uim conuenientior est. Sudor ligno uirenti accenso ma-
nans, illitu sanat lichenas, furfures, & scabiem. Oleaginum semen illitum
medetur furfuribus, & ulceribus quæ depascunt uorantque. Quod autē
em intra nucleum est ex adipe & farina, scabros ungues excutit.

BARBARI COROLL.

Oleaster, græce ὀλισίκαρος appellatur. Syluestris Olea fecundior satiuæ, q̃ fere syluestres ha-
bent, ceu cura fertilitatē minuere. Mansuescere hanc tractatu, decisit circa taleis, aut omnino
translatione mitem fieri, uix potest adduci Theophrastus, ut credat. Sola hæc arbor cū Olea,
teredinem sentire nō dicat. Ex Oleastro marculos breuiiores, & terebris uaginas, sicut ex buxo,
ulmo, fraxino, aquifolia, factitatas produunt. Est & in Appennino frutex, uocatus Corti-
nos, ad liniamenta modo conchilij colore insignis. Sed hoc ego nō Oleastrū esse puto, sed Ole-

A

ἀλυσ. κ. μαυρά
τ' αἰγυροί κρη
νίαι ὀλισί-
καρος.

ἀγριος

B

Plin. li. 17. ca.
12. Lib. 13. ca.
17. Li. 14. cap. 1

D I O S C O R I D I S

Castellum, & Oleam cilibracam, a Columella nominatam: cuius & ipse Dioscorides in Chamelea meminit. Phorion, Oleastrum quandoq; dici Phauliam existimat. Certe Phaulia Oliuæ genus est Columellæ, Plinio, grecis omnibus.

Plin. li. 15. ca.

3. 3. 4. 5.

Olea medulla tam incerta, ut non in medio haberi, sed p totum lignum sparsa uideat, radi ce parua, uelut lacinia ex medio tendente, cæteris grandibus & cancrorū similitudine contor- tis. Proprium ei malum Congros, etiam si deriuatur in alias quoq; id nomen. Sunt q affectum tū Premnō, Crotonē aliq cognominent. Supina foliorum huius contra q ceterarum, candi- cant magis q prona, minusq; sunt leuia: qd & cum hedera cōmune est oleæ. In Syria, & aliubi, congestum quasi tuæ modo fructum ferunt, ubertate soli. Oleam utiliter & probe defloruisse dicimus, cum flores eius caduci, uelut perforati reperiuntur. Nascitur modis omnibus extra, q; furculo. Ex huius nucleis, quos Sansas uocamus, syluestrem oleam prouenire Theophras- tus scriptum reliquit. Sansam, sunt qui & Naucum dici uelint. Vnde uerbum nauci facere. Quandoquidem & fullones, ob uilitatem artis, Nacæ dicebantur, ut nunc mesitas et proxene- ras, sansarios & ossarios uocamus. Quidam pro nugis, naucum. Alij omnia fere opera ex la- na, græce νύκας dici uolunt. Ipsum quoq; nucis, sed & omnium rerum putamē. Alij nucleum malunt iuglandis. Alij mediū illud uelut dissepimentū. Glossematorū scriptores fabæ grani, q hæret fabulo. Quidā ex græco leuē hominē in eo uerbo significare putauere. In mari rubro uiuit Olea, quæ uocatur arabica, bacis fere nostratibus, fungos, cum largi ceciderunt, imbres educans, qui tacti sole in pumicem durant. Ex qua manat lachryma, inhibendo uulnere san- guini expetita medicis. In sinu heroo lapidis specie, ut thynum & laurus, cubitorū trium ma- gnitudine. Ignē olea, quamuis optime subditum excipiat, q spissa & pingui natura sit, igniari- is tū ineptissima est. Vna maxime omniū Olea regerminat in opere. Vitam oleæ Theophrast. 200. a. nōs longissimā esse tradidit. Si olea consitū in confinio quercetū habuerit, nō solū nō fe- rer, sed etiam fugiet, introrsumq; se in fundum abiicit. Vt cradē fico, ita thalææ tribuuntur hu- ic arbori, utiq; apud nos. Græci, ut inqt Pollux, Thalos non oleagineos solum, sed utigineos quoq; ramos nomināt interdum. Præcidunt, Varro inqt, eam de tenero ramo æquabiliter, ex utraq; parte circiter pedālem. Sunt qui sclauolas nominent. Eresione porro Athenis, siue Iresi- onem uocabant, plantam oleagineā, uelleribus & corollis inuolutā. Vnde & nomen cōtra pe- silentiam foribus imponi solitum, ut est apud Aristophanē. Hanc & Corythalion dicebant. Etiam si pro laureo quidā ramo capiunt, in eundem lustrationis usum. Credo huius quoq; ri- tus apud Romanos uestigium fuisse, cum ita legamus apud Festum, Plantā oleagineā uirga, in- quit, foliata est ex olea deplātata. Nam & februa quoq; lanæ sunt & arborum ramī apud nos- quibus redimiti sacerdotes expiabant domos. Quod deinde nomen ad oīa purgamina transla- rum est. Autor Ouidius. Morbus & ille proprius, præter uermiculationem, Elos uocatus, hoc est, clauus. Ab alijs Mices, atq; Lopas, hoc est, fungus & patella: ceu quædam solis inustio. Quanq; Patella in sicu morbum significat, qui nimios propter imbres radici contrahitur in o- lea. Et Arachnion uocatur affectio, hoc est, aranea, fructus absumentis uermis: sub corio pro- uentū adimit, in uicemq; adiuuat, si nascatur ad nucleum. Nulla post ficum arbor uredini ma- gis obnoxia est. Carpæ appellant in oleis uermiculi, statib. austrinis creati, ut in uitibus. Est et impetigo, peculiaris ei morbus, ut scabies fico, & uitib. fluor. Olea græci, ἰλαίαν uocāt: nostri qnq; Termitē. Quāq; ita & ligni uermes dñr. Optia erat Olea ueterib. licinia, siue liciniana. Pau- sia. 2. oleo. Escē, orchas. Varro, grādis inqt, Olea uocat orchitis, a similitudine, ut credo, testiu: antiquis archemora. Minus ijs gratæ sunt regiē, et radij uocare. Sūt et alia earū gñā, quæ ambiti- osū sit, pleq; cū et. 6. uolumine Colum. et Plin. 15. naturalis historie, nihil fere indictū relinquat. Hæc arborē nonnulli existimāt ultra. 60. a mari, aut nō uiuere, aut nō esse feracē. Sed in qbusdā locis recte puenit. Olea Mineræ sacrā, ut Aristoph. & Iulius Pollux inqt, græci Moriā uoca- bāt, in academia satā, ut in Olympia nascētē Oleastrū calistephanō: q olympiē uictores ea co- ronarent, ut ait Pausanias. Nā Secos, fructiferā oleā in poetis significat Photiō. Dicit & Callie- lē, quā nos satiuā, ut ab oleastro differat, quā uocāt Agrielgā. Celebrat & cognominata Stre- pte, ab intorta specie. Sed ea loci nomē ē, circa Epidaurū, adiecta fabula, euenisse ita ei circūa- ctu manus, Hercule illac meante. Nā & clauā eius ex oleastro uolūt reuerso ex Hyphoreis fuis- se, ignoto prius græci: quæ mox spōre resloruit apud Troezenios, aut certe ad Alphēū amnē: si Pausaniæ credendū est, hōi qdē satis docto, sed supersticioso, diui Adriani & Antonini, utri- usq; tēpibus. In eadē gēte Streptos, Rhachos uocāt, locū oleastris frequentē, uersus mare: q eorum consuetudine, quicquid ex olea relinquitur inutile, Rhachos appellabatur. In Arcadia spectari solitam, Pausanias affirmat arborem, e cuius radice una, Ilex & Olea nasceretur in

quodam fano. Syraculis, ut Diodorus auctor est, in frondibus olearum scriptis optimatum nominibus, discessione facta, irrogabatur quinquennale ciuibus exilium; de quo argumento, genus id multæ, Petalifmus appellabatur, ut Athenis Ostracifmus.

E X M. V E R G. C O M M.
F Vituniuſæ Græciæ quondam in maiore honore Oleaſter quam Olea. Hanc ipſam arborem Cotinon Dioſcorides uocari ait, communi & recepto ab omnibus græcis nomine. Oleaſtrum enim græci Cotini appellatiōe intelligunt, & ex ſimilitudine æthiopica Oleam, quæ proprie generis in ea regione arbor, nullum inuenit ob ſimilitudinem aptius cui compararetur in Græcia nomen & genus. Maro noſter folijs amariſ Oleaſtrum eſſe dixit. Nec falſo, ſi ſenſui & uiribus ejus in medicina credendum ſit.

C De Colymbadibus Oliuſ. **C A P. C X L I.**
Colymbades trita, & ambuſtis illita, puſtulas gigni prohibent. Sordida ulcera purgant. Muriæ ſuccus collutas gingiuas contra hit. Et motus dentium firmat. Oliua flaua & recens, ſtomacho utilior eſt, uentri difficilis. Nigra autem & matura, corruptioni oportuna eſt, ſtomacho aduerſatur. Oculis non conuenit. Capitis dolorem mouet. Arefacta illitu depaſcentia ulcera fiſtit. Et carbunculos emarginat.

B A R B A R I C O R O L L.
Oliuæ, Colymbades ideo uocantur, quoniã oleo ſuo pura, hoc eſt, ſine accerſita cõmendatione innatant, & quaſi urinabundæ fluitant. Halmades autem dicuntur, quæ muriâ feruntur, etiam ſi quidam Græci confundere nomina. Sunt & Netrides appellatæ, quia natent, apud Iulium Pollucem. Idem auctor & Cotinadas nominat, quas & Phaulias, & Trambelos dici tradit, Medicinæ, quæ a Dioſcoride ſubruffis redduntur, tribuat candidis a Plinio uidentur. Caſtigandi ſunt in auctoribus loci, Columbares, pro eo, quod Colymbades, imperitia librariorum ſcribentes. Genus alterum oliuæ cibariæ, Græci Thlaſtas, & Pyrenas, & Pityrum, ſiue Pityridas, hoc eſt, nucleos, & ſtreſas, & ſurfuraceas appellant. In hunc uſum ſtringuntur ante q̃ prematuræ ſint. Epityra falſo dicta, cum ſit Epityrum, ut Varro inquit, ſiculum edulium: de quo dictum eſt alibi pleniffime.

F Vit quondã multiplex Oliuarũ conditura, accerſitaq; aliorũ ſaporum cõmendatiõe placebat, quod aliqui ingratiũ habuiſſet in cibis uſum. Inter eas Colymbades a Græcis dictæ fuerunt, quæ cõmuniore & certiore uocabulo Halmades iridem dicebantur. Hæ nomen a ſale inuenerant, Hal' enim Græci, ſalem dicunt. Illæ ab eo, quod in conditura ſua natarent ſic appellatæ fuerunt: *κολυμβαν* enim urinare eſt. Dico autẽ urinare, in natando ſub aqua eſſe. Si quis rem uelit exactius noſſe, facile illi erit ex Plinio lib. 15. cap. 3. Palladio lib. 13. cap. 20. Columella, præterea lib. 13. cap. 47. infinitas pene Oliuarum diſcere condituras.

C De Oleo ſylueſtris Oliuæ. **C A P. C X L I I.**
Oleum ſylueſtris oliuæ humidis gingiuarũ uitijs colluitur. Dentium mobilitates ſtabiliter. Calfacti ſorus, gingiuſ fluctiõne laborantibus utilis eſt. Lanam enim ſpecillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuſ admouere, donec albæ ſpectentur.

B A R B A R I C O R O L L.
De oleo ſylueſtris oleæ dictum eſt ſuperius.

E X M. V E R G. C O M M.
Paulus affirmat ſpiſſandi ſimul & adſtringendi uim habere, aridiuſq; & ſquallidiuſ omni alio oleo eſſe. Locus eſt eo capite, in quod de eroſionibus gingiuarum, earumq; excreſcentijs & pladis agit. Sic enim ille uocat, quæ hic *ὄληα πλάσντα* dicit. Quod uitium facile, & quale ſit intelligitur, ſi nouerimus quid in alijs *πλάσντον* græcis ſignificet, non humens ſimpliciter, ſed quod cum humore ſtaceſſit: quale erit, quod natura ſua durans rigensq; admiſſo humore lanquit, & paulominus quam dilabitur, oportetq; in *τὸ πλάσντον* duo hæc intelligere, humorem, & ex humore infirmitatem, idq; eſt, quod hic ait, gingiuas *πλάσνται*, & nos uertimus flaccidas, & cum infirmitate humentes.

C De Lachryma Aethiopicæ Oleæ. CAP. CXLIII.

Αδερυον τῆς αἰ-
θιοπικῆς ὀλεῖας

Lachryma, quam Aethiopica Olea stillat, Scamoniæ similis est, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates Oleæ, Oleastricq; similem lachrymam sudant, quæ cōmode ad oculorum habetudines illinitur. Cicatrices, albuginesq; illitu emendat. Vrinam & menses ciet. Causis dentium impressa, ad dolores efficax est. Inter uenena scribitur. Partus pellit. Lepras & impetigines sanat. Appellatur autem Aethiopica & agrestis Olea.

B A R B A R I C O R O L L.

Oleæ Aethiopicæ lachryma in precio est. Sit hæc Arabica, quæ & ipsa doratur lachryma, nondum constat mihi. Quancūq; puto eandem esse, quoniā in Arabici sinus desertis, tribus insulis, ut inquit Strabo, nascitur. Vt cumq; in Arabia stillat eam olea, qua medicamentū conficitur, Enhæmon appellatū, singulari effectu contrahendis uulnere cicatricibus. Sunt qui hoc esse putent gummi genus, illud quod recentiores Elemi, quasi Enhæmi appellant, ad ossa etiā fracta caluæ conglutinanda cantatissimum. Porro uerbum Enhæmon, non huic modo rationi conuenit, sed emplastris omnibus, quæ cruentis protinus injiciuntur uulnerebus, ad reprimendas inflammationes, & inhibendum sanguinem: quod genus & Alipenon, & Catagmaticon, & Collecticon uocatur, quoniā medicamentis minime pinguibus constat. Oleæ autē hæc in Arabia nascuntur, in maritimis, & fluctibus, æstuq; operiuntur rubro mari, ut in olea demonstratum est. Nec baccæ nocetur, cum constet & in solis salem relinqui. Oleastrum quoq; ipsū, ueteres Oleam uocabant Aethiopicam, testis est Dioscorides.

E X M. V E R G. C O M M.

EX Aethiopia usq; ut Comicus ait, Aethiopicæ oleæ lachryma quondam Græciæ importabatur. Neq; a nobis igitur desyderabit quispiam, quæ in tam longinquo, & inaccessio orbe nascencia cognosci ætate nostra non possunt.

D

Αφύρ

C De Quercu.

CAP. CXLIII.

Omnis Quercus adstrictoriam uim habet, præsertim liber, qui cortici, & ligno intercedit. Quinetiā tunica putamini glâdis subiecta. Decoctū ex ijs datur dysentericis, cæliacis, sanguinē excreantibus. Trita in pello, sceminis fluctione uulua laborantibus subijcitur.

B A R B A R I C O R O L L.

De glâdiferis
arboribus &
glandibus, &
gallis, uide Plin-
ium lib. 16.
ca. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Plinius glandiferas arbores, una uoce comprehendere posse negat latino sermone, quemadmodum græco potest Αφύρ, & antiqua uoce Saronos, a qua Saroniacus sinus, & Saron, in Arcadia nemus, trans Ladonem fluuium. Quibusdam, ut Theodoro gazæ, Roboris appellacione cōtineri posse omnia ea genera uidentur. Sane Græci Dryos uocabulo, etiā omne lignum significant. Vnde Gerandryon, pro ueteri & ambusta quacūq; arbore accipitur, quasi uetus ramale. Persius. Ergo roboris quaterna genera, Quercus, Robur, Aesculus, Cerrus: quæ Græcis illis respondent: Hemeridi, Aegylopi, Haliphloe, Platyphyllo; ut sit quercus Hemeris, Platyphyllos Aesculus, Aegylops Cerrus. Sed nunquid Haliphloeos robur significet, non habeo compertū. Theophrastus certe Agriandryn appellat, quā nostri robur interpretatur, ut in Galla disseruimus. Nec minor hic, q̄ in pinu difficultas, quæ quibus græcis latina congruat. Nos utroq; loco tantū laborauimus, quātū uix ipsi qui p̄didere. Quidā quatuor su prædictis duas addidere spēs, Phagū, & Illicē. Sed toto gñe distāt, ut cognatæ potius, q̄ congeneres hūdæ sint. Hemeris, sane Homero, non quercū, sed uitē significat, ut Photion testatū esse uoluit. Sibari, qui nūc Sibari thurū dicunt, quercus fuisse tradit, in oppidi cōspectu, fronde perpetua, Varrōis & Theophrasti testimonio, q̄ nec germinare cū alijs, sed ab ortu caniculæ solita sit. Rarū est, qn̄ fata quercus deterior eueniat. Dulcissima glās Hemeridi post Phagū. In orbem hæc comat, torqueturq; in alas, crebro ramorum sinu caua, mareries ualida, Macedones, quæ glandem dulcem perducatur, τρυμνιδρύς, hoc est, quasi ueri quercum appellant. Nasci Quer-

cus in rubro mari glandiferas tradit. Nasci & in nostro, propiores terræ, super lapides atq; testas, sine radicibus, sed parellarū modo adhærescentes, folio carnosio, crasso, atq; oblongo, myricæ simili, accedētis ad purpuræ coloris. Magnitudo arboris tota, paulo amplior sesquipede. Hac tingi mulieribus lanæ. Ramis earū adhærent conchæ quædam, & caulibus parte ima, ubi & bestiolæ populantur. Naufragis & urinātib; comperta hæc. In Lusitania profundo mari Quercus glandiferas innasci, unde Thūni uestiatur, auctor est Polybius. Ob id Thūnos, qui dicat marinos esse porcos, minime discesserit à uero: ut inquit Athenæus. Carinas nauibus quernas subiici præcipiūt, maxime triremibus. Abieti, aut pino larici uocatæ, ferruminari quercus nō potest. In sociabili natura, q̄ hæc spissa corpore sit, illæ textu raro. In septentrione haud, pcul Caucis, circa duos p̄cipue lacus, littora ipsa obtinēt quercus, tāta magnitudine, ut suffossæ fluitibus, aut flatibus propulsæ, uastitas cōplexu radicū insulas afferāt. Itaq; libramēto eo stantes, nauigāt. Ramorum ingentiū armamētis sæpe territa Romaniorū classe, noctu & prælio contra arbores quoq; inito. De Herciniæ syluæ miraculis, nihil attinet dicere, nisi q̄ magnitudine insigni robora ibi crescere concupiūt. E glandiferis ciuicas coronas nesti mos erat: quæ omnibus anteferrentur. Ciuiica signa primo fuit. Postea placuit ex æsculo Ioui sacra. Variatūq; hoc cum quercu est, ac data quæ ubiq; fuerat. Non puto prætereundū Alexandri Macedonis inuētū, seruandæ niuis, in scrobis ubi ea sit, coniectis e quercu ramis. Saronicus in Peloponeso, Plinius inquit, sinus est, olim querno nemore redimītus: unde ei nomē, ita Græcia antiqua appellante quercū. Pausanias ab Sarone, qui post Althipū regnauit, sinū eum dici uoluit.

EX M. VERG. COMM.

Coniunximus, unoq; eodē clauisimus capite, quæ natura primū in eodem genere, mox in historia hic scriptor, postremo meliores græcorū codices coniuncta esse uoluerunt.

Emēdauius præterea, addidimusq; pauciora quædam, quæ græca cum nostris conferentibus nouisse facile erit, præsertim in communi & nota omnibus re. Nullibi enim non nascitur Quercus aliqua, Fagus, Ilex, Castaneaq; quàm hic Sardoniam glandem, a Sardibus appellat: quemadmodū a Castano Magnesiæ oppido, uel ut Stephanus docuit, in Apulia non procul a Tarētō, Castaneam Latini & Græci appellauerunt, glandiū generi ab hoc scriptore, & ab alijs assignatā, & Iouis glandē dictam. Et si posteriores regijs nucibus eum honore tribuerint.

Eandem legimus in ueterum Græcorum lexicis Lopimam, & Euboicam dictam fuisse; hanc a regione, illam a cortice, quod λινος Græci dicunt, & λινον decorticare.

Laudauit contra uenena quædam præcipue Nicander, Castaneam, Nucemq; ut postea Maro fecit, appellauit. Versiculus eius est. κατανόη καρὸν παχυφύλλοιο κάλυμμα. Et populo post, *Αυλκίος καρὸν τὸ κατανόη ὑπερὶν ἄλλα*. Quod non parū miretur aliquis, cum manifeste inter glandes, potius q̄ inter nuces, Castanea numeranda sit. Magnis autoribus defendi utrunq; potest, nec nos aliud in ea re monemus, quam fuisse quondam in ea glandis & nucis nomen, latiusq; glandis, quam nucis claruisse.

De Glandē.

CAP. CXLV.

Glandes eosdem effectus exhibent. Vrinam ciunt. Capitis dolorem, & flatus in cibum sumptæ pariunt. Resistant esitatae uenerum natorum ictibus. Decoctum corticis, cum lacte uaccino potum, proudest contra toxica. Intrita crudæ, inflammationes illitu leniunt. Ad duricias, quas cacoethæ uocant, & malefica ulcera cum salsa axungia conueniunt. Iligneæ glandes uiribus quernās præstant.

BARBARI COROLL.

Glans græce βάλανος, ut Varroni placet. Præfertur omnibus Hiberica, fago dulcissima. post Hemeridi. Tum Platyphylo, deinde Haliphloeō. πλατύφυλλος, hoc est, latifolia, post cerum excelsissima & rectissima. Sed post haliphloeon, usu ædificiorū deterrima, nec utilis carbone. Macedones latifoliam intelligunt amaræ glandis: quam Aesculum quidā interpretantur. Aesculū porro ab esu dictā miremur, cum diphthongum æ requirat. In qua uermiculi nascentes, priuatim albæ nominantur. Ab æsculo æsculetur, ut a quercu querquetū. Vtrunq; locus Romæ fuit. Vnde Querquetulana quoq; porta, q̄ a uiminali, & cauilaria nō discrepat. Etia si ab auibus Querquedulis, quas M. Varro & Columella, Cercidas uocari græce dicunt.

D I O S C O R I D I S

C uideri potest appellata. Haliphloeos falsicortex a Theodoro dicta. Potest & recticortex, quia nonnulli apud Græcos, euthyphloeon eā uocent. Crassissimus huic codex, & plerūq; fungosus & cauus. Pessima carboni, & materiae. Nec putrescit alia etiā cum uiuit. Quin & fulmine ictur saepissime, tamen si altitudine nō excellat. Ideo lignū eius, ne ad sacrificia quidē urī fas erat apud Aeoles. Sphagnon, siue Splachnon, siue Phascon appellant, itemq; Bryon, pannū quendam mucosum, pendentē ex ea quasi uillos, ut in Cerro, sed nigriorē breuioremq;. Vtūtur arbore Macedones, ad axes, & id genus utensilia. Glans eius rara & ingustabilis animalibus, praterq; suillo generi, ut Plinius existimat, ac ne sui quidē, si pabulū aliud habuerit. Quod quidē Theophrastus Aspridi, hoc est, Macedonicæ cerro tribuit. Est autē Aspris, rara & improba glande sterilis, quæ caput tentet mandentū, ut iligna. Cerrus, ἀργύρεος a Græcis uocat, glande omnium amarissima. Rarissime nascitur in cultis. Pannū quem dixi phascon, longitudine cubitali, brachiarū similitudine, mucosum, uillosumq; ferens. Nascitur e cortice, non e furculo, unde glās. nec ex gēma, sed e supernis nodorū si a latere. Lignum rectissimū, excellissimum, leuissimum, per longitudinemq; robustissimū. Aedificijs ineptū aspridis, si dedoletur. Ideoq; rudi duntaxat utuntur. Damnatum & carbone, quoniā exiliat, scintillasq; edat. Aerariorum tantū officij nis compendij; quia statu desinente, protinus emoriens, saepenumero uratur.

De Fago & Illice.

C A P. CXLVI.

φρυγὸς καὶ πρίνος

F agus & Ilex, quercus generi assignantur, & copiosum munus ob eunt. Ilignae radices cortex cum aqua coctus, dum eliquefcat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia oīm tusa et trita, tumoribus p̄sunt. Et imbecillas mēbrorū partes corroborat.

B A R B A R I C O R O L L.

Plini. lib. 16.
cap. 6. et 19.
lib. 24. cap. 5.
Theophrast.
lib. 3. cap. 9.

D

F agus ea, ut quidam scripserunt, quæ in tenuissimas secatur laminas, glandifera non est. Ideoq; duo genera, siue nomina Fagi sunt glandem ferentis. Materie scabra, quam Græci φρυγὸν appellant, ut fructū quoq; Hippocrates. Et alterius quam Græci Oxyam, Lydi, Myson, Olym- po eorum monte copiosam. Vnde Mysi populi, ut Strabo inquit, & Eustathius. Nostri Scis- simam appellant, scissilem in laminas, similemq; abiecti. Syluestrem, nunq; ut Macedones arbi- trantur, florentem, erectam, leuem, enodem, ligno colorato, robusto, nervoso, folio crasso, bi- fido, longiore q; piri, extremitate aculeato, radicibus nec multis, nec altis. Fructus glandis effi- gie leuis. Includit cauliculo echinato quidē, sed blādo, nec hispido, ut in castanea, cui tñ similis est dulcedine ac succo. Nascitur eadē candida, sed in montibus. Vtilis ad carpenta, lectos, sub- sellia, mensas, nauigia. Campestris nigra, & ad hęc minus petita. Fructus utriq; similis. In aqua durat auis, ut robur, atq; ita firmior quoq; redditur. Humidissima hæc, & fraxinus. Quāobre e duabus his lectuli, qui fierent, incuruant cedentes ponderi. Minoribus Scissima nauibus cō- mendat ad carinas. Itē ad testudinem plaustrorū quoq; uectabulorūq; uilem fabricā, specie ui- senda prouenire in agro latino solita, auctor est Theophrastus, tanta longitudine, ut nauibus Ethruscis, pro carina satisfaceret. Sunt qui Oxyam interpretant Ornū. Ilex uero, Prinos græce dicta, post occasum uergiliarū fructificat, & anno proficit, ut putat Arcades. Simul em̄ antecede- dentē fructum, nouus occupat, proptereaq; a nonnullis inter biferas descripta. Simul em̄ antece- dentē fructum, nouus occupat, proptereaq; a nonnullis inter biferas descripta. Radix Ilici multū plex, & ut syluestri altissima, folio roboris minore, aculeato, leuiore cortice. Arbor de amplissi- mis, ut robur, materie spissa & robusta, sed quæ frangat ac dissiliat sponte sua. Ob id Pericles Beocios Ilicibus dixit esse similes, ut est apud Aristotelē, qm̄ ipsi se conficerēt intestinis discor- dijs. Glās exigua, & pter glandē puniceum granū sunt hæc. Hyphear, & uiscū in ramis, ut alie- na sustinet, a septentrione uiscū, a meridie hyphear. Hanc & Aquifoliā, uel Aquifoliū uocari pu- to, siue paulo ab ea differentē. Theodorus Aquifoliā appellat, quā Theophrastus Ariā, siue A- griā, siue Narycan syluestre, & cui folia nunq; decidat. Ita em̄ Dore uocat, ingt, quā Arcades Phellodryn, sempiternæ frondis arbore, mediāq; inter Robur & Ilicē. Sunt qui Phellodryn ali- ud negent esse q; Ilicem foeminā: ut Ilex ubi delit, utant hac in carpentarijs præcipue fabricis, quod & Lacedæmone faciūt & Elide. Lignū intusq; Ilici candidius, sed fuluius q; robori. Ma- teria quoq; durior, sed q; Ilici solutio in opere: foliū simile, sed iligno maius, & querno minus. Speciosior medulla q; Ilicis: fructus minimis glandibus. Aequalis Acylon uocatur, quēadmo- dum & iligneus. Nam Balanos, siue glans robori propria tribuit. Acylon certe Lydi genitale ipm̄ uocant: quēadmodū & Balanos, pro glande Colis dicitur: Plinius contra q; Theophra- stus, Phellodryn uidetur eadē existimasse cum subere, quod & Phellos dicatur, in foeminarū

calciatus utile hyberno tempore, ob id mulieres, facete a grecis, arborum cortices uocari. Est autem Suber, arbor procera, line multis ramis, ligno robusto, cortice præcrasso & aspero in se-nectute, qui ut in Picea rūpatur, sed maioribus fragmentis, folio Fraxini crassiore longioreq; ac perpetuo. Glans Aquifoliae. Corticem detrahere oportet, ne deterior fiat arbor: qui trienio post subnascit. Simulachra e Subere dijs factitata. Sed successit in eius locū palma. Hæc Theophrastus. At Plinius hæc, Suber inquit est arbor, glans pessima, rara, cortex tantū in fructu præcrassus, ac renascēs, atq; etiam in denos pedes undiq; explanatus. Vfus eius anchoralibus maxime nauū piscantiumq; tragulis, & cadorū obturamentis. Familiaris hæc arbor Theophrasti temporibus Pyrenicæ. Nec in Italia tota nascitur, aut in Gallia omnino. Sed & illinc nascitur confusio, q; Smilacē uocari legimus, quē dicatur Ilex in Italia, & in prouincijs Aquifolia: cum Smilacem Sestius eadē esse eum Taxo prodiderit. Recentiores sunt qui Smilacem cum Phellodrye faciunt eandem; haud ferendo errore: etiam si Smilax Illici describitur a Theophrasto si milis. Dictū est de Aquifolia & in Cræogono. Vt cumq; sit, Illicis inquit Plinius, duo genera, ex ijs in Italia folio non multū ab oleis distantes, a quibusdam grecis Smilaces dicūt, in prouincijs Aquifoliae: masculas Illices negāt ferre. Illici honos, ad axes in plaustris simplicibus, hoc est, monostrophis. Item ad iuga lyrarum, psalteriorumq; Igniaria quoq;. Ciuiam ex Illice pri mam fuisse diximus: cui ex æsculo succellerit, dicata Ioui. Lignum ex Aquifolia contractum ac discissum, Tedæ modo uritur, & a grecis in hoc usu Garbion uocari solet. Hoc & e quercu sit, & alio nomine Panos & Phanos appellatur, uulgo quoq;, quemadmodum e uirgineo libro, factæ lampades, Lophiæ dicuntur, & ex arundinibus Elanæ.

De Castaneis.

CAP. CXLVII.

Sardianæ glandes, quas aliqui Castaneas, aut Lopima, aut Glandes Louis appellant, adstringunt, simileq; effectus præbent. Præfertur tunica, quæ carnem & corticem media intercurfat. Caro his qui ephemerum biberunt conueniens est.

BARBARI COROLL.

Castanea, uergiliarū obitu fructificat, græce *λίος βάλανος*, hoc est, Iouis glans, uocat. Cum tamen Iuglandis appellatio, nucibus tantū Regijs dicata sit a nostris. Nuces uocamus & Castaneas, quancq; propiores glandium generi. Ideo apud Græcos appellantur balani sardianæ: quoniam sardibus prouenire primū. Euboidas quoq; a Græcis dici, quas nos Castaneas uocamus, lego. Sed & Castaneas primo dictas scribit Phocion, q; ab oppido Magnesiæ, quod Castanon dicatur, aduectæ sint. Vt forte Diodorus, nuces Castanaicas inde nominari. Quid si a castitate, cum Plinius ieiunijs fere dicatas eas innuat: Ex ijs, Græci Pogonias appellāt, quæ barbudas quasdam habent; nisi quis lanatas earum intelligat. Sunt enim aliquæ pilis hirsutæ. Tiberius Cæsar, balanum nomen imposuit satiuis, cura multo excellentioribus. Plura earum genera, Tarentinæ faciles, nec operoso cibo, figura planæ. Balanitides rotundiores, purgabiles maxime, ac sponte profilientes. Salarianæ, puræ ac planæ. Nam Tarentinæ, minus ijs tractabiles sunt, & Corellianæ laudatior, & Meteranæ ex Corellianis factæ, rubenti cortice. Triangulæ, & populares nigrae: quæ uocantur coctiæ, minima laude, patriæ commēdatissimæ Tarentum, & in Campania Neapolis. Cæteræ suum pabulo nascuntur, scrupulosæ corticis. Intra nucleos quoq; ruminatiore. Armatum Castaneis echinato calice munimentum, quod inchoatum glandibus, trini quibusdam partus ex uno calice. Cortex lentus. Proxima corpori membrana, & in ijs, & in nucibus, saporem, ni detrahatur, infestat. Torrere has in cibis gratus. Mollitura etiam præstant, ieiunio sceminarum, ut ait Plinius, quandam imaginem panis, & ubicunq; fruges aliæ deficiunt, ut in Bergomatis, Agri montanis.

De Galla.

CAP. CXLVIII.

Galla fructus est Quercus. Aliqua Omphacitis appellatur, parua quidem, sed torosa, solida, nullo foramine peruia. Altera plana leuis, perforata. Eligi debet Omphacitis, quæ efficacior est. Vtriusq; uis uehementer adstringere. Tritæ ex crescentia in carne, fluctiones gingiuarum & uuæ, atq; oris ulcerationem cohibent. Nucleus, dens

A

σαρδιανὰ
βάλανος
λόπιμα ἢ
κασανα
λίος βάλανος

B.

Plin. lib. 17.
cap. 20. & lib.
15, cap. 23.

κκκς ομφακίτις

C tium cauernis inditus dolorem sedat. Crematae carbonibus, donec igne flagrent & uino aut aceto, aut acida muria extinctae, sanguinem supprimunt. Decoctum quibus insidere expedit efficax est. Et contra uulvas procidentes, fluctionesq;. Capillos denigrant aceto, aut aqua maceratae, Dysentericis coeliacisq; cum uino aut aqua trita, conuenienter illinuntur, aut bibuntur. Obsonijs addi debent, aut integrae in aqua praecoqui, in qua non nihil excoquendum est, quod ipsis conferat. In summa, his utendum ad adstringenda quae opus sunt.

Plini. libro 16.
cap. 7. Theophrast. lib. 3.
cap. 6. 8. 9.

GALLAE, a graecis *καυίδες* dicuntur, ad coria utiles. Hemeridis, Cerri, Platyphyllisq;, hoc est, latifoliae, nullius fere usus. Quamquam similes hemeridi, tantum leuiore. Genera faciunt, medicinae utilia, solidam, perforatam, albam, nigram, maiorem, minorem. Galenus Onocidas, hoc est, quasi afininas, a rusticis uocari Gallas eas scribit; quae fungosae, flauae, atq; magne sint, minus efficaces. Vis omnium similis. Optima comagena. Nascitur autem Galla, sole de geminis exeunte, erumpens noctu super uniuersa. Crescit uno die candidior, & si excepta est aestu. arescit protinus: neq; ad iustum modum grandescit, hoc est, ut nucleo magnitudinem fabae impleat. Nigra, eademq; resinacea, diutius uiuet, interdum mali amplitudine. Deterrima ex robore. Signum eius, quod cauernae translucent. Galla nigra, sine oleo flagrat. Robur Gallam fert minorem: & alteram, ut dixi, resinofam atq; nigram. Quae glandem ferunt, omnes & Gallae. Hemeris, id est, quercus, optimae, & corijs, ut dixi, perficiendis aptissimae. Fert & nigram, tingendis utiliore. De Robore, quae Theophrastus, agriamdryn appellat, discrepant sententiae, Alijs semine, Alijs etiam radice, quamq; sero, Alijs trunco nasci contententibus. Item alij florere eam putant, alij negant, sed muscum floris loco edi credunt. Fructificat post Autumnum, circa occidentes uergilias. Ramos habet inconditos, crassum corticem, atq; scabrum, in senecta maxime. Ac reliquae quidem arbores, ut coepere, continenter germinant, solae Robur, Abies atq; Larix, germinatione terna parturiunt, corticemq; inter squamas spargunt, ac deinde rumpunt. Ob id Trislepri, siue Trislipi uocatae, ut in Pinu diximus, hoc est, intermillariae, aut trisquamis. Robori & Cachrys dicta, quam nonnulli Amentum appellant, innascitur, durans hyeme, de qua in Abiete monstrauius. Tardissime Robur caeditur, hyeme ineunte. Ante computrescit. Tempestiue caesum, durat eius spissatum, ut cornu. Non desunt tamen, qui tempestiuum putent uere, cum amentum, hoc est, cachryn suam gerit. Medullam huius inter spissa commemorant, Melandryon uocatam. Aeterna in aquis materia, sed dulcibus. Mari putrescit: contraq; magna pars arborum. Hoc tamen & mari utile. Sed nauibus & aedificijs quoq; ceteris, quae terra obruantur. Carbones e robore annofo & nouello damnant. Media aetas in precio est, quamq; anteferantur, ex aria, arbuto, picea, praesertim metallis argenti.

Primus lib. 3. de plantis Theophrastus multa eius genera tradidit, quem secutus Plinius eisdem uerbis omnia latinis reddidit, Quae omnia ad duo tantum genera a Dioscoride contracta sunt. Credimusq; nos, quam hic *καυίδες* uocat, & nos articulorum in digitis magnitudine uertimus, eam esse, quam ille dixit magnitudinem fabae habere, quoniam ad iustam magnitudinem non creuisset.

Dicendum breuiter, hoc loco etiam, quam nos diminuta a columna uoce oris Columellam diximus, eam, quam graeci *καυίδες* etiam, latini uero uuam dixerunt, ea crassior facta & in flammata remedijs huiusmodi indiget.

Quam deinde nos exhalmeni diximus, Plinius aliquando, ut credimus falsum acetum dixit. Sed malumus nunc graeca uoce uti: quoniam de ea Plinius cum de exhalme ex professo egit, usus est. Interim satis sit ex nominis compositione, quoniam aceto & muria constaret, sic graecis dictam intellexisse.

ῥῶς ἰσχυρῶς

Rhus, quae obsonijs aspergitur, ab aliquibus Erythros appellata, semen est coriarij fruticis. Ita uocari solet, quoniam coriorum in

De Rhoe. CAP. CXLIX.

fectores ea utantur ad inspissandas pelles. Arbuscula in petris nascens, binum cubitorum altitudine, folijs oblongis, rubicantibus, in ambitu ferratis, acino uuarum gracilium, denso, magnitudine Therebinthi, quadamtenus lato. Cuius corticosa tunica per se utilis est. Folia uim habet adstringendi, & Acaciae effectus praebent. Decoctum capillos denigrat. Dysentericis infunditur, & in potus eorum infususque adhibetur. Instillatur auribus purulentis. Gangraenas & pterygia cohibent folia ex aceto, aut melle illita. Liquefactum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem ut Lycium conueniens. Semine eisdem effectus exhibet. Coeliacorum, dysentericorumque obsonijs inspergitur. Fracta, desquamata, liuidaque illitum ex aqua, ab inflammatione uindicant. Linguae asperitates cum melle abstergit. Candida sceminarum profluuia sistit. Haemorrhoidas sanat, cum quærno carbone intrito admotum. Latex in quo semen maduit decoctus, cogitur, coitque, efficacior ipso semine. Gummi defert quod dentium cauis imprimitur, ad dolores finiendos.

BARBARI COROLLE.

RHUS, siue ut Hippocrates, Roon, a Theodoro, fluida uocatur. Sterilis foemina est. Mas fructificat. Virgas, ut inquit Theophrastus atque Plinius, fundit Rhus, breues & graciles, folio Vlmi, longiore paulo, subhirsutoque, disposito per uersus, ita, ut in nouellis ramorum, contrarijs inter se pediculis, germina respondeant. Iis candidas pelles conficiunt. Flos in racemis albus, a quo semine collectum, lentis & errebinthi similitudine, rubescens, cum uina, quod uocatur Rhus: medicamenti necessarium, in eoque osseum. Radix simplex pro summa cespitum coherens, ut facile possit uniuersa flecti. Nascitur ubique, sed argillosis potissimum, utique in Syria. quam habeo unde mihi hoc Rhus syriacum, siue ut Columella & Palladius appellant Ros Syriacus, parum distare uideatur ab hoc nostrate, qui frutex coriarius, & rhus erythros, a colore subrutilo uocatur, Dioscoridi & Plinio: quem Columella rorem futorium semel dixerit, quoniam Rhus scytopedificos & brisopedificos dicatur, cuius aridis folijs pelles, ut malicorio perficiantur, crassitudine digitali, altitudine bicubitali. Quam Plinius, nisi librariorum ea sit incuria, cubitali prodidit. Duo faciunt omnino graeci genera. Magiricon, quod additur in obsonia, idest, cum Syriaco, ut opinor. Alterum quod *βυροδυσπικόν*, idest, excoriarium. quandoquidem utrumque in pastillum, ex carnibus ceruinis compositum, & in pantolmium quoque dictum requirunt, diuersis ponderibus; contra dysentericos & cruenta reijcientes. Habetur & syluestris herba, folijs myrti, colliculis breuibus: quae tineas & uenena pellit, Rhus uocata, porro specie, quam Theophrastus supra reddidit. Contemplati sumus Rhum ex Vmbria perlatum.

EX M. VERG. COMM.

Fuit quondam huic frutici in Graecia duplex honor, & quod coquinae, conficiendisque pelli bus inseruaret. Duplex etiam nominis indicatio. Latini, qui sale potius in obsonijs quam semine eius uti uoluerunt, ab altera utilitate nomen illi tantum fecerunt, futorium Rhum dicentes.

Posterior medicina, quae barbaris uocibus plerumque utitur, Sumach appellat, quae uox contrarijs communis etiam in aliquibus locis est, non aliunde, ut credimus, quam quia folijs fruticis huius confecta fuerint, uocantque ea passim coriario rum officinae Sumach. Theophrastus in fruticoso genere, et a spina alba paliuroque & rubo statim eam descripsit.

De Palma. CAP. CL

PALMA in Aegypto gignitur. Ea medio autumnu uigore decerpit solet, arabici Myrobalani similis, Pomatis cognominis, colore uiridi, & odore mali cotonei: quod si emanulescens sole percoquatur, Phoenicobalanus fiet. Palma acerba est, & adstringens. Contra alui foeminarumque profluuia, in uino austero bibitur. Haemorrhoidas sistit. Vulnere

A

Theoph. li. 3.
Col. li. 10. ca.
13. Pl. li. 13.
ca. 6. li. 24. ca.
pice. 11.

B

φόνιξ πάλμα
φονικὸς βάλανος

D I O S C O R I D I S

C glutinat illitu. Phoenico balani plus siccis adstringunt. Capitis dolorem afferunt. Copiosiores in cibo inebriant. Sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis, & dysentericis utiles in cibo. Illinuntur cum cotoneo & cærato cenanthino uesicæ uitijis. Carioræ præsertim faucium asperitati essu medentur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 5.
Lib. 13. cap. 4.
Theoph. li. 1.
ca. 2. li. 3. ca. 5.

Palmæ teneritas, processu lignescit. Vita in sicco æque ut in humore. Sabulosis falsisque gaudet, adeo ut in Syria Cœle, tribus dumtaxat locis, ubi arenæ sint, pueniat. Alibi computrescit, etiam si recentes earum palmulæ suaves gustu sint, nouellæ fructu nullo intus ligno edunt postea cum ligno. Paucos fere Palma ramos habet, scabro cortice, præcipue cum senescit. Medulla omnino nulla. Mari tantum flores, feminis statim fructus. E semine suo nascitur, ut conifere omnes, præterquam Babylone, ubi & uirga feritur. Tanto ibi unius eius usu, ut extare carmina scribant, quæ utilitates ex ipsa numero dierum anni pares esse predicant. Simulacra ex hac fieri solita ueteribus, sed prius tamen e subere, ut diximus aliubi. Palma uictoriæ symbolum est, quod ut Aristoteles & Plutarchus inquirunt, non cedit oneri quolibet ingenti. Nec intra flectit panditur, sed cõtra pòdus resurgit. Ideoque in coronarijs certaminibus fere aliud præmium quam Palma non dabatur, ut inquit Pausanias. Etiam si Græcia quatuor tantum locis, oleastro, pinu, lauro, & apio coronare uictores mallet. Palma fumo infestat cremata, de quo & Cheremonis poetæ uersum Theophrastus prætexuit. Parit arborum sola fructum ceu in spica: quod ei siccitatis causa, & proprietate quadam naturæ contingit. Fit & in alto Palma, fructum generis, fronde corosâ, breui caudice, uirgis rectis: parte ima non in orbem, sed in latitudinem sigillatim ambientibus, cõtinenti serie aliquâ tamen interrupta. Color toti plantæ puniceus. Surculis eius natura foliorum acanthinorum, qualia soncus, & cetera id genus. Sed recti tamen sunt hi, non ut illis recurui. Palma porro ægyptia, quam Dioscorides hic describit, Myrobalanon appellatam fert, nullo intus ligno: quæ & Adiplos, & Poma nominat. Phœnicobalanus niger est, quia maturefcere permittitur Myrobalanus uiridis. Habetur & Myrobalanus unguentaria cognominata, sed generis alterius, suo loco indicanda. Quid autem sit Chrysobalanus apud Alcæpiadem, ad ardores stomachi singultusque adhibita, non comperi. Ægyptia uero, ut Solinus inquit, sitim sedat, utique ante maturitatem decerpta. Matura sensum, gressum, linguam retardat & inebriat. Phœnix appellatæ græce Palma, unde fructus dependent Spathæ. Palmulas e mari Plenes, e femina Balanos appellat, ut Iulius Pollux tradit: qui sumpsit ab Herodoto. Est & Phœnix herba, ut post constabit. Itaque musicum instrumentum, ab inuentore ita dictum: siue, ut alijs placet, quia primum ex Deliacâ palma cubiti eius facti fuerint. Ipsos palmarum cum fructu termites, Baia & Spadices græci, præsertim Dorici, appellant: a quo & color equo generi, spadix, aut spadiceus & phœniceus, hoc est, palmeus: unde uulgo quoque Baius, alioque Phœniceus, proprie est, quæ uermiculus et puniceus uocatur, ab Eusebio siue Hieronymo in chronicis: nomen hæc a Phœnice illo, quæ literas inuenerit. Reperio & Parium & Balium colores equis attributos. Sed pro uario apud Euripidem, est Balus. Scio & Achillis equum Balsam uocatum, & equos Balias, pro celeribus quoque acceptos a Poetis. Nam murinus color, a mure dictus in equino genere, is est quæ græci psaron, quasi a sturno appellat. Cerebrum palmæ Galenus Encephalod, Dioscorides Encardiō, hoc est, medullam uocant, quod & esculentum est. Palmarum plantam Cephalonem uocari, Palladius autor est.

Lib. 13. cap. 4.

P A L M V L A E Caryotæ, celebrantur cibo. Sed & succus earum uberrimus est, ex quibus præcipua Orienti uina, capitum iniqua, unde Pomo nomen. Ex his & acetum & mella fiunt, & farina Babylone. Nuclei pro carbone sunt. Et pabulo quoque iumentorum aqua macerati. Laudatissima in Iudæa: nec tota, sed Iericunte maxime. Quanquam & Archelaidæ in precio & Phaselidæ, & Lybiadæ, gentis eiusdem conuallibus. Dos his præcipua, succo pingui lactentibus: quodamque uini gustu, in melle prædulcibus. Tria Caryotidum, siue Caryotarum genera. Nicolai, sicciores, amplitudinis uasæ, ut quæ cubitorum quaternum longitudinem compleant: ab Augusto ita primo nominatæ, in honorem Nicolai peripatetici Philosophi, crebro eas ad se militantis, ut inquit Athenæus. Alterum genus minus speciosæ, sed sapore Caryotarum proximo sorores, unde nomen. Tertium genus nimio liquore madidum, rumpente se pomo in parente ipsa quoque calcato simile, ob id Pateton appellatum. Aristoteles in libro de stirpibus, Eunuchos appellari scribit, quoddam genus Palmulæ, quod alij Enorchos uocent, quasi testiculares ac spadonias.

EX M. VERG. COMM.

E Ad ἀφελὸν πικρὸν μύρον. &c. nullo sensu, si sic legatur apparebit. Neq; em de coctura Palmę hoc loco agitur, sed quod Plinius uertit, Quod relinquitur Phenicobalanus uocatur: ideo q; nos diximus, eadē si usq; ad maturitatem in arbore relicta fuerit, mutato colore & nomine Phenicobalanus dicitur, &c. quasi non ἀφελὸν, sed ἀφελὸν legendum sit, sensus enim est, Aegyptiā palmulam ante totam maturitatem lectā, uiridi colore esse, & appellari πῶμα. Si uero in arbore relicta, penitus maturuerit, tunc mutato colore Phenicobalanum, idest, puniceam palmulam dici, monet res ipsa: quia nullus erat sensus, si ἀφελὸν, idest, decocta fuerit, legeretur.

A

T De Thebaicis Palmis. CAP. CLI.
Hebaicarum decoctum potu, aestuationem sedat. Vires recreat cum hydromelite ueteri sumptum. Cibo idem faciunt. Fit ex eis uinum ad eadem conueniēs. Decoctum potu & gargarisatione magno p̄pere adstringit, & cohibet. Nuclei Palmarum cæterorum more cremati in crudo fictili, et uino restincti, cinere loto, spodij uicem efficiunt. Misceturq; in calliblephara. Quod si non iustam uersionem acciperint, denuo cremandi. Vim adstringendi habent, & spiracula cutis obstruunt. Contra oculorum uuam, & pustulas, palpebrarum defluuia, cum Nardo effectum præbent. Corporis excrescentias reprimunt. Vlcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas utiles ex Palmis humilibus ægyptiæ.

Φόνιξ θεβαϊκή

BARBARI COROLL.

P Almulæ thebaides, in totum arentes sunt, quemadmodum & arabicę, macro corpore, exiles & torridę, crusta obductę uerius q; cute, iudaicis, ut inquit Strabo, suauiores, etiam si duri ores, nec alio tractu Aegypto tota nobiles. In ipsa quidem Aethiopia friatur hæc, tanta est siccitas, & farinę modo spissatur in panem. Gignitur autem in frutice, ramis cubitalibus, folio latiore, pomo rotundo, sed maiore q; mali amplitudine, Cyces uocant. Triennio maturescunt. Semperq; frutici pomum adest, subnascente alio. Hanc palmam Chamezelon uocatam a Dioscoride, quam nos pumilam interpretati sumus. Aliud ab ea genus est, quam Theophrastus Chæriphem appellat, hoc est, abiectam & repentem humi palmam, folio latiore atq; molli, ad uicilia utilissimo, de qua in Taxo dictum est, copiosam in Creta, sed magis in Sicilia. Thebaidis fructus extemplo in cados conditur: ni ita fiat exanimatur, marcescitq; non retroitus fur-nis. Ebenus Aethiopica palmarum generibus fere ascribitur, ut diximus, Sylvestris Palmę fructus existimantur a recentioribus, quos officinæ Tamāringos modo nominant: & qdam a saporis acrimonia, Oxyphœnicas, argenti naturę contra bilem flauam pollentis. Sunt qui folia ei salicis describant similia. Non inuenio e ueteribus, qui de hoc genere quicq; prodiderit.

Pli. li. ij. ca. 4.

B

De Palma Elate. CAP. CLII.

P Alma, quam aliqui Elaten, aut Spatham appellant, fructus Palmarum adhuc florentium, tegumētum est, calyxq; quo in spissamenta unguentarij utuntur. Optima habetur odorata, adstringens, grauis, præclusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria. Sistit ulcera quæ depascunt. Laxatos artus committit. Trita miscetur cataplasmatibus & malagmatibus. Prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista cōferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat. Datur bibendum congrue renum uesicę, & uiscerum uitij. Vuluę ac uentris fluctiones sistit. Scabiem cum resina & cæra sanat, si uiginti diebus recens apponatur. Fructus quem suo amplexu fouet, Elate etiam uocari solet, & ab aliquibus Borassus. Adstringit, & Spathę effectus præ-

Φόνιξ ἐλάτη
σπάθη

D I O S C O R I D I S

C stat, non sic unguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta eadem facit.

Pli. li. 12. ca. 28

B A R B A R I C O R O L L.

PALMA Elate laudatur, Hammoniaca maxime. Tum Aegyptia, demum Syriaca, dumtaxat in locis siccentibus, odorata, pingui lachryma: quæ in unguenta additur. Elatem, Galenus tenellum palmæ germen intelligit. Dioscorides ipsum fructus integumentum. Alibi genus est, ut in unguento Elatino diximus. Non ignorauit hoc Secundus noster, cum inquit, palmam Elatem conferre medicinæ, germina, folia, corticem. Cato Palmam hanc intelligere mihi uisus est, cum dixit, odoratum uinum fieri e Palma: quam habent Unguentarij. Abies ergo duplex est. Unguentaria, & materiaria, uulgo nota: unde abiegnæ traves dicuntur, & Abietarij negociatores, atq; fabri, pro eo qd est lignarij. Abies quia in cœlum abeat, a proceritate uidetur appellata.

E X M. V E R G. C O M M.

Videtur Plinius lib. 23. cap. 6. Elatem, siue Spathem hanc, de qua Dioscorides hoc loco ait, in censu, & historia Palmarum, proprium habere genus credidisse, quæ medicinæ conferret, germina, folia, & corticem: cum tamen ceteri omnes non palmam, sed palmæ partem indicent, & multifariam appellent. Verum de hoc alias.

De Malo punico. C A P. CLIII

Malum punicum omne boni succi est, stomacho utile, nullum sufficiens alimentum. Dulcia stomacho utiliora habentur. Sed aliquantulum in eo calorem gignunt. Inflationes pariunt. Vnde in febri abdicanitur. Acida adstringunt. Aestuantis stomacho auxiliantur. Et multo magis contrahunt, ac urinam cient. Ora, gingiuasq; lædunt. Vinosa uero mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorum acidi punici in sole ficcati, & obsonijs insparsi, concoctiue, fluentem aluum stomachum qd sistunt. Cœlesti aqua madescunt, bibunturq; comode sanguinem excreantibus. Ad defessus dysentericorum, foeminarumq; fluctione uulue laborantium utiles sunt. Expressus nuclei succus coquitur cum melle ad oris, uirilitalis, & sedis ulcera, nomas, reduuias, & ea quæ in corpore exuberant, aurium dolores, & narium uitia, præsertim acidi.

Pli. li. 12. ca. 19.
lib. 17. cap. 17.

B A R B A R I C O R O L L.

Punica, contorto & breui trunco, flore contra qd reliquis arborum puniceo. Excipiunt amygdalarum quoddam genus, quæ subrubicundum florem sustineat. De acidæ planta uel semine, uinolenta dulcisq; in Aegypto exit in Cilicia, circa Solos, ad Pinarum amnem, ubi contra Darium pugnatum est, ut Theophrastus inquit. Omnes sine nucleo proueniunt. Sola hæc, & Vitis, & Ficus, & Malus, caudice fisso non emoritur. Aculeos gerit in ramis, ut Paliurus & Rubi. Punicum malum Chartagine laudatissimum, indeq; cognomen, Malum punicum. Et Romæ locus erat in regione sexta, ut inquit Suetonius, quæ alta quoq; semita dicebatur, ut est apud Martialem poetam, ubi hunc uidelicet Dioclitiani thermæ sunt. Genera summa duo. Alteri nucleus adest lignosus, Sclerococcon ob id uocatum. Alteri non adest, aut certe minimus, quod ex argumento Apyrenon dicitur, penultima producta, licet correpta Martiali. Archestratus certe anguillam, ut spinis & ossibus caret, solam piscium Apyrenon esse cecinit hoc uersu.

Ἰχθυὸς ἡ φῶς ἐκὼν ἀπὸ πρηνὸς μόνος ἰχθύος

Quæ autem sit Paulo æginetæ radix Apyrani, ex qua recenti discussorum cataplasma diapyranu, contra collectiones fingitur, ignoro. Natura sunt candidiore Apyrena, & blandioribus acinis, qui minus amari sint, distinctiq; membranis. Est & alia structura eorum communis, tanq; in fauo nucleos habentium, quinque species, dulcia, acida, mixta, acida, uinosa. Samia & ægyptia. Distinguunt erythrocomis, & leucocomis. Ita nouæ genera colligunt omnium. Dulcia sæpe intelliguntur, cum apytena dicimus. Vinolenta nucleum fere paruum habet. Vnam in his, ænemustum quidem, sed uinum protinus aperuit natura, Apyrenis & uinosis, cortex asperi-

or. Ex acerbo sit medicamentum Stomatice uocatum. Sicut ex Mori quoque succo, Panchristos cognominata. Acinos, granatis totidem esse numero in singulis affirmant, etiam si magnitudo uariet, modo ex eadem arbore legantur. Satam primum in Cypro Malum punicam a Venere, restantur fabule grecorum. Boerij, malum punicam ibidem, ut est apud Callimachum, & Sidem Hippocrates, alia grecia Rhoan & Rhoean, pomum quoque Rhoas & Rhodia & Rhoe dia uocare solent. Inuenio & Rhoadrion uocari a Paulo in quodam cataplasmate, cui nomen Aphroditario est. In quod & rus, & amyllum, & squama æris, & cerussa queritur. Nam Aloida rion ex aloe medicina est. Sidem porro & Boetia terra dicitur: a qua et arbori nomen datum. Quo argumento Athenienses ab Epaminunda in Side regionis questione uicti memorantur. Legitur & Theophrasto Side frutex quidam, ut Athenus interpretatur, punice malo similis, Orchomeno lacu nascens. Theodorus gaza non punice, sed papaueris similitudine describit, quia Rhoas, & punicam, & papaueris genus unum significet. Quanquam discrimen illud, quod pro arbore primæ declinationis nomen est, & rhoea, non rhoas dicitur, pro papauere in tertiam refertur, Rhoas, Rhoadis. Theophrastus certe non Rhoeadis similem, sed Rhoæ dixit. Vt utique sit de Sida, Theodorus ex Theophrasto ita scribit. Sida papaueris, inquit, habet similitudinem, capite ad portionem maiorem, ut quid magnitudinem mali referat, nec nudum id est, sed membranis candidis obducitur, superque eas folia rosæ cum suis continentur caliculis quaternaria herbacea, de hiscens uero grana rubra, exigua, orbiculata ostendit: nec magnopere maiora quam miliu, sapore tritici diluto, crassescit æstate paruo pediculo: flos callicibus rosarum similis, quamque duplo fere grandior: hunc & folium super aquas manere, sed ubi defloruit, inclinari magis in uadum: donec attingat terram, atque ita fructum fundere: folia pecudibus, germina suillo generi, semen hominibus mandis. Cognominem huic haberi & in Nilo scribit idem Theophrastus herbam, sed radicibus carentem. In tumulo Menœcei, Creontis filij, ad Boetias Thebas punica nasci traditur Pausania, cuius poma intus sanguineum colorem præferant.

N O T I O R Q V A M V E R G . C O M M .

corum omnium historia & usus est. Illud tantum animaduertendum, quod uno excepto, in cunctis legitur grecis, τὸ δὲ ὄξυς ὁ πυρὴν πυρᾶν ἢ ἰδία, &c. & a nobis contra communem significationem conuersum est. Acidorum uero acini in sole siccati. πυρῆας enim greci nucleos pomorum, quales in cerasis, prunis, & uuis sunt appellant, κακίους uero acinos: nihilominus tamen πυρῆας acinos, non nucleos uertimus. Primum, quod in probatiss, non πυρῆν erat, sed ὄξυς, quod liquorem significat, quasi ad cohibendam aluum, & in stomachum destillationes, non acinis, nec nucleis hic uti iuberet, sed ex acinis expresso liquore, eoque in sole siccato, quod sensus forte absimilis uero non est.

Certius quod sequitur idem ostendit, ὡς ἔχουσιν δὲ τὸ ἀποδιδύμεν τῶν πυρῶν, quod est utilissimum, & quod ex nucleis expressum fuerit, decoctum & melle mixtum.

Quod enim exprimitur, uuida acinorum caro est, non duri & arentes nuclei: idque Plinius libro. 14. cap. 7. quoque confirmat.

H V I V S F L O R E S C Y T I N I uocantur, qui adstringunt, sic

leant, cohibent. Sanguinolenta glutinant. Quas Puntum præstant utilitates. Humida gingiuarum uitia, mobilesq; dentes decocto coluuntur. Herniam pro lapsu intestini erumpentem cataplasmate repellunt. Memorie tradunt, qui tres æminimos Cytnos deuorauerit, nullam eo anno lippitudinem passurum. Eliquatur hypocistidis exemplo.

B A R B A R I C O R O L L .

CYtinus aliter ab alijs exponitur. Dioscorides & Galenus florem satiuę punice ita uocant, Balauftium syluestris. Plinius pomum ipsum immaturum, & primum partum eius florere incipientis, Cytnum appellat. Flores ipsi Balauftia, in ipso erumpentes Cytno uestibus tingendis: quarum color nomen inde acceperit. Cytnum Dioscorides cognominat ipsum quoque Apollinaris herbe florem. Ceterum non proprie, sed per translationem. At Cicum, M. Varroni dicit membrana prætenuis, in malo punico discrimen. Vnde Cicures animantes, quæ non sunt feræ, atque agresiles. A quo Veturij quoque nobiles cognominati Cicurij, Etenim Sifen

D I O S C O R I D I S

Cna Terabitē, p syluestri arbusto posuit. Partim ingt Terabite, partim Lauro atq; Pinu abūdat.

¶ De Malicorio. CAP. CLV.

Μαλὶ τῆς Πίνου

Malicorium asperum est, mali Punici putamen, quod aliqui Sidi on appellant. Id spissandi uim habet, & quos Cytini, præbet u-
sus. Decoctum radiceis poru laras uentris tineas pellit. Et easdem euocat.

BARBARI COROLL.

Malicorium, græci Sidion appellant, ex acerbis prælatum, ad perficienda coria. Nam &
arbor ipsa, ut prædixi, a Boetis Sida uocabatur.

Βαλαύστιον

¶ De Balauftio. CAP. CLVI.

Balauftium syluestris Punici flos est, Cytino similis. Cuius com-
plura genera reperiuntur, candidum, fuluum, rosaceum. Ligua-
mentum ex eo fit, hypocistidis modo. Cui adstrictoria uis inest, eadem
faciens hypocistis & cytinus.

BARBARI COROLL.

Pli, li, 19, ca. 19.

Balauftium, græce quid esset, dictum est in Cytino. Quidam caducum appellare modo uo-
lunt, a græco detorquentes. Mihi appellatio antiqua perplacet, Nec tantum græca fastidio, ut
latina deteriora probem. Ausonius Baulauftum, siue Balauftum, non Balauftium in carmi-
ne pronunciat. Item Columella. E X M. V E R G. C O M M.

De Balauftiorū nominis causa & origine, nihil pro cōperto nobis est. De uiribus hoc bre-
uissime Aegineta tradit, efficacissima in adstringēdo esse, sicca frigidaq; naturā habere.

¶ De Myrto. CAP. CLVII.

Μυρτίη

D

Myrus satiuā, nigra, utilior est medicinē q̄ cādida. Sed hac mul-
to magis mōtana. Semen tñ imbecillius parit. Vis & Myrti & se-
minis adstringit. Semen uiride aut aridum in cibo datur sanguinē excreā-
tibus, & uesticē erosiōib. Succus uirentibus baccis exp̄ssus, eosdē effectus
exhibet. Stomacho utilis. Urinā cit. Prodest cōtra phalāgij morsum, &
scorpionis icūs in mero. Seminis decoctū capillū tingit. Ius decocti in ui-
no ulcera ī extremitatib. sanat. Oculorū inflammatiōes illitū cū polline po-
lēte, lenit. Cōtra ægilopas illinit. Crapulā arcet p̄sumptū uinū, qd feruefa-
cto semine exprimatur: alias enim acorem contraheret. Præstat uinū semi-
nis effectus. Vtile procidentiae uuluarum in defessionibus, sedis uitij, &
fœminis fluctiōe uulue laborantibus. Purgat furfures, ulcera capitis ma-
nantia, atq; eruptiones papularum. Fluentes capillos continet. Additur
quoq; in medicamento qd liparas uocant, uti oleū qd ex folijs eius factū
est. Decoctū foliorū ad defessiones balnearū cōuenit. Et cōtra laxatos ar-
tus, & male solidescētes. Eo fracta ferruminatiōi repugnātia utilissime fo-
uentur. Vitiliginē emēdat. Purulētis auribus infundit. Et capillos deni-
grat. Succus eadē efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis ulcerib. &
mēbris omnib. fluctiōe laborātib. coeliacisq; p̄sūt. Et admisto omphaci-
no oleo, aut exiguo rosaceo cū uīno ad ulcera serpētia, ignē sacrū, testū in-
flammatiōes, epinyctidas, & cōdylomata. Arētū foliorū farina utilitē inspar-
git paronychij, pterygij, & cōtra alarū feminūq; p̄fusiōes. Cardiacorū
sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cū cgrato, ābustis, paronichij,

pterygijsq; medent. Exprimi folijs succus adfuso uetere uino aut aqua celesti, cuius recētis usus ē. Nā exiccatus planē cariē sētīt, & uires amittit.

Myrus, græce *μύριον* dicitur. Item Myrsinos, & Myrsine. Item Phibaleos, ab Antipha-
ne. Sed & Myrton, ab Archilochio. Degenerat in fruticē, nisi crebro repurge. Vita ei ut
quibusdā animalibus ambigua, hoc est, terra & aqua. Præcipuus odor Myrtis Aegypti; ubi cæ-
tera omnia hebescent. Semen apud Menandrum Synaristulū manditur. Myrtum & Myrta di-
citur a Catone, masculino & foeminino sexu, græcorū (ut arbitror) imitatione. Item Murra
Varroni, unde Murcatū, siue Murcatulū, genus farciminis, q̄ ea largē farciret intestinū crassius.
Vlus bæccæ antiq̄s p̄ libo fuit, ante q̄ piper habere. Gñofum inde obsoniū, cognomine Myr-
tatū. Cōmēdant Myrtis & iura, p̄sertim aprorū. Peregrina Italiæ arbor, atq; etiā Europæ quon-
dam. Pacifera Romę habita, uice cuius uerbenā nūc, laurus & olea prætendi inter armatos ho-
stes quietis indicium fuerit. Purificatōibus quoq; suffimētisq; adhibita. Ob id & in coronis ute-
bant ea thesmothetæ Athenis. Præest Venus arbori, quippe q̄ litoribus maxime pueniat: Ve-
nus autē mari dicē orta. Hinc & arbor sacra coniugio. Græci arborē Mineruæ, ut Oleā dicant;
cōmenti fabulā, q̄ Myrsine Atheniensis puella fuerit, pulchritudine ac roborē insignis, amica
Palladi, quā ituenis, ab ea cursu & palæstra superatus, intēremērit. Catonis fastigia sunt candi-
di, nigri, coniuguli. Alia distinctio est, sariuæ, ac syluestris: & in utraq; latifolia. De syluestri age-
tur in Oxymyrline. Satiuarū gñā topiarij faciunt. Tarentinā, folio minuto: nostratē, patulo:
forensem, hoc est, exoticā, p̄denso, uersibus foliorū senis. Hæc non est in usu. Vtraq; alia ramo-
sa. Coniugulā, quæ & Coniugalis uocat, nostratē dici existimāt. Ouantes myrtea corona usos
quādoq; tradunt, ut triūphantes Lauro. Celebris est Hippolyti & Phædræ amoribus Troeze-
niā, cuius folia, ut ingit Pausanias, prope Veneris delubriū satē pforata nascebatur, iniuriā ui-
delicet ferentia scuiuentis unguibus, & calamistris scemittæ. Myrtæ sunt, ipsæ Myrti bacculæ.
Controuersum fuit apud Græcos, quod nam coronæ genus esset Anacreonti, Naucratis ap-
pellata. Et pluribus uisum est, non aliud esse, q̄ ex Myrto, rosis comitantibus. Alij papyrū co-
ronariā: quam Aegypti Biblon stephanotrida cognomināt, interpretantur Alij e sampsocho
fertum, q̄ in Aegypto copiosissima sit sampsochus.

Quia porro de coronis incidit sermo, inutile nō arbitror quædā huc transferre, q̄ alio a no-
bis opere dicenda seruabatur. Ergo Lesbij, ut ingit Athenæus, Myrti ramulos Hypothymidas
uocat. Iis se coronāt implexis floribus. Alij pectorales coronas: quibus & ceruices quoq; redi-
mibāt, Hypothymidas, Hypothymidasq; dicebāt. Habēt & Hypoglotis, ex Hypoglossos her-
ba, quæ post dice. Item Isthimion, quā pleriq; Isthimiācā appellant. Pyleones uero ferta sunt,
quæ Iunoni circumdabatur, utiq; apud Spartanos. Sicyonij celebrāt Iachachas, ex Iachā flore
quodā odoris cōmendatissimi. E Myrto constāt & Hællorides uocatæ ambitus ingentis, cubi-
torū uicē: ab Europa dictæ, quā Ellotida Corinthij appellāt, q̄ eius ossa in Myrto condita fe-
ratur. Quidā Elotida & Minēruā dictā uolunt. E Palma Psilimi sunt, quas Lacedæmonij Thy-
reaticos uocat, a loco ubi castra hostiū cœpere. E ferta Campanica Melilotini, quanc̄ ex omni
gñe coronamēta muliebria in eo uocabulo Græci fere intelligūt. E Loto Aegyptia sit Antinoi-
os, utiq; non omni, sed ex ea quæ colore rose nascit. Ex ea uero quæ ceruleū eum habet, Lori-
nos tantū dicūt. E rosa cylistos maxie, quas & Eccylistas cognomināt. E Struthio Struthiū. E
Potho, Pothos. Est autē Pothos duplex. Alterū genus Hyacinthi flore. Alterū sine colore can-
didū, quo sepulchra coronabāt, a quo & nomē quasi desideratis esset dicatū. Theodorus desy-
deriū cōuertit. Florēt æstare. Diuturnius est candidū. Habēt & Aegydiōn coronę genus Eubu-
lo, aut ex Anagalide, ut arbitror, quā nōnulli Aegylin uocabāt. Aut e Lygō, nā Lygos Aegy-
lis a quibusdā uocat. E Lygo aut coronas fieri solitas antiq̄s, in Vitice docuimus. Aut gramī-
ne, quippe q̄d ab aliquibus Aegriōn uocēt. Nam Fauni arundine ferulaq; uinciebatur. A tilia
Phyllirinos, Synthemáticos, Aristophanes cū dixit, coronas uidet promptuarias & parabiles
intellexisse, nō multū a triualibus & promiscuis diuersas, quæ a Græcis Chydeæ, quasi confu-
sanæ uocatur. Choronos, Appion grāmaticus, apud Philetam, a choro dictos putauit. Vnde
apud nos coronæ sint uocat. Sūt & Acini, corollæ genus ex Acide, ita dicūt flos & satū quod
dam, ut Athenæus & Plinius scribunt. Sunt & Elicti ex Helice, familiæres Alexandriæ, nec
non alijs quoque floribus plicatiles. Nam Tindiai, Abydai, ab oppidis Aegypti, ex spinā
sunt Aegyptia, nemore ibi sacro Apollini semper florente, multis comitate fabulis, quas re-
ferre, ut non piget, ita certe parū interest. De ijs & in Aegyp̄tia spina diximus, ex Demetrii sen-
tentia, Coronamēti nomen uidet, & cuius mentionē fecit Cratinus, Cosmofandallos uocatū.

A

B A R B:
Plin. 15, ca. 29.
lib. 23, cap. 9.

Coronarum
genera.

B

Ceius inuentores Lacedæmonios fuisse Clearchus auctor est. Ariadnes coronā e flore Theſe-
dicto perhibent fuisse. Id satū radice describit amara, ut Theophrasto placet, de quo Timachi-
das poeta græcus cecinit. Inuenias & Apragmosyn uocatū, coronariū quoddā satum, apud
Aristophanem poetā, ut grāmaticus Aristophanes interpretat, Athenis in academia nasci so-
litū. Anethinis quoq; fertis usos ueteres, & Alcæus, & Sappho testes sunt. Coronas in Græcia
facilitas, a Stephano primo dicunt, ob id & nomen fertis datū, ut Stephani uocarentur. Au-
ctorem & inuentorem coronæ lanum biforem fuisse græci affirmant. Hybernas corollas no-
stri Córneas uocabant, q̃ e cornu fierent, in florū defectu. Sicut ex omni florum genere, Pan-
carpias. Dictum est & in Vitice de coronis alijs. Itemq; in Elichryso.

MYRTUS differt a Rusco, quod mitior & quod Græci dicunt *ῥύσκος*. Ruscus uero cuspidat-
is folijs, uulneras magis quā pungens, asperior & indomita est. Qualis aut sit Ruscus, cum de
Nigram Myrtū ueteres dixerunt, quæ can- (Oxymyrſine nobis ager certius patebit.
didæ comparata nigresceret, & candidam quæ nigræ comparata albesceret. Præfertur in omni
bus in medicina nigra, teste Columella lib. 11. cap. 38.

De Myrtidano.

CAP. CLVIII.

MYRTIDANUM dicitur incrementum inæquabile, uerrucosum &
concolor. Quod perinde quasi manus Myrti caudicem ample-
ctitur. Magis q̃ Myrtus adstringit. Tusum addito austero uino repo-
nitur, coactumq; in pastillos siccatur in umbra, multo efficacius, & folio
& semine, carato, pessis, inſessionibus, cataplasmatīs admistum, ubi
adstringendum aliquid est.

B. A. R. B. A. R. I. C. O. R. O. L. L.

Pli. li. 23. ca. 9.

MYRTIDANUM, a Galeno Myrtada nominatur, uirgultum & soboles Myrti: qualis fortasse
in Ficu quoq; fructicat, exiens ab radice. Myrtidanum certe Plinius pro uino accipit, quod ex
sylvæstris Myrti baccis sit conditum, libra in tribus musti congijs deferuefacta, donec duo su-
perſint. Hippocrates Martidanum uidetur appellasse hunc fruticem. Myrtidanū uero ipsum
piper, ut post dicemus.

De Cerasijs.

CAP. CLIX.

CERASIA uentri utilia sunt, si uiridia sumantur. Eadem siccata aluum
sistunt. Gummi quod Cerasi refudarūt, cum uino diluto tussi ue-
rustæ medetur, Colorem commendat. Visum exacuit. Appetentiam in-
uitat. Idem ex uino potum calculosis auxilio est.

B. A. R. B. A. R. I. C. O. R. O. L. L.

Pli. li. 16. ca. 25.
li. 23. ca. 7. lib.
16. ca. 18. Theo-
phr. li. 3. ca. 17.

CERASUS, in quatuor & uiginti sæpe cubita erigit, crassa, dodrantibus quatuor ab radice. Fo-
liū Mespili durū, & latius corticis leuore, colore, crassitudine. Similis Tiliæ, ob id apta cistis, ut
Tilia. Hæc meatu flexo, nec girū complente, abducit arbori ab infernis sursum uersus in angu-
stias colligendo sese, qualis in fronde ipsa quoq; descriptio est. In eundem modū, & desquama-
tio euadit, alioquin præscindit potius q̃ filo eodē auferri possit. Per crassitudinē secto tenuitas
folij detrahit, nec arbor emoritur, q̃ si totū deglubas, qui reliquus sit, tunc humor elabit. Tunica
porro exteriore adempta, nigricat. Interior pituita quadā muccosa, & uice illius secundo anno
tenuior, altera subnascit. Nerui ligno contorti cōuolutiq; in anfractus, ut cortex uirgis conti-
nuo q̃ nascuntur idem mos: rami dum adoleſcunt, alij subinde pereunt, ut qui ab imo sunt, alij
cōtinue crescūt, ut supni. Prorsus arbor de rāolis nō est, minus etiā aliquāto q̃ Populus. Radix
multijuga, & summa telluris cute nec crassa. Contortio eadē radicis & corticis, radice tegētis, flo-
re albo, piri uel mespili, e racemis fauaceo. Fructus ruber diospyri figura, magnitudine fabæ.
Q̃z q̃ acinus diospyro pdurus, ceraso mollis, ut Theophrastus inq̃t: apud quē diospyros, hoc
significat, qd lithosponon Dioscoridi & Plinio, ut arbitror. Nec Theodorū satis p̃bo: q̃ diospy-
ron, Iouis flāmam interpretatus est: cū Iouis triticū interpretari debuisset: quādo & uulgaris quoq;
sermo granū solis appellare consueuit. Nascitur Cerasus ubi amnes & tigna, oīnoq; ubi Tilia.
Italiæ Cerasum Lucullus intulit. Nunc tras Oceanū, & in Britanniam quoq; uecta. In Aegypto

nulla cura eualuit, ut prouenire posset. Genera nominantur Aproniana, quæ maxime rubeant. Actia nigerrima, rotunda Ceciliania. Iunianis gratus sapor tantum, sub arbore adeo teneris, ut gestatu marcescant. Principatus Duracinis, quæ Campania Pliniana appellat. In Belgica Lusitanis. In ripis etiam Rheni. Tertius ipsos colos e nigro ac rubenti, uiridique, similisque maturefcentibus semper. Sunt & laurea Cerasa in Lauro primum insita, non ingrata amaritudinis. Hinc Amarasia dicitur uulgo, quasi amara Cerasia. Et enim pomum ipsum non cerasum, sed Cerasium uocari, Seruius precipit: cuius & illa quoque uerba sunt. Cerasium inquit, & antequam e Ceraso urbe Lucillus adueheret, erat in Italia, sed durum, & cornu appellabatur: quod postea mixto nomine Cornocerasium est uocatum. Sint autem Cornocerasia idem cum Duracinis genus, an uero Seruius credendum, qui Cornum in Italia Cerasium fuisse prodari, cum alia res sit Cornus, alia Cerasus omnino, satis ambigimus. Cerasiorum porro discrimen alterum, quod Romæ Visulum appellant, frequentissimum in Germania, & Gallia. Sed in Scythia fere supra modum, ubi & Viscina Barbari cognominant, ut Pomponius Lætus, qui ea loca modo inuisit, constanter affirmat. Sunt Macedonica, parua arboris, raroque tria cubita excedentis, Chamæcerasi uocata. Pomum hoc, primæ colono fere gratiam uertentis anni refert. Primo candidum, mox rubescit, deinde nigret septentrione frigidisque gaudens, siccatur sole, conditurque ut Oliua cadis. Medium Cerasis genus, inter acinos atque baccas, sine osse. Quemadmodum nascantur, Græci & Latini monstrauere. Fatigatur caniculis æstu Cerasus. Defendit hoc incommodum, ut inquit Palladius, herba Symphoniacæ, trunco arboris eius circumdata: nec qualis herba ea sit, ostendit. Quemadmodum neque Græci Polypremnon appellatam, cuius succo ægrotas arbores oblinere præcipiunt. Nisi quis Apuleio credat, Symphoniacæ tradenti, eadem esse cum Hyoscyamo. Plinius Symphoniacæ herbam describit alternis uiridibus, roseisque per caulem folijs, in posca sanguine reicientibus mæderi. Hanc aliqui Cremphenæ scribunt, aliqui Symphonæ, alij Comphenæ, aut Somphenam. Quod si pro Hyoscyamo sumi posset: non folijs alternis uiridibus, roseisque, sed floribus legendum erit. Quandoquidē Dioscorides ita dicat, παρά δὲ τὸν καὶ τὸν ἰσχυρὸν περὶ κακίαν ἀνθρώπων ποίαν. Accedit, quod ad eruptiones sanguinis Hyoscyamus quoque laudatur.

EX M. VERG. COMM.

Aliter de Cerasijs docet lib. 6. Paulus Aegineta. Sapor enim tribuit, quod hic ex siccitate, contrarioque habitu eorum decernit. Siquidem monet, quod dulcia sunt, citissime dilabi, austera stomacho utiliora esse, Acida uero, ob incidendi uim, habent pituitosis, & excrementosis stomacho. Seruiabitur a nobis id posthac multa fide, ut ubi ὑπόλευον sit, bonam (chis prodesse. alium semper, ubi λεῖον, solutam, ubi μαλάειν, mollem, ubi ἐπαγειν, deiectam, aut soluere, mollireue aut deicere dicamus.

De Siliquis.

CAP. CLX.

Siliquæ recentes stomacho aduersantur. Aluum soluunt. Eadem sic scatae sistunt, stomachoque utiliores fiunt. Urinam ciunt, sed precipue quæ uinaceis condiuntur.

BARBARI COROLL.

Siliqua arborem Ficū Aegyptiā uocari, & in Ionia Ceroniā, Theophrastus auctor est, quæ & Ceratia dicat. Galenus arborem Ceratoniā, fructum Cratiā nominari scribit, a corniculi similitudine. Lucius Columella, Siliquā græcā, credo, ut a foeno græco distingueret, quod absolute siliquā rustici cognominant. Recentiores Græci Xylocerata. Sed alia est Ficus Aegyptia omnino, ut Plinius notauit, & nos paulopost monstrabimus. Quandoquidē in Aegypto nulla nascitur. Sed in Syria, Ioniaque, & circa Gnidum, atque Rhodum, folijs semper comatibus, flore candido, cum uehementia odoris: pomo siliquæ, & ob id nomen: radice sublimi, sed non multum, plantigeram, imis partibus, superficie flauescens inarescensque, succum auferente sobole. Pomo antecedentis anni detracto, post canis ortum, statim concipit, uterumque præfert, & mollem quandam uuae modo in formam indiscretamque primo edit: quæ postquam adoleuit, per æstuum & æquinoctium florem emittit. Hyeme foetus enutrientem, qui usque ad canis ortum in parente durat, ut prædiximus. Tum metitur. Non puto quenquam nescire, Siliquas prædulces esse, earumque manducae corticem, digitorum hominis longitudine, interim falcata pollicari latitudine. Seritur & hæc apud nos semine, sed parum felicitur. Quandoquidē nec fructum fert, & breui emoriunt. Galenus usum eius cibo dānauit, ut mali succi, & lignosi, nec facile conficiendi. Posteritas commendat ad stomachum fulciendum, utique post cenam, & ad uentris profluuium, si quis præsumpserit. Subter hanc arborem flammæ

κεράτια

Plin. 15. capit.
29. 28. li. 17. ca.
8. lib. 23. ca. 5.

D I O S C O R I D I S

Gellius lib. 9.
cap. 15.

C

nis Dialis capillū, & ungues p̄fectos terra operiri mos & religio erat, ut est apud Geliū. Quāq̃ non Siliqua, sed silica mendose in eo legit̃. Nisi quis non siliquā, aut silicem, aut salicem putet legendum. Ego ut ingenuæ ueritatis homo, quid sequendū in eo potissimū sit, non diffitebor ne scire. In mediū, ut plerāq̃ alia relinquo. Est & nomen herbæ Plinio Ceratia, uno folio, radice nodosa & magna, coeliacis & dysentericis in cibo danti. Idem auctor coniūgit huic Peraticā: septem ei caules reddendo, qui uelut rosæ capita sustineant. Quāq̃ in codicibus quibusdam non Peratica, sed Statica scriptum legas, quoniā sistat aluum.

E X M. V E R G. C O M M.

Adem Græcis & Latinis in hac arbore fructuq̃ eius ratio nominis est. Illi *κέραιον*, quæ uoce in frugibus & leguminibus aliquot longiores Siliquas dicunt, facto a cornu nomine appellauerunt. Latini cōmuni, & alijs Siliquis appellatione indicauerunt, & ut ab alijs distinguere-
tur, aliquid quod rem ad proprium genus contraheret, adiecerunt, nunc dulcem, nunc græcā Siliquā appellantes. Nota satis arbor, notus & fructus, felici descriptione a Plinio lib. 15. indicatus. Quorū arborem, paulo a Ceratijs deflexa uoce, Paulus ægineta Ceratoniā uocat. Græci aliquot itidem facto ex lignosa soliditate cornuq̃ longitudine, & flexura nomine, Xylocerata appellauerunt. Damnavit in cibo Siliquæ huius usum Galenus.

Carere quoq̃ intellectu nobis uidetur quod dicit, *μάλισι δὲ τὰ ἐκ τῶν σιμφύλων συντιθέμενα*. quæ sic uerbum de uerbo uertat aliquis. Maximeq̃ ea quæ ex uinaceis componuntur. Nulla cum superioribus serie & rei sensu. Quid enim Siliquis his cum uinaceis? Corruptus nobis o-
mino locus uidetur. Suspiciamurq̃, ex quo *σιμφύλων* duplici λ legitur, contra q̃ id in uinaceis scribatur id nomen, potuisse aliquid de folijs arboris eo loco decerni. Quod uetustissimus, qui apud nos est, Longabardus, literis scriptus latinis Dioscorides indicat, in quo legitur, maxime quæ ex folijs componuntur. Aut si uinaceorū illic futurū nomen est, de conditura aliqua Siliquarū, quæ uuarū modo in uinaceis seruarentur. Sed obstat huic sententiæ præpositio *ἐκ*. Non enim ex uinaceis, sed in uinaceis seruantur, quemadmodū priori illi *σιμφύλων* uox.

Potuit forte etiā Dioscorides, corticem huius *σιμφύλων* dicere, quemadmodū in uuis Græci appellant, docereq̃ urinam præcipue ciere, quæ ex Siliquarū huiuscemodi corticibus confecta essent, confectiois genus aliquod indicans ea ætate notum, sed nobis incognitum.

D

De Malo.

C A P. CLXI.

μᾶλις

Folia, flores, & germina cum omnis Mali, tum maxime Cotonæ adstringunt. Pomis acerbis adstringendi uis inest. Maturis uero longè secus. Ex ijs uerna bilem gignunt. Neros lædunt. Inflationes pariunt.

Pli. li. 15. ca. 14.
li. 12. ca. 3. lib.
26. cap. 27.

B A R B A R I C O R O L L.

Malus corticis lēuore niter. Peculiāres habet nodos, belluata facie, ut Theophrastus scribit, sed prægrandi uno, alijs circa eum pusillis compluribus. Fructificat primis frigidioribus. Vrena intelliguntur mala, quæ adulto uere maturescunt. Inter Mala tuberos correpta priore syl-
laba dicuntur, baccis similiores q̃ Malis. Post Armeniaca, & omnino inter primas florent arbores. Inferi solent Cydonio, piro, pruno, & calabrici, & malis omnibus, ut inquit Palladius, quamq̃ Plinius syluestrem spinam, calabricem uocari dixit. Genera duo Tuberum, candidum, & a colore, Sericum uocatur. Papinius Tuberos, & Zizipha, hæc ex Africa, illa e Syria nouissimis Augusti temporibus inuexit, in castris fata, & aggeribus præcipue decora. Græci quemadmodū ipsas Tuberos appellant, haud possum coniungere. Nisi quis Syrica, siue, ut in quibusdā exemplaribus habetur, Serica eas uocare putet, parui succi poma, nec concoctioni, nec stomacho facilia, ut inquit Paulus, Oribasius, Aetius. Præferuntur e Ziziphis Aedestina uocata, ut quidam putauere, q̃ grandissima, calore, ac humore tēperata, medicis monstrantibus. Columella duplex Ziziphi genus habet, rutilū, & candidū. Inuenio apud Græcos, qui Dinzipha pro Ziziphis appellitent. Pene uero Tubera peregrina sunt in uno Italiæ agro Vronensi nascentia, quæ peculiari noīe lanata Plinius apparit dicit, obducta lanugine, ut Struthicis & Persicis fere plurimis, nulla tamen alia cōmendatione insignia, ab inuentoribus nuncupantur. Matiana ex uico Aquileiensi sub ipsas Alpes, quibus similitudine respondeant Gangeris Paphlagonæ urbe nascentia, nunc Hispaniæ uernaculo uocabulo Matiana in commune sunt mala oīa. Sunt & a Manlio Manliana, Claudianis color rubens. Appianis odor & magnitu-

do cotoneorū, inſito cotoneo. Sceptiana rotunditate inſignia. Cato addijcit Quiriana, & Con-
 ditua, quæ dolijſ condantur. Et Scantiana, Scandianaq;. In nomine ſunt & Geſtiana, ſiue Se-
 xriana, ſiue, ut Græci ſcribunt, Caſtiana: quoniam & Ceſtomela uocantur ab Aetio. Quan-
 q; ridicule a ceſto, id eſt, loro dicta quidam interpretes exiſtimant, cui ſimilia ſunt cortice.
 Hæc ipſa & Pezomela uulgo dicunt, & auſtera prædicant. Auſtera eſt dulci ſunt Aphratomela:
 odorata hæc, & pulſam habent aſperam, & ſqualentem, ut cidonia. Sunt & parua quædā, ſa-
 poris gratiſſimi Petiſia. Habetur & Peluſiana, & Proſiua, & Veriana, ſiue Tiburneriana & Si-
 rutia. Sunt & Phaulia, & quæ Delphica Græci uocant, & Platania, & Mordiana orbiculatiſ ſi-
 milia, ex Apolloniæ agro, qui Mordius cognominabat, & Camerina, ſiue ut Columella uo-
 luit, Amerina, & Græcula. Itē Gemella, nuncq; in ſortu ſingula. Sicut Belgemela, ſiue Melgeme-
 la, q; folium unū aliquādo geminū erumpit latere medio. A colore Serica, ut neſciā Tuberum
 hæc generis, an diuerſi putē. A gentilitate Melappia, a celeritate miteſcendi Muſtea; de quibus
 in Melimeliſ loco ſuo dicitur. A māmarum effigie Orthomaſtica. A conditione caſtrati ſemi-
 nis, Spadonia. A corrugationis celeritate Pānucea. Ab importuno & ſtolido timore, Pulmo-
 nea. Sunt quibus color ſanguineus, origine ex mori inſitu tracta. Sunt & parua grati ſaporis,
 atq; etiā a cutiora, odore ſylueſtria peculiari, acerbitatē, improbitatiſq; cōiutio, de quibus proxi-
 me diſſeremus. Itē Dacca, ſerme uiliſſima, Quanq; aduētū prima; decerpitq; properantia, Græci
 Corinthiaca, e Sidunte uico celebrāt. Nominātur & Laconica, & Herina, a uere dicta, ſicut a la-
 nugine Chnodia, Lanatiſ ſupra dictiſ forte nō plane diſſimilia. Seruant poma tabulatiſ, lo-
 co frigido, ſeptentrionalibus fenestris, quæ ſereno die lucē accipiāt patētes. Auſtri ſpecularibus
 arcendi, Aquiloniſ aſtatu marceſcunt in rugas. Colligunt poſt æquinoctiū autumnī, nec ante
 ſextamdecimā lunam, neq; ante primā lunam. Gadiua ſeparanda. Minimū Melimela durant;
 Plurimū Camerina: quæ ut Scantiana quoq; ſerotina ſunt, & gelu matureſcunt, ad hyemē uſq;
 pendētia in parente. Vini Malo, pprietatē æque ut Piro. Malū a Græciſ Melon, arbor Melea di-
 citur. At Pomi nōmen generaliuſ eſt, ut cōplectat quicqd apud Græcos Opora continēt, in
 quo ſignificatu eſt, cum dicitur a medicis, omne Pomū refrigerandi & humificandi uim habe-
 re, parū alere, mali ſucci eſſe, autumnō plus officere. Inde Oporotheca, ubi cuſtodiunt. Pomū
 Varro diſtū autumnat, quia potu ſiccitatibus indigeat. Diſſert tamen Opora ab iſ, quæ Acro-
 drya Græci uocāt. Q; Opora eſt, quicquid nihil habet exteriuſ lignoſum, Acrodrya uero con-
 tra, ut malū puniticū, piſtacia, caſtanea, nuceſ, ſimiliaq;. Vtrūq; genus Salgami nomine cōple-
 ctunt Latini: a quo Salgamanuſ. Dubitatū eſt, & in iure apud Ceſeliū, an nux pinea pomū eſ-
 ſet, quia Nuceſ eſſent quicqd foriſ duro regitur, Malū quicquid id quod eluſ eſt foriſ habet,
 Pomo utrūq; contineretur: quod ſere probamus. Seruio Nuceſ ſunt omnia corio duriore te-
 cta, molliore uero Poma. Feruntur & alia Mali genera, ſuiſ mentionibuſ prodenda. Galenuſ
 omnia inquit Mala breui fugiunt, atq; aceſcunt, utpote frigida, & excrementitiſ ſucco redun-
 dantia: ideoq; niſi melle condita ſeruando, ſeruari non poſſunt. Exciipiuntur Cotonea inquit,
 & Struthæa. Malorum enim appellatiōe ueniunt & Coronea, & Granata, & Perſica, & Piri
 genus, unum Librale nuncupatū, ab amp;itudine ac pondere.

De Cotoneo malo. CAP. CLXII.

Cotonea ſtomacho utilia. Vrinam cient. Verum toſta accommo-
 datiora habetur. Proſunt cœliaciſ, dyſentericiſ, purulenta extuſ-
 ſientibuſ, cholericiſ, præſertim cruda. Maceratorum liquor, comode in
 ſtomachi, aut uentriſ fluctionibuſ potui datur. Succuſ crudoruſ aſſum-
 ptuſ orthopnoiciſ ſalutaris eſt. Decocto fouentur uulua, & ſedes ſi pro-
 cidant. Cotonea quæ melle condiuntur, urinam mouent. Mel autem ſi-
 bi conſtringentem illam uim, & inſpiſſantem adſciſcit. Quæ cum melle
 coquuntur, ſtomacho atq; ori gratiora ſunt, ſed minus inſpiſſant. Cru-
 da cataplaſmatiſ adiſciuntur, ad cōhibendam aluum, aut ſi ſtomachuſ
 æſtuet, aut in uomitioneſ effundatur, ad mammarum inflammationeſ,
 præduroſ lieneſ, & condylomata. Fit uinum ex iſliſ tuſiſ, expreſſiſq;.
 Sed quo perduret, quindecim ſextarijſ ſucci unus mellis adiungitur:

D I O S C O R I D I S

E alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia quæ dicta sunt. Fit & oleum ex ijs, quod Melinum uocauimus, quo utimur quoties adstringenti oleo est opus. Eligi oportet uera, rotunda, parua, & odorata. Quæ uero Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Flos & uiridis & siccus cataplasmatibus imponitur, ijs conueniens quæ adstrictionem desiderant. Inflammationibus oculorum, reiectionibusque sanguinis, contra citam aluum, & mensium impetus, in uino bibitur.

Pli. li. 15. ca. 11.
17. li. 23. cap. 6.

C O T O N E I S, ut primus Cato nominauit, amplitudo Pinearum nutum. Interim maioribus incuruatos trahunt ramos, prohibentque parentem crescere. Cydonea Græci appellant, quoniam ex Creta primum illata fuerint. Genera eorum, Chrysomela, hoc est, aurea mala, incisuris distincta, colore ad aurum inclinato. Nostratia candidiora, odoris præstantissimi. Neapolitana ex eodem genere minora, odore uibrantia, prouentu serotino, quæ Struthea nuncupentur, sicut quæ celeriter mitescunt & præcocia sunt Mustea. Aetius Struthea inquit dicuntur, quæ magna sunt, & suauiora, minusque acerba. Cotoneo Strutheis insito, muluiana cognominantur: quæ sola ex ijs, uel cruda uescendo sunt. Habentur & syluestria parua, e Strutheis odoratissima, in sepibus nata: Omniaque iam & uirorum salutarioris cubilibus inclusa, simulachrisque noctium consocijs impolita, ut Plinius queritur, insigni taxatione sæculi muliebriter mollis. Cotoneum, & Codymalon, siue Cydyomalon uocari quidam scripserunt: uerum Polemon, floris genus esse id existimat. Cotonei genus præter hæc inuenio, Phaulion uocatum. Quod nomine, Mali quoque genus unum dici meminimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Q uod in græcis dicitur, *καρυδιόσ*, quæ uox purulentas excreationes significat, in antiquioribus & melioribus græcis, non *καρυδιόσ*, uerum *καρυδιόσ*, id est, sanguinem expuentibus legitur, diuerso mali genere, & quod in his qui ad tabem feruntur purulentas excreationes antecedit, si Hippocrati credimus. Ideoque nos maluimus dicere, sanguinem expuentibus, auctore, & confirmante id Plinio lib. 23. capi. 7. de Cotoneis malis, cuius uerba sunt, Maturatione inquit, profunt sanguinem excreantibus, &c.

Non uideo, cur relicta hic uoce græca Barbarus uerterit, aletima, quasi ex hoc nomine priuatim aliquod genus indicaret. Nullibi enim inuentum id a nobis est, nec ipse inuenisse se testatur. Nos uera reddidimus. Nec aliud inter Coronea uera, & Struthia discrimen hic esse ostendit, quam ex forma, magnitudine, & odore.

M E L I M E L A uentrē molliunt, & animalia expellunt. Stomacho negocium exhibent. Aestuosa. Ea a multis, dulcia mala uocantur.

μελίμηλα

M E L I M E L A dicuntur a sapore melleo. Eadem & a celeritate mitescendi, Mustea, ut inquit Varro, uocabantur. Minimu durant hæc, ut inter Mala diximus. Mustea sane ueteres appellabant id quod nos præcocia. Vnde Cotonea quoque certo genere Mustea dici solita reddidimus. Item Pira, quod recens est, Mustum, & Musteum dici solet. Athenis Melimella nominabatur, malò in syluestrem Pirum, Cydoniumue insito, ut scribit Diophanes.

E X M. V E R G. C O M M.

καρυδιόσ inuidetur non carere mendo, tamen & nos quoque reddiderimus, uentris animalia pellit. Dulcia enim hæc mala sunt, mellisque sapore, a quo nomen inuenerunt, non uidentur posse uentris animalia facile pelleret; nisi forte deiectam hoc cibo aluum, ea etiam sequitur, & quæ alioquin hæssissent, impetu excrementorum, quasi in torrente pisces, qui largiore per æstatē imbre abundauerit rapiuntur, aut propria naturæ suæ potestate, qualia multa passim uident, id ea mala possint. Habere quidem parū certam, non tamē absurdā id rationem.

επιρρωτικά

E P I R O T I C A mala, quæ latine Orbiculata dicuntur, stomacho utilia. Si estunt alui. Urinas euocant. Malis tamen Coroneis inualidiora.

Epirotica, ex

BARBARI COROLL.

Epirotica, ex Epiro inuenta primum. Argumento est cognomen. Orbiculata nostri appellant, ex figura orbis in torunditatem circumacti.

EX M. VERG. COMM.

Facile nobis indicatur, posse hæc mala esse quæ rura nostra a colore rosea appellant, Mala rotunda & orbiculata, quæ toto anno seruari possunt.

De Syluestribus Malis. CAP. CLXV.

Syluestria mala similia sunt uernis, & adstringunt, Sane in hunc *αγριομηλα*
sum immatura opus sunt.

BARBARI COROLL.

Syluestria, odore acutiora, sed improba & acerba: ob id & conuitio dicata. Iis tanta uis, ut aciem gladium perstringant. Aliud genus sunt, quæ Poma syluestria dicuntur, a rei rusticæ scriptoribus, ut albæ spinæ, græcæ siliquæ, iuniperus, lotos, pampinus, cornus, arbutus, prunus, & paliurus, atq; sacchades piri. Quid porro sit in Columella (sunt enim hæc Columellæ uerba) Pāpinus, & an corrupta sit lectio, pro eo quod est Carpinus, aut Pinus, relinquo discutendum peritis.

EX M. VERG. COMM.

Syluestria sunt, quæ Theophrastus in Bucolicis suis *οπισμαδια*, id est, montana appellat. In quibus illud animaduertendum, nō de his tantum præcipere Dioscoridæ, ad adstringendum imaturis opus esse, quod ex Plinio Barbarus uertit, sed in uniuersum omnibus acerbis in adstringendo uti oportere.

Verba eius hæc sunt, *Αἰ δὲ πρὸς τὰ ρύσιον χρῆσθαι ἀπορριπτοῦ ἀπὸ τοῦ χρύσου*. Id est, Oportet autem ad ea quæ ad adstringenda sunt, intempestiuus, id est, immaturis omnibus uti. Omnibus id tribuitur, non priuatim syluestribus.

De Persicis Malis. CAP. CLXVI.

Persica poma matura, tam stomacho, quæ uentri utilia sunt. *περσικὰ*
Acerba aluum cohibent, sed sicca uehementius, Decoctum e sic-
cis, alui stomachiq; fluctiones sistit.

BARBARI COROLL.

Persica, ex Perside aduecta, ut ipso nomine apparet, Theophrasti temporibus in Aegypto tantum, & uicinis locis ferebat. In Rhodo ad florem usq; perueniens: quod primum ab Aegypto uenienti hospitium fuit. Inde Rhodacina fortasse uernaculo græcorum sermone dicta. Nisi quis inuersum nomen putet, quasi Doracina. sic enim Persica ipsa nominantur a græcis recentioribus, Paulo, & Aetio, quasi Duracina: de quibus post agetur. Notant autores, nusquam minus odoris pomo, plus succi, qui tamen sitim stimulet. Falsum est, uenenata cum cruciatu in Persis ea nasci, & poenarum causa a Regibus translata in Aegyptum, ubi coelo proprietatem mutauerint. Idem de Persea diligentiores tradunt. quam nos in suum locum differimus. Persicorum palma Duracinis. Nationum habent nomen Gallica, & Asiatica. Post Autumnum maturescunt, sicut æstate Præcocia: quæ Plinius intra 70. annos inuenta prodente se testatur, & primo denarijs singula uenundata. Supernaria e Sabinis sunt. Popularia ubiq;. Pomum innocuum uel ægris. Preciū singulis triceniquondā fuere nūmi, nullius maiore quod miremur: quia non aliud fugacius, longissima namq; decerpro bidui mora est, cogitq; se uenundari. Persica in prouentum alium Autumno condiuntur, ut uix cadis. Molluscum nucem sunt qui Persicum interpretati falso fuerint, ut in suglande cōmonebimus. Persica sine suis ossibus, & inscripta quem admodum nascantur, docebit Palladius. Idem tria genera enumerat, Armenia, Duracina, Persica. Sinthæc Armenia, quæ Prunorum generis esse quidam uolunt, an diuersa, studiosi salgamorum diiudicent: mihi eadem uideri placet.

EX M. VERG. COMM.

Notum Persicorum genus omne & forma, nondū tamen in antiquioribus satis patet, an huius pomi arbor ea sit, quā paulo post hic, pluresq; alij Persea dicūt, in Aethiopia letalē, in Aegypto aut salubrē, de qua in Horulo notissimos uersus cecinit Columella, an quæ malus Persica ubiq; nunc nascitur. Sed eandem esse Persicā malū, & Persea, ex Nicandri cōmentatore probabimus. Eius uerba sunt eo loco quo de Phalangijs ait. Sciendum est, Socratē in Cōmentario de

D I O S C O R I D I S

C reptilibus & serpentibus, testari Perseam, quam Rhodacineam dicunt. Hac uoce autem græci Persica nunc etiam appellant. Ex Aegypto in Aethiopiā translata fuisse testat, et Rhodus Democritus in cōmentario de his quæ ἀντιπαθὴ, & συμπαθὴ dicuntur, Persas ait lætalem arborem habentes, in Aegyptum misisse, credentes perituros ab ea multos. Sed utilem contrario euentu illis profuisse, protulisseque suauissima poma, qualia nunc uidentur. Et hæc interpres eo loco.

Ex quibus manifeste patet, quam alij πικρίαν arborem dicunt poetice, a Nicandro, interpretæ eius πικρίαν uocari. Quod a Barbaro relictum, addere placuit. In hanc enim partem inclinat animus. Etsi Plinius id negauerit, & aliorum multorum autoritas obstat.

De Præcocibus.

CAP. CLXVII.

significand

A Armeniaca, quæ a latinis Præcocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho utiliora.

BARBARI COROLL.

Armeniaca, siue Armenia, Prunorum generis sunt, peregrina & ipsa, ut ex nomine cognoscitur. Sola e Prunis odore cōmendantur. Armeniaca uocari desita, & Præcocia, siue præcocia, sed Berioccia fere pronunciant.

perdund

De Medico Malo, seu Citreo. CAP. CLXVIII.

Medica mala, aut Cedromela, quæ latini Citrea uocant, nemini nō cognita. Arbor ipsa omnibus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascentibus. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum. Semen habet Pyri. Id in uino potum uenenis resistit. Aluum mouet. Oris suauitatem commendat, decocto eius colluto, aut succo. Estur in malacia mulieribus. Vestitijs impositum, ab erosionis uitio uestes uindicare existimatur.

D
niray

BARBARI COROLL.

Pli. li. ii. ca. 7.
Theoph. li. 4.
Athen. 3. di-
pnochophistæ.

Malus medica, flores duobus modis procreat. Alios qui uelut erectam in medio colū habent, fecundiores existimati. Alios qui careant ea, infecundos. Sunt qui & Assyria, & Persicam malum uocent. Item Citrum, Citream, Græci & Hesperida, & malum eius Hespericum, autore Iuba, qui ab Hercule translatum id in Græciam, & aureum malū uocatum scripsit. ut Virgilius de his intellexisse uideatur, cum dixit, Aurea mala decē. Nuptiale pomū intelligi hoc uolunt, qui ædium a tellure fabulantur, nunciato Iouis & Iunonis cōnubio. Foliū ei Adrachnes, Vnedonilque, spinis intercurrentibus, ut in pyro & oxyacātha, sed Iguibus infestis mucrone, ualidis. Nō mandebat pomum Theophrasti ætate, sed ne Plinij quoque (ut arbitror) magnopere, tū odore cōmendato. Plutarchi certe aurorum memoria, gustabat nemo, ut Athenæus inquit. Nunc a Palladij fere temporibus promiscuum, expetimus cœnis. qui & medullas eius acres, dulcibus mutare docuit. Quamq; Apuleius negauit eandem esse malū assyriam, siue medicā, quæ Citrus: quæ Citrus exiguum esset genus arboris, Medica uero, ut Maro scribit, ingens. Pamphylus Citrum, Critum a Romanis eam dici, parum peritus homo scripsit. Vtūque arbor hæc scribitur, uere partibus cultissimis semine quarto die aut quinto rigatur. Maiuscula transferretur etiam uere in solum molle, udumque, nec admodum gracile. Arbor ipsa omnibus horis pomifera est, alijs ruentibus, alijs subnascentibus, alijs maturescentibus. Serit & fistilibus, dato radici bus spiramento, per cauernas ut Palmæ: qualiter oīa transitura longius haberi conueniunt. Semen eius solum id quod in colo quadam e medio prorumpit, fecundum existimatur a Theophrasto. Sed hæc olim fuisse. Nunc trallatitia & triualis fere arbor, ut pluribus generibus Citrea Liguriæ, Campaniæ, Benaco lacu, Italia fere tota germinet feliciter, quamcunque libeat imaginem reddentia. Hæc ex insitione Mali quoties proueniunt, Citromela proprie dicuntur ab aliquibus. Quamq; uero Medica malus dicatur, ipsum tamen pomum Galenus malum medicum uocari negat, sed Citrinum dumtaxat. Theophrastus etiam malum Medicum & Persicū, est ubi appelleret, cum huius fere unius mali semen imperispicuum esse dixit, secundo uolumine, de stirpibus, ut Athenæus interpretatur. Diphylus autor est, Citria, quandoque Pruna persica, uocari solita, Aristophanes grammaticus, a Lacædemonijs Oxymala persica nuncupari pro-

didit, quibus & Deos coronent. Menses illas ueteribus & Plinio decantatas, præsertimq; Ciceronianam, non ex hac fuisse Citro, sed ex alio cirri genere conijcio, pluribus argumentis: sed illo potissimum, q; arbores ex quibus fierent, Cupressi femine syluestri similes folio, odore, caudice, a Plinio produntur, Anchorano monte, citerioris Mauritanie, sed iam tum exhausto. Itæ Adante, cuius imas radices densis alisk; repletas syluis, incognito genere arborum Suetonius Paulinus, a Plinio citatus, asserit spectabili proceritate, enodi nitore, frondibus Cupressi, pterq; grauitate odoris, has tenui lanugine obduci, quibus addita arte possint quales bombice uestes confici. Idem autor paulo superius, efficacissima inquit luxuriæ uis sentitur, cum Ebori Cedroq; syluæ exquirantur. Preterea quis potest negare, arborē ex qua tam celebres mensæ cōstent, Trogetem, & Thyian, & Thyon a Theophrasto & Strabone dictam esse? Idq; Plinius exploratissimum nobis fecit: de Thyia uero Theophrastus. Perpetuo, inquit, uiret, arbor procerā, inter syluestres feruina, ut nulla fere tardius germinet, argentiis locis, & cacuminibus montium gaudens, circa Hammonis delubrū præcipua nascens, & in inferiore Cyrenaicæ parte, atq; ubi ipsa tunc esset, ramis, caudice, frondibus, syluestri Cupressi similis, ex ea ueterum templorum contignationes fuisse, imortali post Cupressum in tecta materie. Nihil radice crispius, nec aliunde preciosora opera. Siccitatem mari, duricie & maturitate incorrupta spissari tradunt, nec ullo modo uehementius. Homero quoq; notam fuisse, inter odores uri solitā a Circe, magno errore eorum, qui odpramenta in eo uocabulo accipiunt. Cum præsertim eodē uersu, Cedrum & Laricem nominet, ut manifestum sit de arboribus tantum loquutum. Nam & Calypsus, & Helene thalamos, & Thyia cōditos, idē poeta cecinit. Quid habet Citrus nostras cōmune cum Cupressi, frondis Cupressi, Iuniperi sabine, Cedri, Citro, Lauri, Adrachnes, Arbuti? Quid tam diuersum, q; Galbulus, & Citreum? Omittō alias notas. Quibus perspicuo liquere potest uolentibus, decipi gramaticos, quicunq; mensas citreas ex hac Citro, quæ nunc habetur, factitatas arbitrantur. Dion certe historicus, Neronis uita, non citreas, sed cedrinās mensas appellauit, siue cedro potius q; Citro similes esse uiderentur arbores, siue q; in exemplari uitium est. Erit ergo Thyia, siue quod idem est, Trogetes, et Citrus duorum omnino generū, ut constat. Vnum Cedri eius, ex qua mensæ dolabantur. Alterum Citri eius, ex qua malum medicum. Plinius, alia inquit est arbor eodem nomine malum ferens execratum, aliquibus odore & amaritudine, alijs expetitur, domos etiam decorans. Quod & sensisse Macrobius uidetur. Hodieq; Mauritanī malum medicam, & pomum eius Atrogi uocant, a Trogete uocabulo parum deflexo. Alioquin Trogetem, non quia mandī posset, sed carantiphrafin, qā mandī non possit, appellatam censuerim: quandoquidem, ut dixi, ueteribus esculentū non erat. In summa, non nego Malum quoq; Medicam in Mauritania fuisse, cum plena sint Poetarum omnia fere uolumina, sed ex qua mensæ ille celebres existerent, malum medicam fuisse, hoc nego, & pernego. Nec dissimulandum tamen est, Phaniām Ereslū quinto uolumine de plātis cedrum appellasse, ac malum cedrum, pro eo quod nos citrū & citrium uocamus, & Dioscori dem secuti Cedromelon. Varro quoq; libycam Citrum nominat.

EX M. VERG. COMM.

DE Medicis, quæ Persica etiam hic uocari ait, quoniam nostro orbi, & Græcia diu peregrinæ fuerint, & ex Perside in nostrum orbem transferint, illud primum testabimur, in appellationibus eorum, non Cedromela forte, sed Citromala, quasi Citria mala legendam esse uocem. Nihil enim Citro cum Cedro, & a Romanis Citria hæc uocari iam pridem receptum est. Nihil tamen mutamus, in cunctis enim grecis pariter legitur.

Quæ autem in Barbari Corollario longius narrantur, omnia ex quarto Theophrasti uolumine, & Atticis dipnosophistæ excerpta sunt. Qui etiam quod uno aduerbio ab hoc *ἡ δὲ* dictum est, pluribus conuertit. Nobis una superfectionis uoce indicare id placuit.

Sequitur deinde quod anceps in hoc scriptore sit, quo loco statim a descriptione seminis legat, *ἡ δὲ* nostri in *ἡ δὲ* *ἡ δὲ* *ἡ δὲ*, tribuendū ne id sit semini, an pomō, utriq; em neutri generis. Sed qd ad pomū pertinet longius in sermonis textura abest: qd uero ad semen, ppius, et quasi cōtignat. Plinius et semini, et pomō id tribuit. uerba eius hæc sūt, Citria cōtra uenena in uino bibunt, uel ipsa, uel semē. Ceteri, in quos Theoph. pomō eā uim tm assignat.

PYrorum multa genera, quæ tamen omnia adstringunt. Adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum e siccis.

m ij

A

Theo. li. 4. &
s. cap. 5.

*

B

Macrobius li
bro. 3. cap. 19.

C & cruda ipsa aluum sistunt. Ieiunos esitata ledunt.

Pli. II. 15. ca. 15.

B A R B A R I C O R O L L.
Pirum, græci edomitam, siue urbanam Apion & Adipion appellant, de quorū prouentu, Peloponnesus quoq; ipsa quandoq; dicebatur Apia. Licet quidā ab Apia Phoronei filia, terram eam ita nominatam putent. Poetæ sunt, qui Pirum Ochnen uocent, syluestrem Achrada, ut mox dicemus. Apios & Rhapsani genus est. Turbinata Pirus omnibus figura, multis generibus. Alia parua ocyssimaq; & odoratissima, nominant Superba; in his crustumina, quæ gratissima, & ex parte rubent. Et proxima his Talerna, cetero largo succo habundantia: hæc Lactea uocantur. In hisq; alia colore nigro donant Syriæ. Post hæc Decumiana, & ex his tracta origine Pseudodecumiana. Dolobelliana longitudine pedali. Pomponiana, cognomine mamosa. Liceriana seueriana, & quæ ex his nata sunt, Tyranniana petioli longitudine distantia. Fauoniana rubra, paulo Supbis maiora. Lateriana, siue laterisiana, ut Columella uocat et Macrobius. Anitiana, & autumnalia accidulo sapore grata, & quæ maxime Tiberio principi placere Tiberiana. Colorantur hæc magis sole, grandescuntq; alioquin eadem essent quæ Liceriana. Accedunt his Neufana, Turanianaq;. Atq; hæc auctorum suorum nomen habent, præter Supba, & Phalerna. Patrias nobilitauere quæ sequuntur. Serissima omnium Amerina, Piacetina, Numantina, Alexandrina, Numidiana, Græcula, & his Tarentina. Signina, quæ alijs a colore Testacea appellant: sicut Onychina, ut quoddā pruni genus, Purpurea. Ab odore Myrapia, Nardina, Laureia, Ordearia, siue ordeacea, a comitatu frugis eius. A colo Anpullacea & Coroliana, & brutæ gentilitatis Cucurbitiana. Acidula a succo, a melle Mulsia. Incertâ omnium ratio. Barbaricis & Venerijs, quæ colorata nuncupant. Itæ Regijs, quæ minimo pediculo quasi sessilia sunt. Iâ patricijs uocanturq; uiridibus & oblongis. Dixit & Volema Virgilius a Carone supra. Volemitū, uocat Macrobius, qui & ceritium, & ceruisitū, & calculosū, & Iollianum, & Lauiniū, & Milesiū & Myrteum, & Orbiculanū, & Precianū, & Rubile, Tulianū, Ticianūq;, itæ Mespilaceum, et Valerianū indicauit, Cloatiū secutus. Idē Cato & Semetina, & Musæa quoq; nominat. Ampullacea, græca, Laureia, ad hyemē usq; in parente pendent. Seroquina, et gelu maturescuntia. Nam quæ Aristoteles Apē, Bloadas nominat, insitij generis intelligunt. Vini pprietas & Piro. Cōdunt hæc totidē qbus uua modis, non alijs, q; in cados. Vino & aqua coquunt in escā ægris, daturq; pulmētarij uice, quod nō alia præterq; Coronea. In conuiujs græcorū Pira secūdis mensis inferebant aqua mersa, ut mitissima, quæq; legi possent. Pira sunt & quæ Libralia uocantur. Sed sola tamen e Pirus Mala dici consueuerunt. Liquamen de Pirus fieri statum, ad ieiunia foeminarum. Inuenio quod Castimoniale dicebatur. Piorum quæ maturissima sint, carnis integro sale calcatis & resolutis, atq; ita fistilibus picatis cuppis ue conditis.

Macrobius li. 3. cap. 19.

D

VERG.

Pirorum infinita pene genera, quæ ab antiquioribus rei Rusticæ scriptoribus tradita sunt. Quod solū desiderari in hoc capite poterat, longissime in Corollario suo Barbarus profectus est: nos ideo nihil ultra de his agemus.

Ex pto

De Pyraastro. CAP. CLXX.
Achras Pyrastri genus est, quod tardissime maturescit. Vim Pyra adstringentiorē habet. Et ad eadem conuenit. Stringūt etiā eius folia. Ligni Pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strāgulāt. Aiūt fungos si syluestria Pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Vicus antiq
rū frugaliss.

B A R B A R I C O R O L L.
Achudō Pirum syluaticam, hoc est, Achrada, & apud quosdā, ut apud nos, et Pirastrū, fertiliorem urbanā predicant, Hyeme fructificat fere, Autumno tū genus eius unū, ut Theophrastus inquit, materia ei apprime dura. Ideoque discos, tabellascq; sutorias, e Piro syluestri faciunt. qm ut in molli retundit, ita in duro ferrū acuitur. Aculeatos hæc habet ramos, ut Punica. Quid autem Achyrades Heliano sint, quas in cibo primum Tirynthios habuisse memorat, non comperi. Nisi quis nō Achyradas, sed Achradas, hoc est, Pira syluestria in eo legat. Nam ut idem autor inquit, ante panis usum, Argiuos esitasse Pira meminit, ut Athenienses ficos, Glādem Arcades, Indi Arundinem, Carmani palmulas, Milium Sarmatæ, Terebinthum nasturtiumq; Perse. Achyra certe paleam significat: nec uideo, q; sit uerisimile paleis quemq; uesci potuisse, quasi ueterinum, etiam si Arcadas radicibus herbarum, & arborum folijs recentibus ante glandis fagineæ usum a Pelago traditum: uicissatē creditur.

De Mespilis. CAP. CLXXI.

Mespilus, quæ a nonnullis Aronia uocatur, spinosa arbor est, folio acutæ spinæ. Fert pomum suaue, exiguum, tribus intus offi-
culis. Qua ex causa id nonnulli Tricoccon appellauere. Tardè maturef-
cit. Esu adstringit. Stomacho gratum est. Aluumq; supprimit.

BARBARI COROLL.

Mespilorum tria genera, Setanium, Anthobon & Antehoboides, quam et Gallicæ intelli-
gunt. Setanio fructus grandior, candidior, solutior, Acini molliore ligno, reliquis minor, sed
pstantior odore, & astringētiore gustu. Quo fit, ut diutius q; durēt. Lignū his flāuius, & spissi-
us. Flores oibus Amygdalæ, nō tñ rubētes, sed p̄modū herbacei. Arbor int̄ amplissimas, co-
mosa in girū, foliis scisso, extremitateq; Apio simili, sed maiorib. diuisuris, p̄misso, rigētī, ner-
uoso, tenuiore & longiore q; Apii, lōgo & gracili pediculo. Radice alta, numerosaq;. Ideo lō-
gua ē arbor, a terræ inextricabilis. Lignū densū, incorruptū, solidū. Semine et auulsioe serit.
Foliū anteq; decidat, uehementē adrubescit. Infestat et hęc uet̄mibus in senecta, q; p̄grādes ei di-
uersi q; ceteris cōtingūt. Nō fuit hęc arbor in Italia Catōis æuo. Hęc Theoph. & Plin. Verū a-
lia hęc Mespili distinctio ē, q; a Dioscoride rep̄stata ē. Et sane dubitari solet, an Mespilū ueteres
cū Sorbi arbore cōfuderint. Quādoq; dē altissimis cōnumerat, q; certe Sorbo q; Mespilo nūc
uocat, magis cōueniūt. Nisi q; nostratū Mespilū, nō tā Mespilū, q; Chatemespilū appellandā
fortasse cōseat, quæ nascitur, ut inq; Dioscorides, Italiæ uocata Epimelis, de qua sequenti capi-
te differitur. Certe Iulius Pollux, Mespila inquit, & Sorba quoque appellatur.

Quam genere neutro Mespilū arborem fecit, Theophrast. lib. 3. sc̄eminino ḡne descripsit.
Longius idem de tota hac arbore pomūq; eius eodem loco egit, quæ omnia a Barbaro
in Corollarium suum translata a nobis relinquuntur.

Illud tñ notādū, ubi de semine huius pomī agit, nō dicere Theophrastū claudere in se hoc
pomū acinos molliore ligno, ut Barbarus uertit, sed πυρῖνασ μαλακότερον, quod est, nucleos
habere molliores. Toto enim genere differunt inter se acini, & nuclei. Et si in antiquioribus i-
dem utriusq; fuerit nomen, ut in Punica non multo ante dictum est.

Sciendū & illud, quam primū hic describit Mespili arborem peregrinam & incognitam Ita-
liæ nobis uideri, & sui generis arbore spinosam, & ut hic ait, Trigraniam, quæ nostrates Mespili
non habent, quinq; intus nucleis farscē, & nullis spinis armatē. Nostratem uero Epimelidem
ideo, ut nō credimus, a gr̄cis dici, quod felicissime in Malo inseritur, & quasi ἐπὶ τῷ μύλεισ, i-
dest, in malo adoptata creuerit, sc̄eminino genere & diuturna forma, πικρὺν dicta a gr̄cis est.

Quod aut̄ diximus, esse nostratē Mespilū latiore umbilico, quodq; Barbarus, fundo in lati-
tudinem resimo, nō facile intelliget aliq;: nescio qd in pomis πικρὺν .i. si uerbū de uerbo uer-
tas, fundus, significet, qua uoce ueteres gr̄ci, qd in sumo pomo umbilici descendit iudicaue-
runt, p̄sertim in malis, piris, sorbis, mespilis, alijsq; pene infinitis, in qbus cauum, & ueluti la-
cuna descendens, lanugines in ea, floccosq;, & floris postquā defloruit inutiles reliqas ostēdit.

Et quoniam descendit, & quasi in doliolo fundum facit, idest, πυρῖνασ, & quod humani um-
bilici modo cauum est εμφορόν etiam gr̄ci uocauerunt, nos umbilicum igitur uertimus.

Quod aut̄ a Barbaro dictū est Resimo, in Diosc. nō legit, et si ea est umbilici i Mespilo figura.

De Setanijs. CAP. CLXXII.

Alterū Mespili genus in Italia nascit̄, qd aliq; Setaniū, aliq; Epimeli-
da uocat. Arbor folijs Mali, sed minoribus. Pomū fert rotundū,
esui aptum, ima parte latius. Quod adstringit, serocq; maturefcit.

Mespilum Setaniū a Theophrasto nominatam, Dioscorides Epimelida uocari scribit. Hip-
poc. Amamelida. Galenus Mespilum, cōmuni uocabulo Tricoccon, quasi Triossum, aut
Trigraniam ab aliquibus appellatum meminit: quoniam tria intus grana, siue ligna, fructus
habeat loco seminis. Quid autem sit Epimelis Galeno, differendum putauimus in Arbuto.

De Loto arbore, seu Faba græca. CAP. CLXXIII.

Lotus arbor est uastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maio-
rem, dulcem, graui odore, stomacho facilem. Aluum sistit baccis.

A

μίσπιλος

Theo. li. 3. ca.

12. Plin. li. 15.

ca. 20, li. 23, c. 7

VERG.

B

BARB.

λωτός

D I O S C O R I D I S

C Rametorum ligni decoctum, siue potu, siue infusione dysentericis, ac foeminiis fluxione uulug laborantibus, auxilio est. Ruffat capillos. Citam aluum cohibet.

Theo. lib. 4.
cap. 10. Plin.
lib. 16. cap. 31.

Homerus Odyss. 1.
Strab. lib. 17.

B A R B A R I C O R O L L.

Lotus arbor (nam & herbae sunt hoc nomine complures) in latino Celtis uocatur, itemque faba graeca. Seruius Fabam Syriacam, Nympha in arborem sui nominis conuersa, quam Priapus fugientem comprimere quaesisset. Anacabeam uulgo apud graecos dici, autor est Aetius, ut fructum eius Anacabon, licet quidam peruerse, Alicabon scripsere graeci, Piri magnitudine, aut paulo infra. Incisura folio crebriores, alioquin llicis uiderentur: spissa, nigra, enodi materie. Differentiae generum plures, earumque maxime fructibus constant. Amplitudo Fabae pomo. Color Croci, sed ante maturitatem ut in uuis alius atque alius. Nascitur in ramis densum myrti modo inter sese aduersum, non ut in Italia Cerasij. Manditur inter Lotophagos innocua dulcedine, suauitateque: nec uentris sentire morbum ferunt qui uescantur. Iucundus meliusque sine interiore nucleo, qui in alterutro genere osseus uidetur. Vinum exprimitur huic simile mulso: quod ultra denos dies negat durare Polybius. Sunt qui biduo triduoque acescere id scribant. Baccas eius confusas cum nucleo & callo suo, dolis ad cibos condunt. Vnde uulgo Romae, puls Tyriaca uocat arbor illa modo. Nam Padi accolae, baccam syriacam appellant. Tanta uero fructus & arboris copia narratur, ut exercitum Ophelli, Carthaginem petentis, in comituum defectu pauperit. Numerosa in Pharide insula Lotophagorum. Plurima et in Africa nos spectante. Familiaris & Italiae: sed natura coeli terraeque mutata, & succos oblita priores. Praecipua est circa Syrtis, atque Nasamones. Sunt qui breuem tradant arborem, ut Polybius, qui & uidisse se testatur spinis asperam, folio uirenti, quale rhamno, tantum profundiore latioreque, fructu myrti candida per initia, processu puniceo, magnitudine oliuae, sed rotundo: cum cibo familiae tundi cum nucleo, qui perexiguus ei est, seruari conditum. Eundem nucleum herilibus mensis eximi. Saporem fici & phoenixolobani esse pomo, sed praestare odore. Vinum & acetum inde fieri. Lignum cereae ad tibiarum cantus expetitur, e radice cultellis capillos & subscudes, ac breues alios usus excogitant. Hesperidum Lotos, ab ea quae Lotophagis nascitur distat: ut qua ligni uice utantur ad urendum. Non desunt, qui fructum eius postputamen esse, nec carnosum foris, sed cuticulaceum prodiderint, nec tam cibo dulcem, quam gustu alias iucundum: ut hinc fortasse Dioscorides maiorem Pipere descripserit. Ac fructus quidem lotophagis dulcissimus, sed materia Cyrenaica praefertur. Radici nigricia maior quam ligno: sed densitas minor, quam in Loto post Buxum & Hebenum summa redditur. Vtilitas quoque radici latior. Particulatim Lotus fructificat, non ab utroque sui germine: quod & in bulbi & tithymali quodam genere notatum est. Ludicerae Tibiae fieri coepae sunt e Loto, quas Alexandrini Phoringas appellant. Sicut ex asininis quoque ossibus, & argento ebur quoque ceptum peritundi. Vnde Tibiae elephantinae dicantur, reiectis propter nimiam difficultatem harundinibus. Propterea Cenomani, Lotum arborem hodieque appellant Calamum. Spectatur Parauis antiqua Lotos, in quadam Anoniani templi xylo. Est quando Hippocrates Luron pro Luto nominat. Circa Memphim, nemus a Theophrasto describitur, fuisse tam uastis arboribus, ut excederent trium hominum amplexum, utiles operibus, colore densitateque per similes Loto, nam Faba, siue arbor pontica, genus diuersum est a Faba graeca, id est, Loto, magnitudine ne Fici, fructu fabae, succo uestibus expresso, quem Achy uocant: niger autem crassusque est. Aut per se lugentes, aut mixto lecta uiscitant. Nascitur in Scythia.

E X M. V E R G. C O M M.

VAgum est per herbas & arbores aliquot Loti nomen, ut libro. 4. docebimus: ob eam causam, nos capituli huius titulo arborem adieciimus. Monente id scriptore hoc, qui Loton arborem ait, plantam esse, &c.

Multiplex, longaque est arboris huius in Theophrasto & Plinio historia. Nos eam relinquitur in scriptoribus illis, & Corollario Barbari uolentibus legendam.

Γαββίσι δὲ καὶ ῥπίχα, ruffat capillum, ut nos reddidimus, cum tamen uetus lectio aliud habeat, si ex eo caput lauetur, capillorum casum prohibere: nec ego detulisset huic lectioni aliquid, nisi Plinius lib. uicesimo quarto, cap. 2. idem his uerbis docuisset, Ramenta ligni decocta, &c. cohibent & capillum. Suspiciamus itaque uitium esse in uerbo illo, γαββίσι. Communi tamen lectionem secuti, nihil mutauimus.

De Cornu. CAP. CLXXIII.

Cornus dura arbor est, baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primū uirent, dein per maturitatē rubescunt, aut cære colorē re presentant. In cibo adstringūt. Profluuiū alui, atq; dysenteriaē salutare, si ue in edulio, siue in cibis exhibeantur. Muria ut oliuæ condiunt. Sanies quā uirentia folia torrendo resudarūt, impetigini cōuenienter illinitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Cornus Craniās a Theophrasto dicit. Sexus in ea duplex. Fœminā, Græci Thelycraniā uocant. Fructus syluestris maturiores, suauioresq; q̃ urbanæ: quod in hac & Sorbo peculiare fe re est. Cornus altera præcox, solsticio fructificans: altera post autumnū, cui & fructus ingusta bilis, lignum infirmū, hiansq; ac fungosum, quæ fœmina intelligitur. Contra masculæ firmissi mum. Fœmina uiticulas paruas a lateribus emittit, amplexinā modo Salicis, in totūq; fructico sior est, mollis & medullacea, uenabulis damnata. Materies masculæ robusta, solida, excorsq; tota, hoc est, sine medulla, & cornu instar, prædensa & ossæ. Nodos Cornus ois habet per in terualla geminos, & inuicē respondētes, ut in Vitice. Foliū Amygdalæ, sed pinguius & crassius, cortice neruoso ac tenui, caudice nō admodū crasso. Mas duodecim fere cubita excedit: quā al titudinē Sārissæ Macedonū amplissimæ habent. In Ida mas sterilis, fœmina fructifera. Fructū apud Macedones ambæ ferūt, sed fœminæ (ut diximus) qui mandī nō possit. Radices ut Ame rina, firmas & contumaces emori. Humidis locis auulsione, semineq; prouenit. Est & in India arbor, ferens fructus similes Cornis, quæ merito Cornus Indica nominari possit.

Diximus fortem & speciosam arborem Cornum esse: sic certius indicantes, quod in græ cis ἀδρὸν est, quibus ea uox τὸ ὑπερπλοῖον, id est, pingue & feliciter nutritum, ex eōq; cum decore ualidum & forte, qualis Corni materia, & ob id uenabulis apta.

De Sorbis. CAP. CLXXV.

Sorba colorem malorū referentia, priusq; maturescāt, dissecta, & so le siccata manduntur, ut aluū sistant. Eadem est functio molitorū fa rinæ, si polentæ loco sumatur. Quod & decoctū eorū in potu præstat.

B A R B A R I C O R O L L.

Sorbo syluaticæ, præstator q̃ urbanæ fructus, qd in hac & Cornu præcipuū Theophrastus notauit. Arbore Græci Oen, & Oien, fructus Oa & Va uocat. Fœmina fructificat sola. Dis crimē in fructu, q̃ aliæ figura orbis, aliæ oui ferunt. Itē in succo. Aliæ odoratiore dulcioreq; ut orbiculati fere oēs. Aliæ acidū peiusq; olentē, ut ouales. Vtriq; folia pediculo singulari pro lixo, neruaceo, condita in uersus, alæ modo a lateribus emicantia, tanq; ex oibus unū fiant, lacinis pennatim, ut in filice, ad neruū usq; diductis, ampliusculoq; diuisis interuallo. Atq; hæc non paulatim ut cæteris, sed uniuersa collabunt. Omnibus ramulis in extremo pediculi foliū prominet, cuius accessione impar numerus efficit. Figura his lauri, tenui folio, præterq; q̃ ferra ta per ambitū, breuioraq; sunt, neq; cacuminibus mucronatis, sed in rotunditatē reclusis. Flos ra cematum coactus ex pluribus candidis ac minutis, petiolo unico dependet. Fructus cum large pueniūt, uix modo, farcti congestiq; uisunt, ex uno petiolo faui spēm p̃bentes. Exest eos uer miculus etiānum crudos acerbissimosq;. Ipsa quoq; arbor in senecta uermibus obnoxia, rufis, hirsutis, sui gnis. A trimatu fert. Autūno folijs subinde amissis Cachryn suā fundit, edura turā hyeme: ut in Robore. Aculeos Sorbus non habet, ut mespilus. Nouella, cortice leui, pin guisculo. Flauer e candido, aūosa scabro, atroq;. Arbor ipsa de grandibus & subrectis, coma concinna: & nisi qd impediāt, uerticē nucis Pineæ representās. Materies solida, colorata, firma, cōpactilis: radicibus neq; multis, neq; in altū defixis, ualidis tamen & crassis, auelliq; difficilli mis. Nascitur semine, radice, auulsione, solo aliofo, humecto, interimq; montibus. Conduñ sapa Catonis p̃cepto. Nostri differentias in Sorbo quatuor nouere: alijs rotunditatē malī red dūt: alijs turbinē piri, utriq; sapore uini gnosissimū, cui circa pediculos folia: alijs ouata specie, odore acri, nec pinde iucūda suauitate. Quartū genus Torminale appellāt, ualens cōtra tormi na: hoc affluū prouentu est, minimūq; p̃pomo, arbore dissimili, folijs fere platani.

Longa est arboris huius & pomi in Theophrasto historia. Nec breuiter Plinius de eadem

Legit. Res etiam ipsa de quotidiano spectaculo satis nota est.

A
npariaPlin. lib. 17. ca.
26. 28. 48.
Theoph. lib.
3. cap. 12.

VERG.

B

Theophrast.
lib. 3. cap. 12.
Plin. lib. 17. ca. 26.

VERG.

C Quo fit, ut magis Barbarū demiremur, tā incerta de pomo, arboreq; hac in Corollario suo docentē. Optatū profecto hoc loco erat, græca nouisse oēs, ut collatis cū Theophrasto ab eo dictis, imperfectā hoīs interpretationē cognoscerent: in qua nescio, credendū ne magis sit, qd obiter ea uerterit, an potius, qd morte præuētus, fartā rectāq; rem ostendere nō potuerit.

De Prunis.

C A P. CLXXVI.

Prunus arbor est nota, cuius pomum estur. Sed stomachum male habet. Aluum mollit. Syriaca Pruna, & præcipue quæ Damasci gignuntur, exiccata stomacho utilia sunt. Aluum adstringunt. Folia Pruni in uino decocta, gargarizatu uiam, gingiuas, & tonsillas fluctione laboranteis reprimunt. Præstant idem syluestrium Prunorum bacca, post maturitatem exiccata. Cum sapa uero decocta stomacho utiliores redduntur. Aluumq; magis adstringunt. Gummi Prunorum agglutinat. Potum in uino calculos comminuit. Ex aceto quoq; illitum, impetigines infantium sanat.

B A R B A R I C O R O L L.

Prunus, Coccomelea, & Cocomelos græce dicta. Pomū ipm neutro gñe. Arborē masculi no media comœdia pnunciat. Folio Arbuti describit, si Theodorus audiat. Et inter paruas, ut peculiare in ea Theophrastus reddiderit, fructū in lanuginē solut, quæ dicat Pappus: qd nulli alij arbori eueniat. Sed hoc Plinius, Theophrastū secutus, non pruno, sed coggigryæ uocatæ tribuit. Decepit hominē uel corrupta lectio, uel nominū affinitas: forte qd cocconeliā, non coconeleam scribendū erat. nā & Vnedo, cui similis est Coggigrya, nelix nomē apud Theophrastū habet. Prunū syluestre Virgilius Spinū uocauit, eo uersu. Spinosa Pruna ferētes. Genera Pruni ppe inexplicabilia. Vericoloria, nigra, candida: quæ a cōitatu frugis eius hordeacea dicuntur. Alia eodē colore, seriora, maioraq; Alina cognōiata ob uilitatē. Sūt & Onychina Columellæ, nigris laudatiora. Sūt Cerina, siue Cereola, atq; Purpurea, necnō Armeniaca, de quibus dictū. Habent & insita Nucipruna, q̄ in facie parentis succū adoptionis pferunt. Nucipruna q; uocant. Hec & Cerina & syluestria ubiq; nata, ut uix autūno cadis usq; ad alia nascentia conduūt. Reliquorū uelocitas transuolat cito marcescentiū. Non pridē, ingt Plinius, in Betica malina appellari cōperūt malis insita, & Amygdalis, intus in ligno nucleus amygdalæ, nec aliud pomū ingeniosius germinatū est. Damascena, e Damasco Syriæ, tā pridē ante erat Plinij, in Italia nascebatur, grandiore q̄q; ligno, & carne exiliore: nec unq; in rugas siccata, quādo soles sui defunt. Populares ijs Myxæ, de quibus in Aegypto & uina fiunt. Familiares & ipsæ Italiæ, uel Sorbis insitæ. Amariora prunis Myxa, uel similia Paulus existimat. Nā myxa Græci uocāt, nos myxas. Quibus similis est Persicus ægyptia, nisi qd poma ægyptiæ rubescūt. Pruna oia post Catonē in Italia corpisse manifestū est. In syluestribus, satiusq; Prunis limus est arborū quæ Lichena Græci uocāt. Est & sua Prunus Aegypto, magnitudine insigni, nō dissimilis Spine Syriæ, pomum mēspili, ligno intus grādi ac rotūdo, Florere incipit mēse fere Iulio: maturescit bruma, nec folia dimittit. Corpus ipsum pomi natura, copiatq; pro mellibus est incolis. Siccātū purgatq; fundit, seruātq; eius offas qui Thebis habitāt. Mirat Galenus Dioscoridē, qd Pruna Damascena sicca aluū sistere pdiderit, cū perspicuo soluāt. Qz q̄ minus ingt, q̄ Hiberica uocata: qm̄ primū ex Hispania uenerūt, ut ingt Aetius, succi dulcioris. Ceterū Damascena intelligit, qd Theocritus Brabyia uocauit, quæ & Madrya, & Badrya dicunt Athenæo. Prunus syluestris, ut idem auctor est Galenus, in Asia Prumnon dicitur, & nos ea uulgari uoce Prunulā uocamus.

E X M. V E R G. C O M M.

Certiora, & ex re magis de Prunorū uiribus post Dioscoridem alij tradiderūt: demiraturq; hunc Galenus lib. 2. de simplici medicina, dicentem siccatis Damascenis Prunis compesci aluū, cū manifeste & hæc deiciant, sed minus q̄ alia. Vnde nō male suspicabitur aliquis, quod in cunctis græcis legitur, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς τῶν φύλων. &c. quod est, foliorum decoctū potuisse quondam aliter legi. Nā præter aliorū decreta, qui fructui hoc tribuerūt, res ipsa id exigere uidetur. Nihil tamē in cōmuni omnīū cōdicum lectiōe & fide mutātū a nobis est, & quā forte hic locus exigerat castigatiōe, ad ea q̄ statim sequunt manifeste trāstulimus. Quod em̄ in hoc scriptore passim legit τὸ δὲ ἀπὸ τῆς τῶν φύλων. ἢ οὐκ ἐνεαζόμενον, non ἐνεαζόμενον, i. pparatū, qd nullā habet

Pli. li. 15. ca. 19.
lib. 15. cap. 1.
Theoph. li. 3.
cap. 16.

hoc loco significationem, sed *διανυόμενον*, quod colluere significat, legendum est: id omnium probatis, mihi codex habet. Et Paulus Aegineta, de his ipsis libro 6. agens, ait, τὸ δὲ πλεονάζοντος τὰς κατὰ γαργαρίσματα φλεγμονὰς ἰστέαι διανυόμενον: quod est, Prunorum decocto gutturis inflammationes collui. ut sit in Dioscoride sensus, collui & gargarizari decocto illo facium mala ab ea multa deinceps numerata.

De Arbuto.

CAP. CLXXVII.

Arbutus, siue Vnedo, arbor est Cotoneæ malo non dissimilis, tenui folio. Cuius fructus Pruni magnitudinē implet, nullo intus nucleo. Huic Apomacolæ cognomen est. Maturus aut flauet, aut rubescit, in esu acerosus. Stomacho aduersatur. Capitisq; dolorem mouet.

BARBARI COROLL.

Arbutus græce, Comaros dicta, cortice deciduo, tenui, similitudine tamaricis, folio interlicem atq; Laurū. Arbor ampla non est. Flores Iulio mense, ab uno pediculo cacuminibus racematim dependent, similes baccis longioribus myrti, neq; foliosi, sed concaui, ceu ouū pertuso uertice. Cum deflorescunt, parte qua sunt annexi perforantur, relabendoq; in pediculū, speciem uerticilli fuso injecti præbent. Fructus anno perficit, cibo idoneus, ut pariter floreat subnascens, & prior coquat. Carbones officinæ argentariæ cōmendant coctione prima, ut ariā. Pomum hoc, & Comaron, & Memecylon Græci fere uocant. Latini pomū & arborem quoq; ipsam Vnedonem, & Arbutū appellant. Sunt qui duo genera constituent, Theophrastū, ut arbitror, secuti. Comaron, id est, Arbutū: & Mimecylon, id est, Vnedonem, a Theophrasto Nelian uocari, defluo & hoc cortice, folijs quoq; sed ima tantū parte deciduis, uirēte perpetuo coma, Mas sit, an foemina sterilis, nō constat. Arbor ipsa fruticosa. Pomū inhonorū: ut cui nomen ex argumento sit unū dumtaxat edendi: uel fortasse, quia solū hoc pomorū simile fructui terræ gignit, hoc est, fragis terrestribus e quinque folio frutice nascētib;: quæ & Mora terrestria dicunt a Seruio grāmatico. Nec satis scio, an recte. Ideoq; mōtana Fraga nominant a poetis, ut a terrestribus distinguerent. Galenus & Paulus Arbutū comaron, Synedonē uero, siue ut ipse lego, Vnedonē a rusticis Italiæ uocari scribūt, quā Epimelon, & Epimelida Græci nuncupant. Syluestris mali genus, copiosum in Calabria, fructu acerbo, & infesto capiti & stomacho. Sed siue aliud hoc sit ab eo, quod Dioscorides inter mespila connumerat, & Epimelida meminit uocari, siue idem, certe Palladius Epimelides, siue Hypomelides inquit, sunt poma Sorbo similia, mediocri arbore nascentia, flore candidulo, sapore ex acri dulci. Pamphyly Apimelida Piri genus arbitrat, quod alij uocant Amamelida. Quidam Homomelida: frequentē in Ionia, & biseram, fructu Piri, sed sui generis. Omnino, ut Athenæus inquit, prædulci & sine nucleis, ac prælato piris. Alij Omomalidas uocant, ut Asclepiades, non pira, sed mala syluestria & montana: quæ Theocritus Oromalidas appellauerit, cū sicu maturefcentia. Amamelides, inquit Galenus apud Hippocratem, mespili genus est nascentis in Italia. Ex quo facile colligit, Amamelidas ei esse, quæ sunt Epimelides Dioscoridi. Mirū, qd eius usu, mulieribus lac cieri tradidit Hippocrates. Autores sunt, quinquagenū cubitorū altitudine, in Arabia esse Arbutos. Similis Comaro est & Adrachne, quā oēs fere Græci, Portulacæ noīe interpretantur falso: cū illa sit herba, & Adrachne uocet, unius literæ diuersitate. Theodorus, apud nos arbore Portulacā uocauit, ut a Portulaca herba distingueret, eruditius, q; felicius. Ceterū Adrachne est syluestris arbor, neq; in planis nascentis, similis Vnedonī, fructu & folio tantū minore, & nunq; decidēte, pterq; ab imo. Cortex exciduius, & scaber quidē, sed qui circūgelatus uideri possit, tā tristis aspectu est. Qd in Theophrasto, nō περιπυγμένον, hoc est, circumgelatū, sed περιπυγνόμενον, hoc est, rumpentē se per ambitū legat, quod & Theodorus quoq; sequit. Alibi quoq; Theophrastus, φασπαγία, hoc est, corticis abscessus, Platanō & Adrachnæ cōe inquit est. Sed lectionē Plinij uerorem puto: quia corticē excidere huic arbori propriū nō est, sed ad alia quoq; plura pertinet. Liberū tamen sit æstimantibus hæc iudiciū. Corticem quoq; candidū, Theodorus ei reddidit, quia leucon, ut arbitror, legebat. Ego lepron, id est, squarosum, scabrūq; lego, Pliniū secutus. In Helicone arbore hanc Pausaniās enascei tradit frequentē. Etiam si Andrachnū uocari credit. Magnitudo arbori nō præcipua. Illud cum Subere habet peculiare, detractō in orbē cortice, nō emori: quod ueteres latini, cingere arbore uocabāt: actione instituta cōtra eos, qui ita de glabrassent, & balteū exemissent, Arborū furtim cæsarū, eadē causa, qua legis aquilæ. Germinare cum Urbana Theophrastus eā scribit: Nec de urbana qualis esset inuenio, nisi quod mi-

A

κόμαρος

Pli. li. 15. cap. 14.

B

C nime uerū puto, herbā intellexit Portulacā. Inter biferas hæc arbor, priorē fructū, incipiente putrescere uua, peragit. Posteriorē, hyemis initio, siue ut Theophrastus inquit, priorē cū dulcescit uua, posteriorē cū floret. Adrachne usus foeminis, ad opus telarū. Similis huic Apharca. Plinius Aparachem uocat, e syluestri gñe arborū, æterna fronde, olympo monte frequens, nec nisi montibus nascens. Habetur & urbana. Vtrūq; genus simul germinat, & ut Adrachne bifenum, septis uallisq; utile, sed urendo quoq; predicat. Differt Connaros a Comaro, ut in Paliuri mentioe diximus. Testandū est & illud, grāmaticos græcos esse, qui fructū Arbuti, Acylon uocari credant falso, cū Memecylon eum dici constet; Acylon uero ligna glans sit.

De Amygdalis.

C A P. CLXXVIII.

A Mygdalæ amaræ radicū decoctū, uitia cutis in facie corrigit. Illitæ nuces idem munus præstant. Menses admotæ ciunt. Capitis dolori auxiliatur, illitæ fronti, aut temporibus cum aceto, uel rosaceo. Epinyctidas sanant ex uino. Item putrescentia ulcera, & quæ serpunt, & morsus canum cum melle. Earum autem esu dolores finiuntur. Aluum emolliunt. Somnum faciunt. Vrinam cient. Contra sanguinis reiectiones cum amylo assumuntur. Renum uitij, et pulmonum inflammationibus ex aqua in potu, aut eclegmate cum resina terebinthina dantur. Calculosis, difficilique urinæ in passo auxiliantur. Et illinctu cum melle & lacte hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis Auellanae magnitudine. Quinis, septenisue præsumptis, ebrietatem non sentiunt potiores. Vulpes, si cum quauis esca eas uorauerint, emoriuntur. Gummi eius, calfacit et adstringit. Reijcientibus sanguinem, potum auxilio est. Impetigines quæ summum corpus occuparunt, illitum cum aceto tollit. Tussi uetustæ cum diluto uino potum medetur. Calculosis cum passo bibere prodest. E nucibus græcis dulces cibo idoneæ, sed multo minus ualent in remedijs quæ amaræ. Attamen extenuant, Vrinam ciunt. Recentium esu cum suo putamine humida stomachi uitia recreantur.

BARBARI COROLL.

Pli. lib. 16. ca. 17, li. 17. ca. 18.

A Mygdalæ flos, antequam folia (quod fere soli propriū inter arbores tribuitur) manet e trunculo. Lachryma ad nihil utilis. Proximū corpori operimentū, item summū, simile Iuglandiū, sed tenuius, nucleo dissimili, lato, callosioreq;. Mori uulpes earum pastu ferunt, utique si non contingat e uicino aquā lambere. Nihil æquæ degenerat, quæ Amygdalus. Ideoque aut plantā sæpius transferri, aut adultā inseri præcipiunt. In remedio est, & paxillum adigere, & lachrymā defluentem extergere, reliquo cultu omni perinde adhibito. Ex Amygdalo cinerem & lixiuiam probat, ut acerrimā. Ad fornaces, arteque aliquas non incōmodo quoque ligno. Amygdalā eandem esse cum græca & Thasia, Cloatius putabat. Alijs græca uidetur esse Iuglans. Columella tria facit genera libro sexto, Græcæ, Iuglandis, Amygdalæ. Amygdalus dulcis, si a pecore sit erosa, dicitur amarefcere. Quemadmodū Amygdala nasci scripta possint, rei rusticæ libri doceant, origine a Græcis orta: quod & ad alios quoque fructus feliciter conuersum est.

* Pli. li. 13. ca. 8.

EX M. VERG. COMM.

Si huic, & Galeno, quorum decreta pro oraculo antiquis medicis fuerunt, credendum de uiribus Amygdalæ est, primam capitis huius partem, parum feliciter latinis Barbarus reddidit, dicens, amaræ Amygdalæ radicū tritarum decoctum, cutem in facie corrigere. Neque enim hic, si uerba eius omnia diligentius estimantur, illud decernit, sed quod Galenus lib. 6. de simplicis. Si accipiantur Amygdalæ radices, coquanturque, ephelides foris impositas auferre: iubetque non decocto Amygdalæ radicū foueri ea labe hominis faciem, sed decoctam radicis materiā uitio illi imponi. Quod primo lib. etiā Paulus Aegineta confirmat. Alternat præterea, si melioribus græcis habenda est fides, Dioscorides, acetum, & rosa-

ceum, quo loco iubet in dolore capitis utroque uti, non simul, sed alterutro. ^h enim, quod uel, non ^h, quod &, significat intercedit.

Reliquit & Barbarus, quod alioquin Plinius monebat, & post Plinium Serapion contra sanguinis reiectionē, ultra amyllum cum mentha fumendas Amygdalas esse. Siquidem Plinius libro 23. cap. 9. his uerbis rem indicat, Et sanguinē sistunt, cum amylo & mentha: fuisseque hanc lectionē Serapionis ætate cōmentaria eius indicant. Et nos plures ex melioribus Græcis uidimus, in quibus μετὰ ἀμύλου καὶ κδνόςμων manifeste adhuc legitur.

De Pistacijs.

CAP. CLXXIX.

Pistacia quæ in Syria gignuntur, Pineis nucibus similia sunt, & stomacho facilia. Trita cum uino contra serpentium ictus profunt, siue edantur, siue bibantur.

BARBARI COROLL.

Pistacea in nucū genere habentur. L. Vitellius, qui censor fuit, & hæc in Italiā primus intulit e Syria, cū legatus in ea prouincia fuisset, nouissimis Tiberij Cæsaris temporibus. Mox & in Hispaniā, qui cū eo militauerat Flaccus Pompeius eques Romanus. Venetijs hæc, Iudaico uico, satū seminis enata uidimus, folio maiore quā Lentisci. Marem in hoc genere accipiūt, cui sub corio uelut ossei longi uident latere testiculi. Nicander Colophonius Pistacia uocauit. Et alius Nicander Pistacia. Sunt qui Pistacia, ut Possidonius, Inuenio & Astacia scriptū in poetis. Athenæus auctor est, Terminthos, siue Terebinthos credi solita a nonnullis, quæ nunc Syri Pistacea uulgo appellant, foliorū similitudine, ut arbitror fallente.

EX M. VERG. COMM.

Male in omnibus græcis, præterquam in probatis, mihi codice legebatur, *πισάκια τὰ μὲν γένος μὲν ἐν σπία*. Hic enim dicendi modus alterum sibi membrum & Pistaciorum genus exigebat. Quando, ut græcorum grammatici docent, semper τὰ μὲν, reddendum, τὸ δὲ est, non aliter quā si in latinis dicas, hic quidem, ille autem, semperque proposita altera expectanda, & querenda altera pars est, quæ aliud, aut diuersum a priore illa aliquid ostendat: quod nullibi in hoc capite inueniri poterat. Fuitque, ut uidebatur, uera & antiqua huius capitis lectio *πισάκια ἢ σπία* *σπία γένος μὲν*, facili in una tantū syllaba ad uitiū lapsu. Idque etiā Plinius lib. 13. indicat.

De Nuce iuglande.

CAP. CLXXX.

Nuces iuglandes sunt difficiles concoctu, stomacho inutiles, bilio sæ, capitis dolorem inferentes, tussientibus inimicæ, & uomitus ris ieiunis in cibo aptæ. Cum Ruta uero, & Ficus præsumptæ, uenenis resistunt. Nec minus si a ueneni haustu comedantur. Largius esitata teneas latas pellunt. Illinuntur mammarū inflammationi, abscessibus, luxatibusque cum mellis exiguo & ruta. Cum cepa autē, sale & melle, canis, hominisque morui proficiunt. Tormina, cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ, sedant. Putamen combustum, tritumque in oleo & uino, infantū capite peruncto, nutrit capillum. Alopecias replet. Sistunt menses nucleis uisti, si triti ex uino admoveantur. Idem e ueteribus illiti carbunculis, gangrænis, & ægylopijs medentur. Alopecijs commanducati & impositi præsentī sunt remedio. Nucibus tussis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt, & suauiores. Itaque allio mistæ eximunt acrimoniam. Liuios in corpore illitu tollunt.

BARBARI COROLL.

Caryon basilicon, id est, Regia nux uocata, fructificat autumno. Arbor Careæ græce dicitur. Notum in ea est, calliculacæ tegumenta totidem, quot flores fuere, contrahi pediculo, singulisque his singulas includi nuces, duplici munimento protectas, puluinato primū calice, mox ligneo putamine, quot modis & fortis in parente, hoc est, utriculo atque uentre. Propterea Fescæ

A

πισάκια

Pli. li. 23. ca. 82

B

καρύα βασίλιν

Pli. li. 11. ca. 22.
28. Macrobi.
lib. 3. cap. 18.

Cinix locutionis comites, & religiosas nuptijs, uerisimiliusq; hoc, qd cadendo tripudium faciant, elidendo uirginu puellarum clamore. Germinat hæc non cacumine, ut maxima pars arborum, sed lateribus impulso priore pululo. Quæ forma & caudex totus, & prægrandes rami crescunt. Hoc & Auellana faciunt, & quibus germina in folium unū procumbunt uidelicet: quia desit initium unde germen erumpat. Medulla nucis quæ in ligno ipso continetur, lica dicitur Aetio. Forte ut alia quoq; multa, deprauate a latinis id acceptum, quasi esca, quoniā pro igniario & cauterio quoq; sit medicis. Mutari hanc in quercum senio, nonnulli produnt. Transulere Iuglandem reges e Perside, ob id regiae nuces appellatur. Caryon uero, a capitis grauedine, propter olacitatem uocatā, nemo dubitat. Et enim arborū ipsarum, foliorūq; uires, in cerebrū penetrant, hocq; in cibis nuclei earū, minori momēto faciunt. Tinguunt cortice earū lanē, & capillus ruffatur. Primū prodeuntibus nucleis, id compertū, infectis tractatu manibus, pinguescunt uetustate. Sola differentia generū in putamine duro, fragili, tenui, crasso, multis loco simplici. Solū hoc pomū natura compactū cinxit operimēto. Nāq; sunt bifidæ putaminū carinæ, nucleorūq; illis quadripartita distinctio, lignea intercurrente mēbrana. Hæc arbor an fuerit in Italia Catonis æuo, nō constat: quoniā græcas nominat, quas quidā in genere Iuglandū seruāt. Sunt & Galbæ, siue Caluæ. Itē Prænestinæ, ab eodē Catone dictæ: quas maxie laudat, & conditas fistilibus in terra seruari uirides meminit. Postea Thasiæ, & Albenses pbari ceptæ. Et Tarentinarū duo gñā, fragili putamine, & duro, quæ sunt amplissimæ & minime rotundæ: quas a frangēdi mora Moracias, & Moracillas sunt qui uocent. Præterea Molluscæ, putamen rūpētes. Macrobius, qui Persicū uulgo dictū Molluscā nucē esse putat, aperte hallucinatus est, cū is nō de Persico, sed de nucē regia & Iuglādē q̄ sit e Perside cōuecta primū ad nos, Molluscā intelligat. Nā a quibusdā Nucē persicā uocari tradit, Sueuū hoīs doctissimi testimonio fretus. Thasiā quoq; nucē, atq; Græcā, Amygdalarū esse gñis, Cloatius existimat. Prænestinā Macrobius eandē esse cū Auellana, Varronis & Neui auctoritate meminit. Iuglans a iuuādo & glāde, siue quasi Iouis glans, literis intercis appellatur: siue quasi diu glans, id est, Diosbalanos Theophrastū uocasse Cloatius auctor est. Sed certe Diosbalanos Castaneā Dioscoridi signifi-
Dcat. Proinde nō parcius errauerit Nonius Marcellus, qui Iuglandē pro syluestri nucē interpretatus est. Biferas Iuglādes, Siluaciano patauini agri uiculo prouenire satis constat. Fomites ex hac nucē Mnecor optimos fieri cum dixit, de Iuglandē uidetur intellexisse.

EX M. VERG. COMM.

Cvr Persicas, & Regias Græci, Romani uero Iuglandes in genere nucum eas dixerint, quas nunc priuatim Ehruria gentesq; alia multæ nuces nominant, satis Plinius lib. 15. cap. 12. declarat, quare nos ea de re superfedebimus.

Barbari tamen superstidosam interpretationē nō probamus, qui quod hic *Ανταρ* dixit, nihil aliud significās, quā quod ægre in stomacho concoquitur, & quod Plinius difficiles concoctū ait, residens in corpore, & difficile transire dixerit, longiore q̄ decuit uerborū ductu, nec satis apto uerborū intellectu. Quando aliud iudicio nostro est, ægre concoqui aliquid, & aliter dicit residere aliquid in corpore, nec facile transire. Nec obstat, qd & Varro usus hac uoce est, sed tamē quod aptius & certius in Dioscoride ad medicinā dici debuerat, desideramus.

De Nucibus Auellanis, CAP. CLXXXI.

Nuces Auellanae, quas & Leptocarya uocant, stomacho infestæ sunt. Ipsæ tamen tritæ, & in aqua mulsa potæ, tussi ueteri medentur. Tostæ, & cum exiguo piperis potæ distillationem concoquant. Crematarum cinis cum axungia, aut adipe ursi perunctus, alopecij capillum reddit. Aiunt nonnulli, usta earum putamina, & in cineris speciem redacta cum oleo, cæsiarum oculorum pupillas infantibus denigrare, perfuso sincipite.

BARBARI COROLL.

NVx Auellana, quā Græci Heracleoticā appellant, nostri Prænestinā, & Abellinā patriæ uocabulo. In Asiā Græciāq; uenit e Ponto, propterea nunc Ponticæ, nunc Heracleoticæ dicitur. Quo nomine Macrobius, Castaneas intelligi falso putat, Oppiū secutus. Ponticas, sunt qui & Alareas nuces cognominent. Inuenio & Alariā uocari, arborem unde iacula & hastæ fabricari sole-

νάρυα ποντική

Pli. lib. 15. ca.
22. Macrobi.
lib. 3. cap. 18.

atari soleant. Auellanae sunt ex arbore, quae Corylus dicitur. Has mollis quidem tegit barba, sed putamini nucleisque solida. Rotunditas contra, quam Juglandibus. Umbilicus Auellanis, et in uentre medio. Torrentur ex cibus. Corylus neglecta comest in fruticem: quae si quis eam minus subluet, fructum meliorem & copiosorem ferre traditur: ut quae naturae suae proprietate fructuosa sit. Tonderi tamen, reserarique precipiunt: ita fructuosam reddi. Alioquin si arbore scire patiatur aliquis in corpulentiam & magnitudinem, alimentum omne sumptit. Florere negant hanc aliquid, sed floris uice quosdam in ea uillos erumpere. Huic simul fructus decedit, uicemque callus innascitur, magnitudine uermis grandiusculi pinguis, singulo pediculo copatilis: kulu uocant. Dehiscit uere ac defluit, cum folia emergunt, simili omnino sorte qua Cachrys in robore, abiete, ceterisque amentiferis. Syluestris prius natura: quam hyemis patetissima, & montibus magna parte prouenit. Nec urbanae fructus magnopere in domum praestantior, folium urbanae maius. Seratumque ambitu utique. Alno simile, tamen latius. Coryli, alie nucem rotunda, alie oblonga ferunt. Candidiore urbanae, meliorem in aquaticis. Translati mitescunt syluestres. Cortex sumus, tenuis, pinguis, & maculis albis uariis, materies lenta, praegraciles eius uirgae desquamantur, crassiores derasae interpolantur. Medulla tenuis sufflata, quae dematur.

EX M. V E R G. C O M M.
 Eπεριχέμειν τοῦ ἐρίμματος, parum recte perfuso capite transtulit Barbarus. Neque enim ἐρίμμα caput graecis est, sed anterior tantum capillata pars, si Galeno in anatomia credendum est.

De Moro. CAP. CLXXXII.
 MORUS arbor nota est, cuius fructus aluum soluit. Stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem praestat Mori succus. Decoctus autem aereo uase, atque insolatus adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes, addito melis exiguo. Sed inolefcit uis eius adiecto scissili alumine, galla, croco, & myrrha, item myricae semine, iri, & thure. Immaturo Mori poma siccantur, tulaque acinorum rhois uice obsonijs miscentur, ut coeliacos iuuent. Radicis cortex decoctus in aqua, et potus aluum resoluit. Latas uentris tineas excutit. His quoque auxiliatur qui aconitum hauserunt. Folia ex aceto illita, ambustis igni medentur. Tinguntque capillum, uitium & fici nigrae frondibus simul coctis in aqua coelesti. Succus foliorum cyathi mensura potus, contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruescenti corticis, & foliorum iure dentes apertissime in dolore colluuntur. Radix circiter messeni incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit, qui postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est. Tuberacula discutit. Et aluum purgat.

B A R B A R I C O R O L L.
 MORO succus in carne uinosus. Trinit colores. Candidus, mox rubes, maturo niger. In nouissimis floret. Inter prima maturefcit & transuolat. Tingunt manus succo. Matura eluunt, acerba pilu corijs folia eius in urina madefacta detrahunt. Minimu in hac arbore ingenia profecerunt, nec nominibus, nec insitionibus, nec alio modo quam pomi magnitudine. Mora differebant Hostiensia, & Thufculana Romae. Autores graeci, Moru inserunt castaneae, phago, terebintho, piri syluestribus, malo, ulmo, populo, quae sit alba: unde candida nascant Mora. Nascuntur & in rubis, multu differente callo: quae Maratha nominant ab Hippocrate. Quam corrupta fortasse lectio est, nec μάραθα ἀπὸ βαρῶν, sed μόρα τὰ ἀπὸ βαρῶν scribere oportuit. E pomo arboris Mori Panchrestos stomatice, eadem Arteriace appellata, pluribus modis fit. Neque est aliud oris, arteriae, uicem, stomachi iucundius remediū. Hoc et uulnera ad cicatricem pducebat. Succus sic cato expressus pomo, multu saporu quae obsonioru confert, ab Hippoc. Rhoon quoque dictus. Mora germinatione priusquam in folia exeant, sinistra manu decerpi iubet. Futura poma Ricinos, siue ut quida legunt, cytinios graeci uocant. Si terra si non attigere, sanguine sistunt alligati, quacumque parte fluat.

A

μόρα ἢ οὐκ
 μίνα.

B

Pli. li. 15. ca. 24.
 The. li. 4. ca. 2.

μόρα ἢ οὐκ
 μίνα.

μόρα ἢ οὐκ
 μίνα.

D I O S C O R I D I S

C Ad hoc seruantē repositi. Materia utilis operibus, quę flexu cōstet. Ideo furculas ex ea circosq; faciūt, ut ex caprifico q̄q;. Itē nauibus tornacula, ut ex fraxino, ulmo, platano. Quanc̄ e Plata no celerit putrescūt. Itē auriculas liburnicis, & testudines atq; firmamēta. Mora in Aegypto & Cypro sui generis habent, ut mox dicemus. E ficu Aegyptia et Cypria, Sycaminō gręci pomū ipsum uocant, Sycamineā, & Sycean, & Sycen q̄q; ipsam arborē Hippoc. Nā Aegyptia & Cy pria Sycomoros, & Sycomorea dici fere solent. Media Comœdia, Sycaminō uocat et pomum & arborem, sed pomū neutro, arborē masculino gñe, ut apud Iuliū Pollucē notatū legīt. Hip pocrates Morum arborem, est quando Sycean, & Moreon quoq; dicat: ubi uidelicet radicem Syces, primo de foeminarum incōmodis uolumine requirit, ut Galenus interpretat. Inuenio & Modon scriptum in Hippocrate, pro Moro, nisi fallor, culpa librariorum.

De Sycomoro. C A P. CLXXXIII.

SYcomorum aliqui etiam Sycaminum, idest, Morum uocant, cuius fructus Sycomorum etiam propter inefficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans, folijs Mori. Pomum ter aut quater in anno fert, non ramis ut ficus, sed caudice ipso, caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus. Quod nō maturescit, nisi ungue, aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, locisque non multū tritici feracibus, ubi prouentu fecundo iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum alio utile est, sed nullam præbet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus tenera arbore antequam fructum ferat eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato. Si enim alio re plaga uioletur cortex, nihil effluet. Spongia, aut uellere lachryma excipitur, quæ siccata & in pastillos coacta reponitur. Vis succi emollit. Vulnere conglutinat. Discutit collectiones coctioni repugnantes. Bibitur etiam, aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & horrores. Celerrime pomum teredinem sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quod Vlmus esse uideatur, folijs Sycomori, fructu Pruni crassitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis.

B A R B A R I C O R O L L.

Macrobius. li. 3. ca. 20. Plinius. li. 13. capite. 17.

Humor humorem siccatur

Ficus Aegyptia, siue Morus, quam, ut Celsus ait, & Morosycon appellant. Fructum hanc nō caudice, sed ramis fere qdam falso tradunt: cum ueriores sint, qui utroq; nasci prodāt. Magnitudo, aspectusq; pmo fici, succo tñ & sapore caprifici. Sed dulcedo copiosior sine granis interioribus, scalpēdo tñ ferreis unguibus, nec aliē maturescit. Quod cū factum est, quarto die decerpitur, alio subinde atq; alio subnascēte terno, ita ut etiam septeno numerosa partu p singulas ætates, multo lacte abundante. Subnascit etia si non scalpāt, quater æstate, priore impellendo foctū, q sitimaturus. Arbor nostrati Moro similis folio, magnitudine, cōspectu. Materies int̄ pauca utilissima. Cæsa statim uirot. Siccat merfa incilibus atq; stagnis. Cū fluitare cœperit, tempestiua opibus intelligit, ablato ita pondere, ac soluta. Id probe inueteratę signū habent: uidelicet alienus humor, alium eius omnē rigando suggit. Huic similis est, quę uocat cypria Ficus, in Creta. Nam & ipsa truncō pomū fert, & ramis, cū in crassitudine adoleuerit. Distat a superiore: quod germina emittit, sine ullis folijs, radiculę similia, cui fructus quasi cuspidis accessu præpilatur. Caudex magnus, & Populo albę proximus. Folii ulmē quater germinat, quater suas ficos maturat. Sed grossus in ea nunq; excoquitur, nisi emissō incifura lacte. Suauitas pmo Fici, sed interna. Similitudinem caprifici habent. Magnitudo Pruni, uel Sorbi.

De Ficu Cypria iam dictum est in Aegypto.

E X M. V E R G. C O M M.

Theophrastus. li. 4. ca. 20.

CRediderunt Theophrastus & Plinius, in Aegypto tñ nasci Sycomorum hanc. Alter em̄ ubiq;

nō eius meminit, q̄ ut dicat, τὴν ἐν ἀγροῖς ἐνκαμνον, αὐτὴν ἀγροῖς ἐνκαμνον. Alter lib. 13. ca. 2. his uerbis de ea tradit. Et in Aegypto multa arborum gēa, quę nō alibi. Ante oīa Ficus ob id Aegyptia cognominata. Arbor Moro similis. Gręci ex utroq; Sycomorū, quasi ficū simul & morum, uel Sycaminon, idest, Morum tantum dixerunt. Ab illa nomen ex pomō, ab hoc & ab alijs ex arborum aspectu nomen factum est. Celsus aliquando Sycaminon, aliquando Sycomorum, interdum etiam Morosycon appellat, nisi uicium etiam in eo sit.

Illud etiā nō immerito querit, cur nā arboris huius pomū ob ignauū & inertē sapore Sycomorū uocat. Sic enī ait, καλεῖται δὲ καὶ ὁ ἀπὸ αὐτῆς καρπὸς ἐνκαμνον, διὰ τὸ ἄτονον τῆς γεύσεως. ex quibus aperte indicatur, non quia similis Moro arbor hęc sit, sed quod lāguido & inertē sapore sentiat. Et si id hoc sensu simpliciter accipiat, nō ab re suspicari aliquis poterit, non ἐνκαμνον, sed una tñ mutata litera, ἐνκαμνον, quasi satia et stolidi arboris ficū appellandū sycomori fructum esse. Id enim prima producta μῶρον gręcis significat. Nos tamen id nō probamus, credimusq; quod hic ait, διὰ τὸ ἄτονον τῆς γεύσεως, ad proprium eius saporem referendum esse, qui in eo sit, ut ait Plinius p̄dulcis, & sine interioribus frumentis, seu granis.

De Ficis.

CAP. CLXXXIII.

Fici maturę, recentes, stomachum lædunt. Aluum soluunt. Sed facile contracta ab eis fluctio sistitur. Sudorem euocant, papulasq; sitim sedant. Calorem restinguunt. Siccis, natura excalfaciēdi. Vires alunt. Sed sitim magis stimulant. Aluo utiles, Rheumatismis uentris & stomachi contrarię. Gutturi autem, arterię, renibus, uesicę, & ijs quos longa uoletudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus apertissimę. Feruefactę cum hyssopo, & potę, pectus purgant. Tussi ueteri, diuturnisque pulmonum uitijs conueniunt. Aluum molliunt, tussę cū nitro & croco, dein manducatę. Decoctum arterię, & tonsillarum inflammationibus gargarizatu prodest. Cum hordeacea farina cataplasma ti miscentur. Et in muliebres foris, cum sceno gręco & ptisana. Ceterum cum ruta coctę, torminibus infunduntur. Coctę, illitęq; duricias discutiant. Parotidas, ac panos emolliunt. Furunculos ad maturationem perducunt, maxime nitro, iri, aut calce addita. Crudę si cum antedictis tundantur, eadem efficiunt. Cum malicorio, pterygia purgant. Cum atramento sutorio, deploratis fere tibiarum fluctionibus, & cacœthicis ulceribus medentur. Quin & cum uino decoctę, addito absinthio & hordeacea farina, utilissime hydropicis illinuntur. Crematę cum cęrato sanant pernio-
nes, pruriges. Sonitusq; si crudę terantur, & synapi liquido exceptę auribus instillantur. Tam syluestri, q̄ satiaę Fici lacteus succus, coaguli modo lac contrahit, concretumq; dissoluit ut acetum. Exulcerat corpora. Venarum spiracula laxat. Soluit aluum. Vuluam aperit cum detrita nuce gręca potius. Menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut thyrrhenica cęra. Podagricorum cataplasmatibus cum farina scenogręci & aceto utilis. Lepras, lichenas, uirilignes, uitia cutis in facie, psoras, ulcera in capite manantia, cum polenta expurgat. Instillatum plagę percussis a scorpione, uenenatorum ictibus, & rabiosi canis moribus auxiliatur. Prodest dentium dolori lana exceptus, & in causis eorum additus. Verrucarum infirmationes tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem

D I O S C O R I D I S

C præstat succus e teneris ramis syluestris Fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo tusi exprimuntur, & siccatus in umbra reponitur. Et lac & succus imponuntur exulceratorijs medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramuli ficulnei, facilem afferunt decoctionem. Lac efficitur quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo surculo spathæ loco moueatur.

The. li. 4. ca. 5.
Pli. li. 13. ca. 7.
li. 12. ca. 5. li. 15.
ca. 28. 18.

F I C U S B A R B A R I C O R O L L

Fico circa Elephantium agrum folia non defluunt. Græci pomum Syca, & Palathen quæ uocant. Arborem uero Sycen, & Sycada. Quanquam Sycada nouellam ficum fere intelligunt, ut Iulius Pollux inquit. Nam Ischades, aride fici sunt, aut caricæ interdum. Inuenias apud Græcos Ischadas, recentes et ueteres quoque dici. Comœdia et Iscada, capti pro sicca, uidetur appellasse. Quanquam & Ischada Sophocles, pro anchora est ubi acceperit. Fici pomum Hegeteriam, ab Atheniensibus uocatum, quasi ante alias fruges inuentum, auctor est Athenus, etiam quibusdam festis præferre pompæ solitum in offis. Naxy, ficum ipsam Melichen appellant, a quo & Liberum patrem Melchion, seu inuentore eius uocant. Ut Lacedæmonij Sycitæ. Quidam gigantem nomine Syceam, Ioue persequente, in Ficum a tellure conuersum fabulantur: unde in Cilicia urbi nomen sit inditum Syceæ. Sunt qui Sycen, hoc est, ficum, Oxyli, ex Amadryade filiam, ut alias quoque arbores fuisse memorent. Pausanias in Attica primum editas putari tradit, Cereris munere, in memoriam hospitij Phytalo donatas: quod & in monumento eius testatum est uerbis hexametris. Ficus omnis, breui fere, nec procero caudice. Quanquam amplissimæ quædam inueniuntur, uel piris æmula magnitudine. Cortex ei leuis, laciniosa folia, & cruciformia, hoc est, ut Theophrastus inquit, *εὐκροτομή*, nisi quis *καρπυονομή* magis legendum putet. Nam Hippocrates, uere inquit, folia sunt Fico, pedibus cornicis similia. Ex interiore pomi huius semine, id est, minutis in eo granis, quæ Græci *κρυπταίδας* uocant, etiam caprificus nasci dicitur a Theophrasto. Germinat sub æstuum, post uer: quod tempus eorum, ne omnibus est, præsertim edomitis, ac præcipuè in Fico, uite punica. Ficus in Hircania dulciores multo, fertilioresque, ut modios. 270. singulæ ferant. Externæ sunt in Italia Chalcidicæ: quarum genera plura. Item Lydiæ: quæ sunt purpureæ, & māmillanæ, similitudinem māmaram habent. Calistrutiæ, parum sapore præstantiores, sed Græcorum iudicio prælatæ cæteris. Has & Ficus & Passarias uocari, Cæpitolinus auctor est in Clodio albino, Ficorum omnium frigidissimæ. Inuenio Psycalia uocari quoddam earum genus, ab algore. Nisi quis malit ab Atticæ regionis insula Psycalia. Sed an Calistrutiæ sint, quia frigidissimæ dicantur, mihi parum constat. Nonnulli sunt, qui Psycalia intelligant, quæ recentes non sint quidem, non tamen siccæ, Africanæ ab aliquibus præferuntur, cunctis celebratæ Carthaginis excidio. Et aliæ ab Africanis Libycæ. Habentur & Sulcæ, & Topicæ quæ dicantur. Patricæ nomen obtinent etiam Alexandrinæ, post dicendæ. Candidat Serina, cognomine delicata. Nigra est & Rhodia, & Tiburtina, præcoque. Sunt & Liuiang, siue ut alij uocant, Liuiæ pompeig, in usus annuos arefactæ foliis, aptissimæ cum mariscis. Et quas harundinei folij macula uariare dicunt, Harundineas ob id uocatas, a quibusdam Alfulas. Est & Herculanea, & Albicerata, & Aratia alba, pediculo minimo latissima. Cloacius & Alinastræ, Atram, Paluscam, Augustam, Biferam, Cucurbitanam, Leptolydiam, Mariscam, Numidicæ, Pullam, Pompeianam adijcit in nomine. Sunt apud Græcos Atticæ, delatoribus inde nuncupatis, præsertim Aegilides. Sunt & Laconicæ, item Phrygiæ. Item Phibalex Hippocrati. Androtrion Leucerineon adiungit, quas nostri Albiceratas uocant, albas Ficos ferentæ. Addit et Oporobasilidas, & Celuron, & Phormynion, & Megaricam. Et alij Toxaliæ sunt, & ex insula Paro Aemoniæ uocatæ, nihil a Lydijs distantes, colore sanguineo. Sunt & Amadei, et Coracei, & Nicoi, & Basilicæ, quas & Basilidas uocant. Hybernas Ficos, Cydoneas Græci appellant. Probabantur & e Zacyntho, quod & Plauti confirmata autoritas in Mercatore. Item Cimolicæ. Primo autem prouenit Porphiritis, longissimo pediculo. Comitatur eam e minimis & uilissimis appellata Popularis. Contra nouissima sub hyemem maturatur Chelidonia, hæc rubens est e nigro. Quæ porro nigra Ficus est, Barbachytræ dicitur a Græcis. Iulius Pollux, Chelidonia dicendo, Atticas inquit intelligimus, quas Lacedæmone Chelidonia appellabant. Sunt præterea eadē ferotinæ, & præcoces, bifere, alba & nigra cum messe maturescentes, atque uindemia, Serotina, a corio appellatæ duro, hoc est, ut Macrobius, Duricoræ, ex Chalcidicis trifero quædam prouenit. Tarenti tantum prædulces nascuntur, quas uocant Onas. Sunt & Sagun-

ting, Telianeq. Quibusdam prouincijs & Hibernæ, sicuti Moesiæ: non natura, sed ingenio. In Ficorum genere, Caricas peculiari arbore fert Syria, & minores, eius generis quæ Coitana appellant. Habentur & Gaunæ ominales, Marco crasso in Parthos mouenti. Gaunæ porro sunt, tam ex Cariæ oppidulo, unde nomen Caricis apud nos, ut conijcio, aperte ut multa, & ex Aeolica urbe Cauno cõmendabiles. Antiochenæ uero Caricæ, quas & Triphyllos uocant, ut inquit Strabo, ab Antiochia Phrygiæ Meandro apposita nomen habent. Omnia hæc L. Vi tellus in Italiam Tiberij principatu transfudit. Ficus unum genus, pomum super folij dorsum ferentis, circa Idam ostenditur, & ob id Opisthocarpion uocatum, Idæi cognomine. Ramosa hæc, neq. celsa, cubitali crassitudine, ligno ualido, cõtorto, lento, sine lacte. Pars quæ a terra est, leuis, enodisq. Superior comosa in orbem. Colos folio & cortici liuens, ac uiridis. Folium Tiliæ per omnia, sed molle. Flos mespilaceus, & cum Mespilo erumpens. Ficus rubra, magnitudine Oliuæ, rotundior, sapore Mespili. Radice crassa, ut Ficus quoq. cætera. Item lenta materies, incorrupta, corde solido, neq. medullaceo siue molli. Alexandrinam hanc ibi uocant. Nascitur & in mari ficus sine folijs, parua, rubro cortice. Quædam Ficum & Grossos ita ferunt in Cyprio, Cilicia Hellade, ut ficum aduerso folio, grossos auerso sustineant: cum reliquæ arbores sub folio pomum, ut protegatur, habeant. Laconicum genus uocatur, præcoces eas habens: quas Athenis Prodrõmos, hoc est, præcoquas atq. præcurrentes uocant. Eiusdem feracitatis est, & quæ a Theophrasto Leucomphalios nominata est. Idem autor & Charition, & Aration ficum nominat. Ficus maturas græci, Colythra, ut Philemon scribit, uocant. Seleucus Prote-ricen fici genus uocari tradit, primitiua eas ferentis. Habentur & alia Ficorum nomina, Cirocoelaidæ, Picridiæ, Hiladiæ, Sarcelaphiæ, Lapyriæ, Dracontia, Leucophiæ, Melanophiæ, Creneæ, Mylææ, Afcalonæ, Trallianæ, Rhodijs simillimæ, Bringidaridas. Quancq. barbaræ, tñ cum Atticis fere certantes. Prosenidas Pamphilus, Tithraffas Theopompus, generosas Plato in legibus, & ficus & uites quasdam commemorat, quasi nobiles: etiam si nobile a generoso, ut inquit Aristoteles, diuersum est. Fortasse illa genera intelligens, quæ dicuntur Aegilides, interficos, & racemos, Nicostraticos inter uuas: quæ duo Athenis maxime cõmendabantur. Ut racemos Hipponius, in Rhodo insula, Thracelinas, ad Lienam probari, apud Aetium inuenio. Morbus fici peculiaris, uermiculatio. Bestiolas eas uocant ceraftas, stridulum animal. Itè patella: sed aliter q. in olea: quoties uidelicet radices imbrium superuentu, quasi deglabrantur. Item crados, scabies, & cocleæ. Crados intelligitur, cum marcescunt ramj, quos priuatim cradas in Ficu uocant. Attici ficum ipsam Cradem nominant. Nam & machina, quæ in comædia Bellophontas, & Perseos, & deorum imagines in aere presentabat, crada appellabatur: quia species ea ficum imitaretur arborem. Inter morbos est & uredo, idest, κλαυθμός, & tabes quæ dicitur ἐν πλεῖστο, quasi quidam stupor, rigorq. Frigore hic & gelu, aliosq. annis contrahitur. Cõmunis hæc & alijs, quemadmodum & radicatio syderatioq. ἀστροβόλιος uocata, folliculus Fici, ut frumenti, a Varrone gluma dicitur. Ficaria quoq. grana, Plinius frumenta nominat: quas nos a græcis Cenchramydas uocari diximus, succus maturefcentibus lactis, percoctis melle. Tactus omnibus mollis. Maturis frumenta intus. Lacte satiarum coagulatur lac, syluestrium nequaquam. Aut minus probe fructus, ut in uite alba. Eo melior futurus intelligitur, quo lætius germen antecesserit, contra quam cæteris arboribus. Ficus sola, ex omnibus arboribus non floret. Lactis inquit Macrobius, proprie ficorum dicitur ficus. Tanq. non pomum fecerit a pomis apud idoneos autores, Afranium Ciceronemq. reperias. Fico fumus acerrimus, caprifiscoq. Item, cuiuscunq. lacteus cremor redundat, atq. ipsa hæc ramentum fluuiata de tracto cortice, mox siccata, minime omniũ tedio illo infestant. Quin & flammam quoq. mollissimam reddunt. Lixiuum quoq. cinere uehementer asperum. Quancq. ex Amygdalis asperum ignem excipere, optimas ficum & olea, contrariæ causæ faciunt. Ficum, lenta fungosaq. materies, oleam pinguis & densa. Senescunt ficus in arbore, anusq. distillant gummi modo lachrymā, ob id Athenienses, γυμῖον uocant earum folliculos, ut nostri glumas, quemadmodũ prædiximus. Siccantur, feruantur in capsis. Ebuso insula præstantissimæ amplissimæq., mox in Marrucinis, plurimæ in Asia, Ruspinæq. Africæ urbe. Panis uicem & obsonij habent, siccate, ac recentes quoq. Athletæ hoc cibo uires aluere, priusq. Pythagoras exercitator eos transferret ad carnes. Sale inueteratis, & casei quoq. loco uesci excogitatum est. Decoctũ, inquit Paulus, Ficorum, pleriq. Siræum appellauerunt: quod & defruto quoq. nomen est, Hippocrates Sydon. Studiosos uocis, abstinere Ficu græci iubent, Aeglesianactis Alexandrini exemplo moti, q. is tragœdiarum actor optimus euaserit, quia, is, annos a siqu temperasset. Produntur & de hac arbore prouerbia, Ficum post piscem. Legumina post carnem. Gallinæcos amantibus, ficum

D I O S C O R I D I S

C ne feritō, Assentari nescio, sicū sicū, panē panē dico. Sacra ficus Athenis uocabat, uia quē dū cit ad Eleusinem. Erat & Sicelensis Romę uia, quæ Nomentum ducebat, & Nomētana quoq; dicebatur, ex Viminali porta. Ceterum non a ficu, etiam si Plautus locum innuit, sed a figlinis appellata, quasi figulensis: q̄ ibi foderetur figlinum, ut ad Auentinum quoq; montem. Ficum atram, infelicem pontifices putabant, felicem albam. Quę autem felicia sint ligna, contraue, Macrobius libri tertij calce docuit, acrifolium inter ea numerans: quod quidem quale genus sit, haud facile reddiderim. Nec enim puto aquifolium posse legi, q̄ Aquifolium sit Ilex, quā felicibus annumerant. Recentiores certe, Agrifolium pro Faba gręca, siue quod idem est, pro arbore Loto capiunt. Sed Lotus felix erat arbor, ut idem Macrobius testis est. Scio Peucedanum quoq; Agryophyllon dici a gręcis. Inter arbores infaustas, & Alternus, & Sanguis, siue quod idem est, Sanguen, ab eodem autore collocantur.

Pli. li. 13. ca. 274

27. li. 23. cap. 74

Caprificus, Erinos a gręcis uocata, q̄ in Erineo Thessalię oppido primum apparuerit, ut Photioni placet. Longe ualidior est q̄ ficus, nullis fere uitij obnoxia, ut etiam fico insita grossos suas tueri credat. Interdū tñ inuadit eam scabies. Frequentissima in ficu, quoties post uergilias admissi sunt imbres, utiq; parui (nam largis causa omnis eluitur) flexilis materia. Nunq̄ maturefcit in ea pomum. Additur Fictis, ut culices alimento in ea fraudati, euolantes in ficos ferant: aperiantq; ora earū: atq; ita sole imisso & lacte absumpto, maturitati præparent. Eos culices ficarios, Aristoteles Psenas, ionica uoce appellat. Etiā si legat corrupte pferas. Dicunt autē Psenes, quasi galbę. nā & Psenes poetę cū dicunt, caluos & glabros intelligunt, ut est apud poetā Simonidem. Nos tñ Galbas, æsculi uermiculos uocamus, ut predictū est. Sūt in fico & Cetrinæ dicti culices, fucis apum ignauia maliciaq; similes. Interimendo em̄ utiles, & ueros culices utiq; ipsi cōmoriunt. Caprificatio a nostris hoc uocatur, a gręcis erinasmos, & sycasmos. Interim non arbor ipsa ferit, sed grossi ex ea pertuli, uelut sarta suspenduntur ad eundē usum. Theophrastus autor est, meliores quodā loco nasci ficos, sine ulla Caprifici ope: quas Anerinasta prædicari uendentium uoce scribat. Caprificus, tauros quamlibet indomitos collo eorū circumdata, cicures & immobiles præstare dicitur. Habetur & Ficus indica, cuius germina per ambitum radicare tradunt, neq; caudicem contingere, arbor magnitudine insigni, ut sub qua tres turmas equitum condi affirmunt. Caudici crassitudo sexaginta passus, Ramorum umbræ bina operiunt. Folijs amazonicæ peltæ amplitudo, formaq; ut Solinus inquit. In Hircania tam sæcunda est Ficus, ut medimnos. co. singulæ ferant. Est autem *μυδισυρος* modij sex ita-lici, utiq; atticus. Nam prolemaicus maior est, ut qui sesquiplus sit attico, sed exiguo pomō. Caprificus in Co insula, non bisera modo, sed trisera quoq; habet. In Gallia transalpina, Strabo similem Fico nasci tradit arborem, fructu capitulum corinthiacę columnæ referens: cuius lacte mortifero, sagittas suas illinant, infami alias temperandi uenena, cœlo non pridem aboleri cœpta: eius rei nota Gallijs, ut hoc forte Virgilius intenderet, cum de Cimbri Tullio, qui frateem ueneno sustulit, in senario locutus est, de quo inter odoramēta diximus.

De Grossis.

CAP. CLXXXV.

ἀγρία οὐκ

GR O S S I, quæ Erinei nonnullis uocantur, coctæ, illitæ & strumas nodosq; omneis emolliunt. Crudæ, formicantes uerrucas, & thymos nitro farinaq; additis tollunt. Folia eadem possunt. Illita cum sale & aceto, ulcera in capite manantia, epinyctidas, & fufures sanant. Iis ficosæ extuberationes, & genarum scabriciæ perfricantur. Nigræ ficus folijs cauliculisq; candidę uittilignes perunguntur. Faciunt ad canū morsus & ulcera, quæ Ceria, idest, fauōs uocant. Grossi cum syluestris papa-ueris folijs, ossa extrahunt. Furunculos cum cœra discutiunt. Contra muris aranei morsus, & scolopendræ uenena, cum eruo & uino illitæ auxiliantur. Fit ex cinere ficus tam syluestris q̄ satiuæ lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod subinde macerari opus est & inueterascere. Siquidem inter caustica intelligitur. Gangrænis prodest. namque expurgat & consumit quę excrefcunt. Quo utendum ita est. Spongia assidue hoc

lixiuio imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & infuſiones ue-
tuſtas, & ſinus cuniculati exedentes, magnosq; inſtillari conueniet. Et
enim purgat, conglutinat, carne replet, & oras committit, non ſecus atq;
emplaſtra quæ cruentis uulncribus inſciuntur, Enhæma uocant. Bibi-
tur ad diſcutiendum ſanguinem concretū, & contra præcipitationes, ru-
pta, conuiulſa, cum cyatho aquæ recenter colatū, addito olei exiguo. Cœ-
liacis, dysentericis per ſe cyathus datus prodeſt. Nerviū uitijſ, conuul-
ſionibus cōmode illinitur ex oleo, ut pote quod ſudores moueat. Aduer-
ſus gypſi potum, & phalangiorum morſus bibitur. Hæc eadem præſtant
reliqua lixiuia, præſertim quernum. Omnia tamen adſtringunt.

BARBARI COROLL.

Groſſulos, atq; Groſſos, Græci Olynthos, & Erineos uocant, de quibus in fico & ca-
priſico abundanter egimus. Sed Groſſi proprie Olynthi ſunt, hoc eſt, primitiua ficus. Apud
Macrobiū, Groſſos legas ficos eſſe, quæ nūq̃ matureſcunt. Alij ſic diſtinguunt, ut ficus
primo ſit Olynthos, deinde Pheix, poſtea Sycon, poſtremo Iſchas. Frōdes ficus, Græci
priuatim uocāt Thuria, Nicander & papaueris folia ſic appellat. Eſt &edulj genus Thron, ut
aliubi notauimus.

Cinerem lixiuium, Conſian Græci appellant: de quo dictum in Ficu a nobis eſt, aſperita-
te inſignem, ex eo ligno eſſe, aſperiores ex Amygdalo.

De Perſea.

CAP. CLXXXVI.

Perſea arbor eſt, in Aegypto fructum ferens cibo idoneum, ſtoma-
cho utilem, in quo Phalangia cranocolapta nomine inueniuntur,
præſertim in Thebaide. Arida folia illi ſanguinis eruptiones ſiſtunt.
Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perſide exitioſam eſſe, transla-
tamq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

BARBARI COROLL.

Perſeam arborem, Aethyopia & Aegyptus habent ſolæ. Perſicum Aegypti Plinius, appel-
lare quodā loco maluit, hilarem intuitu, piro ſimilem per omnia. Semper autem folia habet, &
pōma, ſubnaſcentibus alijs. Maturitas per Eteſias. Alio tempore crudiuſcula decerpunt, ac re-
ponunt. Magnitudo longioris piri. Amygdalæ putamine includitur, & corio, coloris herbidi
nucem intus habet, ut prunū, ſed minore multo mollioremq; ſuauiſſimam carni prædulcis, & in-
nocua etiā largiorem mandentibus. Concoctu & deiectu facilem. Radice prægrandi. Materies
longitudine, craſſitudine, copia, inter cōmodiſſimas bonitatē, firmitudine. Nigritia quoq; ni-
hil differens a Loto ea, quæ ſabam græcā uocamus. Simulacra ex hac, & lectulos, & cubilia fa-
ctitauerē, non tam decore ligno q̃ ſideli, ut quod magna ex parte ſit contortū. Proindeq; naua-
le tantū eſſe cœpit. Hanc aliqui rubefcentibus Myxis fecerē ſimilem. Perſeam hanc, non Perſi-
cum, ut diximus, e Perſide in Aegyptum tranſlatā a regibus tradidit, propter ſupplicia: quod
niā uenenata ibi eſſet, quod eruditiores tamen conſtātē negant: ſed a Perſeo Memphi ſatā ſa-
tenē, & ob id Alexandrū illā coronari uiſtores iſtituiſſe in honore Atæ ſui. Fortaſſe Theophrā-
ſtus hanc intelligit, cum textilem Perſicā in Aegypto plurimā nemore Thebaico fuiſſe ſcribit.
In quo & Aegyptia Spina, & olea, & quercus habeant, ut textilem a coronæ uſu dixerit. Qui
dam pro cucu capiūt Palmæ ſimili, cuius folijs ad nexus & textilia utant, & Perſicā textilem uo-
catā putant: quia Perſis in magno honore fuerit. Aliā a Perſea, de qua Dioſcorides præſenti
mentionē loquitur. De Perſea porro hac Columellæ uerſus illi fortaliſſe fuerint.

Quin etiā eiſdem gentis de nomine dicta.

Exiguo properant miſcere Perſica malo.

Plutarchus auctor grauiſſimus, Perſeam arborem inter omnes Iſidi gratiſſimā, & in Aegypto
maximè celebrari tradit: quia fructum ſerat cordi ſimilem, ſolium uero linguæ.

n ſij

C De Iberide. CAP. CLXXXVII.

Iberis, siue Cardamantica, folia habet Nasturcij, uere uiuentia, caulē cubitalem, aut minorem. In incultis nascitur. Aestate lacteum florem promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturcio similes habet, calfacientes, & adurentes. Ipsae enim ischiadicis cum salsa axungia emplastro utiles, quaternis horis alligatae, ut dein in balneas descendatur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

Pli. lib. 27. ca.
8. 12. & lib. 26.
cap. 9.

Hiberida, siue Hiberiada, & Hiberiden herbam comperit Seruilius Democrates, assignato etiam inuentioni eius senario. Nascitur maxime circa uetera monumenta, parietinasque, & inculta itinerum. Semine tam paruo, ut aspici uix possit. Radici odor nasturtij: de quo Cardamina, & Cardamantice, & Apollonio Cardamen, & Hiberitis appellata est. Vfus aestate melior, & recenti tantum. Tunditur difficulter. Galenus Hiberida eandem esse cum Lepidio uocata conicit. Carmen quoque Democratis ipsius praetexuit, ex eius libro qui Clinicus inscribitur. Multa de hac Archigenes, in epistola ad Aristonem, eamque Lepidion & Agriocardamon, id est, syluestre Nasturtium uocauit. Vidimus hanc Venetijs, specie qua describitur a Dioscoride ac Plinio. Illud adijcimus, folia ei pusilla esse, qualia Nasturtio. Semen quoque in siliquis admodum pusillis, tam exiguum, ut cernere non liceat. Flos item pusillus, & lactei candoris. Differt Hesperis ab Hiberide. Nomen uero Hesperis inuenit, non ab Hiberia, sed ab re: quoniam ut Theophrastus inquit, nocte plus oleat quam interdiu, contra quam herbarum plurima.

D De Halicacabo. CAP. CLXXXVIII.

ἡλικάκωσος

Halicacabum aliqui Dircaeon, alij Strychnon, alij quod insanis lam faceret Manicon, alij Dorichnyon, quod cuspidēs eo tingentur, appellauere, Rhomani Apollinarem minorem, aut Vlticanam herbam. Alij Oplaginem, Daci Cocalidam, Aphri Cancabon. Frutex est multos habens ramos, fractu peruiaces, surculosos. Folia plurima, pingua, Cotoneae malo similia. Florem rubrum. Acinum in foliculis paruis croceum, ciceris magnitudine. Semina quina, senaue Erui modo rotunda. Nascitur in petris non procul a mari. Huius succus cum uino potus drachmae pondere somnum conciliat, ut papaueris opium. Semen urina cit. Dantur hydropicis duodecim corymbi. Plures aut potius mentis alienationem creant. Remedio est aqua multa copiosa potui data. Succus & cortex miscentur pastillis, qui doloris sensum auferunt. Decoctum in uino si in ore contineatur, dentium dolorem mitigat. Radicis succum melle illitus, oculorum hebetudines discutit.

DE Alicacabo una Strychni, hoc est, Solani specie, quarto uolumine differet: ibi quae hic in Dioscoride leguntur repetita sunt ad uerbum fere: quod libro quarto pro secunda Solani specie, primo pro tertia uideretur accepisse: nec Alicacabum ibi hanc appellat, sed quod uerius est, Hypnoticon. Alicacabus enim uera est, quae quarto uolumine describitur.

¶ Finis LIB. Primi.

PEDACII

DIOSCORIDIS

De Medicinali materia. LIB. Secundus.

IO. RVELLIO interprete.



PRIORE, charissime Ari, libro, quem de Medicinali materia condidimus, de aromatibus, oleis, unguētis, arboribus, & nascentibus in eis succis, lachrymis, seminibusq; differuimus. In hoc autē secundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frumentis, atq; oleribus explicabimus, subnexus herbarum quæ acri prædita sunt facultate: utpote quæ cum ipsis cognatione iuncta sint. Qualia Allium, Cepa, Synapi intelliguntur. Idq; ideo, ne cognatorum vires disiunxisse uideamur.

M De aquatili Echino. CAP. I.
Marinus Echinus stomacho uentricq; utilis est. Urinam cit. Huius testa recens inassata, commode medicamenti ammiscetur, quæ pforas abstergunt. Crematæ uero cinis, sordida ulcera expurgat. Luxuriantem carnem reprimat.



HERMOLAI BARBARI

Patricij Veneti, & Aquileiensi Patriarchæ

Corollariorū LIB. Secundus.

ERINACEVS marinus, quem Græci Echinos thalassion appellant, alius piscis est ab eo, qui Echneis, hoc est, Remora, siue Remeligo dicitur, adhærens nauibus, & medio mari cursus earum impediens, palmari crassitudine, pedali, semipedaliue amplitudine, magnæ Limaci similis, Odyngion appellatus a quibusdam, quia partus grauidis adalligatus, resoluat in ueteratus sale. Alij & muricis genus quoddam hoc nomine, potentiaq; accipiunt. At Echino, id est, Erinaceo, spinæ pro pedibus sunt, quibus uoluit in orbem, nec aliter ingredit. Itaq; detritis sæpe aculeis inueniunt. Ex hoc gñe appellamus Echinomeras, & Iulius Pollux, Metras: quibus spinæ longissimæ calicesq; minimi. Neq; omnibus idem color uiridis. Circa Toronem candidi capiuntur, spina parua. Oua omniū amara, quina numero, nec nisi per hyemem, atq; plenilunijs. Ora in medio corpore in terrā uersa. Tradunt sauitiā maris prælagire eos, quoties correptis operiuntur lapillis. Echinos aliqui & Patangas nominant. Sed Aristoteles tria eius genera dinumerat, Ouarios, qui & mandatur, Patangas, & Bryllos. Haberi & fluuiatiles Echinos, Paulus Aegineta prodidit.



MARCELLI VERGILII

in Dioscoride ANNOTATIONES abbreviatæ.

MRIA hæc una Echini appellatione Græci indicauerunt. In mari, & in testaceo genere piscis, cui natura est, spinis quasi pedibus, & earū in orbem uolutatiōe ingredi. Mox in arida, & in quadrupedum genere, quod nouerunt rura omnia, animal aculeato omni corpore, præterq; ore, pedibus, & ex inferiore parte, infestis & ad uulnus semper paratis spinis, quibus salutem uitamq; suam, a canibus & uenatoribus tueri posse se credit: cui natura sit, in periculo in globum circumagi, nec nisi spinas ostendere & porrigere. Quam ob causam Acanthon etiam Græci id uocant. Postremo Castaneorum, a consimili

Exuv. Echinos
B

Phil. 32. ca. 112

C spinarum figura & noxa, summum illud operimentum, quod pauloante descripsimus: de quo satis dicta hæc sint. Quod enim ad terrestrem pertinet, a marino statim dicitur: cum pleraque legentes in eo monuerimus, quorum id primum erit. Non probari ab Aristotele libro. 4. de animalium historia, ad sciendam urinam marinos Echinos omnes, sed ex multis quæ ab eo illic numerantur unum tantum genus, quod in exiguo corpore longissimas & durissimas spinas habet, nec nisi in altis gurgitibus inuenitur. Verba eius hæc sunt. *πρὸς δὲ τοῦ τοῖς ἄλλοις μικρὸν ἀκάνθας ἔχον μεγάλας καὶ σκληρὰς γίνεται δὲ ἐν τῷ θαλάτῃ ἐν πολλαῖς ὀργάνοις ὡς χρῆνται πρὸς τὰς τραγῳδίας τινος.* Estque eorum sensus qui antea dictus a nobis est. Legentes monemus, etiā uideri nobis nō esse integrū, quod in omnibus græcis passim legitur, ὅτι τὸ ὄσραν ὧμὸν μίγνται χρῆσιμῶς ὁ πῆ- θεν τοῖς περὶ τὰς δώρας σμήμασιν. Si enim quale id membrū est uertatur, non aliud fiet sensus quam cruda marini Echini testa misceri utiliter tosta his, quæ ad extirpandas scabies cōficiunt. At qui possunt, nulla intercedente copula, aut dictiōe alia, simul præcipi & doceri, cruda, & tosta: Necesse itaque omnino est, aut copulā intermiscere, quod nos fecimus: aut disunctionē, quod forte fuit, aut (quod nos magis credimus) suspicari aliquot deesse illic uoces, quibus in cruda Echini testa uis, usus, aut remediū aliquod doceretur: cui deinde de tosta & cremata subiiceretur, quod ad læuigandas cutis asperitates pertineret. Id enim cineres, præsertimque marinarū testarū maxime possunt, ut in Purpuris mox patebit. A qua potestate longius cruda abesse uidentur. Neque in huiusmodi remediōrū rationem facile admittuntur.

De terrestri Herinaceo.

C A P. II.

χερσαίος ἔχινος

Terrestris Herinacei corium combustum, alopecij cum pice liquida aptissime illinitur. Afficcatum corpus, & cum aceto mulso potum, renum uitij auxilio est. Item aquæ quæ cutem subijit, conuulsionibus, elephantia, & male habitis, quos cachecticos uocant. Viscerum fluxiones exiccat. Eiusdem iecur testa insolata arefactum, ad eisdem usus utilissime reconditur.

καχέκταις

D

Pli. li. 31. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.
Erinaceus terrestris, id est, Echinos chersæos, & Acanthion epigios, uallatus est aculeis extra quam ore, pedibusque, ac parte inferiore, quā rara tantū, & innocua lanugo operit. Vbi uenantem sensere, conuoluuntur in pilā, ne quid apprehendi possit præter aculeos. In desperatione urinam reddunt rabificā, spinis, & tergori propter quod petuntur. Ideoque artis est, uenari eos exinanito prius lotio, Capri, aquæ calidæ aspersu resoluuntur, & suspensi posteriorū pedum altero, enecantur inedia. Hac cute uestes expoliuntur. Cibos sibi præparat in tempus. Etenim uolutatus supra poma iacentia spinis affixa, unū non amplius tenens portat in cauas arbores. Idem mutationes aquilonis in austrū prænunciat, condens se cubili. Echinos, Græcis uas æreum significat, in quod testimonia coniecta signabatur. Sed & foeni partem, & ollæ genus. Item muliebris ornamentū non dissimile omnino brachialibus, & armillis. Pollux auctor. Dicuntur & in casta neis Echini. Eos tamen latine qui Erinaceos uocant, non inuenio.

E X M. V E R G. C O M M.

Credidit quondam antiquitas, homini ut pleraque alia animalia inuidere etiā terrestrem Erinaceum. Testaturque id Theophrastus est in eo quod reliquit commentariolo de his animalibus quæ homini inuidere dicuntur, quæ ille multa numerauit, Stellionem, Ceruum, Equum, Phocam, Lyncem, & pleraque alia. Quorum Stellio exutam uere tuniculam, anguium modo deuorat, statim comitialibus utilem: cuius rei & Plinius testis est libro trigesimo, capite tertio. In locis fenestrarum, aut sepulchrorum cameris frequens hoc animal inueniri ostendens. Solereque, qui eorum membranas has uenantur, incipiente uere, ex fissis harudinibus textas, illis ueluti calas opponere: quarum angustijs id animal gaudet: eoque facilius circumdatū torporem exiit, quo inter harundines eas relicto non possint remeare. Nec ultra Plinius quicquam dixit, quam nullum animal fraudulentiū inuidere traditum esse, cogitandum legentibus quod nos dicimus relinquens. Ceruus dextrum cornu terra obruit, contra rubetarum uenena necessarium. Equus pulli sui hippomanes præcipit, ad amoris ueneficia quæsitum. Phoca coagulum euomit, isdem comitialibus optatum. Et Lynx urinam suam celat, multum in medicina usus, & in delictis uitæ ad anulos expetit. Sed omnia falso inuidere homini creduntur. Nullus enim brutis inuidiæ contra hominem sensus est: metuque perturbata, aut aliter affecta id agunt anima-

lia hæc. Verisimileq; est Phocā, cū capi & teneri se sentiat, metu, doloreq; id pati. Sigdē in eodē affectu, idē aliquando hoīes animo p̄turbati patiunt. Et Stellionē tuniculā suam, & equū pulli hippomanes eodē, aut nō dissimili naturæ affectu deuorare, q̄ canes & fues a partu statim secū das suas etiā deuorare dicuntur, Lynceſq; & Ceruos ignorā nobis habere eius qd agunt aliquā cām. Multa em̄ huiuscemodi brutā agunt, quorū reddi rō a nobis nō potest. Ex hoc animalitū hominī inuidentitū gñe, terreſtris Erinaceus antiq; esse creditus est. Is em̄ teneri se sentiens, metu, affectuue alio p̄turbatus, in globū se circūagīt, circumastuſq; noxiā spinis & cuti suæ urinā remittit: cuius cōtagio corruptæ, nec multo post deciduæ spinæ, desinūt in artibus habere usū, & in medicina coriū inutile fit. Eius cinere ad Alopecias nō hic tm̄, sed ueteres Græcorū medici, & Plinius p̄cipue utunt, ob egregiā siccādi, discutiendiq; uim quā habet. Qua etiā potestate in ueterata eius caro hydropi, quē Græci, Anasarca, uel Hypofarca uocāt, mederi a Dios. dicta ē.

De Hippocampo. CAP. III.

Hippocampus marinum animal est, exiguum, cuius cremati cinis cum liquida pice, aut axungia, seu amaracino unguento illitus, alopecias replet.

EX M. VERG. COMM.

Credimus olerū & plantarū erucas, quas Græci Campas dicunt, marino pisci a similitudine nomen dedisse. In locustarū enim genere Hippocampus a ueteribus numeratur. Breuem, paruumq; hunc piscem scriptor hic ait esse, & nihilominus magnitudinis nota illi coniuncta est. Quod enim Græci hippo, multis in natura adiſciunt, grande significat, ut in Hippofelino, & Hippomarathro, aut Hippolapatho indicabimus. Sed id sic intelligendum est, ut comparatū hoc animal, olerū, aut arborū erucis, grande sit: marinis uero beluis & piscibus, breue & paruum. Nec aliud hic intelligi uoluit dicens, paruum esse marinum animal.

De Purpura. CAP. IIII.

Purpura uſta exiceat. Dentes abstergit. Excreſcentias in carne cohibet. Vlcera purgat. Et ad cicatricem perducit.

BARBARI COROLL.

Purpuræ, a Græcis Porphyre nuncupantur. Hinc ipsas quoq; uestes Purpuras uocamus, auctor est Theopompus, tū quondā precū fuisse, ut æquall argento penderentur. Nemo ignorat, Ostreorū quoddā genus esse purpurā: idq; sanies eius, quæ testis detractis colligereſ, Ostrū, ut Viſtruius inquit, appellata est. Ostrea porro inquit Galenus, penultima correpta, & producta differunt. Producta genus est Aristoteli, ad oīa testacea, ut p̄r diphthongum u scribantur ^{ὀστρεα} uidelicet. Correpta uero species est eius una. Quibus respondere apud nos quidā uolunt, conchā, per. x. & Concā per. c. Sed auctores ipsi sunt, nec præter ipsos alius. Athenæus, ueteres per u diphthongū proferre solitos affirmat, nec aliter locutos Cratinū, & Archilochū, Platonē correpta. Sed placet Galeni ex Aristotelis auctoritate distinctio. Porphyrides ex auiū sunt gñe, a Porphyriionibus diuersæ: sicut ab utroq; Lathiporphyrides, siue Adiporphyrides, & lathiporphyre. Illud obiter notauerim, Porphyriones a nobis uisos esse in agro Patuino, allatos ex Hispania, quos ibi Telamones uocāt: siue quia statuæ uiriles, quibus mutili & coronæ sustinentē, ita nominātur: siue quasi thalamorū & pudicitie custodes. Etenim scribit Athenæus, uolucrem hanc sensum adulterij habere, ac significare id patrifamilias, in cuius domo alitur, nō uoce quidem, aut omnino aliter q̄ suspendio. Nisi quis Telamones, quasi nutriculas esse dictos putet. Ita enim Græci Altrices uocāt. Porphyriōni similis est Tetrax appellatus, ut Athenæo placet, Gallōs gallinaceos uirtens magnitudine. Vox grauis. Caro si mādatur, strutionis sapore. Pendente ei ex auribus utrinq; cartilagine, atq; cristæ, ut in Gallo Gallinaceo. Epicharmus, & Alexander certe myndius, qui aues scripsit, pusillā uolucrem hoc nomine intelligunt. Tetrax inquit auicula est, a uoce dicta, quā oua pariens emittit. Plumis color macularum sorde uariis, perpetuisq; lineis. Magnitudine Spernologi eius, quā nos Spicilegam, siue Frugilegā uocare possumus. Qz̄ Frugilega nomen generis est, ita uictū quærentis apud Aristotelem. Rura ipsum passerculū uocāt Spicilegā, deuita modo priore syllaba. Ab eodem auctore Scolopax, aragenis colore tradit, Gallinaceo generi persimilis, quā Theodorus Gallinagem, uernaculā uocem secutus (ita enim uulgo nominatur) interpretatus est.

A

ἵπποκαμπος

πορφυρε

B

Pli. li. 9. ca. 36.
37. 38. 39. 40.

C
ἐκφυγί

De Buccinis.

C. A. P. V.

EAdem præstant concremata Buccina, sed uehementius urunt. Si quis salis plena, fictili crudo adurat, dentificio conueniunt. Ambustis utiliter illinuntur, quibus solui medicamentum non oportet. Nam posteaq; uulnus cicatricē duxerit, ipsum in testæ modū induratum sponte sua decidet. Fit etiā calx e Buccinis, ut in eius mentione demonstrabimus.

Pli. li. 9. ca. 36.

B A R B A R I C O R O L L.

Buccina, a Græcis Ceryces dicuntur. Muricū nomen gñalius esse uideo, q̃ Buccinū, ut potest quod & Purpurā quoq; cōprehendat. Illud notare libet, Cerycas a nostris uerbū ex uerbo Buccina cōuerso s̃ esse, q̃ Ceryx idē sit quod Præco: q̃q; & a cera, quā mucō similē attritu mutuo saluant, cognominari posse uideantur: quod Græci ἐκφυγί dicunt. Muricum generis sunt, inquit Plinius, & quæ uocant Græci Colycia, Alij Corycia, turbinata æque, sed minora multo, efficaciora etiā, & oris halitū custodientia. Athenæus hæc non muricū, sed chamartū generibus contribuit: easq; in Macedonia κερκονίδι dici, Athenis χερία. In cætera Græcia, Tracheas, hoc est, asperas, uocari prodit: quod & Plinius fere aliubi secutus uidetur.

E X M. V E R G. C O M M.

Non paruā naturalis historie partem, mare & maritima faciunt, nec parum in homine laudanda eorū cognitio: tam late uis utriusq; rei patet, totq; modis ad uoluptatem, necessitatemq; humanā instruunt uitā: & tanta est in mari nascentiū uarietas, quæ si quis numerare, & ex his lem labore inierit: qui ex tā multis pisciū, & testarū quæ toto mari nascunt generibus, pauciora plerisq; alijs reliqua longius & certius cognoscere, & qd ad Purpuratū Buccinorūq; sapes, & in medicina uires aliquas priuatim ptinet, nō contemnendā ab Athenæo historia, quo loco de Ostreis agit, audire: Nos eā ganeæ multū, medicina uero parū necessariā relinquimus.

D

De Ionijs.

C. A. P. VI.

Ionia uocantur Purpuratum Buccinorumq; media, qua parte testæ uolumen clauiculatim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem Purpuris Buccinisq; facultatem urendi consequuntur, ut pote cum ea parte eorum natura prematur. Buccinorum carnes ori gratæ sunt, & stomacho utiles. Sed aluum non molliunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Ionia, sunt qui florē esse credāt eum, quē Purpuræ, ut Aristoteles scribit habent, & Buccina, & qui a Democrito Anthos porphyrios dicat. Alia nigrū, alia qd rarius est rubentē, mediū inima esculentaq;: q̃q; oīs callus pinnæ & conchilij interior Papauer quoq; dicit, ut idē auctor scriptū reliquit. Est & in Polypo, qui & Polyps dicitur, & Anosteos suū papauer, ea pars uidelice, quæ supra uentrē eius folliculi specie conspicit, liquore plenus, non atro ut in sepia, sed rubentē. Ego in Dioscoride nō Ionia, sed Cionia, hoc est, uerbū e uerbo, Columellā lego: ita scriptū in exemplaribus aliquot inuenias, Est & uasculi genus Cionion, siue Cion: quo noīe in hō. Vnde apud iuris pītos Colūnariū: q̃q; non colūnariū, sed colūbariū sortasse, p̃nunciandū sit. Instrumenti genus ita nominatur Vitruuio, ad aquā hauriendam, per tympana. Etiam si a colituiue, Colluuiarium sunt qui legant. In quo illud mihi occurrit, Columbarium non a columbis, sed à græco uerbo, quasi colymbarium uenisse: quando Græci κολυμβήεις, & colymbistas uocant, quod nos urinare, & urinatores dicimus. Urinatorium ergo uas, quo uidelicet aut Vinum prōmitur, aut aqua, Columbarium a ueteribus dictum existimare possumus. Alioquin & columbæ ab hoc ipso uerbi Græci significatu appellantur. Quid si Columnarium apud Iurisperitos pro mensa lapidea, quæ Cartibum, & Carubulum quoq; dicebatur accipias: De qua M. Varro: Altera inquit, uinaria mensa erat lapidea, quadrata, oblonga una Columella, uocabatur Cartibulum, in qua uasa ponerentur ænea.

De Myacibus.

De Myacibus. CAP. VII

MYaces laudatissimi in Ponto. Cremati eundem Buccinis effe-
ctum præbent. Priuatim plumbi more eloti, oculorum medica-
mentis cum melle utiles habentur. Genarum crassitudines absument.
Albugines purgant, & cætera quæ oculis caliginem offundunt. Carnes
eorum ad canis morsus utilissime imponuntur.

MYtuli, Græci Myas, & Myacas appellant, Hippocrates Scaphidas. In harenosis sponte
natura proueniunt. Quidam prius his genus faciunt eorum, qui proprie Myes dicantur: quo-
rum proprietas sit, congregari muricum modo, & uiuere in algolis. Si mutuo attritu, lentore
cuiusdam ceræ, Meliceram uocatum, saluant. Gratissimi autumnio sunt, & ubi multa dulcis
aqua miscetur mari. Ob id in Aegypto cõmendatissimi. Procedente hyeme amaritudinem, co-
loremq; rubrũ contrahunt. Degenerant, ut Athenæus & Plinius testant, in duas species. In My-
ias, idest, muscas, & Mytulos. Mytuli sale, uirufq; recipiunt. Muscæ, siue ut in exemplaribus
quibusdã Plinianis legi, Myiscæ, differunt rotunditate, minores aliquanto, atq; hirtæ, tenuiori
bus testis, carne duriores. Laudantur apud Græcos Ephesij. Est & piscis Muscæ, Ponto cõmen-
datus, ex Athenæo. Plautus in Rudete, nominat qdem Musculos. Captamus inquit Echinos,
Lapadas, Ostreas, Balanos, Vriticam marinam, Musculos. De Mytulis intelligat, an de pisce
Mure, iudicent legentes. In Aristotele Mystocetus piscis, a Theodoro Musculus conuertitur.

EX M. VERG. COMM.

Quæ sequuntur Tellinas, non Myacas, Mitulos a Romanis dici testatus Athenæus est.
Nos tamen aliorum in ea re obseruationem secuti, Myacas, nō Tellinas Mitulos uo-
cauimus. Similitudo, & idem fere eorum natales, nominum uagam & incertam hanc ratio-
nem faciunt. Quod in multis fieri quotidie uidemus, deficientibus in tanta rerum naturæ ua-
rietate & copia, proprijs earum appellationibus. Est in Mitulis his, ubi nos legerimus mederi
eorum cinerem palpebrarum asperitatem, non crassitudini. Idq; Paulus Aegineta lib. 6. etiam cõ-
firmat, nisi uitium in eo sit. Nos tamen cõmunem lectionem secuti sumus, confirmando eã Pli-
nio, qui lib. 22. cap. 5. de mitulis hæc ait. Lauantur quoq; plumbi modo ad genarum crassitudi-
nes, & oculorum albugines. Persuasit & illud etiam, nihil in his mutare: q; facillimus lapsus
est in græcis ab asperitate, in crassitudinem: siquidem una tantum mutata litera, τραχι, quod
asperum, τραχι quod crassum est fit: multisq; locis occurrit in hoc scriptore huiuscemodi uiti-
um. Crassitudo autem genarum, quam nos crassas palpebras uertimus, Galenus in Ilagoge
sua fieri dixit, cum inuerset a natuo habitu palpebræ, duriores, carnosioresq; fiunt.

De Tellinis. CAP. VIII.

Recentes Tellinæ aluo utiles, sed maxime ius earum. Salitæ urun-
tur, tritaq; in cinerem, & cum cedria instillatæ, auulsos pilos re-
nasci non patiuntur.

BARBARI COROLL.

Qui Tellinas interpretatur in Martiali poeta Mytulos, improprie locutos arbitror. Cũ
aliud genus esse Mytulos, aliud Tellinas Dioscoridis autoritate cõstet, Athenæus cer-
te Mytulos a romanis uocari, eas uidet existimasse. Sunt q Tellinas, & Crenia, idest, Pectūcu-
los, idẽ esse iudicent, a celeritate crescendi nominatas, ὅτι τάχιστα γίνονται τέλει, hoc est, ocysime
p̄ficiunt. Qd Aristoteles, tā Pectūculis, q̄ Purpuris tribuit cõe. Añõ em̄ magnitudinẽ totā im-
plet. Plinius certe medicinas quæ hic de Tellinis reddūt, ad uerbũ fere Pectūculis adscripsit. Tel-
linas ad Canopũ in ægypto frequẽtes esse narrat: quarũ tenuiores, exiliioresq; Basilicas, hoc ẽ,
regias appellat: his dulciores esse fluuiatiles, e Nilo. Romę circũferunt pusillę quẽdã cõchulę,
quas q uendūt, Tellinas predicat. Hę uulgaribus conchis minores, & leuiiores sunt, & cãdidę,
nec striatę: quas Veneri piscatores, a capparis similitudine, Capparoculas appellant.

EX M. VERG. COMM.

Nullibi, qd hætenus legerim, Plinius Tellinas appellauit: et nescio, an cõmune hoc multis
in mari nomen sit quę celerrime in integram ætatem absoluuntur. Nouit nostra ætas Tellinas

A

μύακας

Pli. li. 22. cã. 11.

B

Tellinas

D I O S C O R I D I S

C in mari ubiq; nascentes, quotidiani in cibus usus. Nihil illis Paulus Aegineta tribuit quod non a Dioscoride illis tributum fuerit, priuatim primo sub Tellinarum titulo, mox iterum ubi de omni esculento iure agit, quo loco Tellinarum aluum maxime deſcere ait.

De Chamis. CAP. IX.

χῆμα

C Hamarum, Conchularumq; in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet. Id cum uino assumitur.

Pli. li. 2. ca. 11.

BARBARI COROLL.

C Hamæ, a Græcis χῆμα, species sunt Cōcharum. Aliud in mari uidetur piscis esse genus Chamæ, quas Hiatus quidam interpretantur, habentes uulnam. sicut & qui Erythini, hoc est, Rubelliones dicuntur. Nisi quis ita distinguendum putet, quod & Aristotelis præferunt codices, ut Chamæ hiatus interpretetur: Chamas autem concharum speciem agnoscat. Chamarum duo redduntur genera. Tracheæ, hoc est, asperæ, mali succi, quas & Ostrea cognominant, & in Macedonia Corycos, & Athenis Crios, ut in Murice diximus. Alterum læues, multo meliores, & crassiores, ob id & Pelorides, & Pelorinæ a quibusdam, & Basilicæ uocantur, & ab Helio spartiano Liofrea. Etiam si lithostrea mendose legeretur. Esset hic de Conchis, siue quod idem est, Ostreis, & Conchylis tractandi locus, sed copia deterreo. Sufficiat primum phronem mimographum, & Phalerum Demetrium. Nec illud prætermisero, Conchæ genus, ex qua margaritæ, unionesq; uellantur, Berberion, & Berberi ab incolis uocati esse, Ping, aut Pectunculi effigie, nisi q; nec auriculas habet ut Pectunculus, nec operculum exterius, sculpturis ullis asperum, sed læue. Coloris quoq; nomen Conchylum, & chliaro conchylum, & cōcha ægyptia Paralios cognomine, quam & Pninā uocat Democritus. Idem Chrysocōchylum fieri docet, sed fictitum, & metallicum, sicut & Chrysocorallium, quod item & gemmæ est nomen.

EX M. VERG. COMM.

D Longa est in Athenæi ostreis Chamarum historia: q; forte sic dictas quondam fuisse ait, παρὰ τὸ κενῶσαι, id est, q; aperto ore, & hiantes, contra q; alia in hoc genere semper sunt. Ex qua causa latinorum aliqui Hiatus eas appellauerunt, nominis rationem, & animalis naturam secuti. In genere minimorum ostreorum Chamæ sunt, tanta cū alijs affinitate, ut facile in antiquis scriptoribus cōfundat earū historia. Nihil difficultatis in tota huiuscemodi rerū cōmētatione est, q; in appellationibus his concordem ueterū historiā ostendere: ob id nos eam peritioribus relinquimus, contenti ab hoc scriptore didicisse, omnium huiuscemodi conchularum in his his uti, indicauit M. Cato centesimo & quinquagesimo octauo sui de re rustica operis capite, inter cætera Mytilis tribus ad eam rem utens.

De Onyche. CAP. X.

ὄνυξ

O N Y X conchylis tegumentum est, ei simile quo purpura intergitur. Quod in Indiæ nardiferis lacubus inuenitur, suauem ideo spirans odorem, quod Conchylia inibi nardi pabulo uescantur. Coligitur posteaq; stagnantes aquæ æstiuis squalloribus inaruerunt. Colatissimus qui a rubro mari defertur candicans, pinguis. Babylonicus nigrescit, atq; minor conspicitur. Ambo odoris gratia suffiuntur. Sed aliquatenus castoreū olent. Idem suffitu excitant fœminas uulnæ strangulatu oppressas, comitialesq;. Poti uentrem molliunt. Crematum conchylum eadem efficit quæ Purpura & Buccinum.

Pli. li. 2. ca. 11.

BARBARI COROLL.

O Nyx græce dicitur, quod nos Vnguem odoratum uocamus, Ostracium nonnulli appellant, siue Ostracon. Galenus Poma, hoc est, cauū, siue quod idē est, Opculū, etiā in purpuris. Onycē uero Paulus testam uocari dicit conchylis duntaxat Indici, quod & Cōdylis appellat. Condylus certe Ostrei genus est, eidem Paulo, ut alios præteream. Vngues uocant & quos Solenas Græci dicunt. Eos deniq; Donacas, & Aulos, Theodorus modo Vngues, mō Digtos ap

pellat, in utroq; Plinium secutus. Hinc & piscatores Ostrearum Solinistæ nominabantur, ut Atheno placuit. Et ampulla unguenti Onyx quandoq; dicitur, Porphyrio grammatico.

EX M. VERG. COMM.

Plinius Ostracum cōmuni omniū testaceorum appellatione uocari Onychem hunc dixit. Posteriores Blattā bizantiā dixerūt. Hic Onychem generis nomine etiam appellat: quando ubiq; nascentes testæ, in quibus leuor sit & candor, eodem hoc nomine censentur, quod ab ungue humano factum sit, & ad gemmas marmorisq; certum genus translatum etiam fuerit. Ex eodem enim humano ungue, quem græci ὄνυξ dicunt, Onyx: & Sardonyx gemma, & Onychite marmor ab antiquis dicta sunt. Ex eodē plura alia etiam, quæ in græcis & latinis passim leguntur. Variāuit natura omnes has in mari testas, uoluitq; eas coloribus, figuris, & quantitate differre: ut nominibus etiam distinguerentur. Onychesq; priuatim dicti sunt, in quorum testis nulli margines, nullæ rugæ, nullæ concauitates, nullæ asperitates essent, sed toto corpore leuor & candor, quales in humano ungue sunt. Ex hoc genere indicus Onyx est. Dico autem Indicū: quoniam ut ab alijs secernatur, gentis nota illa nomini adijcienda est. Sic enim Paulus Aegineta eum appellat. Sic etiam græcorum ueteres aliqui codices adhuc habent. Sentiri in eo Nardi odorem Diosc. ait: q; in palustribus Indiæ Nardum ferētibus inueniatur, uelcaturq; ea. Non satis certa re, quō modo in palustribus Nardus uiuat, cui in arida uita est: aut si iuxta paludes illas Nardus nascitur, quō nam modo ostreum, cui natura est scopulis in mari herere, extra aquam uelci in arida possit: Barbarus ut alterum scopulum uitaret, in alterum incidit, adiecitq; quod alioquin in Diosc. non legitur. Neq; eū ille ait, in paludibus Indiæ nasci Onychem, ubi regio eius nardifera est, sed inueniri in Indiæ paludibus Nardum ferentibus: nec alia præter hæc in eo sunt. Credimusq; nos respondere quæ in hoc capite leguntur, his quæ in Malobathro a Dioscoride & a nobis dicta fuerunt, plura. s. odoris similitudine in censum & nomen Nardi uenisse, quæ multa tunc numerata ab hoc fuerunt: & inter ea quod Malobathrum antiquitas uocabat, foliūratū quod in paludibus Indiæ fluitans inueniretur odore Nardi, lectumq; ad multos usus feruaretur. Nec tū inclinātissimus nobis, quas hic modo Indiæ nardiferas paludes dicit, easdem illis esse in quibus Malobathrū inueniri & colligi antea tradidit, sed pro comperto rem habere uidetur. Siq; dem utrobq; ait sicari paludes illas æstate. Cūq; in eis Malobathrum inueniatur, odore Nardi foliū, & ob eum odorem in Nardi nomen a multis adscitū, nihil impedit, ne constituamus hoc loco, ex cōmuni omniū opinione, qui Malobathrū cū Nardo miscerent, Nardiferas hunc dixisse paludes, quæ re uera non Nardum, sed Malobathrum ferrent. Constitutoq; hoc, facile & sequax est quod sequitur, pasci Nardo in paludibus his indicos Onyches, paratō & ubiq; exposito sibi cibo, & quem extra aquas contra naturæ suæ leges querere non cogerent. Nunq; enim legisse me memini, in ostreorū genere esse quæ ambigua sint, & quæ, qualia pleraq; alia quotidie uident, in aqua parit & arida agere possint.

De Cochleis. CAP. XI.

TERRESTRES Cochleæ, stomacho utiles sunt, & non facile corrumpuntur. Optimæ Sardonicæ, Aphricanæ, Astypaleicæ, & quæ in Sicilia, Chio, & Liguriæ alpibus gignuntur, Pomatix, idest, operculares cognominatæ. Marina stomacho idonea, & facile aluo excernitur. Fluuiatilis uirus olet. Quæ uero uepribus, frutetisq; glutinata coheret, quam uocant nonnulli Cefilon, uentrem & stomachum turbat, uomitiones excitat. Crematæ omniū testæ, excalfaciendi & urendi naturam sortiuntur. Purgant lepras, uirilignes, dentesque. Emendant oculorum cicatrices, & uitia cutis in facie, albugines, ac uisus hebetudines, si uistæ tritæque ex melle illinantur. Crudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutem tumores exugunt. Sed non ante soluantur, quam omnis hauriatur humor. Podagricas inflammationes leniunt. Impactos corpori aculeos illitæ euocant. Menses tritæ & admotæ ciunt. Carnes earum cum thure & myrrha illitæ, cum uulnera alia,

D I O S C O R I D I S

Cum maxime quæ nerui acceperunt, conglutinant. Tritæ in aceto, sanguinem naribus erumpentem infrænant. Viuæ corpus, & præsertim Aphricanæ cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat. Trita cum testa, uino & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli, uesicæque cruciatus sanat. Terrestris, pilos incommodos replicat, si quis abrafo aculeo leniore, pilum attingat.

Pli. li. 9. ca. 56.
& 11. li. 32. ca.
11. li. 30. ca. 12.

B A R B A R I C O R O L L.

Cochleam, & Limacem Græci Cochlian, & Cochlion appellant. Nam Cochlos, & Cochlos, marinos calculos significat. Est & Cochlos apud Aristotelem, animal testaceum, & aliud quæ Limacis, a Theodoro dictum Vmbilicus. Hoc & Cochlian est, ubi Aristoteles appellet, sicut Limacem quoque Cochlion. Nobilitas precipua Solitanis. A patria item Balearicis; quas in speculuncis nascetes, Cauaticas nominant. Aphricanis duplex genus. Nudarum, testarumque; quibus magna fecunditas. Sicut Illyricis amplitudo. Nam Siculæ commendantur quæ diu paræ sunt, quia magnitudo duras facit, aufertque succum. Laudantur & Caprearum insulis. Præterea sunt quæ albæ, siue albulæ dicuntur, in Reatino agro. Itemque aceratæ lateque, multifariam nascentes. Itæ minutæ. Iam aliæ in usu sunt, hæc cibis damnatæ. Cochlearum uiuaria neptibus piscis fuisse, sapienter, & farre, aliisque rebus alendo eas, tanto successu, ut singularum calix quadrantes. so. caperet. In Aegypti Nilo grandissimæ feruntur, uocales ululatum expressa similitudine. Saliua Cochlearum, quæ punctis, aculeo, uel stilo carnibus manat, a Græcis, ut Galenus inquit, Myxa dicitur, hoc est, mucosus lentor, siue mucor, mucosus. Limacem Teucer ad exemplum questionis ludicræ, ita finit, Animal sine pedibus, sine spinis, sine ossibus, crustatum, oculos nunc exerens, nunc retrahens. Cicero, terrigenam, herbigradam, domiportam, sanguineasam. Inuenio Limacis genus Cocaliam ab Aristotele uocari, & aliud Abrotonem. Quamque sunt qui locustam putent, Item qui apem, Alij qui piratam in eo uocabulo intelligat. Strabo Cocleas prædicat Linusias, ab agro, cui nomen Lino est, iuxta Pityuntem, medio Parianâ coloniam, & Priapum spacio.

Libro. 13.

E X M. V E R G. C O M M.

Domiportam Cicero, græcorum more, qui *οπιπορευ* inter cetera nomina eam uocant, Cochleam dixit. Nec male una hac ratione laudata est necessario homini exemplo, ut sua omnia secum ipse etiam ferat, & Prienæi sapientis modo eas domi suæ opes coaceruet, quas nec hostis ferat, nec populetur bellum. Idem Sanguineasam appellauit: propterea, quod illi saliuæ & mucosus lentor pro sanguine sit, quo in oculorum medicina, ut hic docuit, ueteres utebantur. Quibus, quod hactenus inuenerim, nullus fuit usus exsudati igne ex Cochleis humoris, quod nostra ætatis medicina, præsentis remedio utitur in his, quorum corpora ad tabem lubrica sunt, & macie conficiuntur. Silice operimenti cinere, carnibus, & crudis totis Cochleis contra aliquot hominis mala antiquitas tantum usa est.

καρκινος

De Cancris. CAP. XII.

CANCROrum fluuiatilium exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adiecto consimili radice gentianæ modo, triduo potus cum uino, magnopere prodest canis rabiosi moribus. Rimas pedum, sedisque, perniunculos, & carcinomata, cum decocto melle lenit. Triuii crudi, potiusque ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalangiorumque morsus, atque scorpionum ictus. Decocti autem, & cum iure elitati, ijs profunt qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt. Necant scorpiones triti, & cum ocimo admoti. Possunt eadem marini, uerum inefficacius omnia præstant.

Pli. li. 9. ca. 31.

A R R B A R I C O O L B L.

Cancer græce Carcinus, mirabile contra morsum canis rabidi remedium: præsertim ut Aesculapion parabat, qui popularis, & præceptor Galeno fuit, urens eos æstate in patella uiuos sub Canis ortum, cum sol in Leonem transisset, non nisi, is. luna. Pelops medicus, idemque Gale-

ni doctor, qui rerum omnium causas, & effectus scire profitebatur, hanc Cancrorum uim in Canis morlu, qualitati corporis, ac materię, non proprietati naturę tribuebat. Nec fere quisq̃ est, qui eum sequatur.

T De terrestri Scorpione. CAP. XIII.

Terrestis Scorpio tritus & impositus, suę plagę remedium est.

Quin inuenitur assatus ad eadem prodesse.

BARBARI COROLL.

Scorpionum duō summa genera fere traduntur, Terrestres, & Marini. Sed Pausanias uisisse prodit & uolucres, pinnatosq̃, ut locustę sunt, e Phrygia in Ioniam translatos.

M De marino Scorpione. CAP. XIII.

Marini Scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines, & hebetudines.

BARBARI COROLL.

Scorpionum, alij Pelagi sunt, atq̃ alto mari capiuntur; alij Palustres, ac cœnosi potius. Preferuntur sapore pelagij, quos & rufos colore prædicant, cum alteri sint subatri. Aristoteles & Scorpidas nominat. Nec constat, pro diuerso, an pro eodem genere acceperit, Scorpiana certe, ut Athenæo placet, euidenter a Scorpione differt.

D De Dracone marino. CAP. XV.

Raco marinus replicatus atque impositus, ictus spinę suę qua ferit, medela est.

BARBARI COROLL.

Adiectum est huic Draconum generi Marinum, ut a terrestribus Aethiopię distingueret: qui, ut inquit Aetius, non ueneno, sed dentibus, quos similes aprugnis habent, opprimunt; colore enim uno, sed alij ruffo, alij cinereo, alij nigro. Præterea iubarum umbra tecta, prominentibus e mento barbulis, ore uasto, lingua præpeti.

EX M. VERG. COMM.

Non ab re fuerit quęsisse, ut in Scorpione dictum est, an eundem illum Draconem qui uulnerauit, medicinam uulneri a se facto, facere dicat: an ex eodem genere quem potuerit aliquis habere. Nobis in priorem illam partem animus inclinat.

S De Scolopendra. CAP. XVI.

Scolopendra in oleo decocta, si illinat, auellit capillos.

Sed contactu pruritus facit.

BARBARI COROLL.

Scolopendra Marina dicitur, quoniam et terrestis sit, ut post liquebit. Dioscorides Ophioctenam quoq̃ nominat, aut Scolopendram, aut uermē scolopendrę similem accipiens, libro huius opis extremo. Emoris inqt a Scolopēdra, siue Ophioctena, locus ambitu colluiescit.

EX M. VERG. COMM.

Q uales terrę Scolopendrę, siue Centipedes sunt, tales & marinę, longiores, tereti corpore, & infinitis pene pedibus ingredientibus, notissimum omnibus insectum, & ex quo rustici futurę pluuię præfagia aliquando accipiant.

M De Torpedine pisce. CAP. XVII.

Marina Torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus uehementiam mulcet. Eadem apposita, conuersam sedē, prociduamq̃ coerct.

BARBARI COROLL.

Torpedo, a Gręcis dicta Nārce, nomen utraq̃ lingua ex argumento inuenit, quod etiā e longinquo, aut si hasta, uirgaue attingatur, quamuis præualidos lacertos torpescere, q̃libet ueloces ad cursum pedes, alligari faciat. Est & Turpæna piscis maritimus, a quo Cerati quoddā genus, ad duricias emolliendas appellatum est a medicis, ut est apud Paulum.

A

σκόρπιος χιρ-
σαϊος

Pli. li. ii. ca. 25.

σκόρπιος θαλάτ-
τιος

Pli. li. 32. ca. 11.

δράκων θαλάτ-
τιος

Pli. li. 8. ca. 13.

B

σκολόπενδρα

Pli. li. 32. ca. 11.

νάρκη θαλάσσια

Pli. li. 32. ca. 1.
3. li. 9. cap. 51.

D I O S C O R I D I S

C E X M. V E R G. C O M M.

C Ab eventu græci suam Narcem, Romani suam Torpedinem dixerunt. Vtrisque em̄ in sua ap-
pellatione eadē piscis nota & uis indicatur: quæ tanta esse traditur, ut hamo capta, per ferrū, se-
tam, harūdinemq; in piscatōre torporis sui naturā & uim Nærcē trāsferat, & limo obruta, ad-
natantes pisciculos eodē torpore imobiles corripiat. Ignauī ingenij piscis, & qui, quā alij mānī
festam & generosam uenationem faciunt, clandestinis dolis, & quasi ueneno quodam hęc sibi
acquirat: quasi Maronis illud ad uitam magis laudauerit, Dolus, an uirtus quis in hoste requi-
rat: Hanc Paulus Aegineta uiuentem, ad arcendos capitis dolores capiti imponi iussit: idq; eo-
dem illo torpore facere, quo membra omnia hominis contactu eius torpere creduntur. Viuen-
tem præterea in oleo coqui, oleoq; illo utiliter inungi articulorum dolores: & præter hęc, quod
hic de procidente & inuersa sede ait. In cuius mali significatione, non placet quod Barbarus
ait, procidentis interanei, aut euerſi morbum coeret. Latius enim interaneum pater, & hic se-
dem tantum dicit; & inuersam, non euerſam eam partem appellat.

V De Viperinis carnibus. CAP. XVIII.
Iperinæ carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt. Ner-
uorum uitij auxiliantur. Increſcentes ſtrumæ reprimunt. De-
tracta autem cute, caput caudaq; quoniam carne uacant, amputari de-
bent. Quippe commenticiū est, quod præcipitur, certam utrinq; men-
suram præcidi oportere. Reliquum uero corpus elotum, dissectumq; dis-
coquitur cum oleo, uino, ſalis exiguo, & anetho. Aiunt ijs qui Viperas
eſitent pediculos procreari, quod plane a ueritate abhorret. Adijciunt ali-
qui, longam ſenectutem agere, qui eo cibo ueſcuntur. Sal ex eis ad eadem

D conficitur, ſed inefficacior eſt. Viua autem Viperæ in fiſtile nouū demit-
titur: adijciuntur ſalis, caricarumq; tritarum ſingulū an quinq; ſextarij;
mellis cyathi ſex: mōx fiſtilis operculum luto oblituitur, & fornacibus
inaſſatur, donec ſal in carbones redigatur: qui poſtea tritus in pulueris
faciem, reconditur. Plarumq; quo ſtomacho grator fiat, immiſcetur
Nardi ſpica, aut folium, aut Malabathri momentum.

V B A R B A R I C O R O L L.
Ipa Echis, & Echidne a Græcis uocata. Sed prior mas, ſequēs ſemina eſt. Hęc colore ſuffla-
uo, multis maculata capillamentis cernit. magnitudine cubitali, aliquē etiā palmorū ternū, utiq;
ſi nō ſit Indica. qppe quā cubitorū .9. & dodratis a ſe uiſa Nearchus, & Strabo p̄dicāt. Cauda
Viperæ nō paulatim gracileſcente, ſed uniuerſim, & p̄tinus Vipæ, & ſine carne. Oculi ſubrubet,
caput latiſculū, ceruix anguſtior. Aluus p̄minula, meatus ad extrema caudę. Inceſſus gei p̄-
ximus, dētes canini quatuor. Cōtra mari, anguſtius caput, ceruix craſſior, corpus uniuerſū te-
nuius & p̄cerius, meat ſupiore uētris p̄te ſeſtinātius. Dētes canini duo, totidēq; uulnera. Horis
ſeptē, ſūmū die. .3. cōficiūt Vipę. Sūt q Dipsadas a Vipæ nō diſtinguāt, niſi q Dipsades ſalla lo-
ca incolūt: unde fiat, ut caro earū ſalla q̄q; ſentiat, alienaq; ſit medicīnę, uehemētiffimā ſitma af-
ferēs utētib; et inde nomē: quales in Africa plurimę naſcant. Nullę in Italia, p̄pter cœli, ſolique
molliciē. Hoc ſe Gal. Romę ab ijs, q ſerpētes uenant, Marſiq; dicant, accepiſſe ſcribit: nec tñ o-
minino credere. Cubitales eſſe p̄hibent craſſitudine, in gracilitatē ſe minūctē, nigris & ruſſenti-
bus inēptiſſis maculis, anguſtiore q Viparū capite. Dioſco. etiā Preſteras uocari eas uoluit. So-
linus diſtinguit. Percuſſus inq; diſtendit, & corpulētia enormi diſſilit. De Vipæ, ut cōſiat, The-
riaci paſtilli ſūt, q quēadmodū cōficiāt, alio loco indicabimus. Viperā Italia mō aut nō habet,
aut nō agnoſcit. Quāq; ſūt q Marſos Angues, ut inq; Euaſthius, & ut uulgus ipſū mō uocat
Marafos, p Vipis accipiāt: ita paſſim uocātibi Hiſpanis, ex qbus q ſūt minus atri, Aſpides ru-
ribus dicunt. Aſpidū uero tria ḡna. Chelidonix, ab hirundinū colore, iuxta ripas amniū, ſed
Nili p̄cipue uerſant, paulo cubitalibus maiores. Secūdū genus Cherſea, hoc eſt, terreſtre, ſubi-
uiridi fere, aut cineris colore, cubitorū quinū. Maiores ijs ſunt Pyades, qbus idem color, ſed
& auro quoq; proximus. Intra horas oēs cōficiūt; celerius Chelidonix, tardius Pyades. Mas

Pli, li. 10. ca. 62

binos ictus, fœmina quaternos relinquit. Pryadem fuisse, quam Cleopatra sibi admouit, Galenus auctor. Hæc ceruicē exporrigens, metū ex interuallo quē feriat, Solinus Hypnalem dicit appellari, necantē somno, qua uitā sibi Cleopatra inuiderit. Aspidas in Aegypto, Nicaderait, sunt qui ferūt alias dodrantes, quæ citius interimāt, alias etiā passum iustū longas.

EX M. VERG. COM M.

Negabant quondā Marſi, gens quæ in Italia impune serpentes uenaret, & tractaret, Viperas in nostro orbe nasci, ob cœli temperiem, & molliorem solī naturā. Id tamen non credere se Galenus ait. Omnes contra Africæ, peculiare hoc naturæ malū potius, q̃ animal esse testati sunt. Idem non satis certe genus & formā Viperæ descripserunt: alijs Dipsadem: alijs Præsterem, alijs aliud genus & nomen Viperæ assignantibus: alijs hac forma, alijs illa describentibus. Longum sit, si Strabonis, Galeni, eiusdem scriptoris huius, multorumq; aliorum dicta hoc loco congeſſerimus, & præter longitudinē superuacuum etiā: cum ante nos plura ex his Barbaris in Corollario suo retulerit, quæ poterunt uolentes ab eo intelligere. Nos propositū nostrum agentes, ex ueterum Græcorū decretis primū monebimus, calido siccoq; palam temperamētū esse Viperinas carnes, totumq; corpus per cutem purgare: ideoq; ab elephantis suis, solo hoc cibo, multos ad sanitatē restitutos fuisse, testatus libro sexto Paulus Aegineta est. Nec minus libro 4. quo loco de malī illius curatione agens, Viperinis carnibus uti iubet: & si sit earū copia, nihil æque in cibo prodesse testatur. Iubet præterea, cōfecto uiperinis carnibus sale illo, de quo paulo ante dictum est, pariter uti, nec minus prodesse. Quem ille Theriacū ideo uocat, q̃ in τῷ θυρίῳ, id est, uenenato, & serpente hoc animali cōfectus fuerit. Idem contra strumias eodem Dioscoridi, aut non dissimili remedio pugnat. Hic Viperæ carnibus strumarum incrementa sisti ait: Ille non uiperam, sed quem Græci θρίν uocant, iubet in fictile gypso circūlitum conijci, & in fornace cremari: tum addito sœno græco, melle subigi: eaq; ratione uti. θρίν autem intelligere oportet, quē nos Anguem dicimus omnibus notū. Vtitur medicamētō etiā ex aspidibus cōfecto. Ex quibus cogitatū a nobis aliquādo est, nō adeo differre Viperas ab Aspidibus. & nostros Angues nō dissimiles penitus uires habere posse: quodq; in Africanis laudatur, & alijs antefert siccitate regionis, & cœli temperamētō fieri, Iubet deinde in præparandis ad cocturā Viperis, detractā primū pellem, mox caput & caudā amputari: quia minus, aut nihil carnis hæ partes habent, in qua amputatione dānat, fabulosumq; esse dicit, quod quidā præceperunt, certa aliqua mensura auferendas Viperæ partes illas esse. Quod tamē antiqui oēs testati sunt, eamq; digitorū quatuor fore decreuerūt. Plinius lib. 19. cap. 5. cuius hæc uerba sunt: Quatuor digitorū mensura uerinq; præcisa. Paulus Aegineta primo quarti uoluminis capite in Viperæ coctura, προκοπιπῶν πρότερον τῶντι κερὰν αὐτῶν καὶ τὰν ὀφθαλμῶν οἷον ἀπὸ δακτύλων τῶν τῶν. Quod est, amputatis antea capitibus & caudis quatuor fere digitorū mensura. Id ipsum & pleriq; alij testant. Nec dānat, negatq; Dioscori. earum partiū amputationē, sed quā uulgus amputationis cām opinat, quia, scilicet ueneni sedes in his partibus sit: fabulosamq; huiuscemodi historiā testatur, & q̃ certa mensura amputandæ illæ partes sint. Causa em̃ amputationis est, nulla in his partibus caro, & ob id inutilitas, cōiecturāq; satis ad mensurā est: ideoq; & Paulus Aegineta quatuor fere digitorū dixit, qui per latitudinē, & ut in manu se contingūt intelligendi sunt. Cōiunctū huic est, quod nos uitiosum oīno suspicamur, & ex similitudine uocis alterū ex altero participio factū esse, τὸ δὲ λοιπὸν πλύναντες καὶ τιμαχίσαντες, &c. Quod si uerbū de uerbo uertas significat, postremo autē lotā, & in frustra dissectam Viperā, &c. Lauare em̃ πλύνειν est. Et si sic legat, dubitandū non est, quin lauari antē cocturā Viperā oporteat. Ac nō sic in omnibus græcis legi. Vidimus em̃ nec spernendæ fidei codices, in quibus non πλύναντες, id est, cum lauerimus, sed πλατύναντες, id est, cū aperuerimus, & quasi diffusa inferiore parte diuicauerimus, tunc in frustra dissectā coqui oportere: nullo alio sensu, q̃ ut significetur, oportere Viperā euiscerari, detractisq; interaneis omnibus tūc coquendā esse. Persuademurq; in eo facile, q̃ hic sensus a rei necessitate non abhorret, q̃q; integrā adhuc lectio in aliquibus hæc est, & q̃ Plinius eodem loco ait, exemptis interaneis discoqui in aqua, aut oleo, &c. & præter Pliniū Paulus Aegineta eodē loco. Cuius hæc uerba sunt: ἀραιεῖν τὴν δὲ τῶν ἐντέρων, &c. Quod est, ablatis interaneis, quorū nulla fieri detractio, nisi aperta & dilatata inferiore parte poterat. Ideoq; nos, restituta lotura, exemptis interaneis coqui Viperā diximus. Addiderūt huic cocturæ aliqui, q̃ a Dioscori. non dicunt, rutā, & porrū. Neq; ab re fuerit, suspicari in tot rerū censu, potuisse librariorum incuria perire, aut ambo hæc, aut eorū alterū. Dubitandū illic etiā, quo loco Dioscori, ait credi, pediculos gignere qui uiperinis carnibus, aut earū iure uescant, fieri ne id, an contra non fieri pediculos Dioscori, dixerit his qui ea uescuntur. Multa enim in utrāq; partem asserri pos-

C sunt, Galenus, Paulusq; Aegineta, quod haecenus legerim, nihil de pediculis his docuerunt, sed alter quod ad hanc rem faciat tantum dixit, per cutem totum uiperinarum carniū cibo purgari corpus: potuitq; cōmuni purgationis appellatione illa, pediculos etiā intelligere, qui, ut in pediculosis a longa ualitudine fit, pellente corruptos humores natura, toto corpore aliquando gignuntur. Alter certius, longiusq; descripta eadem uiperinarū carniū potestate, ampliore adhuc uoce usus, ait gigni in cute uiperarū carniū uelcentiū cuncta illa, quae corrupti intra hominem humores gignere solent: numerauitq; scabies, lepras, labelsq; alias, in quibus extima uitiatur cutis, nulla pediculorū priuatim habita mentione. Quodq; in his fit propria earum carniū potestate, fieri & in alijs poterit, quae quod crassum terrestreq; in humore nostro est, in exteriorē partem pellunt: in quo genere potuit & pediculorū labe illa etiam censerī. Plinius tantum pediculorum eodem libro his uerbis meminit. Ius, praeter supradicta pediculos e toto corpore expellit. Quo uerbo usus, negare uidetur, quod Dioscorides, & si falsum mox dicit id esse, confirmat: nisi in expulsiōis uerbo, non fuga & euectio intelligenda sit, sed ut in auibus, quae pullos suos post incubitum excludere dicuntur, generatio, & quasi ex occulto & priuatione in lucem & uitam protractio, nec aliud expellere uerbum, q̄ ad generationem excludere Plinio illic significet. Quae omnia longius dicta a nobis sunt: quoniam non desunt in graecis, in quibus contrario sensu μή γεννᾶν, quod est, non gignere legat. Nos in ambiguo communem lectionē secuti sumus, praesertim negāte id fieri Dioscoride. Variant in extremo capite non multo post antiqui Graecorū codices, suntq; in quibus πρὸς ὑστρομαχίαν, id est, ad stomachi utilitatem legatur. Habetq; utraq; lectio quo niti possit. In priore illa, & ratio, & cōmunis lectio est: in posteriore, ratio, & Plinij auctoritas, qui eodem libro & capite ait, Exurit cum sale in olla, quem lingendo claritatem oculorū consequitur, & stomachi totiusq; corporis festiuitates.

De senecta Anguium.

CAP. XIX.

37988 08100

Senectus Anguium in uino decocta, dolori aurium infusu, & dentium, collutione auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed praecipue uiperinam.

Plin. 20. cap.
23. & 20.

B A R B A R I C O R O L L.

Senectus Anguina, graece Geras opheos, a Catone Pellis Anguina dicitur, Coriū anguis a Palladio, Leberis ab Hippocrate. Inuitat me Serpentiū natura, ut praeter supradictas de generibus earū reliquis, quatenus ad Dioscoridis extremū uolumen attinet, breuissime attingam. Haemorrhus, & Haemorrhoidis, a sanguinis effectu nominantur, qui toto corpore percussis effluit. Ille mas, haec foemina est. Vtriq; colos arenaceus. Magnitudo palmorū trium. Crassitudine paulatim, in tenuitatem descendere. Incessu tardo, & directo serpunt, ruffis, ut quidam scribūt, pedibus. Maculae per totas, multae, partim atrae, partim candidae, squamis asperae. Ob id ingredientēs, strepitu sese produnt. Foemina in aluum iacet serpendo, meatumq; uersus caudam inferiore situ continet. Mas autem uersus aluū habet, ceruicemq; serpendo porrigit. Foemina perniciosior, ut ex cuius ictu dentes gingiuae, unguesq; decidunt. Colore sabuli uisunt & Hammoditae, maxillis Viperae latioribus, cui & similis est, nisi q̄ uiperæ color suffuluus. Hos & Cenchrias nominat Aetius, cubitales eos describens, nigris maculis, cauda superiore parte scissa, & praedura: unde nomen inquit, Cenchriae, ut cerchriam potius, q̄ cenchriam putem legendum. Nam Cenchrites, siue Cenchrinus, siue Cancros, aliud serpentis genus est, quod & Acontion, & acontitem, & acontiam aspidem, hoc est, iaculum uocāt aliqui: ut idem uoluit Aetius, longitudine cubitorum binum in exilitatem fastigiatū, uiride praesertim sub aluum, ut milio, cum recens eius seges est, uideatur persimile robustum. Præterea se iaculi specie proripiens, infestumq; saltui. Erasistratus epar, colon, uelicam affici eorum scribit, quos Cenchrinus peremerit. Arenae colore, & cerasae magnitudo, cubiti unius, summūq; duorū, squarrosa cauda, binis in capite corniculis, siue quadragenis, ut Solino placuit, squamis uero in uersum quendam sub aluo conditis: eo fieri, ut crepitum sibilo non dissimilem serpendo edant. Incessu obliquo. Nono die interficit. Dryini a quercubus dicuntur, q̄ in radicibus earū, ut Galenus inquit, uiuant, in Helleponto copiosi, odore tetro, qui & eos prodit, si quis aggrediatur eos perimere. Olfactu multantur, nec alterius rei odorem praeterea sentire perhibent. Qui uero supergreditur imprudens, crura tumescere, cutem pedibus abscedere, manus quoq; ipsas curantium eodem modo periclitari. Amplitudo bicubitalis, Præpingue corpus, muni-

tum, loricatorumque squamis durissimis, in quibus Aeripennes muscae latitant, quae ipsum animal conficiunt. Amphibæna similis est Scytalæ tereti, & æquali corpore, uti ne caput utraque sit cognosci possit. Amphibæna etiā biceps est, ut inquit Galenus, & utraq; parte ingreditur. Vnde nomen. Cæterū nec Amphibæna, ut Aetius existimat, interficit, nec Scytale, præterquam chalcidica, eandem afferens quam uipera perniciem. Scytale tanta uarietate fulget tergoris, ut notarum gratia moretur obuios. Prima ponit exuvias. Hydros, siue Natrrix primū in terra uiuit, & Chersydros appellatur. Deinde in aqua. Similis est aspidi pusillæ, præterquam quod ceruicem latam non habet ut aspides. Nominatur ab Aetio & Parous, in Syria proueniens, modo æris colore, modo nigricans. Item Spathiuos apud Chalcidem, ex crassitudine in exilitatem procumbens, lato capite. Sed neutrum genus inferre mortem. Ab eodem auctore Pelias, & Elaps produntur, sed quia noti sunt, descriptione, inquit, non indigent. Elaps & a Solino dicitur. Fit & Chamedraconū mentio. Sed omnium sine dubio pestilentissimū est animal, quod a triplici frontis apice, quasi alba mitrula, & plane regio insigni Basiliscus appellatur, palmorum ternum longitudine, fusillatus, exacuto capite, cuius uel sibilum animantes nullæ perferunt, præter Mustellam, a qua uincitur. Auditus, conspectusque, momento perimit. Quicquid morsu eius occiditur, ipsum etiam extinctum, iacentemque, nullum attingit animal. Vulnus ab eo factū, ut inquit Erasistratus, aureo colore obducitur. Ex his quas dixi pestibus, alias esse surdas, alias haberi cæcas, quæ propterea Typhlini, hoc est, Cæciliæ uocantur. Prouidentia naturæ factū esse dicerem, nisi facile responderi posset ab imperitis, melius consulturam fuisse, omnino non peperisse, quam si captas oculis, & auribus peperisset. Ita enim leges naturæ dicimus eadem facilitate, qua contemnimus. Atque utinā accusare mala satis esset. Odimus & bona. Vfu certe comperi, haud temere alios naturæ taxatores esse, quam quibus uitia ipsa placent, impunitatem conuestione redimentibus. Sed & alterius curæ sunt. Illud obiter admonendi sunt leuctores, ea quæ de serpentibus a neotericis dicuntur, præsertimque Arabibus, & eorum Principe (ita enim modo scholæ uocant, & Galeno quoque præferunt, si Djs placet) usque adeo negligenter & sordide mandata esse literis, ita mendacius haberi plena, ut non dico infantissimi, sed plane omnium rerum usu uacui fuisse uideantur.

EX M. VERG. COMM.

Quam hic contra dentium dolores Anguium senectū in uino, Paulus Aegineta in aceto decoquit, & quā hic ^{ixv}, id est, Viperā dicit, ille Dipśaden uocat, non negligendo restimonia uagū quondā in Græcis uiperarū nomen fuisse, unaque hac appellatione plures huiusce modi species nunc etiā intelligi posse. Nihil senectū anguis, siue anguina uernatio hæc aliud est, quam quod hyemalem torporem exuentes, appetente uere Angues, spoliū relinquūt, & quā lubrica serpens exiit in spinis uestem, ut Lucretius cecinit, Græci ^{γῆρας}, id est, senectutem eam dixerunt. Plinius quod uere id fiat, Vernationem appellauit.

De Lepore marino.

CAP. XX.

Lepus marinus Lolligini parua similis est, qui per sese tritus, aut cum urtica illitus, capillos euellit.

BARBARI COROLL.

Lepus marinus, græce Lagōos thalassios, animal pusillum, odore retro. Inter Lolliginēs se re uersatur, quibus & similis esse dicitur. Venenū id est, alijs cibo, alijs potu, alijs contuitu. Si quidem gruidæ, si feminā ex eo genere aspexerint, confestim nausea, & redundatione stomachi uitium fatentur, ac deinde abortum faciunt. Remedio esse marem tradunt, induratum sale, ut in brachialibus eū habeat. Eadē pestis, in alto, uel tactu solo nocet. Vescit eo unū tantū animal, ut non intereat, Mulus piscis, & tenerescit. Inde ingrator, uiliorque fit. Hoies quibus in pastu fuerit, pifecolent, moriunturque totidē diebus, quot Lepus uixerit. Oīno incerti temporis ueneficiū id affirmat. In India uiuentē capi negāt, inuicēque illi hominē pro ueneno esse, ac digito quoque in maritactu emori. Esse autē ampliorē multo, quemadmodū reliqua orbis eius animalia.

EX M. VERG. COMM.

Nouerūt terrestrem Leporem in continenti agentes oēs, Marinū piscatores, & qui ad mare habitant, informē magis ossam quam piscem: cuius formā ex ueteribus plures descripserunt, inter uenenata ab hoc ipso scriptore in sexto uolumine numeratū, de quo tunc copiosius & certius ex Nicandro & alijs agetur. Hunc non satis certo intellectu, cum urtica simpliciter depilare cæteri interpretes dixerūt, cōem græcorū lectionem secuti, cui deest quod in melioribus adhuc in

A

Basiliscus.

Aucennā, Rasis, & Serapion taxantur.

B

αγῶος θαλάσσιος

Pli. li. 9. ca. 49.
li. 32. ca. 5. & 11.

Cuenit, quodq; a Paulo Aegineta in sexto uolumine tradit. Quorū fidem & auctoritatē nos secuti, quod Dioscoridi deerat adiecimus, cū marina urtica illitū leporem marinū depilare uer-
λαγῶς χερσαίος
 tentes. Paulus enī his uerbis rem explet λαγῶς θαλάσσιος λίος καταχρίσθαι καὶ ταύτην χρὴ μὴ ἀκαλῶ
 φρε θαλάσσιος τρίχας φιλοῖ. Quod est, Marinus lepus concisus, inunctusq; per se, & cū marina ur-
 tica pilos aufert. Idipsum & meliores Græci habent. Esse autē in mari urticas, & homini medici
 nā facere, testatus Plinius pluribus locis est, qui lib. 9. cap. 45. totā earum naturā & in medicina
 uires pluribus locis descripsit. Testati & alij sunt, quos huiusmodi causa relinquimus.

De Lepore terrestri. CAP. XXI.

Terrestris Leporis inassatum cerebrum manditur, iuuandis tre-
 moribus, qui uoletudine contracti sunt. Affricū, aut cibo faci-
 lem infantibus dentitionem præstat. Exustum caput, & cum adipe ur-
 lino, aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum
 coagulum, post triduum a concubitu potum, conceptum adimere, par-
 tusq; spem intercipere prodicitur. Vuluæ & alui fluorem sistit. Comitiales
 iuuat. Contra tienena ex aceto bibitur, præsertim aduersus concretum
 lac, & uiperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, uicia cutis in
 facie, uittiginem, lentiginēq; sanat.

BARBARI COROLL.

Lepus terrestris, græce Lagos, & Lagoos chersæos, & a stupore atq; metu, Prox, & ab dor-
 miendi habitu Derceumenos, Nicadro, Lagides quoq; Strabo eos uocauit: dictus, ut Varro
 putat, non quasi lenipes, sed q; Eloes Boëtij leporem uocarent ita. Genus Leporum triplex.
 Italicum, Gallicum, siue Alpinū: qui toti sunt candidi, niuem elstant algoribus, qua liquecente,
 rutilescunt, raroq; Romam perferuntur. Adapis nomine Hispanum, quos, ut Polybius est
 auctor, appellamus Cuniculos. Quorum fortis, uentre exectos, aut ab uberibus ablatos, gra-
 tissimo cibo Lautices appellant. Strabo Leberidas a quibusdam appellari tradit ipsos Cuni-
 culos: qui ab effectu Lepores Gæorychiæ, hoc est, fossiles ab ipso cognominantur. Aristoteles
 & Iulius Pollux Leporem etiam Dasypoden uocari tradunt. Alij distinguūt Dasypoden a Le-
 pore. Inuenio & Chelidoniam cognominatum genus quoddam leporis a Diphilo. Sunt qui
 Plinium accusent, q; Leporem alium a Dasypode uideatur habuisse. Nec intelligunt, genus
 quidem unum ambobus esse, sed discriminis tamen aliquid inter eos notari posse. Nam illud,
 quod a Plinio dictum uidetur esse Lepori coagulum, inutile. Dasypodi præcipuum. Lectio-
 nem arbitror corruptam, ut in Annotationibus libri undecimi docuimus. Nec illud tamen
 inficias eundem est, confundi sæpe nomina, ut & Leporem pro Dasypode, & contra pro
 Lepore Dasypodem Lepores appellasse uideam. Dioscorides certe Leporem, nec aliter uoca-
 re solet, opere toto. Apud nos certe Lepores montani, differunt a campestribus, in Triden-
 tinis & Vicentinis alpibus frequentes, nigritia, magnitudine, ferocia, densiore pilo, a cate-
 ris distincti. De Lepore prouerbum dictum est, λαγῶνος κρεῖον ἐπιθυμῶν, Leporis carnes concu-
 piscis, usurpatum a Terentio in Eunuchis.

De Pastinaca. CAP. XXII.

Marina Pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squam-
 mis reflectitur, dentiū dolorē mitigat. Nā eos frangit & euocat.

BARBARI COROLL.

Plin. 32. cap. 2.
21. lib. 9. ca. 20.

Pastinaca piscis, græce Trygon, Turturis appellatione dicitur. Hæc quæ momorderit, si
 figatur in arbore, querna maxime, liberari qui sit percussus, arborem siccescere, auctores sunt.
 Vt meminit Aetius. Pastinaca dicitur, & insecti genus, quod ab Aristotele, Staphlinus ap-
 pellatur, uerticilli magnitudine.

EX M. VERG. COMM.

Radium, quē nos aculeum in maris Pastinaca diximus, Plinius appellat, nulla rei, sed sola
 nominis diuersitate. Hanc Græci Trygona, Turturi æquiuoca appellatione, uocāt. Nec nobis
 ex antiquo scriptore aliquo causa satis patet, quod sæpe desiderauimus: quemadmodū desy-

derare nunc etiā cogimur, quis nam in sedando dentium dolore usus aculei eius sit: neque enim hic docet, inspergendus ne, an imponendus dentibus sit: an percussisse, conuulsisseue eo dentes oporteat. Poterunt diligentiores nouisse id, & nescientes docere.

De Sepia.

CAP. XXIII.

Sepiæ coctæ comesum atramentum ægre concoquitur. Aluum molit. Collyrijs e testa factis conuenienter genarum scabriciæ perfriantur. Vstum in sua testa, donec id quod crustosum est abscedat, postea tritum, expurgat uirilignes, furfures, dentes, & uitia cutis in facie. Elotum in medicamenta oculorum addi solet. Contra albugines, oculis iumentorum efficaciter inspuitur. Pterygia oculorum absorbit, cum sale tritum & iniectum.

BARBARI COROLL.

Sepias Græci *συνίας* uocant, & Lolligines Theutidas, de quibus Marro græcus poeta cecinit. Solos piscium cognoscere, quid atrū, quid album sit. Differunt Lolligines a Sepijs, toto genere, quæ & amicitia & similitudine conueniunt. Est & Teuthos, magnitudine insignis, qua sola ferè differt a Teuthide, ut Theuthos Lolligo, Teuthis Lolliguncula dici iure possit. Atramentum Lolligini suppalidum, nigrum Sepiæ. Inuenio & libi genus Teuthida, hoc est, Lolligunculam a Græcis uocatum. Thebani ridentur a Comicis, qui Sepiam opittolicam, gallum galinaceum orthalicon, ficos tyca, hirundines cotiladas nominant.

EX M. VERG. COMM.

In uocibus uitium, & male sequax earum ductus est. Nam quod ad rem pertinet, facile est, quod hic docet intellexisse. Duo enim in Sepia. Primum sunt, quod duriore testa intra eam clauditur: & quæ foris claudit, id testa. Rursus in exteriorè testa duplex rei substantia. Quod intus pumicosum, & tenerius quæ pumex: & quod foris siliceum, durius, crustaceum, & in quo cum asperitate aliqua læuor est. Ex his in duobus tantū medicas uires aliquas esse Dioscorid. docuit: in eo quod testa clauditur, uentrem mollire: & in eo quod claudit, asperitatem palpebrarum leuigare, uirilignesque & alias his similes corporis labe extirpare: non tamen simpliciter, sed cinerem eius. Quam ob causam addidit, crematā in propria testa Sepiæ testam, &c. obscure quidem, sed necessario rei intellectu, ex eo quod sequitur, donec quod crustaceum in eis est abscesserit. Crustaceum enim hic dicit, extimū illud operimentū, quale nos paulo ante descripsimus. Estque sensus, crematā Sepiæ testam, donec extima illa pars, quam hic crustaceam dicit, ui ignis coacta, a reliquo pumicoso corpore separata ceciderit: integræ enim cocturæ indicium id erit. Post quā hic iubet, friatā in puluerem corpori inspergi. Nosque rei necessitatem, & Paulum Aeginetā secuti, ut legitur uertimus: qui de eadem hac re libro primo agens, *κακαμινον συνίας οσρακον* dixit, id est, crematam Sepiæ testam. Idem etiā nobis auctor fuit, ut in extremo capite sali fossili adiceremus: quod in aliquibus græcorum adhuc legitur, & ab eo in extendendis oculorum unguibus manifeste præcipitur.

De Mulo pisce.

CAP. XXIII.

Mulorum assiduo cibo, aciem oculorum hebetari constat. Is marini Draconis, Aranei, ac Scorpionis moribus medetur, si crudus atque dissectus admoueat.

BARBARI COROLL.

Mulum, Græci Tryglen, goneatida, hoc est, barbarum uocant: dictum ita, quoniam ter anno pariat. Præfertur ex Ionia. Est ab hoc diuersus, qui Trigolas appellatur. Item qui Myllos, de quo inter falsamenta, in Omotaricho differui. Mulum piscem Proserpinæ, item Dianæ sacrum fecere Græci: ut Citharon Apollini, Mercurio Bocas, Libero patri Citulum, Apuam Veneri, Neptuno Pompilum.

EX M. VERG. COMM.

Nouerūt gulæ proceres, Mullū piscem Græcorum uocabulo, nunc etiā Tryglen ab omnibus dictū, lauioribusque coenis cum seruari, quæ de eo iactatur ubique uox indicat, non comedi

A

PAPIA

Plin. lib. 9. capit. 29. & 51.

B

Trigla

Plin. lib. 7. capit. 18. & 51.

D I O S C O R I D I S

Ca piscatore Tryglen. Fuit huic cibo omnibus sæculis gratia, nec uile pretiū: in quo singulis sex tertijs singulæ rependerent librae, si Iuuenali credimus, dicenti, Mullū sex millibus emit, æquā-tem sane paribus sextertia libris. Hunc uenenatorū multorū moribus non recentē, ut Barba-
rus uertit, sed crudū imponi Dioscori. iubet. ὅμῃ enim in eo est, quæ uox Græcis crudum tan-
tum significat. Nescioq; ego, cur recentē potius, q̃ crudū uertere ille uoluerit, cōmunemq; græ-
carū uocū æstimationē mutare, non leui sane in medicina periculo, si crudum, & recens promi-
scua significatione misceant. Multa enim in tota natura sunt, quæ cruda uetustatem habent, &
quæ cōcta recentia dici possunt. Libet hoc loco gratias Plinio habere, qui ea quæ angustius a
Dioscoride dicta fuerant, latius explicauit. Hic enim marini Draconis, & simpliciter Scorpij,
Aranearumq; moribus imponi Mullum iubet, nullo inter terrestrem, & marinū scorpionem,
& araneas, & Phalangia discrimine. Plinius uero libro 32. capite 4. de hoc ipso pisce agens, his
uerbis rem docuit. Item contra Scorpiones terrestres, marinospq;, & Phalangia illitus, &c. Qua
Phalangiorū uoce in eo remedio usus, aliud & uenenatius araneorum genus q̃ Dioscori, intel-
lexisse uidetur. Hic enim non Phalangium, sed ἀράχην ait: eam intelligens, quæ in trabibus,
parietibusq; suas telas suspendit. Quod totum peritiorum censuræ relinquimus, cōtenti qua
debemus & possumus fide scriptoris huius uoces uertisse.

HIPPO POTAMI testes exiccati, ac triti, contra serpen-
tium morsus bibuntur. CAP. XXV.

EBARBARI COROLL. Quum fluuiatilem Hippotamon Græci appellant. Sanguine utuntur pictores. Geminus,
ut Crocodilo uictus, super Saiticam præfecturā, in Aegypto plurimus, in India quoq;, ut O-
nesicritus est auctor, amne Indo. Celebratur inuentione sanguinis trahendi.

PEREGRINUM ITALIAE fluuiatilis hic equus semper animal fuit, Romanæ tamen urbis & Cæsariū
fortuna suæ genti sæpe id palā ostendit. Viditq; Ro. Po. in Aegypti Nilo ad Saiticam præfectur-
am genitū ambiguum, & cui æque in arida ac in flumine uita sit animal, binis & quales in bu-
bus sunt unguibus, dorso, iuba, & hinnitu equi: a quibus & flumine cōposito nomine, fluuiā-
tilis equus dictus est. Rostro præterea resimo, cauda torta, dentibus aprorū aduncis, sed minus
noxij. Depasci eum segetes, testis Nicander est, Qui in Theriacis suis de eo sic cecinit.

Ἰππον τὸν νῦλον ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων
Βόσκουσιν, ἀρούριον δὲ καὶ ἰππικὸν ἐπιβάλλεται ἀρπῆν.
Ὅς καὶ ἐν ποταμῷ λιπὼν ἄλλον ἐλύνοντα,
Χιλοὶ ὅτε χλοῶουσιντόν δ' ἀπεχέοντο πόιν,
Τόσον ἐπιστῆσαν λίπει βύθονόσάτιον περ.
Εὐνέμεται γένεσιν παλίσυτον ὄμον ἑλάνων.

Quorū uersiculorū ea sententiā est. Aut equi quē Nilus supra nigricantē Saim pascit, aruifq; eū
noxia immittit falcē. Hic ex flumine egressus, relictis cœnosis fluctibus, cū frumēta flauent, &
uirentē amiserunt frondē, quātū a flumine ingrediens per arua, pgrēditur, tantū dentibus de-
pascitur, retrogrado incessu iter faciens. Quod Plinius felicissime descripsit his uerbis. Depa-
scitur segetes destinatione, ut ferunt, antea determinatas in diem: & ex agro serentibus uesti-
gijs, ne quæ reuertenti insidiæ comparentur. Plures, nec paruifaciendas in medicina uires ei
Plinius q̃ hic tribuit, quas licebit uolentibus multis locis in eo scriptore inuenisse, præsertimq;
libro 29. capite. 8. Quorum hic unum tantum probauit, quod ille scilicet ait. Testiculi dra-
chma ex aqua, contra serpentes bibitur.

FIBRINIS testibus. CAP. XXVI.

Liber ancipitis uitæ animal, plæruncq; cum piscibus & cancris ex
aqua uictum capefcit. Huius testes serpentium uenenis aduerfan-
tur. Sternutamenta mouent. Et in uniuersum uarios obtinent usus. Si-
quidem menses ac partus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti. Se-
cundas quoq; eijciunt, Contra inflationes, tormina, singultus, uenena,

ixiamq; ex aceto bibuntur. Lethargicos, & utcunq; ueterno obdormi-
scientes excitant infusi. Cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris suf-
fitu, idem faciunt. Poti & illiti prosunt tremulis, conuulsionibus, et omni-
bus neruorum uitijis. In summa, calfactoriam uim habent. Eligi debent
Testes qui ex uno ortu connexi sunt. Fieri enim non potest, ut gemini
folliculi in una membrana coniuncti reperiuntur. Liquore intus ueluti
mellis exrosi, odoris grauis, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus
tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corrumpunt, coniicientes in fol-
lem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita
exiccantes. Vanum est quod traditur, Testes ab ipsis euelli, et a sese abij-
ci, quum uenatu urgentur. Siquidem tangi nequeunt, ita ut in sue sustri-
cti. Operæ autem precium est, diuisa pelle melleum liquorem cum eue-
stiente tunica assumere, & siccatum potui dare.

BARBARI COROLL.

Fiber, quem Græci Castora uocant, ab extrema ora, ut Varroni placet uocatus, quoniā de-
extra & sinistra fluminis maxime uideri soleat. Et antiqui Fibrum, inquit dicebant, extremum.
Vnde sagis fibræ, & fibræ in auribus & iecore. Differt a Lutra Fiber sola cauda, cætero pilus
utriq; pluma mollior. Dicta uero Lutra est, q; se in aquis luter. Ob id græci eam *λυτράριον* uiden-
tur appellasse Theodoro: qui tamen lutrin, non lutram conuertit. Plinius Enhydrinda serpen-
tis nomen esse maluit, ut aquatilis colubri. Varro quoq; non lutram a luendo, sed Lytram tra-
dit: quoniam succidat, disoluatq; in ripis arborum radices. Cæterum testes Lutræ comitialibus
prodesse docet experimenta, ut appareat cum Fibro cōmunem Lutræ proprietatem esse. Plini-
us e genere inquit, Fibrorum Lutris, sed nusq; mari accepimus mergi. Archigenes iustū uolu-
men de Castorū utilitatibus conscripsit. Plurimus hic in Ponto, morsuq; hominē, nō prius di-
mittit, q̄ ossa fracta cōcrepēt, ut Solinus inqt. Nascunt & in Hispaniæ fluminibus Castores, ut
inqt Strabo, cæterū nō inest uis illa medica, ut in pōticis. Castorē porro dictum, q; sese castrēt,
ea se corporis parte redimentes, ppter quā expetunt: & pondicū esse canem, Seruius honora-
tus p̄didit. Nam qui Canis marinus dicit, piscis est, & longe a Cane Pontico diuersus. Est autē
marinus canis, etiā carmine Homeri celebris: cuius frustra Romę, thuriani pulmētī nomine uē-
debatur tribus obolis in libras, Rutiliū Ruffi etate: qui res gestas populi Romani scripsit. Hoc et
a Plinio, Tomos Thurianus, ut ego quidem primus cōperisse suspicor, appellatus est. forte a
Thurijs oppido Italię, q̄ primū e Sicilia sit cōuectus. Athenus & Thurionē, siue Thurionē
dici obsoniū hoc latīna lingua solitū affirmat. Suauissimūq; id ac lautissimū fuisse. Strabo Gale-
orē hūc, & Xiphīā uocari tradit, & quemadmodū capiat ostēdit. Dictū & Scyllā, & Lamiā, &
Carchariā quoq; arbitror a nōnullis. Vnde cōiectari liceat, aut eū esse Thurionē, quē nos uul-
go Sturionē appellamus: aut quod uerius existimandū est, ab eo quasi delicato & cupedario
piscē nomē accepisse. Notādū, Aristoteli aliud quodāmodo, sed affine tū genus uideri Scyllā,
& Canē marinū. Nā Scillaros apud eum pro Squilla parua sumitur. Nec illud omittēdū, Pho-
cænā apud eū dici, q; latine Tursio uertat a Theodoro gaza, siue Tursio, aut Torsio, ut Plinius,
Delphino similis, paulo tristior, & rostris canicularum similitudine maleficus. Hūc puto esse,
quē ab Athengō mō Thurionem, mō Thurionē, mō Thurianū pulmentū uocari diximus, a
Strabone Galeotem & Xiphiam, ab alijs Canem marinum, aut si nō iīdem omnino sunt pis-
ces, quod & ratio nōnulla suadet, certe similes fateri eos necesse est. Sunt qui græce Hyccam, si-
ue Hyccam, hoc est, porculum pro sturione capiant. Mentionem Hyccę penes eundem Athe-
nēum legas & Callimachum, qui eum piscem Sacrum uocauit. Aliud uidetur genus esse ab
Hycca, id quod Hyn, id est, suem uocant, qui sit, ut Athengō placet, idem cū apro, siue capro,
ut Archestrato, diuersum, qui suem marinam Psamitid, alijs Psammatida cognominant. Nam
oppidulum Sicilię quod Hyccara uocatur, ab Hyccarū multitudine cognominatū putant.
Cyrenæi certe hunc non Hyccam, sed Erythrinum, hoc est, quasi Rubellionem appellabant.
Sunt tamen qui & pisces luidas uocatos, Hyccas nominent, & Philetæ uersum

Ουδὲν γὰρ ἰχθυὸν ἰχθυὸς ἰχθυὸς,

A

Pli. li. s. ca. 30.

Lib. 30. ca. 3.

B

Strabo lib. 3.

P

C sic interpretentur, quia difficile sit eos capere. Propterea & uermes, quos Intestina terre dicimus, & Græci Gefentera, & Iulos a nostris, uulgaris uoce Porcelliones appellantur. Numen-
tis & Hyænam piscem cōnumerat, qui an idem sit cum aliquo ex prædictis, in incerto est mihi.
Est & terrestre quadrupes Hyæna, ut constat. Inter pisces & Syagris, a sue dicta potest uideri:
quancū inuenio quandoq; scriptum Synagris. Diphilus & Capriscum dici quendam signifi-
cat, qui & Mys uocetur. Nisi quis non Myn, idest murem, sed Hyn, idest, suem legendum po-
tius existimet. Sunt enim & mures in piscibus, quemadmodum & inter ostrea.

E X M. V E R G. C O M M.

Contra multa hominis mala, usa quondam antiquitas est, & nostra ætas adhuc utitur Ca-
storeo, præsertimq; contra uenena aliqua. Quæ uerisimile est a Dioscoride illuc numerata fuis-
se: sed ea librariorum incuria excepto uno perierunt, idq; Ixias est, quod Barbarus Viscum, ex
Plinio interpretatur ubiq;: nō satis certam nunc rem notissima Visci appellatiōe indicans, uo-
cumq; similitudine Ixiam, & Ixon simul miscens: cum tamen alterum in ramis arborum inue-
niatur, aucupio inseruiat, & in medicina non penitus inutile sit: alterum ad Chamæleonis acu-
leatę herbe radices nascatur, omni careat usu, & inter uenena ab hoc ipso, & a Paulo Aegineta
numere; quemadmodū in Chamæleone herba, & in uenenis lūgius ab hoc scriptore, et a no-
bis dice; Nec animus mō nobis est, Pliniū, & Pliniū Necutos insci; aut incuri; arguere. Fecit
em̄ ante nos id Leonicens, oī doctrinarū gñe clarus homo. Sed qđ ad nos p̄tinet, legētes mo-
nemus, qm̄ nihil Visco & Ixię idē sit, nō declinatio, nō genus, nō natales, nō usus, nō rei substā-
tia, maluisse nos græca uoce in altero q̄ latina uti, & Ixiā uenenū dicere, Viscū uero qđ in ramis
arborū natū, multos habet in re nostra usus: ne uisci audita uoce, crederent le gētes, homini ut
auihus mortem uiscum esse, abstinentesq; eo, quas habet utilitates amitterent. Certius de tota
hac re in utroq; Chamæleone, & uenenis patebit legentibus, & a nobis dicitur.

De uulgari Mustella. C A P. XXVII.

μύσση κατωρίδιον

Mustella, quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur,
& inueterata sale in umbra siccatur. Ea binis drachmis cum ui-

Dno pota, aduersus omnia serpentium uenena præsentaneo est remedio.
Toxico, simili sumpta modo resistit. Eius uentriculus coriandro factus,
inueteratusq; percussis a serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Cre-
mata in fictili, podragicis cōfert, cinere ex aceto illito. Sanguine perun-
ctæ, strumæ iuuantur. Comitialibus etiā prodest.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 29. ca. 4.

Mustella uulgaris quam Græci μύσση, Cato Ecidiōn appellant.

De Ranis. C A P. XXVIII.

βάτραχοι

Contra omnium serpentium uenena pro antidoto sunt Ranæ,
si ex sale & oleo decoctæ edantur, iusque earum iidem sorbea-
tur. Contra inueteratos tendonum rigores pollent. Illitus earum cinis,
profluentis sanguinis impetus sistit. Explendis alopeciarum inanitati-
bus ex liquida pice illinitur. Viridium Ranarum cruor, auulsos genis
pilos renasci prohibet, in uestigia euulsoꝝ instillatus. Decoctæ in a-
ceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 9. ca. 42.

51. li. 32. cap. 5.

Ranam Græci & fluuiatilē, & marinā p̄dicant, etiāmn̄, p̄ pisce, Batrachō, & poetica uoce
Batrachon uocāt, ut Iones: qđ & apud Aristophanē & Xenophanē poetas legi; Batrachio &
Chymistæ suū habent, excellentis in auri cōfectione miraculi, ex putrilagine diuini laticis nas-
centem, specie Ranunculi, uenenū p̄sentissimū, qđ uel solo halitu minus prudentes opprimat.
Hoc ab effectu Chrysocolla qđ dicit; Est & morhi genus Batrachos, tumētib; sub lingua ue-
nenis, cui simile fortasse Plinius. 26. uoluminis initio monstrauit, rubentis sub lingua duriciæ.
Inter Ranas est & quę Phrynos græce dicit; hoc est Rubeta, qā in ueprib; uiuat, quāq; prius tu-

aquis, postea sit terrestis. Perniciosa hæc, ut Chersidros. Grandissima cunctarū. Magnitudo testudinis parvæ, geminis quandoque ueluti corniculis, ut inquit Plinius, dorsum exasperat: in flatu se irata, tam proterue audax, ut insiliat quoque proximum: quamque suspirio se frequenter, quam morfu vindicans. Buffo inde, ut arbitror, a Virgilio & uulgo dicta, ueneficiorum plena, precipue ossiculis duobus: quorum in sinistro latere inuentum, Apocynon uocatur, quia Canum impetus cohibeat. Recentiores lapidem in capite huius Ranae haberi tradunt, ad dolores illius gestatu probant, sed qui uiua ea sit exemptus: quales uulgo magna etiam copia feruntur anulis: quamque hunc elici potius, quam eximi uiuentibus constat, puniceo in panno, cuius plurimum colore delectantur, ita dum ipsi feriendo relaxant se, capitis onus deponunt: id mox in subiectam cistam e medio foramine collabitur: alioquin ea est illi inuidissima natura, ut lapidem eum, nisi tolleret, resorbeat. Huic aliquando & cauda ab initio est, quam post amittit: ob id in stagnis, cum adhuc pusillæ sunt, Muti ruribus uocantur. Alterum genus, & hoc exitiale, Calamites dicitur, quando arundinetis frutetisque roris linctu uisitans, sine uoce, omniumque minima & uiridissima: quæ si forte a bubus hauriatur, distendit eas. Hanc et Dryopetem uocari credimus a Plinio, quia inter frutices & arbores uisatur. Est & genus uocalis parvæ, scandentis arbores. Inuenio & palustrem mutam inter uenena, hoc est, Eliobatrachon, diuersam a Phryno: quoniam & signa, & medicinæ uariant, præsertim Aetio. Aristoteles Ranas cões, Telmatiaeos, aut Lymnaeos, hoc est, lutarias & lacustres nominat. Varro luridam Ranam dicendo, per Calamite uidet accepisse: quoniam Philothrui sit, ut Plinius, idemque Varro affirmant, illud efficacissimum: quæque & epitheton Ranarum omnium putant id poetæ. Miror quãobrem Dioscori. Phrynõ, hoc est, rubetæ lion, quod est leuis, cognominari dixerit. Nisi quæ Rubetæ duo genera constituat. Leuis, & sine cornibus, ex qua delibutorum uenenum, sicut ex palustri quoque Muta cõdit: & Aspera cornutaque, quæ proprie sit Buffo: cuius dorsum paulo ante scabrum esse diximus ex Aetii sententia. Habetur & Batrachos halica, hoc est, piscatrix rana, sed inter pisces Aristoteli, Ciceroni, Plinio.

EX M. VERG. COMM.

Non est Ranis omnibus unum genus, nec idem color, aut similis uita & mores. Nascuntur aliæ per se, conspersis tantum æstiuo imbre, littorum & idnerum puluerulentis harenis: quarum breuis uita, & nullus usus est. Habent aliæ legitimo naturæ ordine in aquis suos natales, nec mare tantum, sed profluentes omnes & palustres aquas incolunt. Sunt & quæ in sicco agunt: quales Rubetæ, & quæ in harundinetis inueniuntur, Calamitæ ob id appellatæ, inutiles, & ob uenenum suum letales. Sunt & in fluuiatilibus & palustribus, quæ uiridi, & quæ liuido colore sunt: quæ itidem tutius, & quæ non sine periculo comedi possunt. Ex toto hoc genere ferpentibus aduersari intelligendæ sunt, in profluentibus, aut stantibus aquis agentes, & in cibis utiles. Et quas hic uirides, nouum in palpebris pilorum incrementum prohibere dixit, in aquatiliū illarum genere eo colore cognoscendæ erunt.

De Fele. CAP. XXIX.

Reccens Felis in cibo nutrit, & facilem præbet aluum. Sale uero conditus, non suppeditat alimentum. Arteriam expurgat. Et uocem expedit. Illita saliti caro, aculeos extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in desidentium fots adijciatur. Fluctuones siquidem ad summa cutis elicit. Ischiadicis infusa medetur.

BARBARI COROLL.

Silurus, piscis est fluuiatilis, qui & alibi quam in Nilo nascitur. Aetius, Silluarion, ut puto, uocat hunc, cuius selle suffusus oculos inungi cum attico melle præcipit bobus. Aristoteles uidetur Silurum intelligere Theodoro, cum Glanin piscem nominat.

EX M. VERG. COMM.

Thynnus precipue magnitudinis in mari pisces, æquant in fluminibus aliquot nascentes Siluri, priuatimque in Aegypti Nilo. Vnde maxima eis ad ganeam laus in poetis & gloria. Feroces ipse uti in piscium genere, & qui non aliter quam hostes in aqua latrocinantur, obuia quæcunque appetentes, & quæ in ferocioribus rarum est, multo prolis amore. Aedita a foeminis oura, mares in hoc genere ne pereant custodiunt, tantopere sibi seruandis: rerum generibus natura consultit. Crediderunt iuniores aliqui, Siluros esse quos nostra ætas Sturiones uocat, sed falso. Thynnus enim similiore Siluri sunt, & eorum magnitudinem æquant.

A

B

ἄλγρον νιάρου

Pli. li. 9. c. 15. 510

D I O S C O R I D I S

C De Cerro pisce. CAP. XXX.

σμερίε

Cerri salit caput exustum, excrecentes ulcerum oras, puluilloſq; reprimi. Nomas cohibet. Thymos, clauosq; absumit. Caro nō secus atq; falsamentū pdest a scorpione pēssis, aut a cane demorsis.

BARBARI COROLL.

VERG.

DE Smaride, siue qd idē est, Maride, in sequenti mentione dicit. Illud in transcurso nō silebit, Marida genus etiā mēsurę dici apud Aristote. quę ut inquit Iulius Pollux, heminas. 6. capit. MAenis cōgeneres, de quibus mox dicit, Smarides sunt, tā similibus inter se notis, tamq; mixtis natalibus, ut mutatis iam pridē appellationibus, nō facile nūc sit alterū genus ab altero secernere. Id ego non ausim quod alias dixi, procul a mari natus homo. Poteram & ipse hoc loco quę Plinius, Athenęus, pluresq; alij de utroq; hoc genere longius tradiderunt, in unum collecta coaceruare, sed nihilo magis res patuisset.

C De Mænis. CAP. XXXI.

μαίνε

MAenarum ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas abolet. Eius etiā garrum corporis putredines collutione sedat.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 32. ca. 11.

MAenas gręci Mænidas appellant, laudatissimas e Lipara. uulgus Mænulas. Aleculam quasi ex Plauto Theodorus interpretatur. Ego Aleculę uocabulum generale credo, idem apud nos significans quod apud gręcos Anthracides, ut in Halme demonstrabimus. In Pañonia pisciculum quem Menapij & Belgę ceteri copiosissime uenantur & inueterant, Arengam acas, et Smaridas. Candidiores nepe Mænas. Sunt qui Boacas, siue Boecas appellant, hoc est, Leucomænidas. Smarides uero, siue Marides, sunt quas nōnulli uocant Cynoseuma, ut inquit Athenęus. Aristophanes byzantius, solus non Bocas, sed Boopas uocandos existimabat: quia parui essent, & magnos oculos haberent. Miror unde Theodorus Cerros interpretetur, quas gręci Smaridas appellant. Sūt quidē Gerres, Plinio, Martiali q; inter uiles, ut illo uersu, Fuisse Gerres, aut inuiles Mænas, Odor impudicus urcei fatebatur.

VERG.

Non cinere Mænarum in medicina tantum Plinius uitur, sed carnibus etiā: quibus impositis, docet uerendorum pustulas sanari.

C De Gobio. CAP. XXXII.

κόβιος

Gobius recens in suillum uentrem coniectus, si contusa rima in duodecim aquę sextarijs, donēc duo supersint decoquatur, & sub diuo refrigeratus potui detur, alius sine molestia deijcitur. Illius cōtra serpentium canumq; morsus auxilio est.

BARB.
Pli. li. 9. ca. 57.

Gobius, & Gobio uocat & gręce Cobios. Plinius quōq; p. c. scribit, nō per. g. secūdo & 50. Quolumine. Præferē nigro cādidus. Deterrimus omnium est, q uiridis appellat, etiāsi grandissimus, quem Diphilus Caulinem dici testis est. Gobios saxatiles, sunt qui Cothonas dici putent. Siculi certe Gobium, non aliter q; Cothonem uocabāt. Sunt & fluuiatiles qdam Gobij.

VERG.

In mortario tustum antea iubet ad deijciendā aluū Paulus Aeginetā decoqui in aqua Gobij. Piscis e uilissimis est. Ob quam causā in Satyra Iuuenalis ait. Nec nullū cupias, cum sit tibi Gobio tm In loculis. Laudauit contra Martialis in xenijs dicēs. In Veneris sint laura licet cōui uia terris, Principiū cœnę Gobius esse solet. Plinius paulominus q; in eo genere Gobium nūmerauit, in quo terreni pisces censentur: quoniam palustris, & quasi incolā terrę sit contra aliorum piscium naturam. Declinauerunt ueteres latini in secunda & tertiā declinatione eundem significantes, ut ex paulo ante citatis exemplis aperte patet.

C De Thunno. CAP. XXXIII.

θυστάρηχος

Conditanei Thunni caro, quā Omotharicō uocat, sumpta, ijs auxiliant, quos uipa noīe Prester, momorderit: sed oportet uinū q; plurimū subinde cogantur haurire, ita ut uomitione reddatur. Cōtra

acrimonias esicatorum maxime ualet. Canum mosibus utilissime illiniē. **A**

BARBARI COROLL.

Omotarichos e Thynno, falsa caro dicitur, Thūnina uulgo. Paulus Tarichon, siue Tarichos, hoc est, salsamentum. Differt autem a Salsamēto Salgama, ut ex Columella facile colligitur. Salsamenta Græci duorum generum fecere, Horæa, & Thūnia. In Horæo, quod a tempestiuitate uidetur appellatum, macra pinguibus, in altero macris pinguiā præferri: quæ Cybia dicuntur. Inter macra sunt, ut inter pinguiā Cordylæ. Horæa ex Pelamyde, id est, Lutaria minore fieri. Thūnnia ex maioribus: quas aliqui Synodontidas appellant. Aliud genus uidetur, q. Synodontes uocantur, & a nostris Dentices. Similis est Pelamydibus & qui Triton, siue Chelidonias uocatur, nam Chelidon, aliud genus est, Polypo, ut inq. Diphilus, simile. Adiciamus obiter & prouerbiū, quod fertur. Salsamentum putre cunilam bubulam desiderat. Item & illud. Salsamenta simul ignem uidere, cocta esse. Crates salsamentum celebrat Elephāthinon a se uocatum: cuius & Aristophanes meminert, sicut Omotarichon Alexis. Inuenio & Hemitarichon: & quod ab hoc plane differt Hemineron. Vtrūq. Salsamēti genus est. Sed Hemineron e Coracino: quem Alexandrini Hemineron appellāt. Dicitur & Pelses, & Saperda Coracinus, & a nōnullis Aeolias Meotide stagno cōmendatissimus: quanq. alius piscis est Aeolias Epicharmo. Nam & Saperdam Photion, p. Apua inueterata & arundinibus infixa capit. Item pro Succidia, & Larido, quod Paphlagōes, inquit, Ionden quoq. appellant. Laudantur in salsamētis Delcani, a Delcano amne dicti, quos aliqui Leptinos, & Lebianos cognominant. Item Mylli, quos & Platistacos, & Plastacos nominant, utiq. maiusculos, sed cum parui sunt, Gnotidia, sicut media ætate Myllos. Sunt tamen qui Platistacos, & Plataces eodē esse cum Coracinis putant. Inter Salsamenta preciosa, est & quod Spondylos uocatur. Athenæus certe id, quod in capite Mugilum Echinata specie conspicitur, Spondylum dici meminit. Item est ubi & ipsum Horæi salsamēti Spondylum cōmendari scribat. Sexitana, siue Gaditana, ex Orcyno, quæ Clides & Clidia, hoc est, ex eo Iuguli dicuntur. Quemadmodū ex Antaceis uocatis maxillæ, palatæq. Antaceis nōmen uidetur amnis dedisse, in Meotim lacum asiatica parte influens. Magnitudine sunt Delphinis pares, & ipso Cimerij Bosphoro gelu fodiuntur plerūq. nullis ossibus spinisq. ut Herodoto placet. In Borysthene copiosi, carne prædulci, ut ait Plinius. Ex Orcyno sunt & Melandryæ. Sed et pubes eius tota salem accipit, admodumq. pinguis est. Pamphilus Melandryn, genus Thynni grandissimū esse statuit. Diphilus pisces quosdā salsamentarios uocauit Costas. Aetate nostra Græci piscem Hyscā, de quo supra dixi, tribus nominibus inueterant. Rhachin partē eius Dorfuariam & Spinalem uocantes. Quam nostrū uulgus, schinalem corrupte appellat. Pleuram, id est, costas & latera. Hypocœliō, id est, aluam eius atq. pubem. Hunc piscem, ut testatū sumus, Italia Sturionem modo uocat.

EX M. VERG. COMM.

Quem composito ex crudis Thynorum carnibus et salsura nomine Omotarichō hic nominat, ceteri oēs simplici plerūq. Tarichon dicūt. Salsamentū qd. pisciū carnibus & sale constat, non simplex, aut unū, sed quot fere sunt in Thynnis ætates, corporis partes, habitus, loca, & piscationis tempora, tot etiam nominibus ab antiquioribus græcis discretum, nec Thynnorum tantum, sed aliorum etiam piscium quorundam carnibus confectū. Eius rei longiorem historiam Athenæus libro primo Dipnosophistæ sui prosecutus est, quæ græcarum literarum peritis in eo legenda relinquimus. Eius autem linguæ ignaris in Barbaro, qui licet breuius q. oportebat ex scriptore illo plerāq. collegerit, plura tamen q. in latinis inueniri possint exscripta ab eo in Corollario suo fuerunt.

De Garro. CAP. XXXIIII.

Garrū omne quod ex piscibus, carnibusq. sale maceratis liquamen est, illitum, depascencia ulcera sistit. Morbis a cane medetur. Dysentericis, atq. ischiadicis infunditur. Nōnullis ut exulcerata adurat. Alijs autem ad lacestanda, quæ ulcera non senserunt.

BARBARI COROLL.

Garus, & Garrū dicitur, a Garo pisce, ex quo olim conficiebat. Postea ex Scombro pisce. Laudatissimum in finibus Carthaginis spartariæ Cætaris, quod Garrū sociorū appellabat, singulis millibus numum pmutantibus, congios pene binos. Nec liquor fere ullus, præter unguenta, maiore in precio erat, Scombri quidē Mauritania, Beticaq. & Carteia ex Oceano in-

p. iij

Pli. li. 31. ca. 79

D I O S C O R I D I S

C rantes capiebantur, ad nihil aliud utiles. Græci optimum Gari genus putant, quod Hæmati-
 on, hoc est, Sanguiculum appellat, ex intestinis Thynni, cum brachijs, sanie, ac cruore. Garū,
 & Clazomenem, & Pompeios, & Leptin nobilitauit. Vitium huius est Alex imperfecta, nec
 collata fex, neutro dumtaxat genere, ut Plinius atq; Flaccus, & primus omnium Plautus effe-
 runt. Si quidem & græci liquamen uocant id, quod purissimum ex eo fluxit: id autem quod fe-
 cis instar in cophino (ita enim uocant) obmansit, Alex. Vnde liquimarij dicantur. Quod etiā
 pro liquore accipitur, promiscui gregarijque piscij: ut iam ad Ostrea Echinos, Vrticas, Cāma-
 ros, Mulorum iocinora pertineat. Cāmari sunt, quos græci quoque Cāmāros appellant: itemque
 q; pisciculum, ut est apud Catonem, atq; Plautū. Columella ritalem nominat Aleculam, in-
 ter pisciculos, & incrementi parui fluuiorum animalia. De hac uoce quid sentiremus, in Mena
 & Halme diximus. Cœpit uero Garum & priuatim ex inutili pisciculo, minimoque cōfici. Apu-
 am nostri, Aphyen græci uocant: qā nōn alio principio fere, q̄ ex pluuia nascat, quasi Dypsphy-
 es: ob id Apulas Theodorus, nunc Apuas cōuertit. Eundē Aphritida q̄q; nomināt, & Gonō
 thalassion: qm̄ ex spuma tm̄ marina coalescat. quanq̄ Aphyarū multa gna notant. Sed Aphri-
 tis omniū pstantissima est. Quā & Aphrō, & Aphryan q̄q; uocāt. Quæ uero int̄ has alba ē, Ci-
 bonis appellat. Meretriculas Athenis fuisse quasdam legimus Aphyas cognominatas, qā gra-
 tiles & cādide magnos haberēt oculos. Græci Phalericas maxime pbabāt Aphyas. Foriulien-
 ses, ex pisce quē Lupū uocāt, ipsi Garū faciūt. Creuerunt deinde ad infinitū gna. Nā et ad colo-
 rē multū ueteris fiebat, tā dilutē suauitatis, ut bibi posset. Aliud uero, ad castimoniarū supstitutio-
 nē etiā sacris Iudeis dicatū, ex piscib. squama carētib. Garus latinū nō habet nomē, ut Ausoni-
 us poeta autor ē, q & liquorē Sociorū uocauit. Nec scio cū qbusdā, q Ausoniū poetā id uelit
 dicere qd nō dicit, quasi sociorū Garū appellauerit antiquas: ut Græcū nomē Garū, latini nomi-
 nis, hoc ē, sociorū accessiōe mollesceret, ita ut quasi græcū uideri delineret. Nō hoc Ausonius
 intelligit, sed illud. Malle se ingt uocare Muria, cū sciētissimi ueterū, & uocabula græca fastidien-
 tes, latinū in Gari appellatiōe nō habeant. Sed q̄cūq; ingt nomine liquor iste sociorū uocetur,
 iam patinas implebo meas, ut parior ille Maiorum mensis Apuarum succus inundet,
 Mendosus erat locus. Nam & pro in gari appellatiōe, legebat ignari. Et pro apuarum, apala-
 ria. Vtrūq; lectiōni uerā legitimeq; restitui. Differt porro Garum a Muria, & Alece: q Garū
 ex extis Scombrj, & quondam Gari piscis fiebat. Muria ex Thynno fere Antipoli thuriā: in-
 de uero & Dalmatiā nobilitans. Quanq̄ Muria, siue Muries Catoni, Palladio, Columellæ nō
 liquamē ex piscibus, sed falsilaginé facticiam ad caseos cōdiendos, uinaq; significat. Erat & sua
 uestalium Muries, ut ingt apud Festū Verrius, certis prescriptisq; rebus condita: ut quē ritua-
 lis esset, & ad religionis quæsitā ceremonias. De Alece supra dictum est. Habetur & Halme di-
 cta, latine Salsugo, & Salsilago, apud Dioscoridem & Plinium. Quanq̄ in medendi usu Salsu-
 ma, cuius mentionē apud latinos in Plinio tm̄ cōperi. Habet & Oxalme appellatā, q ex aceto
 & sale fiat. Nā Gari genus acidi Oxigarū appellatū, ipso nomine significat. Columella Oxiga-
 rū Moreti genus facit, & Oxiporū q̄q; dici posse uult: rationē eius cōdendi totius opis sine red-
 dit. Vide id nominis habere. quia cum usus exigit, aceto Garoq; diluit. Sunt & sua medicis
 Oxypora, sicut & Hydrogara, & Oenogara, & Eleogara. Alioqui Eleogaron & ferculi genus
 erat delicati, quod Sibariticum, missum in cœnis appellabāt: qm̄ Sibaritē quo aīo id ganeæ in-
 uenissent, perissent, autore Spartiano. Inuenio & Oxiliparō genus esse iuris, in quo Raia, ac
 ceteri eius nature pisces mādī soleāt. Isicia quid sint, nemo ignorat, sed e piscibus inuenisse pri-
 mus traditur Heliogabalus, inter ganeones potius q̄ Romanos principes dicendus.

E X M. V E R G. C O M M.

Satis in Garo nobis fore credimus, si quæ corrupta in hoc capite sūt, in antiquā & uerā lecti-
 onē instaurata fuerint. Quod fiet, cum breuiter dixerimus, esse Dioscoridi Garū, nō ut alijs, qd
 feculentū carnosūq; in eo subsedit, sed qd ligdū, & aquæ mō fluens supnat: neq; in piscibus
 tm̄, sed in animalium carnibus Garū etiam dici, qd ex earū salsura exsudatū, siue ut Columella
 ait, exsaniatum fluxerit. Et qm̄ liquidum sit, ideo in medicinæ usu, non illitum dicendum, ut
 ceteri interpretes uerterunt, impressi tantum codicis lectiōnem secuti, in quo καταπλασµονος
 quod illitum significat legitur: sed ut nos diximus, meliorum fidem secuti, si eo foueantur, κα-
 ταπλασµονος enim, est quod uerbum certam in græcis habet significationem, cum liquore ali-
 quo quidpiam fouemus. Quod totum rei necessitas exigit. Fouemur enim liquidis, & insper-
 gimur, non illinimur. Postquam usus in strumis, & canum moribus rationem aliam docere

aggressus, non *uicti* aduerbio, quod interim, & aliquando significat Dioscorides ait, intesti-
norū tormina & coxēdices sanari, sed uerbo *uicti* usus, inijci & infundi Garū oportere dixit;
leuis in una tantū literā lapsus, sed qui usum Gari in his malis, & oēm huius scriptoris hac parte
intellectū confundat. Quod an aduertere alij interpretes debuerāt, nec tam incerto sensu.

De Iure piscium.

CAP. XXXV.

Recentium piscium Ius, modo per se, modo ex uino potum, al-
uum subducit. Priuatim ad hunc usum conficitur e gobijs, &
scorpionibus, & iulide, e percis, & recentibus alijs saxatilibus, nec uirus
recipientibus, simpliciter cum aqua, oleo, & anetho.

BARBARICOROLL.

Saxatiles Græci uocant Petreos, quos saxosum mare nutrit, ut Merule, Turdi, Elephēdēs,
Menaluriæ. Tria enim sunt piscitij marini genera, siue littoralis. Limosa regio planum piscem
educat, ut Soleam, Rumbum, Passerem. Harenosū gurgites pelagium, ut Auratam & Denti-
cem. Saxosum litus, Saxatilem. Inter quos principatus gulæ Scaŕo. Deinde Turdo, ac Meru-
læ. Post hos Iulides, Phycides, & Percides, hoc est, Percæ laudantur ab Aetio. Iulidas Theodo-
rus in Aristotele conuertit Iuliam, Diphilus Phycidas, & Phycenas, quasi genera duo, sed uici-
na tamen inter Saxatiles enumerat. Porro contrarij Saxatilibus uidentur, quos Hippocrates
Planetas, & Cymatophlegas, hoc est, Errones & fluctuāgos appellat.

EX M. VERG. COMM.

Saxatiles, qui a Diosco. numerantur hoc capite, cuncti pisces sunt: non ideo tamē, quod Bar-
barus fecit, mutandus capitis titulus erat. Neq; enim de carne eorū agitur hoc loco, sed de escū
lento iure, quod coctis piscibus his fit, quo deniq; posse aluū hic scriptor ait. Sunt autem Aristo-
teli, Plinio, multisq; alijs Saxatiles pisces, quos saxosum litus nutrit, in agrotantium cibis a
Paulo Aegineta sæpe laudati. Eorum iure hic deniq; aluum iubet, sic tamen, ut simpliciter, id
est, nullo addito condimento, aut sapore alio, in aqua præter ab eo numerata, oleum & ane-
thum coxisse eos oporteat. Nos solum ex ueterum codicum lectione, & Paulo Aegineta adie-
cimus. Quod & antiqua Dioscorid. interpretatio habet. Cuius licuit mihi uidere antiquissi-
mum, & Longobardis literis scriptum codicem, in corruptæ antiquitatis, multa adhuc uesti-
gia seruātem, in quo etiam sal oleo, anethoq; additur.

De Cimicibus lectularijs.

CAP. XXXVI.

Cimices, qui in cubilibus enascuntur, cauis fabarum inclusi, si ante
febriū significationes septeni deuorētur, quartanis auxilio sunt.
Et citra fabas illiti, percussis ab aspide profunt. Vuluarum exanimatiōes
olfactu reuocant. Porri cum uino, aut aceto, adhærentes sanguisugas abi-
gunt. Triti, & urinariæ fistulæ impositi, stranguriam leuant.

BARBARICOROLL.

Cimices lectarijs, græci Cōres Clinicos appellant, ad differentiā syluestriū, in maluq; na-
scentiū, ut arbitror. Aduersant aspidibus Cimices, adeo, ut gallinās quo dñe hoc animal ederit,
interfici ab illis negent. Contra Cimicibus Scolopendra, ut quæ suffitu necet eos.

EX M. VERG. COMM.

Foedissimum sane animal, dictu quoq; fastidiendum Cimex: ob quem non male descensu-
rus ad inferos Bacchus, in lepidissimo græcorum Comico, iter illud ostendit sibi precabatur,
& eas dari cauponas, in quibus paucissimi Cimices essent: Nihilominus concordia illa re-
rum, & repugnantia, quæ totam duce natura explet medicinā, quod homini prodesset,
aliquid in eis esse uoluit, non omnibus, nam in lectis inueniuntur Cimices: inueniuntur, &
in oleribus aliquot: præsertimq; in Malua; quos Plinius Agrestes nominat. Sed his tantū
qui circa nos nati contra quartanas a Dioscori. numero septem cauis fabarum inclusi deuor-
rari iubentur. Quod remedij genus falsum, nec referendū Plinius dixit, damnauitq; agresti-
bus tantum Cimicibus id tribuens: & præter fabas, ouo, ceraue includi ostendens. Quod mi-
retur aliquis in eo, qui noua, superstitiosaq; hæc in medicina remedia magnopere amaret.
Nos in plæbe & agro uidimus aliquādo id fieri, dantq; in cunctis febribus sorbendos, tritos in

σομοῖ ἐκ τῶν ἡδ
πῶν ἰχθύων

κόρη

Pli. l. 29. ca. 4.

D I O S C O R I D I S

C puluerem Cimices. Contra aspides prodesse eisdem testis itidem Plinius. Sed quod nouisse in Dioscoride oporteat, non καταπασθίντας, id est, illitos, ut fere Græci omnes habent, sed ut in melioribus adhuc legitur, καταποθίντας, quod est, deuoratos.

non capio

De Millepeda.

C A P. XXXVII.

Millepedæ, quæ sub aquario uase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ contacta manu, contrahunt in orbem. Hæ ex uino potæ, difficili urinæ, & regio morbo auxiliantur. Millepedas illini anginis utilissimum. Tritæ, & in cortice mali punici calfactæ, doloribus aurium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.

Plin. lib. 29. ca. 6. li. 30. ca. 5.

B A R B A R I C O R O L L.

Onos, latine Millepeda, Centipeda, Multipedaq; dicitur: Græci & Oniscon, & Tilon quoq; uocant: Galenus & Cyamon, a fabæ similitudine, fuscum colore. Photion & Iulum dici credit. Sed Iulus Vermis terreus est potius, quem Lumbricū uocamus. Athenæum sequor. Pilosia hæc, & arcuatim repens. Aliud genus Multipedæ habetur, quæ non arcuatur, Sepe uocata, & Scolopendra minor: quæ perniciofa quoq; est. De hac paulo post tractabitur. Illud meminisse oportet, Onon & Millepedam uocari & quoddam locustæ genus, ut dicitur. Oniscos & piscis est, quem nos Asellū dicimus, duos in capite lapillos, & cor in uentre habens solus omnium: hunc Græci etiam Banchon, & Chellaren, siue Gallarian appellant. Est & Mugilis genus unum cognomento Banchos, id uidelicet, quod ab Aristotele Chelones dicuntur, omnium minimi. Porro non defunt, qui inter pisces Onon ab Onisco dirimant, Onon & Gadon uocantes, Oniscon uero Gallarian, siue Galleridam, atq; Maxinon. Nam Onias Scari genus est. Sunt enim Scari alij Oniæ, alij Aeoli cognominati. Oniscos porro Hippocrati uulnerarium instrumentum est, ad luxata corporum, Aetius Oniscon marinum, ad uitia interaneorū commendat. Piscem intelligat, an uermem, non satis scio.

D

E X M. V E R G. C O M M.

Notæ omnibus Multipedæ hæc, nullibi non in humidis & aquosis nascentes: Græci a liuido colore ὄνους, quasi Asinos eas uocauerūt. Antiquiores Romani a numero pedum, nostra ætas & gens a totius corporis specie Porculos uocauit. Eas nos in aquosis & humidis agere potius, q̃ sub stilis diximus, Paulum Aeginetā, & rem ipsam secuti. Frequentiores enim in humidis, q̃ sub aquarijs uasculis inueniuntur: & ille non ὑπὸ τῆς ὑδρίας, quod est, sub hydrijs, sed ὑπὸ τῆς ὑδρίας, quod est, ubi hauritur & tractatur aqua, inueniri & agere Multipedas dixit. Meminit earum lib. 5. de animalū historia Aristoteles, quo loco de pediculis animalium agit, quos in piscibus similes Multipedis his esse dixit, præterq̃ in cauda, quā illi latiorē habent. Vocauitq; ὄνους πολύποδας, id est, Multipedes asellos, quoniam ὄνους, id est, aselli nomen hoc commune uagumq; per multa animalia in græcis sit: nam & in quadrupedum genere, piscium, & locustarum aselli nomine aliquid indicatur: quam ob causam Multipedes ille adiecit, idq; animaduertentes latini ueteres, a pedum numero Multipedas eas uocauerūt.

σίλφην ἐν τοῖς ὑπεροκοποιῖς

De Blatta pistrinaria.

C A P. XXXVIII.

Blattæ eius quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita, aut cum oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

Pli. li. 29. ca. 6.

B A R B A R I C O R O L L.

Blattas, Græci dicunt Silphas: ridendo cuiusdā errore, qui Silphiophoron Cyrenis agrū, hoc est, ut Catullus inquit, Laserpitiferū, a Blattis cognominatū, ratus Blattiferū, conuertit in Strabone. In his pinguitudo quædā est, capite auulso, quæ celerrime trāsit in uermiculū. Plura earū genera; Mollū, & q̃d Myllæcon appellauere, quoniā circū molas fere uisat, fortasse quā Mylacrada noinat Aristophanes. Tertū genus odoris tēdio inuisū, & exacuta elune fastidiedū.

E X M. V E R G. C O M M.

Longe breuior, q̃ Plinius in Blattarū remedijs Dioscorides est. Ille longiore historia Blattarum genera omnia, & singulorū priuatim remedium aliquod profecutus est: hic in uno genere unum tantū remedium docuit. Causam peritiores conijciunt. Nobis ad suspicionem inclināt animus: facitq; in aliorū abundantia tanta capitis huius paupertas & breuitas, ut suspicemur non esse integrum hoc caput, nec ex antiquioribus, & melioribus Græcis, quæ id ostendant,

coniecturæ defunt. Sed male sola suspitione de re aliqua censetur, ob id consulto eas relinquitur. Est autem in Plinio locus libro vigesimo nono capite quinto.

PODAGRAS, pernionesq; emendat Pulmo marinus recens, tritus & illitus.

De Pulmone marino.

CAP. XXXIX.

Marinus pulmo, Pneumon thalassios a Græcis uocat. Pulmo etiā Pleumon dicitur attice.

EX M. VERG. COMM.

Quales in mari Pulmones sunt, nouerūt qui ad mare habitant, fruticum natura magis q̄ piscium: & in eorū censu & ordine, quæ a ueteribus Græcis ζωφύρα, mediō inter plantas & animalia habitu dicta sunt. Nomen illis similitudo fecit. Plurimū dierum in pelago hyemē Pulmones marini portendunt: & in sanandis hominū aliquot morbis egregias habent uires.

De Suillo pulmone.

CAP. XL.

Svillus, & Agninus, Vrsinusq; pulmo impositu, intertrigines ab a-
quis contractas, ab inflammatione tuetur.

De Vulpino pulmone.

CAP. XLI.

Pulmo Vulpis si arefactus bibatur, suspiriosos adiuuat. Adeps quoq; liquefactus, infususq; auri dolore finit.

Pulmones Equini, Suilli, & Vrsini, ceterorūq; animantium, ex Dioscoridis instituto referēdi erāt. In his quādo nihil erat scitu admodū dignū, ad diuerticula multę lectionis uenimus, q̄ nec inutilia, nec iniucūda futura sint lectoribus. Suem igit Græci Hyem uocat, & Sin, & Hyn. Aliquādo Thytem, q̄ a suillo pecore antiqui principii imolandi sumperint lactentē porcelum, qui & Subgrumus est: Græci Orthagoriscō uocat, quia matutinis uenales essent. Sed cōmuniōri uoce Galathenon, Agnū Amnon, & Arna, & Arnon, & Rhena Hippocrates, Agnam Amnada, & Amnida, Hircū tragon, & Aegyptia uoce Murem. Vrsū Arcton, Arcon ue. Arietē Veruecemue Crion & Cilon, præcipue sectariū. Vulpem Lampurim & Alopeca. Est & uolucres animal, & piscis hoc nomine. Græci certe Alopecis uocabulo, in medicina quādoq; intelligūt carunculas musculares eas, quę utrinq; lumbos anialis quasi uestiūt: quas Hippocrates Psyas, Aristoteles pro lūbis ipsis Psoas, & Psoas, Hieronymus Psyas pro renibus accepit. Alij Neuromerras uocat. Earū porro caua, inanitateq; partiū, Cibos nominat, & Lagonas, nos Illia: unde Lagonoponos, qui sit dolor Illiū, alius q̄ qui laterū dolor appellat, hoc est, Pleuritis. Vulgus eā partē græca uoce, sed luxata inuersaq; significat, non lagonē dicendo, sed Galonē. Dicta uero Illia existimo a tenuitate, q̄ ea pars imbecilla, sublesta, ianis, & flaccida sit. Ob id & Ceneones itē Lagonas uocatos, Athenus auctor diligētissimus affirmat. Nam & Lagana, & Artolagana hinc nomē habuere, quasi lagara. Porro Ina, & Illa gracilis est pellicula, ut Festus prodidit: unde Illia crediderim fuisse nōiata. Quādoquidē tenuiora quoq; intestina, q̄ in homine, atq; oue Lactes proprie uocant, ut Plinio placet, Illas ueteres appellauere. Theodorus certe Gaza, Lactes interpretat, pro eo quod Græci Mesenterion appellat: nec quē sit auctorem in ea re secutus uideo. Illos certe morbi genus est, ita Græce dictus: nec arbitror, aut Illas, aut Illia hinc esse deriuata. Ina quidem Græcis & neruum, & uim significat. Dicitur Sus a Græcis etiā Choeros, hoc est, porcus. Nam Porceta est, quæ semel peperit, Scrophia quæ sæpius. Mulieres inquit Varro nostræ, nutrices maxie, naturā qua foeminae sunt, appellant Porciū, & Græci eadē significatione, Choeron, siue ut Athenæus inq̄, Delphacā: unde qui fratres sunt Adelpi nominant, hoc est, uterini. Porro Delphax porcus est adultus, atq; masculus, ut grāmaticus Aristophanes existimat, Choeros uero dum adhuc tenet est. Alij cōtra uolūt. Hippocrates usum carnis & Choero dānat, cum e Sue, hoc est, uis cōmendet. Certe Delphax, & pro foemina Sue capiti quādoq; a poëtis, sicut & Choeros quoq; apud Iones. Opimas Sues Græci qui dam sunt qui Petalidas, & Larinas cognominēt. Alterū nomen a uutilis deriuatū est, quos illi Petalos appellat: ubi patula habere cornua cōpere. Alterū a bubus, quos e pastoris nomine Larinos uocabāt, siue a larina Epiri uicūlo, siue a græco uerbo saginā significāre. Dicitur Sus & Verres, & cū exectus est, Malalis: ut in gallis gallinacis Capi, & in equino genere Cantherij: quia seminis usu careant. Nam Canthelios Græci pro segnibus accipiunt atq; tardis: ab

πνύμων θαλάσσιος
8108

χοίριος καὶ ἄρ-
νιος καὶ ἄρκειος
πνύμων

ἀλώπικος πνύ-
μων

B A R B.
Aristo. de par-
tib. animalium
lib. 3. cap. 6.

B

D I O S C O R I D I S

C asinorū similitudine, quos Canthonas appellant, a clirellis, quas Cantheleos uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

Spirandi officina Pulmo est, attrahens ac reddēs animā, idcirco spongiosus ac fistulis inani-
bus cauus, quibus aperiens se excipiat, contrahens uero aerem reddat: eamq; ob causam ope-
ratione foliibus in fabrica, figura autē bubulæ ungulæ similis est. Preciosum uicē instrumentū,
& quod nō ratione hac tantū eam a morte distinguat, sed ex bestijs, quadrupedibusq; aliquot
homini medicinā faciat. Quā nos certius docere cupientes, quod in impresso codice legebatur
ὁ δάτων, quod aquarū significat, ὑποδιδυμάτων, id est, calceorū necessario mutauimus. Obseruauī
mus etiā in Vulpino pulmone monere Paulum Aeginetā, non simpliciter ὑρανθίντα, quod est
siccatum, sed σκελετινόντα, id est, sale inueteratū suspiriosis prodesse. Quod ad hēcere his placu-
it, ut siccandi eius exti certiorē rationē legentes haberent.

De Asinino iocinere.

C A P. XLII.

ἵπκρ ὄνιον

A sinī iecur inassatum, esu comitialibus prodest. Verūtamen iec-
uinis edendum præcipitur.

A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 32, ca. 11.

Haberi & piscem ferunt, qui a iecore dicatur Hepar, & Hepatus, qui selle careat, in capite
lapillos duos habēs, ostrei colore, sed rumbi forma. Hinc Eubulus, Rebaris, inquit, carere bili
me, nec mecum aliter q̄ cum Hepato pisce loquebaris. Hunc Phagro, & Rubellioni similem
Speusippus facit. Archestrato, Lebias uocatur. Inter saxatiles a Diole ponitur. Color ei ni-
ger ab Aristotele tribuitur, oculi maiores, q̄ pro corpore, cor triangulum atq; candidum. Et
hæc dixisse in transcurso nihil officit.

E X M. V E R G. C O M M.

Continuata historia in uetustioribus & melioribus græcis de aliquot animalū iecore agi-
tur: neq; ab re. Male enim a toto partes, & a genere species alterius rei intercessione separan-
tur, Eorū nos fidem & rei rationē secuti, de omni in scriptore hoc iecore deinceps egimus: nihil
Dioscoridi nociturā ab impresso codice mutationem hanc nostrā opinati: præsertim ut dixi-
mus, meliorū uetustiorumq; fide & rei necessitate confirmatā, neq; ex his quæ reliqua in anima-
libus mox dicēda erunt quidpiā auferētes. Multū, longeq; plus q̄ cordi, iecori detulerunt anti-
qui aruspices: caput extorū in eo constituentes, & eius notas omnes ad futuram fortunā dissi-
gentius obseruantes. Plato etiā, excepta iracūdia, affectionū aliarum omnīū nostrarum sede in
eo constituta, multas et graues quæ in exto illo fiunt labe, ut nos credimus, contemplatus est:
pro quarū multiplici curatione, ut aliquā naturæ gratiam idem referret, medicinæ se miscuit, &
ex diuersis animalibus diuersa curauit, & adhuc curat mala.

De Genitali Cerui maris.

C A P. XLIII.

αἰδελὸν ἀρρενὸς
ἐλάφου

Genitale masculi Cerui tritum, & in uino potum, a uiperā demor-
sis auxiliatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Genitale Cerui, Aedæon Elaphu, Græci appellant. Lydi genitale ipsum Acylon uocāt, ut
in Fago diximus. Est & piscis nomē Aedæon, qd & nos Genitale nūcupamus marinū, a non
nullis Halesurion græce dictū: q̄q̄ Halesurion sunt qui pro Callionymo pisce capiant.

E X M. V E R G. C O M M.

Certius libro sexto remedium hoc Paulus Aegineta docuit. siccat enim prius: tum teri,
sicq; cum uino bibi Genitale id Cerui iussit, addiditq; misceri remedijs, quæ ad Viperarum
morsus componuntur.

De Vngula Asini.

C A P. XLIII.

ὄνυχος ὄνων

Vngularum asini cinis, per dies multos binis coclearibus potus,
proditur comitiales adiuuare. Eadem oleo subactē, strumas dis-
cutiunt. Et illitæ pernionibus medentur.

B A R B A R I C O R O L L.

Vngues Græci Onychas, & Oplas uocant.

Desyderabunt non sine causa, frustra tamen legentes, quo humore dilutus Asininae unguis cinis comitialibus bibendus sit: nihil enim aliud in scriptore hoc legitur, & nos ex alijs scriptoribus nihil habemus, quod in ea re moneamus. Iudicio id medicorum seruabitur, qui malo illi noxios humores omnes uitabunt: quale in primis uinum est.

De Lichenibus equorum. CAP. XLV.

Lichenes sunt in equorum genibus, & super ungulas indurati calli, qui triti & in aceto poti comitialibus mederi traduntur.

BARBARI COROLL.

In equo Lichen, & Hippomanes haberi solent. Lichen os est, dentibus caninis simillimū, in genibus & super ungulas animalis eius agnascens. Hippomani uero tantæ in ueneficia uires sunt, ut affusum æris mixturæ, equæ Olympiæ, ad mortos marēs equos, ad rabiem coitus insti mulat. Est & herbae genus Hippomanes Heliado, quod & Seruius testatur. Nomen hoc & Dioscorides duabus herbis tribuit, ut post constabit. Sunt & Limi arborū Lichenes appellati. Est & herba Lichen uocata. Græci & Imperiginem Lichenas uocant. Hippon Græci equum, Celtæ, qui Breno duce Græciam inuasere, Marcant uocant, auctore Pausania.

EX M. VERG. COMM.

Cvis uitium & aspredo græcis Lichen est, latini Imperiginem id malū dixerūt. Eius natura est, quoniam ex falsa pituita, flauaq; bile fit, ut quales ex fistilibus crustoæ squamæ decidūt, cum fallugo in eis aliquādiu fuerit, sic ex hominis cute squamulæ etiam decidunt. Hæ cum diutius in cute hæserunt callosam contrahūt duriciem, & ab harū similitudine in genibus & ungibus equorū excrecentes callos, Lichenas Græci dixerunt, quibus ad medicinā usa est antiquitas. Meminit earū Plin. li. 29. capite decimo, meminit & Paulus Aegineta: qui præterq; comitialibus omnium uenenatorum moribus mederi etiā ait. Facile est in equis id uitium obseruare. Plinius adnatū in his equi partibus os esse dixit. Hic non magis os, q̃ quo uoluerit aliquis nomine appellare. Non esse autē os, indicat quod hic ait, ἢ τετραμύγονος, quod est, in callum duratos: fieri q̃ κατ' ἐπιγραφὴν, non κατ' ἐπιγραφὴν. Nihil enim hoc significat: illud autem ἀπὸ τοῦ γράμματος, quod est, flectere in flexu genu, & unguis fieri, & durari ait.

λίχης ὁ ἵππου

De qua Plin. lib. 20, cap. 4.

Lichenes
λίχης

De Vngula capræ. CAP. XLVI.

VNGULARVM caprinarum cinere perunctæ ex aceto, alopeciae sanantur.

BARBARI COROLL.

CApra græce uocatur Aex: quarū syluestres, atq; feras in Samothrace nasci Varro scribit, Platycerotas uocatas. Quem locū in auctore illo deprauatū omnibus exemplaribus corrigendū monemus. Non em Platycerotas, sed latine Rotas legit, ubiq; sæculis cōiuentibus. Capras a carpendo dictas, idē Varro scripsit. Has & Chimaras Græci uocant, & Chimarōn, & Enorchā Theocritus, qui sit caper: q̃ idem Varro Caprū dici proprie uult, qui sit excastratus.

De Caprino iocinere. CAP. XLVII.

CApræ inassati iocineris decidua sanie, inungi lusciosos prodest. Et dum coquit, apertos oculos uaporari. Carnes assas uesci per q̃ utile. Tradunt Hircini iocinoris cibo comitiales deprehendi.

ἵππου αἰγός

De Apri iocinere. CAP. XLVIII.

IEcur Apri recens si arefactum teratur, ex uino potum, contra serpentium, uolucrumq; morsus auxilio est.

καρπὸν ἵππου

BARBARI COROLL.

CAprinū, & Aprugnū latine dici posse uideo. Aprum Græci, Capron uocant & Syagron. Siculi Aschedoron, ut est apud Aeschylum. Poetæ item Clunim, ut in Truculentio Plauti clunum pecus, legendū censeam, chlunimū. Nam & Aristoteles suum ferum Chlunim uocat. Suillum præfertur omnibus Aetio, si quis, inquit, animal id arida siccā pauerit. Quod genus Græci Sycoron appellant. Vnde, ortū puto, ut imperitū uulguis omnia iocinora uocare Ficata cœ-

C perit. Sane, ut meminit Aristoteles, suem præcipue alunt, & opimant ficus, & cicer.

ἡπαρ κυνός
λυσσώτης

De Cane rabioso. CAP. XLIX.

I Ecur Canis qui rabie exagitatur, ab emorsis sumptum, ne tententur metu aquæ tueri creditur. Utuntur autem ad arcendos aquæ pauros dente eo, qui Caninus dicitur. Hunc a cane qui momordit exemplum, & folliculo inditum, pro a muleto brachio adnectunt.

BARBARI COROLL. Anem græci Cyna uocant. Poëtæ Acamythion, rabiosum, Lyssonta.

καπνιστῶν πα-
λαιά λίμματα

De Soleis ueteramentarijs. CAP. L.

V Eteris Soleæ crematæ illitus cinis ambuista igni, intertrigines, necnon calciamentorum attritus sanat.

BARBARI COROLL.

C orium e calceo, græci Cattyra, & Cassyma uocant. Nostri Veteramentum, & Veteramentarios artifices appellant, quos Græci Palæurgos. Sicut Veteramenta quoque ipsa Palimpega, & Palindoria. Hinc & Veteratores fortasse dicti, a consuendis fraudibus. Nam & apud Græcos Cattyra, sutelam, dolumque significat. Nam Alutarij sunt, qui ex aluta, hoc est, concinato corio pellicium opus faciunt; unde Alutamentum, ut Veteramentum. Pelliones quoque ab his differunt. Sed hæc instituti huius non sunt. Corium certe pecudis, fugillata ui prædicant. Ut propterea unilissimum sit ad eos, qui uirgis cæli fuerint. Pellis certe Calcedonia, in Hippocrate habenam mollem, Cornelio significat.

EX M. VERG. COMM.

S iccat cremati corij cinis, ideoque exulcerationibus medetur. In quem usum non satis integro sensu illini hic iubet. Desyderatur enim, ex quo liquore, aut unguine illinendus sit. Barbarus ex Lini oleo fieri id ait, cum tamen in scriptore hoc, quod hæcenus legerim, nihil huiusmodi inueniatur. Nos illud monemus, non esse herbarij, & eius qui medicam materiam tantum doceat, usum eius docere. Priuatim enim a medicis instituendus, & tractandus hic est: ideoque non esse certam eius rei disciplinam, sed oportere medicum his uti, & in usu ea addere, quæ utiliora & aptiora fore ille coniecerit.

D

De Mergi iocinere. CAP. LI.

αἰθία ἡπαρ

S IC Catum Mergi iecur, & ex Hydromelite binis coclearibus possum, secundas expellit.

BARBARI COROLL.

M ergum Aethyam Græci uocant. Et poëtæ Dypten. Alioquin nihil aliud est Dyptes uerbum ex uerbo, quod Mergus. Poëtæ Græci etiam Poigas, & Bungas dicunt aues eas. Phorion auctor.

ἀλεκτριδὸς ἀ-
νασχισθῆσαι

De Gallina. CAP. LII.

D Isectæ Gallinæ, & adhuc calentes appositæ, serpentium moribus auxiliantur. Sed identidem alias sufficere oportet.

ἀλεκτριδὸς ἐγ-
κίφαλος

De Gallinaceo cerebello. CAP. LIII.

G Allinarum cerebellum in uino bibendum datur contra serpentium morsus. Sanguinem a cerebri membrana profluentem sistit. Subdita autem uentriculo Galli membrana, cornu non absimilis, cuius pellis in decoctionibus detrahi solet, siccatur, tritaque in uino conuenientissime stomachicis datur in potu. Ius e uetere Gallinaceo, aluum soluit. Abiectis itaque interaneis, salem coniici oportet, & consuto uentre, decoqui in uiginti sextarijs aquæ, donec ad treis heminas redigantur. Totum

id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt olus marinū, mercu-
rialem, cnicum, aut filiculam. Crudos humores crassosq; atram bilem &
strigmenta elicit. Prodest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis,
& inflationibus stomachi. Eorum uenter sale conditus, & in umbra sic-
catus, cōtra eximias uacuationes medicamentorum trium drachmarum
pondere, præsenti est auxilio. Quandoquidem protinus deiectiones co-
hibet. Teri autem debet in farinam, & aqua subactus dari.

S A R B A R I C O R O L L.

GAllos gallinæcos Alectryonas, & Alecторыs Græci uocāt, quia nos a lecto exuscitēt. Gal-
linas uero Alecторidas, & Ornithas. Aristophanes Alecторыs qui mares sint, Alecтриenas quæ
fœminæ. Alecтро nas utrumq; continere, ludens in comœdia monstrauit. Inuenias et pro mari-
bus Alecторidas acceptos, ut inquit Athenæus, Alexarchus Cassandri Macædonum Regis fra-
ter, is qui Vranópolis condidit, Gallum Gallinaceum Orthoboam uocabat, confecto nomi-
ne: in quo uel ambitiosissimus fuisse dicitur. Athenæus pullos Gallinæcos a Græcis Hippos,
hoc est, quasi equulos uocari scribit: credo, quia pulli proprie sunt equorum. Dicitur & Pulla
stra, sed & iubar & capillum Græci Alecторidas appellant. Persæ etiā coruos hoc nomine si-
gnificant. Iure Gallinæcorum perunctos, Pantheræ Leonēsq; non attingunt, præcipue si & al-
lium fuerit incoctum. Si Gallinarum membra auro liquefcenti misceantur, consumunt illud
in se: ita hoc uenenum auri est. Intestina Gallinarum, cum rebus alijs incocta, ueteres Gigleria
uocabant. Gallinarum tria genera, Cortalles & Villaticæ, siue quod idem est, Cortalis: de qui-
bus medicinæ hoc loco habentur. Item Rusticulæ mansuetæ, ac feræ non dissimiles, Villaticis
aucupio quæsitæ. Varro Africanis similes aspectu, ac facie incontaminata scripsit, a quibus p-
productionem uocabuli Gallinaria insula uocatur, in mari Tusco Ligusticoue, contra Intemi-
lium & Albingaunum. Gallinæ Africanæ sunt grandes, uariæ, gilbericæ, Meleagrides appella-
tæ a Græcis, ut Varro putat. Columella Numidicas easdem quibusdam esse cum Africanis
tradidit. Africanas uero non Meleagrides, sed ipsi similes, nisi q; rutilam cristam capite gerunt,
quorum utrumq; sit in Meleagride cœruleum. Clytus Aristotelis discipulus, Meleagridas Gal-
linæ describit nostratis magnitudine, paruo capite, ad portionem corporis, & glabro, crista car-
nea, sed rotunda, & prædura, quæ paxilli modo promineat, colore ligni, ab ore ad malas ca-
runculam pro mento esse, sed rubriorem q; Gallinæco generi. Etenim mentum uocari car-
nem, quam Gallinæ in rostro habeant: hoc Meleagrides carere. Rostrium acutius, & maius q;
Gallinæ, ceruix breuior & crassior, atq; nigra. Corpus uarium, maculis in nigro candidis, fre-
quentibus, per interualla maioribus lenticula, soleæ figura, uel orbiculis ut alæ, serrata specie,
digestis in quendam uersum maculis lucentibus. Crura sine calcaribus, cætero similia Galli-
nacels, Mares a fœminis internosci ægre possunt: tam est in specie germanitas. Pullos suos ue-
lut perosæ negligunt. Nam Medicæ a Media, quasi Medicæ generi uillatico ascriptæ sunt: pro-
pter magnitudinem in Italiam translatæ: cuiusmodi Parauinæ modo sunt, Puluerariæ cognomi-
natæ, a uico, ubi grandissimæ, ac spectabiles maxime nascuntur. Quas Turcarum Rex is, qui
Constantinopolim ætate nostra cepit, ut muneris magni loco, a senatu missas habuit. Ad Pu-
gillatum atq; prælia Græci e Boetia Tanagricas, ite Rhodias, ut Athenæus & Columella, Mar-
tialisq; apud nos, nec minus Chalcidicas & Melicas probauere. Quidam Alexādrinas ex Ae-
gypto, Pausanias Boeticarum duo genera describit, alterum præliare, alterum Cossyphos, qua
si Merulas appellans, Magnas inquit, alit Lydia, sed colore coracino, calcaria & apex Anemo-
næ floris macula modo rubent. In rostro summo, & in cauda item summa candidæ. Ex omni-
bus generibus Cortales, fœminæ proprie appellantur Gallinæ. Mares Galli seminares, qui Ca-
pi hoc nomine uocantur, cum sunt castrati, Gallinas Græci quandoq; uocant in comœdia My-
lacridas. Quanq; Aristophanes ita appellat bestiolam inter molas nascentem. Adrianas, siue
Adriaticas Gallinas, Chrysippus exiguas intelligit, easq; ab Atheniensibus expertas comme-
morat. Aristoteles quoq; paruo eas corpore, sed feroces, & quæ pullos plerumq; suos oppri-
mât, Gallinas primi feruntur habuisse Persæ, ut Meleagridas Aetoli, & Pautos, siue quod idem
est, Pauones Samos insula: quos Græci quoque Taos, & Taonas bifariam, ut nos appellant.
Et Antiphon orator, aues uarias, Attici Taos, circumflectētes & inspirantes ultimæ pronun-
tiant, ut Athenæo placet.

Pli. li. 37. ca. 10
lib. ii. capit. 7.
lib. 29. cap. 46

B

C

Οὐν & ἄπυλον

¶ De Ouorum natura. CAP. LIII.

OVum molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. Luteum oui, contra oculorum dolores utile est. Inassatum, sedis inflammationibus prodest, cum croco & rosaceo. Et condylomatis cum meliloto. Cum uua autem fruticis eius quem Rhoa dicunt, & Galla in patinis frigitur, ut cibo aluos sistat. Per se etiam offerri solet.

λευκόν τοῦ οὐοῦ

¶ De Candido oui. CAP. LV.

Candidum Oui crudum, refrigerat. Spiramenta cutis obstruit, inflammationes oculorum infusum lenit. Ambusta si statim eo perungantur, pustulas non sentiunt. Faciem a solis adustione tuetur. Fronti impositum cum thure, fluctiones arcet, auertitque. Inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo melle, & uino, mitigat. Vtiliter contra hæmorrhoidum morsus crudum sorbetur. Summe tepidum prodest uesticæ rosionibus, renū exulcerationibus, faucium scabrie, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis reumatismis.

B A R B A R I C O R O L L.

D

OVum græci Oon uocant, cognomentis distinguitur: tenerum, siue liquidum, siue ut Cornelius, molle. Apalon Græci uocant: quod recentiores Elixum, & semicoctum interpretantur. Scleron, hoc est, durum, quod ita sit coctum ut indurescat. Sorbilia dicuntur, id est, Ropheta, quæcunque tantum incaluerunt. Quæ uero plus coquuntur, appellant Ephtha. Sunt & quæ Trometa, hoc est Tremula dicuntur, oprime alentia, etiam si facilius transeunt forbilia. Sed hæc alij aliter cognominant. Et quantum consicio, tenera & tremula sunt eadem, sicut & Sclera, & Ephtha. Habentur & quæ Teganiſta, a patellis, & sartagine dicuntur, succi deterrimi. Mala sunt, & Optethenta, hoc est, toſta cinere. Ideoque ipsæ anteponuntur quæ Græci Exaphtha, siue Pniſta nominant, hoc est, quæ in aquam calidam mittuntur, immingunturque cum garo, uino, & oleo coquenda lento igni, ac modice coagulanda, ut inquit Paulus. Nam & quoddam obsonandæ carnis genus, Pniſton ipsi uocant: quod equidem hæud reor multum distare ab eo, quod Anabrafton appellant. Sunt & quæ uulgo dici solent Otariſcha, id est, oua falsa, inueterataque, abdicandi usus. Nunc oua piscium salita in offas, aut in pastillos durata, inclusaque membrantulis, Oua Taricha dicuntur, inter lautilimos recepta cibos. Præferri uolunt omnibus ex gallina, ut Paulus inquit, ac fere Galenus. Item ex Phasianis, Perdicibus. Pessima dicunt anserina: quamquam proprietate illa comedentur, quasi promptum ingenium faciant, si quis crebro utatur cum butyro, & melle. Schista quoque oua, Plinius appellat tota lutea, quæ triduo incubata tolluntur. Causa nominis, ut arbitror, quia diuidantur, & discedat uitellus a candido. Firmitas putaminis tanta est ouo, ut recta, nec ui, nec pondere ullo frangatur, nec nisi paululum inflexa rotunditate. Putamen in aceto maceratorum molliſ. Candidum ex ipsis, siue ut Columella inquit, albus liquor, siue ut Palladius, albor oui, admixtum calci uiuæ, glutinat uitri fragmenta. Vis uero tanta est, ut lignum perfusum ouo non ardeat, ac ne uestis quidem contacta aduratur. Luteum & Vitellus oui dicitur, quem Græci modo Lecythion, modo Chryſion uocant. Hippocrates etiam Chloron, Oua quæ non sint recentia, ueteres appellabant regeta. Est etiam asculi genus Ouum, ab ouali specie. Sicut & quod Oofcyphion Græci uocant. Sed & ipsum coelum a ueteribus Ouum dici solitum, & hominem quoque ceu quandam coeli paruam imaginem comperias.

VERG.

Monebimus leges, mollis, forbilis, durique oui discrimina in nutriendo solam facere coctura: quantumque Ouom cocturæ accesserit, tantum in nutriendo uirum illi accrescere. Et hoc est quod hic ait, magis quam forbile nutrire tenerum Ouum: quod nos, excelso molle uertimus. Rursusque magis quam tenerum, siue molle, quod igne duratum fuerit. Et ut tota res certius pateat, forbile hic Ouum uocat, quod in coctura concepto tantum calore, uix densari incœperit, & liquidum adhuc caleat, potiusque coctum sit. Tenerum deinde, siue molle, quod ulteriores coctura densatum quidem, non tamen duratum penitus fuerit. Durum postremo, siue igne duratum, quod extrema coctura ad eam duriciem peruenerit, ut comanducari & teri dentibus opus sit. In quo ordine primum

illud & forbile, ab usu & sumendi ratione sic appellatum, exiguas, aut mediocres in nutriendo vires habet. Secundum mox quod tenerum, siue molle, duri comparatione, a nobis dictū est, ampliore coctura densatum, maiores in nutriendo vires acquirit. Durum postremo, quod nos igne duratum etiam diximus, maximæ in nutriendo potestatis est. Et hic in ouorum usu gratus & quasi census nutriendi ab hoc scriptore traditur: cui addiderunt multa & certiora posteriores, medicis notissima, & a nobis ob eam causam relinquenda.

De Cicadis. CAP. LVI.

Cicadæ quæ inassaræ manduntur, uesicæ doloribus profunt.

BARBARI COROLL.

Cicadæ Tettigæ a Græcis dicunt: quo nomine coci quoque & absurdi, & imperiti dicebant. Sicut elegantes, & urbani Mæsones: a quo facietas & sales, & quæ scommata græci uocant, Mæsonia cognominantur. De Mæsone Athenæus, Chrysippus inquit, existimasse falso, a uerbo græco deriuari nomen id, manducum & helluonem significante. Cæterum Megarensis homo quidam Mæson fuit, comœdiarum actor: qui & seruorum, & cocorum personas, & eam primus comperit quæ Mæson appellatur: a quo dicta inquit falsa Mæsonica uocari consueuerunt. Cicadæ genus quoddam Acanthion, et Acanthia uocant: quod mutum interpretantur nonnulli: quoniam in Acanthio urbe Aetoliæ non canat: ut prouerbij quoque loco sit, *αὐδύβιος ἁβύβιος*.

EX M. VERG. COMM.

Idem uerbis remedium & Paulus Aegineta docuit.

De Locustis. CAP. LVII.

Locustæ odoris suffitu, urinæ difficultates adiuuant, præsertim quæ sceminas male habent. Earum carnes nullo sunt usui. Est & quoddam genus Locustæ quæ Asiracos, aut Onos dicitur, siue pennis, prælongis membris. Exiccata autem si ex uino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abunde uescuntur Aphri, qui Leptim incolunt.

BARBARI COROLL.

Locustarum, quas Græci nominant Acridas, una species Onos appellatur, & Apteros a Paulo, quia penes caret: quæ & Bruchon uocari putant, rodentem sata, & Attacō in sacris literis appellatur. Licet in Dioscoride Asiracō, siue Asiracō legamus corrupte, ut arbitror. Nicander Mastica appellatur, pro Bruchō, Aristoteles Artelabon. Clitarchus in Ambracia Locustas omnes Masticas dici uoluit: ut Molurin, quæ frumenta depopulat. Ionia Locustas a numero penarum Tetrapelyridas nominat. Oeræ Cornopas, alij Parnopas, & Pornopas: unde cognomen Herculi, & Apollini quoque in Aeolia, quæ Locustas abigar. Ridendus uero Strabonis interpres apud nos, quæ culicæ, non locustæ uertit in Parnote, quæ & Millepedæ genus unum est: quod uocat Onos. In sacris certe literis sunt, quibus Locustæ mandī solitæ, non animal insectum, sed herba hoc nomine significant. In qua sententia magnus autor Chrysostomus, & prior eo Athanasius fuisse credunt: quasi pro animali acceptæ, uescendo non essent. Cui tamen in Africa, ut Dioscorides commemorat, ad Leptin, cibo etiam frequenter commendat: hodie quoque uulgo eas comedunt Aegyptij. Plinius & Indorum gentem quidam, & Aethiopum quoque partem Locustis tamen uiuere, fumo & sale duratis, in annua alimēta, perdidit post Diodorum, Strabonemque: ut ob id Acridophagi nomen habeant. Locustā igitur, siue Pedem Locustæ, pro herba sumptā interpretatur, quā uulgo Repunculū, siue Napūculū uocamus, folio angusto, desinente in mucronem cauliculis, uertice torulos habentibus, ut in asparago et salicario lupo cernit. Itemque multi lateris. Ex quibus minores alij alterno semper inguine profiliunt. Radicula uel diuina, lautorumque mensis petita. Rapisti quidem sapore, non tamen ad ructus illiberali, ac fatuus omnino gustus, sed cum aceto, & sale non iniocundus. Semen ei tam exiguum, ut discerni fere aliter non possit, quæ grana fabulæ. Alij Pedem Locustæ pro Blito, aut ualde simili herba capiunt, in Arabicis scriptoribus. Sunt qui uocabulo Acridis, non herbam unam aliquā, sed summa herbarum omnium, quibus uiscerari homo sanctus in solitudine, accipiant. Quod si esset, perperam uertisset Hieronymus Locustas. Alioquin certum est, Locustas Iudeis inter animalia, quæ non sunt interdicta cibo, numerari. Dioscorides certe paniculas auenæ dependentes, ut in Bromo diximus, Locustas, Plinius Lobas appellauit.

q n

A

ri. 1716

Pli. li. ii. ca. 26.

expiduo

B

Pli. li. ii. ca. 29.
Aristot. de natura animalium. li. 5. ca. 17.

En

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

C Vt plura sunt in natura gēa, sic etiā pene infinita ueterib. earū nomina fuerūt. Nihilq; mō difficilius, q̄ attelabos, parnepas, mastacas, molurides, tetrapelyridas, cornopas, & alia in gr̄cis earū nomina digito signari, & dicier, hæc sunt; generatim excepta Asiraco, quā et Asellū dīcūt. Ob eā, ut nos credimus, causā, Dio. de Locustis egit. Nec priuatim strāgurijs. i. uesficē stillicidio, sed *Αυοουπλαιο*. i. uirg angustijs mederi ait. Quo magis Barbarum demiror: q̄ ad delectationem certas gr̄corum & latinorum in morbis & remedijs uoces tantopere uariauerit.

De Ossifrago.

C A P. LVIII.

Q̄viii

V Enter eius auis quam latini Ossifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 30. ca. 7.

Ossifragus, siue Phinis, & ut Aristot. appellat *Phine*, alienos fœtus cū suis alit: q̄s Aglē nūtriēdi tedio eiecerint. Quidā nō generare Ossifragū scripsere, ut Aristot. Plinius ex Halicō nasci Ossifragos, ex Ossifragis Vultures minores, & ex minoribus maiores, q̄ omnino nō generēt. Differt Ossifragus, ab Ossifraga, etiā si cōfundāt aliq; q̄ Ossifraga septimū est Aglē genus, quē Barbata dicit, & Sanqualis. Ossifragus uero qualē indicaui, laudatus ad colī uiciā, qm̄ inte finū unū habeat, mirabili natura, oīa deuorata cōficiendi. Nescio quāobrē Ambrosius Fulicā accipiat, quā Gr̄ci Phinin uocant: cum sit apud Maronem Fulica, ut q̄busdā placet Herodius, ex Arato, quē Poeta noster ea parte uidet imitatus, ubi prognostica tēpestatū carmini suo inseruit. Idē Ambrosius Herodiū, alio loco Sturnū interpretatus est: cū Sturnos gr̄ci Pfaras nō minent. Hieronymus Herodiū Gr̄co nomine appellat. Seruius Herodios accepit, quas nos Diomedēas aues uocamus. Pausanias Herodiorū genus maximū, & pulcherrimum, & augurijs quoq; proditiū uocari tradit Oenon. Theodorus Fulicam, quā ab Aristotele Cepphos, siue Cemphos dicitur, intelligit. Ossifragus parum ualet oculis, nubecula etiamnum suffulsi.

E X M. V E R G. C O M M.

D

Avis postremi int̄ Aglas generis Ossifragus est. Nominis manifesta oībus cā. Longissime in Aglarū cēsu Aristoteles & Plin. de eo egerunt, & qd facile uolētibus inuenisse sit: nihil non ab illis dictū, a Barbaro in Corollario suo repetitū est. Nō parua laboris, & p̄c̄j mercede querenda auis hæc erit, si qd de ea ferē, uesficā calculos per urinā pellit. Sed q̄ uerū id sit, nō est testatus Diosc. *ισοψιτοι* qd est, tradi, & ferri id dicēs, sapientē qdē & caute, in aliorum fidem & famam reiiciens, quā testari ipse non posset. Cuius morē & exemplū nos etiā secuti, nihil ultra ci traue mensurā & significationem uocū eius tradidimus: legentesq; in eo *ισοψιτοι*, quod est narratur & fertur, ferri & nos uertimus: ne si p̄cipi, ut Barbarus fecit, dixissemus, ueterum p̄cepto confirmari & probari crederetur, quod hic non sua, sed aliorū fide credi tantū uoluerit.

De Galerita.

C A P. LIX.

υαρυδαλλος

Galerita auicula est parua, apicem in uertice pauonis modo gestans, quā assa & in cibo sumpta, cœliacos adiuuat.

B A R B.

Pli. li. 10. ca. 49

Galeritā, siue qd idē est gallica uoce, Alaudā, Gr̄ci Corydon, & Corydalon, & Scordalō appellant. Itē Corydalida. Oēs a Galero, siue Galea. Nā & Epitymbiditō Theocritus, q̄ ceu tymbō, hoc est, sepulchrū patris in capite gerat. Cuzulā gr̄cū uulgus nominat. Nota est apud Aristophanem comicū poetā fabula, primā uolucrū fuisse Galeritā: priorē q̄q; terra defunctū ei patrē, cū humari non posset, nōdū enata humo cōditum in uertice. Corydalis est & herba Capnos appellata: qm̄ & ipsa doloribus colī medeatur, ut auis ipsa. Galeritā nemo fere ignorat, auem pusillā, & plerumq; ob iter nobis obuiam, ingenio ad cantus docili, Passerculis, ut inquit Galenus, qui Pyrgitæ ac Troglytæ nominant, in oppidorū muris, ac turribus frequentes adsimilem, extra q̄ galero, quo illæ carent. Nam Corydylis, salsamentarius piscis est, quem nos Cordyllam uocamus, Gr̄ci etiā Cordylida, & Dorylum. At Cordila tumores in capite significat: & Mitellam quoq; Cyprijs: eam quam Persē Cidarīn, Athenienses Crobylon appellant. Porro similis est Alaudæ, Zerraneola uocata: nisi q̄ apice in terra nidificans: unde nomen. Differt ab Alauda & Parcus, etiam si quī negant. Est autem Parcus auicula Palumbo minor, aliquanto subtus candida, cætero Pauoni similis, & crista quoq;.

E X M. V E R G. C O M M.

Variant in Alaudē remedijs latini scriptores, & gr̄ci, Paulus Aegineta simpliciter elixam

(dico autem simpliciter, in aqua tantum) sumi diu iubet; hic assam præcipit. Plinius non assam tantum sumi, sed cinerem eius etiam in aqua bibi. Adhuc quod suæ ætatis testimonio & experientia confirmat, idem homini præstare cor eius femini adalligatum, & recens, tepensque ad huc deuoratum: pluraque alia quæ lib. 30. cap. 3. uolentes nouisse in eo poterunt.

De Hirundinibus. CAP. LX.

DISSECTIS crescente luna pullis Hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in uentre eorum lapillos offendes: e quibus duos, unum uersicolore, alterum purum eximes. Si priusquam terram attigerint, in iuuenæ corio, aut ceruina pelle, lacerto, aut collo adalligati, comitialibus proderunt. Et sæpe prorsus eos recreabunt. Hirundines, uti Ficedulæ in cibo, aciei uisus medicamentum præbent. Tam pullorum quæ matrum cinis, cum melle oblitus, oculis claritatem adfert. Anginæ eo commode perunguntur. Vuæ & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant qui anginæ morbo conflitantur.

BARBARICOROLL.

Hirundines, græce Chelidones, lapillum dicuntur pullo excluso dare. Tria earum gêna. ut Banarum, syluestrium: quæ nidorum figura deprehenduntur. Ripariarum: quæ ita uocantur, quoniam in riparum cauis nidificant. Fit hoc capite Ficedularum quoque mentio, Græci eas modo Sicalidas, modo Ampelidas, modo Ampelionas uocant: autor Pollux, ut ceteros præteream.

EX M. VERG. COMM.

Chelidonio ab Hirundinibus, quas græci Chelidonas dicunt, Plinius lapillos eos appellat, qui in earum uentriculis inueniri feruntur, fabulososque existimat, & magicis artibus in medicinam illatos. Quod magis credendum in eo facit Paulus Aegineta, qui sexto sui operis libro de Simplicibus his agens, crematarum Hirundinum cinere tum in medicina utitur, anginisque, & ad oculorum claritatem ex melle inungi præcipit. Receptum tum antiquitas omnis quæ de eis in scriptore hoc legitur: eamque ob causam qualia in græcis, latinisque omnibus adhuc leguntur, talia a nobis etiam reddita fuerunt: cætera omnibus eadem sunt.

De Ebore. CAP. LXI.

EBoris scobe illito paronychia sanant. Vi adstringendi ebur obtinet.

BARBARICOROLL.

EBur a Græcis appellatur Elephas, eodem quo animal ipsum nomine. Quamquam animal Elephantus quoque dicitur. Ebur uero alij cornu, alij dentem Elephantis nuncupant. Est & uasis potioris genus Elephas.

Quæ nos Eboris ramenta diximus, Plinius Scobem appellauit eadem significatione: et si Ramentorum amplior quæ Scobis ambitus sit. Rameta enim ueteres latini dixerunt omnia quæ ramentis, secando, incidendo ex materia aliqua, quasi inutiles reliquæ supersunt: Scobe uero priuati, quæ lima, aut ferra detrita cadunt. Estque Rametorum uox cunctis his cois, et quasi generis appellatio: illa autem unius, aut alterius rei tum nota et significatio Dioscoridis. *ρίσμα* dixit scobina, detritum ex Ebore puluerem indicans. Quam rationem secutus Plinius. lib. 28. ait, Scobe paronychia tollunt. Nos cōiorem & ampliorem rationem secuti, Rameta diximus, quicquid ferramento detritum ex Ebore puluerem significantes: fecimusque id autoribus alijs græcorum medicis. Paulus Aegineta non ex dentibus tum Elephantis, quod solum Ebur est, sed ex unguium, aliorumque ossium ramentis remedium hoc conficit.

De Suillo talo. CAP. LXII.

SVis talus comuritur, dum e nigro albescat: qui tritus & potus, inflammationibus coli, longisque torminibus medetur.

BARBARICOROLL.

Alus Astragalos Græce dicitur in sue: cuius uicem in homine, Malleolus appellatus implet. **E**X M. VERG. COMM.

Non omni malo coli mederi cinerem suilli Tali hic scriptor ait, sed ex tribus eius generibus.

A

χελιδών

Pli. li. 10. ca. 33.

B

ἐλέφαντος
ὀδόντος ῥίνισμα
Pli. li. 8. cap. 3.

VERG.

ἀσφράδαλος

Cbus illi tantum, quod cessante, nec transeunte crasso, & qualis peditu efflari solet spiritu, in eo intestino sit. Habet enim plures id malum causas. Fitque aliquando, cum inter eius membranas crassius, pituitosusque humor subsederit. Nonnunquam cessante, nec transeunte illac spiritu: quale pauloante descripsimus. Sepe ex eiusdem intestini inflammatione, aut ob acres erodentesque humores dolorem acrimonia erosionisque sua excitantes. Ex his secundum illud genus *ἰμπερηματώδης*, idest, inflationis uoce indicasse uidetur.

De Ceruino cornu. CAP. LXIII.

ἰατρικὴ νίκα

Ceruini cornu cinis elotus, binis cochlearibus eponus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, coeliacis, regio morbo, & uerifica doloribus cum tragacantha. Feminis fluctione uuluae laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu cotusum, crudo fistili luto circumlito, & in furnum indito uritur, donec albescat. Id cadmię modo elotum, ulceribus oculorum & defluctionibus salutare est. Infricium dentes expurgat. Crudi cornu suffitum nidore serpentes fugantur. Feruefactum in aceto, si eo gingiuę colluantur, maxillarum a dentitione dolorem adimit.

B A R B A R I C O R O L L.

Ceruum, Gręci Elaphon appellant, ut prędiximus, & Bredon poetę. Alij caput ipsius Cerui Bredon uocant. Inulum, siue Inuleum eius, Nebron, et Cemada. Quamquam Cemās nondum pgregit in pascua. Damā uero Gręci Proca dicunt. Aristoteles, et idonei fere omnes, et Dionysius a Ceruo non distinguit. Philetas, primogenios Ceruos Procas dici uoluit. Ab hoc animalis Proconesos appellata est. Nam Ophion, quod Sardinia quondam ferebat, & interisse creditur, Ceruus non erat, sed animal pilo, ac dente simili, Ceruo minus. Genus uero Ceruorum pręgrande, Gręci Echęneas, ab oppido uocant. Aristoteles Achęnas cognominat. Inulū, Varro & ex equo & asina uocari scribit: quos & Bardones aliqui appellant, sicut ex asino, et equa Mulum: quamquam uetusti codices, tum Varronis, tum Columellę Innum habent, non Inulū, quod ab equo patre nomen traxerit. Sed & Aristoteles quoque Innum gręce dicit, quod ex mulo & equa nascitur, ceru paruum mulus. Proinde Nonius marcellus, Hinnas inquit, & Hinnos, sub quo nomine accipere debeamus Varro signat. At enim, ex equis & mulis quod nascantur, Hinnos uocari. Ut errauerit, quod distinctionis studio cōfinxit, Hinnulos ceruini generis esse pullos, equi uero Inulos uocari. Quin si mutare oportet, uerius sit Inulos per simplex, n, & sine flatu ceruinos pullos accipere: Hinnos autem & Hinnulos per duplex, n, & cum aspiratione, ex asina conceptos equi coitu, sed utique si sint maiores, ut Plinius adiecit: quod Nonius marcellus alit, ut pmonui. Porro Inis, etiā infantem & paruulum Gręcis significat. At Ginni per, g, ab Aristotele, appellantur equi pumili, non alia ratione quam maris & uteri uitio, Gygenios a Strabone dictos arbitror, in Ligurię montanis, ubi & Mulorum genus uocat hoc nomine. Non placet quorundam distinctio inter Dorcem, & Dorcadem: quasi Dorcas ceruinus pullus sit, Dorx animal diuersum, cum Dorcas Aristoteli non Ceruum, sed Capream significet. Certe Dioscorides in coaguli mentione, Dorcadem a Dorco separauit. An, ut eo distet Dorcus a Dorcade, quo Ceruus ab Inuleo, & in Strabone Zorces, pro eo quod sunt Dorces. Nisi uitium sit in exemplari legas. Ipsum cornu Ceras uocant: quod & poculigenus est. nam cornibus ueteres bibisse, Pindarus, Sophocles, Homerisque testantur: si modo ut fere persuasum est, Rhyton, in Poeta eminentissimo idem sit quod Cornu.

E X M. V E R G. C O M M.

Non placet quod in extremo capite dictum a nobis, & ab alijs est, collui ceruini Cornu de cocto utiliter molarium dentitione factos dolores. Cur enim molarium magis quam primorum, & caninorum: Omnium enim eadem ex inflammatione doloris causa, et ratio est. Nec sic canibus, qualis hic cinis est, sed natiuo unguine mollientibus remedijs, ad adiuuandas in pueris dentitiones, ut antiquiores preceperunt: qualia sunt gallinaceorum adeps, & teporis cerebrum: at in dentibus *γυνφίον* molares tantum gręci appellant. Fatemur id quidem: & ab his *γυνφία* facta uox nihil nisi molarium dentitionem significare potest, concedimus id etiam, sed hac conditione, dum certius aliquid & ad hanc rem aptius inueniatur. Inclinat enim animus, nobis significari ea uoce aliud in cunctis dentibus malum. Nec leuibus argumentis ob-

orta nobis hæc suspitio est, non ob eas quas paulo ante diximus causas, sed quoniam Galenus usum ceruini Cornu esse ait ad refringendā gingiuam, & confirmandos dentes. Quod & Paulus Aegineta etiā, cum de omni Cornu lib. 6. agit, his uerbis testatus est. *το δὲ τῆς ἰατρικῆς καὶ μὴ διανοηθέντων, ἵνα περιπλάττονται ὁδόντας ἵσκει συνημνόν.* Quod est, Cerui autem cornu tritum, uinoq; maceratū, mox circumlitū mobiles sistit dentes. Et paulo ante, *ὅλα πλάττα*, id est, humentes & diffuentes gingiuas compescere idem Cornu dixerat. Plinius etiā lib. 28. ca. 10. dentes mobiles confirmare ceruini Cornu cinerem testatur: doloresq; eorū mitigare, siue infricentur, siue colluantur. Additq; statim, arbitrari quosdam ad omnes eisdem usus efficaciorē crudi cornu farinā esse, & dentificia utroq; modo fieri. Quæ omnia eodum pertinent, ut dentibus, non denticionibus mederi ceruinum Cornu uideatur.

De Eruca.

CAP. LXIII.

ERUCIS, quæ in oleribus gignuntur, cum olco peruncti, a uenenatis bestijs feriri negantur.

BARBARI COROLL.

ERUCA, pro animali accepta, a Græcis Campæ nominantur. Hippocrates in herba tidii malo nascentes, aculeatas esse prodit, utiles ad conceptus. Campa dicebatur & genus illud bestiae, quam Liber pater in Libya sustulisse dicitur, ad Zambiram oppidum, tumulo in monumentum eius facti condito. Vt Diodorus meminit.

EX M. VERG. COMM.

HORTORUM, satorumq; omniū pestis calamitasq; Erucæ sunt, dirū animal, lento & humido tempore, auctoribus Theophrasto, & alijs nascens: multiplex hoc malū, & quod in uitis & arboribus natū, frondem oēm & florem erodat, turpiq; facie depastam arborē relinquit. Nihil in carmine suo, & ultimo duodecimi libri capite Columella pro horti, annona diligentius curauit. Si cætera defecerint naturæ & artis auxilia, ad superstitionē translata re, in qua non ueritus est, auctore Demoerito, docere quæ saluo pudore dici & audiri non possunt, sed ut ille testatur, tam pſenti contra hoc malū remedio, & ope, ut non aliter q̃ cum decussa pluit arbore nimbus, Vel teretis mali, uel tectæ cortice glandis, Voluit ad terrā distorto corpore campe. Qualia aut ea sunt, poterunt uolentes ab eo audire. Nobis em̃ in scriptore hoc aliud consiliū est, nec in Erucis eius aliud qd moneamus habemus. Q̃ deo in oleribus nascentes Erucas eum appellasse, ut a picarū, aliarumq; arborū Erucis, quæ ueni maleficium habent, separaret. Nostra ætas & gens totum hoc genus quacuncq; forma sit, & ubicuncq; nascatur, una appellatione Brucos nominat; cum tamen Locustarum genus quoddam priuatim Brucum Græci appellent.

De Cantharidibus.

CAP. LXV.

FRVMENtis congestæ Cantharides, ad recondendū idoneæ sunt, quæ fictili uasē, non picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerso, suspenduntur super aceti feruentis q̃ acerrimi halitum, donec æstu examinentur. Postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes uariæ, luteis lineis, quas in pennis transuersas habent, promissoq; corpore, crassæ, ac blattarum modo præpingues. Sed inertes ac imbecilles, quæ unius sunt coloris.

BARBARI COROLL.

NOMINE Cantharidū e nostris aliqui etiā Scarabeos, maxime pilularios accipiunt: qui & Canthari dicantur. Et ab Hippocrate Copriones. Plinius, est inquit & Cantharis dictus Scarabeus paruus, frutera erodens. Porro Cantharus & nauigij, & pocilli nomen est, & ornamenti quoq; muliebris, ut Athenæo placet. Ipsarum Cantharidum uenenū, in qua parte sit, non conuenit. Alij in pedibus, & capite existimant esse. Alij negant. Inter omnes constat pennas earum auxiliari, in quacuncq; parte sit uenenum. Ipsæ nascuntur ex uermiculo in spongia maxime cynorhodi, quæ sit in caule, sed fecundissime in fraxino. Cæteræq; in alba rosā, minus efficaces. Improbantur duo earum genera. Minutæ, latæ, pilosæ. Item macræ, unicolores.

EX M. VERG. COMM.

MULTA sunt, quæ Scarabeis congenere Cantharidas faciunt: sed nihil æque cognationem eorum ostendit, q̃ uaginis clausæ utriusq; animalis pennæ. Ob quam similitudinem, diminu-

A

καμπε

Plin. lib. 19. ca.
pit. 6. lib. 11. ca.
pi. 23.

B

καntharidis

Pli. li. 11. ca. 28.

D I O S C O R I D I S

Cta a Scarabeo, quem Cantharon Græci nominant appellatione, Cantharida illi simile, sed minore corporis mole animal hoc dixerunt, pueris etiam notissimum: sed quod præfenti, & insanabili ueneno hominē perimat: quemadmodū inter uenena hic ipse in extremo opere docebit. Habent ueneni par maleficiū Buprestides, & picearū Erucae. Hæ cæteris Erucis similes, & congeneres, discrimen ab arbore in qua nascunt nomine ipso ostendūt, Pytiocampæ a Græcis dicuntur: Ille bouū acerba pestis, in eadē gente a maleficio suo nome inueniunt. Describit Buprestim Plinius lib. 30. cap. 11. his uerbis. Rarū in Italia animal Buprestis est, longipedi Scarabeo simillimū. Fallit inter herbas bouem maxime, unde & nomen inuenit: deuoratumq; tacto felle ita inflammat, ut rumpat. Nouerunt nunc etiā rura hoc malum. Vidimusq; nos, peremptum aliquādo eo ueneno bouem. Non satis tamen ostendunt rustici eius animalis formam, diuersisq; appellationibus, diuersis locis, & diuersa forma describitur & appellatur. Copiosius inter uenena de his omnibus iterum agetur. Nunc satis sit nominū causam & rationem reddidisse.

De Bupreste.

CAP. LXVI.

Buprestis

Simili modo reconduntur Buprestes, genera quædam Cantharidū, & pinorum erucæ, quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omniū communis erodere, ulcerare, calorem elicere. Qua de causâ ammiscentur medicamentis quæ lepras, ferrosq; lichenas, & carcinomata sanant. Menses ciunt pessis emollientibus additæ. Aliqui Cantharidas antidotis impositas, aquæ subter cutem auxiliari prodiderunt. Argumēto, q̄ urinā moueant. Alij pennas, pedesq; contra potarum ueneficia, remedio esse tradiderunt.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 30. ca. 42

Pityocampæ a nostris Erucæ picearum, aut pinorum uocantur. Buprestis & animal, & herba est. Ex his Erucis uermiculi postea nascuntur, qui acceptis alis euolant: quemadmodum & in ficu, & cynorhodo, siue canina sentice,

D

De Salamandra.

CAP. LXVII.

Salamandra

Salamandra lacertæ genus est, iners, uarium, quod frustra creditum est, ignibus non uri. Vim habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. Additur ut Cantaris in medicamenta, quorū uis est exesse, & lepras abolere. Similiq; modo reconditur. Liquefacta in oleo, pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus & capite, in melle seruat ad eundē usum.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 10. ca. 67.

*Lacerti sunt frigidi, & similes omnium partium, ut Pompo-
nins Sabini mgl.*

Salamandra animal lacerti figura, stellatū, nunq̄ nisi magnis imbribus proueniens, & secuta ferenitate deficiens. Huic tantus rigor, ut ignē tactū extinguat non alio modo, q̄ glacies. Quod quidā tamen negant. Aetius per ignem inquit, cadentibus flāmis ambulat, eumq; non solum frigoris ui, sed etiā pondere corrumpit, quasi obruens. Theophrastus & frigori & humori tribuit, qui ex ipsa lentus profluat. Si diutius tamen in igni mansit, comburitur. Cassiodorus, Salamandra subtile, & paruū inquit est animal, lumbricis associū, flauo colore uestitū. Salua eius, quæ lactea ore uomitur, quacūq; parte corporis humani contacta, uel pede imo respersa, toti decidunt pili, & colorem in utiliginē mutat. Si arbori irreperit, omnia poma inficit ueneno. Ita populos sæpe totos necando frigida ui, nihil acōnito distans. Quinimo, si contacto ab ea ligno, uel pede crusta panis incoquatur, idem ueneficium est, uel si in puteum cadat. Manditur tamē a suis innocenter. Similis Ascalabotæ Salamandra est Aetio. Lacerta uenenaria, hoc est, Pharmacitide uelocior. Ascalabotem Græci, & Colloton, & Galeorē quandoq; appellant. Nostrī Stellionē. Horum transmarini pleni lentigine, stridoris acerbi, qui & uescuntur, intantū scorpionibus aduersi, ut uis protinus torporē afferat frigidū sudoris. Tales in Italia non sunt. Viuit enim rore, ut chamæleontes, præterea & araneis. Qui aut Stelliones appellantur, ut Marcellinus inquit, in nouis domibus cernunt, forte h̄ quos Romanū uulgus Taranulas uocat, albas, innocuas, & pusillis lacertis similes. Sunt & Apulorum Taranulæ in agris,

Phalangiorū fortasse generis, ueneni presentanei, cōmoto statim eius mente, quē percusserint. **A**uxiliari cantu eis, & omnino musica ratione, cōsuetudo regionis est. **A** Stellione fraudulentiſſimo animali, stellionatus crimen, & stellatura. Spartianus in Pefennij Nigri uita, quos ingreſſus conſtitit accepisse stellaturā. Et alibi. Tribunos, qui stellaturas inquit militibus tulissent, capi tali poena affectos. Inuidentissimū hoc animal intelligit, quoniam senectutis suae membranā deuoreret, gnarum propter Comitiales morbos impetī eam. Hinc stellare uerbū, pro inuidere. Cuiuslibet stellionis, in locis ostiorum, fenestrarūq; sunt, aut cameris, sepulchrisue.

EX M. VERG. COMM.

Sunt nobis & alijs de Salamandra eadem fere omnia. Quod inter nos non cōuenit, unum tamen & illic est ubi legitur, *φιδὸν δὲ τριχας τανύσα μὲν ἰδαίου*. Quā lectionem illi secuti, liquefactam in oleo Salamandrā depilare dixerunt. Nec male; id enim participiū illud plerūq; significat. Nos autem non liquefactā, sed crematā cinerem facere id diximus: in antiquissimis, ἡσδεμῆς probatissimae fidei graecorū codicibus, non *τανύσα*, sed *καύσα*, quod est, cremata legentes. Confirmatq; nobis eam lectionem Paulus Aegineta, qui crematā Salamandrā cinere tamen ad hos usus utitur. Verba eius haec sunt. *σαλαμάνδρας δὲ καυθίσας πῦρ τίθραν ἔνιοι μίγρουντι*, &c. quod est, crematā autem Salamandrā cinerem aliqui miscent.

De Araneo.

CRP. LXVIII.

Araneus, quem Holcūm, alij Lycium uocant, subactus cum sple- *ἀράχνη ὀλκὸν*
λύκιον
nio, & linteo illitus, prolatusq; utriusq; temporibus, aut fronti, tertianos circūitus persanat. Tela eius imposita sanguinem sistit. Vulnēra quae summā cutem occuparunt, ab inflammationis iniuriā uindicat. Est & alterum Aranei genus, qui candidam, tenuē, densamq; telam orditur, quem in loculo ligatum, & lacerto appensum, quartanis circūitibus mederi narrant. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus auxiliatur. **B**

BARBARI COROLL.

Araneū Graeci Arachnen uocāt, Araneorū, Phalangiorūue multa gēna. Innoxii lupi nōmine post dicendū. Noxiōrū duae species ab Aristotele tradunt. Vni corpus exigū, uarium, acuminatum, asulūm ingrediens: ob id Pulex uocatus. Alteri malus & nigricans, prioribus cruribus longissimis: tardū hoc & imbelles, nec saliens, aequē Phalangitū. Præter hæc a Plinio uocatus genus Aranei lanuginosum, grandissimo capite, quo dissecto, inueniānt intus uermiculi duo, qui adalligati, ceruina pelle ante solis ortū, dicunt mulieribus p̄stare ne cōcipiāt. Vniq; illā durare anno, unde Atociōn q̄q; dicit. Est & Rhagiōn uocatus, q̄ acino uuae nigro similis est, ore mimio, sub aluū pedibus curtissimis, & tanq; inchoatis. Dolor a morſu eius, qualis a scorpione. Vrina textis Aranei p̄similis. Quintū genus Astiorciōn, uel Astertion, ex manu scriptis codicibus, aut Astorgion, q̄si discordiā & inamabilem significent. Sed in picto Diosco. *ἀστειριον*. i. alteriū, uirgulis albis, a proximo distinguit, cuius ictu genua labefactantur. Sextū ceruleus, utroq; perniciosior, lanugine nigra, caliginē morſu concitans, & uomitus araneosus. Septimū a crabrone penna tantū differens, deterius etiamnum ceruleo: propterea macie quoq; conficit a se percussos. Octauū Myrmecion, quia formicæ similis, sed multo maior, ruffo capite, aluo & reliqua parte corporis nigra, guttis resperſus albis interſtinguentibus, acerbiorē q̄ uel parū dolore torquens. Viuit maxime circa furios, & molas. Fuliginosum describitur Actio, stellatū, præsertimq; dorſo. Nonū Tetragnathus, sed duobus fastigijs. Alterius mediū caput, lineā candida & trāuersum. Itē altera distinguit, qui & peior, tumorēq; oris molitur. Alter cinereus, posteriori parte candicās inertior. Aetius Tetragnathon modice lato, & subalbo corpore describit, pedibus asperis, duabus incisuris in capite, recta una, per obliquū alterā, ut quaternas buccas habere uideat; unde nomen. In Aethiopia tam frequētes, ut regionē in eā quandā prope Sillos, Acridophagosq; deferi coegerint. Idem auctor & Cranocolap̄rē, & Scolection, & Sclerocephalon enumerat. Vt primū genus longis cruribus, subuiride, aculeo circa ceruicē infesto prodatur: ita dictū, quia caput maxime percutiat. Secundū squalet maculis, præsertim capite, longis pedibus. Tertiū caput duriciā siliceum. Lineamēta toto corpore similia bestiis, quae lucernas circūuolant. Hæc fortasse uel eadē sunt, uel parū diuersa plinianis. Præcipue uero Cranocola-

Pli. li. ii. ca. 24.

Cptes idem genus uidet illud esse, qđ nos Sextū haberi diximus, ceruleū, & caliginē morfu con-
citans, caputq; tentās. Habet & cinerei genus quoddā minime noxiū, telas muscis in parietibus
latissime pandentis: qui & Muscarius uocat, inter lupos, ut arbitror locandus. Comperio &
Araneum candidū, longissimis, tenuissimisque pedibus. Item aliud genus crassissimū, textū con-
dentis in contignationibus: quorū uterq; in dictas, aut dicendas forte species recidit. Est & di-
scrimen Araneorū, quos Aristoteles appellauit Lupos: quorū minimi non texant, maiores in
terra cauernarū uilia, & exigua uestibula præpandant. Mediū genus lautiores, crassioresq; te-
las orditur uel operosissime, ob id Eruditissimū ab eodem Aristotele uocatū, cuius duas quoq;
species reddit. Maiorem subtrus pēdere, degrauatū mole corporis. Minorem, in sublime & qui-
busdam telæ suæ latebris obseruantem excubare. Græci qui de uenenatis ictibus scripsere, Lu-
pum uenari muscas demonstrāt rotundū, cælata, sculptraq; ceruicula, tribus in ore, quod ei la-
tiusculum est, lineamentis. Aranei Lacertarum catulos irrēunt, utraq; labia mordicus appre-
hensa, telas suas altius tollendo. Incrementa amniū futura præfagiunt, Sereno non texunt, sed
nubilō. Fœminā textrix, marem uenationi operā dare arbitrantur, idq; sole oriente, occiden-
teq; bestiolis tum maxime infestis. Aranei clunibus in uenere conueniūt. Vermiculos similes
ouis pariunt, in telas expansos: quia saliendo excludūt: Phalangio excepto, qui specu in ipso
cubat, magno numero, triginta fere: sed ubi emerfit, matrem consumit sæpius, & patrem. Incu-
bant triduo. Cæteris generibus oua pauciora. Consumant Aranei, quater septenis diebus. Si-
mul porro editi sunt, fila sua mittūt, siue de suo qđ foris habent, ceu uellere corticeo, ut Aristoteli
uifum est: siue ut Democrito, excrementi cuiusdā modo, uelut corrupta intus alui natura,
statuto tempore: siue ut alij dixere, quia intus sit quædā lanigera fœcunditas, Ouidius.
Cætera sunt uentus, de quo tamen illa remittit
Stamen, & antiquas exercet Aranea telas.

Non habet Creta insula maleficū animal, præter Phalangium, alioquin Italiae ignotū. Hoc cerui
perculsi, cancos edendo sibi medent. Nominat & Mus araneus: de quo priuatim agendū no-
bis est. Araneorū telæ, priuatim Vescæ, hoc est, siccæ, ac tenerę uocari solent. Ipsum anial Ara-
neus uocat, græce Arachnes. Tela uero Aranea, ut græce Arachne. Quæ interim & pro aniali
poëtæ capiūt Araneū. Phalangia uero, & quod idem est Aristoteli, Phalangas, & Phalangios
arbitror esse dictos: & Phalanx internodiū significat, qualis pars ea digiti, q̄ rigida manet, nec
flectit, ut Aristoteli placet. Omnibus em Phalangis internodia terna in cruribus. Ob id & fu-
stes nodis rigentes, ut Plinius testat, Phalangas uocabāt. Vnde baiulos Viſtruuus, quia Pha-
langis uti soleant, Phalangarios appellat. In Albania Phalangium haberi traditur Straboni, He-
lianoq; a quo siqui feriuntur, aut ridendo, aut flendo moriant desyderio suorū.

E X M. V E R G. C O M M.

Longa est Plinio, Nicandro, Aristoteliq; animalis huius historia: fecitq; id multiplex eius
genus, diuersiq; in tam exiguo corpore ad uitam & mortem hominū euentus, & quæ artificio
se modo exercent, modo insidiosè ubiq; animalia hæc agunt. Prima & maxima omniū, id est,
noxios, & innoxios, diuisio est: hos Græci ἀρῆχναο, nos Araneos, illos ambo Phalangia dixi-
mus. Rursus Phalangiorū plura sunt genera, priuatim ab antiquioribus latinis & græcis suis
nominibus appellata. Araneorū itidem, sed pauciora: quæ Dioscorides hoc capite numerat.
Qui primū Arachnes nomine usus indicauit, non de omni Araneo, sed de innoxio tantū age-
re, qui in parietibus & trabibus telas suas ad aliorum insectorū uenationem suspendit. Notissi-
mus omnibus hic est, in uetustis & rimosis parietibus habitās. Hunc Holcon, & Lycon, id est,
supum uocari hic ait: facta, ut nos credimus, a uenatione & insidijs eius appellatione: & quo-
niam muscas rapiat, trahat, & enecet, ideo lupum, & Holcon a trahendo dictum fuisse. Lu-
pos Aristoteles totum hoc genus etiā appellauit.

De Lacerta.

C A P. L X I X.

σαύρας ἢ κεφαλή

Lacertæ caput intritū, & appositum, aculeos & omnia corpori infi-
xa extrahit. Varos, formicantes uerrucas, & pensiles, quas acro-
chordonas uocant, tollit. Iecur ex esis dentibus coniectum dolores finit.
Si diuulsa admoueatur, ictis a scorpione leuamentum præstat.

Pli. li. 8. ca. 39.

Lacertam Græci Saurā. Huius una species Chalcidice uocatur, atq; Seps seorsum reddenda,
Lacertum, & Lacertam idem genus esse conspicio, ut est apud Græcos quoq; Sauros, atq;

B A R B A R I C O R O L L.

Saura. Est & pifeis hoc nomine. Lacerta uidetur & uasis genus esse apud Iuris peritos. Sicut & apud Græcos Saura, cuius in palma meminit Hippocrates. Est & Herbae nomen Saura, Plutoni sacra, ut Nicander poeta docuit illò uersu. *σαυρα*
ἡχθονίου πλάτατος σίφος ὑγασίλιον.

Fortasseq; in eo uerbo aut Anagallidem intelligit; quippe quam Dioscorides Sauritin a nonnullis dici prodat; & prophetē Nycteritin, quasi nocturno & subterraneo dicatam numini; aut ipsum Sinapi, quod, ut Plinio placet, ab Atheniēsis Saurion uocatur; aut Nasturtiū, quod ab Hippocrate Sauridion quoq; dicitur. Lacertarū pedes Græci Blafos uocant, hoc est, quorum pars extrorsum, pars introrsum spectet.

EX M. VERG. COMM.

V Troq; genere Lacertū, & Lacertā idem hoc animal antiquiores Latini dixerūt, tam certū, tanq; ubiq; nascens, ut nihil dicendū aliud de eo sit. Nec fuisset nobis in cōmentatione eius aliquis labor, nisi quod fere in cunctis legit, pellere, siue malueris dicere, tollere impositū Lacertae caput *ἰόνθον*, id est, uaros; nō sic, sed *ἰόνθον*, id est, clauos legi oporteret; quod nos antiquissimorū codicum fide instaurauimus: persuasitq; id audere Paulus Aegineta, qui clauos hoc re medio curat; & pręter hęc res ipsa etiā, & cōgeneres morbi uerruca & formica, quibus rectius clauī, q̄ uari coniūgebant. Quinetiā uerbum *ἔψυ*, quo hic usus est, & tollere significat, clauis aptius q̄ uaris competit, qui extenuantur leuiganturq; potius q̄ tolluntur.

De Sepe.

CAP. LXX.

Seps, quam aliqui Lacertam calchidicam uocarunt, in uisno pota, morfus suos sanat.

BARBARI COROLL.

Seps, nunc Lacerti genus est, nunc ut diximus Millepedæ. Cum Lacertam significari uolumus, Chalcidicæ cognomento utimur. Sed an idem sit cum ea, quam Aristoteles Chalcida, & Zygnida nuncupat, Theodorus more suo Dignydā conuertit, lacerto paruo similem, æstimabunt legentes. Ipse in diuersam partem moueōr Plinij uerbis, qui quodam loco ait, Peculiariter inquit, a Chalcide Ceraſte differt. Est & tuberculi maioris ac pestilentis nomen Seps, apud Hippocratem, ab erodendo impositum. Aetius, Seps inquit, serpens est cubitorum binum, crassitudine in exilitatem, ut alia quoq; genera serpentium, descendente: ingressu tardo, rectoq; lato capite, ore acuto, maculis corpore toto candidis: triduo, uel quadriduo interficit. Pausanias quoq; AEpytum inquit, Arcadiæ quondam Regem in uenatione occupatum, & imprudentem Seps oppressit. Viperæ similis est inquit, minime, cineris colore, maculis ex interuallo uariis, lato capite, angusta ceruice, aluo maiori, cauda breui, obliquo incessu, quasi cancer: quod & Ceraſtæ inquit, serpenti proprium est. Chalcidicem Helianus, si quis inquit, habeat in tritico, fore ut incorruptum seruetur. De serpente intelligat, an de pisce Chalcidico, qui & Chalceis dicitur, non constat. De Sepe pro Multipeda, Plinius uigesimo uolumine. Multipedem inquit, Sepa Græci uocant, oblongam, pilosis pedibus, pecori præcipue nocuam. Castigatus est in ea parte locus, propterea q̄ non Sepa, sed Ipa legebatur. Nam Ips genus uermis aliud, ut in pūmice docebimus.

EX M. VERG. COMM.

A Bexedendo Seps lacerta hæc dicta est. *σέπυ* enim, id est, exest quæ ueneno suo contigit. Lacertæ similem omnes describunt; præsertimq; in Theriacis suis Nicander dicens, *σέπυ* *πιδάκτοι* *δρακόν* *δρακόν* *δρακόν*, quod est, Vitabis & Sepa, corpore humilibus lacertis similem. Dico autē humiles, quas ille *πιδάκτοι*, id est, per terrā serpentes dixit. Fuit hoc illi ab euentu nomen, quemadmodū a corporis maculosis lineis, quas in tergo habet colore æris: quod Græci Chalcon dicunt. A Chalcis, siue Calcidica dicta eadem est. Nos enim eadem credimus: fuisseq; antiquā & uetā eius appellationem Chalcida, quasi æneā, ob eam quā diximus causam; & ex eo deinde nomine, cuius rationem non nouissent omnes, ad adiectiuū gentis, & loci nomen translata eius appellationem fuisse, dictamq; Chalcidicam, quasi in Chalcide Euboia plurima inueniretur. Quod falsum est: cum in Libya & Cypro nasci præcipue dicatur, & inter petras illic uiuere. Factū ob id etiā est, ut in antiquis scriptoribus modo Chalcis, modo Chalcedica lacerta inueniatur: eorūq; auctoritate diuersum, non idem creditū hoc animal fuerit. Nobis in hanc partem inclinat animus: habemusq; opinionis huius auctorem antiquissimū Nicandri interpretem. Nec eo secus liberum legentibus arbitrium relinquitur.

C De Scinco. CAP. LXXI.

Pli. li. 2. ca. 8.

Scinus aut Aegypti, aut Indiae, aut rubri maris alumnus: quibus inueniatur in Lydia Mauritaniae. Est autem terrestris Crocodilus sui generis, qui salus affertur in nasturcio. Aiunt carnes quae renes amplectantur, id sibi uirium uendicasse, ut si drachmae pondere bibantur, uenerem accendant. Verum decocto lentis cum melle, aut semine lactucae cum aqua potio, ueneris cupiditates inhibentur. Additur in antidota.

Pli. li. 2. ca. 8.

B A R B A R I C O R O L L.
Scinco a Crocodilo cute distinguitur, candidiore, tenuioreque, sed praecipue seta squamarum, quae a cauda ei ad caput uersa est. Maximus Indicus. Post Arabicus. Afferuntur in ueterati sale. In Nilo natus, Ichneumone minor est, tanto inferior Crocodilo. In Libya duos cubitos excedere, Pausanias existimat. Venales Scincos ex Aegypto licet uidere, lacerti magni similitudine. Sunt & Vincentino agro sui quidam Scinci, minores multo ueris, etiam si pro Aegyptijs officinae subijciunt. In Bithynia Chalcedonis agro fere, Crocodilos minutos quodam fonte nasci, qui a Zaritia dicatur, Strabo meminit: fortasseque pro Scincis accipit, quoniam paruos esse tradat. Crocodili Champsae apud Aegyptios uocantur. Iones uero Crocodilos primi uidentur appellasse, ut inquit Herodotus, sumpto nomine ab illo Crocodilorum genere, qui apud ipsos in sepibus, macerisque nascuntur.

Pli. li. 2. ca. 8.

T De Terrenis uermibus. CAP. LXXII.
Terreni uermes impositi, praecisos neruos glutinant. Tertianas discutiunt, decocti cum anserino adipe. Infusi, affectis auribus medentur. Cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillantur, dentium doloribus praestant auxilium. Poti ex passo, urinam ciunt.

D B A R B A R I C O R O L L.

Vermes terrenos, quidam Blininthas, alij Gensentera, hoc est, Lumbricos, & Intestina terrea uocant, Iulos aliqui, ut Dorion. Gaphagae a Syracusanis uocantur, quasi limo & terra uidentur. De his non nihil & in Fibro diximus. Est Iulus & Polypus & Cantilenae genus, quae lanifices siue purpurarii utuntur. Hoc nomine uocantur hymni quoque Cereris, ac Proserpinae. Sed & fruges ipsae. Propterea, quod singulares manipulos farris hordeacei, amalas Graeci uocant: ipsas uero metas, & fasciculos, qui ex multis manipulis praeligati sunt, Vlos, & Iulos nominant, ut Athenaeus inquit, meliusque Photion Vlos interpretatus, panes holoceros, hoc est, quibus nihil detractum sit. Nec satis scio, de autopyro pane, an de holopyro Photionis enarratio intelligenda sit: de quorum utroque in tritici mentione disertabitur. Terreni uermes, cum e cauernis suis prodeunt, tempestates, imbresque praenunciant.

Pli. li. 2. ca. 8.

M De Mure araneo. CAP. LXXIII.
MVS ARANEVS dissectus & impositus, sui morsus ueneficia luit.

Pli. li. 2. ca. 4.

B A R B A R I C O R O L L O.
Murem araneum Mygalen, & Myogalen Graeci appellant. Negant transiri orbitam ab eo, naturae quodam corpore: & si transierit, moritur. Inde contra morsum eius, terram ex orbita sumendam praecipunt. In Italia uenenatus eorum ictus. Eosdem ulterior Appennina regio non habet. Monendi sumus in Theodori praefatione de animalium historia, non Mygalen pro mustella, sed Galen scribendum ab impressoribus fuisse. Mus araneus ideo Mygale dicitur a Graecis, ut placuit Aetio, quia muris magnitudine sit, & mustellina specie. Os ei oblongum, cauda gracilis, dentes quadruplici uersu tenues: quod & uulnus indicat. Ex eo purus sitim sanguis effluit, mox saniosus, tum pustulae insurgunt, Sunt quibus caro feculenta. Ipsum animal maxime testiculos aggreditur. Pustulae, si praegnans perculserit, nec aliter rumpuntur, ut Dioscorides & Aetius scribere. Plinius, non pustulas, sed ipsum Murem araneum si praegnans ferisset, dissilire protinus existimant.

EX. M. VERG. COMM.

Descripserunt ex veteribus plures araneū Murem, præsertimq; Aetius: q; ideo a græcis Mygalem, factō ex mure & mustela nomine, appellari ait, qm̄ muris magnitudinē, & eadē illi caudæ gracilitate, et rictus longitudine, reliquo autem corpore mustelina specie fit. Amyntas tñ, antiquissimus græcorū scriptor, ideo Mygalem uocari ait, q; adulterino coitu ex mure & mustela nasceretur. Quod nec uerum, nec uerissimile est. Qui enim ad generationem coibunt mus & mustela: quibus non solum dissimilis penitus natura, sed quales multæ aliæ inter animalia uidentur natiuæ & exitiales inimicitia sunt. Meminit aranei Muris Nicander in Theriacis suis, cecumq; appellauit, homini exitialem, in orbitis rotarum pereuntem.

De Muribus. CRP. LXXIII.

MVres, qui in domibus oberrant, concisos, scorpionum plagis utilissime imponi in confesso est. Si in affatos infantes ederint, oris saluam exiccare promittunt.

BARBARI COROLL.

MVris nomen ut Mustellæ, animalibus multis cōmune. Alpini, quos aliqui Marmoras uulgo dictos intelligunt, magnis oculis prominētib; media magnitudine, pabulum hyemi præparant, anteq; condantur. Alterni, ut aiunt, mas, & fœmina, complexo herbarum fasce, supinos cauda mordicus apprehensa, inuicem detrahunt ad specus, proindeq; tunc temporis detricto uideri dorso. Pares ijs Aegyptij, similiter residunt in clunem, & in binis pedibus gradiuntur, prioribus manuum uice utentes. Sunt & Pontici, unius coloris, & uarij. Ex hoc gñe creduntur esse pelles, quibus muniri uestes contra frigora cœpere, candidos eorū Armillinos, fœdum uulgus nominat. Nam uarij, parte tātūm prona, candicāt. Venetis in dorso color, a quo Dossuarie Pelles uocantur: quandoq; ferrugineus, deterior priore. Instruxit & ex Muri bus luxuria suam uitā, alios magnis frigoribus, alios medio anni tempore a septentrionibus petēdo. Armamus corpora, debellamus animos. Condunt mures hyeme dumtaxat albi, quorū palatum in gustu sagacissimum esse referunt. Murem Græci Myu appellant, Cretenses Smythion, siue Smynthea, unde Appollini cognomen, ut Phocion uidetur post Strabonem.

EX. M. VERG. COMM.

PLura sunt Murum ueteribus genera. Alpini, Pontici, Glyres. Et in his generibus diuerso colore & forma, sunt & in domibus nostris latentes: quos adiecta hac nota ad medicinam Dioscorides ab alijs secreuit.

De Vsu lactis. CAP. LXXV.

LAc generatim omne boni succi est. Corpus alit. Aluum emollit. Stomachum & intestina inflatione uexat. Venum tamē dilutius æstiuo habetur. E uiridi pabulo aluum magis læuigat. Probatum autem candidum, æquali crassitudine, quod ungui instillatum cogitur. Aluum minus tentat caprinum. Quoniam adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, magna ex parte uescuntur. Inde stomacho accommodatissimum reddi solet. Ouillum autem dulce, asperum, & præpingue, non usq; adeo utile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & equinum, uentri magis idonea. Sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora scamoniā, ueratrum, lematipem, aut mercurialem pascuntur, lac omne uentrem & stomachum subuertit. Quale in Iustinis montibus esse, a nobis proditum est. Siquidem capræ, quibus candidum ueratrum pabulo fuerit, primo foliorum partu euomunt, & eorum lac haustum nauseam creat, & stomachum in uomitiones effundit. Adstringentiū omne decoctum, præcipueq; candentibus calculis marinis exuctum. In summa, omnibus auxiliatur internis exulcerationibus, præsertim faucium, pulmonis,

C interaneorum, uesicæ, & renum. Foris uero contra pruritum cutis, eruptiones papularum, & uitiatos corporis succos. Recens cum melle crudo, addito sale, datur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcunque feruifacium. Decoctum cum calculis marinis ad dimidias, ulcerosas uentris fluctiones adiuuat.

Pli. li. 28. ca. 9.
Lib. 11. ca. 41.
Aristot. de naturis animalium. lib. 7.
cap. 5. u.

B A R B A R I C O R O L L.

Lac Græce Gala. Camelinum, ab hominis lacte, dulcissimum; præcipue si ad unam mensuram tres aque addantur. Bos ante partum non lactescit, Asina protinus. Pullo eius ubi pingue pabulum est, biduo a partu maternum lac pressisse mortiferum. Genusque morbi uocatur Colostratio, & infantes Colostrati, densato lacte in casei speciem. Ex proximo semper a partu Colostræ fiunt, quæ nisi admisceatur aqua, durecant in pumicem. Est autem Colostræ, siue ut Plinius Colostrum, prima a partu spongiosa densitas lactis. Theodorus pro coitu lactis quocunque, Colostrum plerumque accipit. Itemque pro eo quod ab Aristotele Trophalides appellantur. De Colostro & Martialis poeta meminit, & Lucilius, & Plautus in Penulo. Mea inquit Colustra, meum cor, meus molliculus caseus. Inter opera uero ganæ præciosissimum ex lacte Caput uocatum; quod Britanni atque Belgæ Cremorem lactis hodieque nominant, conficitur & quæ Spuma lactis dicitur. Insubriæ supra memorati, Cremoris æmula, quam græci Aphrogala, ut inquit Aetius, appellant. Vtrinque dentatorum lac non coit. Tenuissimum camelis. Mox equabus. Crassissimum asinæ, ut coaguli uicem impleat. Omne Lac igne spissatur, frigore ferescit. Spissatum igni, Pyriathes, & Pyriephthon uocari a græcis, autor est Aetius. Meminit & Iulius Pollux, sicut spissatum coagulo Pyctes, quod rustici nostri Lac luncatum, a Iunco & carice, aut quibus alijs seges tribus inuoluitur, appellant. Athenæus uero primum lac Pyriephthen, & Pyriephthon tradit uocari. Photion primum Lac a græcis etiam Pyos, & Pyon dici uoluit. Alioqui Pyos & sanguis concretus est: quod & Pus dicitur. Pultem ex ouo & lacte Oogala medici cognominant. Lacticia, qui uocant ex Lacte quoquo modo cibum, etiam si quidam in sacris literis id usurpant, non probo. Lactarium opus dixerim potius, autore Spartiano. Cœnas inquit Heliogabalum exhibuisse alia die de oleribus, alia de pomis, alia de dulciarijs, alia de opere lactario.

D

εἰς τὸν γάλακτος

De Sero lactis. CAP. LXXVI.

Lac quodcunque Serum continet implicitum. Quod ubi discessit a lacte, multo potentissimum ad purgationes redditur. Datur quibus sine acrimonia uolumus deiectionem moliri: ut melancholicis, comitialibus, lepris, elephantijs, & erumpentibus toto corpore papulis.

Strabo lib. 3.

B A R B A R I C O R O L L.

Serum iam multo potentissimum quidam ad tertias decoquunt, & sub diuo refrigerant. Græci Orron uocant. Hoc quemadmodum a lacte separetur, Dioscorides mox indicat. In Erythia iuxta Gades, insula unius stadij, parente fireto, lac sine Sero premi tradunt, ut Strabo retulit: tanta pinguitudine, ut in caseo conficiendo, aqua diluatur.

χρυσός

De Schisto, ceu scissili lacte. CAP. LXXVII.

Ex omni lacte fit quod Schistum appellant. Lac autem fictili nouo feruet, ramoque ficulneo recenti mouetur, insparsis postquam bis aut ter efferbuerit, totidem acetum mulsi cyathis, quot sunt heminae lactis. Ita enim ferescens, liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum concreuit. Sed cum feruet, ne superfundatur, conueniet spongia ex frigida continuo fictilis labrum detergere, sestetariumque argentum frigidæ aquæ plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singulis usque ad quinas, ita ut intercedentibus spatijs, potantes ambulent. Lac autem recens efficax

est contra rosiones ustionesq; ab exitiis medicamentis factas, uti a cantharidibus, aut salamandra, bupreste, aut pinorum eruca, hyoscyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero. Præsertim bubulum ad id eximie confert. Gargarizatur autem exulceratis faucibus, tonsillisq;. Asininum peculiariter collutos dentes, gingiuasq; stabilit. Fluxiones alui, si ulcera sentiantur, tenesmosq;, ouillum, bubulum, aut caprinum cum marinis lapillis decoctum, sistit. Per se autem, & cum hordeacea ptisana, aut halicæceo cremore infusum, magnopere intestinorum rosiones mitigat. Exulceratæ uulvæ immittitur.

BARBARI COROLL.

LAc Schistum uocatur, quasi scissile, ac dimidium, quoties uidelicet concretam eius partem, quæ Casealis dici potest, ab serosa, ut Galeno placet, separamus. Improprie tamen Schiston inquit lac nonnulli appellant, id in quo aut littorales calculi, aut ferrum ardens restitutum sit.

De Muliebri lacte. CAP. LXXVIII.

HVmanum lac dulcissimum est. Et maxime alit. Mammis autem leuatum, prodest tibi, & stomachi rosionibus. Contra haustum leporem marinum præsidio est. Oculis cruore ex ictu suffusis, cum thuris polline instillatur. Podagricis utile est, cum meconio, & cærato illitum. Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitialibus, uertiginosis, & neruorum uitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus. Nisi si quis interdum purgationis gratia, ut ostendimus, Schistum præbeat. Primiperæ canis lacte perunctos narrant glabrescere. Potum contra uenena antidoti uicem obtinet. Abortus mortuos expellit.

BARBARI COROLL.

LAc mulieris ante septimum mensem inutile, infalubreque. In omni usu præfertur eius, quæ geminos enixa fuerit, tum eius quæ marem fere. Inefficax eius quæ sequiorem sexum edidit. Eius quæ marem peperit, lacte gustato, Canes rabiosos fieri negant.

De Caseo. CAP. LXXIX.

Caseus recens, sine sale, sumptus alit. Stomacho utilis est, & facile in membra delegatur. Corpus auget. Aluum modice emollit. Alius tamen alio præstantior, pro natura lactis a quo conficitur. Decoctus autem & expressus, deinde inassatus, aluum sistit. Illitus, oculorum inflammationibus & sugillatis prodest. Qui uero recens salitus est, minus alimenti præbet. Corpus apte minuit. Stomacho aduersatur. Negociū uentri, interaneisq; exhibet. Vetusiore sistitur alius. Sero quod a caseo manauit, quæ optime canes aluntur.

BARBARI COROLL.

Caseus non fit ex utrinque dentatis, ut diximus. Bubulum, Caseo fertilius quæ caprinum, ex eadē mensura, ut Aristoteles tradit, pene altero tanto. Quæ plures quaternis mammas habent, Caseo inutilia, & meliora quæ binas, Caseus infumatus laudabatur a ueteribus: nec hodie cotemnitur. Omnis porro Caseus, senectute fit falsus: sed in museum redit saporem, aceto e thymo maceratus. Barbaros Caseo non usos tradunt, sed in iocundū tamē acorem solitos lac coagere, quod & Oxygala uocatum sit: cuius rationē aliam Columella postremo sui operis libro tradidit. Casei genus Saptum, quasi putrē dicas. Faciunt utilem coeliaci. In Plinio legendū sit epityron, an caprarum, in mentione Casei lib. ii. controuersum diu fuit. Ipse nō epityrum, sed

A

γυναικός γάλα

B

Pli. li. 28, ca. 9.

τυρός νιάρος

r ij

Caprarum lego, non quia Epityrum oliuæ fractæ genus sit, ut quidam putant: quandoquidem oliuæ genus illud pityrum & pityrida, non epityrum appellari constat: sed illa ratione potius, quod nisi caprarum gregibus sua laus est, in recenti maxime eam augente fumo gratiam, & reliqua legamus, uix stabit sensus, nisi plane quis extorqueat. Præterea, cum de bubulo, & ouillo Caseo disseruisset auior, maxime sequens erat, ut de caprino quoque loqueretur: ne quia sit omnium fere deterrimus, improbari omnino iudicaretur. Adde, quod infumari, non alius magno fere Caseus, quam caprinus assolet. Nec fere placet, nisi musteus, atque recens. Athenæus latini uoce usus, fumosos Caseos appellat. Laus Caseo Nemaufeni, Lesuræ, Gabalicique pagis. Alpino duobus generibus. Docleati, ex Dalmatia, Vatisico, ex Cetrônia, Cebano & Liguriâ & Appennino, maxime lactis ouium. Auximati, ex Umbria. Item Iunenti magnitudine conspicuo, singulis quoadque milibus pondo. Item Vestino, Crustuminoque, ac Coditio campo. Nam Siculum Iulius Pollux meminit, & Aristoteles, qui & Phrygium quoque nominat: sed Siculum ex ouillo & caprino mixtum lacte, Phrygium ex equino alininoque fieri solitum commemorat. Siculum Athenæus præferri putat omnibus, utique post Achaicum, ex oppido Tromilia, unde Tromilistis dicatur, & a Simonide Stromilium, ex caprino lacte. Epityrum uero caseus non est omnino, sed ut Varro inquit, edulium, Siciliae quam Italiae frequentius: cuius uocis in Plauti mentionem haberi sciunt omnes. Vnum inquit epityrum edam. Pollux uidetur hoc Xeriantyron uocasse, siculum edulium id esse affirmans, Athenæus Hypotyrida placenta genus facit, fortasse idem cum Epityro. Nam Catatyron condimenti nomen est e caseo, apud eundem autorem. Trans maria Bithynius fere in gloria erat, Salonites ab oppido appellatus. Gallicia por medicamenti uim obtinet. Nunc a Cisalpina Gallia commendantur, Placentini maxime. Formaginem Theodorus pro Caseo cur dixerit, aut quem autorem secutus ita uerterit, quod Aristoteles Trophalida scripsit, nisi quod in Columela forte legit, cœcretum lac in fiscellas, aut in strum interpretatur, ut prædiximus. Neutrum satis probo. Caseum Græci Tyron uocant. Eius discrimina pulcherrime Antiphanes poeta reddidit. Chloron, hoc est, recentē atque molle: qualis in fiscella fertur. ob id Fiscellis uocatis: quia inde caseum figurant: Xeron, hoc est, aridū, atque ut Iulius Pollux interpretatur, macilentum. Copton, hoc est, prædurum. Nam & Copta rhodia, & Copta ficus hinc nomen tulere. Xyston, hoc est, consilem atque rasilem. Nam & horum sic dicuntur. Tmeton, hoc est, scissilem. Pecton, hoc est, coagulatum, colostratumque: nam est qui acescere incipiat & lacte ficulneo coierit, Opian uocant. In Creta Caseos quibus lara forma est, sed gracilis, Thelias, id est, quasi foeminas appellant.

De Hippace. CAP. LXXX.

ἵππας

Quod Hippacen uocant, Caseus est equinus. Ea uirum redolet. Magnopere alit. Bubuloque proportionem correspondet. Nec desunt qui Hippacen, equinum coagulum appellarint.

BARBARI COROLL.

Hippace differt ab Hippice: quod Hippace caseus atque coagulum est, Hippice uero herba, Scythica equestris, a Theodoro dicta. Phrygiū caseum, Aristoteles ex equino & asinino lacte confici solitum scribit, ut in caseo notauimus. Hippocrates inuictum scribit Scytharum Hippacem. Ex equino lacte, in ligna, inquit caua infundunt id. Deinde obturbant, in natantem spumam. Butyrum uocant: id quod fidat, Hippacem: id quod in medio subsistit, Serum. Vires exiguo cibo sustentat Hippace, quemadmodum & Hippice.

De Butyro, & eius fuligine. CAP. LXXXI.

βούτυρον

Elacte pinguiissimo probatum fit Butyrum, quale bubulū est. Fit & ex caprino, agitato in uasis lacte, donec pingue discedat. Butyrū natura oleosum est, & emolliens. Vnde largius epotum, uentrem resoluit. Prodest, ubi oleum non adfuerit, contra uenena. Cum melle, si infusetur, dentitiones adiuuat. Gingiuarum pruritus, & oris ulcera infansibus emendat. Illitum foris, capaciora alimentorum facit corpora. Et ab albidis pustulis per summa scatentibus asserit. Contra inflammationes, et durit

A cias uulnæ, quod nec uirus respicit, nec uetustatem sentit, Butyrum efficax est. Dysentericis, & coli exulcerationibus infunditur. In medicamēta addi solet, quæ pus mouent. Vtile præsertim cum nerui, aut cerebri membranæ, uesica, aut ceruix uulnera accæperit. Id autē purgat. Replet. Carnem creat. Ab aspide percussis utilissime imponitur. Recens obsonijs additum, olei uicem pensat. & adipis uice fungitur in bellarijs. Colligendæ ex eo Fuliginis ratio hæc est. Butyrum in lucernam nouam ingestum accenditur, fictiliq; operculato, quod superne in siphunculū desinat, & sub pedibus cuniculos clybani modo habeat, crematur. & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur Fuliginis modus, quem facere institueris. Penna post deraditur ad usus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exiccare & adstringere. Fluxiones cohibet. Et ulcera celeriter ad cicatricem perducit.

BARBARI COROLL.

B utyrum spuma Lactis est, cōcretiusq; q̄ quod Serum uocatur. Hic & Butyrus dicitur, & Butyrum, & ab Hippoc. Picerion. Laudatissimus Barbaris cibus, & q̄ diuites a plæbe distinguat. Butyrum a boue nominatur, q̄a e bubulo lacte fiat: ut miretur Dioscoridem Galenus, q̄ ex caprino, & ouillo cōfici lacte dixerit. Ex caprino tamē fieri solere, testis est Plinius. Quod quidem cū fit, hyeme calefacto eo, æstate uero dumtaxat expresse utuntur, crebro iactatu, in longis uasis, angusto foramine, additur paulum aquæ, uti acefcat. Quod est maxime coactū, in summo fuit. Id exemptum addito Sale, Oxygala, hoc est, acre Lac appellant. Reliqua decoquant in ollis. Ibi quod supernat, Butyrum est. Quod magis uirus respuit, hoc præstantius. Oxygala fit & alio modo, lacte acido in recens addito. Casei genus a Galeno Oxygalactinon uocari Asiæ, Pergameno præsertim agro dicitur.

Pli. li. 25. ca. 9.

EX. M. VERG. COMM.

E x lacte Butyrū fit, spuma eius dū coquit cōcretior q̄ Serū: & qm plurimū e bubulo fit, a boue nomē inuenit. Alioq; ex omni lacte fieri posse, & hic, & Plinius testati sunt: qd antiquiores aliqui negauerunt, nomen magis, q̄ rei naturam contemplati. Oleosum natura Butyrum esse, Diosc. ait, & p̄ter hoc non μαλακτικὴ δύναμις, quod fere in omnibus græcis legitur, quod molliendo aptum significat, sed ut in uetustioribus, & ut res ipsa exigit, γαλακτικὴ, i. lactuosæ naturæ. Barbarus ex priore illa lectione, molliens id uertit. Nos ex posteriore, oleosum natura Butyrum esse, & lactis naturam sequi diximus: non tam ueterum codicum fide & auctoritate persuasi, q̄ passui eius uerbi ἰχταί significatione admoniti, quæ apte id indicabat.

De medicina Lanarum. CAP. LXXVII.

S uccidē Lanæ molles, e collo, feminibusq; laudatissime habent. Subueniūt int̄ initia uulnerib. percussis, desquamatis, liuidis, ossib. fractis, aceto, oleo aut uino imbutę. Siquidem capaces sunt liquidorum, quibus oblesæ partes fouentur. Et ob pecudum sordem, sic enim Oesypum uocant, emolliunt. Capitis, stomachi, aliarumq; partium doloribus, cū aceto & rosaceo efficaciter imponuntur.

ἱρία οἶσός πῖρά
τὰ ἀπαλά

De Lanis ustis. CAP. LXXXIII.

C rematarū Lanarū cinis crustas obducit. Excrefcentias in carne cohibet. Et ulcera ad cicatricem perducit. Mundæ autem, & carptę in fictili crudo cæterorum more uruntur. Nec secus purpurarum tomenta cremari solent. Aliqui cum sordibus Lanæ carpūt, & melle irri-gant, eodemq; modo urunt. Alij in fictili oris patuli, uerucula inter se di-

κεκρυμμένα ἱρία

Cstantia componunt, & conceptas lanas oleo ita suffusas, ut ne stillare quidem possint, assulis tædæ subiectis, & eisdem lanisq; permutatim interstratis, leuiter succendunt, & uistas tollūt. Quod si e tæda pix, pinguitudine ulla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. Cinerem in labellis aqua addita manibus confricant, & confidere patiuntur. Idq; sapius, mutantes aquā donec linguam adstringat, nec mordeat.

Pli. li. 8. ca. 48.
Lib. 29. cap. 2.

B A R B A R I C O R O L L.

LAnam, Græci Erion uocant. Ad medicinam laudatissima est Gaiatica, Tarentina, Attica, Milefia, Lanæ quibusdam locis non tondentur, sed euelluntur. Ob id cum dempta est, atq; cōglobata, quidam Vellera, alij Velumia appellant. Mirum quod tradunt, mederi Lanæ pecori, cibos fastidienti, si cauda q̄arctissime præligata, indidem uellantur: statim enim uesci pecus incipere, & quod extra nodum sit, præmori. Lanam succidam Græci Rhyparam, Ionia Siny-pen, alij Oesypiram, hoc est, sordidam, & cum Oesypo suo, de quo paulopost dicturi sumus, nominant. Galenus autor. Succidam, a sudore dictam Varro existimat: quia oues cum inceperint sudare, tondeantur. Nam Succidia, non a sudore, sed a sue nominatur, cuius caro est. Lanarum sunt & a coloribus, quos bibunt, discrimina. Cyanatiles a fluctibus, Geranochroes a gruibus. Iam ab Amethylo, ab serenitate, a Crocō, a Rosa, a Myrto, a Glandibus, ab Amygdalis. A Cera, a Coruo Coraxicæ, a Purpura Colossinæ. Et hæc partim ex Plauto, partim ex Ouidio in Artribus, & Strabone. Adulteros, ut Aelianus tradit, in Gortyna Cretæ deprehenso, Lana coronabant, mollicia probro: atque ita per ciuitatem, ad Magistratus traducere moris erat.

Supplicium ad
ulteriorum a-
pud Cretenses
olim.

E X M. V E R G. C O M M.

Quales fuerint ueteribus, & unde nomen inuenerint succidæ Lanæ, satis docuit Varro rerum rusticarū secundi uoluminis ultimo capite, cuius uerba hæc sunt. Tonsuræ tempus inter æquinoctiū uernum & solstitiū, cum sudare inceperint oues, a quo sudore recens Lanā tonsa, succida est appellata. Hic præter tonsuræ tempus, quod succidarū appellatione signatum ab eo est, ex qua etiā pecoris parte tondendæ essent, ad medicinā docuit: ex collo scilicet, & femoribus, unde molliores, & copiosiore sudore sordidiores tondent: quorū alterū molli, alterū adspergines felicius cōbibit. Dicimus autē adspergines quæ Græci *ὑεφύματα*, & *ὑεφύματα* in sua medicina passim dicunt, quæcūq; humida & liquida corpori inspergunt: quæ quoniam cito dilabunt, linteolis, stuppis, alijsq; huiusmodi inspersa imponunt: & in hunc usum aptissimas esse pecoris lanas Diosco. ait Nec aliud in Satyra Aquinas poeta indicauit dicens. Vinū, qd succida nollet Lana pati. Eo em, alijsq; humoribus ad medicinā quotidie inspergunt.

sigumet

¶ De Oesypo, pecudum sorde. CAP. LXXXIII.
Oesypum uocant græci, succidarum lanarum pinguitudinem. Cuius parandi ratio hæc est. Succidæ molles radícula curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunq; sordibus expressis, & in labellum oris amplius coniectis, aqua infunditur, magnoq; impetu cocleari uti respumet agitur, aut lignea rude ualidiuscule cōturbatur, quo largius sordida spuma colligi possit. Deinde marina respergitur. Et confidente pingui quod super natabat, collectoq; in fictili uase, denuo aqua in labellū fusa agitur. Spuma mari perfunditur, & demum eximī. Hoc tantisper fieri solet, dū consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum Oesypum manibus emollitur, & si qua insit spurcicia, cōfestim demitur. Exclusaq; sensim omni aqua, recentique affusa, manibus misceatur, donec admotum linguæ Oesypum, adstringat leuiter, nec mordeat, atque pingue candidūq; spectet. Tū in fictili uase condi. Verū omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus

non secus atq; cæratum foeminæ, confricant: Ita enim candidius redditur. Alij elotis lanis, & sordibus quibuscunq; exemptis, ac lento igni in æneo uase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectum, aqua ut diximus lauant, colatumq; in fictilem ollam, quæ calidam aquam continet, linteo operiunt, atq; soli mandant, donec candidum fiat, & satis crassum. Alij bidui spacio aquam effundunt, nouamq; adijciunt. Melius est læue, radícula non curatum, quod succidarum uirus oleat. Et si manu in concha fricetur cum aqua frigida albescat, nihil in se duri, aut concreti habens. Veluti quod cærato, aut adipe adulteratur. Oesypum excalfacit, explet ulcera, & emollit, præsertim sedis ac uulvæ, cū meliloto & butyro. In uellere appositum, menses & partus euocat. Vlcerà non aurium modo sanat, sed & genitalium cum anserino adipe. Contra erosos angulos oculorum, scabiososq; genas quæ occalluerunt, & ciliorum defluuia efficax est. In testa noua torretur, donec redactum in cinerem pinguitudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligit, uti demonstrauius. Quæ in oculorum medicamenta commodè addi solet.

BARBARI COROLL.

Oesypum, & Oesypus, utroq; modo effertur, ab eo quod Oes, hoc est, ouis. Græci masculino sere utuntur, Latini frequentius neutro. Laudatissimum a sudore alarum & feminum, sicut in Atticis ouibus genitum: quod & notauerit Ouidius,

Oesypa quid redolent, quibus mittantur Athenis.

Hippocrates, Caprinæ & clunibus sordem uocauit Oespen, ouillam Oesypiden: quo quidē nomine, Lanam quoq; succidam significat quibusdam. Quidā hoc a Galeno Hysopū dici putant: errore uulgi, & quidem a Græcis orto, qui non Oesypum quādoq; sed Hysopum scribant: ut siue prudentes, siue imprudentes, non Oesypum simpliciter, Hysophon Hygron, & Hysopum pharmacum sæpissime cognominent: quasi ab Hysopo herba distinguere uoluerint, ut Paulus in compositione, quam a Ruta *πυραυρα* appellant, utilem pleureticis.

Pli. li. 29, ca. 28

B

De Coagulo.

CAP. LXXXV.

Leporis Coagulum tribus obolis ex uino, uenenatorum morsibus, coeliacis, dysentericis, & foeminis fluctione uulvæ laborantibus, ac reiectionibus a pectore, auxiliatur. Sanguinem concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum uulvæ cum butyro, præstat mulieribus ut concipiant. Potū uero partus enecat. Et post excretionē, pariendi spem adimit. Equi Coagulum, quam Hippacen aliqui uocant, priuatim coeliacis, dysentericisq; conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capræ, apri, cerui, uituli, bubaliqu Coagula similes naturas fortiuntur. Contra aconiti potū in uino, & concretū lac in aceto, cōuenienter assumuntur. Hinnuli Coagulum triduo & uagationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli, marini Coagulum castorei uires representat. Comitibus, strangulatis uuluis potu conferre existimatur. Sed synceri hoc experimentū est. Aqua inspergitur, qua paulisper cum alterius animalis, tū præcipue agni Coagulū, maduerit. Quod si uerū est, statim lique-

πύρα λαπαύ

r iij

C scit in aquam. Sin minus, consimile permanet. Excipitur autem catur-
lis qui nondum natate possunt. In summa, Coagulum omne dissipata
cogit, & coacta dissoluit.

B A R B A R I C O R O L L.
Coagulū Pictya, & Pitya græce dicit, & Tamisos poetis. Plinius ex hædo laudat. Aristote-
les ex Inulo. Præcipuū tamen Dasypodis: quod & profluvio alui medeat, unius utrinq; denta-
torū. A Pitya Pitynā uulgo dici, concretū igni serum, & quod in cascum coire non potuit existi-
mo. Est & apud Græcos id quod appellant auctores noui, Melcen, imbuto uase aceto, atq; ita
excalsfacto, mox lacte infuso, ac nocte tota quiescere citra ignem permisso. Quæ & alij pleriq;
modi sunt. Sed hic & compendarius, & facilis. Sunt quibus Melce uideat esse, quod Oxygala
uocauimus, Tamet si butyrū quoq; rustici non aliter fere appellant, q̃ Melcen.

E X M. V E R G. C O M M.
Nota oībus res Coagulū est. Et nihilominus qui in græcis literis se tantū profecisse iactant,
ut singulis diebus aliqd cōponere se posse dicant, & depromere, quicq; sacrarū literarū antiq̃s in
terptes nouis æditionibus castigare ausi sunt, in Plutarchi cōmentariolo, cuius titulus est, quo
modo quis ab inimicis utilitatē inueniat, pro coagulo lac uerterit: non intelligētes, quantū ab
altero alterū differat, & qd in ea re scriptori illi propositū & consiliū fuerit. Licetq; auctore Ari-
stotele lib. 3. de historia animalū, Coagulum lactis substantia sit, non tamē illi idem est: & ut re-
ipsa differunt, lac, & Coagulū, sic etiā diuersis a græcis & latinis appellationibus indicant. Mul-
ta de animalū Coagulis in utraq; gente uetustissimi scriptores docuerūt. Sed in græcis omniū
copiosissimā historiam eodem libro & loco Aristoteles, & inter latinos Plinius.

De Adipis ratione. CAP. LXXXVI.
A^{siap}**D**^{DEPS} **A**DEPS ANSERINVS, aut gallinaceus, recens, & sine sale
conditus, ad uulua uitia proficit. Sale inueteratus, & qui tem-
poris spacio acrimoniam concæpit, uulua inimicus est. Recens ex-
emptis membranīs in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere ca-
pacior sit, quantus sit modus Adipis quem curare institueris, obstru-
cto diligenter uase, flagrantissimo soli exponitur. Eliquefcens inde hu-
mor in fictile alterum excolatur, donec Adeps omnis absumatur: mox
loco uehementer frigido reconditur, & ad usum digeritur. Alij fictile ful-
ciunt super aquam calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ
solis uicem penset. Est & alia curandī ratio. Exemptis membranīs teri-
tur, coniectusq; in ollam eliquatur, adiectio minuti salis momento. Mox
lineo colo transfusus reponitur. Vtiliter in medicamenta additur, quæ
lassitudines & fatigationes leuant. Suillus adeps, & Vrsinus hoc curan-
tur modo. Recens, præpinguis, renibus potissimum detractus, in lar-
giore aqua coelesti & q̃ frigidissima, exemptis tunicis, diligentissime ma-
nibus confricatur, & exprimendo ferme siccatur, subindeq; noua aqua
abluitur: Cæterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam demergi-
tur. Et subditis leuibus prunis, spatha mouetur. Eliquatusq; colo tran-
sfunditur in aquam. Vbi uero refrixit, & guttatim aquam omnem ex-
clufit, in prælotum fictile demittitur. Et infusa aqua leniter eliquari de-
bet, & manu deprimi, quo facilius fæculentum uirus pessum eat. Postea
in pilam spongia madefactam transfunditur. Vbi coire cœpit, residens
in imo sordes eximitur. Tertio citra aquam eliquatur, repurgatusq; ficti-

li bene operculato, perq̃ frigidis locis reponitur. Hircinū seuum, ouillū, **A**
 ceruinūq̃ ita curato. Elotum ex his quodcūq̃, tunicis ut in suilli mentio-
 ne dictū est exemptis, pilæ emolliendū tradito, ac manibus fricato, affusa
 paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentū uirus excernatur, aut
 pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. Deinde in ollam conijcito,
 & adiecta aqua ut superemineat, leui pruna liquefacito, atq̃ in aquam
 colato. Cumq̃ refrixerit, iterum in loto fictili eliquato. Et quæ ante dixi-
 mus facito. Tertio sine aqua liquefactum, in perfusam liquore pilam col-
 lato. Refrigeratūq̃, ut in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum au-
 tem seuum, renibus maxime detractum, exemptis membranis, aqua ma-
 rina ex alto petita eluendū est. Mox in pila tundendū diligenter, affusa
 maris aqua. Cum uero dissolutum fuerit, in fictilem ollam conijciendū,
 & marina aqua, quæ non minus dodrante superemineat, proluendū. De-
 coquendum, donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui atti-
 cas minas, quaternis tyrrhenicæ cæræ drachmis. Excolatumq̃, detractis
 quæ pessum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum, opertūq̃ so-
 li interdū credendum, ut ad candorem reducatur, & uirus euanescat.
 Priuatim taurorū pingua sic curari debent. Renibus euulsum pingue,
 profluente amnis aqua abluito, detractisq̃ tunicis fictili nouo postq̃ exi-
 guū sale insperferis, liquefacito. Dein in nitentem aquam excolato: &
B ubi concrefcere cœpit, manibus iterum confricando uehementer laua-
 to, aqua sæpius infusa, refusaq̃, donec q̃optime elotum uideatur. Rur-
 sus in olla cum pari modo uini odorati decoquito. Et cum iterū efferbue-
 rit, dempto ab igni uase, ibidem finito pernoctare. Postridie si grauius
 adhuc oleat, noua olla repetitū, uino odorato perfundatur. Eadem quæ
 prius fiant, dum omne uirus euanescat. Colliquatur, & sine sale, præser-
 tim affectionum earum cauissa, quibus sal aduersari solet. Sed ita para-
 tum, non magnopere albescit. Eodem modo pardorum, ac leonum
 pingua curari oportet. Taurorum autem & uitulorum pingua, nechon
 ceruorum medullæ, odoramentis imbuuntur hac ratione. Pingue quod
 odoratum reddi debet, demptis quo diximus modo membranis, elo-
 tum, & uino q̃odoratissimo nulla maris aqua diluto feruefactum, per-
 noctare finitur. Alterum id genus uinum eadem mensura infunditur,
 colliquatur, & exquisitè colatur. Nouemq̃ eius heminis, iunci Arabici
 ci septem drachmæ adijciuntur. Quod si ipsum odoris fragrantioris fue-
 ri uoles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cum paribus palmæ, ca-
 lami, & casia modis adduntur. Et xylobalsami, aspalathi singulæ drach-
 mæ, cinnamomi, cardamomi, & nardi singulæ uncia. Omnia exactius
 tunduntur, & affuso uino odorato, in uase operto quod supra carbones
 firmiter collocatum sit, ter effervescent, & semoto ab igni uase inibi per-
 noctant. Postridie uinum effunditur. Aliudq̃ generis eiusdem adijcitur.

D I O S C O R I D I S

C Ter simili modo conferueſcat. Matutinis uinum effundatur. Et abluto uafe, ſi quid imo ſubſidens hæſit, detergatur. Poſtremo eliquatum pingue, & excolatum, ad uſus reconditur. Hoc autem modo odoramētis imbuitor, quod antea curatum eſt. Verum ante dicta prius inſpiffari ſolent, quo facilius ſibi odoramentorum uires adſciſcant. Itaq; aſſumens quod uoles cum uino feruefacito, impoſitis una myrti ramulis, ſerpylo, cypetro, item aſpalatho plenius tuſo. Aliqui tamen pro uſu, uno dumtaxat horum contenti ſunt. Cum autem ter efferbuit, exemptum leniter & linteocolatum, aromatis uti expoſitum eſt imbuitor. Adipibus ſpiſſamenta ſic fiunt. Synærus, & ſanguinis expers adeps, reliqua habens quæ ſæpere tulinius, in ollam nouam demittitur, inſuſo uino albo, uetere, odorato, quod ſemipedis altitudinem ſuperet: lento igni ferueſcat, dum uerna- culus odor aboleatur, planeq; uinum redoleat. At ubi depoſito uafe re- frixit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo uini eiſdem ſextarij, & ſeminis loti, eiſus inquam cuius e ligno ludicræ tibie faciuntur, tuſi minæ quatuor adijciuntur. Lento igni ſubinde miſcendo decoquuntur. Cumq; odoris uirus euauerit, excolatusq; adeps refrixerit, una contuſi aſpalathi mina, cum amaracini floris minis quatuor, & uetere uino ſub- igitur. Nocte una hæc odorem rapiunt, combibuntue. Poſtridie in ficti- lem ollam tricongiam ea omnia cum adipe iniecta, additis ſextarijs tri- bus uini, una ferueſcūt, quouſq; & uim & odorem ſpiſſamentorū adeps ipſe cootraxerit: qui eliqueſcens colatur, & reponitur. Quod ſi maiorem odoris fragrantia efflagites, drachmas octo q̄ pinguiſſimæ myrrhæ uino macerata, quod multos in annos aſſeruatū eſt, miſcero. Gallinaceus, an- ſerinusq; ſic odoribus imbui ſolent. Cuiuſuis eorū percurati ſextarij duo fictili olla excipiuntur, eryſceptri, xylobaſſami, palmæ elatæ, & calami pla- ne contuſi ſingulorum ſeſcuncia admiſcetur. Vini leſbii ueteris cyathus unus adijcitur. Ea ter efferueſcunt prunis. Mox uafe ſublato ab igne, die noctuq; refrigerantur. Poſtridie liquata per linteum mundum in uas ex- colatur. Vbi uero adeps coierit, concha excipitur, fictiliq; nouo denſius operto, perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id inſtituere opor- tet. Aeſtate ſiquidem pingua non coguntur. Nec deſunt qui tyrrenicæ ceræ momentū adijciāt, quo facilius in unum corpus omnia coaleſcant. Eadem ratione ſuillus adeps, & uſinus, cæteriq; id genus, odoramentis imbuuntur. Verum Sanſuci odorem adeps ipſe repreſentabit hoc modo. Curati q̄ optimi adipis, præſertim taurini mina una, tempeſtiuiq; ſanſu- ci exquiſite confracti ſeſquimina miſcentur, & in ſparſo largiore uino di- geruntur in offas, quæ in uafe cooperto nocte quieſcunt. Matutinis in ficti- li olla leuiuſculo igni, aſuſa aqua coquuntur. Dumq; ſuū adeps odorem exuerit, defæcatus, ac bene opertus, nocte tota permanet. Poſtero die de- terſa ſorde quæ peſſum ierat, ſanſuci, ut dictū eſt, contuſi iterum ſeſquimi

na priori pastillo adijcitur. Eodemq; modo in offas cogitur. Alijs quæ **A**
diximus peractis, decoquitur, & colatur. Quod si qua fundo hæsit spur-
citia, deraditur, & frigido loco reconditur. Si quis tamen incuratum ad-
ipem anserinum, gallinacium, aut uitulinum, a putredine tueri uelit, ita
faciendum est. Quamuis Adipem diligenter elotam, & siccatam in um-
bra, super cribrum per lintea munda manibus uehementer exprimat, li-
noq; confutâ umbroso in loco suspendat. Et post multos dies noua char-
ta inuolutam, frigido loco recondat. Pinguia autē, indito melle, uindican-
tur a putredinis uitio. Vis omnium est excalfacere, mollire, odorem ciere.
Taurinus adeps, bubulus, & uitulinus aliquantum adstringunt. Earun-
dem uirtutū compos leoninus. Nam resistere eum aiunt ijs qui insidias mo-
liuntur. Ceruino, elephantinoq; perunctos, serpentes fugiunt. Adstrin-
gentior est caprinus. Qua ex causa decoctus cum polenta, rhoe & caseo,
dysentericis datur, & cum pisanæ succo infunditur. Ius decocti phthificis
in sorbitionibus prodest. Datur quoq; utiliter his qui cantharidum uene-
na hauserunt. Hircinus, ut qui ualidissime discutiat, podagricis auxiliatur
cum fimo capræ & croco impositus. Huic proportionē respondet ouil-
lus. Suillus uero contra uulua & sedis uitia idoneus est. Ambustis igni
medetur. E sue uetustissimus quisq; sale conditus excalfacit, & emollit.
Elotus uino pleuriticis prodest. Cinere, aut calce exceptus, inflammatio-
nibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt, cicatrices cor- **B**
pori concolores reddere. Anserinus, gallinaceusq; conueniunt muliebri-
bus malis, & ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra
aurium dolores. Vrsinum constat raptos uitio alopecie capillos restituere.
Pernionibus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Fluuiatiliū
piscium pingua perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole lique-
scant, & melli ammiscantur. Viperæ adeps contra oculorum hebetudi-
nes, suffusionesq; efficax est, addita cedria, melle attico, & pari oleo uete-
re. Pilos alis euulsos, perunctis radicibus obliterat.

BARBARI COROLL.

Adipem, atq; Seuum, item pingue, medici fere confundunt, cum ueteres, tum noui. Sed differunt: quia ruminantia Seuum habent, Adipem cætera. Vel ut Aristoteles tradit, cornigera, non utrinq; dentata, & quorum in pedibus tali sunt. Pinguescunt Seuo bifulca, scissisq; in digitos in pedibus adipe. Adeps atq; Seuum semper in fine carnis sunt, pingue uero inter carnem, cum temp; succo liquidum. Adeps atq; Seuum concretæ sunt, ac gelascunt, fragiliaq; si refrixerint, pingue non gelatur. Atq; hoc Plinius intellexisse mihi uidetur cum dixit, Adeps concretus est, & cum refrigit fragilis appellatione Adipis, etiam Seuum complexus. Lupino Adipi apud ueteres palma fuit: adeo, ut nouæ nuptæ intrantes, solene haberent postes eo inungere: ne quid mali medicamentum inferretur. Seuum Græci Stear uocant. Nam Staes massa est farina, quæ & Conspersionem, & Balthum, atq; Tracta dicimus, Adipem uero & pingue Pimelæ appellat. Item Pion, atq; Lipos: a quo genus carnis Alipaston uocatur, hoc est, sine pingui, quæ Strabo comicus, seruitijs apponit. Dicitur & Grassos Adeps ipse a Græcis, & Grasson, sed ouilis maxime cum sordibus, & sudore illuies. Dicitur & Demos a poetis ipsum pingue, ut nihil præterisse uidear. Archigenes sudorem sordesq; corporis, Grassoniâ uocauit. Pollux Grason, & Cinatram. Quædam non pinguescunt, ut lepus, atq; perdix. Steriliora pingua in utroq; sexu, cele-

Plin. 29. c. 9.

Crius senescunt omnibus animalibus. Est quoddam & in oculis pingue. Adeps sine sensu est ois, nec arterias habens, nec uenas. Pingue animalium, plerisque sine sensu. Quia ob causam sues spirantes, a muribus erosae perhibentur. Adipes homini detrahunt, & uiuit, leuatus onere. Habent & arbores suos Adipes, quos Alburna Plinius appellat: quos amputare, & adimere, Exalburnare dicimus. A colore nomen sumptum: cum ligni pars est deterrima, & teredinem breui sentiens. Vnde robur exalburnatum, quod a Theophrasto Melandryon est dictum: quia sit ei color nigricans. A cuius similitudine falsameti genus quoddam Melandryon fortasse uidetur appellatum. Quid autem sit Aruina, Suetonius in eo libro, qui de uitis corporalibus inscribitur, explicuit, durum esse dicens pingue, quod est inter cutem atque uiscus. Non solum autem pinguitudo, sed etiam pinguedo latine dicitur: quicquid Seruio grammatico uisum fuerit, qui aliqui mihi parum uidetur Plinium multis partibus legisse.

Pli. li. ii. ca. 37.

Pli. li. 28. ca. 9.
Aristo. de natura animalium lib. 3. cap. 17.

ADEPS SVILLVS, ET AGNINVS.

Adeps Suillum Vnguen, ut inquit Palladius, & Axungia latine dicitur: & Graeci quoque usurpant. Sed Oxyngon fere appellant, tracta origine ab axibus curruum perungendis. Quamquam est, ubi Plinius aceti fecem, Oxyngon interpretatus esse uideatur. Et nos fortasse quibusdam locis, auctoritatem summi uiri nostro iudicio praetulimus. Alioquin Paulus Aegineta Oxyngon pro Axungia clarissime uidetur intellexisse, in emplastro cui Phoenicite nomen est. Laudatissima ex apris: Tanta porro uis, ut genibus etiam adalligata, redeat ad os sapor, eamque expuere uideantur. Neque occulta ratio, quoniam hoc animal radicibus herbarum uescatur, ideoque innumeri e fimo quoque usus. Axungiae nomen ad alia quoque pinguia transferri: sed raro comperi. Laridum uero salita est animalis eius caro, quasi large aridum, ut Macrobio placet. Sunt qui Suillum pingue, Laridum uocatum putent.

ADEPS BVBVLVS.

Gellius lib. ii. cap. 1.

* D

Bouem Graeci Boa, & Bun uocant, itemque Taurum, & quandoque Italon, unde dicta sit Italia. Nam steriles uaccas nostri Taurus uocabant: sicut praegnantem Hordas, atque Sordas. Vnde Hordicalia Romae festa, quo die Hordae boues imolabantur. Ephesij pincernas ipsos appellare Tauros solebant. Nam Portis, & Portax pro iuuenta dicitur a Graecis. Item Damale, siue Damalis, ut Dores solent *δαμαλιν*, quam nos Lunicem uocamus. Damales uero ipsum iuuentum significat: quem in Alexandri Caesaris uita Lampridius Damalionem uocauit. uterque sexus in Moscho continetur. Photion Damalin uocari omne animal existimat in iuuenta.

ADIPES ODORATI, E VITVLO, TAVRO,

CERVO, ITEM MEDVLLA CERVI.

Sapientiae .4.

Vitulum Graeci Moschon, unde Moscheuma in Agriculturae usu dictum existimant. Qui Vitulamen in literis sacris interpretati sunt: cum latine dici posset, Viuiradix. Moschos & pediculum significat, quo frondes & fructus ramis annexi pendere: qui & Peciolus, & a Palladio Tenax uocatur. Viuiradix & Auulsio parum distant, sicut Moscheuma, & Paraspades apud Graecos. Dicitur & Moschos, siue quod idem est Oschos Pampinus, & Capreolus, & Clauicula, quae Graeci Helicas, & Ligna, & Clemata, & Amphidas quoque appellant, ut Galenus inquit.

Plin. 10. ca. 22.

ADIPES GALLINAE, ANSERVM ET ANSERVM.

Anseres, & Ocae siue Aucae, a Graecis Chenes appellantur. Vnde Chenoboscion, locus ubi alunt. Nam chenizin uerbum, ad muscos pertinet, quasi tibiarum sonum praesentans. Herba in Varone pabulo Anserum feri solitam, non herin, ut habent exemplaria, sed Serin scribendum monemus, auctore Columella. Ferunt eam, cum est aqua tacta, etiam cum est arida, quasi renouellari, uiridemque fieri. Laudant Anseres sitienti, hoc est, altilis ueteribus, & ex his iocinora.

ADIPVM MEDICINAE.

Caprinum Adipem astrictiorem esse quam Suillum, Galenus falso creditum a Dioscoride commouit: nisi quis astrictiorem, pro eo quod est acriorem, accipiendum putet: quandoquidem homo inquit, alias peritus, sed barbarus, proprietatem graecae linguae minus tenuerit.

περί μυελών

De Medullarum ratione. CAP. LXXVIII.

Laudatissima est ceruina. Mox uitulina. Post hanc taurina. Deinde caprina, & ouilla. Colliguntur aestatis exitu, cum appetit autumnus. Quippe cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur. Nec facile cognosci potest, nisi quis eam

ossibus extrahat, & recondat. Omnes Medullæ molliunt, sedant, rarefaciunt. Vlcera explent. Ceruina perunctos uenenata fugiunt. Curantur recentes aquæ resparfu mollitæ, selectisq; ossibus elotæ, donec aqua syncera emanet, & deterfa sorde pinna, si qua innatet, liquatæ per duplicatū lintheum in pilam exprimuntur. Et ubi coiere, omni facie quæ ad ima sedit de rasa, fictili nouo reponuntur. Quod si libet incuratas reponere, facito omnia quæ de anserum & gallinarum adipe demonstrauiamus.

MEDULLAM, quam Græci Myelon uocant, uituli, Galenus post ceruinam præfert omnibus: eamq; priuatim a medicis appellari Moschion scripsit. Medulla proprie, inquit, Galenus est, quæ ossibus includitur. Improprie uero etiam e spina dorsi. Notæos, hoc est, dorsago, ut ita dicam, nominata, quæ sit reliqua medulla durior ac siccior. Nam ea quæ spondylis, hoc est, articulis uertebriq; continetur, spondylionis habet nomen, ut inquit Pollux.

Pli. li. 28. ca. 9.
Gale. lib. 3. de
aliment. & ad
Paternianū. 22

ADIECERUNT posteriores Medullarum disciplinæ ex animalium partibus discrimina aliqua. Tradideruntq; pinguiore, & ad molliendum maiore ui & potestate Medullas esse, quæ ex animalium anteriorū, posteriorumq; crurū ossibus erutæ fuissent: squalidiores uero & duriores, quæ ex spina, & dorso: præcipuamq; habere uim contra corporis duricies, quæ græci sciromata uocant, de quibus alibi certius & expresso dicei. Nunc qd nouisse legētes inutile penitus nō erit, monebimus, qd Barbarus dupodiariū uas appellauit, maluisse nos in re non satis certa, græcorum uoce uti. Credidit em̄ ille ut uidet *Μινωμω* a græcis ideo dictū id uas fuisse, qd duplicē caperet mensurā aliquā, & ex nominis ratione rem auguratus est: cum tū nullam habeat Medullarum curatio mensuræ in uasculo necessitatem. Et Paulus Aegineta libro primo, quo capite de ouis & eorum diuersis cocturis agit, nihil aliud *Μινωμω* esse ostendit, q̄ fictile, aut æneum uas, in quo ad ignem densarentur oua, quæ ille *πικτὰ*, quod est, præfocata appellat: facilis intellectus res, ignota tamen nostra ætate uasis forma, & nominis ratio.

B

De Felle. CAP. LXXXVIII.

FEL OMNE curatur hoc modo. Recēs præligato ore folliculi lino, demissum in feruentem aquam, spacio quo quis stadia tria percurset: mox exemptum siccatur umbroso loco, asperginem non redolente. Sed quod ad oculorum medicamentā adijci solet, ligatum lino in uitreum uas, quod mel habeat, immittitur, circūuoluto ad os uasis lini principio, & operto uasē reconditur. Est enim uis omnium acris, & excalfaciens. Intensis tamen, & remissis uiribus differunt. Siquidem præstantius in effectū esse uidetur fel marini scorpionis, & piscis qui Callionius appellatur, marinæ testudinis, hyenæq;. Item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & syluestris capræ. Quod priuatim prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, albuginesq; & genarū scabricias. Ouillo, suillo, hircino, atq; ursino, taurinum multo efficacius. Felle omni perfacilem, præsertim infantibus, deiectionem quis molietur, si intinctum eo tomentum sedi subiiciat. Priuatim taurino angina cum melle perungunt. Sedis ulcera sanat, & ad cicatricem usq; perducit. Idem auribus fractis, & purulentis, cum muliebri lacte, aut caprino instillatum, medetur. Et sibilo earundem ex porri succo. Admisceri insueuit uulnerarijs emplastris, & circumlitionibus quæ contra uenenata parantur. Phagedænicis ulceribus, co

Clis, & scroti doloribus ex melle prodest. Lepras, furfures cū nitro, & terra cimolia q̄optime purgat. Ouillum et ursinum contra eadem pollut. Verum inefficacius hæc præstant. Ursinum eclegmate comitiales adiuuat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis prodest. Naribus inditum comitiales erigit. Syluestrium caprarum Felle peculiariter peruncti, lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus. Thymia abolet. Et luxuriantes elephantorum extuberationes illitu reprimunt. Suillum autē contra aurium ulcera, reliquaq; omnia, magno usu assumitur.

Pli. li. ii. ca. 37.

B A R B A R I C O R O L L.

Fel, siue Bilis, Chole a Græcis dicitur. Minorum animalium subtilius. Equinum tantum damnatur, inter uenena. Ideo flamine sacrorum, equum tangere non licebat Romæ: cū tamen publicis quoq; sacris imolaretur equus. Taurino Felle aureus color ducitur, aramentis atque pellibus, qualia Græci cholobaphina cognominant. Bilis duplex, Atra, & Flaua: Sed cū simpliciter pronunciat, Flaua inquit Galenus, intelligitur. Flauæ duō fere genera, Luteæ, quam Græci Ochran uocant; & Rufæ, siue fuluæ, quam Xanthen dicunt, uehementiorem & calidiorem priore. Sūt & alia cholorum discrimina. Virentis, quam Ioden; ceruleæ, quam Cyaneam; & subnigræ, quam Phæon, Isatidis modo fuscæ. Callionymum piscem, cuius mentionem habet hoc loco Dioscorides. Sunt qui Callichthyn, & Anthiam quoq; appellent. Itē Hellopa, hoc est, Accipenserem, & Castum, Sacrumq; piscem. Aliqui etiam Lycon. Sed differre in eos inter se, cum ex Aristotele, tum ex alijs autoribus, aperte constat. Sacer certe piscis est proprie, quem Pompilon uocamus. Dixi Hellopa eundem qui Accipenser dicatur. Ceterum Archeostratus, eum qui uocetur inquit a Romanis Accipenser, Galeon a Græcis appellari existimauit, perspicuo errore, ut aliubi monstrabitur. Fit & de Perdice sermo hac parte. In quo sciendum, Perdices, & Cacabidas, & Cacabos etiam uocari, a sono quem edunt canentes. Theophrastus autor est, non omnes eum sonum reddere, sed Ditybizin aliquas. Perdicum porro multa genera: sed præstantissimum, cui rostrum purpureum. Nam Italica, inquit Athenæus, præparuæ sunt, nec rostrum rubens habent. Idem autor Phasianum, siue Phasianicum, aliquando Tatyryn, aliquando Tetarton, & Tettaron uocatū scribit. His adiecit Atragas, non atragenas dicendo, etiam si Varro, & Gellius ita nominent. Atragenus certe piscis e numero est.

De Sanguine. C A P. LXXXIX.

Sanguis anseris, agni, & hædi, utilissime in antidota miscetur. Palum ubi autē, turturis & columbæ, necnon perdicis, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum uulneribus, lusciosisq; illinuntur. Peculiariter colubæ sanguis, cruorem membranæ cerebri erumpentem inhibet. Hirci, capræ, cerui & leporis sanguis patinis inassatus, dysenterias, & celiacorum profluuiâ sistit. In uino potus cōtra toxica efficiat est. Leporinus sanguis, ita ut tepet illitus, uitia cutis in facie, lentiginēsque emaculat. Caninus comode ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit. Contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestris sanguinem epotū tradunt prodesse comitalibus. Marinæ autem testudinis cum uino & leporis coagulo, cuminoq; contra serpentium morsus, & hausta rubetæ uenena, conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duricias discutit, emollitq;. Sanguis equarum quæ admissuram expertæ sunt, in medicamenta additur quæ erodunt. Septica uocant. Sanguine chamæleonis genarum palpebras euelli creditum est. Hoc idem uiridium ranarum sanguine præstatur, Menstruus sanguis foeminarum, circumlitu conceptio-

nem inhibere existimatur, aut si omnino mulier mēstrua supergrediatur. **A**
Leuat podagras muliebres, & ignem sacrum, illitus.

BARBARICOROLL.

Sanguis Græce uocatur Hæma. Distat a Sanguiculo, q̄ is proprie sanguis ædi est in cibū, igni coctus, Nigritum lus, ut Iulius Pollux arbitratur, uocatus. Hoc a Græcis Hypotrimma, & Aemalea, & Aemation, & specialius Hyposphagma dici putant: sed ex omni tamē quadrupede, adiecto melle, aut sapa, sale, aceto, lacte, caseo, cumino, laserpitio. Inuentum Lacedæmonie putant. Vulgo id nos lus Dulce nominamus. De alio Sanguiculi significatu diximus in Galeno. Non dissimile uidetur, quod Græci Creocaccabon appellant, hoc est, carnem minutatim concisam cum sanguine, & adipe, iussulentōq̄, ac dulciario liquore. Nam quod Myma uocat, mihi quædā uidetur miscella Creocaccabi, & Hyposphagmatis fuisse: nisi q̄ paulo plura sunt, quæ in Myma requiruntur a quibusdā, autore Athenæo. Iuris & illa sunt genera, quorum in Pseudulo festiuis poeta meminit, Cicilendrum, Hypolindrum, Cicimandrum, Paroplis, Capris, Mēcis, siue Magis, ut conjicio. Equæ uirginis sanguini uim inesse negant, quæ maribus foeminisq̄, non uirginibus, Taurinum ubiq̄ inter uenena collocant. Excepta Egyra, ubi descēsurā in specum sacerdos uaticinij causa, tauri sanguinem præsumit. Caprinum bibentibus, pallor accidit. Hircorum sanguine ferramēta acuntur, indurata subtilitate, & scabritia expolita, uehementius etiamnum, q̄ scobina fabri. Adamantis natura inuictissima, & duarum rerum uiolentissimarum, contemptrix ignis, & ferri, non alia rumpitur ui, q̄ hircino sanguine macerata recenti, & calido. Etiam si hoc gemmarij nostri falsum & ridiculum existimant. Anatem, de qua mentio hic habetur, Græci Nessas, & Necta uocant. Quanc̄ Necta magis est, ut septa anataria significent, q̄ anates ipsas. Anatem ueteres, & anilem morbum uocabant, Similes Anatibus sunt, sed maiores, quas Glaucia Græci uocant, ab oculorum colore. Sunt & Boscades, et quas ab urinandi uoluptate Colymbos, & Colymbidas nominant. Inter omnes eas minimæ, atræ ac sordidi coloris, acuto rostro. Soli earum spectantur oculi, cætero merguntur. Habentur & Chenalopeces appellatæ, sed anseri contribuntur. Inuenitur & Boscadis unum genus, maius Anate, sed minus Chenalopece. Huc & Phascades pertinent, paulo grandiores quam Colymbi, cætero similes Anatibus. Est & Vria dicta, non multo minor Anate, rostro longiore, ac tenui, colore sordido figlinæ. Angustum & Phalaris uocata, rostrum obtinet, caput rotundius, uentrē subcinereo colore, tergus nigricatus. Nominantur hic & Columbæ. Græci eas modo Peristeras, & masculino genere Peristeros, ut Artici, & neutro Peristeria, modo Pelias, et Peliadas uocant, ut Dorici. Quanc̄ Aristoteles distinctum genus facit, qui & alia dinumerat. Quo fit, ut in pocillo Nestoris, pleriq̄ non Columbas, sed Pleiadas cœlestis fidus intelligendas arbitrentur in Homero. Columbæ porro Siculæ præferuntur omnibus. Laudantur & Cypriæ, luteo colore. In India Columbas esse græci affirmant. Cæterum Columbarum quas diximus Peristeras a Græcis esse dictas, duo genera constituunt, ut Galenus est autor, Carocceidion, hoc est, domesticum, & Nomadicum, hoc est, pascuum & syluestre.

E. X. M. V. E. R. G. C. O. M. M.

Quod ad medicinā pertineat, de Sanguine satis nouisse illud sit, nullū frigere Sanguinē. Omnibus enim ingentis & necessarius calor est. Differunt solum, q̄ alter altero minus, magisue calet. Fuitq̄ hic quondā in Sanguinibus uirium & naturæ census, ut suillus humidior, minusq̄ calidus cæteris sit, temperamento suo hominum Sanguini maxime similis. Columbarum uero, palumbis & turturis æquali inter se temperamento, oculorum medicinæ calidus inseruiat: instillatusq̄ crassiori cerebri tuniculæ, in his quorum calua perforata esset, in inflammationes arceat. Noctūq̄ cum uino, aut aqua, contra spiritus angustias utiliter bibatur. Vespertilionum, ranarum, chamæleonis, ricinorumq̄, qui in canibus hærentes inueniuntur, mammarum incrementa in uirginibus compescat, & quæ eo inungantur alia depilet. Negauit tamen, facto periculo, Galenus uera hæc esse. Inuenimus etiam, caprinum ob siccitatem suam, contra cutem subeuntes aquas cum melle utiliter bibi, & renum calculos frangere. Agninum comitialibus prodesse. Hædinum nuper coagulatum, cum aceto bibi contra cruentas pectoris excreationes. Vrsorum, situestrium caprarum, hircorum, & taurorum abscessus maturare. Et terrestris crocodili oculorum claritatē facere. Quæ omnia a Galeno, Plinio, Pauloq̄ Aegineta, & ab alijs longius dicta sunt. Poteruntque uolentes plura his etiam in antiquis medicinæ autoribus inuenire, consulto a nobis relicta: satis fore credentibus, si communiora aliqua dicta fuerint.

Pli. ii. 28. ca. 14
& alias sæpe.

B

C **A** Rmentarij bouis Fimum si recens admoveatur, uulnerum inflammationes mitigat. Folij autem inuoluitur, & calfactū cinere feruenti supperponitur. Coxendicis cruciatus tali imposito compescit. Illitum ex aceto duricias, panos, & strumas discutit. Priuatim suffitu Fimi, quod a masculo boue redditum est, procidentes uulua reprimuntur. Accensi nidore culices abiguntur. Fimum caprarum, praesertim quae in montibus errant, potum in uino, regium morbum emendat. Menses cit cum odoramentis haustum. Et partus euocat. Tritum in farinam, & impositum lanis cum thure, foeminarum profluuia sistit. Caeterosque sanguinis impetus ex aceto cohibet. Medetur alopecij exustum, & cum aceto mulso illitum. Cum axungia uero impositum, his qui podagra tentantur auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpentium moribus, ulceribus quae serpunt, igni sacro, et parotidibus. Vtilem ischiadici uestionem hunc in modum accipiunt. In interstitio pollicis, qua parte brachio committitur, caua ueluti lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta substernitur; deinde sigillatim feruentes, stercoris caprini pilulae imponuntur, dum uapor per brachium ad coxam sentiatur peruenire, & coxendicis dolore mitigare. Adustio id genus Arabica appellatur. Fimum pecudum ex aceto illitum, sanat epinyctidas, clauos, peniles uerrucas, thymos, & ambusta, igni rosaceo carato exceptum. Fimum suis syluestris aridum, in aqua aut uino potum, reiectiones sanguinis sistit. Vetusum lateris dolorem mulcet. Adrupta & conuulsa ex aceto bibitur. Luxatis cum carato rosaceo medetur. Tam asinorum quam equorum Fimum, siue crudum, siue crematum, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. Armentarij qui herba pascitur siccum Fimum liquatum in uino, mox potum, contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbium uehementius excalefacit, & urit cum hordeacea farina mixtum. Strumas ex aceto discutit. Carbunculos emarginat, tritum cum lini semine & oleo. Ambustis igni medetur. Gallinaceum uero omnia eadem, sed inefficacius praestat. Priuatim tamen contra uenena fungorum, & coli cruciatus ex aceto, aut uino bibitur. Ciconiae Fimum si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesset credunt. Vulturini Fimi nidore partus excutiuntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, alopecij medetur. Cum thure & mulso, calculos expellit. Subditae infantibus muscerdae, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum uino, aut aqua potum, sistit aluum. Humanum sterces illitum, uulnera inflammationem minantia intumescere non patitur, Sed ea statim glutinat. Sicco ex melle anginae perungi commodissime traduntur. Terrestris crocodili Fimum Crocodileam uocant, quae mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremque seruat. Optima est tenuissima

et friabilis, amyli modo minime ponderosa, in humore statim eliquesces, **A** quæ cum teritur, fermenti acorem quadamtenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo, quos captos oryza pascunt: ipsumque non dissimile ueniunt. Alij Amylum, aut Cimoliam miscent, & adscito colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in uermiculorum speciem. Qui siccati pro Crocodilea uæneunt. Inter omnes conuenire inuenio humanum stercus, caninumque gutturi impositum, anginis auxiliari.

BARBARI COROLL.

Fimum Græci multis nominibus, Apopatema, & Apoparon, & Bolbitō, & Hippomacroboliton, & Scatos, & Apōsceuen, & Aphodon, & Eumarean ionice appellant, & Scor: quæque hominis hoc proprii: ut asini, Onida, & Onthon: equi, Copron: pecudis, Oespoten, uel Oipoten Aristophani, & Sinypen: Iones suis Hypeleuton: murum Myocopron, & Miscelerda, nos Muscerdam: ut suillum Sucerdam. Liquidius quod est, nostri Soria cognominant. Vnde Sorioli, quibus solutiuscula est aluus. Et cōsorire uerbum, pro eo quod est inquinare fimo: quod Plautus concacare dixit. Et Sorica locus in publico, ut latrina in priuato. Fimos porro etiam luforias tabellas, hoc est, alueolos dixit Horatius. Asinini certe pulli Fimunt, quod primū edit, Polion uocari tradit Aristoteles. Plinius Polean priuatim & caprinum, Spyrrathos, & Spyrradas, & Spyrdana, quas Palladius Caprinas baccas uocauit.

Pli. li. 17. ca. 98.

CROCODILEA.

Crocodileam Cerasæ modo elui præcipiunt. Est & Crocodilea, siue Crocodilina, & Crocodilitis uocata questio Sophistarum ludica, ut Prion & Ceratina, sed alienæ omnes ab hoc opere. Crocodileam Plinius etiam intestina ipsa terrestres Crocodili appellat: ob id diligenter exquilita, quoniam iocundissimo nidore fragrant. Viuit enim odoratissimis animal id floribus, simile Crocodilo ei cui uita in terra, aquaque communis, sed multum infra magnitudinem eius, & in terra tantum.

De Vrina. CAP. XCI.

Humanam Vrinam suam cuique bibere, contra uiperæ morsus ac **B** uenena, incipientemque aquam intercutē proderit. Marini scorpiōnis, uiperæ, draconisque morsus ea conuenientissime fouentur. Canina, ad perfundendos canis morsus idonea est. Pruritus, & lepras nitro addito expurgat. Sed uetus ulcera capitis manantia, furfures, psoras, & feruidas eruptiones, multo magis abstergit. Nomas, & præcipue genitalium cohibet. Auribus infusa manans pus suppressit. Decoctaque in calice mali pūnici, earum uermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur. Decocta in æreo uase cum melle, emendat cicatrices, argema, caliginesque. Ex ea & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt. Lutum quod in Vrina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat. Feruefactum cum cyprino, inditumque, uulua dolores mulcet. Strangulatus leuat. Genas deterget. Oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina uiribus eisdem prædita est. Priuatim comminuit uesicæ calculos, & potu expellit. Ad aquam quæ cutem subiit, cum nardi spica cotidie binis cyathis cum aqua bibitur, urinamque per aluum extrahit. Aurium doloribus instillata medetur. Asinina, traditur renum uicijs mederi. Lyncis urinam, quam Lyncurium appellat, simulac excernitur, glaciari, coireue in calculi duriciam, uulgo creditum

s iij

D I O S C O R I D I S

C est. Quare quod de ea proditum est, uanum esse conuincitur. Est enim quod a nonnullis uocatur succinum pterygophorō. Id potum ex aqua, stomacho, aluoq; fluctione laboranti conuenit. Asininæ urinæ potum renum uitia sanari traduntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Vrina, siue Lotion, Græce Vron uocatur. Vrina struthionis atramenti lituras abluit. Fuliones pedum uitij carere affirmant Vrinæ beneficio. Magi præcipiunt, ne quis contra solem, lunam ue nudetur Vrinæ caussat neue umbram alicuius respersat. Hesiodus contra obstantia reddendam, ne Deorum aliquem nudatio ea offendat. Non desunt qui Amuletum esse dicat, suam cuiq; matutinis omnibus instillatam in pedem.

L Y N C V R I V M.

Pli. li. 9. ca. 39.

DE Lyncurio non constat autoribus, an sit, aut unde sit. Qui electrum id esse negant, gemmam tamen fatentur, ex urina Lyncis omnino, sed quam animal id statim redditam, aggesta pedibus terra obruat inuidia, ceu gnarum peti eam ab homine: celerius ita concrefcere in gemmas similes carbunculis, igneo colore fulgentes, atq; frigidās, quæ & scalpani. Quanc; distingunt e maribus, præcipueq; feris & fuluas & igneas, e fecminis, præsertim cicuribus, candidas atq; languidas existere, nec frondes & acus modo rapere, sed æris quoq; ferriq; bracteolas, ut Diocles & Theophrastus referunt. Alij dixere Langurium, & esse in Italia circa Padum Langurias, quæ ab aliquibus Langæ nominentur. Falsa hæc omnia Plinius existimat, nec uisam æuo suo gemmam appellatione tali scribit. De Lyncurio lapide non hoc, sed alio inter fungos, mirum quidem, sed uerum dicturi sumus. Succinum Dioscorides hoc loco Pterygophoron cognominat, q; stramenta, floccos atq; simbras in se trahat: aliubi Chrysophoron, ut Plinius Chryselectron. Lynces clarissime omnium quadrupedum cernunt.

E X M. V E R G. C O M M.

DHabet Vrina in animalibus, quæ per renes, & quos urinæ meatus dicunt, ex sanguine in uellicam non aliter q; per colum fluit, quod cōmune omnibus sit, calorem. s. & acrimoniam. Priuatim omnium aliorum animalium, exceptis eunuchis, humana infirmior est. In nutriendo non paruas habet Vrina uires: ideoq; in fame pota Vrina seruati aliqui sunt. Sanat præter ea quæ a Diosc. dicta sunt, pedum attritus, sed nondum inflammarios, ex calceis factos. Caprarum & Chamælorum urina aluum deijcit: ideoq; contra cutem subeuntes aquas, utiliter bibitur. Ex homine omnium efficacissima impubis pueri est. Auguria ualitudinis ex ea a medicis præcipue accipiuntur. Suntq; tam multi eius colores, tã diuersi habitus & odores, ut nihil æque in medicina difficilius & utilius nouisse sit. Nisi forte aliquis Romani Cæsaris exemplo, ad rigandas, stercoreandasq; simul arbores ex ea uestigal in gente sua excogitauerit. Ea pruritui foueri utilissimum Dioscorid. ait: *υνημωδ* græci id malum uocant, in senibus non adeo curabile. In reliquis ætatibus haud difficilis curationis, si deprehensa mali causa fuerit: quæ plerumq; est corruptus, & (ut aptius loquamur) putris, pituitosus, aut biliosus humor. Contra quem Vrinæ acrimonia & calore inter cætera pugnandum est. Exigebat post omnia hic locus, ut de Lyncurio, siue gemmâ, siue succinum id sit, aliquid diceremus. Sed tanta est ueterum in historia eius uarietas, ut nihil censere de eo audeamus. Sunt enim qui negent Lyncurion esse. Sunt qui esse quidem dicant, sed unde, aut quid sit, affirmare non audent. Plinius diuersis locis multa, sed quæ omnia de gemma intelligantur. Quæ possunt uolentes facillime ab eo audire.

¶ De Melle.

C A P. XCII.

μέλι υμήτιον
σιμέλιον

Pincipem locum obtinet Mel, quod Atticæ regionis est, præcipue ex Hymeto, mox Cycladibus insulis, & e Sicilia, cognomine Simblion. Maxime probatur dulcius, & acre, odoratum, sufflauum, nec humectū graue, & minime fluxū, qd ob sequacē lenticia nō facile abrumpit, tractūq; resilit in digitos. Mel abstergendi uim habet. Ora uenarū aperit. Humores euocat. Qua ratione in sordida ulcera, sinusq; cōmodissime infunditur. Decoctū, atq; impositū, abscedentem carnem glutinat.

A Medetur impetigini coctum cum liquido alumine, & illitum. Item aurium sonitui & dolori, cum fossili sale tepido instillatum. Lendes, & scæda capitis animalia illitum necat. Nudam glandem recutitis operit, præsertim quæ circumcissione aperta non est, si melle coles a balineo triginta diebus emolliatur. Oculorum caliginem discutit. Faucibus, tonsillis, anginae illitum gargarisatumue medetur. Vrinam ciet. Auxiliatur tussi, & a serpente percussis. Contra haustum meconium, cum rosaceo calidum assumitur. Aduersus uenena fungorū, & rabiosi canis morsus linctum, aut potum proficit. Crudum tamen aluum inflat. Tussim laceffit. Et ea de re despumati usus aptior est. Primatum tenet in Mellis genere uerum, deinde æstium. Hybernium uero, utpote quod crassius constet, deterrimum reputatur. Siccas eruptiones excitat. Quod in Sardonia gignitur Mel, amarum est. Quoniam apes inibi absinthio uescantur, quod uitia cutis in facie & maculæ aptissime perunguntur. Heraclia in Ponto quibusdam anni temporibus, propria quorūdam florum dote Mel conflatur, quod qui edere, mente abalienantur, ac sudore diffluunt. Remedio sunt esitata ruta, & salsamenta, aut epotum mulsū, resumpta quoties uomitione reijciuntur. Acre autem est. Et olfactu sternutamenta mouet. Quod cum costo illitum, foeminarum cutem emendat, & cum sale sugillationes rapit. Est & aliud concreti Mellis genus, quod Saccharon nominatur. In India uero & felici Arabia in arundinibus inuenitur. Salis modo coactū est, dentibus ut sal fragile. Aluo idoneum, & stomacho utile. Si aqua dilutū bibatur, uexatæ uesicæ, renibusq; auxiliatur. Illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt.

BARBARI CÖROLL.

MEL a Græcis Meli. Natum in Carina Cretæ monte Mel, mulsæ non attingunt, propterea medicamentis eligitur. Varro Siculum præfert omnibus: quod ibi Thymum bonum frequensq; sit, quo ad mellificium nihil est præstantius. Strabo e Cycladibus, & inter Cycladas Calymnum antepōit omnibus. Natura Mellis ea est, ut uitia coërceat, ne serpere ultra patiat. Quam ob causam, uel exanimū corpus hominis, per annos plurimos innoxium conseruat. Est & suus in Melle, ac mulso flosculus, si recta est apud Columellam, in oliuæ conditura lectio. Sunt enim qui uasculum Mellis, non flosculum ibi legant. Sed certe in omni purissima & tenuissima quæq; pars, floris appellatione demonstratur. Est & in pomo flosculus, qui & Umbilicus dicitur. Nam & in fico pomo fundus, græce Omphalos dicitur, hoc est, extremitas altera, quæ quæ petiolo annectitur. De cœlesti Melle dictum est superius in Elæomele. Hircanum Mel, ex ipsis quoq; fuit arboribus, sine curâ mortalium, examinibus inibi se eogentibus atq; mellificantibus, ut inquit Strabo. E petris quoq; ut Diodorus. Sed minores apibus sunt, Arthredones appellatæ. Meminit bestiolæ huius & Aristoteles, inter crabrones uidentis. Etiam si corrupte legitur in ipso, Tenthredon. pro Anthredo. nam crabrones Anthrenæ a Græcis dicuntur. Hoc ipsum fere in Media, & Armenia quibusdam locis uisitur. Diodorus, & Quintus Curtius, arbores in Hircania, quarū folia multo Melle tingantur, faciem quæcus habere tradunt; ac nisi solis ortum incolæ præuorterint, fore, ut uel modico tempore is succus extinguatur. Mellis inuentione, Plinius & Diodorus Aristeo Atheniensi, uel Arcadiæ regi, ut Trogus, sicut medicinæ ex eo, Gelius Oceani filio Soli assignat. Trogus colligendi Mellis usum monstraſſe Gargorin scribit, uetustissimū Regem in Hispania Curetum, qui saltus Tharte florum incoluere; in quibus Titanes bellum cum Dijs gessisse perhibentur.

Pl. li. ii. ca. 14.
Aristot. lib. 7.
cap. 22. de animalibus.

D I O S C O R I D I S

M E L S A R D O V M.

C Vm Mel in Sardinia progenitū uirus habeat, mirum est, cur nullum tamen animal homini pestiferū, in insula ea nasci perhibeatur, extra q̄ Solpugam, ut Solinus meminit: de qua in castigatione Pliniana dictum est abunde. Non solū uero Mel Sardoum, sed & Chokichum infame traditur amaritudine. Sunt & alia Mellis fastidia, quæ mox subiunget dissertatio.

M E L P O N T I C V M.

M El Heracleoticū, siue Ponticū, ex herba fieri candida cōmemorat, quæ Ægolethros uocet: quia uexatio iumentorū sit, præcipue caprarū. Non sentitur aut̄ omnibus annis hoc malū, nec nisi cum flos ille marcescit aquoso uere. Signa uenenatū sunt, nunq̄ densari, color magis rutilus, & q̄d ponderosius est, q̄ probū: qui gustauere abijciūt se humi, refrigerationē quærentes. Exitū hoc per excrementa, ad canes quoq̄ peruenit, similiterq̄ torquet eos. Mulsū tamen ex hoc Melle inueteratū, desinit esse pnciosum. Aliud genus Mellis in eodē Ponti situ, Manicon, siue Menomenon appellant, ab insania, quā facit, existimatū, rhododendri flore contrahi, quo scatent syluæ. Optima tamen ex hoc uno cera fit. In Perside aut̄, & in Mauritania Cæsariensi, Getuliasq̄ Massylis contermina, uenenatū Pauigignunt: quidāq̄ non toti, sed parte, quo nihil fallacius, nec nisi liuore deprehendunt. In Themiscyra Ponti regiōe, mons est Scydissus, cuius incolunt Byzeres & Heptacomitæ dicti iuga, hi tris cohortes Pompeij, ea cōmēantes interfecerunt, dispositus qua trāseundū erat Mellis infani uasis, quod ibi ex arborū quarundā, ut inquit Strabo ramis, fundit. Corruentē enim potu eo militē aggressi, facile confecerunt.

S A C C H A R V M.

Pli. li. 12. ca. 8.

S accharum laudatius ferebat India: nunc popularis ortus eius est in Aegypto, Cypro, Rhodo, Creta, Italia quoq̄ nascitur. Nullū epulum magnificū iam, ne quotidianus quidem uicinus placet, sine Saccharo. Digerit in pastillos, effingit in placentas, a maza & pane, ut putō Mazapanes uocatas. Qz q̄ & Marcipanes ab auctore dictos coniectari licet: quandoquidē & Marcia tum unguentū, & Marci pastillos in medicina legimus, ut est apud Aetiū, & priorem eo Paulū. Omnino cōponitur in oēm figurā Saccharum, non aliter q̄ farina, trahiturq̄ etiā in picturas, opere historiali: uenatus, classes, oppida, & quascunq̄ rerū afferri libeat imagines præsentās: a coronatis ministris, cū tūbicine introferri solitū conuiuijs, & ad principia eorū, & in secundam quoq̄ mēsam. Vnde natū sit prouerbiū: nullum ferculū corrumpi Saccharo. Amplissimū uicis auellanae magnitudine, Plinij tēporibus, & medicinæ dūtaxat usu, nunc tam promiscuū, ut desinat prodesse, multis obfit. Pueris certe lūbricos & tineas contrahit. Varronis uersus sunt.

Prouerbiū.

Indica non magna nimis arbore crescit arundo,
Illius & lentis premitur radicibus humor,
Dulcia cui nequeant succo contendere mella,
Strabo quoq̄ nō ex ipsis tantū arundinibus, sed & radicibus quoq̄ Mel exprimi cōmemorat in India. Nunc ex Alexandria Aegypti, & Cypro cōmendatissimū. Melius quo uetustius, q̄q̄ calidius, ita & capiti fere nocens. Dilutū aqua, refrigerandū uim concipit: præsertim ter coctū. Primo excoquant arundinē, deinde flaua pars secernit: hanc Saccharū existere. Hoc iterum coqui potest, atq̄ ita fit candidius & concretius. Quod si tertio coquat, maxima in eo fit & candoris & densitatis accessio. Quartum & quintū quoq̄ solet excoqui, & donec specie aluminis scissilis fere transluceat: q̄d genus alij Candidū, alij Cantū cognomināt, Saccharū Græci Sacchar uocant. Rarū, nec plane cognitū Galeni quoq̄ seculo: tantū abest, ut instrumentum nitidioris uitæ fuerit. Qz q̄ non magnopere pridem inuētum puto, ut nucleos pineos, amygdalas, auellanas, pistacea, citreum, cinamomū, coriandrum, anisum, feniculū duclili tunicarum facilitate contegat, circumdatum modo coricis crassitudine, modo curis tenuitate uestiens. Dulciora quidē ex nucleis pineis, & amygdalis condebat antiquitas: sed cum melle, ut est apud Paulum. Venale porro Saccharū, in dupondiairos fere panes, metæ effigie diuiditur. Preciū optimi, in libras aurei nummi fere sexcunx. Cyprium non coibat ante: nunc densatur, tanto inuentoris quæstu, ut inde locupletissimus euaserit: neq̄ ratio tamen cōmunicata est, sed archanam habent, ut ad heredes latifundi cuiusdam, aut monopolij uice transeat. Illud monendi sumus, in Pampini sylua quadam illo uersu, Et quas præcoquit Aebusita Cannas, Hypasitam, non Aebusitam legendum: ita enim populū uocantur Indiæ a flumio Hypasi, ut est apud Strabonem, Pliniumq̄. Nec audiendi sunt, qui nullo auctore, nullo teste, in Syria locum eum tradant, inter Libanum & Antilibanum, conualle media. Nam ibi arundo quidem prouenit, sed odorata, non saccharea: ut alibi quoq̄ diximus.

De Cera. CAP. XCIII.

Cera optima est subfulua, odorata, subpinguis, pura, odorisque quadamtenus mellei, natione Pontica, aut Cretica: Secundū locum obtinet candida, & sua præ natura pinguis. Candida fit hoc modo. Ex earadunt album, syncerūq; atq; transfundunt in uas, quod satis habeat marinæ ex alto petita, in parsoq; nitri momento decoquūt. Cumq; iterum, tertio uel inferbuit, separatim uas refrigerant, ac cæræ pastillum eximunt, deterfa sordē, si qua forte adhæsit. Tum denuo indita noua maris aqua feruet, uti retulimus: & uase dempto ex igne, basin ollulæ nouæ aqua frigida madefactam, in cæram summam suspensa manu intingunt, quo celerius concreseat, & q̄ minima portio extrahatur. Suscepto primo cæræ orbiculo, iterum uas in uas aqua refrigeratum, tantisper intincti debet, dum tota excipitur. Orbiculi lino consuti, ita ut intercedat spacium, suspenduntur. Et interdum, continuo sub sole, noctu sub luna aspergunt, usq; dum perfecte albescant. Verū si eximius ille candor desideretur, eadem facituri, & identidem recoqui operæ precium est. Nec desunt qui pro marina, in muria q̄ acerrima, semel aut iterū excoquant. Dein laguncula tenui, rotunda, ansam habente, extrahunt. Postea orbiculos, substrato cespite hærboso insolant, donec candorem summū contraxerit. Præcipiunt hoc obeundū munus uere, cum sol remissa uehemētia humorem pariāt, ut nō facile liqueat. Cera omnis molliet, calfacit, modice explet corpora. Datur in sorbitione dysentericis. Ac milij magnitudine decem grana Cæræ hausta, lac in lactantibus non patiuntur coagulari.

BARBARICOROLLA

Cera græce uocatur Ceros. Fit expressis fauis, sed ante purificatis aqua, & triduo in tenebris siccat, quarto die liquatis igni nouo sistili, aqua fauos regente, tum sporta colatis. Rursus in eadem olla coquitur Cera, cum eadem aqua, excipiturq; alia frigida, uasis melle circumlitis. Optima quæ Punica uocatur. Plurimum habet ex Propoli Cretica: ideoq; locum secundum in nationibus obtinuit. Tertium Corsica: quoniam ex buxo constet, & medicaminis utilissima, uarios in colores pigmentis Cera trahitur: ob id & Tracta dicitur, ut puto etiam a Græcis. Nigrescit, addito chartarum cinere. Anchusa mixta rubet, ad reddendas similitudines, & innu meros uitæ usus, ut taceat interim pugillariū, parietūq; & armorū tutelæ. Superat niuem candore Cera, quæ Pharmacopolæ nostri præparant, nuperrime uri cocepta publicis, priuatisq; sacris solēnibus & prophanis usibus. Officina tantū una concinnabatur hæc patris memoria. Nunc urbe tota uenditur, nec alia crematur Cera dumtaxat apud nos, q̄ candida. Primus omnium Cornelius, e Senatu domū rediens, funali Candido usus dicitur, tanta uerecūdia, ut non prius accendi pateretur, q̄ tota curia & foro decessisset: quia cæteri, aut laterna, aut triviali Cera deducerentur. Exemplum eius deinde sequuti oēs, maiestatiq; hoc illius ordinis amplissimū, non luxuriæ datū. Itaq; Senatus missō, post occasum solis, tam longus est ordo luminū, ut plane diem reddant. In Cera qui nascitur uermiculus, ab Aristotele uocatur Acar.

EX M. VERG. COMM.

Quod habet in medicina utilissimū Cera, excipiendis, retinendisq; alijs medicamentis materia est, qua omnium generum Cerata quotidie fiunt. Maturandi, abstergendiq; uires aliquas nihilominus habere illam, aliqui ex ueteribus tradiderunt: hic calefacere tantū, molli- re, explereq; eam dixit: & omnia mediocriter, quoniam parum efficax uis eius ad omnia fit: præterq; (modo id Cera possit) ad prohibendā in nutritibus lactis in caseum densationē. Quod uitiū ex Dioscoride uerbis descriptū a nobis est, Barbarus id Colostrari dixit.

A

B

Pli. li. 21. ca. 143

πρόπολις

C

De Propoli.

CAP. XCIII.

Propolis eligi debet flaua, odorata, styracem referens, in uehementi ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere calfacit & euocat. Aculeos, et oīa infixā corpori extrahit. In uetere tussi suffita p̄ficiat. Impetigines admota tollit. Et in alueariū foribus, cerosę naturę iuenit.

B A R B A R I C O R O L L.

EPropoli Apes faciunt ad foramē introitus protectum, æstate maxime, ut inq̄t Varro. Alia hæc ab Rhitace uocata, qua fauos extremos simul conglutinant. Interdū extra fores alui ob-
turant omnia, qua uenit inter fauos spiritus. Interpretatur hanc Gaza noster & Careum quan-
doq̄. De hac & in Lili mentione disseremus.

VERG.

Quæ in aluearibus apium uideri etiam nū possunt fundamēta operis, ut diuersos habent in apibus usus, nec eandē ex qua confecta sunt materiā, sic diuersis appellationibus a græcis pariter & latinis discreta sunt. Inter ea post Metyn, & Pissoceron, tertia Propolis est, inter coria & ceras media crassioris materiæ: ueluti gūmi, additis aliquādo etiam floribus: nondū tamen cera, sed fauorū stabilimentū: qua oēs frigoris, aut iniuriæ aditus apes obstruit, magni ad medicamēta usus. Quorū genera hic breuiter complexus, nihil quod de Propoli ab alijs dictū fuit, non duobus uerbis, & maior ū totidem generibus prosecutus est. Eam Plinius ab apibus præcipue fieri dixit, ex gutta quam populi arbores in folijs ferunt.

πυρός

D

De Tritico.

CAP. XCV.

Prima e Tritici generibus ad secundę ualitudinis usus habetur, quæ recentia, & iam perfecte adulta, colorē mali referūt. Dein sequuntur trimestria, quæ nonnullis Sitania nominant. Itaq̄ cruda in cibis retinetur tineas gignūt. Canū moribus profunt māsā & imposita. Confectus eorū similitudine panis, plus alit q̄ cibarius. E trimestriū farina panis leuiorem cibū præbet, & qui facile in mēbra demandet. Farina eorū cum hyoscyami succo illinit, aduersus neruorū fluctiones, quas Græci rheumatismos uocant. Itē contra interaneorū inflationes. Lentigines ex aceto multo tollit. Furfures aut in acri aceto decocti, turgentes māsas sedant. Viperarū ictibus auxiliant. Et torminosi profunt. Farinaceum fermentū calfaciendi extrahendiq̄ uim habet. Priuatim callos pedū, clauosq̄ extenuat. Cætera tubercula, furunculosq̄ ex sale concoquit, & aperit. Sitaniarū farina, contra uenenatos ictus cum aceto, aut uino cōmodissime illinitur. Eadem si decocta in glutini modū delingat, cruentis excreationibus proderit. Contra tussim, & exasperatas fauces, cum menta & butyro decocta efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsa, aut hydræleo decoquatur, oēm discutit inflammationem. Panis & crudus & coctus inflammationes omneis illitu mulcet: cum emolliat & quadamtenus refrigeret. Sed hærbis succis uē huic rei accommodatis ammisceatur. Vetus panis aridus, adiectis conuenientibus, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus illitu, uetustas impetigines sanat. Glutinum ex similitudine & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidius ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

B A R B.

Plini. lib. 18.

cap. 7. 10. 11.

Triticum & Satiuū & Syluestre, cultu annorū trium mitescit, in Leontino Siciliæ agro plurimum. Degenerare Triticū in ordeum, ex eodēq̄ nasci pede, utrūq̄ fabulosum existimat a Theophrasto. Frumentū omne radicibus multis ac prætenuibus exit, folio uno, germinibus

oīno multis, sed quæ in ramos brachiari non possint: cuius contrariū in oīni legumine cōspi-
citur, excepta Faba. Frumentū Sitos græce dictū, quicqd ex se aristas mittit: in herba quā Græ-
ci Loion uocat per hyemem est. Remollito autē coelo, cauliculus de medio assurgit: cuius tercio
aut quarto genu spica geritur, non prius euidens, q̄ folliculo inclusa: qui Gluma dicitur. Con-
sumato eo, flos erumpit: quarto aut quinto post die, ac totidem fere diebus, plurimūq; septem
durat. Varro quindecim diebus frumentū in uaginis esse dicit, quindecim florere, quindecim
arescere. Post florem crassescit, inquit Theophrastus: maturaturq; intra quadagesimū diem,
cū tardissime octauo a satū mense, plurima parte metitur. Aegyptus, ut scribunt, septimo. Fo-
liū harundineum, angustius tamē Tritico q̄ ordeo, caulis quoq; leuior, & lentior, nec perinde
fragilis. Triticū multis integitur tunicis, ordeum nullis. Culmus Tritico altior q̄ ordeo, spica
quoq; remotior a folio. palea suauior, mollior, succosior. Inconditæ Tritico spicæ, explana-
tæq; ordeo dispositæ in uersus. Vtriq; culmus spicā sustinet, quæ & Spicus, & Spicum a Ci-
cerone dicitur in Arato. Spica granum & aristam, quæ uti acus eminet e folliculo siue gluma;
Sunt autē Aristæ partes in spica primæ, quæ a Græcis Antherices dicuntur, & Atheres. Est au-
tem Ather proprie in ordeo, ut Galenus interpretat, cuspis ipsa spicæ. Nam & mēti pars extre-
ma, hoc nomen inquit, habet, cum aristam non habet. Mutica spica dicitur, quasi mutila. Va-
ginā uocant, sub qua latet herba. Stipulæ sunt folia culmū ambientia. Est autē Culmus, idem
quod & Calamus, cum spicæ penitus oriūtur in summo spicæ iam maturæ. Quod minus est
q̄ granum, uocatur Frit. Quod uero ad culmi cacumina in firmā spica geritur, minus item
q̄ granum, Vrucus appellatur. In tritico marcescente gurguliones, hoc est, Bias (sed lego
Cias, ut in pumice notauī) a Græcis uocatos, innasci serunt, ut in faba Midæ. Gigni & cantha-
ridem in Tritico (Scampeus is paruus est) ut Phalangion in Eruo constat. Tritici multa dis-
crimina. Sitanias uocat. Genus id est filiginis trimestre, ut Columella uoluit. Frumentago di-
cta Theodoro, differens crassitudine surculorū, quemadmodū inter ordea Crithanias, Ordea-
go nominata. In nomine sunt Assyriū, Aegyptium, Ponticū, Thracium, Siculū, Africum, qd
facile absoluitur folliculo. Nam Thraciū multas habet tunicas. Habetur & Cachrydias, siue
Canchrys, culmo crasso, quod etiā Africo tribuitur. Ponticum leuissimū. Siculum pondero-
sum. Ponderosius Boetium. Deprenderūt hoc Athletæ. Ponticū & Aegyptium sine lolio na-
scitur. Item Siculū, præcipue Agrigentini. Q̄q; cum siculo, melapyron nasci perhibent. Sed
innocui, neq; lolij modo graue, caputue tentans. Nominat & Alexandrinū, oblongo semine,
quod fortasse idem sit cum Aegyptio, & Calymno. Ex Calydnis insulis, a Ptolomæo Philadel-
pho in Aegyptū conuecto. Dracontias, & Selenusium, & Stengias, crasso cuncta calamo. Iam
aliud trimestre, aliud bimestre. Sitanii, uideo idem esse cum trimestri. Satiū dorice uocatū, &
attice Titinū, quasi purum, ut Photioni placet, de quo & paulo supra dixi. Galenus Sitanium,
inquit, est Triticū instantis anni, id quod uere seritur. In Triculento Plauti Etanio, pro Setanio
legitur mendose, castigauimus. Non possunt inquit, militares pueri setanio exducier. Euboicū
certe intra diem quadagesimū a satū metitur, firmitate ac pondere præcipuū, non ut trimestri
leuitas, ob id cibario panī utile: nam & furfuris parū habet, inuentu rarū. Bimestria, in Achaiā
& Sicilia primū uenere, parum fecunda, sed cibo facilia & iucūda. Olynthi & in Euboea apud
Cerinthum genus effoditur terræ, qua Triticum oblinēres diu id seruāt. Trimestria ubiq; sunt,
uerū inutilia, & infirma, singulari calamo. In Asia quodā loco trans Bactra frumentum nucleis
oliuæ par nasci referunt. In Pissotis, tam firmū, ut multos Macedonum largiore usos, eo saties
peremerit. Omni frumēto nocent imbres in flore. Itē iam plane crassato, Triticum plus q̄ orde-
um uligine cōmeat in lolium. Camatias in Thessalia Tritici genus est, quod admissio pecore de-
generat Babylone: propterea nihil patitur, etiā bis derosum. Præter lupinū, nihil æque in spica
durat q̄ Triticum. Durat bonitas cibo in petra Cappadociæ, in septuagesimū usq; annū. Vnde
de Cappadocio panī summa gratia, qui & Apalos, a teneritudine uocat, & Syrorū lingua La-
gman. Addebat in massam lac & oleum, & salis quantum saties esset. Laudabatur & Parthicus:
quē alij aquaticum uocabāt, quoniā aqua traheret a tenui & spongiosa inanitate. Triticum ex
Assio Troadis, in panē sibi Reges Persarum quærebant. Varro conditū diligenter Triticū, quo
uentus non perueniat, mansurū ad annos promittit. Vis Tritico tanta, ut cados plenos siccet.
Panificij multa & nomina & genera. Ex his nauticum intelligo, qui uetus atq; siccus a Diosco-
ride in medicinis dicitur, fortasseq; biscoctus: quē Græci Diephthon appellant. Syncomistos
uero, is est quē alio nomine Autopyron uocari Galenus auctor est: quoniā ex omnibus farinæ
sue paribus detractioe nulla constet. Inter Pityriā, & Semidalitin, hoc est, furfuraceum, simi-
lagineumq; medius. Et enim Autopyros, siue quod idem est, Autopyrites, & Xeropyrites, &

A

Theoph. li. 3;
capi. 25. 26. 27.
28. de planta-
rum caussis.
Itē li. 4. ca. 17.

B

C Pynos Athenæo, siue Pynos Hippocrati, a Tritico, non ab igne flectitur, propterea quod non ex Tritici parte sit, sed ex ipso plane toto. Dicitur autem Anerectos ab Hippocrate. Item Syncomistos, quasi confusaneus, quoniam castratus non sit, sed omnia simul tulerit, furfures, urticulas, & similia. Idem fere qui Sordidus. Cuiusmodi Neronem usum legimus. Quod Paulus Sordidum, a Syncomisto separat. Vtriculos in auctoribus intelligo, id quod furfure melius est, & similia de-terius: hodieque Fertini suos farine ventres uocant. In Cisalpina Gallia Redundago appellatur, Me-dianum in Venetia prouincia. Autopyri panes dicunt, & qui furfure tantum leuiter succreto sunt, qualis fere Cibarius, & Secundanus est, & qui Rubidus fortasse a Plauto poeta dicitur. Hoc autem fieri solet, ut Galenus ait, quotiens Triticum generosum non est. Generosum inquit uocat, quod similaginis plus habet quam fufuris. Nam similago & similia prorsus idem sunt, Semidalis graece dicta, nimis fortasse multa de hoc pane, sed consulto: quia parum constabat inter erudi-tos qualis esset, praesertim cum in Plinio illa uerba legerentur. Ad omnia inquit, haec fermenta-tus qui uocatur Autopyrus utilior: nullo non accipiente fermentatum panem eundem esse cum Au-topyro. Non hoc significari uoluit Plinius: nec tantum hallucinatus fuisset homo, seculorum omni-um post Varronem fere doctissimus, sed quod fermentatus panis, non quicquam, sed qui sit Au-topyrus, ad omnia ea quae dixisset utilior esse uideatur: quod & duobus locis seorsum Galenus praecipit: in altero panem Autopyrum, ut secundo ad Glauconem uolumine, in altero fermenta-tum ad omnia illa praefrens, de simplicibus facultatibus lib. 9. Sunt qui fermentatum panem Apo-pyrian uocant, ut Cratinus, non a Tritico, sed a pruna: quoniam torretur, ut ipsum nomen in-dicat. Farina Graeci Aleuron, & Alphon, & Halisparton, & Aliaton, & Aliton uocant. Quod Al-phita polenta fere significat, & Aliata farinam coctam, & Halisparton agrum consitum poe-ris. Fermentum Zymen, Cyribia, quae nos excreta Tritici, aut ordei, ut Columella, siue ut Palla-dius Cretura uocamus, auctore Iulio Polluce. Photion & Galenus etiam ipsos Furfures, quos Graeci Appherema, & Pityra, nos etiam Canicas, & Apludas uocamus. Unde Canicaceus pa-nis, id est, furfureus Pacuio. At Ceribia in Cratino, idem Photion pro fabalibus interpretatur. Pepalem uero Pollux ipsum farinae pollinem. Dioscorides & Plinius Pepalem Alphon, pro po-lenta capiunt fere. Triticum Syracusani Spyron, non ut ceteri Graeci pyron uocabant. Panem Ar-ton, quem Phryges Beccum, ut testis est Herodorus, a perfectione, quia rotunda eius forma sit, ut Athenæo placuit. Tritici summa tria genera obseruant, qui minus operose persequuntur ista. Primum Robus, pondere & nitore praestat. Alterum Siligo: cuius candor & species in pane praeci-pua, sed pondere deficitur. Tertium Trimestre, de quo supra diximus, Sitanum uocari: cuius usus agricolis gratissimus, inopiae subsidio: hoc & Candidum esse dicitur. Nunc locus est, ut Pa-nis genera dicantur quae breuissime. Zymites, hoc est, fermentatus, qui & Nastos dicitur. Quod Na-stos, quibusdam placenta genus est. Contrarius huic Azimos, qui & Daratos. Nam acidus & Huic Aegyptij Tyllastin dicunt. Alij ex ordeo confectum accipiunt, qui Cyllastis uocatur. He-rodorus ex siligine, Semidalites e similia, Dictam uero Simila a Cerere putauerim: quam Syra-cusij Simalida nominant, & Sitona. Aleurites a farina. Gyrites a polline. Condrites ab halica, siue Zea. De Syncomisto, & Autopyrite, & Apopyria diximus. Item de Cappadocio, & Apa-to, Parthico, & aquatico, & rubido. Ipnites, & Caminites, a coquendi ratione. Item Aeschari-tes a craticula, sub finem coenae cotiuus apponi solitus, & intingi passio, usque ad ebrietatem legi-tima. Hic & inuoluebatur, atque ita ut calebat intortus. Athenis maxime placebat. Cotiectari li-ceat id genus panificij, quod a tenuitate, & candore Nebulas fere uocamus, Aeschariten uete-ribus fuisse. Nam & apud nos uulgari uoce ita dicitur, una tantum mentionem in Plauto, ut ceteros taceam, inuenias. Tabyrites pusillus erat. Achænes praegradis, quo in Thesmophorijs uteban-tur Atticae mulieres. Qualis autem sit Apurites, Polluci non constat. Praefertur omnibus sanitatis usu a Galeno Cribanites, siue quod idem est, Clibanites, hoc est, ut Varro Textuaceus, a cli-bano: quem Attici Cribanon appellat, nostri Textum, quod in textu calido coqueretur, usas comitia-libus matronas scribunt. Cribana uero placenta genus sunt, specie mammosa. Encryphas, qui & Agoræus, hoc est, Foræsis, & Venalitius, & Atticus uocari solet. Dipyros, qui & Pyrites Pol-luci, delicatus fuisse dicitur, siue idem qui Dipyrites ab Hippocrate cognominatur, siue alius. Quia porro Dipyrites, ad aquam intercutem cibo utilis existimatur, coniectari liceat, pro his cocto pa-ne capiendum esse eum. Lagana, siue Lagana, minimo pondere, quod quod leuior & tenerior, etiamum a carbone dictus Epanthraxis, Saturnalibus praebere solitus, nihil, ut quidam putant, ab Encry-phia differens. Vterque subcinericius est. Iam Homoros, & Stærites, & Encris, & Aliphaites, & Hemiarion,

Genera panis
multa.

Hemiarton, & Placites, & qui Tytontes a caseo nomen habent. Enicridi similis est Physcilus, quo Spartani utebantur in sacris epulis, Rapi effigie. Magnos & fordidos panes Cilicis uocabant, & a colore subnigro Phæos, sicut Agelæos, qui a nostris cibarii & gregarii dicuntur. Ornides ab Oryza, siue ab semine quodam Aethiopico, tam simili sesamo, ut difficile possit internosci. De ficu ægyptia, Sycaminites fit. Collabus, siue quod idem est Collix, & per diminutionem Colliphion, ut Xyliphion e caseo recenti constat: de quo Iuuenalis, & in Persa Plautus. Hic & Crinmatias, & Chondribos quoque dicitur. Sunt & Maconides uocati. Sunt Chrysocollæ, sed ex lino, ac melle. Aegyptij sunt, & ad sistendam aluum utiles, ut inquit Strabo, Caces appellati. Sunt Colloræ, siue Colliriæ: quos Plautus non Colloras modo, sed Colluria uocauit, & Collyria ut existimo in Persa, & Collyridas sacrae literæ. Is olei mistione conspersus intelligitur a Hieronymo. Sunt Obeliæ Baccho sacri: ita dicti, uel quod obolo Alexandrie uenirent, uel quod in ueru torrerentur. Sunt Eunice. Aut etiam Enicæ, cognomento Lecythitæ. Sunt Pani: unde apud nos uocabulum. Etenim Mellapios redundantiæ & saturitatem, Paniæ appellasse, testis est Athenæus. Varro tamen Panis uocabulum a pano duci putat, quod figuras in eo faciebant, ut in lana mulieres. Habetur & Cnestos a nidore. Itæ Banchylos, & Thronos, Spodites idem uidetur esse cum Banchylo. Patrias nobilitauere Cyprius, & Cappadox, de quo supra dictum est. Artopticus uero panis a Clibanite ac Turnaceo differre eo dicitur: quod hic e duriore fermento splendidus conficitur: illi fermentum semper perque terriberrimam desiderant. A boleti forma Boletinus, papauere accepto & fumosi casei colore. Strepticus, siue Streptos, ex lacte, oleo, pipere conficitur: aut olei loco, adipe. Artolagana pusillum uini, lac, piper, oleum, siue adipem olei uice continent. Capyridia sunt, quæ alio nomine Tracta dicimus, ut Athenæo placet. Cuius uocis & apud Caronem metio est, ubi de placenta, & spira, & scriblita loquitur: quo uerbo ipse non Panificium, sed portiones tota materia detractas, & in solum, hoc est, stratum in tabella, siue aluoculo diffusas congestasque significat. Proinde in hoc usu Græci sic loquuntur, *ἄλιν λάγαν*, pro eo quod est, tracta facere. Hinc et Cera candida, Tractum dici a Græcis quoque, aut or est Photion: a quo & uerbum *πραταίνω*, pro eo quod, perficere, ac subigere, ut alba fiat Cera. Paulus quoque Ceram tractam, ad psoras commendat. Sunt & Cubi, hoc est, quadranguli, aut etiam quadrati, ex oleo, anetho, caseo. Quanquam Athenæus eos qui Romæ quadrati uocarentur, incisuris præcinctos, & Bomilios a Græcis appellari prodit. Thargelos, qui & Thacysius: ita dici panem uolunt, quod primus e nouella messe fingit. Est & Samites, & Pyramus: quem nonnulli eundem cum Sefamite putauerunt. Thiagonos Dijs coquitur in Aetolia. Sunt & Dramices, & Araxis. Quanquam Dramin in Macedonia uocari, qui panis in Thessalia dicatur, nonnulli scribunt. Enicem uocant, qui ex confracto, nec excreto sit tritico. Blemia porro calidus, & egregie subactus, ac Depsitus panis est apud Seleucum: quem nostri forte Despitum uocant, ut est apud Caronem. Quanquam in Carone sunt qui Speuticum, a festinatione legendum putant: nec ut arbitror male. Brattimes, & Pityrites idem est, qui Furfuraceus, a quibusdam Euconos, & Teuconos appellatus. Nam Spolea, eum panem Græci uocant, quod necessarii duntaxat cognati uescuntur. Est & Phacinos de lente, popularis Alexandriæ, ut scribit Athenæus. Opis pistorum genus est, & quod Buccellatum ab Paulo, & Aetio uocatur. Iustiniani codex, & Marcellinus in militari annona grana connumerant, quæ bis coquat, a buccæa dictum. Est autem Buccæa, ut ex Suetonio colligit, idem fere quod bolus. Sunt qui Buccellatum, fermento putent carere. Plautus Rubidum panem cum nominat, uidetur Nauticum accipere: quia sit bis coctus. De Placentis alius mihi locus est: & sane proluxa metio ea foret. In Amylo dicent, ubi & panis quædam grana, sed admodum pauca necessario libabimus. Alioquin & Placenta panis est, ut Athenæus inquit. Illud obiter attasse non fuerit inutile, genus id quod Itricon, & Itrion Græci appellant, a nostris Libum uocari, et neutro et masculino genere, ut Athenæus testatum reliquit. Ego non Libum simpliciter, sed Libum suminale interpretor, ut in Amylo docebimus. Cato Libum ex caseo & ouo condidit: ut autem legumen, ita & triticum si coquatur: appellationem habet nouam. Episo & faba Etнос, ex lente & aphaca Lenticulam, ex tritico Pyanum, & ut recentiores malunt, Holopyron uocamus. Aliqui fruges omnium generum in passlo coctas Pyanon appellant. Venerit Iulium Pollucem, qui Pyanon quasi Cyamon, pro faba cepit. Chidron uero coctum triticum, ut Athenæus inquit, seu frustum far, ut Hieronymus: quasi molam falsam. Est autem Mola falsa tostum far, sale conspersum: quo uisum perfundebantur, Vlochyton græce dicta. Iulius Pollux Chidron sorbitionem ex tritico uirenti factam intelligit: quia uirens triticum Chicria ab Aristophane dicatur. Nam Pelanos apud Aristophanem, a quibusdam accipitur pro specie leguminis. Pausanias placenta genus accipit in Pelano. Euripides pro quacumque re concreta, gelataue.

A

Strabo lib. 17.

B

C^{apitulum} **H**ordeū optimū est candidū, purumq;. Id minus q̄ triticum alit. Pūfana tamen ob cremorem in decoctiōe redditū, plus alimentū prebet, q̄ polēta ex hordeo facta. Cōtra acrimonias atq; faucū scabricas, exulceratiōesq; pollet. Quibus etiā triticea pūfana p̄sidio est. Sed plus alit, magisq; urinā mouet. Lac abūde suppeditat, si cū sceniculi semine decocta sorbeat. Hordeū abstergit. Urinā ciet. Inflationē parit. Stomacho aduersat. Tumores cōcoqt. Farina hordeacea decoqnit in mulsā aqua cū fico, ut inflāmationē collectionēq; discutiāt. Duricias cū resina et simo colubarū cōcoqt. Cū meliloto aut et papaueris calyce dolores finit q̄ latus excruciant. Aduersus intestinorū inflatiōes, cū lini semine, scenograeco, & ruta, illini iuuat. Strumas cū pice liqda, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad cōcoctionē perducit. Et cū myrto, uino, malicorio, syluestribus pyris, & rubo, alui pfluuiā sistit. Podagricis inflāmationib; cū cotoneis, aut aceto pdest. Decocta in acri aceto, modo quo hordeaceū cataplasma, & calida imposta, lepris medetur. Liquata eadē cū aqua, atq; cū pice decocta, pus excitat. Cum aceto liquata itidem contra articulorum fluctiōes prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflāmationēq; mitigat.

BARBARI COROLL.

Pli. eodem ut
supra.

Strabo lib. 10.

D

Ordeum, Chymistę Lutum Vulcani appellant, in græcis codicibus. De Ordei radice, ortu, herba, flore, spica in tritici mentione diximus. In Aegypto metitur sexto mense; aliubi multo tardius. In Chalcia, Rhodiorum insula, celerrime qdam loco. Itē Messan in Sicilia, ubi Mylas uocant. In India syluestre nascitur, iocundum in panis esu. Hoc eqs appositū Alexātri, necabat eos primo; deinde in palea exhibitū, paulatim desijt esse noxiū. Fundit hoc in brachia, quemadmodū & Crithanias, hoc est, ut supius dixi, Ordeago. Ad Cedropolin, in Thracia qd nascitur, iumenta non attingunt; cuius rei causa, ut Theophrasto placet, malus odor, etiā si nō sentit homini. Gna Ordei cōplura. Alijs granū rotundius, & breuius. Alijs maius, oblongius, et rarius. Aliud cādicat. Aliud uergit in purpurā, copiosius farina, ualidiusq; q̄ cādidū. Iā aliud binos spicarū uersus, aliud ternos quaternosq; habet, itē gnos: nullū tñ plures senis, cui spica folio perq; pxima est, amplitudinis & crassitudinis maioris. Hoc Achilleis, & Achilleas ab Hippocrate cognominatur; ob id ppenius obnoxii erugini. Erysi bē gręci uitii hoc appellāt, plenilunij fere accidens: qd & Rubigo frequētius dicit, ordeo q̄ tritico infestior. Eteocrithon genus Ordei est tutū a Rubigine; qm incuruū nascat. Sunt & Leptides, a tenuitate dicta recēti oribus Græcorum. Nam Amphicaustis, in tragœdia Ordeū montanū significat, qd & Eustro uocat. Differt Polēta a Farina ordeacea, q̄ torret polēta, nō farina. Polēta Gręci Alphita, nō ut in Palladio corrupte legas, alphica. Itē Gerania, instrumēti nomine, quo pcutiunt ligneo: & E-naulemata, p̄sertim cū uino et oleo. Ordeū Crithē et Cri, et Proconiō poetę: q̄ et triticū tostū Proconiō quoq; dicitur, & genus itē suffitus, Photioni. Galenus in Hippoc. Proconiū, polentā ex ordeo recentī, aut etiā ex ordeo nondū tosto, significari tradit. Ordeacei uero panis genus unū Mazā nominant, in ordeaceos panes deterrimum. Acetius polentā ordeaceā, quæ sit humido conspersa, Mazā appellari testis est; quæ uidelicet mandat cruda cū defruto, uel melle, uel alio quo huiusmodi. Mazarū uero plura genera, siue nomina. Physten Attici uocant, quæ non multum subacta sit. Est & Anthema, & Ephicois, & Concon, & Tripte, & Cardamale dicta, & Berex, siue Barax. Alij Caryx, etiā Caryce, a nigricia nomen habens, non a nucibus. Distinguit Berex a Caryca Iulio polluci, et Tolya, et Thridacina, siue Thridacisca, et Anemolos. Itē a uino Oenutta, sicut a melle Melirutta. Nam Achilleos uocata, ex ordeo cui Achilleis nomen est, constare creditur. In nomine sunt et Cypria, et Magidis. Hesiodus Amolge dictæ meminuit, quæ nihil aliud sit q̄ recens. Iis uero quæ in sacrificijs Trophonij degustandæ præbebantur, Melitutte, Arefte, & Hygse nomen erat. In summa, laudatur Lydia, Caryce, Eretria, Prę-

fertur omnibus Conchos. Maza in latino non habet nomen, nisi quis interprete panis offam, ut ipsi quandoque fecimus. Et ante nos Theodorus gaza, Offam, inquit Festus, abscisum globi forma nominabat, ut manu glomerata pulre. Frumenti genus est quod ueteres Ador, & Edor, & semē Adoreū, & Far uernaculū, aut eā Vermiculū uideo appellasse: ab edēdo: uel qm̄ adurebatur, ut tostū fieret, ex quo mola saltem sacrificijs, & Adorea pro laude. Nam Ordeum etiam Sifar quandoque dici solet. Leguminibus fere ascribitur, quia ex eo pisanā fiat, ut Columella inquit. Inuenio tamē & Sacrum ordeum a Græcis uocari Didalida: quasi eo pro farre ac mola saltem ufos existimare liceat, si Photioni credamus: qui & Cāchryn dici frictum Ordeum notauit. Galenus plurali tantum numero Cāchryas pronunciat. Singulari uero non Ordeum frictum, sed radicem Libanotidos, hoc est, roris marini, ab Hippocrate significari cōmonet. Contra fractum porro indiligenter Ordeum, Ericidas idem Hippocrates appellat. Seminis porro Adorei quatuor sunt publica discrimina. Far Clusinum candidius, ac nitidum. Far quod uocāt Vermiculū, rutilo colore. Far Candidum, maioris utriusque ponderis q̄ Clusinū. Quarto genere semē trimestre Halicāstrum uocatum, pondere, bonitateque præcipuum. Ordei uero illæ differentia. Cantherinum quidam & Exhastichū appellāt, animalibus quæ ruri sunt pascendis utilius, & homini q̄q̄ melius, q̄ malum triticū, fragili culmo, & nulla uestigum palea, celeriterque decidens, ac tritu facile. Aliud genus est, quod Distichō, siue Galaticum uocamus, ponderis & candoris eximij: quod Oryza esse quidam interpretantur ætate nostra. Græci, quemadmodū Far ipsum uocent, nisi Ordei appellatione contineri dicant, haud scio reddere.

De Zytho. CAP. XCVII.

EX hordeo potus fit, cui Zytho nomen est. Is urinam cit. Renes & neruos tentat. Membranis, præsertim cerebrū uestientibus officit. Inflationē parit. Vitiolum succum creat. Elephantiasin. Qui eo potus genere perluitur, agilis, & ad opus obeundum expeditus euadit.

De Courmite. CAP. XCVIII.

Fit & ex hordeo potus quem Courmi nominant. Eoq̄ sepe potu, pro uino utuntur. Verum dolorem capitis mouet. Malum succum gignit. Neruis nocet. Consimilia etiam potus genera ex tritico fieri solent in Britania, & quæ occidentem spectat Iberia.

BARBARI COROLL.

Zythus, & Zythum dicitur, & Græce uulgo Phocadion. In Aegypto sitideoque a poetis quandoque Pelusiaceus potus uocatur. Madescunt aqua fruges, donec resoluantur in liquorem uino similem. Inebriat hoc, & acre gustu est: quoniam ex putrilagine acescente constat. In Mediæ montanis, septentrionali situ, gentes uini loco succum e radicibus quibusdam ebibunt. Curmi porro fortasse hoc sit, quod Ceuissiam in Gallia uocant, & Curmi, Curmithos inscribitur. Possidonius homo stoicus, non Curmi, sed Corma appellat. Inuenio & Celia, & Ceria, unde Sibera, & Sicerites uinū forte nomen. Quanq̄ Hieronymus in ea uoce, quā uult Hebraei cā intelligi, accipiendū esse dicit omne potionis genus, qd̄ inebriare possit bibetes. Id aut̄ pluribus omnino modis ac nominibus, ratione tñ una fere ubiq̄. Hispani iam et uetustatem ferre genera ea docuerunt. Spuma uero dum resoluatur frumentū concretā, utuntur fermenti uice: quā ob causam leuior illis q̄ cæteris panis est. Aristoteles Pinū uocari tradit, qd̄ ex ordeo fit uinum. Hoc qui sunt remulenti, nō in omnē partem cassabundos corruiere, ut cæteri, sed retrorsum dū taxat, ac supinos. Paulus uinum quod ex sordibus uellerum elutis conficitur, Pinon uocari putat. Sophocles, Aeschylus uinum ex ordeo Bryton uocant, non Zython, aut Pinum. Est & apud Theophrastum Bryton. Hellanicus & ex oryza Bryton fieri cōmemorat. Fit & e milio, ut Athenæus testis est. Nam Cyceon homericus aliud genus erat: id ex mixto farina caseo confabatur, in forbitionis usum. Sunt qui Pinon pro uino capiant, quo lanæ cum sordibus suis lauantur, atq̄ ita siccatur reponitur. Illud notatione dignum existimamus, Dioscoridem eburi scribere maceratum Zytho, facile tractari. Plinius non eburi, sed ipsum animal tractabile hoc modo reddi prædicat. Cæterum inquit, Elephantū masticantur ordeis succo.

EX M. VERG. COM M.

Antiquum est, ex frugibus fieri pocula, quorum ad ebrietatem non minor q̄ uini etiam uis

A

Zytho

B

κείνη

Pli. li. 22. ca. 25.

D I O S C O R I D I S

C est. Nec nostra ætas eadem sibi parare his locis defuevit, quibus negata uina, ex quo non satis homini aqua est, quod eorum uicem expleret, quærere sibi homines coegerunt. Inter ea Zythus quondam fuit, qui ex hordeacea fruge madida fieret. Meminerunt Zythi Plinius in naturali, Diodorus Siculus in Gætium historia. Meminit & in carmine suo Columella, Aegypti inuentum & usum Zythi ostendens, cum cecinit. Iam Sifer Assyrioque uenit, quæ semine radix. Sed etiam præbetur madido satiata lupino, Vt Pelusiaci proriter pocula Zythi. Veteres grecorum medici, acrimoniam habere Zythum dixerunt: quoniam ex corruptione factus esset. Frigidum præterea: quoniam acorem haberet: ideoque mali succi esse. Quos autem in medicina usus habet Zythus, & hic, & alij manifeste dixerunt.

De Zea, seu Semine. CAP. XCIX.
Z Ea duorum generum est. Vna simplex. Altera in geminis putaminibus grana bina iuncta gerit. Ob id Dicoccos appellatur. Plus quam hordeum alit. Ori grata. Digerit in panificia, minus quam triticum ales.

Pli. li. 22. ca. 25.
lib. 18. cap. 8.

BARBARI COROLL.
Z Eam nostri Semen dicunt. Hæc si seratur pinsita, hoc est, tusa, transit in Triticum, ut Tiphaz idque non protinus, sed anno demum tertio: nunquam contra. Nihil hac robustius, terramque magis exinanians, radice alta, multiplici, culmo numerofo, fructu facillimo, cunctis animalibus iucundo, simillima tritico aspectu quemadmodum & Tiphaz. Soli non quæcunque, ut Tiphaz, sed lectum, pingueque desiderat. Zea & in Bromo dicta comest. Dionysius halycarnalleus latine dici Fabulam existimat. In Catode porro Fabulus albus, faba cadida ut arbitror significat: quæ bubus cum languent, dari precipit. Vt in Columella deprauate legi putet. Balbulos albos in cura Bosu, p Fabulis albis. Dioscorid. certe Papauer albu, a Romanis Fabiolu uocari tradit. De hoc lectore ad fabam mentionem differo. Zea, Zeteis, & Zontio, & Zostio apud Aristoph. in comœdia. quæ Babilon inscribit, locus uocat, quo seruitia puniendi mittebant. Meminit & Pollux. Ad quod alludit poeta noster comicus in Asinaria (ni fallor) cum dixit, Qui polentam pransit, & ubi uiuos homines mortui incurfant boues. Gregorius Tifernas in Strabone Zeas interpretat, rustica potius quam latina uoce Speltas: credo quia Rhemiut Palæm prior usurpauerit in carmine de poderibus, ac mensuris, quod tamen Prisciano grammatice inscriptum circūfert, Octo inquit speltas pedere scrupulum.

EX. M. VERG. COMM.
D Nihil difficiliorem medicæ materiæ cognitionem semper fecit, & adhuc facit, quam quæ non eadem ubique omnia sunt: neque ubi eadem sunt, ipsædem nominibus appellant: & quæ quo communius aliquid humano generi natura fecit, eo facilius neglectum ignoratur. Idque in frugibus animaduertisse licet: in quibus nulla alicui certa huius, aut illius ex antiquis scriptoribus indicatio nunc esse potest, cum tamen nihil in illis frequentius inueniatur. Fecerunt id mutata per tempora earum appellationes: sed multo magis, quod paulo ante diximus, neglecta communia, et quoridiana natura bona: & ut in Zea, de qua nunc agimus, accidit. Eam Plinius, Theophrastusque triticum nunc frugem, quæ Speltam rura nostra appellant, esse eam existimarunt. Nec huius scriptoris descriptio & historia, ab ea seminis forma penitus distat. Plinius in Italia, præsertimque in Campania feliciter prouenire lib. 18. ca. 8. testatus est: priuatimque semen appellari præclarum, ut ille ait, re. Quam in medicina ueteres grecorum medici, tritico similes habere uires dixerunt, medioque in Plinius testatus est. De qua non multo post dicemus. Esse autem tritico similem Zeam, Theophrastus præcipue, s. de plantarum historia uolumine ostendit.

De crassiore Farina. CAP. C.
C Rimnon crassior est ex Zea, triticoque farina, ex qua pultem faciunt. Abunde alit. Facile conficitur. Aluum uehementius adstringit, si Zea ex qua fit, prius torreatur.

BARBARI COROLL.
C Rimnon fortasse hoc est, quod Cremor latine dicitur, ut succus a cremore differat sola crassitudine. Interim confunditur. Cornelius Celsus cremorem pisanæ pro succo fere accipit. Crimnon & Hordei genus est Photioni, et Cycæonis homerici liquamentum. Hippocrates Crim-

nodeas urinas pro crassis, & ad similitudinem farinæ tritici corpulentis accepit, ut Galeno placet, in Aphorismis, sicut alias eruo, alias frondibus, alias furfuribus haberi similes docemur. Nā Crymodes aliud est. Ita uocatur febris quæ pulmone, sacris ignibus correpto prouenit: sicut Lepyræ, quæ stomacho, & Typhodes, quæ iocinere. Pultem Græci Polton, et Poltarion appellat. Plinius, Calidam inquit potionem in pultario poposcit Offilius. Vt Pultarium aut pro uase, aut pro sorbitionis genere accepit. Puls certe, ut Aetio placet, omnis sorbitio uocatur, quæ aut de leguminibus, aut cerealibus granis coquendo in succum resolutis conficitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Artis, non naturæ opus Crimnon quondam fuit, idem Romanæ Pultr, qua quondam Græcia pariter & Italia pro pane usa est: manifesteque id Plinius lib. 8. cap. 5. testatur, Pultr, non pane longo tempore uixisse Romanos dicens. Translata deinde ad medicinam res est, relictaque uere appellatione, posteriores Græcorum medici, non crimnon, sed πολτόν, aut πολτάριον .i. Pultr, aut Pultriculam appellauerunt. Sic Paulus Aegineta, sic ante eum Galenus aliquando dixerunt. Fieri autem solitam præcipue ex hordeo, nomē testatur. ἀπό τῆς κριθῆς enim, id est, ab hordeo, κριθῆς dicta est. Vtilior deinde deprehensa fuit quæ ex Zea, & Tritico fieret. Qualis deinde ea esset, satis hic ostendit dicens. Crassiorē quæ farina sit cōfectione, trituraque Crimnon esse. Post hunc Paulus Aegineta lib. 6. de eadem agens, Crimnon, id est, Pultr appellari ait, quod ex Tritico & Zea crassius esset. Cæteri Græcorum medici eam his uerbis diffiniunt. κριθῆς καὶ πολτῶν τὸ παχυμερὲς οὗτος ὀνομάσται ἢ, ἢ τὴν πυρίνου καὶ τοῦ τῶν λίαν ἀλείφου. Quod est, Crimnon, siue Puls dicitur, quod in Tritici & Zea farina crassum & crassiorum partium est. Poteritque quanta & qualis hæc crassitudo farinæ in Crimno sit, cupiens nouisse, si quas Hippocrates, & posteriores Græcorum medici κριθῶδους urinas appellant, aliquando uiderit, in quibus corpulentioris farinæ similes nubesculæ apparent: quasque Plinius lib. 23. furfures, & nubesculas appellauit.

De Siligine. CAP. CI.

Et de M generi Siligo adscribitur, sed minus aliquanto nutrit. In panes ut Zea cogitur. Fit quoque e Siligine crassior farina, quam Græci Crimnon uocitant.

B A R B A R I C O R O L L.

Olyra, Siligo a nostris uocatur, autore Plinio, Catoni quoque genus est tritici. Siligo locis apertis, cellisque ferenda, & ubi sol quædiutissime sit. Vitium est Siligo tritici. nam omne triticum solo ulginoso, post tertiam factionem, conuertitur in Siliginem. Est & Olyra Galliarum propria quæ cognominatur Arinca, uel Italiæ copiosa. Theophrastus Olyram folliculo describit multiplici, ut Tipham, sed Bromo & Zea molliorem, infirmioremq. Sit autem siligo, quam nunc rustici Secale uocant, ambiguum est quibusdam, non mihi. Plinio certe farraginis & pabuli genus est Secale nominatum, occurrere tantum desideras. Hoc inquit Taurini sub Alpibus Asiā uocant, deterrimū, & ad arcendā famem utile, foetunda, sed gracili stipula, nigritia triste, sed pondere præcipuum. Admisceatur huic far, ut mitiget amaritudinem eius: & tamen sic quoque ingrassimum uentri est. Nascitur qualicūque solo, cum centesimo grano, ipsumque pro letamine est. Farrago autem ex recrementis farris prædensa feritur, admixta aliquando & uicia. Eadē aliquando in Africa fit ex Hordeo, unde hordeacea Farrago dicitur. Hæc esse puto, quam Græci uocant Cratin, ut est apud Aristotelem, siue quod idem est, Graftin. Interpretantur enim Graftin, uires hordeum. Alij Graftin dicunt, & fenum semiaridum intelligunt, utique Pollux, quod & Poam, & Chilon uocant, atque Chonton. Fit igitur optima Farrago, cum cantherini hordei. 10. modijs iugurum obseritur. A farragine Farraginarum deducimus, pro loco ubi Farrago feritur. A Siligine differt radícula: quam pastores Consiliginem uocant, in Maris montibus frequentem, omni pecori maxime salutarem. Corrigendus in Columella est locus, ubi de Consiliginis usu loquitur, circumscribendum esse ita, manante sanguine, tanquam olivæ reductum appareat. Legendū est, Tanquam, o, literæ ductum appareat. Hoc in transitu monuisse quid officiet?

E X M. V E R G. C O M M.

Congener, & ut Theophrastus ait ὁμοίονυρος, quod est, tritico similis Olyra est. Semen eius antiquiores Græci figura inter triticeū & hordeaceū tradiderunt. Longa est Olyra in Plinio historia: nec in Theophrasto breuis. Collectaque ex his scriptoribus simul oia, eā indicare frugē uidetur, quā nostra tempora Secalem uocant: non tamen id pro cōperto habemus. Quod certū sit, inter tritici grana, aut tritico similia ab omnibus numeratur, Græciæ magis & Aegypto quam Italiæ pecu-

Cliaris: & ob id in gentibus illis felicioe prouentu, magisq; nota. Siliginis nomen huic aliqui etiam communicauerunt. Sed si Columellæ grauissimo rei rusticæ scriptori credendum est, Siligo secundæ conditionis triticum est. Verba eius sunt. Triticæ genera plura cognouimus: uerū ex his maxime serendum est quod Robus dicitur: quoniam pondere & nitore præstat. Secunda conditio est habenda siliginis, cuius species in pane præcipua pondere deficitur. Habent nihilominus qui Olyram siliginem non dixerunt, latinos alios autores, quibus tueri rem suam possunt. Sed nos, qui ex professo hæc docuerunt, libentius sequimur. Vagæ rerum in gentibus appellationes, nec ubiq; eadem res, diuersitati, & incertitudini huic causam dederunt.

A **De Athera, idest, tenui pulculla. CAP. CII.**
A **ATHERA** ex Zea fit tenuissime molita. Est autem sorbitio, quasi liquida pulculla infantibus conueniens, & cataplasmatibus efficax.

Plinius lib. 18. **EX** Olyra Atheram constare Plinius, Dioscorides e Zea scribit. Actius etiam ex amylo. Familiaris Aegypto Athera ex Siligine, hoc est, Olyra, quæ ut dixi Arinca dicitur. Iulius Pollux, Atharen uocat pultem e miliacea farina. In Plauto, Atharathrion compositum uidetur ex Athera & Thrio, quod placentæ, aut libi genus est, dictum a folijs fici, quibus circumdatur: aut seorsum utrumq; legant, qui eius poeta studiosi sunt. Potest & Athera, & Oathrion legi, ut est apud Alexin comædiarum scriptorem. A quo locus is in Plauto festiuissimus, ex persona coeci sumitur: qui & Candauli mentionem habet. Erat autem Candaulos, siue Candylos, miscella ex carne cocta, pane, caseo phrygio, ut Athenæus inquit. Vt Phorion, ex lacte, ac melle: qui thynnides, Athera, ut inquit Aristoteles, sed ut sit Tribrachys.

D **Non** uidetur Athera hæc a Pulte, nisi liquidiore habitu differre. Nec Paulus Aegineta aliter eam sexto uolumine describit: pulcullam sorbilem ex tritico, zeauæ emollitis confectam esse Athera dicens. Obseruauimus tamē ex olyra, amylo, & milio factam pultem, Atharam pariter dici. Plinius Aegyptiorum uocem Atharam esse dixit. 22. uoluminis ultimo capite: a grecis tamen recepta, non ad pultem tantū, sed ad tubercula quæ in homine aliquando extolluntur ea uox est: quibus quæ subest ueluti tenuis et dilutior pulculla. Ab Athara hac Atheromata in abscessu dicemus.

T **De Trago. CAP. CIII.**
T **RAGOS** quandam Halicæ figuram gerit. Multo minus quā Zea nutrit, quā multum aceris habeat. Quare agrius conficitur. Aluumq; magis emollit.

Plinius lib. 18. **T** **Ragos** cognomine Sitodes, hoc est, Cerealis, ut ab herba Trago distinguat, frumenti genus est. In Hippocrate quid sit Strygis, quod ipse leuius esse tritico, & uentrem magis soluere testatur, non comperi, nisi quis pro Trago Strygite capiat.

EX M. VERG. COMM.
Non habet in grecis unam significationem tantum Tragus, sed animal, herbam, frugem, & qui sub alis sentitur uirosi odorem significat. Ideo in frugis significatione, Tragon *αἰσώδης*, id est, Tragum frumentaceum ueteres aliqui frumenti genus hoc appellauerunt, peregrinum Italianæ. Cuius breuissime Plinius meminerit, nec ultra quæ ut diceret, ex omni eodem genere graniprætulit Oreuntium, & Tragum. &c. locus est libro decimo octauo, capite septimo. Quinetiam capite eiusdem libro decimo. Inter peregrina Italianæ tritici genera Tragus hic numeratur his uerbis. Adijciunt his genera bromos, siligo exceptitia, & Tragos externa, omnia ab oriente inuecta. Est & illud ex eodem Plinio intelligendum, non frugem tantum ipsam, & tritici genus Tragum dici, sed quæ ex semine eius prisanæ similis ad medicinam conficeretur farina. Verba eius eodem capite sunt. Prisanæ conficiendæ uulgata ratio est: simili modo ex tritici semine Tragum fit in Campania tantum, & Aegypto. Hic Tragum figura similem Chondro ait, non

fatís certo intellectu, similem ne frugi dicat, quam græcorum aliqui Chondron, id est, Far nominant, an Alicæ, quæ passim Chondros etiam uocatur. Vtrunq; enim Chondros in græcis significat: si qua hic usus est uoce χῆμας, & eius tota significatio expendatur, ad frugem potius, q̃ ad alicam referenda similitudo uidebitur. Frugis enim figura aptius q̃ alicæ dicitur. Si ea quæ mox hic de Chondro ait, ad alicam magis q̃ ad frugem. Chondron siquidem alicam, non frugem uocat. Nobis inclinatur animus ad frugem magis, q̃ ad alicam referri oportere. Legendibus tamen & hoc liberum relinquatur.

De Bromo.

CAP. CIIII.

BRomus genicula quædam habet. Folio & stipula triticum imitatur. Et in cacuminibus dependentes paruulas ueluti locustas gerit, in quibus semen continetur, utile ad cataplasmata uti hordeum. Pultē huius aluus sistitur. Prodest tussientibus in sorbitione succus.

BARBARICOROLL.
Bromos correpta prima, semen est spicam ferentis herbæ, de qua & libro quarto seposita mēto est: hic enim de grano ipso potius, quia sit inter fruges, disseritur. Semen hoc natura maxime operuit, ut Theophrastus inquit. Radice copiosa innititur, multiplici culmo sparsa, syluestri fere habitu, quasi æglops, inter uitia segetis, auenæ modo nascitur, dependentibus, ut Dioscor. inquit, locustis, ut Plinius, lolij. Poetæ Bormon, & Bormacem quoq; dicunt interim.

EX M. VERG. COMM.

Quis non credat, Hauenā. cūctis notissimā frugem, hoc capite a Dioscoride de scribi: tam apposite in eo pictura naturæ rīdet. Quis etiā in hoc scriptore adeo incautus fuerit, ut quæ inter Bromon, & Aegypem, alterā in frugū, alterā in herbarū genere discrimina sunt, non facile sola eius lectione statim intellexerit. Toto em̄ genere, & partiū notarūq; historia disserunt. Hæc inter congeneres fruges a Dioscoride numerat, & describit, magno argumēto Bromon Hauenā frugem esse: illa inter herbas. Hæc culmū habere dicit: illa *Borduior*, id est, Herbula appellat. Hæc in summo dependentes paruulas ueluti locustas, duplici crure diuicatas habet, in quibus semen est: illa in cacumine καρυός, id est, q̃d semen continet, duos, tresue colore rubētes habet, ex quibus ariste capilli figura prodeunt. Hæc in medicina ad cataplasmata & tussim utilis: illa ad oculorū æglopas, & discutiendas duricies uim habet. Et ne longiores sumus, quis non credat aliā ab Aegypole Bromon. i. Hauenā esse: si Paulū Aeginetā. s. uolumine legerit seorsum de utraq; agentem: & utriq; quæ sua sunt assignantem. Hanc similes hordeo uires habere, quibus leniter & sine erosione siccet, habere itidem aliquid quod adstringat, eamq; ob causam alui fluores compescere: illam discutiendi tantū habere uim, qua duricies, inflammationesq; & oculorum æglopas sanat. *Erit quarto uolumine in Aegypole iterum de his dicendum:* quæ nunc causa est, ne in re nota ultra q̃ deceat immoremur. Quodq; nunc dictum est eo pertinet, ne quis ex eo quod Barbarus in Dioscoride ait, Bromon Hauenæ genus esse, & in Corollario de grano tantum Hauenæ dici hoc loco, de herba autem in quarto, eandem Bromon & Aegypem huic scriptori esse opinetur, & hic de semine, in quarto de planta sub diuersis nominibus actum a Dioscoride fuisse.

De Oryza.

CAP. CV.

ORyza frugum generis est, in palustribus riguisq; nascens. Medicocrem cibum præstat. Sed aluum suppressit.

BARBARICOROLL.
Oryzam, Theophrastus Oryzon uocauit. Quidam Ordeum galaticum, quia graue sit atq; candidum, appellant. Peregrinum initio semen, ex Indiaq; illatum, simile Zeæ aspectu folij, magna parte in aquis cubitorum quaternum altitudinis: ceterum effundit non spicam, sed mihi modo ac panici iubam. In Bactrianis quoq; ac Babylonia, & Suside, atq; Syria inferiore gignitur. In Italia uero multis locis. Indi hanc Farris, seu Zeæ modo pistam reddunt concoctus faciem. In eadem gente Bosmorus, frumētū religiosi genus traditur, tritico minus. Inter amnes prouenit, excussum areis torretur protinus. Iuramentoq; adiguntur messorēs, non absportaturos id se prius inde, q̃ coxerint: ne semen in alias terras comunicari possit, Strabo auctor. In Diodoro Bosporon, non Bosmoron corruptis exemplaribus intuenias.

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

C Nota omnibus etiam Oriza, parati & quotidiani in sanitate usus, præsertim quibus locis abundat. Descripsisse eam inutile, & inanis iactantiæ fuerit. Quod ueteres Græcorum medici ei tribuerunt, est: ægre concoqui Orizam; exigui nutrimenti esse; & quod hic ait, aluum subprimere.

De Halica.

C A P. C V I.

χόρδα

H Alicam fit ex Zea, quam Dicocon appellauimus. Plus alit quàm Oryza. Aluum magis cohibet. Stomacho longe utilior. Decocta in aceto, illitacq; lepras tollit. Vnguium scabrias extricat. Incipientibus ægypsijs medetur. Decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, infusum idoneum est.

B A R B A R I C O R O L L.

A Licam Theodorus hanc interpretatur, quam Græci Chondron uocant; quod & Plinius quandoq; facit. Paulus Alicam differre a Chondro putat. Alix inquit, similis Chondro est natura; nisi q; uentrem magis subprimit. Plinius, Alicam inquit, res Romana est; neq; Pompei magni ætate in usu fuisse traditur, pisanæq; antefertur sine dubio. Pisana quocq; dicitur, & olim græcè Besana. Chondros porro, ut Paulus ait, similis est tritico, plus tamē lentoris habet si cōmanducetur. Hippocrates Chondron dicit esse utilissimū cibi sorditionem. Aetius Chondrum Alicam cum dicit, Pisanā ex Alicam significat, hoc est, Alicam faris, modo fream, in sorditionis usum, ut pisanam. E Zea pista quemadmodum Chondros fiat, ut ex Olyra quocq; generosa Tragos, rei rusticæ scriptores Græci produnt. Inuenio & Hadron dici, quæ sit Chondros. Alix, & Alicion uocatur. Quæ Alix Calliæ, quo p. Chlamyde accipitur. Thessalico uocabulo Chondros, & cartilaginē significat, & melleum in ture, præsertim ceu quendam callum: quē & Pyrena Hippocrates appellat. Oino Chondros ea frumenti spēs a Græcis intelligitur, quæ a nostris Far, siue Farrum uulgo nuncupatur. Archigenes Far Chondro potius simile, q; idem uidetur existimasse. Far inquit Romæ, ut Chondros, Græcis conficitur sanitatis usu. Frumentū aqua maceratum nudatur cortice; mox siccatur in sole tunditur, sed leuiter, ita ut singula grana in partes quaternas, quinasue dissiliant. Idem Archigenes (ut meminuit Aetius) pulte ad dysentericos, ex Farre quemadmodū conficiatur docet. Ad eumq; usum Far, inquit, clusinum desydere. Ita enim legendum credo, non iliusinum, ut omnes Græci habent codices. De clusino Farre dictum est supra ex Columellæ sententia.

E X M. V E R G. C O M M.

R Romana res, inquit Plinius, Alicam est. Nobis eam cognouisse Hippocrates etiam uidetur, multo ante eum medicinæ professus. Plures fuerunt latinis & græcis Alicæ confectiones: quas fere omnes idem scriptor lib. 18. cap. 11. profecutus est. Quam tamen ille confectionem cui Gypsum adijceretur Africæ assignat, Græci ut suam uendicant: & hoc modo conficiunt. Tunditur Zea: tusaq; in calidam conijcitur aquam: statimq; exprimitur. Mox tusum in tenuissimum pollinem album, illi gypsum exigua quantitate additur; adpersoq; itidem sale sub ardentissimo canis estu, ne acescat, insolatur: & cum insolata fuerit, cribratur, & seruatur. Hæc nos ex græcis collegimus: quibus non dissimilia Plinius antedicto uolumine narrat: quæ relinquimus omnibus parata, & in eo scriptore exposita.

De Milio.

C A P. C V I I.

μύκη

M Illium in panes coactum, minus cæteris frugibus alit. Siftit pulte sua aluum. Vrinam cit. Torretur Milium, feruensq; in sacco ponitur, ut torminibus, reliquisq; doloribus auxilio sit.

B A R B A R I C O R O L L.

M Illium intra quadragesimū diem metitur. Caulis ei harundineus. Flos lanugineus, ut frumento, largior aquatio detrahit folia. Plus centū manet annos, si condact quo uenti non perueniant. Nihil leuius, mollius, aut caloris capacius Milio est. Farinā miliccam, seu fractū Milium, sunt qui Scrutū uocari putent in Horatio. Sunt quibus uasis potius appellatio ea uideatur, ex Scroto, id est, corio confuti: qd genus Græci Thylacos, id est, folles, & quasi pascuos dicunt. In quibus tamen, ut est apud Aristophanē, panis quocq; seruabatur: cuiusmodi & Panariū, & Pa

nariolū a nobis cōmode uocari potest, quacūq; confet materia: quæ uox in Varrone, & Papi-
nio poëta, & Martiali, Suetonio, Tranquillo legiū. Nos de Scruto quid sentiamus in Cicerē di-
cemus. Nam Miliariū uas a pondere, non a Milio nomen habet. Est autē, in quo exalfiunt a-
quæ, ut Athenæo placet: qd e Græcis aliqui appellant Ipnoleteta, id est, caldariū. Porro Miliū
a miliaria summa deriuatū, non a græco, Festus existimat: apud quos Cenchros, & Strabonē
Cenchrys diciū. Hippocrates Paspalem uocauit. Varro Miliū a græco deducit. Nam id Meli-
nem inquit uocant. Dioscoridēs & Theophrastus Melinē, pro Panico intelligūt. A Milio, aues
quædā Miliaria dicunt, ut eidem Varroni placet: quas ego non ausim eas credere, quas a Mi-
lio Græci Cenchridas appellant: q illæ uideantur in latino Tinnunculi uocatæ.

EX M. VERG. COMM.

Milio posteriores naturam & uires assignarunt, refrigerandi in tertio, siccandi uero in se-
cundo ordine. Habere præterea uires extenuandi aliquas Milium crediderunt, nihilq; ad con-
cipiendum & retinendum calorem aptius eo esse.

De Panico.

CAP. CVIII.

Panicum frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile. Eo-
demq; modo in panes subigitur. Eosdem habet usus. Minus ta-
men & nutrit & stringit.

BARBARI COROLL.

Panicum Helymos, etiam Melinos a Theophrasto dicitur. Melinos porro cantionis græce
nomen est. Item Elynos, siue Linos, lugubris eiulatus, quē nos Lessum dicimus. Tibia genus
quoddam apud Sophoclem uocatur Helymos, ut in Harundine docuimus. Quadagesimo
die absolui confectū, ut æstiuā omnia. Calamus harundinis, ut milio. Flos lanuginis. Durantissi-
mum inter frug. Panicum. Ideoq; Diocles medicus, Mel frugum merito appellauerit. Seras
uermiculos, e quibus Sericum uellus metitur, Panico alii quadriennio apud Seras populos,
tradit Pausanias: quinto anno Harundine recenti, quam prædulci pastu auidius carpentes dis-
siliant. Alioquin non ultra eum finem uicturi. Ex utero Bombycem eam pecti, multo fertilio-
rem q̄ uiuentium, detractam pedibus, quos araneorum modo sub arbore texentium octonos
habeant. Esse autē corpus ijs amplitudine scarabei maximi. Seras ipsos in Aethiopia sinum ru-
bri maris intimū colere, uel ut alijs inquit, placuit, in Scythia Indis contermina, qua insula ia-
cent Seria, & Abasa, & Sacæa, nihil contendo, uerum, falsumue dicat. Scio & ab alijs de hoc ia-
ctura. Illud testari bene est, Seras uermiculos, iam pridē in Italia tam multos alii, Vicentino ma-
xime agro, ut non alia re prouentus quibusdam maiores consent. Sed hos non Panico, non
Harundine, sed Mori folio uesci: ob id, multis locis plantaria sunt eius arboris frequentia. Cir-
ca Mediolanū quoq; Abiterno agro feritur, alias non magnopere in illis uisa regionibus, nunc
crebra in latifundijs Ludouici Sfortia, clari ætate nostra Principis, prædijs eius ad Ticinum
amnem, uilla magnificentiſſime substructa.

EX M. VERG. COMM.

Fœminino genere Melinen, & masculinō Melinon, Theophrastus Panicum notissimam o-
mnibus frugem uocat. Romani a paniculīs in quibus semen est, Panicum appellauerūt.

De Sesama.

CAP. CIX.

Sesama stomacho inutilis cibus. Halitus grauitatem facit, quoties in-
ter mandendum commissuris dentium inhæsit. Neruorum crassi-
ciem illitu discuit. Medetur auribus fractis, ambustis, inflammationi-
bus, coli doloribus, & cerastæ morsibus. Capitis dolores, qui æstuatō-
ne concitantur, ex rosaceo lenit. Eadem efficit herba decocta in uino. Præ-
sertim inflammationibus oculorum, doloribusq; prodest. Ex ea fit ole-
um quo Aegyptij utuntur.

BARBARI COROLL.

Sesamum, & Sesama uocatur, & Plauto poëta Sesuma, caule ferulaceo, flore foliaceo, ut
Irion. Quadagesimo perficitur die. Genus ex eo candidum præfertur dulcedine: quod & in
ceteris leguminibus contingit. Grana eius in siliquis distincta, ut Lupini, sed peculiari quodā-

D I O S C O R I D I S

C modo septa. Viride nullum attingit animal. Nihil ita emacrat solum: ut pote cui crassior & multiplicior harundo sit q̄ Milio, & radix quoq; numerosior. Sefartia, & Sefania quandoq; le gas corrupte in Columella, pro eo quod est Sefama.

E X M. V E R G. C O M M.

D Esit iam pridē feri in Italia Sefamū, neq; inter fruges nostras numeratur, pauloq; minus q̄ peregrinum, & alienum modo nobis est: quondā tam cōmune, tamq; omnibus agris satum, ut æqua esset huius & aliarū frugum cura. Indicantq; id quæ tam multa de semente eius a Co- lumella, Plinioq; & ab alijs docentur. Nouerunt tunc omnes Sefamū, nunc cum fruge mul- tis locis nomen etiā ignoratur. Et nisi ex Græcia reperatur, & Aegypto, quibus regionibus ad- huc feritur & abundat, nulla fere erit quæ ab hoc & alijs Græcorum medicis Sefamini olei ad medicinam utilitas ostenditur. Frugis oēm figuram Plinius lib. 18. capi. 7. aptissime & felici pi- ctura descripsit. Ideo nos nihil de ea repetemus: dictis ab eo tantū adijcētes, candido colore semen eius esse, dulce simul & odoratū: quod minores aues, quales fringillæ, passerēs, & car- dueles sunt, auidius appetunt. Græcia omnis eo ad dulciaria utitur in panificio tritum, reliquo pani compingentes: mox in summa panis cute integrum addito liquore aliquo inspergentes, ut retineatur, & in coctura panis concorporetur. Aegyptus oleum ex eo exprimit, quo in cibo, & omni alio domestico usu utatur, tanta copia, ut amplissima latifundia nulla alia fruge uiue- ant. Nōstra ætas, ut paulo ante diximus, uix nomen eius audit, & si aliquando utatur.

De Lolio.

C A P. CX.

λίπα βύσσο

L Olīum quod inter segetes nascitur, molitum, illitu nomas, uetera ulcera, gangrænascq; emarginat. Sanat cum raphanis, sale & ace- to feros lichenas. Et ex aceto & sulphure uiuo, lepras. Strumas quoq; dis- cutit, cum fimo columbino & lini semine decoctum in uino. Abscessus etiam rumpit, qui acrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua **D** mulsa, utilissime ischiadicis illinitur. Si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuuat.

B A R B A R I C O R O L L.

L Olīū e Tritico & Ordeo, corruptis uligine seminibus, e lino quoq; nasci non desunt qui affirmant. Negant uernā esse frugē, sed hyeme statim ineunte proflire terra, folio angusto, hir- suto, pingui, non tunicis, ut Avena multis, sed nudū: nec ptunditur. Quidā non ex tritico, aut ordeo, sed inter ea, ut in Sicilia Melampyron puenire putant. Inter Lolia flosculi uisunt, e car- ne tantū, non e cortice atq; uena, ut ceteri. Loliū Græci Aerā uocant, etiam si Calimachus pro- pila quoq; & globo Aeram accipit. Plinius certe aliud uidē genus existimare Loliū, aliud Ae- ram. Vnde farina Aerina dicit, Aeræ inquit granū minū est, in cortice aculeato. Cum est in pane, tam Aera q̄ Loliū inebriat, celerrimeq; uertigenes facit. Aiunt in Asia & Græcia, balnea- tores ad pellendā turbā, solitos Aerā inijcere carbonibus. Triticū hæc circūligando se strangu- bat, Plautus quoq; Loliū oculis officere testat in Milite: q̄ non Lolio, sed Oleo corrupte lege- batur hoc modo. Mirus oleo uiscitaret, & tam uili tritico. Quid iam? quia lusciosus es.

Sed scribendum ita fuit,
Mirus Lolio uiscitare te, tam uili tritico.

Et reliqua. Ouidius,

Et careant Lolijs oculos uiscitantibus agri.

E X M. V E R G. C O M M.

I nter uitia frugum & noxas Lolium est, omnibus nouissimum, macro solo plæruncq; proue- niens, & cum degenerauerunt uitio aliquo frugum semina, inter eas nascens: neq; enim solum in triticea, sed in omni fere alia segete & per se etiam provenit: frugum acerba pestis, ideoq; a Poëta infelix appellatum.

ἄμυλλον

De Amylo.

C A P. CXI.

A Mylum ex eo appellatum est, q̄ sine mola fiat. Optimum ex tri- mestri, natione Creticum, aut Aegyptium. Ratio faciundi Amy- li hæc est. Purgatum trimestre triticum madescit quinquies in die, & si

fieri potest nocte. Cum emollitum fuerit, effunditur sensim sine agitatio-
 one aqua, quo minus cremoris dulcedo una excludatur. Vbi molli-
 mum esse uidetur, mutata aqua pedibus calcari oportet. Rursus infusa,
 teri. Tum demum enatantes ibi furfures incerniculo eximendi. Reli-
 quumque quallo, sportisque siccatum tegulis nouis confestim torreatur fla-
 grantissimo in sole. Namque si paulisper udum maneat, acorem concipit.
 Contra fluxiones oculorum, pustulas, cauaque efficax est. Sanguinis reie-
 ctiones potu cohibet. Exasperatas fauces lenit. Lacti atque obsonijs ammi-
 scetur. Fit etiam Amylum ex zea, quae maceratur, ac eluitur uno aut al-
 tero die, & farinae modo manibus subigitur: pressaque feruentissimo in
 sole, ut ante retulimus, exiccatur. Nullius in medicina usus. Ad alia
 tamen conueniens.

B A R B A R I C O R O L L.

Amylum ex omni Tritico, ac Siligine, ut Cato uoluit, sed e Sitatio, i. trimestri: quod item Siligi-
 nis genus est laudatissimum. Inuentio eius Chio insulae debet, unde commendatissimum Plinium reperi-
 bus. Probabile uero ac laetius: utique recens sit. Quia uero etiam Placentae genus est Amylon, de
 Placentis agere tempus est: quod & in Tritico pollicitus sum. Ergo patriae nomen habent Paria, &
 Samis, & Rhodia: quae & Copram, & Coptoplacunta noiant, insignem duricia, ut Martialis pla-
 cet. Accipiebat haec & papauer, & mel, cui simile uidetur. In Festo Coctum dici legimus, & aliubi
 Coccentum. Alexandrinis Pancapra celebrabat, in modum rotae Papyro inuoluta diuturnitatis gra-
 tia. Similis haec ipsa erat, quae Itria dicunt, & a festo Sumenalia, ut consilio, quod fumen *ἴτρον* dicat.
 Constabat autem Itrion, sesamo, ac melle. Quod & a sesamo & Sesamutes, & Sesamides pilari specie
 appellant. In noie sunt & Amelon, quae alij Ametas, & Ametiscos uocant, Sunt & Splenia co-
 lore candida. Habent & Amphiphontes, sacrum Dianae ferunt, saculis urentibus circumdatis, ut Ba-
 syniae, iridi, ex triticea farina cum melle. Celebrant & Thymatides, & Samiae, & Philoxeniae. Sunt
 & Coccora, quorum meminit Demosthenes in oratione, per Cresiphonte. Sunt & Tegeniae, quae & En-
 chridas uocat Pollux. Apud Caronem est, quod uocat Enchyton: cuius & Menander meminit. Ali-
 ud hoc, an idem sit genus cum eo quod Epichytes dicit, aestimandum relinquo. Phorion nihil distinguit.
 Pollux uidetur se iungere. Epichytes certe, atque Anites quoque noiantur, ut Paphilus existimat. Ca-
 ronianae sunt & Spira, funi nautico in orbem conuoluta similis. Et Globi, siue Globuli: fortasse ipsae,
 quae Syracusani Epicyclios uocabant. Nam pastillum in sacris libi genus rotundum erat. Item Erneum,
 & Sphaerite, & Scribitae. Item Sauillum: quod Athenaeus Subitillum noiat. Et ex halica quoque fie-
 ri monstrauit, Aelius stilio Subuculum uocari scribit. Libi genus ex halica, oleo, atque melle, ut Fe-
 stus inquit. Chrysippus multa ipsa genera adiungit. Tarentinum, Crassianum, Siculum, Crustulum, Iulianum,
 Apicianum, Canopicum plucidum, Cappadocium, Hedybion, Maryptum, Plicium, Guttatum, Montianum,
 Coerianum, Tutatum, Tabonianum. Tria haec postrema Crustulacei sunt generis. Iis adiicit Mustacea,
 e mulso, quorum hodieque in Iunensi agro usus. Mustacea, Sesamata, Puriu, Gofgloanu, Paulia-
 nu: & haec quoque Crustula. Iam Lucetule, Argyrotryphemata, libi Circi, siue Circuli, ad praeparanda farina,
 & aqua, & caseo: quae circumdantur aequabiliter fundebantur hos quidam, qui magis incedere faciebant: & Lixu-
 las, & Semilixulas uocant, ut Varro inquit Sabino uocabulo. Exaphe, Crustoplacites, Oryzite,
 Pithoes, Ostracites, & quod Catillus ornatus a Romanis dicitur, lactucas, & piper, & axungia acci-
 piens, fit ex siligine. Post haec sunt Creion: quae apud Argiuos sponse ad sponsum ferunt. In car-
 bone coquitur. Glycinas ex passo & melle, Cretensis familiaris, eademque fere cum Mustaceo, quod ex
 mulso fieri docuimus. Empetras uero triticeus panis est cauius, ut in quae Placentae caseariae, ut
 in theca recondi soleant. Encris in oleo primum coquitur, mox accipit mel. Habet & Panis hoc no-
 men, ut diximus in Tritico. Cyriban: Laccedaemonis sunt, praeque, in conuiujs foeminarum circumfer-
 ri solitae, cum uirgo laudanda esset a choro muliebri. Criminites, a Crimno fit, de quo supra dixi-
 mus. Staetites ex pingui, melle, caseo, ac sesamo conficitur. Erat & panis nomen Staetites. Charisti-
 os Aristophani Placenta est, panis Eubulo. Praemium hoc in pugilijs dabatur. Apud nos hinc for-
 tasse Chalifiones, quasi Charifiones appellati ex amygdalis, & saccharo, nec alia fere materia quam
 Mazapanes, sed oblongi, fastigati in medio quasi deliiscentem crusta tumet. Ex eadem miscella
 sunt & Fungi, solitudine matronali cum feriuntur, praelatis semper quos sanctimoniales ipsae

Pli. li. 19. ca. 78.

De Placentis.

B

C finxerint. Epidætron sub finem cœnæ mensis apponebatur: unde nomen. Nanos panis uide-
tur placētaceus magis q̄ placenta, constat caseo & oleo. Psorhia, siue ut aliq̄ Psathyria, sunt qui
micas panis, quas & Attaragos uocant, ita nominatas putent. Attaragus porro & pro rimula
in pane ignis ui facta capitur, & oīno pro uilissima & minima quaq̄ re: ut Ecfa apud nos: unde
uerbum Ecfa facio, de quo Festus. Polluci Attaragos est superior in pane crusta, sicut in ima E-
psethia. Sunt qui genus placentæ fecerint. Taganitæ a patellis ac sartagine dicuntur. Elaphos,
a mensis nomine quo fingebat. Sicala est Amorbites. Aliud ab hac genus est Amoras appella-
ta. Oedepæsa Cōi celebrant. Syracusani Myllos, ex sesama, & melle, muliebris pubis specie: q̄s
fœminæ Dearum focis & altaribus circūferant. Nastos e nucibus & intestinis, & fartilibus, ad
iecto melle fit atq̄ lacte. Vnde dicitur Nastos, quasi fartum. Ab Erinaceo nomen Echinus ha-
bet. Ab Hemina Coryliscus. A tritico Pyramuntes, & ab hīs diuersæ Pyramides, fortasse haud
hīs dissimiles, quas Cato Graneas triticeas appellat. Pyramides porro in peruigilijs dabantur:
quasi præmia hīs, qui nocte tora insonnes excubassent. Quidam tamen & Pyramuntas hoc ge-
nus uocabant. A caseo, & usu cribri Tyrocoscina dicunt. Ab hīs differunt Hypotyrides appella-
tæ: quas e caseo, lacte, ac melle condūt. Nam Pityrides, siue ut aliq̄ quidā legunt, Epityrides, &
Epityra, oliuæ genus est: ut aliubi docuimus. In Creta fit a uentre, Gastris uocata, e nuce, tha-
sia, & auellana, & amygdala, & papauere. Item pomis, & sesamo, & pipere quadrangula figu-
ra. Ab hīs est Poltos dicta: quam nos Pulrem uocamus. In Catone quidem punicæ fit Pulis
mentio inter Placentas: forte non dissimilis a libo eo, quod punicum uocabant, q̄ ex Africa
uenisset, & Probum cognominabatur. A melle Melicerides. A suibus Chœrinæ. Latina sunt,
& sacris dicata libi genera quæ Fertum, & Strues appellātur: unde Strusetani, qui ea ferre con-
sueuissent. Strues uero dicebatur, q̄ erat digitorum coniūctorum similitudine: qui superie-
cta panicula, in transversum continebantur. Item Libum farreum a farre. Libum uero, q̄ pri-
us libaretur q̄ esset coctum, ut Varroni placet, dictum est.

De Fœni græci Farina.

C A P. CXII.

τῆλιν

D

G Ræci Telin, aliq̄ Carpon, aliq̄ Buceras, aliq̄ Aegoceras. Latini Fœ-
num græcum appellant, Aegyptij Itasin. Vis farinæ est molli-
re, dissipare. In aqua mulsā decocta aduersus tam internas, q̄ externas
inflammationes efficaciter illinitur. Lienem cum aceto & nitro trita ex-
tenuat. Succus decocti eius, fœminarum malis subuenit, & siue tumor,
siue præclusio sit uulvæ, fouentur, & insident. Decocti cremor, capillos,
furfures, & manantia capitis ulcera purgat. Locos laxat & emollit, si cum
anserino adipe pessi uice subiiciatur. Viride cum aceto utilissimū imbecil-
lis partibus, & ulcera sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus tene-
smos, fœtidamq̄ dysentericorū proluuiem. Oleum quod ex eo exprimi-
tur, ex myrto, capillos & genitaliū cicatrices abstergit.

Plin. li. 24. ca. 19.
Columel. li-
bro 2. ca. 11.

B A R B A R I C O R O L L.
F Enum græcū a Theophrasto Buceras uocat. Ab aliquibus Ceraitis. Epiceras Hippocrati,
quonia semen habeat simile corniculis: unde Siliquā nōnulli appellant. Plinius Siliciam, Var-
ro Siliculam. Inuenio & Carpum in nostris, & Græcis auctoribus uocatum: q̄ q̄ & pro balsa-
mi semine Carpum fere accipiunt. Item Carphos pro Fæno græco, quasi flocculum, siue aren-
tem furculū. Dioscorides Boron quoq̄ dicit uocatā. Quidam Lobon, hoc est, siliquam legen-
dum, non loton credunt. Ego & lotum dici posse uideo, ut in Anoni diximus.

E X M. V E R G. C O M M.

F Aenogræci a principio statim numerantur a Dioscoride aliæ appellationes aliquot. Ea-
rum plures a siliquarū figura, quas corniculis similes habet, factæ sunt. Neq̄ hæ quidem noui-
tiæ, posteriorumue temporum, sed uetustissimæ sunt, & a Theophrasti temporibus. Siqui-
dem auctor ille libro quarto de plantarum historia, a bubuli cornu figura Bucceron appella-
uit. Eademq̄ ratione aliq̄ non a bubulo, sed caprino cornu similitudine accepta, Aegoceron
Fænogræcum dixerunt. Aliq̄ a cornu simpliciter Ceratida, ^{uigæ} enim græcis cornu est.

De Lino. CAP. CXIII.

LINVM aliqui Linocalamin uocant, alij Annon, alij Linon agri-
on, Romani Linum, Poeni Zeraphöes. Vulgo notum est. Cu-
ius semen easdem quas foenum graecum uires habet. Discutit, & emol-
lit omnem intus forisq; inflammationem, cum melle, oleo, exiguaque
aqua decoctum, aut melle cocto exceptum. Vitia cutis in facie, uarosq;
crudum tollit. Illitum cum nitro & ficulneo cinere, parotidas, duricia-
que discutit. Vlcera quæ serpunt, fauosque, cum uino decoctum expur-
gat. Vngues scabros eximit, cum pari modo nasturcij & mellis. Vitis
pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis uicem substituatur. Tussim
lenit. Venerem stimulat, si farina piperis & melle exceptum, pro placen-
ta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum, uuluaq; erosio-
nibus immittitur. Alui excrementa euocat. Ad uulua inflammationes
in deflectionibus perquam utile.

BARBARI COROLL.

Linum, a Græco sumitur. Semen eius Linospermon appellatur. Oleo seminibus expresso,
fraces, & recrementa quoq; ipsa reponuntur, saginando iumentorum generi, præcipue bubus
obesitate sola insignibus futuris. Quales ad nos Mediolano coronati ueniunt, Principibus q̄t-
annis officij gratia donantibus, Visceratione hinc solenni orta, Magistratibus diuisa carne glo-
bulis, quos quia fere pares sunt, Sociolos consuetudo appellat. Quidam nō Sociolos, sed Suc-
cidulos, a suilla uisceratiōe uocari maluit, quæ singulis annis ante Curia uenationis die agit. In-
ter Lini genera est Choleicum: quod tamē Sardonicū uocant Græci. Est & Aegyptium: a quo
Xylinae uestes, quas & Gossampinas dixere. Hoc iurisperiti Lanam ligneam appellant. Est aut
em Gossampinus, siue Gossipio, siue Xylon, fruticulus e superiore parte Aegypti, etiam in Ita-
liam delatus, fructum ferens barbaræ nuci similem, plenum lanugine: nec alterum Lini genus
est, quod huic candore, aut mollicia præferri putent, quanq; firmitatis in eo parū. Huius pu-
tant esse generis quod uulgo a pocilli credo forma Cothonem uocamus, siue a mali similitudi-
ne coronci, quod in eo gignitur. Id maturitate hialcēs, lanuginis pilas ostendit. Folia huic uitiū
minora. Aliqui Gitonē, a Git, cui similem fere gerit in capite folliculum, appellant, Draconis
acetarij e Lini semine, ut post dicemus, nascentis, folia ipsa testantur originem.

Plin. libro. 19.
in præfatione.

B

De Cicere. CAP. CXIIII.

Cicer satium aluo idoneum est. Vrinam ciet. Inflationem pa-
rit. Colorem commendat. Menses ac partus expellit. Lac au-
get. Cum eruo decoctum, illinitur ad inflammationes testium, uerruco-
sas informicationes, ad scabiem, ulcera capitis manantia, impetiginēq;
Contra carcinomata, & ulcera quæ cacœthe uocantur, cum melle &
hordeo prodest. Alterum genus arietinum nominatur. Vtrumq; cit u-
rinās, dato cum rore marino, hydropicis, aut regio morbo laborantibus
eorū decocto. Legunt ea exulceratam uescicam & renes. In uerrucarum
formicantium pensiliumq; genere, prima luna singulis granis singulas
tangunt, eaq; grana lintheolo deligata abiici post se præcipiunt. Ita de-
cidere eas arbitrantur. Syluestre Cicer, folijs Satiuo simile est, odore a-
cri. Sed semine discrepat. Idem quod satium præstat.

BARBARI COROLL.

Cicer Erebinthos a Græcis uocatur, Legumina gallicani, ut Varro ait, nōinant Legaria.

ἰρίκιον ὀνίσιον

C Dicuntur ita, quoniam uellantur e terra, non subsecuntur ut fruges. Eadem Gellius etiam Legu-
menta nominat. Inter hæc Cicer altissima radice adhæret. Floret diutissime ut Eruum: quadra-
gesimo die uellitur: caulis admodum lignosus. Ciceris aliud Arietinum, Crios a Græcis uoca-
tur. Aliud Columbinum, idemq; Venereum, Erui similitudine, Orobiaeos ob id dictū, a Co-
lumella Punicum. Siliquæ Ciceri rotundæ. Vni leguminum florenti, pluuiæ officiant. Erucis
nascentibus, eluta falsilagine, nigrum & rufum candido ualidius, herbas omnes enecans, sed
tribulum celerrime. Sideratio Radicis & Erucæ, quas aliqui Vricæ, & Græce Campas uocāt,
Ciceri propriæ dicuntur. E Cicere corrupto nullum sit animal, contra q̄ in cætero frugum
genere. Quanq; hoc & seminibus olerum, & quibusdam alijs commune. Nigrescit hoc cū cor-
rumpitur. Durat Erui modo annos. Ciceris generibus syluestre adiicitur, a Dioscoride, Gale-
no, atq; Paulo, cuius uis alia duo excedat. Orobiaeos, siue Orobias, calidior est Arietino, sub-
amarusq; ut Eruum: unde nomen. In Columbino, & Orobiaeon, & Syluestre contineri puto.
Nasci & in India sum Cicer aiunt, diuersum omnino genere. Cæterum tam simile, ut mensis
appositum, dignosci fere non possit. Cicerculam uero Theodorus putat esse, quam Lathyron
Græci uocant, folio non rotundo, ut plurima leguminum, sed oblongo: caulis humi serpens,
ut piso: quaterni & inequales grano sunt anguli, ut Plinius inquit. Idem Theodorus, Ochron
uocatum, interpretatus est modo Eruiiium, modo Eruiale, modo Cicerum. Folio ut Cicercu-
la oblongo, uermiculus, ut item Cicercula, obnoxio, secutis post imbres caloribus. **C O L V**
M E L L A quidem Cicerculam similem piso tradidit. Ciceram uero non tam leguminibus,
q̄ pabuli generibus annumerat. Nec Cicerum, sed ut dixi Ciceram uocando: quæ Bubus Erui
loco detur, fresa in Betica, nec hominibus inutilis: sapore nihil differens a Cicercula, colore tã-
tum discernitur, quo sordet obsolentior uidelicet, et nigro propior. Sunt qui Ochros etiam
Phasilos appellari scribant. Habentur & Dolichi uocati: quos Theodorus a Plinio sumptum
interpretatur Siliquas, qui & Lobi, siue Lobia nominentur: q̄ soli fere leguminum, ut ingi Aë-
tius, cum thecis suis mandantur in patinis. Scandunt hi pedamento cui accubant, prælongo af-
fixo: ita enim reddi putant frugi: contrahens eruginem, ni fiat ita. Semen eius æuum non patit,
breuiq; marcescit ut aphaca. Nec defunt qui Lobos, siue Dolichos a ueteribus, pro Phasiolis
dictos existiment: et a recentioribus Pisos. Cæterum Theophrastus, & ante Theophrastū Hip-
pocrates, Pisum a Dolicho manifeste separauerunt. De Phasiolis nusq; meminit. Nisi quis Pha-
siolos ab eo significatos Dolichorum appellatiōe censeat, ut Aetio placere uideo. Sed nō sem-
per Paulus Pisos, & Ochros, & Phasios, a Lobis, siue quod idem est, Dolichis manifeste se-
iunxit. Illud quidam putant Lobos esse, nō candidos istos et triuales Phasios, sed rubentes
ex melle herba. Alioquin idem Paulus in quadā compositione, Phasios requirit albos: qua
dicitur: cuius Africanum genus unum haberi meminit. Idem ualuulas thecasq; Ciceris, Cori-
las appellat. Quod admonitionis gratia, non imitationis retulimus. Inter legumina & Acan-
feruntur, a duricie uocati, quod eos *κλῆρυ*, id est, frangere non sit, lenti similes, ut grammatici
quidam interpretantur. Ego haud scio, idem, an diuersum id genus sit ab Aracis: quos Aetius
tantum, & p̄fici difficiliore. Aracos inquit Theophrastus, inter aphacas, siue lentem nascitur,
res dura & scabra, & proinde uilis. Hippocrates Aracida nominat, ab aliquibus dicta Lecithos.
Est & Aracidna, & alia q̄q; Aracos in Tubere dicenda. Quidam Lecithō p̄ genere accipiūt, ad
Pisum, & Aracum. Nec scio, an h̄s assentiā, qui Lecithō ab oui luteo, cui similis colore sit Ara-
cus, deducūt putent: cum scriptura fortasse diuersa sit. Galenus certe Lecithō p̄ lente, cui detra-
cta coriū est. Proinde contrariū ei genus esculenti fortasse fuerit: q̄d Horatius illo uersu insinuat,
Vt Plautus quoq; Scrutea, & Collubia in hūc forte sensum appellauerit in Persa. Ceterū Hora-
tiani forte nō scruta, sed scuta legas, pro uasculo rustico. Vnde Scutiscum Catoni se penume-
ro, Matellum, Trullum, Scutiscum unum: Matellā, Trullā, Nasiternā unam. Qanq; pro uase
sunt q̄ coeperint Scruta in Horatio. Cæterum Collubia, & Collubiæ sunt, quæ Tragemata etiā,
& Bellaria dicunt, Ciceris frixi, uuarumq; passerum uilia munuscula, ut Hieronymus interpreta-
tur. Vnde Colybitas, pro numularijs mutatiūm fœnus exercentibus, uocari cœptos asserit:
q̄d genus a Polluce nominat Colybos. De Colybo & ante diximus. Propterea locū in Plauti
Persa eum, non frutea, & colluthea, ut omnes habent codices, sed Scrutea, & Collubia legēdū
putamus. Fortasse Scrutea sunt, quæ græci Catachysmata, hoc est, missilia uocabant, spargis

Theoph. lib. 9
capite. 6.
Pli. li. 18. ca. 12.
Col. li. 2. ca. 11

Alita: siue a uilitate, ut diximus, siue qm̄ e pellicij folliculis, quos & Pasceolos uocamus, effusi di consueuissent. Quid si Coluthra legamus? cū maturas ficus ita græci uocent, ut inquit Philemoni. Nam strutea pro cidonijs quoq; sumi possunt. Apud Aristophanem & comicos Lecithopolæ mulieres dicuntur, quæ uilia quædam uenditant, quasi Nugiuendulæ. Sidonius Apollinaris in epistolis, nunc inquit quædam friuola, nunc ludo apta uirgineo, Scruta donitabat, hoc est, scutilla quædam & quisquilias, & nihili munuscula. Meleager Græcus autor, uolumen singulare scripsit, Lecithi & Phaces comparisonem continens. Porro legumen omne, ut inquit Athenus, tribus modis manditur. Aut enim ex eo fit quod Etnos dicitur, ut ex faba & piso, quam nos Cōchin uocemus, si placet. Quancq; quid sit Conchis proprie, dictum est a liubi. Aut Lecithos, ut ex araco. Aut Phace. Aut ex aphaca & lente: quod nos Lenticulā. Theophrastus Lori ægyptiæ radicem decoctam Lecithodem fieri cibo gratam scribit, hoc est, araci, uel leguminis alterius in modum. Quancq; Theodorus albumen oui, quemadmodū in ea uoce luteū intellexerit, uehementer miror: cum Lecithos, uitelū oui potius, q̄ candidū significare uideatur. Hoc primi uidimus, seu recte, seu perperam. Certe si errauimus, utilis & eruditus error futurus est. Nec illud tacuerim, Lecytho pro gutto oleario, & ampulla falso a quibusdam coepisse, Lenticulam uocari. Nescio q̄ perite: cum Lenticula uasculum non sit magis, q̄ id qd græci Discū uocant. Defendit eos fortasse Apuleij de strigilecula, quæ lenticulari forma uisebat, autoritas. Satis est locum notasse. In summa, Lecithos, pro legumine, aliquando pro putamine periora scribitur, pro uitello per, y, p ampulla per, u, potius q̄ per, y. Hęc fortasse curiosius q̄ debui, psecutus sum, sed imorandum fuit, quia & Græcis & Latinis multa hinc caligo p̄diu fuit.

¶ De Faba. CAP. CXV.

Faba inflationem excitat. Aegre concoquitur. Tumultuosa somnia facit. Tussi confert. Carnem gignit, media calidi frigidicq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esitata, dysenterias et coeliacorum profluuia sistit. Contra uomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendū abijciatur. Viridis plus ne-
Bgocij stomacho exhibet, maioremq; flatum parit. Lomentum eius & per se, & cum polenta illitum, inflammationes quas uulnus excitauit, mitigat. Cicatrices concolores facit. Turgentes prædurasq; mammas, etiam si inflammatione tententur, adiuuat. Lac restinguit. Furunculos, sugillata, parotidasq; cum scenigræci farina & melle discutit. Cum rosa autem, thure & ouicandido, procidentes oculos, tumores, uuasq; reprimit. Subactum uino, suffusos ictu oculos recreat. Manducata sine cortice Faba, ad auertendas fluctiones, fronti illinitur. Decocta in uino, testium collectiones sanat. Quo tardius pubes erumpat, pueris imo uetri illinitur. Viuliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescent, et minus alimentum capescunt. Cum polenta scisso alumine, et uetere oleo impositi cortices, strumas discutunt. Decocto earum lanæ inficiuntur. Faba dempto cortice, in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluctionibus ab hirudine concitatis. Namq; eas suppressit, si semisecta apprimatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Faba Græce Cyamos, Hellenicos uocatur, ad differentiam Aegyptiæ. Aul. Gelius & Festus Fabam etiam Fabulum appellant. Plautus in Stich. Conuiuium, inquit, hoc satis est pro opibus nostris, satis commodule, nucibus, fabulis, ficulis. De quo & in Zea diximus, Græci Cyamon uocant, & primam in manu concretionem lactis. Eadem parte scapus & radix funditur, idq; in omni leguminum genere. Non diuersa, ut in frumento singularis ei radix, sed capillata fibris, ut cætero legumini. Folij exit multis, ut pisum atq; cicer; non singulis, ut triticum. Dic-

Pli. li. 18. ca. 12.

Cibus quadraginta floret, non uniuersim, ut frumentum, sed particulatim, ut reliqua legumina. Post florem totidem diebus perficitur, quantum legumina nulla. Differunt folio rotundo, ut maxima pars leguminum geniculato & inani caule, lignosissimoque post cicer. Sola fere legumini scapo recto assurgit. Circa Philippos Ateramon uocant, in pingui solo herbam, qua necantur Fabae. Teramon de qua in Macro. Nonnunquam porro fieri, ut Teramos in Ateramō transeat, cum uapore atque halitu terrae madidam, indigena quidam uentus efflauerit, ut Theophrastum Plinius intelligit. Aliter Theodorus, qui duo illa, Teramon, & Ateramon, siue Ateramnon, pro eo scitabili & incoctibili, non pro herbis ita nuncupatis accipit. Theophrastus certe alio loco facile significat, ueriores Theodori quam Plinii sensum fuisse. Ateramna uulgo Legumina Graeci uocant, inobsequiosa & contumacia. Quod genus seminis etiam Ceraifoloni uocatur a Platone, superstitiosa origine, quasi sterilia & irrita proueniant, quae per bouum cornua serendo eecidissent in terram. In Macedonia & Thessalia moris est, arua fabis florentibus inuertere: quia legumen id solo proficit, quasi pro stercore. Nascitur in marcescente Faba uermis, quem dixi, Mydas. Siliquae, Fabarum folliculi sunt. Fabalia uero, purgamēta earum dicuntur, autem Plinio. At nigrum id, quod in summa ea uisitur, Hilum uocatur: cui respondet in proverbio apud Graecos Gry: etiam aliud significat, hoc est, unguis fordecularum. Legumina Graeci Ospria, & Theophrastus Chedropa nominant. Aristophanes Beleeceōs, ut quidam interpretatur. Fabae genus quod Marficum uocat, uere seritur. Faba cum suis corticibus elixa, Conchis appellabatur, ad discrimen fresa: nam Conchos aliud est eius genus est, ut in Hordeo monuimus. A Fabis, Fabaginem Catō dixit, & Plinius Fabalia. Interdictum esse Pythagoricum, cibo Fabam. Inualuit opinio contra uerum. Sicubi porro detestatos usum eius ueteres inuenias, non Cyamon, id est, Fabam in eo uerbo, sed Venerem intelligi demonstrat oportere Gelius. Tota Insubria & Liguria, recentes Fabae uenditum uoce nuncupantur Baianae. In Etruria & Latio, Scaphi. Vtrumque originem habet eruditam. Nam & Baianas Apitius ipse appellat, & Scapos fabarum Plinius decimo octauo libro. Inuentus est inquit Scapus, ceterum Fabis onustus, ut inde uulgo Scaphi, pro Scapis, tenuis in flatilem diuerticulo uocentur.

αὐγύπτιος κίβανος

D **A**egyptia Faba, quam aliqui Ponticam uocant, in Aegypto plerumque prouenit. In Asiae etiam, Siciliaeque lacubus inuenitur. Folia habet ampla, etiam si ad arborum frondes comparentur, caulem cubitalem, digiti crassitudine, florem roseum, dupla papaueris amplitudine. Et ubi flore exuitur, fert folliculos loculis similes, in quibus Faba supra operculum bullae modo prominet. Cibotio ideo nominant, id est, arculam, quoniam feratur ipsa, humenti glebae mandata, & ita in aquam demissa. Radice firmatur harundine crassiore, quae cruda coctaeue estur. Ei Colocasiae nomen est. Faba uiuens manditur, & exiccata nigrescit. Graeca magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & stomacho utiliter. Dysentericis, celiacisque prodest, in sparsa polenta uice lomēto. Datur quoque in pulte. Cortices in uino mulso decocti, si ternique inde cyathi bibantur, magis proficient. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio uiride spectat, gustu amarum, si tritum et cum rosaceo coctum instilletur.

Theoph. li. 2.
de causis plantarum cap. 19.

B A R B A R I C O R O L L.
Faba Aegyptia, & Colocasia idem sunt, ut fructus tamen ipse Ciborium dicatur, radix uero Colocasia, & Mazitanion ab Aetio. Pocilli genus ab hac similitudine, Ciborium uocari scribit Athenaeus. Paludibus stagnisque nascitur. Caulis ei longissimus redditur, decem pedum a Strabone: uel ut Theophrastus & Plinius, cubitorum quaternum, digitali crassitudine, mollis & sine geniculis, rimae intus per totum, ut Lilio. Propter quod & Lilium Aegyptium ab Herodoto uocatur: quemadmodum & Lotus ipsa. Calyx in cacumine rotundus, uesprium fauo similis. Tringenta plurimum loculis: qui singulas singuli contineant, non quidem omnino testas, sed paulo extantes. Ipsi quoque calyces aequi extant, latissimis circa folijs, quae singulas Fabas ob-

re uideantur. Magnitudo ijs, ad similitudinem eorū, quæ ut Plinius inquit, Personata in nostris fluminibus uocatur. Atterenti Fabas, amaritudo uel odore prodit. Radice crassissima, pleniorque Harundinis, rimosa ut Scapus: q̄ & Araneosus sentiri dicitur, ubi coctus est, in mādendo, ait Plinius, filis ad morsum ut in lana sequacib. autore poeta Martiali. Thyrsus uero inter folia emicat spectabilis, a Theophrasto, Pilos ut arbitrantur uocatus. Quæque Theodorus Pilulas interpretatus id uidet. Alij calicē rotundū in eo uocabulo significari uoluerūt. Indigenę implexis Colocasie folijs, in uaria specie uasorum potitare gratissimū habet. Nascitur sponte, ac satius quo mō & in Italia quoque. Non excōquit Syriæ, Ciliciæque, & in Trōrone Chalcidis lacu ad maturitatē omnino p̄uenit, sed magnitudine deficitur. In India quoque fluuiio Hydaspē cernit, Alexandro id falso in coniecturam trahente, nauigari posse in Aegyptū inde. Fructus q̄dem, ut dictum est, amarus, sed ipsa radix perq̄ lauta cibus. Seritur in limo paleato, ut descēdat, cōprehendatq̄: ob id Spirobolos quoque dicitur. Vbi semel coaluit, durat ad infinitum. Refugiūt eā Crocodili spinis horrentem, caule ac radice: oculis timentes, quos hebetiores habet. Nominatur & Taba quædam Indica, ex arboribus, in filiquis digitorum decem longitudine dependens, mel se plenius, sed quo gustato difficile sit euadere, ut inquit Aristobulus.

EX M. VERG. COMM.

Q̄uod ex Aegyptia faba usum in Aegypto nostra ætate habet, radix sola est: quā coctā, sed in taleolas prius seclā incola quonidie comedunt, odore cotonei mali, f̄ lēbi, nobilitatq̄ cōmunem cibum. Nec minus tota Aegypto Colocasia nunc, seruatō antiquo nomine, q̄ nobis Rapa nota sunt. Falsum est quod antiquiores omnes de ea tradiderunt, non nisi in aquis nasci: quoniam in arida, sed non procul a mari, & humido harenosoq̄ solo, etiam sata, & per se prouenit. Licetq̄ nunc totos Colocasijs confitos agros, ut ferunt, supra Tripolim urbem ad mare, non in iocundo spectaculo uidere. Latissimis siquidem & numerosissimis folijs uirent, quibus solis æstus in calidissima regione etiam arcent.

De Lente. CAP. CXVII.

LENS SV O cibo aciem oculorum obtundit. Aegre concoquitur. Stomachum male habet: eumque, & intestina inflat. Sed aluum cum cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facillime coquitur, nihil atri in maceratione reddens. Vim habet adstringendi. Quæ ex causa aluum cohibet, si detractio antea cortice discoquatur accurate, priusq̄ aqua inter coquendū effundat. Quippe primū id decoctum uentrem resoluit. Somnia tumultuosa excitat, Capiti, neruis, ac pulmōi inutilis. Melius suo fungetur munere contra alui fluctiones, addito cū aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mēspilis, sorbisue, pyris thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quæ post decoctionem abijciuntur, uel uuarum rhois, quæ obsonijs insparguntur. Verum acetum cum eo diligenter percoqui debet: alias aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lentis delibrata deuorari, proderit. Decocta cum polenta, & illita, podagras lenit. Sinus cum melle glutinat. Crustas rumpit. Vlcera purgat. Decocta in aceto, duricias & strumas discutit. Cum cotoneo, aut meliloto medetur in inflammationibus oculorum, sedisq̄, addito rosaceo. Sed in amplo sinu, aut inflammationibus sedis, quæ maius remediū exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosis, adiecto melle decoquitur. Nōnis quæ in gangrænā euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, & his quæ serpunt, igni sacro, pernionibusq̄, ut antea dictum est. Contra turgentē

C mammas, et usq; eo duras ut quandam cartilaginis speciem referant, cocta in aqua maris & illita auxiliatur.

Pli. li. 12. ca. 12.

B A R B A R I C O R O L L.

Lens feracissima leguminum, siliquis in latitudinem molliter fusis. Melior quæ coctibilior, & quæ maxime aqua absorbet. Enecat Lentē herba Securigida, ut Plinius Aparina, siue Lappa, ut Theophrastus. Nascitur & sua Indiae Lens fenogrecō similis, quam circa occasum vergiliarum demetunt. Differt hæc a nostrate omnino. Sed illatam cibo discerni posse negant ab ignaris. Aegyptia Lens a Marone Ouidioq; laudatur. Pelusiaca ob id uocata. Græci Lentē Phacon, Lenticulā Phacen uocant; quo nomine & Vlixis soror fuisse tradit, ab alijs Callisto appellata. A quibusdā non Phace, sed Phaceus: ut Orpheus, & Peleus uocata est Lenticula: sed ij peregrinitatis in comædia coarguitur. Laudes Lenticulæ apud autores Græcos legas, præsertimq; Pythagoristas: utiq; si rationē Zenonis sequare, præcipietis, ut in eā Coriadrū .i. parte indat.

ἢ οὐ δὲ φακὴν ἡμετέρας δολιχάτων κορίαννον.

Gel. li. 13. ca. 28

Congruūt & cū ea Bulbi. Ob id & Bolbophace dicta est a poeta quodam. Vnde scitū illud ortum uidetur, contra perditos gulones, Lentem laudar, ut apud Phalereum Demetrium est. Notū & prouerbiū apud Varronē in satyra Menippæa, τὸ ἐν τῇ φακῇ μύρον, hoc est, unguentū in Lenticula: ut obiter emaculemus inolitum, atq; adeo receptum in Aulo Gelio multis feculis errorē, ubi τὸν ἐν τῇ φακῇ μύρον, pro eo quod est, ἐν φακῇ μύρον legitur. Et ne librarij mendum fuisse uideretur, Theodorus Gaza locū interpretatus est, fabulam in Lenticula, hoc nos Atheni uiri doctissimi testimonio corrigendū monemus. Hoc adagiū, contra cacozeles, et apirocalos inuētū est: quos, ut est apud Senecam, & eundem Gelium, Infrunitos appellamus, qui nullo discrimine rerum quas agunt, aut dicunt, habito, pari nixu, cuncta moliantur: & eadem ornamenta, si guras, emblemata, conuenire omnibus locis et temporibus existimant, Cuiusmodi et illud est, τὸ ἐν λαγάνοις πίπρι, hoc est, Piper in oleribus.

☞

De Phasiolis. C A P. CXVIII.

Φασόλιος

Phasioli inflant. Spiritus cient. Aegre coquuntur. Virides cibo aluum emolliunt, ad uomitiones idonei.

B A R B A R I C O R O L L.

D De Phasiolo in Cicere disserui. Habetur & genus herbæ Phasiolus, ut post constabit. Græci pro legumine Phasiulon, & Phasiolon, & Phasilon quandoq; appellant. Nostri Phascolum, & Phaselum, Columella.

E X M. V E R G. C O M M.

Dolichum, nescio an Theophrastus aliquando idem legumen hoc appelleret. Piso enim magis q̄ Phaseolo congruunt quæ de Dolicho ab eo dicuntur. Verba eius lib. 8. de plantarum historia hæc sunt, ὁ δὲ δολίχος ἐὰν παρακαταπύρην τις ἐξέλα μακρὰ ἀγαθαίνῃ καὶ γίνεταί κάρπιμος, ἢ δὲ μὲν φαύλος καὶ ἥρως ὁ δὲ δολίχος. Quod est. Dolichus uero, si prope longius lignum defixerit aliquis, ascendit, fecundusq; fit: sin minus, deterior, & rubigine uitiatur. Paulus tamen Aegineta primo uolumine quo capite de leguminibus agit, de Phaseolo his uerbis usus est. ὁ δὲ φασόλιος καὶ δολίχος καλούμενος. quod est, Phaseli uero, qui & Dolichi nominantur. Magna utriusq; autoritas. Neq; ego ausim pro re, quæ ad utramq; partem trahi potest, inter eos censere. Dolichon enim longū græcis dicitur, quod Phaselorum siliquis msgis competit: & Pisum per se stare nequit ideoq; adiunctis sibi lignis, ut Theophrastus ait, nititur.

De Eruo. C A P. CXIX.

ἔρουος

Eruum paruus frutex, omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in ualuulis habens, e quibus farina fit nomine Eruina, ad multos medendi usus conueniens. Eruum capitū onerosum est. Aluum esu turbat. Sanguinem per urinam extrahit. Elixo boues saginantur. Paranda farina ratio hæc est. Vberiora grana, candidaq; deliguntur, permiscendoq; aqua resperguntur, donec sufficienter cōbibant. Postea torrentur, usq; dū hians cortex disrumpatur. Molitaq; farinario cribro incernuntur. Postremo farina reconditur. Hæc aluo utilis est. Urinam ciet,

Meliorem colorē efficit. Sanguinē per uesicam, aut aluū cum torminibus **A** elicit, si largius in cibo aut potu assumat. Vlcera cū melle purgat. Lentigines, & uitia cutis in facie, & maculas, totumq; corpus emendat. Nomas, gangrænas, duriciasq; serpere non patiē. Mammārū duricias emollit. Astra ulcera, quæ theriomata uocāt, fauosq; emarginat. Carbunculos rumpit. Cum uino illitū, moribus uiperarū, canum, hominūq; medetur. Vrinae difficultates, tenesmosq; ex aceto mitigat. Tabidis, qui alimentū non sentiunt, tostū, & in nucis magnitudinē melle collectū, conuenit. Eius decoctum perniones, & pruritus in toto corpore sanat, fouendo.

B A R B A R I C O R O L L.
ERuū, Herbumue, aliud candidū, aliud rufum. In siliquis grana sine septo habet, quæ se inuicē quasi tangāt, ut in Pīso. Siliquæ forma teres, & ad rōnē grani Cylindracea, ut itē Pīso. Patientissimū uetustatis est atq; cicer. Genus est & Erulīa leguminis, quā nōnulli falso Durellā uulgo dictā interpretant: propterea, qd hodie quoq; in Vmbria uocant Erulīā agricolæ, qd in Gallia & Venetia prouincia Dorā, Durellāq; folio crasso & oblongo leontopodij, sed maiore: capitulis semē includētib; minutū, simile nasturtio, tantū exilius flore cādido. Scopas ex ea ruri faciūt. At Erulīa, syluestris herba ē, amaritudinis extimig, colore & folio cicercule, qd minore.

Pl. li. 13. ca. 15.

De Lupinis. **C A P. CXX.**
Satius Lupinus notus est. Cuius farina cū melle delinctu, aut potu, **B** uentris animalia expellit. Ipsi quoq; macerati, & cū sua amaritudine esitati eadē efficiunt. Decoctū eorum idē mūnus pręstat, cū ruta & pipere potū. Quare lienosis prodest. Eodē ulcera tetra, quæ theriomata uocant, gangrænas, incipientē scabiem, eruptiones pustularū, ulcera in capite manātia, uirilignes, maculasq; fouere utilissimū. Menses & partus extrahit, cū myrrha & melle subditū in uellere. Forū farina cutē liuioresq; corrigit. Inflammationes cum polēta & aqua mitigat. Tubercula, & coxendicū cruciatus, ex aceto lenit. Strumas in aceto cocta illitaq; dissipat. Carbunculos rumpit. Decocti cœlesti aqua, donec in liquamētū crassiciem redigantur, faciem abstergunt. Medentur pecorū scabiei, cum radice nigri chamæleontis, ita, ut tepentē decocto abluantur. Cit urinā radix cum aqua cocta. Lupini triti, ubi maceratu dulcescere cœperint, cum aceto poti, fastidium detrahunt, & cibi auiditatē faciunt. Gignunt & syluestres Lupini satiuis similes, sed omnino minores, qui eadem quæ satiuī possunt.

B A R B A R I C O R O L L.
LVpino cura officit, quis alte conditū in terra, diducit eam radice, & in summa nititur, atq; ita germinat ceu per uim. Grana eius in siliquis discreta septis. Viride nullum mandit animal. Diurnius id tradunt Eruo, ac Cicere, Sabulum, & arenas, & omnino uitia terræ sequit, horretq; culta ex omnibus quæ eduntur. Sicco nulli minus ponderis, plus utilitatis. Mitescunt cinere, aut aqua calida. Circumagi Lupinum cum sole, tradunt pleriq;.

L V P I N V S S Y L V E S T R I S.
LVpini syluestres per omnia minores inueniuntur satiuis, præterq; amaritudine.

De Rapo. **C A P. CXXI.**
DEcocta Rapi radix alit. Inflationem parit. Mollesq; spongiosasq; carnes creat. Venerem stimulat. Decocto podagræ, per-

u. iiii

D I O S C O R I D I S

Cnionesq; fouentur. Contritoq; Rapo, atq; imposito iuuantur. Si excauata radici rosaceum cæratum adigatur, & feruenti cinere eliquescat, exulceratis pernionibus proficiet. Asparagi eius decocti esu, urinam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, Anodyna uocant, idoneum est. Potum contra uenena salutare est. Venerem concitat. Muria conditum, minus alimenti sufficit. Sed multo magis appetentiam recreat. Syluestre Rapum in aruís nascitur, fruticosum, in cubiti altitudinem assurgens, ramosum, læue. In cacumine folia fert læuia, digitali latitudine, aut maiora, & fructum in siliquis caliculatis. Cumq; pulpæ aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quantam capitis speciem præbet. In qua semina paruula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur in medicamenta, quibus ad detergendam cutem in facie, totoq; corpore utimur, præsertim quæ ex lupini, aut erui, tritici, aut lolij farina fieri solent.

B A R B A R I C O R O L L.

Theophr. lib.
7. cap. 4.
Pli. li. 18. ca. 13.

Rapa, quasi Ruapa, ut inquit Varro, tellure accumulata conditur ab olitoribus, ut insequentem annum regerminet. Semen includitur siliqua. Vtrunq; sexum in hoc quoq; genere intelligunt, ex eodem semine protuenientem, ut scribit Theophrastus. Quæ uideatur Athenæo, marem a Theophrasto nihil aliud intelligi, q̃ Napum Buniada. Effeminari collocata rarius dicunt, masculoscere densius compositæ. Laudatur semen eius tenue. Seritur semine, post trans fertur. Dulcescit algoribus; per quos & in radicem, non in folia incrementum capescit. In Italia Nursinæ præferuntur a Columella, Pollux, & Athenæus e Mantinea maxime commendant. Gongylen, & Gongylida Græci uocant, quemadmodum & nostri Rapum, atq; Rapam. Nam Rapina ut Napina, & Cepina dicitur; & Rapitium, ut Auitium, Piscitium. Cato coles Rapitos uocauit alio loco. Rapa biennio sata conuertuntur in Napos, alio Napus Raporum natura accipit. Gongyliorum uocabulo Hippocrates globos pusillos quasi pilulas, & catapotia significat Galeno: ipsos autem pastillos, siue orbiculos, quibus in medicina utimur, Dactylios appellat: quod & officinæ modo seruant. Rapas Lacedæmonios Gasteras uocare Apollas tradidit. Sed Nicæder colophonius Gasteras a Boëtis Brassicas intelligi: Rapas uero Zacetidas appellari uoluit. Amerias, & Timachides non Rapas, sed cucurbitas ita dici arbitrantur. Sunt e Græcis qui Rhaphyn esse dicant Napum Buniada: licet Glaucus non Rhaphyn, sed Rapyn uocet: unde apud nos Rapo nomen uideri potest manasse.

R A P V M S Y L V E S T R E.

Pli. li. 18. ca. 19.

Syluestris Rapa longior, in speciemq; Raphani, caule breui, semine intus candido, duplo maiore q̃ papaueris. Has in Dalmatia frequentes sponte nasci, Possidonius est auctor.

E X M. V E R G. C O M M.

Communem latinis græcam Gongylem, non Rapum, sed uocem fecit in carmine suo Columella, cum peractis Vulcanalibus cecinisset. Nube noua feri cœli impendentibus undis Gongylin, illustri mittit quam Nursia campo. Nec peregrinitatem uocis ueritus latinus homo est: tam grata omnibus erant omnia, quæ ab ea gente in doctrinis audirentur. Cumq; in secunda græcorum declinatione, & in quinta nomen id in græcis inueniatur, ex quinta elegit secundam, scilicet hoc quod Dioscorides ait, sunt qui Gongylida, nulla significationis diuersitate. Nisi quis forte diminutiuam forma Gongylida, a Gongyle factum id nomen dixerit. Quacunq; autem forma dixerit aliquis eadem significatione, semper indicabit quod rotundum sit: qua figura ubiq; plæruncq; nascuntur Rapa. Græcis enim γόγγυλον γρόγγυλον, id est, rotundum significat. Quod deinde hic ait, minus nutrire in cibo Rapa quæ in muria seruatur, ex antiqua salgammorum consuetudine rationem habet: quoru cum esset quotidianus usus, docere Dioscorides uoluit, murata aliquantisper natura, minorem ex conditura uim in nutriendo Rapa habere. Quomodo autem condirentur, & condita seruantur, Columella. 13. uolumine capite quinquagesimo tertio satis docuit. Poterunt uolentes ex eo scriptore omnia facile nouisse, Quos obiter monemus,

Quaerendum medicæ materiæ studiosis esse, quas nam hic dicat in syluestris Rapi filiquis capitum speciem & figuram. Quale enim id sit, non satis constat.

C De Buniade Napi. CAP. CXXII.
Octa Buniadis Napi radix inflat. Modicum alit. Semen eius potum uenenorum uires hebetat. Antidotis ammiscetur. Conditur sale radix.

B A R B A R I C O R O L L.
Naporum in medicina quoque Græci fastigia duo seruant. Angulosi foliorum caulibus florentis, quod Bunion uocant, dicendum inferius. Alterum genus Buniada appellant, de qua hic agitur. Amiterinam Buniada maxime sunt qui probent. Græci Thebaicam. Officinæ modo ignorant Buniada, & syluestris Rapi semine Buniadis uice utuntur. Quæ facile cognosci poterat. Est enim syluestri Rapi semen & nigrius & maius, quæ Buniadis.

E X M V E R G. C O M M.
Rapis congenere Napi sunt, quibus locis nascuntur, omnibus cogniti, & a cunctis rei rusticæ scriptoribus longissime descripti. Eorum plura a Theophrasto, Plinio, aliisque generantur. Columella in his etiam græca uoce in eodem carmine usus ait, Quæque Amiterinis deferunt Bunias aruis. Eodemque loco de conditura eorum a Rapis statim certam rationem monstrauit.

C De Radice. CAP. CXXIII.
Raphanus latine Radix dicitur. Excalfacit. Flatus gignit. Ori suauis est, sed stomacho aduersatur. Ructus ciēt. Vrinam pellit. Alio aptior. Summo tamen cibo sumi debet, quo magis eius distributio nem adiuuet. Cum autem presumitur, cibum subleuat. Quare uomituris commodissime datur ante cibum. Sensuum aciem excitat. Decocta contra ueterem tussim, & pituitæ crassiciem in pectore, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius uomitiones mouet. Hydropicis commodissime illinitur. Lienosis utilis. Sugillata cum melle tollit. Contra uiperarum ictus auxiliatur. Alopecias ad pilum reducit. Lentigines cum loliacea farina emendat. His qui fungis strangulantur, tam cibo quam potu salutaris est. Semen uomitiones facit. Vrinam mouet. Menses cit. Lienem extenuat. Cum aceto potum gangrenas ualidissime emarginat. Coctum cum aceto mulso, anginis perque utiliter gargarizatur. Contra cerastis morsus, potum ex uino auxilio est. Syluestris Raphanus, quam Romani Armoraciam uocant, alij montanum Raphanum, alij Apium, alij Iscada, alij Chamæbalanum, Romani etiam Radicem syluestrem, ramulos tenues iunctos duos siue tres spargit, rubentes, folijs rutæ syluestris, oblongioribus, & angustioribus, semine paruo, radice albuci, rotundiore, turbinatiore, pyri figura, candido cortice. Ea lacteo succo madet. Pars radicis superior uomitione, bilem pituitamque extrahit, inferior per aluum. Tota susque deque purgationes mouet. Quod si tibi in animo est succum extrahere, radix tusa in fictili mergitur, & qui supernat succus pinna eximitur. Is sesquibolo potus, utraque parte purgat.

B A R B A R I C O R O L L.
Radix, quam ut Varro inquit Raphanori, & Raphanida, & Crambidion Græci nominant, caudice uno assurgit fere arboreo, ut in Ruta quoque cernitur: proinde hoc genus olerum Den-

D I O S C O R I D I S

C drolachana cognominant, hoc est, ut Theodoro placet Oleriarbores. Die tertio a satu profilit, radice terra adoperta, Rapi modo. Sequenti anno germinat, tellure abiecta. Semen in siliquis. Genera, Boeotium rotundum & dulce. Liothasion, quod alij Thracium uocant, patiensissimum hyemis. Cleonaeon, in longitudinem porrigitur. Corinthium, amplissimum detecta stirpe nascitur. Quo folium leuius, eo suauior atq; mitior est Raphanus. Dulcescit ut Rapum frigoribus. Traditur genus unum eruce folio. Pulices appellantur bestiolae Raphanis in nascentes. Raphanorum radices lignescere Theophrastus est auctor. Haec, ut inquit Palladius, foeminini generis existimantur, quae minus acres sunt, & habent folia latiora, leuiora, & iocunde uirentia. Raphanum, ut brassicam, uitibus inimicum esse constat, ut si circum se feratur, diffugiant. Genus ei unum est, quod ab Herodoto uocatur Symraea. In Aegypto cum cepis & allio pyramidibus condendis praebere solitum, Iulius Pollux auctor. Confirmant id & Diodorus, & Plinius, qui scribunt ad id opus in Raphanum cepas & allium talenta mille octingenta erogata. Ut mirer Laurentium Vallam, apium, uertisse pro Raphano. Sunt e Graecis qui Syrneam apud Iones genus oleris apio similis accipiant. Itemq; pro edulio ex adipe, atq; melle. Sed Syrneam legi malo, q̄ Syrneam. Utq; hinc fortasse ferculum nuptiale uulgius Syrneam corrupte pro Symraea dixerit, ex amygdalis, & pulpa gallinacea, & saccharo. Nam Hippocrates Surmeam, siue Symraeam, pro succi quodam genere, seu passum, seu desrutum id sit, intelligi uolebat, cum praeciperet, quid in uino odorato, Symraeae fumendum esset. In compositionibus quibusdam Pauli & Aetij Bacanum inuenio commemorari. Nec quid ea res sit compertio, praeterq; in quodam glossemate, ubi semen, siue nucleum, siue mucronem Raphani Bacanum esse legebatur. Bacanum Aetius iocinori prodesse in cibo, utiq; parti eius uisceris incuruae praedicat.

A G R I O R A P H A N O S.

A grioraphanos, ab Raphano agria differt auctoribus: ut aliud sit syluestris Raphanus, aliud Raphanus syluestris: quemadmodum leuca canthe, ab acantha leuce distat, id est, alba spina, a spina alba. In quo tamen honestius puto nominibus Graecis uti, q̄ Latinis. De Agrioraphano, & hic, & libro quarto paucis immutatis agitur. Apion, & Ischada nominando. Nec Theodorum probo, caricam, atq; pirum interpretantem. Falsum est & quod scribit, inter spinas esse, quam pirum uocant. Non enim hoc in Theophrasto, quem uertit, legitur. Fessellit hominem, q̄ auctor ille de Orchi herba scribit, similem ei caulem esse apio, sed spinosum. Proinde Plinius, caule inquit spinoso est Orchis. Paulus Chamaeraphanon quoq; dici hanc existimat, quae Apios, siue Agrioraphanos uocetur. Radicem habet cepae, sed ampliorem, uel ut Theophrastus inquit, asphodeli, uerum squammofam. Nascitur in montosis & asperis, aliquando & herbosis. Effoditur uere.

De Syluestri Raphano.

C A P. CXXIII.

ῥαφανίς ὄρεος

Syluestris Raphani, quam Romani Armoraciam uocant, folia satiuo similia, & quadamtenus Lampsanam imitantur. Radix gracilis, tenera, subacris. Tam folium q̄ radix in olera recipitur. Excalfacit. Urinam concitat, aestuosus.

B A R B A R I C O R O L L.

Raphanos agria, id est, Radicula syluestris, & quae Cheria, & in Ponto Arinon, & ab aliquibus Leuce, a nostris Armoracia uulgo dicitur, fronde copiosiore q̄ corpore. Laudatissima nascitur Arcadiae. Seritur in Italia, & Armoraciam uocant satiuam, ut inquit Plinius.

De Sifaro.

C A P. CXXV.

σίφαρον

Sifarum uulgo cognitum. Cuius radix decocta ori grata est, & stomacho utilis. Urinam ciet. Et appetentiam inuitat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 20. ca. 5.

Sisser Graeci Sifarum appellant. Duorum generum est, Satiuum, & Erraticum. Inest longitudine Siferi neruus: ut pastinacae: qui decoctis extrahitur, magna tamen parte amaritudinis relicta: quae multo in cibis temperata, etiam uertitur in gratiam. Nobilitauit hoc princeps Tiberius, flagitando a Germania omnibus annis ex Gelduba castello, quod impositum Rheno est, ubi generositas praecipua: ex quo apparet frigidis locis conuenire. Non praetereundum, quod tradunt, ideo utilem stomacho uideri cibum, quoniam nemo tres Siseres edendo con-

tinuaret. Sisaram Varro, Plinius Sisarum appellat herbam, cuius flore uescantur apes: ut in Eryce disputatum est.

EX M. VERG. COMM.

Inter olera quorum radix tantum in usu est Siser antiquis fuit, nec quæsitam in eo nisi radicis crassitudinem Plinius, & Columella indicauerunt. Siquidem alter. 12. rei rusticæ suæ libro de satione eius agens, iubet pastinato, stercoreatoq; loco, & præ rarissime ponenda esse pastinacam, Siser, & inulam, ut maiora capiant incrementa: Alter naturalis historiæ libro. 19. e Germania maxime laudauit: quoniam egregiæ generositatis, & amplissimæ magnitudinis, in frigidissima regione nasceretur. Seri hoc non semine, sed bulbis ueteres dixerunt: qui ut in lilio, inula, & arofit, a reliqua radice auulsi, ad nouam sobolem in hortis disponuntur. Fecerunt in hoc genere ueteres etiam satium, & erraticum: quemadmodum & in pastinaca, cui corigener esse creditur, si cuncta a ueteribus de eo tradita diligentius obseruentur. Poterant dici & alia, sed quæ ab alijs tradita sunt, sine desyderio a nobis relinquuntur.

De Lapatho, & Rumice.

CAP. CXXVI.

Ex generibus Lapathi, Oxylapathum uocant, quod in acutum tendit, prædura habens extrema, non nisi in palustribus nascens. Aliud est satium, illi dissimile. Tertium syluestre, paruum, plantagini proximum, humile & tenerum. Quartum genus est, quod alij Oxalida, alij Anaxyrida, aut Lapathon uocant, syluestri ac exiguo Rumici simile, caule non magno, semine subacuto, rubente, acri, in caule, & agnatis appendicibus emicante. Omnium decocto olere aluus emollitur. Crudi illitu, melicerides temporis tractu discutiuntur. Syluestris & Oxilapathi, & eius quam Oxalida nominant, semen ex aqua, aut uino utiliter bibitur, contra dysenterias, & coeliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ, aut illitæ crudæ, lepras, impetigines, & scabrosos ungues persanant. Sed antea locus aceto & nitro in sole perfricandus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat, si foueatur, aut in solijs balneum confricetur. Coctæ in uino & instillatæ, aurium dentiumq; dolorem mulcēt. Strumas, parotidasq; discutiunt. Lienem cum aceto extenuant. Aliqui amoliendis strumis radicum gestamine utuntur, eas collo appendentes. Tritæ & inditæ, foeminarum profluuia sistunt. Cum uino autem potæ, regio morbo medentur. Calculos uesciæ comminuunt. Menses cient. Scorpionum ictibus auxiliantur.

BARBARI COROLL.

Lapathum, nostri Rumicem fere appellant. Radice altissima, & inter olera maxime singulari: nec enim lateribus crassiores alias emittit, sed prætenues. Multicaule hoc olus, ac ramosum, & cum perfecte adoleuit, figura betæ proximum, corpus carnosum & madidum: eoq; uel exemptum terræ diu recens. Viuacissimum præ cæteris oleribus est Lapathum, præsertim satium. Differt hoc a syluestri, qd sesquipedalis satiuo radix, breuior syluestri: gustus tamen gratior syluestri, sed acrior, ut omnia syluestria satiujs collata. Syluestre Lapathum, Aëtius Centrodēs, a pungendo cognominauit, radicem ei sublongam tradens, Raphano parua similem. Qd porro Lapathum a nostris Rumex dicitur, proprie tamen Rumex est, quem Oxalida, & Oxylapathum Græci nominant, satiuo similem, folijs aquosis, colore betæ candido, radice minima, Cantherinum Lapathum ab aliquibus uocatur. Quidam Oxylapathon satiuo similis esse, qd Oxalida, siue Rumicem existimant. Lapathos Democritus pro uenaticis serobibus accepisse dicitur. Theocritus Alapathon uocauit, ab effectu, quoniam exinaniat. Etenim Acti ci Alapatha, quæ nos inanitiones dicimus, appellant.

A

ἀνάπθον

ὄξυλάπαθος

ὄξαλίδα

ἀνάξυριδα

B

Pli. li. 20. ca. 21.

D I O S C O R I D I S

C E X M. V E R G. C O M M.

QUæ a principio capitis huius frequens uox auditur, ὡς ὑπὲρ, & quæ ab his composita sunt, ὑποδάπαθον, & ἔραλς, in quibus anceps ad acetum, & quæ acuminata sunt significatio est, causam antiquis interpretibus, & latinis medicis dedit, ut omne Rumicis genus uno acetosæ nomine indicarent: quod scilicet ὡς Græci acetum dicunt. Cum tamen quartum Rumicis tantum genus acido sapore sit. ideoque ἔραλς dicta fuerit: qua uoce uinum quod acorem contraxit, & acescentem fecem, Græci etiam appellant. Cætera uero omnia ab acuta foliorum marginis minusue cuspide ὑποδάπαθον, & ὑποεὐδάπαθον dicta fuerint. Quod forte miretur aliquis, si nesciat late in græcis patere significationem τοῦ ἔραλς, id est, eius quod illi acutum dicunt: nec tantum indicari ea uoce quæ in cuspide, aut mucronem designant, sed quæ celeri motu etiam transiunt, & subito efficacique sensu sentiuntur: quoniam quemadmodum illa cuspide mucroneque suo primum penetrant, eodem modo & hæc festinata & efficaci actione potestatem suam exercent. Sic Homerus gladium acutum sæpenumero dixit. Pindarus uero acutam niuem, non eodem quo gladius modo acutam, sed gelu, sensuque suo in humanum corpus penetralem. Qua uoce Lucretius, & Maro felicissime in frigore uli fuerunt. Eadem ratione Hippocrates etiam καὶ τὸν ὄντα, id est, occasionem non acutam, sed citissime transeuntem, & præcipitem dixit. Ob hanc ipsam causam acetum etiam ἔραλς a Græcis dictum est, quod acore suo altius, efficacissimeque in hominis sensum penetraret, nec sine doloris aliquo sensu sentiat. Fuit itaque in Rumicum nominibus antiquis græcis hæc ratio, ut una eademque uoce in alijs acidus significaretur sapor, in alijs acuminata foliorum cuspis. Ideoque nos in quibus acidus sapor sit, ea descriptione uli sumus, quæ id indicaret. In quibus autem acuminata essent folia, aliquid itidem adieciimus, quo ea significare tur species. Quod hic in quarto genere ait, non oxalida ab acido sapore tantum, sed anaxyrida etiam dici, a foliorum figura acceptum est.

De Hippolapatho.

CAP. CXXVII.

ὑποδάπαθον

HYppolapathon olus est magnum, in paludibus nascens. Eadem habet uires quas supradicta Rumicis genera.

B A R B A R I C O R O L L.

DHYppolapathum maius satiuo, candidiusque, ac spissius. Adiecere nonnulli Bulapathon, radicis tantum altitudine differens. Sunt qui & Hydrolapathum tradunt, in aqua natum.

De Lampsana.

CXXVIII.

λαμψάνη

LAMpsana, quod Romani Napium uocant, sylvestre olus est. Plus alit quam Rumex, & stomacho utilius. Cuius folia caulesque coquantur in cibo.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 20. ca. 9.

LAPsanam Græci uocant Lampsanem, Cyma est, siue Brassica sylvestris, pedali altitudine, foliorum trium: quæ hirsuta ei sunt, Napo simillima, nisi candidior esset flore. Hinc a latinis uocari Napium existimo: in quo tamen Dioscoridem auctorem solum habeo. Lapsanam diuili carminibus, præcipue iocis militaribus celebratam, ait Plinius. Alternis quippe uersibus exprobrauere, Lapsana se uixisse apud Dyrrhachium, præmiorum partitionem cauillantes. Asiam puto herbam fuisse, qua cum lacte uictitauit exercitus. Cara nomine, ut alibi notabimus. Nam radice utebantur eius, non folio, ut ait Hirtius.

E X M. V E R G. C O M M.

HÆc est Lapsana illa, qua Plinius ait ad Dyrrhachium, uixisse Cæsarianos milites, eamque in triumpho Imperatori suo iocularibus carminibus exprobrasse: Vulgare olus, & in Brassicarum genere. Eam præcepit Columella prope aluearia ferendam esse: quoniam copiosam ex ea ceram apes colligant: Vulgaremque dixit, quoniam ubique fere nascitur, folijs non dissimilibus Brassicæ, & ut nos uidimus, utrinque trinis.

De Bunio, Napi genere.

CAP. CXXIX.

βούνιον ἀντίον
ἀνέμοσφορον
παράδακρυ

BUNION aliqui Aëtinam uocant, alij Anemosphoron, magi Paradachry, Aegyptij Erxonem, Romani Scopā regiā, Aphri Zigar, aut Tēpsō. Caulē emittit quadrangulū, & in eo foliosos ramulos, tenues,

pretenuibus foliis et flosculis scatentes, longitudine digitali, folia ppter radicē, Apio similia, sed multo tenuiora, & quæ modo quodam folia tribuli imitentur. Flores anethi, semen odoratū, minus Hyoscyamo. Excalfacit Bunion. Vrinā ciet. Secūdas detrahit. Lienī, renibus, & uesicæ utile. Eo humētī aridoue utunt, exēpto radice & caulib. succo, ex aqua mulsa.

BARBARI COROLL.

Bunion, hoc est quod nostri Napum uocant, ut in Buniade meminimus. Quancq; Dioscorides Scopam regiā uocari Romæ scribat. Cæterum alia quoq; Scopa regia est, ut in Siderite constabit. De qua porro Scopa regia loquatur Plinius uigesimo primo libro, non leuior inquit odor ei, quam Scopam regiā uocant, quancq; folia eius oleant, non flores, existimandū relinquo. Paulus Aegineta Buniō, a nonnullis Arction appellari scribit, Galenus Arcticonē. De Buniō eadem a Dioscoride libro quarto, quæ hic legebantur detraximus, q̄a inutiliter re-
petita esse uidebantur.

De Blito. CAP. CXXX.

Blito Aegyptij Echlotoripā appellāt, alij Riplā. Romani Blitū, βλῖτον
Daci Bles. Oulus est aluo utile, nullius in medicina momenti.

BARBARI COROLL.

Blitum, siue Blitus (Græci etiam Bleton) erumpit ocylime, semen ut Betæ, corticeum, co-
piofum, racemosumq; ut Atriplici. Radice non una, crassa, in rectum tendente, ut Bera, & La-
pathon, & maxima pars olerum, sed continuo, multiplici, ac proluxa. Inspidum, & sine acri-
monia. Vnde conuicium fœminis apud Menandrum faciunt mariti. Blitum duplex ostendi-
tur, rubens, & candidum. Apud Aristophanem quoq; Blitomamæ, pro stolidis accipiuntur:
quos Plautus noster Bliteos appellat in Truculento.

Blitea inquit, & lutea est meretrix.

Etiamsi corrupte legitur Blittera. Hippocrates Bubleton quoq; nominat herbæ genus: modo
mendum in uerbo non sit. Scio enim & Bolbiton pro fimo bubulo, & Bolbiton pro quodam
polyporum genere minuto capī ab Hippocrate, ut Galenus testatum reliquit. Sed & Onoble-
ton herba, linguæ similis, Hippocrati, contra fœminarum profluvia in uellere apponitur.

EX M. VERG. COMM.

Maledicebatur quondā hominum ingnauic ex hoc olere, & in accusanda ridendaue alicuius
focordia & inutilitate, despectiorem Blito uulgus appellabat: tam nullum in morbis, aut sa-
nitate usum habet. Edendo herbam esse Blitum, Paulus Aegineta in sexto ait, humereq; in se-
cundo ordine et frigere. Palladius in Martio mense, his uerbis de natura sationeq; eius tradidit.
Hoc mense Blitus feritur, solo qualicumq; sed culto. Oulus hoc neq; runcādum, neq; sarculan-
dum est. Cum semel natum fuerit, ipsum se per multa secula seminis sui deiectione reparabit,
ut etiam si uelis uix possit aboleri. Paulus itidem Aegineta, præter paulo ante dicta, in primo in-
ter olera Blitum numerauit, coniunxitq; Atriplici: nec quicq; de utraq; aliud dixit, q̄ humidū
esse, uentrem deicere, & parce nutrire.

De Malua. CAP. CXXXI.

Malua hortenſiam Pythagoras Antema uocauit, μαλὴ ἀνθεμα
Zoroastres Diadema, Aegyptij Cochortem, Magi Lienem ca-
præ, aut muris Vrinam. Satiua esui longe aprior syluestri. Stomacho ad-
uerſatur. Aluum iuuat, sed multo magis caules. Interaneis & uesicæ uti-
lis. Cruda folia cum salis exiguo manducata, ægylpas ex melle sanant.
Verum cum cicatricem trahere cœperint, ea demum citra salem utēdum
est. Contra aculeatos apium uesparumque ictus, illita efficax est. Eadem
cum oleo trita peruncti, non feriuntur. Vlcerā manantia in capite, fur-
furesq; cum urina sanat. Sacris ignibus, & ambustis decocta folia, tri-

D I O S C O R I D I S

Ctaque, utilissime ex oleo imponuntur. Eius decoctum uuluas in seffione mollit. Prodest erosionibus uesicæ, & intestinorum, uulua, sediscq, clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua, contra omnia uenena auxiliatur, si continuo a bibentibus reuomat. Contra phalangiorum morbusus remedio est. Lac euocat. Semen in uino potum, addito Loti syluestris semine, uesicæ cruciatus lenit.

Pli. li. 20. ca. 21
Theo. li. 9. c. 19

B A R B A R I C O R O L L.

MAlua culturæ opera, intra sextum, septimumq; mensē grandescit in arborem, hastant, baculorumq; usu in Arabia, Mauritania quoq; Lixi oppido æstuario, ad Hesperidū hortos, & iuxta delubrum Herculis. Duo genera earum summa: quæ amplitudine folij discernuntur. Maiorem Græci Malachen uocant in satuiis. Alteram ab emolliendo uentre dictam putant Malachen e syluestribus, cui grande folium, & radices candidæ, Athæa nōminatur. Est & quæ unicaulis nascitur, Monocaulos ex factō cognominata. Omne solum in quo feruntur Maluæ, pinguius faciunt. De Althæa, quæ item Dendromalache, siue Anadendromalache dicitur, & Ibis-cus, uolumine tertio differitur. Est & Alcea huius fere generis scorum indicanda.

ἀτράξις
χρυσολάχανον

De Atriplice. C A P. CXXXII.

ATraphaxin aliqui Chrysolachanon uocant, Romani Atriplicē, Aegyptij Ochi. Cognitum olus est. Duo eius genera. Syluestre. & Satium. Coctū estur ut olus. Aluū mollit. Panos discutit, siue crudū, siue coctum illinatur. Semē cū aqua mulsa potum, regium morbū sanat,

Pli. li. 20. ca. 20

B A R B A R I C O R O L L.

ATriplex, octauo die a satū, Octobri mense prouenit. Radix ei una descendit in altitudinē, unde fibræ aliæ promantur, ut in Bera. Foliatum habet semen, & obductum cortice, numerosum, racematimq; singulis ramis insidens. Atriplex & syluestre est, & satium: accusatum a Pythagora, tanq; faceret hydropicos, morbosq; regios, & pallorem. Coquitur difficillime, ac ne in hortis quidem iuxta eum nasci quicq; nisi languidum, culpauit. Addidere alij plurimas ægitudines ex eo gigni, nec nisi aqua sæpius mutata coquēdum. In Italia difficulter id nascetur. Syluestri capillos tingebant. Atriplex ueteres, nō Atriplicē uocasse perhibent: ab græco nomine potius, q̄ ab atrore, ut arbitor. Hippoc. etiā Adraphaxin appellat: post Atraphaxin dixere Atticis, d. literam in, t, mutare amantibus: ut facit Aristot. qui enteuchiam, pro enteuchia usurpauit, ut Lucianus autor est. Quibus porro Atriplex idē uidet esse cum eo genere qd' Spinacia uulgo dicimus, & Græci recentiores Spanachia, fallunt apertissime. Si quē porro uocabulum id parum delectat, Atriplex Hispaniensis nominetur. Et Hercule fieri potest, ut inde profectum sit ad nos olus, ieiunij aptissimum, nec ueteribus (ut conijcio ac demiror) com-
pertum.

E X. M. V E R G. C O M M.

Iocatus ex hoc olere quondam in fabula quæ Equites inscribitur, græcorum omnium comicorum lepidissimus Aristophanēs, est, falsi Atriplicis olere, ab oratoribus Atheniensibus impleri in concione dicens: compositiq; ex olere, & mendacio nomine, quasitam in populo uulgari ratione gratiam, & credulæ plebis irritam bonorum spem simul deridens: non aliam ob causam, q̄ quia uulgare hoc olus est, nullamq; habet maiorem utilitatem: qualia hominum mendacia sunt, ubiq; omnibus in promptu parataq; & inutiliter plerumq; euadentia: quod olus hoc etiam habet in tertio refrigerandi ordine, per alium celerrime descendens. Quæ tota spei fortuna est: siquidem in ancipiti posita, quantumuis leui pulsu & strepitu tota perit & euolat. Sationem Atraphaxis docuit Columella libro. 12. his uerbis. Cherephilum, itemq; olus Atriplicis, quod græci uocant ἀτράξις, circa calendas octobres obrui oportet, non frigidissimo loco. Nam si regio sæuas habet hyemes, post idus februarias semine differenda sunt, suaq; se de partienda. Papauer, & Anethum eandem habent conditionem sationis quam Cherephilum, & Atraphaxis. Cur autem Chrysolachanon etiam, id est, aureum olus quondam diceretur, facilem habet coniecturam: quoniam luteo flore sit, ideoq; ab auro nomen inuenierit.

De Brassica. CAP. CXXXIII.

CRamben Romani Brassicam uocant. Ea aluo est idonea, si modo leuiter feruefacta edatur. Nam percocta aluum sistit. Sed multo magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur. Stomachum autem male habet. Acrior est æstiuæ. In Aegypto propter amaritudinem non estur. Cæcutientibus, et tremulis esse, prodest. Summo cibo sumpta, crapulam discutit, & uini noxam restinguit. Melior stomacho Cyma, sed acrior, & ad ciendum urinam ualidior. Ea condita, stomacho inimica est. Aluum conturbat. Crudus succus cum nitro & iri deuoratus, aluum emollit. Cum uino quoque epotus, uiperarum morsibus auxiliatur. Cum sceno græci farina, podagris & articularum uitis illinitur. Prodest & sordidis ulceribus, & uetustis, illitus. Caput purgat naribus infusus. Menfes extrahit cum loliacea farina inditus. Folia per sese, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusque. Epinyctidas, ignem sacrum, leprasque sanant. Carbunculos ex sale rumpunt. Fluentes capillos retinēt. Cocta, addito melle, aduersus depascentia ulcera, gangrænasque ualent. Lienosique, ex aceto cruda profunt. Mansa deuorato succo, retusam uocē instaurant. Decoctum eius potu, aluum & menfes ciet. Flos post concupitionem in pello subditus, partus spem adimit. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto nascitur, potum, tineas repellit. In antidota coeliacorum additur. Faciei cutem, lentiginemque expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci uetusto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant.

BARBARI COROLL.

BRassicam, antiqua Græcia, non Cramben, sed Raphanon appellabat: quod & Aristoteles, ut Iulius Pollux inquit, et Theophrastus fere sequitur. Crambe quasi Coramble dicta existimatur: quæ pupulas oculorum, quas Græci Coras uocant, hebetet, autore Columella. Sed & ipsi quoque Attici Corambem dicunt eam. Dederit hoc locum prouerbio fortasse, repetita Brassicam, nedum nocere, etiam occidere. Græci tostam carnem Crambaleam uocant, Athenæus autor. Brassica, ut Varro inquit, dicta quasi passica, quæ ex scapo minutatim præficatur, & passica fiat. Die a saturo decimo se ostendit Brassica. Digeritur a Theophrasto in genera maxime tria. Syluestris, cui folium æquabile, paruum, rotundum, multiplex: ramosa, succo aspo, medicato, ad detractiones per aluum præcipuo. Secundum Crispæ: quæ & amplitudine folij, & bonitate succi præfert omnibus. Tertium Leuis appellatur. Nonnulli addidere Quartum, cui semen deterrimum, aut omnino nullum. Cato quoque tria facit discrimina. Vnam extētis & grandibus folijs, caule magno: propterea Cauloden uocatam, aliquando Septembrinā, ab alijs Eleada. Alterā crispæ folio, Selinada nominatam, a similitudine foliorum Apij: quæ & Apiam cognominant, alij Cliauaculā. Tertiam proprie appellatam Crambem, minutis caulibus, folijs tenuioribus, & simplicibus, densissimisque, sed amariorem, leuiorē, tenerā, quæ ob id & Lenis dicatur. Sed de syluestri Brassica suo loco agemus. Athenæus tria inquit Brassicæ sunt fastigia. Primum Halmyris: quæ & præfert omnibus, præsertim in Eretria, & Cumis, & Ephesi, & Rhodo, & Gnido genita. Secundum Liophyllos, a foliorum leuore dictum, ubique nascens. Tertium Selenusia, folio crispo, et Apij similitudine, a qua & nomen habet. Hæc naturæ, illa ganeæ distinctio. Tritiana magnitudine ac sapore præcipua, cui pedale aliquando caput. Dein Cumana sessilis folio, capite patula: mox Aricina, altitudine non excelsior, folio numerosior quæ tenuior, cuius sub omnibus pene folijs fit utat cauliculus peculiaris. Ideoque utilissimum genus existimat. Pompeianæ, in oppido Capanig. Pompeijs percerus caulibus, ab radice gracili, intra folia crassescens. Rariora hæc, angustioraque, sed tenera

A

crapula

Crambe sumpta summo cibo, discutit crapulam, & restinguit noxam

B

Theo. li. 7. c. 4.

Pli. li. 20. ca. 9.

Cato de reru

stica. ca. 136. 157

Crambe bis cocta mors est.

Tria genera Brassicæ.

Syluestris.

Crispæ. hæc præfert alijs.

Leuis.

Cato facit tria discrimina.

1. Cauloden nomen uocat, quæ

2. Septembrina dicitur.

3. Selinada. alij uocant Cliauaculam.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

x ij

Ctas in dote, frigora non tolerat. Sabellicæ usq; in admirationem crispa sunt folia: quorū crassitudo ipsum caulem extenuat, sed dulcissima perhibentur ex omnibus. Non pridem ante Columellam subiere Lacutres, a loco dicti, quo lacus Turni, siue ut Plinius scribit, lacus Turonis fuerit, conuallē Aricina, capite prægrandes, folio innumero. Alij in orbem porrecti. Alij in latitudinem torosi. Nec plus ullis capitis post Tritianos, et Cyma nullis serior. Hoc genus quidā interpretant qd mō Capitios coles, & in Hispania Murtianos uocāt, Brutiani, fringunt us alunt, grandes folijs, caule tenues, sapore acuti. Addunt ijs Silirenses, Tiburtini, Stabiani, Parthenopei, q sunt hirsuti. V esuini, q sunt amari, nō sine suauitate. Marrucini, rubent paucis folijs. Si gnini breuiiores, crassiores, sapidiore Cappadoç folijs, caule pene nullo, frequētib; tunicis, & contra frigus muniti, priusq; in florem exeant, ut uix prima folia discernantur hyeme. Cui- tūq; generi pruinæ plurimū suauitas conferunt. Suauissima ex omnibus est Cyma. Est autē Cyma qdā ipsorū caulium, delicatior teneriorq; cauliculus, quem a prima sectione, proximo uere præstant. Græci Cyema, quasi partū eius uocant. Nos & Cymas, & Cymata uocamus: nec in Brassica mō, sed in Raphano, & alijs cōpluribus: qd absolute Cyma, nō nisi de Brassicæ fructu capit. Palladius Quymā uocat, et semel opere in toto Plinius. Post Cymā æstiuū, autumnaleq; cauliculi, mox hyberni, tū deinde iterum Cymæ, nullo æque genere multifero, donec sua fertilitate cōsumatur. Omnibus oleribus antepōnit Cato Brassicā: ppter ea, ut inquit Varro, nō mine oleris Brassica intelligitur. Vites ad Brassicā assitæ diffugiunt, in trorsumq; in fundum se declinant: quo argumento usus Androcydes, cōtra ebrietatem ualere Brassicam dixit. Tāta est inter plantas quoq; discordia. Hinc Nestor in eo libro, qui Alexicepos inscribitur, olus hoc ex lachrymis Lycurgi, a Libero paure uitibus adalligati, natum prodidit. Brassicæ decoctæ aqua, nihil æque feret humi effusa, crustæ si occupent intus uasa calidaria, in tantum, ut non sit eas auellere: si Brassica in ijs decocta fuerit, abscedūt. Coles capitatos, uulgaris sermo, Scapitos appellat, antiqui Lacutres, et Tritianos, ut conicio. Ex semine uetusto Brassicæ nasci aiunt Rappam, & contra ex Raporum Brassicam. Nobilitauit Brassicam Ionīa, per eam iurando, quasi p aliquem Deorum: ut Zeno Citeius stoicę familię caput, per Capparin, Socratis credo amulatione deierantis per canem. Ob id & mantin, ceu uatem quandam ab Hipponaeste Brassicam uocari, testis est Athenæus: qui & puerperis in Atticā regionē amuletū cuiusdam loco Brassicā apponi solitam commemorat. Nomen oleris commune quidem est quibuscumq; Lachanum apud Græcos, priuatim tamen Brassicæ tribuitur. Ab olla dictum Olus, testis est Varro: ut cōuideatur poeta Veronensis alludere cum cecinit, non olera Ollā capis. In quo sciamus obiter, non pro uase in eo uersu capi Ollam, sed nomen esse uiri proprium, quod ignorātes fere grammatici, delyrant: Quemadmodum & in eiusdem poetæ uerbo, Mentula.

E X M. V E R G. C O M M.

Autor omnibus, ut credimus, post se Theophrastus fuit, ut Brassicæ, quæ edendo est, præcipuam diuisionem triplicem faceret: nec aliter, si conferantur ueterum latinorum cum eo in hac parte cōmentaria, rem diligenter intuentibus uidebitur. Nihil enim octauo de plantis libro, de olerē hoc ab eo dictum, non iisdem uerbis, Romana breuitate a Marco Catone rusticarum rerum capite centesimo & quinquagesimo septimo redditum est: & post Catonē a Plinio naturalis historię. 19. cap. 7. Quæ ideo non repetuntur a nobis: quoniam quæ tria a Dioscoride numerantur hoc loco Brassicæ genera, satiuæ, agrestis, & marinæ, aliam diuisionis rationē habent. Siquidem illæ ex ruris, hortorumq; disciplina, & ad usum sanitatis in pascenda familiā ab autoribus illis traditæ fuerunt: hæ diuersis locis nascentes, ad medicinam docentur. Oportet itaq; in priore illa Brassica, & quam satiuam hic dixit, tria illa Theophrasti, Catonis, & Plinii genera collegisse. Omnium enim pares uires sunt. Tum agrestem, & marinam illis adicere sponte sua, alijsq; locis, & ad medicinam tantum nascentes, & quæ non aliunde qd ex similitudine aliqua in familiā & nomen Brassicarum uenerunt: quales plantæ aliæ multę, deficientibus proprijs appellationibus, quibus indicarentur, gentiū adoptione, nomen, & dignitatem inueniunt. Vidimus nos marinam Brassicam, nihil præter florem simile satiuæ habentē, eadem figura qua a Diosc. describitur, tenuissimis, & in longitudinem porrectis folijs, qualia in Salice sunt, pediculis pendentibus, & in longis ramulis per interualla binis deinceps dispositis. Hanc in antiquissimis græcorum codicibus a Romanis legimus marinum Codiculum uocari. Agrestem Plinius Erraticam etiam nominat, cōmuni syluestribus cunctis appellatione. Quæ enim græci ἄγρια dicūt, erraticæ plerūq; latini appellauerūt. Non relinquendum illud etiā, qd ad græcorū in hoc olerē appellationes pertinet: quam posteriores in ea gente Cramben dixerunt, antiquiores Raphanum dixisse. Testatur id Theophrastus libro de plantis octauo, qui non alio qd

*Brassica alia
satiua.
Agrestis.
Marina.*

*Plinius brassicum
agrestem etiam no-
minat erraticam,*

Raphani nomine p Crābe utit. Verba eius sunt. τῆς δὲ ραπάνου τριχὴ διακρινόμενος. &c. Nec multo post, ἡ δὲ ῥαπάνος ἔχει. Itemq; lib. 2. de caulis plātariū. καθάπερ ἢ ἑμπύλος τῇ τῆς δάφνης ῥίζῃ τῇ τῆς ραπάνου. Quæ oīa nō de Raphano, quæ Radicula nūc est, sed de Crābe, quā Brassicā nostri nomināt, ab eo dicta fuerunt. Idem, & longe certius Aristoteles lib. 5. de animalū historia, q; loco de erucis in Brassicis nascētibus his agit uerbis. αἱ δὲ γίνονται ἐν τοῦ φύλλων τοῦ χλωρῶν ῥίζῃ, μαλιστα ἐπὶ τῆς ραπάνου ἢ καλοῦσι τινὲς κραιβὴν. Qd' est. Nascunt et aliq; ex uiridibus folijs, p̄sertimq; in Raphano, quā Crambē aliq; i. Brassicā nomināt. Actum de tota hac relōgius a nobis est, ut intelligerent legentes, quanto periculo huiuscemodi docent, nisi res prius q; uoces cognouerit aliq;: & scirent, qui medicinam profitentur, posse aliqñ fieri, ut Raphanū p Brassicā in antiquissimis græcorum scriptoribus inueniant, qualis Hippocrates est: oportereq; in ea uoce, non Radiculam quæ nunc græcis & latinis Raphanus dicitur, sed Brassicæ olus intelligi.

De Syluestri Brassica. CAP. CXXXIII.

Syluestris Brassica, quam Romani Rusticā appellant, maritimis præruptisq; locis, magna ex parte gignitur. Satiuæ similis, sed candidior, hispidiorq; amara. Cuius Cyma i lixiuio cocta ori nō insuauis. Folia illitu uulnera conglutinant. Et inflammationes, tumoresq; discutunt.

BARBARI COROLL.

Brassicam syluestrem, Græci medicantes Ceram quoq; nominant: nos Erraticam. Quanc; sciendum, Ceram genus Raphani a Plinio acceptū, non Brassicæ. Hanc aliq; Petræam uocāt, in miscellam uerbis. Sunt qui Colem syluaticum appellent. Syluestris laudes imenso plus prædicat Cato q; satiuæ. Folia syluestri leuia, rotunda, parua, & ut Plinius inquit, bina, sed densissima, & plurima, plantis oleris similior. Inter syluestres Brassicas & Lapfana est, ut diximus: itē Sandix, & Isalione, & Enthuficon, siue ut aliq; codices, Anthriscon. De Petræa Theophrastus, si modo hæc est quam supra diximus, circa Psophidem nasci scribit optimā, numerosamq;. Aliubi non Petræam, sed Petræum uocauit. Alioquin & Capparis Petræa quandoq; dicitur. Nā Petrophyes Aizoum est, ut Empeton Saxifraga.

κράμβη ἀγρία
Germani uocant fœll.

Theo. lib. 7.
capite. 4. 5.

B

De Brassica marina. CAP. CXXXV.

Marina Brassica a satiuā prorsus abhorret, q; folia ferat rotundæ Aristolochiæ, prælonga, tenuia. Singula a ramulis rubentibus exeunt, singulari ut Hædera stilo. Habet lacteum succum, sed paucum, falso gustu, & aliquantum amaro, pingui compage. Hæba in totum stomacho inimica, acris. Vehementissime aluum ciēt, in cibo cocta. Coquitur, propter acrimoniam, cum pingui carne.

BARBARI COROLL.

Brassicæ marinæ cauliculos quidam Halmyrida uocari putant, quoniam nisi in maritimis non proueniat. Nauigatione quoq; longinqua, uiridibus asseruatis ad transferendum. Plinius hanc marinum Olus, est ubi appellat, recentiores græci Thalassocramben.

κράμβη θαλάσσια

De Beta. CAP. CXXXVI.

Beta duorum generum est. E quibus nigra coquitur cum lenticulo, ut uentrem sistat. Quod magis radice eius præstatur. Candida aluo utilis est. Vtræq; tamen propter nitrosum humorem quem habet in se, noxij succi est. Vnde succus earum, cum melle naribus inditus, caput purgat. Aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radice & foliorū, furfures, lentescq; deterget. Perniones fotu mitigat. Crudis folijs uutiligines nitro antea perfrictas, alopeciarū inanitates, atq; depascentia ulcera, illi ni prodest. Eruptionibus papularū, igni sacro, ambustisq;, cocta medet.

BARBARI COROLL.

Beta culturæ quadam ratione incrementum capescit arboris. Seritur circa mensem maium,

τιγύλον

Pli. li. 19. ca. 9.

x iij

D I O S C O R I D I S

C sicut omnia, quæ greci uocant Epispora: quod genus etiam sementis primæ nomen habet: etiam si alio quoque sæta mense proueniant. Ideoque Beta æstate, sexto die nascitur, hyeme decimo. Peculiare in Beta est, ut non continuo singula semina producat, sed anno interim sequenti, sæpe tertio. Radix Betæ unica, longa, recta, carnosæ, gustu iucunda, & nonnullis grata cibo uel cruda. Elateribus aliæ item crassæ, modo singulæ, modo binæ, ternæque funduntur. E quibus si bræ coherentes alligant. Cortex neque crassus, neque Raphani modo extricabilis, sed Olusatro ad quendam modum similis. Semen integritur cortice. Folio Beta uirer, pede candicat, figurâ, b, literæ cum deprimitur, ab olitoribus refert, unde nomen. Beta hortensiorum leuissima est. Greci præferunt ex Ascara ubique candidam, parcellissimi seminis, appellantes Siculam. Nostri Betæ gnâ faciunt, uernâ, & autumnale: quæ & iunio & ianuario seratur. Medici Betam innocentiorē, quâ olus esse indicauere, ut inquit Diphilus. Quamobrem appositâ, non nemini degustare etiâ religio erat, utque ualidis potius in cibo essent. Gemina huic natura, & oleris, & capite ipso exiliatis bulbi. Neque alij hortensium latitudo tanta, ut in lactucis, cum coeperit colorē trahere, imposito leui pondere, in binos pedes aliquando se pandendo. In Circieensi agro amplissime pueniunt. Vini sapor in dolio corrumpitur Brassica, sed odore Betæ folijs demersis restituit. De alia porro Beta, proprie syluestri dicemus in Limonio, Greci Betâ modo Seutlos, seu modo Teutlos uocant. Hippocrates Tetydon (ut arbitror) nisi corruptus locus est in eo libro, quod de mulierum natura inscribitur. Aliud uidetur genus esse Teutlis, ut Athenæus inquit, ex Diphili comici sententia. Nam duo fuere Diphili: medicus, qui & Siphnius cognominatur: & comicus. Hic imperitum quendam in comœdia describit, taxans quod Teudon Teutlida nominaret. Eudemus quatuor Betæ facit genera. uulsi, furculosum, populare, candidum. Betam greci, ouillum Corium uocant: unde Betylus is lapis appellatus est, quem pro Ioue Saturnus uorasse fingitur. Monstratur & saxum hoc nomine, ad Iuliopolin in Syria, proxime Libanum montem. Est & auicula, quæ uocatur Betylus, olim dicta Detylus.

E X. M. V E R G. C O M M.

Q uotquot hætenus de Beta notissimo omnibus olere, aut in historia, aut medicina aliquid tradiderunt, omnes duo genera eius fecerunt, colore alterum ab altero distinguentes. Theophrastus lib. 8. ἐνχυλότερον δὲ καὶ τὸν τυτλὸν τὸ λευκὸν τοῦ μέλανος, καὶ εὐγεωμενότερον δὲ καλοῦσι τινὲς σικελικόν. Quod est. Meliore autem fucci copia in Betis candida quæ nigra est: paucior etiam semine, quam Sicelicam aliqui uocant. Plinius. 19. uolumine a Theophrasto accepta eadem, his reddidit uerbis. Eius quoque a colore duo genera greci fecere, nigram, & candidam, quam præferunt, parcellissimi seminis: appellantque Siculam. Paulus Aegineta etiam in sexto, candidam nigræ anteposuit. Athenæus præterea in tertio Dipnosophistæ, candidam nigræ prætulit: quod simul aluum mollit, & stomacho accommodata est: quod non facit nigra, quæ adstringendi uim habet. Et ne longiores simus, nullus non de Beta agens, discrimen eius oleris hoc tradidit: & nihilominus præter Theophrastum, nullas discriminis eius alias notas aliquis offendit, quibus cognita in frequentiore usu esset: & is non quod ad colorem pertineret, sed quod ad vires, bonitatemque fucci, & exiguum seminis copiam. Solus Columella, quod hætenus legerim, in carmine suo facilem coloris huius in Beta cognitionem indicauit, dicens. Sic & humo pingui, ferratæ cuspidis ictu. Deprimitur folio uiridis pede candida Beta. pedem candidum, radicem appellans, quæ facilis cognitu, nota omnibus cum seretur & uelleretur erit. Quæ enim nigra radice erit, agrestis Beta habebitur: ideoque in uetustioribus & melioribus aliquot grecis, a principio huius capituli legitur, non ut Barbarus uertit τυτλὸν μέλας, quod grande significat, sed una tantum mutata litera, μέλαν καὶ ἄγριον, quod nigrum indicat & syluestre. Hæc enim candidæ comparata, agrestis a grecis habebitur: non quam Plinius uicesimo libro cap. 8. Limonion, aut Neuroïdes a quibusdam uocari ait. De qua hic ipse scriptor libro quarto folia Betæ similia habere tantum dicit.

ἀνδράχνη ἀγρία

De Portulaca syluestri. CAP. CXXXVII.

Syluestris Portulaca, quam aliqui Aizoon syluestre uocant, alij Telesphion, Romani Illecebram, aliqui Portulacam, Aphrimœmœn, Daci Lax, Aegyptij Mochmutim. Folijs pusillis, ad satiuam accedentibus, hirsutis, latioribus. Nascitur in petrosis. Nonnunquam in hortis. Folia Oleæ habet, minora multo, plura & tenera, rubentes cauliculos, ex u-

na radice multos, in terra sessiles, qui manducati bonum succum pari-
unt, uiscosi, & aliquantum salsi. Vis ei excafactoria, acris, exulcerans.
Discutit strumas, cum axungia illita.

B A R B A R I C O R O L L.

Andrachne sylvestris, de qua hic agit, genus est Aizoi, ut quarto uolumine constabit, ubi
Dioscorides hanc herbam fere iisdem uerbis demonstrat. Nascitur breuiore cacumine, q̄ mi-
nus Aizoum: quod in muris, parietinisq; provenit: cui & similis ostenditur. Colligi hanc & cū
bi causa constar. Habentur & alia duo genera sylvestris Andrachnes, hoc est, Portulacæ nomi-
ne, ut in Telephio, & Pepli diximus. Telephion in Theocrito, sunt qui folium papaueris accipi-
ant, ad explorandū amorem crepitu adhiberi solitū, qui lusus fere puellaris erat, ut inquit Pol-
lux, etiam nū ex Lilio. Non desunt qui sui generis herbā intelligant, succo feminis sanguineo,
folijs Loti satius, filiqua Pampini modo intorta. Alij miscellam quandā esse putant Telephion,
quæ corporis partibus imposita, si cutis rubescat, indicium amoris esse, ob id Philtron quoq; di-
ci: sin accendatur, & exulceretur, odij. Ego Telephion Theocriti eādem esse cum ea de qua hic
agitur existimo, quippe cui excafactoria & ulceratoria uis insit.

Pli, li, 25, ca, 15.

De Portulaca.

CAP. CXXXVIII.

Portulacæ uis adstringit. Capitis doloribus, inflammationibus o-
culorum, cæterisq; cum polenta imponitur. Ardoribus stom-
achi, sacro igni, uesicæ doloribus auxilio est. Commanducata, dentium
stupores sedat. Stomachi & intestinorū æstuationem, fluctionesq; mul-
cet. Renes & uesicam adiuvat, etiam si erosionem sentiant. Veneris impe-
tus exoluit. Succus epotus simili effectū prodest, in febribus ualens. Con-
tra teretes uentris tinea, cruentam excreationem, dysenteriam, hæmor-
rhoidas, & profluuiā sanguinis, percocta efficax est. Item cōtra sepi mor-
fus. Ocularibus medicamentis utilissime commiscetur. Interaneis flucti-
one laborantibus, atq; uuluarum erosionibus infunditur. Contra dolo-
res, quos æstus excitauit, caput ex rosaceo & oleo fouetur. Eruptiones
papularum in capite, cum uino emendat. Vulneribus quæ ad syderati-
onem spectant, ex polenta illinitur.

ἀνδράχνη

B A R B A R I C O R O L L.

Portulaca exit post Cucurbitam, Ianuario mense, ut Theophrastus inquit, seritur. Hippo-
crates Portulacam fluuiatilem dicendo, uidetur recentem, & non inueteratam intelligere. Flu-
uiatilis inquit Portulaca refrigerat, inueterata excafacit, atq; purgat.

Theoph, li, 7.

De Asparagis.

CAP. CXXXIX.

Asparagvs, quem aliqui Petreōn, alij Myacantham, alij
Myon uocant, uulgo notus est. Huius cauliculi in cibo, uen-
trem emolliunt. Urinam cient. Radicis decoctum contra urinæ difficul-
tatem, regium morbum, renum uitia, & coxendicū cruciatus, in potu
proficit. Cum uino autem phalangiorum morsibus auxiliatur. Si deco-
cti succus super dente contineatur, eius dolori medetur. Semen ad eadem
ualet. Canes, ut aiunt, si decoctum bibant, emoriuntur. Asparagum etiam
nasci prodiderunt, arietis cornibus contusis, atq; defossis. Quod, q̄tum
equidem sentio, plane a ueritate abhorret. Istamien Asparagus multis ra-
mis fructicat, folijs feniculi, numerosis, radice rotunda, grandi, tuber ha-
bente. Huius teneri cauliculi triti in uino albo, renum dolores sedant.

ἀσπαράγος

D I O S C O R I D I S

C Assus autem, coctusue, urinæ stillicidium, difficultatemq; , ac dysenterias; mitigat. Radix cum uino, aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Cum ficis, aut ciceribus sumpta, regium morbum sanat. Coxendicis cruciatus, stranguriamq; leuat. Alligata radix, aut haustum eius decoctum, conceptum adimit, & sterilitatem adfert.

Pli. li. 19. ca. 8.

B A R B A R I C O R O L L.

A Sparagus, uel ab asperitate, ut inquit Varro, uel quoniam ita Græci nominent, Aspharagos a Theophrasto dicitur. Ipsum quoq; guttur a quibusdam Aspharagus uocatur. Ab Appione tamen grammatico, non Aspharagus, sed Spharagus. Corrudam nostri appellant hanc herbam. Spinosi sunt Asparagi ex toto fere, ut scorpius, unde Scorpiones quoq; a Columella fortasse nominantur: quamq; Asparagus cognomēto Scorpius, siue Scorpio aliud genus est, ut in Scorpio de herba disputabitur. Post æquinoctium autumnū flos exit e quodam folliculo secundum aculeos. Asparagū uero Theophrastus pro planta ipsa uidetur accepisse, aut etiā pro loco, ubi satus est Asparagus: eodem etymo fere quo apud nos Cepina, Rapinaq; . Theodorus Corrudagine quasi aliud q̄ Corrudam genus interpretatur. Cato certe ad eundem modum Corrudam, quo Cepinam & Rapinā accipit. In arundinetis inquit Corrudā ferit, unde fiant Asparagi. Exit uere caulis cibo idoneus: tum scabrescit, & processu in florem abit: qui nō ex ipso tantum, sed ex prioribus erumpit. Non enim caulem habet annuū. Hæc ueteres, qui Altiles Asparagos non uidentur nouisse. Corrudam Attici, non Horminion (aliud enim est) sed Orminion, & Ormenon potius, aliqui Libycum Asparagū dixere, utiq; syluestrem qui post inuētos Altiles, proprie Corrudam est. Corrudam iterū species duæ, candoris solo discrimine. Candidior efficacior uis tribuitur. Iulius Pollux syluestrem Asparagida scribit uocari: fatiū, Ormenon. Serunt spongiis hortenses Asparagi. Ita em̄ Radiculæ Alūliū uocantur. Vellūtū præterq; primo anno radicitus, alioquin decerptis stirpes præfractæ angunt, & quasi excæcāt oculos spongiarū, nec patiuntur Asparagū mitti: spongiæ post quadragesimū diem inter se implicantur, & quasi unitatem faciunt: post annos aliquot transferunt fertilitate in decenniū durante. Seruntū pore ipso quo fastigatus est, in thoros struitur. Nullum hīs gratius solum q̄ Rauenæ fuit, quæ gloria in hodiernū quoq; mansit ei terræ. Nomen porro Asparagi generale est: ut Betæ, Blicæ, Lactucæ, Atriplici, Maluæ, Rapo, Sinapi, Radiculæ, Pyrethro, Brassicæ, Nasturtio, Bryoniæ, Lauragini, ut in omnibus hīs alia res Asparagus, alia frutex sit. Errant qui Corrudā pro eo capiunt, quæ medicorum officinæ Lupulū cognomināt: folijs apertissime reclamantibus, quæ in Corrudam capillamentū modo tenuata, in Lupulo Bryoniæ similia, paulo asperiuscula. Caulis ei spinis horret, cacuminibus tamē, & Corrudam modo in torulos turbinatis. Flores habet folia ceos & candidos, qui fere allium, uinūq; subolent. Hanc Græci uulgo Bryon uocant, a Bryoniæ ut puto similitudine. Brusculam, quasi bryon scanfile, rura dicunt. Aut hæc oīno, aut non absimilis huic herba est, quæ occidentis populi Ceruissam suā maceratis humore floribus cōmendant, sapore quodā uini. Habiolam, siue Habillam Gallicæ uocantes, Humulū, & Tholophin Germani. Ego Lupum salictariū a Plinio dictam cenfeo. subit enim, scanditq; salices, & arbuta omnia, circūuoluendo se complectitur. In Flaminia quoq; Lupus reptitius uulgari nomine uocatur hodie. Herbarū inquit sponte nascentiū, quibus utimur in cibis, in Italia paucissimi mas nouimus, Fraga, Tanum, Ruscum, Batū marinam, Batū hortensianā, quam aliqui Asparagum uocant Gallicū: præter has Pastinacā pratensem, Lupum salictariū: eaq; uerius oblectamenta q̄ cibos. Habetur & aliud quoddā genus, ut idem Plinius testatur, incultius Asparago, mitius Corrudam, passim etiā in montibus nascens, refertis superioris Germaniæ campis. Nam quod in Nefide Campaniæ insula sponte inquit oritur, optimū existimatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Vix credat aliquis, q̄ multa in notissimo olere toto hoc capite mutata, corrupta, & addita fuerint, quæ nouisse legentes inutile penitus non fuerit. Estq; illud ante omnia sciendum, de agresti Asparago omnia hæc a Dioscoride dici. Ideoq; a principio statim Petreus, id est, in petrosi nascens dictus est: ut ea additione ab Altili, quem in hortis constitum, solæ nouerunt diuitum mensæ, discerneretur. Nec tantū Petreus illic legitur, sed in aliquot græcis *ἄπρος*, id est, agrestis etiā inuenitur. Indicantq; id manifeste quæ sequuntur appellationes, Myacantha, & Orminion, quæ omnes in agresti Asparago a Plinio numerantur. Habetq; Myacantha caussam &

originem nominis ex Rusci appellationibus: ut in eo indicabimus. Ormionem autem a nobis dictum est, quod myon in impressis codicibus legebatur, nulla significatione: instauratusque locus Plinij, & aliorum auctoritate merito a nobis est.

De Plantagine.

CAP. CXL.

ARnoglōsson, alij Arnion uocant, alij Probation, alij Cynoglōsson, alij Heptapleuron, alij Polyneurōn, Magi Burechinemona, Aegyptij Asonth, Romani Plantaginem, Hispani Thesaricam, Poeni Atijrcon. Duo eius genera. Minor, folia habet angustiora, minora, molliora, lauiora, & tenuiora, caule anguloso, in terra sessili, floribus pallidis, semine summis caulibus emicante. Altera maior & uirentior, latis constans folijs, olerum generis. Cuius caulis cubiti altitudinem petit, angulosus, subruber, a medio ad uerticem tenui semine circumdatus. Radicibus nititur teneris, hirsutis, candidis, digitum crassitudine æquantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus, & locis humidis. Multo utilior magna est. Vim habent folia exiccatoriam, constringentem. Quare omnibus malignis ulceribus, & fluctioni opportunis, atque elephantice, sordidisque illita profunt. Profluuia sanguinis, ulcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, nomasque cohibent. Vetera ulcera, & inæqualia cicatrice obducunt. Chironia sanant. Sinus conglutinant. Morsibus canis, ambustis igni, inflammationibus, partis, parotidibus, strumis, ægylopijs illita cum sale profunt. Coctum cum aceto & sale olus, dysentericis, coeliacisque sumptum subuenit. Datur & in locum Betæ, cum lenticula coctum. In leucophlecmatia, inter aridas epulas herba decocta datur. Comitibus, & suspiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta subinde oris ulcera, purgat. Cum cimolia, aut cerusa, igni sacro medetur. Fistulis infusus prodest. Lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. Additur quoque in oculorum collyria. Gingiuis cruore suffusis, & sanguinis reiectionibus, potu confert. Clystere dysentericis infunditur. Contra tabem datur in potu. Aduersus strangulationes uulvæ, in uellere subijcitur, etiam si uulua fluctuone laboret. Semen ex uino potum, alui fluctiones & sanguinis excretaiones sistit. Decocta radix, & manducatu, & collutione dentium dolores sedat. Eadem cum folijs, ulceribus renum, & uescicæ in passo datur. Ferunt treis radices cum tribus uini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari, & quatuor quaternis. Sunt qui radice gestamine, discutiendis strumis utantur. Syri ius Plantaginis & calaminthæ, cum melle produnt ijs mederi, quos uires defecerunt, datum die secunda, & quarta, & parasceue, id est, ueneris die. Hoc autem ueluti arcanum accipito, quod ueraci experientia compertum est.

BARBARI COROLL.

Plantago herba, Stelephuros, & Ortyx a Theophrasto dicitur, a Plinio Seläpyros, & Ortygia, Coturnix a Theodoro uertitur, a Dacis Simpeax, alij Thyetericem, alij Theucaricon.

A

ἀρνόγλωσσον
ἀρνείον
κυνόγλωσσον
πολύνευρον
ἡπταπλευρον

B

Pl. li. 25. ca. 9.

D I O S C O R I D I S

C appellant, a nostris quandoq; Septineruia. Quamq; Heptaneuron alia uidetur herba q; Plan-
tago, id quod ex emplastro quodam aduersus collectiones, cui nomen est Botanicon, aperte li-
quet: quippe in quod tres quærantur herbae: Plantago ternis uncijis, heptaneuron senis, leoneu-
ron quoq; ternis. Nec quæ sit Leoneuron intelligo, Flosculus ei lanugineus, ut frumento: parti-
culatim erumpens, ut aphaca, & intubum. Inter spicatas est Plantago, sed minor, nigrioribus
folijs, & linguæ pecorū simillimis, unde nomen apud Græcos Arnoglossō: maior folijs lateritū
modo includitur: quæ quia septem sunt, Heptapleuron nonnulli uocauere. Caulis angulatus,
& similis Napi, Arnoglossō, & Arnoglossā dicitur, a Græcis Plantago.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ a Dioscoride numerantur tam multæ Plantaginis appellationes, una tantū uoce a
Plinio colliguntur. Siquidem 27. uolumine capite, s. linguæ pecorum similia Plan-
taginis folia esse dicens, Romana breuitate complexus omnia est: quæ in legentium gratiā ex-
plicanda modo a nobis sunt. Arnoglossos itaq; a Græcis Plantago dicta est, q; agnīng linguæ
folia eius speciem habent, ἀρνίον enim agnum, γλώσσαν uero linguam ea gens appellat. Eandem
habet rationem & causam ἀρνίον, quasi adiectiua forma agnīnā herbam dicas, προβάτιον itidem
ab oue, quasi ouillam, πρόβατον enim græcis ouis est, κυνόγλωσσαν, id est, canina lingua, non quia
quæ uere Cynoglossa dicitur Plantago sit, sed non dissimili foliorum figura. Videturq; appel-
latione hac minor potius, q; maior Plantago significari, quæ caninæ linguæ similior q; maior
est. Dico autem Caninā linguam herbam sic appellatam, de qua in quarto agendum erit. He-
ptapleuros eadem, & Polyneuros ex eadem causa, iisdem notis dicta est. πλειῶς enim Græci
folia eius distincta sunt, ideo nomen id inuenit. Nec minus a multitudine earundem fibrarū, quas
neruos etiā uocant, Polyneuron. Factumq; postremū hoc nomen ex eo est, quoniam non semper
septem, sed aliquando quinque tantū his fibris distincta est. Eamq; ob causam, quoniam non semper
per responderet numerus, aliqui incertā relinquentes rem, Polyneuron, quasi multinerū dix-
runt. Tam enim quinque q; septem multa sunt. Variant autē Plantaginis fibræ pro latitudine fo-
lij: quod enim latissimū fuerit septem, quod angustius, quinque plerunq; habet.

D De Lauere, seu Sio. CAP. CXLI.

σίον ἀναγallis
χίτων ἀρωματική

Sion, quod in aquis est, aliqui aquatilem Anagallida, alij Darenion,
alij Lauer, alij Schinon Aromaticum uocant. In aquis inuenitur,
frutice pingui, recto, folijs latis, Holusatro similibus, sed minoribus, &
odoratis. Quæ cruda coctaq; esu calculos rumpunt, atq; excernunt. V-
rinas cient. Menses & partus extrahūt. Dysentericis in cibo auxiliantur.
De Sio Crateias tradit, hærbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem,
rotunda, maiora q; Mentæ, nigra, & ad Erucam accedentia.

B A R B A R I C O R O L.

Pli. li. 26. ca. 8.

Sium latius Apio est, nigrius, pinguius, copiosum semine. Sion ὡς ὁ Λαυρὶ a Græcis uocatur,
hoc est, Sium in aquis, siue aquaticū. Hoc multi uulgo Cresionē dici rentur falso, promiscuū &
acetariū olus, & refrigerantis naturæ: At Sium calfacientis est, & odoratū. Sunt qui Lauer Plin-
io uocatū, in riuis proueniens, utile torminibus coctum & conditū, & ad calculos uesicæ cru-
dum pro Sio capiant. Nam & Dioscorides hoc loco Sium ait a Romanis Lauer dici, etiāsi La-
uerde scriptū est. Sunt qui herbā, quæ ab eodem Plinio Silaus dicat, in glareosis & riuis na-
scentē, Apij similitudine, uesicis perinde laudat, pro Sio & Cresionibus intelligant. Ego in ca-
stigatione Pliniana uerbū illud Silaus, adulterinū arbitratum sum, nec Silaus, sed Lauer scriben-
dum. Hoc autē Lauer, ipse pro Cresionibus accipio, nō pro Sio, qd odoratū est, ut cōmonui.

E X M. V E R G. C O M M.

Non est ut uidetur dubitandum, quo loco nascatur Sium: quale autem sit, Anagallis indi-
cabit: ob cuius similitudinem aquatica Anagallis a quibusdam dictum est: indicabit ob ean-
dem causam & odoratus Iuncus. De quorū altero actum in primo uolumine est, de altera non
multo post in hoc ipso agitur. Idem hoc Sion a Romanis Lauer dici, hic ipse scriptor testatur.
Meminit autē Laueris Plinius, ut credimus, lib. 26. non tamen idem Laueri in eo Sion est: quod-
nam de Sio. 22. uolumine eiusdem numeri capite longius egerat: dixeratq; latius Apio esse, in
aquis nasci, pluraq; alia, quæ poterunt in eo uolentes certius expendere. Nos illud tantum mō

A nemus, Lauer dici Sion ob natalium similitudinem, quoniam ambobus uita in aquis sit. Quid autem Lauer Plinio dicatur, non difficile erit rem diligenter in eo contemplantibus intellexisse. Describit enim, in aquis nascentem uulgarem herbam, qua rura fere omnia cum aceto in cibis utantur. Sunt qui credant hanc esse, quam uulgo Cresiones appellat. Quod nos ut non negamus, sic etiam non confirmamus. Quod autem testatur est, non esse Sion quod Lauer. Id enim auctore Dioscoride odoratum est, Lauer nullo odore commendatur. Qualecunque autem Sion sit, non adeo dissimile Apio describitur. Nec est quod miretur aliquis, nostra ætate tantam rerum incertitudinem: cum nec quondam florent Græcorum fortuna, Sium, ut paulo ante monstraui mus; a professoribus cognoscere. Ostendunt nostræ ætatis herbarij, dissimilem huic penitus quam illi Sion uocant, Feniculi folijs, altiore crassioreque caule, grandi in summo umbella: nisi confertior sit feniculo, non dissimili colore, in cunctis albicante.

De Sisymbrio.

CAP. CXLII.

SISYMBRION, alij Serpillum uocant, alij Veneris Coronam, Romani Veneream, aut Eulsteralem. In solo inculto nascitur, Mentæ horrentis similitudine, odoratius, latiore folio. Inferitur coronis. Caffaciendi uim habet. Contra stillicidia urinæ, calculosque semen ex uino bibitur. Tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti, aut temporibus illinuntur. Item contra uestparum, apiumque ictus. Vomitiones potu cohibet.

BARBARI COROLL.

Sisymbrium, siue ut recentiores Græci, Cimbium, degenerat in Nepitam aspectu, sed odore in Mentam, ut Theophrastus existimat. Latissimum nascitur circa piscinas, & stagna, & in puteorum parietibus. Folium in sicco nascenti angustius, quod in riguis prouenit: de quo mox agetur. Sisymbrio montes plerique sciant, sicut Thracia: ubi & Serpyllum, aut aquæ defuerunt ex his auulso ramos, feruntque. Item Sycione ex suis montibus, & Athenis Hymetto, Sisymbrium folio tantum coronat.

Theophr. lib.
6. cap. 7.

EX M. VERG. COMM.

Sisymbrium ut odore in Mentam, figurat in Nepitam degeneret, præcipuam a cultu neglecta causam habet. Nisi enim assidua cultura coercetur, & translatione nouos uelut naturales quot annis accipiat, in varias plantas quæprimum diuersa sui parte degenerat. Testantur id rei rusticæ, & plantarum historiam tradentes scriptores omnes, Theophrastusque præsertim: qui nullibi de naturæ mutationibus his egit, ut non Sisymbrij in Mentam, degenerantis exemplum usus sit: causamque mutationis eius in quinto de plantarum causis longius prosecutus est: docens fieri, ut cum Sisymbrium non excoluerit olitor, nec propriam illi & necessariam culturam reddiderit, altius radices agat, actisque in altum omne illud nutrimentum conuertat, eoque destitutas superiores partes infirmiores fieri, & odoris acrimoniam amittere: eaque amissa, reliqui corporis odorem infirmum, languidumque, & Mentæ similem fieri. Eamque ob causam, ne id patiat, transferri sæpius Sisymbrium in disciplina ruris & hortorum præcipitur. Serpilli figuræ & speciem aliquam Sisymbrium habet: ideo a quibusdam, ut hic ait, Serpillum etiam uocatum est. Quemadmodum in similibus fieri solet. Plinius Serpillum ait syluestrem Sisymbrium a quibusdam dici. Facit id negligentia, & rerum ignorantia: cogitque, commutatis ob similitudinem inuicem nominibus, diuersa rerum genera, graui periculo miscere. Veneris coronam, & herbam Veneream, ob odoris suauitatem, uerisimile est dictum quondam fuisse Sisymbrium. Amorū enim Dea, amoribus aptas tantum sibi exigit herbas, quibus coronata in comestationibus suis iuuentus, suauiore odoris oblectamento, uoluptates suas comendet & augeat. Et hæc de primi, aridisque & incultis locis nascentis Sisymbrij appellationibus dicta satis sint. Quæ deinde in altero & Sij modo in aquosis nascente a Dioscoride numerate fuerunt, ab eodem etiam declaratur. Ideo enim Cardamine facto a Nasturcio nomine, dictum quondam Sisymbrium hoc fuit, quod simile Nasturcio in gustu & sapore sit. Tantaque est Sisymbrij huius quod Cardamine dicunt, ad Sium similitudo, ut Paulus Aegineta in sexto reuulerit, dicere quosdam, Cardaminem hanc Sium esse. Nasci hoc in eodem locis quibus & Sium, a Dioscoride tantum dictum, in aquosis, scilicet, idque genus Plinius etiam describit.

B

C plisse his uerbis uidetur. Lætissimum nascitur in puteorum parietibus, & circa piscinas, & stagna. Cum tamē hic aliter tradiderit, non circa, sed in aquis eodem quo Sium modo nasci. Non possunt abundantibus rebus, deficientibusq; nominibus priuatim, seorsumq; omnia citari. Generatim necesse est uocari, describiq; multa, unamq; hanc ob causam medica ubiq; materia tam parum certa est, tamq; in antiquis etiam scriptoribus multiplex, & uaria. Nos quod possumus præstamus, immensi operis huius aliquam post nos alijs partem relinquentes.

¶ De altero Sisymbrio. CAP. CXLIII.

καρδαμίνη

A lterum Sisymbrij genus, quod aliqui Cardaminam, alijs Sion appellant. Ea herba riguis gaudet, & eisdē in locis quibus Sion prouenit. Quæ ideo nonnullis Cardamina nominatur, q̃ gustu Cardamū, id est, Nasturciū representet. Folia primū rotunda prodeunt, adulta Erucae modo findunt. Id exalfacit. Vrinās mouet. Crudū estur. Purgat lentiginēs, cutisq; uitia in facie, noctibus impositū, matutinisq; detractū.

B A R B A R I C O R O L L.

S i Symbrum syluestre a quibusdam Thymbratum appellatum, pedali, nō amplius altitudine conspicitur. Huic cognomen est Cardamine, ut Galeno placet, atq; Dioscoridi.

¶ De Crithmo. CAP. CXLIIII.

κρίθμον
κρίταμον

C RITHMUM, seu potius ut aliqui Critamon, fruticosa hærbula est, cubiti altitudinem petens. Nascitur in maritimis, & petrosifis, folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, ueluti Portulacæ, crassioribus, & longioribus, salso gustu. Flores candidi sunt, & semen ceu Rosmarini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur. Habet intus semen rufum, radices digiti crassitudine, tres, aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen, & folia incocta uiuo, potu urinæ difficultati, & regio morbo auxiliantur. Menses cient. Estur crudum coctumue in olera. Seruatur etiam in muria.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 27.

C rethmon, Batīs latine dicitur: q̃q̃ Batīs duplex, marina, & hortensiana: quā aliqui Asparagum uocāt gallicum. Liguria Baticulam hodie quoq; appellat. Caulis ei palmū altus Plinio, cubitalis Dioscoridi. Semen feruens, nucleo interiore, qui ut in Rosmarino Cachrys uocetur. De marina potius q̃ de hortensiana, siue quod idem est, satia loquitur Plinius, quotiens Crethmon nominat. Proinde alio loco de Batī medicinis, alio de Crethmo disserit. Satiuam Batin, & olus Chordum a Columella dictam inuenio. Hanc quia serotinum sit olus, quo modo & Sed & pecus Chordum, & Chordū suum dicimus, ut Græci Opsigonon. Nam Metachæron apposuisse. Hippocrates Aethiopicā Batin cōmendat. Est & Batīs, siue Batos, inter pisces, quēquit. Batin, atq; Baton nostri Raīam appellant. Nam quod Græci Rhinam, ipsi Squatinā uocamus, cuius aridā cutem Hippocrates Ichthyen noīat. Quamq; & instrumentū medicinale, quo quādoq; uertit: nisi alterutra lingua librarius errauerit. Batīs porro piscis in tria genera dirimitur, Baton, Hobaton, & Asterianbatin: & ex Squatina & Raia, natus Rhinobatos.

E X M. V E R G. C O M M.

Q uam Græci Crithmon, a figura seminis, ut credimus dixerunt, Plinius, & alijs ubiq; Batim, Columella nunc Batim, nunc olus Chordum, q̃ sero & appropinquante uinuestria, & per se nascentia, inuentū: mox in hortis ubiq; ad quotidianos usus confictā herbam: quam ditiorū, & plæbis mensæ pariter nouerunt. Eam hic paulominus q̃ cubitali altitudine in

caulem crescere ait: ceteri palmum erigi a terra tantum dixerunt. Quod in Italia, præsertim in Hortensi uerius uidetur. Non ideo tamen arguendus Dioscorides. Nulla enim in his certa naturæ lex & mensura est. Refertq; magnopere in huiusmodi rerum historia, quibus locis ali quid cōmetetur aliquis: credimusq; nos quod hic ait, cubitali fere altitudine esse Batim, sic acci piendum esse, ut maxima omnibus locis hæc eius mensura sit, nec altio rem cubito Batim alicubi inueniri. Estq; legitimus hic, et ob naturæ uarietatem necessariū metiendi omnia modus: ut præfinito altero extremo, nec ultra, nec citra id aliquid fieri intelligatur.

De Coronopo. CAP. CXLV.

Coronopus, aliquibus Ammonos, alijs Alstrion, Pœnis Atir sitte, Romanis Cicatrix, alijs Stilago, alijs Sanguinaria dici tur. Oblonga hæbula est per terram repens, fissis folijs. Coquitur in olere. Radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo coeliacis fa cit. Prouenit in semitis, iuxta domicilia, & locis incultis.

BARBARI COROLL.

Coronopus, hoc est, Pes cornicis, inter aculeatas a Theophrasto ponitur, spōteq; nascent. Interim & feritur, medicinae ad usum, Silago, aut Stilago dicitur a nostris, a Græcis etiam Coronopodion, ut Galeno. Sunt Arabes qui hanc Coruinum uocent. Nec prohibeo, dū res constet, quibus cuiq; liber uocibus utat: illud monendi sunt, herbam, quæ mō Pes coruinus ab officinis & herbicidis appellatur, non tam Coronopoda uideri, q̃ Ranunculi genus, qd Polyanthemō cognominatur: quandoquidem aculeata & oblonga esse Coronopus herba tradi tur, & aluinis prodesse: Coruinus aut pes, auis eius, & Ranunculi similitudine conspicitur, plurimis foliorum diuisuris, cuius uel tactu solo pustulæ, ambusti modo corporibus attollunt, flo re aureo, copiosoq; quibus notis, Ranunculum Polyanthemō uocatum coniungunt.

EX M. VERG. COMM.

Scripsit de Coronopode hac iam pridē multa Leoniceus, uir nostra ætate dignus, cui mul tum deferant bonarum literarum cupidi, in cōmentariolo eo quod de Plinij erratis aliquot edi dit. Conatusque inter cætera est, quam hic romana appellatione Coronopodis Caciatricem esse dicit, ostendere ab Apuleio Galli crus dictam fuisse: & ex Galli crure ab imperitis græcorū librarijs Caciatricem in hoc scriptore factam esse. Quod si confirmare ego ausim, uaticinari ma gis q̃ censere me credam. Nulla enim eius uocis uestigia in hac supersunt. Nec coniectura ali qua in ea se offert, qua quod ignoratur & later in lucem trahi possit. Illud potius admittendū, quoniam græci a Cornicis pede eam uocauerunt, uerisimile esse, latinos a Galli crure congru entibus alijs notis, ob similitudinem, nomen illi fecisse: quemadmodū ab aliquibus etiā, non cornicis, sed Coruinus pes hæc ipsa nominatur. Idem præterea eandem a Plinio ait lib. 24. Gra men aculeatū appellari. De quo dubitandum nulli esset, si hic aut aculeatā dixisset Coronopo dem, aut qd aculeos indicaret aliqd illi adiecisset. Quam ob causam, nō sine ratione subsister in Plinio aliq; audiens in aculeatas lib. 11. & secūdo Coronopoda ab eo numerari. Nec nos Pli nium arguimus, sed uarietate historiæ demiramur: dubitamusq; posse eam notā Diosc. deesse. Theophrastus lib. 8. de ea tradidit humi caulescere, quod hic ait per terram sterni: numeratq; in ter aculeatas, & sponte nascentes. Vulgaris & ubiq; fere nascent herba hæc est.

De Cicerbita, seu Soncho. CAP. CXLVI.

Sonchon asperum, aliqui Cichorium uocant, Romani Cicerbitam asperam. Aphri Gathonem. Huius duo genera. Syluestrior magis spinis horret. Alter teneritate quadam mollescit, cibus expetitus, angulo so caule, interdum rubicāte, folijs in ambitu per interualla dissectis. Vtri usq; uis refrigerat. Modice adstringit. Vnde æstuantī stomacho, et inflā mationibus illiti profunt. Succus eorū stomachi rosiones forbitione mi tigat. Lac elicit. In uellere appositus, sedis ac uulua collectionibus opitu latur. Tam hæba q̃ radix illita, uibratis a scorpione ictibus subuenit. Alter Sonchus tenerior, arboris instar, latis constans folijs. Eum qui ra

A

καρυνόπους

Pli. li. 22. ca. 19

B

σδχχος

D I O S C O R I D I S

Cmos habet, folia distinguunt. Sed ad eadem pollet.

BARBARI COROLL.

Sonchos, in candidum, nigrumq; diuiditur. Lactucae similes ambo: nisi spinosi essent, caule cubitali, intus cauo. sed qui fractus copioso lacte manet. Sunt qui nigro uelci prohibeant: quafi faciente morbos. Sonchum Hecale cum Bari supradicta Theseo, apud eundem poetam inuenit, non tacendo Euclidis parasiti dicto non infuso, qui Sonchum in coena copiosam apponenti, senarium ex Euripide poeta protulit, ubi Capaneus inquit.

μὴν τραπεζῆς ὅτιο ἔσονται τὰς.

Aculeatur postq; tenera esse desit, et adulta facta Sonchos, ut Galenus inqt. Aetius hanc quandoq; Dipsacon uocauit. Dioscorides Cicerbitam a Romanis dici prodidit: quod quidem uocabulū in Ethruria hodieq; durat. Nunc Romanum uulgu Crispinos, Venetia Lactucinos. Folia ex aceto, saleq; manduntur. Esculenta est & radix.

EX M. VERG. COMM.

Estur toto fere anno Sonchos: sed nihil autumnō, quo tempore post primas pluuias nouo ortu tenerior frondetur. In acetarijs nostris frequētius est. Eam, ut hic etiam testatur, rura nostra, & omnis Ethruria Cicerbitam uocat. Non ideo tamen credimus fuisse hoc eius antiquum nomen. Potuit enim ex non multo tempore Diosco. accreuisse, eo quo a principio diximus modo. Est ubi Crispinus, & ubi Lactucella Sonchos uocetur. Quorūq; toto orbe gentes sunt, tot fere huiuscemodi herbarum appellatione audiuntur. Nihilq; in medicæ materiæ disciplina periculosis est, q̄ neglectis rebus, nominum tantum sollicitum esse. Nota omnibus Sonchus est. Certas enim habet notas: & si in scriptoris huius historia omissum uideatur quod præcipuum in ea est, cuiusq; meminit Plinius, & unde Lactucella a quibusdam dicta fuit. Id autem est lactis liquor, quo fractus caulis eius manat. Potuit a Dioscoride propterea, q̄ nota uulgo Sonchus sit, ea nota relinqui. Potuit perisse, ut perierat etiam in caulis descriptione *ὑπὸ βύσσιν*, quod est, inanis & uacuu: quæ uox in cōmuni græcorum lectiohe nulla est, & ex alijs, in quibus erat, restituta a nobis fuit: præsertim monente id Plinio, qui ait, caule cubitali, anguloso, intus cauo, & qui fractus copioso lacte manet: quæ omnia manifeste Sonchus habet. Inter aculeatas herbas, sed non simpliciter a Theophrasto lib. 6, Sonchus numeratur. Aculeatur enim postq; induruit, & arescere cœperit. Fecerunt ceteri omnes Sonchi duo genera: appellantq; alij candidam, & nigram: alij asperiozem, & mitiorem: alij edendo, alij non edendo esse dixerunt, eadem rei diuisione et significatione. Vbiq; em duo illa nascunt gēna. Solus Diosco. tertiu genus Sonchi arborescētis fecit, q̄ caret Italia. Nec nos hæcenus qualis ea sit, & ubi nascat, a q̄q; audiuius.

*εἰς
μυκάριον
πικρία*

De Intubo, & Seri. CAP. CXLVII.

Satiuam Serin alij Picrida appellant, Aegyptij Agon, Romani Intubum. Duum generum est. Altera syluestris, quæ Picris, et Cichoriō uocat. Altera latioribus folijs constat. Stomacho q̄ hortēsia utilior. Quæ iterū in duas species digerit. Vna folio latiore p̄dit, Lactucarū simillima. Altera angustiore ē folio, & gustu amara. Vtraq; refrigerat et adstringit. Stomacho utilissima. Aluū sistit cocta, si cū aceto adsumat. Syluestres stomacho meliores. Quādoquidē æstuantē ipsū, et quē imbecillitas uexat, leniūt. Cardiacis per se, aut cum polenta utiliter illinunt. Podagris, et oculorum inflammationibus auxilio sunt. Hærbā cum radice illita, percussis a scorpione subuenit. Igni sacro cum polenta medetur. Succus cum ceruifa & aceto ualet ad illitus eorum quæ refrigerationem desyderant.

BARBARI COROLL.

Serin satiuam Dioscorides non describit, sed syluestrem dumtaxat. Summa ergo Intuborū genera, Seris, & Cichorium, Seris Lactucae simillima, Troximion a recentioribus græcis uocatur. Iterum duplex hæc. Satiua, quæ proprie dicitur Seris, minor Cichorio & uenosior. Et Syluestris, melior priore: nigra hæc & æstiuā, deterior hyberna, & candidior. Cichorium, siue ut Theophrastus inquit, Cichore, nunq; est satiuum. A latinis Ambugia, & Intubus erraticus, in Aegypto Cichorium nomen habet. Duplicis & hoc naturæ. Folio angusto, Chresion, & Pan-

Theophr. lib.
7. cap. 11. & 7.

eration, propter salubritatem uocatū, folio latiore, quod Edypnoida cognominant, & Leonis dens uulgarī uoce dicta creditur. Similitudo Intubis tanta cum Lactucis, ut neq; ex eodem genere dici possint, neque item ex alio. Hyemis quidem impatientiores sunt q̄ Lactucæ, uirula q̄ præferentes, sed caule nō minus grati. De Cichorio Theophrasti uerba subiiciemus in Chondrilla: quando & illa species existimatur Intubi a nonnullis.

EX M. VERG. COMM.

Prima oleris huius, & amplissima diuisio est, in satiuū, & erraticū. Dico autē Erraticum, qđ sponte sua natum, omni humano cultu caruit: qualia in plantis, & disciplina ruris multa fecit natura, feniculū, serpillū, pluraq; alia: a ueteribus latinis sic appellata, q̄ sub nulla olitoris, aut agricolæ lege, libera uagantur & errant. Ideoq; incastigata, satiuus minus speciosa sunt. Quod manifeste in Intyboprehenditur: cuius a principio unum idemq; genus, hac una ratione, in duas statim distrahitur species: quarū diuersæ penitus notæ sunt. Amarefcit em Erraticū, & angustiore folio est. Satiū ori, & in cibo gratius, latioribusq; folijs. Quod autē unū idemq; in ambobus seruiatur, flos est, & q̄ flores ferunt ramuli: quos natura nobis indulgit, ut esset unde satiuum Intybū facere uolētes, Erraticum cognosceremus. Post primā deinde & amplissimā diuisionem illam, alia rursus, accedente maiore, diligentioreq; cultura, & hominis labore, diuisio facta est: discretumq; satiuū Intybū in Lactucę dulcedine, foliorūq; quantitate & figura simile: & qđ minus eo sit, & amarulenti saporis. Et hic census Intyborū nostra ætate etiā est, uocatq; Florentinus ager Erraticū & Amarū primū Intybū illud, qđ græci ab amaritudine Picrida nominant: gentes autē aliquę priuatim Cichoriū: a multis quę habet in radice capillamentis, Radiculā. Idemq; huic nomini genus est, quod translatum, terraq; sepius obrutū, candorē teneritudinēq; acquirit, & maiorem amaritudinis partem amittit. Duoq; hæc genera sunt a Diosc. primū numerata, Satiuum deinde illud uno Intybi nomine nunc censetur: etsi corrupta ab Intybo uoce, Ethuria Endiuia passim appellat. In hoc & maius, et minus est, dulcedinisq; et amaritudinis discrimen aliquod: quod ut uidetur ex una diligentia & culturę ratione euenit. Prius illud notissimo uersu in Georgicis suis indicauit Maro, cum dixit, Et amaris Intyba fibris. Intelligens em Intybū gñis nomē, ut græcis Seris est, latinis esse amaritudinem, ut ad certā contraheret speciem, addidit. Secundum illud Galenus dicens, *μικρόριον ἢ ῥωμαῖσι λεγόμενον ἰντυβόλαχανον*, quod est, Cichorium, quod Romani olus Intybi appellant. Indicaui & Flaccus cum cecinit, me Cichorea, leuesq; Maluæ, & cetera. Est enim Cichorion peregrina græcis etiam uox, quæ omnia hæc Intyborum genera simul indicet. Etsi ab aliquibus ad primum illud & amarum Intybum contrācta fuerit. Nihil, ut uidetur, in antiquis scriptoribus circa congeneris plantæ huius appellatio nes certum est. Theophrastus lib. 8. de plantarum historia, Cichoriō appellat syluestre illud genus, quod eodem autore ab amaritudine nomē inuenit. Agit em de herbarum caulibus, aitq; *ὅτι αὐτὸ τοῦ μικρορίου μέγας καὶ ἀποθύσει ἔχει πολλὰς, ἔτι δὲ γλυκρὸς καὶ δυσδιαίρετος διὰ καὶ δυσμῶν χρεῖται*. Quod est, Cichorei autem caulis magnus est, multas habet ueluti brachia agnationes: lentus itidem est, & in frangendo contumax. Quā ob causam, pro uinculis eo utuntur. Qua de descriptione, uidetur amarū & agreste illud significare. Idem paulo post Picridem hoc ipsum appellat. Sæpe etiam in describenda in aliquibus latiore foliorum figura, *μικρορίωδης* ea appellat, id est, Cichorio similia, satiuum indicans: hoc enim latiore & lactucino folio est. Paulus Aegineta Romana appellatione usus in primo, *ἰντυβὰ* totum hoc genus uocauit. In sexto deinde satiuum, agresteq; & amarum uno eodemq; nomine Serim: in secundo postremo Serim satiuū, Intybum agreste. Plinius libro. 15. capite septimo, a Lactuca digressus, satiuum esse Intybum his uerbis declarat. Neq; ex eodem genere possunt dici, neq; ex alio Intybi. Pauloq; post. Est & erraticum Intybum, quod in Aegypto Cichorium uocant. Mox iterum lib. 20. cap. 3. de erratico & satiuo hæc ait. Intybi quoq; non extra remedia sunt. Erraticum apud nos quidam Ambubeiam appellauere: in Aegypto Cichorium uocat quod syluestre sit: satiuum autem Serim. Columella lib. 2. cap. 18. cum docet, quomodo prata colantur, Primū ne stirpes, aut spinas, &c. atq; alias ante hyemem, alias per autumnum extirpemus, ut rubos, uirgulta, iuncos: alias uel lamus, ut Intyba, ac solstitiales spinas. Qua descriptione, Intyba indicaui, quæ syluestria sunt. Satiua enim in pratis non inueniuntur. Idem postea li. 9. capite. 13. cum de educandis anseribus agit, Serim satiuam appellat his uerbis. Palustris quoq; sed herbidus destinetur ager: atq; alia pabula conferantur: ut uitia, trifolium, scœnū græcum, sed præcipue genus Intybi, quod græci appellant Serim. Postremo Palladius in octobri mense satiuum Intybū uocat. uerba eius sunt. Mense octobri ferenda sunt Intyba, quæ hyemi seruiant, &c. Ex his quæ tam multa & longissime repetita a nobis sunt, colligere facile est, nullam in his, nec græcis, nec latinis certam, per-

Cpetuaamq; appellationem esse: sed in græcis Cichorium nunc agreste, nunc satiuum Intybum indicare: Picridem semper agreste, quemadmodum Serim plarumq; satiuum. In latinis Intybum modo satiuum, modo agreste, Ambubeiam autem agreste semper. Nec fore antiquos autores legentibus aliquid utilius, q̄ præcedente rei coniectura, contra q̄ in cæteris fit, non ex uocibus res, sed ex rebus uoces intellexisse. Solus Celsus libro. 2. cap. 29. de utroq; gñe agens, ad certas uoces in medicina rem contraxisse uidet: satiuumq; Intybū, syluestre Ambubeiā appellasse. Verba eius sunt. Lēticula, cui uel Bera, uel Intubus, uel Ambubeia, &c. alternitū sumi iubēs, aut satiuū qd Intybū, aut agreste qd Ambubeiam uocat. Censeremq; ego: qm̄ graui periculo in medicina hæc uariant, satiuū in græcis Serim, in latinis Intybū: Agreste in græcis Picrida, aut Cichorium, in latinis Ambubeiam semper appellari: ut certa nominū ratio, certam legentibus rem indicaret: nisi in medicæ materiæ nomenclatura audacior uideri aliquis timeret.

κονδρίλλα

De Condrilla.

CAP. CXLVIII.

Condrilla, quam aliqui Cichorion, alij Serin appellant, caulem, flores, & folia habet Cichorio similia. Qua ex causa nonnulli syluestris Intubi speciem esse pronunciarunt. Verum tenuior tota est, in cuius ramulis gummi mastices simillimum, tuberculo fabæ inueniri solet. Quod cum myrrha tritum, & linteo appositum instar oliuæ, sceminarū mēses trahit. Tusa cū radicibus tota, adiecto melle, diuiditur in pastillos, qui nitro ammissi utiligines emaculant. Gummi, inordinatos pilos replicat. Quod item tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admouetur. Contra uiperas in uino pota proficit. Succus decoctus in uino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur Condrillæ genus, folium ferens oblongum, circumrosus, humi sparsus, caulem succo madentē lacteo. Radice tenui, rotunda, leui, uegeta, flauescēte, succosa. Cuius & caulis & folia concoquendi uim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in lætis, & cultis.

The. li. 7. ca. 7.
Pli. li. 21. c. 15. 17

BARBARI COROLL.

Condrilla, siue Chondrillon olus est folio Intubi, & propter amaritudinem ingustabilis. Succus radici lacteus, copiosus, acer. Caulis fere pedalis, succo manans amaro. Radix fabæ similis, aliquando numerosa. Gummi eius proximum terræ funditur. Herbam mures agrestes a serpentibus læsi, mandunt. In Theophrasto Andryala, in Plinio Chondryala, pro Chondryllas. Omnia Intubacea, ut Theophrastus inquit, ineunte uere, caulem, floremq; simul edunt. Cichorium foliatu, & caulibus, & ab radice, unaq; cum emerfu ramusculorum flosculus emicatur. In caule per partem, ut Heliotropium usq; in autumnum. Caule magno, surculisq; brachiato pluribus, itemq; ad uinctum quoq; lentis, ut radices: quarum prolixitate contumaciter emoritur. Fert & siliquam, siue folliculū, et in ea semen per extrema caulium. Intubam auem pleriq; falso intelligunt amari iecoris, non herbam, in Virgilij uersu primo Georgicorum, Et amaris Intuba fibris.

Quo doctissimus Poeta, ad genus illud Intubi uidetur alludere, quod Picris appellatur. Acrius Picrida pro Cichorio syluestri, quod & Serin dici uult, accepit. Iulius Pollux autor est, appellatione Cichorij ueteribus syluestria olera uenisse dumtaxat: quæ & gracilia, & tenuia cognominabantur. In Ouidio ad cutem probari Seram legimus illo uersu.

Et simul instantis corpora finge Seræ.
Quod autem id genus sit fruticis, non ausim decernere: nisi q̄s ab eo Serā, pro Seride uocaram credat. Nā & Chondrilla, quæ itē Seris est, ad illū usum, ut Diosc. hac parte docet, adhibebat.

E X. M. V E R G. C O M M.

Intybis congenerem esse Condrillam, argumēto est ueterum omnium de ea historia, q̄ ab Intybis statim de Condrilla agentes, eam illis coniunxerunt: deincepsq; descripserunt quā natura coniunxerat, & simul docendam esse ob similitudinem monuerat. Plura ceteri omnes q̄ hic de

129
 ea docuerunt: caule pedali, & amarissimo totam sapore esse: radicem habere numerosam: gum-
 mi illud proximum terræ in ea inueniri, & candidum conspici florem: multaq; alia: quæ quo-
 niam in Corollario suo a Barbaro collecta fuerunt, a nobis relinquuntur. Adiciemus hoc
 solum, tantam esse illi cum Ambubeia, quam diximus agreste Intybum, similitudinem, ut sæ-
 pe legentes in campis fallat. Nascitur, ut hic etiam ait, pingui & lutofo solo: quem habiti una
 uoce *ῥωδίων χαρίων* felicissime Dioscorides indicauit, *ῥωδίου* enim *χαρίων* in re rustica ueteres di-
 xerunt eas agrorum partes, quæ nullos habent terræ mixtos lapides, sed solam terræ profundi-
 tatem: ob quam caussam, non dilabentibus per lapidum interualla aquis, lutuosus ager & pin-
 guis fit. Idq; una *ῥωδίων* uoce Dioscorides monstrauit. Sit autem hoc, an secus quod Bar-
 barus uerit, nasci in terrosiss, aliorum iudicium fion. Nos rem primum, mox uocis rationem se-
 cuti, & pinguibus lutuosisq; locis nasci eam diximus.

C De Cucurbita. CAP. CXLIX.
Vcumbita esui apta. Cruda illitu tumores & abscessus mitigat.
Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam syria
sin uocant, in scincipite illinuntur. Oculorum inflammationes, poda
grasque refrigerant. Succus e ramentis tulsis per se, aut cum rosaceo in
fusus, aurium doloribus auxiliatur. Aduersiones cutis illitu adiuuat. To
tius seruefactæ & expressæ succus, cum melle exiguo & nitro potus, al
uum leniter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem excavatam infu
sum, si mistum sub diu teneatur, potu aluum leuigabit.

B A R B A R I C O R O L L.

Cucurbitam fatiuam Colocynthen greci uocant. Syluestrem, Colocynthida. Erumpit fa-
 tiua, post quintum, sextum, septimumue diem. Cucurbitæ multa genera. Satiuum, & Colo-
 cynthis, ut prædiximus. Tertium Sophios cognominata: quia ficinanis, digitali crassitudi-
 ne, non nisi in faxosis nascens. Cucurbitam marinam nonnulli putant. Satiuæ fastigia duo. Pri-
 ma, Camerarium in tectis scandens, leni umbra testudines & pergulas operiens. Plebeium hu-
 mili reptat flagellis. In priore, mire tenui pediculo libratur pōdus imobile: auræ, Crescit qua co-
 gitur forma in uaginas uirtiles coniecta, postq̃ desloruit; plerumq; & draconis intoriti figura: li-
 berate uero penitenti concessa, iam uisa est nouem pedum longitudinis. Cortex uiridi tener dera-
 ditur cibus, quemadmodū & primus quoq; caulis. Ipsæ quo longiores tenuioresq; sunt, eo gra-
 tiores, & ob id salubriores, quæ pendendo creuere, minimumq; feminis tales habent. Chrysip-
 pus unus omnium damnabat eas in cibus, cum tamen adagiū illud celebre iam esset, *κακοκυνθιστος*
υγιεινος, hoc est, saniores esse q̃ Cucurbita, Siccantur fumo Cucurbitæ hortensiorum semini-
 bus condendis, rusticæ supellectili, Alexandrinæ maxime. Iam & in balnearum usum uene-
 re, urceorum uice, multo etiam prius cadorum ad uina condenda.

Q Votidianus, sed vulgaris usq[ue] dum lignescat, cib[us] Cucurbita est, quibus nascitur locis omnibus pariter nota: nihil ideo longius de ea repetendum. Quod in medicina no-
uisse inutile non sit, ex grecorum placitis, quod infantum Syriasis sit, breuiter dicemus. Cuius
mali appellatione Romani caruerunt. Erst Plinius ardores capitis id lib. 20. capite. 7. appella-
uit. De Syriasi autem hac grecorum medici, presertimq[ue] Paulus Aegineta his uerbis docuerit.
Inflammatio partium circa cerebrum, membranasq[ue] eius, in infantibus Syriasis est. Concauum
sit in ea fincipit. Concaui itidem cum pallore oculi. Accedit etiam totius corporis siccitas, Suc-
currit huic malo, impositus fincipiti cum rosaceo uitellus oui: sic tamen, ut continua mutatio-
ne renouetur. Oportet eodem loco etiam imponere herbae quam Heliotropii greci, latini Sola-
ne dicunt, folia, cucurbitae ramenta, cucumeris, quem Peponem uocant, adiacentem carni cu-
tem, aut horten[sis] solani cum rosaceo succum. Graeci dulcem, & quae edendo est Cucurbitam
feminino genere in secunda declinatione *κολοκύνθη* dixerunt: medicam uero & amarā, de qua
fuo loco longius agetur in quinto, & ab hac diminuta appellatione *κολοκύνθια*. Est illud ani-
maduertendum, in dulci Cucurbita ex duplici genere duplex etiam nomen esse. Rotundae, &
in globum tumenti, q[uod] Cucumeri similis sit *σινάπ*. Tereti et in longitudinem extensa, *κολοκύνθα*.
Latini utramq[ue] eodem Cucurbitae nomine appellauerunt.

C S A T I V V S Cucumis aluo & stomacho perquā utilis habetur. Refrigerat, qui corruptionem non sentit. Vesicæ prodest. Olfactu reuocat, quos animus liquerit. Semen modice urinam mouet. Cum lacte, aut passo, uesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum uino folia, morsus canum sanant, & epinyctidas cum melle.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 19. ca. 5.
libro. 20. ca. 1.
Theophrast.
lib. 7. cap. 4.

C Vcumis a curuitate, ut placet Varro, Græce Sicy, & attico more Sicyos uocat, & Sicydiō a Phrynico poeta, & cucumeraria Syclata. Cucumerem Heraclides Tarentinus Hedygeon uocauit. Quinto, sexto, septimoque die emicat, sed omnino celerius q̄ Cucurbita. Radice breui, ut Pepo. Dulciores fiunt, maceratis aqua, lacteue seminibus. Tres satui differētiē Theophrasto sunt, Laconici, Scytalij, Boetij. Laconici rigantur, nō gaudent aqua reliqui. Adiecit q̄s Euthydemus quos Dracontias uocauit. Tanta porro naturę cognatiō est inter Cucumeres, Pepones, Melopepones, Cucurbitas, ut spenunero & pprietates & nomina latini, gręciq; cōfundant. Ipsum quoq; instrumentū Cucurbitulā gręci a Cucumere cognomināt, Sicyā uocando. Quanc̄ non desunt q̄ Sicyam hoc intelligant, q̄d uulgo Anguriū, et Palestinus Melo dicit. Athenus certe Sicyā ueteres p̄ Cucurbita uocare solitos affirmat. Atq; ita & Nicandrus poeta uti Georgicorū uolumine. 2. Apud Gręcos certe Cucumeris appellatiōe, Pepones q̄q; ueniūt. Demetrius Ixion, Sicyos dici uoluit, ἀπὸ τοῦ εἰνέσθαι καὶ νίσθαι, q̄a uenerē cieant: q̄d tñ cōtra multū sentiunt. De Cucumere puerbiū Gręci celebrāt illo uersu, εἰκὼν τρωπώσα γυνὴ τὴν χλαίαν ἔσθαι. ut mulier uidelicet texēdo Cucumerē manducet. Fortasse, qm̄ textrices, ut Aristoteli placet, impudicę sunt magna ex parte. Ceterū cartilaginei oīa ea gr̄is sunt, crescūt quacūq; libeat effigie. Virides Italię Cucumeres & q̄ minimi sunt, inquit Plinius, prouincijs q̄ maximi. Citrinos, nigrosq; pbant. Copiosissimi Aphricę, ac grandissimi Moesię. Aquas ita diligunt, ut ad eas modice distantes, etiā dissec̄ti arrepant. Oleum odere mire, ita ut in hamos curuent, ne attingant. Inuenti et sine seminibus sunt, macerato uidelicet semine farina cuiusdā herbę, quam Culicem appellant. Citrinos Cucumeres intelligūt, qui uulgo Citreoli a colore Citri nominant, maiores multo uulgaribus, nec friati, q̄ iam & in Italia passim nascunt. Particulatim flōret Cucumis, si bi ipse superflorescens, et sicciore locos patit. Candida lanugine obductus, magisq; dū crescit. Seruatur in muria usq; ad alios fere prouentus, & uiridis quoq; in fabulo locis opacis, sero sicco operiente. Cucumeres in fistula, ut est apud Hippocratem, dimisso flore, mira longitudine, quasi anguina specie proueniūt. Quāq; anguinus Cucumis, idem uidetur esse qui Syluestris, multo infra magnitudinē Satiui, Erraticus, & Angueus Columelle appellatus, a Satiuō penitus differens, uix, ut solo aspectu gentilis ei appareat. Serotinū æstate gerimen, & flos, gaudetq; frigidis. Cucumim nasci præcipuum in Arabia, mox Cyrenis tradunt. Alij in Arcadia, similem Heliotropio, cuius inter folia & ramos proueniret semen, magnitudine nucis iuglandis. Esse autem ad speciem Scorpionis, cauda reflexa, candida: propter quod aliqui Cucumim Scorpionū uocant. Decoctionē Syluestris sparsā mures non attingūt, cicimes ea necant. Cucumis syluestris Elaterium quoq; dicitur, quemadmodum ex ipso succus. Vinum & inde sit Phthorium uocatum, ut post liquebit. Herbam Culicem, cuius hoc capite meminimus, a Theophrasto Conopa uocari censeam, nec ne, quoniam & Cynopa scriptum est maiori parte, nō dixerim. Theodorus Canis oculum, & Canuram conuertit, quasi Cynopa, non Canopa probauerit. Olus est hoc Theophrastus inquit, primisq; post æquinoctium imbribus germinat, & inter spicatas herbas ponitur, a Plinio quoque duobus locis dictum, ut in castigatione Pliniana demonstrauimus.

De Pepone.

CAP. CLI.

πένον

P Eponis caro in cibis, urinam cit. Inflammationes oculorū illita sedat. Ramenta eius contra adustionem infantium, quam Syriasiu uocant, sincipiti imponuntur. Fronti admota, oculorū fluctiōnes auertunt. Succus cum semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgāt, & nitore afferunt. Radix sicca, & ex

hydromelite pota drachmæ pondere, uomitionē mouet. Si quisq; mode **A**
rate secundā cenā uomere cupiat, geminis obolis sit contētus. Sanat quo
q; illita cū melle, ulcēra concreta in modū faui, quæ Cæria uocant.

B A R B A R I C O R O L L.

Pepo, a Græcis Pepon, a Theophrasto Sicyos, & Persicyos quandoq; dictus, a Polluce
Spermatias. Cucumerum generi contribuitur. Siquidem cum magnitudine excessere, uocan-
tur Pepones. Particulatim florēt, ut Faba. Sunt qui & Melopepones dicuntur, in Campania pri-
mum reperti, effigie mali cotonei, a quo & nomen fortuito natum ibi, mox semine ex illo ge-
nus factum. Non pendent hi, sed rotundantur humi, figura & odore præstantissimi, ubi matu-
ruere. Quæ non pendent statim a pediculo recedunt. Lusitani Regis Liburnicæ inter alia me-
ridianæ illius navigationis miracula, Melones in Aethiopia nobilissimos haberi prædicant, quo-
rum odorem Elephantēs, sagacissimi olfactus animal, de longinquo sentiant, aduolantesq; cu-
cumeraria tota depopulentur ac proterant. Illud propter iactatam a medicis controuersia præ-
terire nolo, Auctores esse Græcos aliquos, qui præcipiant, post Pepones, Melopeponesq; ui-
num bibendum hīs, qui pituitosi fuerint, biliosis uero acida edenda.

De Lactucis.

CAP. CLII.

Lactucæ satiuæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho gra-
tæ habentur. Somnū conciliant. Aluum emolliunt. Lac euocant.
Verum decoctæ magis alunt. Stomachicis illotas esse prodest. Epotum
semen, assiduas libidinum imaginationes in somno, compescit. Et Ve-
neri refragatur. Frequentiores tamen in cibo, claritati oculorū officiant.
Muria condiuntur. Cum in caulem exierunt, uim quandam nanciscun- **B**
tur, succo, aut lacti syluestris Lactucæ similem.

B A R B A R I C O R O L L.

Lactuca, Lactucula, & Lactecula, sicut apud Græcos Thridax, & Thridacina dicitur, & uul-
go Myrulon, caulem primo blandum, processu spinulis inhorrentem habet: die quarto aut
quinto emergit. Suauior, ciso caule regerminat. Semen lanugine occultitur. Ex hīs candida
tenerior & dulcior. Lactucæ Græci tria monstrauere genera. Vnum lati caulis, adeo, ut olito-
ria ex hīs hostiola factitari prodiderint Theophrastus & Plinius. Foliumq; hīs paulo maius her-
baceo, & angustissimum, ut alibi consumpto incremento. Alterum rotundi caulis. Tertium a
gente cognomento Laconicum, sessile, folio Scolymi, rectum, amplumq; nec brachiatum a
caulibus. Alij distinguunt in nigras, rubentes, candidas, ratione satius colores uariante. Pri-
mas Ianuario, secundas Aprili, tertias Martio ferentes. Quidam fastigia quinque faciunt. Pur-
pureas & crispas, utraq; Cecilianam uocantes. Tertium Cappadoces. Quartum Græcas.
Longiora his folia, caulesq; lati, præterea longi & angusti, Intubis similes. Quintum genus
Picris, amaritudine insignis. Vnde nomē. Alij Crispā, Fuscā, Cappadocem, Tartesiācam, &
Cypriā, ut Columella. Cappadoci pexum, densum, pallidūq; folium. Tartesiācæ, siue Beticæ,
candidū, crispissimū. Cypriæ, siue Paphiæ rubicundū ex candido, tenerimū ac leue. Alij distin-
gere Atram, quæ Meconis, & Meconitis dicat, a lacte papaueris simili, maxime soporifero, qd
apud antiquos Italiæ solū genus earū fuit: & ob id Lactucis nomen inditū. Purpuream, siue fu-
scā, maxime radicis, quā uocant Cecilianā, a Cecilio Metello dictam. Rotundā minimā, sed
latis folijs, Arrylida nominatā, siue ut Græca fides habet, quæ & a mulieribus ita uocari scri-
bit, Astylida. Et Eustuchion a Pythagorā, hoc est, Spadoniā, quia hæc maxime refragetur Ve-
neri. Candorē lacteum contingere putant arte, atq; curā, sed hīs dumtaxat quibus semen album
est. Candida Lactuca maxime hyemem tolerat. Irrepsit & satiuis alia, ut Plinius inquit, admo-
dum probata, quæ Cecilia uocatur, a supradicta Cecilianā, quæ purpurea est differens, folio
Cappadociæ, nisi crispū, latiusq; esset. De Caprina, & alijs agrestibus, in Lactuca dicemus syl-
uestri, & uno eodemq; pede quemadmodū Lactuca, Ocimū, Apium, Eruca, & omnino gene-
ra olerum diuersa proueniant, Græcus auctor Didymus, memoriæ scriptū reliquit, Cyprii La-
tucam Brenthistū uocabant. Sunt & Brenthiæ quædam radiculæ, quibus mulieres genas ru-
bificent, quas nonnulli Fucum, aut Anchusam interpretantur.

Opidag

Theophr. li-
bro 7. cap. 5.
Pli. li. 20. ca. 7.

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

C NObis in tam noto, tamq; utili olerē suspecta capitis huius tanta breuitas est. Inclinatq; animus, desiderari posse in eo multa ex his quæ Plinius, Galenus, Paulus Aegineta, pluresq; alij docuerunt, præsertimq; Serapion; qui in collectis a scriptore hoc, abscissibus, & sacris ignibus mederi hoc olus ait; quæ hominis mala in hoc scriptore modo nulla sunt. Accedunt suspicioni huic nostræ etiam argumenta alia. Primum, q; in seminis medicina nihil hoc loco legitur, prodesse scorpionum ictibus, & Cenchri moribus. Quorum alterum Plinius, alterum hic ipse in extremo opere, capite de Cenchri morfu indicauerunt. Verisimileq; est, ut in cæteris ab eo factum fuit, ad eius periculi remedium ex hoc olerē semen etiam accipiendum fuisse. Mox quod plurali numero, non procul a fine legitur, continuū Lactucarum cibum claritati oculorū officere, deesse aliquid ostendit. quoniam singulari numero semper antea de satiuā Lactuca egerat: quod inconcinnum simul, & hoc scriptore indignū est: credimusq; nos, nihil dicendum huiusmodi ab eo fuisse, nisi prius aliorum scriptorū exemplo, de tam multis satiuæ Lactucæ generibus egisset. Quo fit, ut suspicemur deesse huic capiti aliquid, præsertimq; Lactucarū censum, & nomenclaturā aliquam: quam negligentes in exscribendo antiqui librarij, mutilum nobis hoc caput reliquerunt. Eamq; ob causam nos locum uitij nota signauimus. Poterit tamen qui plura Lactucæ genera, nomina, & bonitates noscere uoluerit, ex Columella, Plinio, alijsq; multis ea audire, & condituræ earum antiquam rationem intelligere.

¶ De Lactuca syluestri.

C A P. CLIIII.

ἄγρια ἐπίδαγ

Syluestris Lactuca, quam Magi sanguinem Titani, Zoroastres Phrombion, Romani Lactucam syluestrem appellant, Satiuæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora. Amaro gustu est, & uiribus aliquantum papaueri similis. Vnde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos. Argema, caliginemq; repurgat. Contra adustiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. In summa, somnum allicit. Doloris leuamentum præstat. Menses trahit. Contra scorpionum & phalangiorum ictus bibitur. Semen non aliter q; satiuæ, libidinum imaginationes in somno amolitur, ac Venerem arcet. Succus ad eadem ualet, sed uiribus infirmior. Reponitur in ficiuli nouo lac eius, antea, ut in alijs liquaminibus moris est, insolatum.

B A R B A R I C O R O L L.

Lactuca syluestris, radice breuior, & multicaulior q; satiuā est, sponte nascens in aruis, folio pusillo, & ubi consummatum est, aculeato: caule candidiore, a lacte copiosissimo acri medica roq; quod carpitur per menses, scapo inciso, præclarum ad multa. Syluestris Lactucæ plura genera, Esopon, de qua hic agitur. Secundū Caprinæ, qua pisces necantur, Marinam Cornelius appellat, de qua inter Titymallos sermo est. Tertiū in syluis proueniens, Isatis uocatur. Quod folio: quemadmodum post liquebit. Communes notæ Syluestrium, candor caulis, interdum cubitali longitudine. Thyrsos & folijs scabricia. Succus omnibus candidus.

¶ De Gingidio.

C A P. CLIIII.

γινγιδιον
ἀπιδιον

Gingidiū aliqui Lepidion, Romani Bifacutū, Aegyptij Dorysastrū, Syri Adoriū, Aphri Tiriēta appellāt. In Syria & Cilicia præterea nascit. Hærbula syluestri Pastinacæ similis, tenuior, & amarior, radice parua, candidate, subamara. Olus hoc crudū, coctū, cōditūue estur magna stomachi utilitate. Vrinā cit. Decoctū ex uino potū, uescicæ prodest.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 20. ca. 15.

Gingidium Syria in hortis operosissima. Vnde natum est adagium, Multa Syrorum olera.

Simillimam Staphylino, & Scandici herbam ferit, non differenda recentium medicorum imperitia, Gingidium pro Fumaria, siue Capno accipientium.

EX M. VERG. COMM.

Peregrinū Græciæ & Italiæ, si Plinio, & Dioscoridi credimus, Gingidiū quondā fuit. Ille in Syria, hic in Cilicia & Syria nasci & feri dixerūt. Quo minus miret aliquis, ignorari nostra ætate, quodnā olus Gingidiū sit. Cognouit tamen id utraq; gens: descripsitq; Plinius. 20. uolumine, capite quinto omnē eius figuram & usum. Paulus Aegineta libro. 1. capite de oleribus post Ocimum, Sinapin, Nasturcium, Vrticam, multaq; alia quæ acrimoniā habent.

De Scandice.

CAP. CLV.

Scandix, quam Romani hærbam Scanariam, aut Aculam nominant, syluestre olus est, amarum, subacre. Quod crudum, coctum ue manditur. Stomacho & uentri utile. Decoctum in potu, uellicæ renibus & iocineri confert.

BARBARI COROLL.

Scandix olus est syluestre, ut in Brassica notauimus, Plauto quoq; dictum. Hanc Aristophanes Euripidi poetæ obicit ioculariter, matrē eius ne olus quidem legitimū uenditasse, sed Scandicem. Vnde uerbum *σκανδική*, pro eo, quod est, *ἀσχηματιστή* confectum, hoc est, ad imitationem Euripidis aliquid aut dicere, aut facere. Eademq; erat, ut Theophrastus ait, Enthusicon, siue ut Athenæus & Plinius, Anthriscon, si tenuiora folia, odoratioaq; haberet. Et lasione olus est syluestre, repens in terra, cū lacte multo, florem fert candidū. Conciliū uocant, singulā folio, sed ut descriptio tamē, & quasi rudimentū multorū in ipso appareat. Theophrastus auctor. Plinius, Foliū inquit unū habet lasione, sed ita implicatū, ut plura uideant. Huius flos, ut Theophrasti uerbis utar, conceptaculo auersa parte nō indiget, sed postrema eius exeunt in angulos, qualis fere oleagineus aspicif. Stimulat hæc herba coitū, lactis ubertatē præstat, phthisicis, pdest: infantū illita capiti, nutrit capillū. In Plinio tamē pro lasione, Lassina deprauatū erat, duobus locis. Differt Scandix a Sandice: q; Scandix herba est, Sandix metallica. Scandix aliē non describit, q; q; olus est syluestre, gustu acri, subamaroq; folijs Anthrisci, sed maioribus, & minus odoratis. In exemplari græco Dioscoridis, adpictā uidī Scandicem, feniculi folio fere cū corniculis, in summo floribus luteis, siue albis. Hac ipsa specie in syluis quoq; uisū, fruticē odora to, flore candido. Paulus, Aetius, & si recte memini, Galenus, simile Gingidio fecerē Scandicē.

EX M. VERG. COMM.

Hæc est Scandix illa quæ toties Athenis in theatro plausum & risum excitauit: cum in Comœdia lepidissimi poetæ, Dicaeopolis ex agro in urbem profectus, rudis homo, ab Euripide eam humiliter poetæ supplicans peteret, *σκανδικὴν ποτὶ πόδιν ἀδελφεύειν*. Nouerant enim omnes uulgare & uile olus: meminerantq; poetæ, illius matrem quotidie in urbem uenientem, uendito eo olere, filium in summa paupertatē theatro & spectaculis educasse. Nec antiquæ hominis paupertati illudentes, sed ad uirtutem in angusta re studium & occasionem admirantes, totis subellijs audito uersiculo illo exultabant. Nota tunc omnibus Scandix erat, uulgare & sponte sua nascens, locis plerūq; incultis olus, plachis cibus, & quotidianum pulmentum & acetariū, quo ad sanitatē magis q; quæstus toto mari & orbe obsonijs proficerent. Vires enī illi sunt siccandi in extremo ordine, calefaciendi uero in secūdo, aut in incipiente tertio. Sed quod utilissimum in ea est, urinam ciere, & renes egregie laxare, testati ueteres Græci sunt: utiturq; ad eas difficultates sapissime Paulus Aegineta: iubetq; in primo, si non iuste quotidie purgetur aliquis, Scandice, Apio, Asparago, similibusq; alijs sollicitandam esse urinam. Plinius etiam 22. capite eiusdem numeri, multis Scandicem prosequitur laudibus: peculiaremq; illi laudem tribuit, q; uenere fatigato corpori succurrit, marcescentesq; senio iam coitus excitat. Quo magis mirū, in tanta morū ruina & labe, in nullo honore esse herbā, neq; ab Herbarijs nostris cognosci. Græci nunc etiā Scandicem appellāt, nihilq; in eorū gente notius, sed non congruentē antiquorū notis ostendūt. Quā enī illi Scandicē modo appellāt, latiore, & quasi Betæ folio est. Antiquiores aut, ut in re nota sit, nullas eius certas notas tradiderūt. Verūtamen, ut ex multis conijcere liceat, tenui, & q; si capillato folio est. Plinius li. 21. cap. 15. inter sponte nascentes numerauit: conijcitq; illi, ut uerissimile est, cōgenēres plures alias, quæ oēs tenui folio & capillaceo sunt: pferuntq; Caucalim, & Tragopogona: q; a capillamentis, q; pro folijs habet, Coma dicta a Græcis est. Ob quā causam non ab re penitus fuerit, similem in foliorū figura illis credere.

A

endydis

Pli. li. 21. ca. 15.

B

D I O S C O R I D I S

C ^{καυκαλίδης} De Gallinaceo pede, seu Caucalide. **C A P. CLVI.**
Caucalis, quam alij Caucum, alij syluestre Daucum, alij Myrtin, Democritus Brion, Romani Pedem gallinaceum, aut Pedem pulli, Aegyptij Sefelin uocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, hirsuto, folijs Apio similibus, feniculi modo per extrema multifidis, hispidisq; candida in cacumine umbella, suauiter olente. Crudum, coctumue olus estur. Vrinam mouet.

Caucalis, olus est flore candido. Syluestris Daucus, ut Galenus inquit, a pluribus uocata, propter similitudinem & gustus & uirium.

B A R B A R I C O R O L L.

Genus herbarū lib. 8. de Plantarū historia facit Theophrastus, quod ἀρωματιστὸν uocat, id est, in aruis sponte sua nascens: statimq; in eo Caucalidem hanc numerat, nullis alijs adiectis notis. Nec parū, si quis rem iuste æstimet, fuerit, tam certe, a tam graui auctore, Caucalidis natale solum, & ubi quaerenda sit, audisse. Id enim additū his quæ hic scriptor, Galenus, & alij tradiderunt, facillimā eius inuentionē nobis efficiet. Nota em̄ omnibus Apij folia, quibus similia Caucalis sua habet. Altitudinē deinde, hirsutam lanuginē, in summo incisa folia, & candidi floris umbellā oculus deprehendit: inuenietq; Dauco tam similem herbam, ut aut syluestris Daucus sit, aut rudimentū naturæ Daucum facere condiscantis. Qualis autē Daucus uterq; sit, in eo certius cognoscetur. Nullibi non Caucalis nascit: præsertimq; in noualibus, anteq; noua aratione renouent. Galenus Dauco Caucalidem sapore & uiribus similem ait. Hic tamen, ex similitudine figuræ, ab aliquibus agrestem Daucum potius appellari ait. Habet em̄ & hæc, & Daucus folia incisuris diuisa. Habent ambo etiā candidi floris umbellā. Dico autē umbellam græcorū exemplo, qui οὐδδλον ab umbra appellant, in aliquibus plantis floris ueluti pedamentū, in plures diuisum longiores pediculos, qui singuli florem sustinent, & in orbem circumactum. Quæ floris figura feniculum, anisum, sambucus, pluraq; alia sunt. Quod quoniā umbellā, qua solem a uultu mulieres arcent, forma est, ob latitudinem circinationēq; suam, ideo Græci primū eam floris formā οὐδδλον, mox Græcos imitati latini, Umbellā dixerūt. Quæ uox huic scriptori multus scriptor, in secūdo de oleribus, habere Caucalidem in gustu salsuginem aliquā: quod nec sensus, nec ex ueteribus alij indicant. Longe plura q; hic in medicina Plinius Caucalidi tribuit: quæ poterunt uolentes in eo legere. 22. uolumine, eiusdem numeri capite.

E ^{ευζωμον} De Eruca. **C A P. CLVII.**
Euzomon, Romani Erucam uocant, Aegyptij Ethericem, Pœni Asuric. Cruda Eruca uenerem largiore cibo concitat, Semen eodem effectu prodest. Vrinam cit, Aluo perq; cōmodata. Semine ad cōdimenta utuntur, quod uti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte, aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum syluestris Eruca, maxime in Iberia, quæ occidentem spectat. Cuius semine pro Sinapi incolæ utuntur. Vrinam uehementius pellit, multo satiuā acrior.

Pli. li. 19. ca. 6.
 8. 10. li. 20. ca. 13.

Eruca, Euzomos græce dicta, quoniam cōmendat iura. Concitat hæc morantem, ut poetainquit, Venerem, frigorum contemptrix. Idcirco iungitur Lactuce in cibis, ut contrarię duarum naturæ temperamentum afferant. Nemo ignorat florem Erucæ candidum, multas in folio diuisuras esse.

B A R B A R I C O R O L L.

O ^{ωκίμων} De Ocīmo. **C A P. CLVIII.**
Ocimum uulgo cognitum. Id copiosiore cibo oculorum aciem habet. Aluum mollit. Spiritum mouet. Vrinam pellit. Lac cuoq;

cat. Aegre tamen conficitur. Illitum cum polline polentæ, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. Draconis marini, & scorpionis ictibus per se prodest, & cum uino Chio oculorū doloribus. Succus, uisus caliginem abstergit. Destillationes exiccat. Semen potū conuenit insanientibus, difficili urinæ, inflatisq;. Naribus haustum, subinde mouet sternutamenta. Quod idem hærba efficit. Sed oculos premi necessum est, cum sternutantentum urget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant. Quandoquidem manducatum, & in sole positum, uermiculos gignat. Aphri autem adiiciunt, si feriantur a scorpione, qui Ocimum ederit, nullo conflictari dolore.

B A R B A R I C O R O L L.

Ocimum prorumpit e terra celerime, floret particulatim, contra quæ olus: cæterum, primo parte inferiore, demum superiore: quo fit ut diutius quoque floreat. Quemadmodum Fabæ, & Heliotropium. Radix una descendit in altitudinem crassa, & admodum lignosa. Cæteræ a lateribus exiles ac prolixæ. Semini cortex obducitur. Vni Ocimo aqua datur meridie: cum cætera matutinis rigentur. Feruenti quoque aqua sparsum, maturius prouenire dicitur. Sub canem exalbescit. Differre uidetur Ocimum ab Ocimo, quod Ocimum pabuli & farraginis quoddam genus est uocatum: ab ocys uerbo, quod ualeat cito, ut Varroni placet: siue ab eo quod citat aluum bubus, & ideo ipsi datur, ut purgentur. Pabularium, & Catoni erat Ocimum, sed sistebar eo bubus aluum. Id erat e segete uiridi defecta antequam gelaret. Quamquam manibus carpendum, non falcula secandum, ut renascatur ocimum, Cato præcipit. Sura Manilius, aliter interpretatur, & tradit Fabæ modios decem, uitæ duos, tantundem & Eruiellæ in iugerum: melius & auena Græca, cui non cadit semen, addita misceri, & autumnio Boeum caussa feri solitos, hoc apud antiquos Ocimum uocatum. De Ocimo sunt, qui scribant capras id aspernari, & insaniam facere. Tritum si operiatur lapide, Scorpionem gigni. Manipulo eius cum cancri decem marinis, uel fluuiatilibus trito, conuenire ad eum Scorpiones a proximo omnes. In cibo pediculos facere. Capras id esitare, alij uolunt. Habetur & syluestre Ocimum, quod aliud est quæ Acinos. Quæ Acinos, quemadmodum & Ocimoides a Romanis Ocimastrum uocari Dioscorides existimat. Illud monendi sumus, de syluestri Ocimo nihil scripsisse Dioscoridem, de Ocimoide nihil Plinium. Martialis de Ocimo scripsisse rem miram dicitur: quod modo purpureos, modo albos, modo roseos flores pariat. & si ex eo semine frequenter satum sit, nunc in Serpyllum, nunc in Sisymbrium abire solitum. Recentiores Græci, qui de Rustica re scripserunt, Basilicon, & Misodulon appellant Ocimum: tantumque cum eo semine discordiam inesse prædicant, ut si pultario subiectum sit, nec mulier id sciat, futurum, ut nunquam cibo manus admoliat, priusquam subductum fuerit: ut fortasse huc alluserit Persius poetâ illo uersu.

Dum ne deterius sapiat Panutia baucis,

Cum bene discincto cantauerit Ocima uernæ.

Pro, excantauerit, hoc est, cantando exclusit. Nam & Varro, Plautusque, ut ait Nonius, Excantare usurpant pro excludere. Meretriculam quandam Corinthi Ocimum uocatum legimus in comædijs: sicut aliam Abrotonum: quo & Themistodis mater fuit nomine. Quæ sunt qui Euterpem uocantam scribant, & aliam Thryallidem, & aliam Sisymbrium: & aliam Meconidem, & aliam Serpyllidem, & aliam Myrrinem.

E X M. V E R G. C O M M.

Es Ocimo quemadmodum & plerisque alijs, in ruris & hortorum disciplina, eadem quæ uirtutis humanæ fortuna & ratio. Maleficio enim & iniurijs meliorescit. Vtque illa infortunio aliquo obruta, aut a Principibus neglecta, maleue habita, nihil ex suo censu amittit, sed quod in serro, metallisque alijs sit, longo attritu subinde magis niter, & speciosior plerumque emergit: Sic etiam non dissimili ratione Asparagus lætior in census prouenit. Gaudet calcari, & atteri pede Crocus, pereundoque lætior prouenit. Crispum nunquam in hortis fiet Apium, nisi cum est natum incrementum eius, superuoluto cylindro coerceretur olitor. Rutam dum conferitur, maledictis prosequuntur qui adsumt: nec aliter maiore bonitate nasci id olus antiquitas credidit. Ex hoc genere Ocimum

Pli. li. 10, c. 12.

B

Cum est: gaudetq; & ipsum cum obrutū terra semen est, pauicula, uel cylindro diligen ter inculcari. Nam si terrā suspensam reliquerit olitor, facillime totū corrumpitur & perit. Quodq; uix credat aliquis, feruenti aqua conspersum, celerius etiam prouenit.

¶ De Orobanche.

C A P. CLIX.

ὀροβάνχη

Orobanche, alijs Cynomorion appellant, a similitudine canini genitalis, Cyprij Tyrfinen, communiter Lycon. Cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruher, hirsutus, tener, folio pingui, flore luteo, aut candicante, radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter legumina nasci constat, & ea strangulare. Vnde Orobanche sibi cognomentum usurpauit. Estur, ut olus cruda, & in patinis Asparagi modo decocta. Legumentis addita, coctionem accelerare creditur.

B A R B A R I C O R O L L.

Orobanche Cynomorion quoq; appellatur, a similitudine Canini genitalis. Enecat Cicer, circumuoluendo se ut Eruo. Vnde nomen Orobanche. Dicitur a recenti Græcia & Osprileon, & Leonteos botane, hoc est, Herba leonina.

E X M. V E R G. C O M M.

Ex maleficio nomen Orobanche fecit antiquitas. Et quoniam fruges, legumina, Eruiq; præsertim circūligando se enecat, Erui angina dicta est. Id enim Orobanche græcis significat. Qui quoniam ea in uitæ humanæ usum aliquando ueniret, leguminūq; cocturam sæpenumero adiunxerat, in damnanda eius fama, hanc saltem illi gratiā habuerunt: ut in cōmuni frugū, leguminūq; omniū iactura solum Erui strangulare crederet. Quod ut Theophrastus ait, cirris quibusdam circūligando se facit. Numerat ille primū libro octauo de historia, mox quinto de causis plantarū multas huiusmodi nocentes alijs plantas: quæ aut adnascentes, aut scandentes, aut circumligantes se, alijs pestem afferunt: cōmunemq; omnibus plantis alias, alias privatim aliquibus noxā afferentes. Qualis angina Erui hæc est: quæ cæteris quidē omnibus nocet, privatim tamen & maxime Eruo notissimè frugū. Nocendi aut causa, infirmitas Erui est. Nocent & aliæ alijs, quas idem Theophrastus eodem loco numerauit, & nos suis locis dicemus. Hanc ipsam Erui anginā Plinius etiam lib. 22. capite ultimo, ait a similitudine canini genitalis Cynomorion ab aliquibus nominari: non mala, neq; inconcinna similitudine, si plantā contempletur aliquis: quæ a radice surgens nudo, glabro, singulariq; caule, in summo folia aliquot consercta, & inter ea emergentes habet flores simul & quasi in glomerem collecta omnia: qua forma caninum genitale in summo est crassius, & quasi galeritum. Vidimus nos Erui anginā, nec quicq; inter legetes & legumina per æstatem frequentius inuenitur.

D

¶ De Barbula hirci.

C A P. CLX.

τραγοπωγόν

Barbula hirci, quæ ab alijs Come uocatur, breui est caule, folijs Croci, radice longa, dulci, supina, magno super caulem calyce, e cuius summo semen nigrum dependet. Vnde nomen inditum est. Hærbæ esui apta est.

B A R B A R I C O R O L L.

Theophrast.
lib. 7. cap. 7.

Tragopogon, hoc est, hirci Barba, quæ & Scandix a Plinio uocatur, nisi quod suspicor deprauata lectio est. Describitur a Theophrasto in hunc modum. Radix longa, dulcis, folium Croci longius, caule paruo, super quem calix latus, & Barbula, quæ summo uertice in cana & proluxa funditur. Nascitur in asperis, sine usu. Acetarium quidam olus hanc esse falso uolunt, quā uulgo Barbam petræ, & in Gallia Cispadana Barbulam hircinā uocent. Habetur & quæ Gerontopogon, id est, senis, siue præhyteri Barba dicitur, Tragopogoni fere tota similis: nisi qd lacte manat, & radice amara est, non dulci. A Nicandro Geraopogon fortasse nuncupata. Sed & radice dulci carpitur Romæ. Tragopogona uocari & in Trago pisce, inuenio partē sub gula eius nigrantē, ut Athenæus auctor est. Tragos porro piscis, Exocæto, qui & Adonis uocatur, similis describit: præter nigrū id quod sub gula cum habere diximus.

EX M. VERG. COMM.

VNa eademq; causa est, cur Hirci barbam, & Comam Romani, Græciq; Tragopogona quondam appellauerint. Cuius si fuerit aliquis oculatus testis, nihil a ueteribus dicet aptiore imagine descriptū fuisse. Non tñ præterq; in integra ætate has notas in ea deprehendet. Quo tēpore em florēt, pauloq; ante descriptū calicē, & ex calice prodeuntē comosam lanuginē, & capillamenta ex se fundit: a qbus Coma, & Hirci barba dicta est. Eā lib. s. de historia plantarum Theophr. aptiore pictura, et his uerbis effigiauit. Quidā uel alia innumerabilia nomināt. Int quē & illa est quā Hirci barbam uocant. Cuius radix longa & dulcis; folia Croco similia, longiora tantum; caulis breuis, in sumo cuius ingens calix est & barba, de sumo uertice cana pendens, proluxa. Nascitur sponte sua in aruis. Sed crescit etiam altius in hortis, aut pascinato altiusq; subactō solo. Suspensa enim terra, crassiores & altius radices agit. Non fuit hæc quondā in honore hortorū. Nos etiam meminimus in maiore precio q̄ nunc sit aliquando fuisse: tam nec in gustu & ganea nobis ipsis constamus. Ethruria, gensq; omnis nostra, q̄ in asperis & petrosis nascitur, Saxifragam, alieno illi assignato nomine, ubiq; uocat: nihilq; hyeme notius, & ad acetaria paratius, præsertim radice, quē una in hac planta ob dulcedinem suam non ingrātū habet usum. Quod animaduertat aliquis in ea est, dicere Plinium in asperis nasci sine usu. Sed congruentibus alijs notis, non multifacienda est saporū per tempora gratiæ uarietas, & inconstantia.

De Ornithogalo. CAP. CLXI.

ORnithogalum cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis, a quibus flores prodeunt, foris hærbacei, & cum hiantes se pandunt lactei uisuntur. Inter quos dissectum ut milio capitulum emicat. Coquitur cum pane ut Melanthium. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

BARBARI COROLL.

ORnithogale, siue Ornithogalon, caulem habet semipedalem Plinio, Dioscoridi duū palmorum. Coquitur in pulce.

De Tuberibus. CAP. CLXII.

TVbera rotundæ radices sunt, sine caule, sine folijs, flauescentes. Vere fodiuntur. Cruda & cocta eduntur.

BARBARI COROLL.

TVber Græce Hydnon a Galeno dicitur. Quidā a tumore legunt Oednon. A Theophrasto describitur, carens medulla, neruis, uena, cortice. Hoc & Aschion ab eodem autore nominatur. Sunt & alia sine folio, aut herba, aut caule supra terram pluscula, cibo idonea, in Aegypto maxime, ut Aracidna, & quod Araco simile uocatur a Theophrasto. Plinius Aracos appellat fructum. Duo hæc pariunt sub terra, non minorem superno: cuius pars carnosam radicem mittit altam atq; crassam, simplicem, cæteras uero quibus insidet fructus, graciles atq; multas, & summo cespite coherentes agit: nec folium, nec herba ulla, aut quicq; aliud supra terram cernitur. Loca modice arenosa diligunt. Quia porro geminum et utraq; parte fructū ferunt, Amphicarpa cognominantur.

EX M. VERG. COMM.

Nihil quod medicinā augeat, aut instruat Tuberibus Diosc. tribuit. Terrestris tñ substantia cōcerni, & constare ueteres aliqui dixerunt, & extenuandi aliquam habere potestatem. Credidit antiquitas, cognationem illis aliquam cum cœlo esse, nec nisi tonante Ioue nasci. Quod in Satyra Aquinas poeta monuit dicens. Et facient optata tonitrua cœnas Maiores, &c.

De Smilace. CAP. CLXIII.

HOrtensia Smilax frutex, cuius semen a nonnullis Lobia uocatur. Folia habet Hederg, molliora tamen, tenues caules, & capriolos uicinis fruticibus circumuolutos, qui tantum adolefcunt, ut topiarum quoddam tabernaculum effingere uideantur. Fructum sceni græci profert longiorem, & corpulentum, in quo semina renum simi-

A

ὀρνιθόγαλον

B

ῥίζαν

Pli. li. 19. ca. 23.

*

σμίλαξ λόβια

D I O S C O R I D I S

Clia, sed inæquali colore recluduntur, quæ quadam ex parte fuluescunt. Fructus cum semine in oleribus Asparagi modo manditur. Vrinam ci-
et, & tumultuosa somnia facit.

B A R B A R I C O R O L L.

Smilax cepea, id est, hortensiana, non eadem uidetur esse cum ea, quæ laevis a Dioscoride. 4. libro cognominata est. Recentiores cum Aetio Phaseolum a Dioscoride hoc loco intelligi scri-
pserunt, utiq; non candidum, sed rubentem, qui & Lobos & Dolichos dicatur, & latine Sili-
qua. Etem duo esse Phaseolorum genera, Paulus Aegineta in compositione quadam ad Renum
uitia, quæ *διὰ τὴν ῥίζαν* uocatur, indicat, Phaseolos in eam quærendo candidos: quasi sint etiam
non candidi. Quancq; est ubi Plinius Siliquam syluestrem dicendo, satiuam quoq; fieri posse ali-
quam intelligat, de quo in Smilace tractet latius. Porro Theodorus cognomento Priscianus,
quancq; recentiusculus, Phaseolo inquit uirtutem eam tribuunt, ut & uentrem soluat, & urinā
moueat. Dioscorides Phaseolos aluum, Lobia, siue Smilacem urinas ciere uoluit.

E X M. V E R G. C O M M.

Credidit Barbarus, nominis similitudine persuasus, quoniam Phaseoli alterum genus Lo-
bon græci uocent, & hic Lobia, Smilacem hanc a quibusdam uocari, ait legumen illud hoc
loco indicari: quoniam & id capreolos, seu clauiculas aliquas, quibus nitatur & implicet se, ha-
bet: & in utroq; Phaseolo, renibus similia semina sunt, & in rubente hoc amplius idem color.
Nobis tamē parum uerisimile uidetur, ad eam altitudinem & frondium copiam esse legumen
aliquod augeri, ut scenas & tabernacula uestiens inumbret. Id enim *σκηνοποιεῖσθαι* græcis, et huic
scriptori significat. Sunt autem græcis *σκηναι*, id est, Scenæ quæcunq; in castris, alijsue locis ex
frondibus, culmis, pellibus, tabulisq; temporaria domicilia fiunt: quales ad umbram in hortis
aliquando etiam eriguntur. Antiquiores latini Atteguas uno nomine cuncta hæc dixerunt. Sic
luuenalis, Dirue maiorum atteguas, &c. Quinetiam antiqui hebrearum literarum interpretes,
eius gentis tabernacula Atteguas interpretati sunt. Barbarus opus topiarium hoc dixit, non sa-
tis, ut nobis uidetur, ad exprimendum uocis illius & uerbi caprum.

D

De Medica. C A P. CLXIII.

medicinis

Medica cum recenti prodiit, folijs & caule trifolio prætere-
si similis est. Procedens uero folia contrahit, caules edens tri-
folij, in quibus semen lentis magnitudine dependet. Quod in corni-
cula incuruatur. Id siccatum iucundi saporis gratia, conditaneo sali am-
miscetur. Viride semen quibus refrigeratione opus est, illitu suffragat.
Herba tota pro gramine utuntur, qui pecora alunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Medica nominatione unde inuenerit, testatur ipso nomine: qd imperitia uulgi Melica uo-
cari cepit. Theophrastus perire stercoratam putauit, aut minctu pecoris incumbentis resper-
sam. Per bella Persarum, quæ Darius intulit Græciæ, aduecta scribitur. Differt ab ea quæ Me-
dion uocatur, ut suo loco indicabimus. Medica seritur iactato semine, ita ut pabulum, & fru-
mentū, tanta dote, ut uno satū plus tricenis annis durare credat. Similis est Trifolio, caule folijs
q; semper uirens, ut Dionysius est autor. Item geniculata. Quicquid in caule assurgit, in folia cō-
trahitur. Sexies reflorescit: cum minimum, quater, modo non secetur. Arescit furculosa. Postre-
mo in puluerem inutilem extenuatur. Pabularium omnium cōmendatissima. Hac quondam
plena erat Venetia, sed pridem periit. Nunc in eandem prouinciā reuerti eam, quasi possi-
minio curauimus, ab annis multis fere non uisam in Italia, sed ne intellectam quidem magno-
pere qualis esset, allatam ex Africa in Campaniā. Semen eius, sub dente Phaseoli recentis sapo-
rem præsentat. Propter altitudinem radicū eius reliquæ herbe intereunt, sine ipsius damno.

aphaca

De Aphaca. C A P. CLXV.

Aphaca in aruis nascitur, altior lenticula, tenuioribus folijs. Sili-
quas maiores fert, in quibus terna quaternae semina, lente
minora, continentur. Quæ adstringendi uim habent. Quare torrefacta,

Stomachi aluiq; fluctiones sistunt, si fresa lentis more decoquantur.

BARBARI COROLL.

Aphaca differt ab Aphia, quæ olus item est, ut Aphaca, florem edens cum germine. Differt & ab Apharca, quæ arbor est Vnedoni similis, ut diximus. Aphacam Theophrastus modo leguminum generi, modo inter olera connumerat. Et ut verum fatear, idem, an diuersum genus sit, fere ambigo. Olus inquit est Aphaca, imbribus ab Aequinoctio primis germinans, per partes florendo, amaritudine ingustabili, aculeata herba, verum ex mitioribus properat flos eius. Sed breui marcescit, & in lanuginem pappum uocatam soluitur; deinde alius subnascitur, atq; iterum alius hyeme tota, & uere usq; in æstatē; qui & luteus sit. Forma siliquis Aphacelatusculæ ut Lenti; celeriter perit, ut Dolichos. Necatur a Securidaca. Semen præter alias differentias madidius est, q̃ Lentis. Inuenio e recentioribus, qui uitiam esse Aphacem existiment.

EX. M. VERG. COMM.

DE Aphace Plinius lib. 27. cap. 5. nihil non ab hoc scriptore dictum, isdem, totidemq; reddidit uerbis. Aphace tenuia admodū folia habet; pusillo altior Lenticula est. Siliquas maiores fert, in quibus terna, aut quaterna semina sunt, nigriora, & minora Lenticula. Nascitur in aruis. Natura ei ad spissandum efficacior q̃ Lenti. Reliquo usu eisdem effectus habet. Stomachi, aluiq; fluctiones sistit semen decoctum. Et hæc Plinius. Barbarus post eū in Corollario suo, quæcūq; in Theophrasto lib. 8. de plantarum historia de Aphace leguntur, totidem uerbis pariter reddidit. Sic nihil fere quod adiiciamus relictum nobis est, nisi quæ diuersis locis ab eodē Theophrasto dicta sunt, breuiter collegerimus: haud sane, quia collectis his digito legentibus Aphacē ostendere cogitemus, sed q̃ coaceruatis in unum tot notis, facilius poterit alicui rei nobis incognita coniectura esse; & quod se nobis non obtulit, alij se offerre. Diximus non multo ante, cum de agresti Lactuca ageremus, quale herbarū genus esset quod Theophrastus ἀρουραῖον nominauit. Ex eodem genere, eodem autore Aphace est: idq; hic ipse etiam testatur in aruis nasci dicens. Nullam itaq; in ruris, hortorumue cura culturam Aphace habet: quærendaq; in aruis est quo tempore inculta cessant. Retulit idem, non admitti in cibos Aphacem, ob amaritudinē suam, similia agresti Cichorio folia habere. Primam appetente uere florere, citissimeq; senescere, florem in lanuginosos pappos resolui, pluraq; alia in ea fieri: quæ omnia a Barbaro collecta, relinquenda a nobis sunt. Ex quibus non facile ratio cernitur aliquis, uitiam notissimam omnibus frugem esse: & si congener, aut similis illi sit, syluestrem omnino existimandam esse.

De Porro capitato. CAP. CLXVI.

Capitatum Porrum inflationem facit. Noxium succum creat. Turbulentum somnum parit. Urinam ciet. Aluo accommodatur. Extenuat. Oculorum aciem hebetat. Menses pellit. Sed lædit exulceratam uescicam, renescq;. Cum pituita uero coctum, esu pectoris uitia extrahit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta, in deflectionibus, ad præclusiones uulvæ & duricias, utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, aut frigida maceratum, dulcescit, et multo minus inflat. Semen acrius est, & quandam adstrictoriam uim habet. Quare succus cum aceto, addito thure, aut manna, sanguinis profluvia sistit, maxime si naribus erumpat. Venerem stimulat. Contra omnia thoracis uitia, tabemq; pro delinctu efficax est. Arteriam esu purgat. Sed si assidue estur, uisus obscuritatem inducit. Stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. Cum aceto & thuris polline, lacte, aut rosaceo, utiliter aurium doloribus & sonitui instillatur. Varos tollunt folia, illita cum uua rhois, qua ad obsonia utuntur. Epinyctidi medentur. Crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent, si binis drachmis & æquali baccharum myrti pondere bibantur.

A

Theophrasta
bro 7, cap. 71

B

πρόσον
κεφαλωτόν

ἐπινύκτιδι

z ij

D I O S C O R I D I S

Pli. li. 19. ca. 6.

C B A R B A R I C O R O L L.

Porrum, siue Porrus, die a saty decimonono interim uigesimo prorumpit. Biennium per fert: ab eo tempore sementescit, emoriturq. Vermiculi Porros, Brassicam, Laſucasq. infestantes, & alia quædam olerum, Præſocurides uocatur: quasi Porricidæ, aut etiam, ut Palladio uidetur, Herbicidæ: non ut Theodorus, Blattæ alueariorum, apud Aristotelem, q. κρυμμένων, pro κρυμμένων legerat, etiam si tinea alueorum in Columella dici legimus, ex stercore papilionum nascetes, et Lucifugas Blattas in Marone. Nascitur et in mari Porru, extra Herculis columnas, ut Theophrastus ingit, sed inter Algaru gna. Capitatum Porrum, Græci Cephaloton appellant, & Gethyllida. Sunt q. Gethyllida, p. Gethyo acceperint, qd & Epithyllida uocauerunt. Didemus uir doctissimus is, qui tria milia et quingenta scripsit uolumina, Gethyū simile facit Ampe Iopraso, mox dicendo. Gethyllides, ut Athenæus ingit. Latonæ sacras esse Græci uolunt: qm o- lus id in Malacia pregnans Latona concupisset. Delphis legem esse, ut qui maximam attulisset Gethyllida, sportulam e sacerdotis mensa caperet. Has magnitudine Rapi crescere nonnun- q. tradunt. Gethyon inuenio, & Getion sine, γ, & aspiratione scribi.

E X M. V E R G. C O M M.

Liberalis cibus Porrum est: non tamen a natura tantope damnatū, ut non medicinam mul- tiplici remedio etiam instruat: præsertimq. q. ueteres, qm in caput creuisset, Capitatum dixe- runt. Cui maiores q. sectiuo ad omnia effectus antiquitas tribuit. Quapropter & hic de Porro acturus, id genus elegit qd ad medicinā primū haberet bonitatis honorem: eaq. est causa, cur capitati tantum meminerit Dioscorides, ne quis forte adiectum Porro capitati discrimen mire- tur. Vtrumq. enim Porri genus, sectiuum, f. & capitatum, eadem omnia potest, sed capitati effi- caciior uis. Et quoniam ubiq. inuenitur utrumq. ideo alterius tantum & efficacioris usum Dio- scorides probauit. Nihil in disciplina ruris sectiuo & capitato Porro frequētius in antiquis est. Laudauit Martialis in Xenij suis utrumq. in altero fila, in altero niueum stipitem describens. Neq. ab re: quando discrepent inter se, satio, cultura, & forma.

ἄμπελοπράσον

De Ampelopraso. C A P. CLXVII.

Ampeloprasum stomacho magis aduersatur. Plus Porro ex- calfacit. Urinam & menses uehementius. Contra serpen- tium morsus esse conuenit.

B A R B A R I C O R O L L.

Ampeloprason dictum est, quoniam in uinetis folio Porri nascitur, ructu graue.

E X M. V E R G. C O M M.

Non fuit Plinio, nec post eum tot alijs cura latinum nomen Ampelopraso dare: græcorūq. appellatione usi omnes, cogitandū legentibus reliquerunt, inter uites nasci hoc Porru. Id enim græcorum uox illa indicat. Nos præter id syluestre Porru etiā Ampeloprason diximus: nec in ne autore. Siquidē Paulus Aegineta lib. 6. sic illud nominauit. ἄμπελοπράσον ὅτι ἐν πρέσων ἐν ἄγριον γρία ἰσχυρότερα. Quod est, Sunt autem Porris sicciora Ampeloprasa ueluti syluestria. Credimus præterea, nec negligendis coniecturis, perisse in hoc capite aliqua. Sigdē q. omniū mihi est uetus ftilissimus & phauissimus Diosc. codex, plura alia habet ad historiā, diuersasq. appellatiōes Am- peloprasī pertinentia. Quæ licet ex Galeno accepta uideant, consiliū tū. institutiq. Diosc. in de- scriptionibus his habent. Numeratq. esse illi caput Allio simile, folium Titimallo, florem pur- pureum, caulē Lychnidi herbæ æqualē, et semē Nasturcio simile. Plinius etiā præ ea quæ nūc in Diosco. legunt, ructu graue ait esse: eruptionem sanguinis per genitale cōpescere, & ob eandē causam a partu mulieribus dari: dari & contra canum morsus, nonnullaq. alia. Quæ ignorat- se, præsertim tam multa, aut oblitum fuisse diligentem in scribendo hominem, parum uerisimi- le est. Quin etiam Paulus Aegineta exulcerare, & incidere addidit.

κρόμμιον

De Cepa. C A P. CXLIX.

Rommion aliqui Polidos uocant, Magi Calabotim, Romani Cepam. Cepa longa acrior est q. rotunda, item flaua q. candi- da, & sicca q. uiridis, & cruda q. cocta, aut condita. Omnes tamen mor- dent. Flatus gignunt, Appetentiam inuitant, Sitim mouent, Et extenuāt.

Fastidium pariunt, & expurgant. Aluo utiles sunt. Eæ detractis purgamentis in oleum coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosq; excretionum exitus laxant, subditæ pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur. Anginæ eodem perunguntur. Suppressos menses pellit. Caput purgat naribus infusus. Canis morfibis cū aceto, ruta, & melle illinitur. Cū aceto autem perunctas in sole utiligines sanat. Et cum pari spodio, scabras lippitudines sedat. Varos cum sale reprimat. Cōtra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est. Citæ aluo prodest. In auribus sonitū ac grauitatem emendat. Ad purulentas aureis, & eliciendā earundē aquā ualeat. Alopecix earum succo perfricantur, qui celeritū q̄ Alcyoniū, pilos euocat. Largiore cibo Cepa capitis dolores ciet. Coctaq; uehementius urinam pellit. Eos lethargicos efficit, qui uoletudinibus aduersis, eā etiā cocta, plus æquo uestantur. Cum passis uiuis, & fico illita, tubercula concoquit, & celerrime rumpit.

BARBARI COROLL.

Cepæ, aut etiā Cepulæ caua sunt folia: quod peculiare cum Gethyo habet, nec nisi oleribus hæc proprietas. Plura earum genera. Sardix, Gnidix, Samothracix, Seranix omnium minime, sed prædulces. Præterea Filliles, & Ascaloniæ. Filliles appellant, quia hyeme cum sua coma inertes relinquunt, & folia uere detrahunt: ns deniq; diuisuris, alia parte inferiore subnascuntur. Hoc exemplo reliquis etiā generibus uelluntur, ut in caput crescant potius q̄ in semina, Ascaloniarum propria natura. Etenim uelut steriles sunt ab radice, nec parte illa crassescunt. Maturæ celeriter putrescunt. Seri semine præcipiunt: quia deposite caulem, semenq; tantū reddant, deinde inaniant, & euascent. Samo, & Sardibus candidissimæ proueniunt. Iulius Pollux e Samothracia cōmendat. De Creticis dubitat, an eadem sint quæ Ascaloniæ: quia satis capitari soleant, sed distant sapore tantum dulci. Reliqua Ceparum genera, depositu proficiunt. Ascalonium genus optimum Columella prædicat. In nomine est & Pompeia Cepa, & Maritima simplex, quam uocant Vnionem Kuthen: ea est autem quæ nō fructificauit, nec habuit soboles adherentes. Cepa in rectitudinem dissecta, nō germinat. Radix non ut Allio nucleis includitur, sed tunicis, ut Bulbus et Scylla. Cepæ syluestres non sunt ullæ: ut q̄ apud Aristophanē poetam Thymum pro Cepa syluestri capiunt, errasse coarguamus obiter. Mentem lædi Cepa quidam scripsere. Hippocrates conspectu potius, q̄ esu cōmendasse dicitur.

EX M. VERG. COMM.

Fuit quidā Aegyptij Porri & Cepe nefas trucidare, & frāgere morsu, damnatq; ab ea genere: alioquin in sanitatis usu, & medicina utiles Cepe fuerunt. Qd̄ contra q̄ in relijs naturæ partibus fit, quæ utrāq; Lunæ fortunā plerūq; sequuntur: & dū toto orbe ea fulget, subinde augentur: pereūte autem illi luce, & ipsæ paulatim minuunt: una hæc in eius sideris morte & tenebris, speciosiore habitu lætiq; fiat & germinat. Accessit ad eā superstitionē etiā, q̄ inutiles seriatis, in lætitiāq; agentibus, pariter & ieiunio castitatē custodientibus essent: his, q̄ sitim et cibi appetentiam excitarent: illis, q̄ lachrymoso odore quæ habent, opratam per serias lætitiā turbaret: & quas in diuina re Dei munere lachrymas, tristitiāq; animi mortales fugerent, inuiti lachrymoso olere admittere cogerent. Erant & alię superstitionis Aegyptiæ in hac ipsa re causæ, nō minus ridiculę: quas Plutarchus cōmentariolo illo quod de Iside & Osiride scripsit, longius & diligentius indicauit, a nobis aliud modo agentibus, relinquendæ. Quæ Ceparum ex nationibus discrimina antiquis fuerint, Theophrastus lib. s. de plantarum historia, & ab eo accepta omnia uicifimo uolumine Plinius, longius docuerunt.

De Allio. CAP. CLXIX.

Allium græci Scorodon, alij Geboscon, alij Elaphoscorodon uocant. Quoddā satiuū atq; hortensium habetur. Quod in Aegy-

Pli. li. 19. ca. 6.

B

ἐν ὁπείδῳ

z in

Cpto, singulari ut Porru capite constat, dulce, i purpureu uerges, partu. Reliqua uero magna & candida, ex plurib. coaugmeta nucleis, qs Aglithas greci nominat. Aliud est syluestre, qd Opio scorodo, i. Anguinu uocant. Vis Allij acris e. Excalfacit. Morder. Excernit. Aluu turbat. Inflationes facit. Stomachū exiccat. Sitim gignit. Flatū permouet. Acie oculorū esu hebetat. Eosdē effectus pbet Anguinū, qd et Elaphoscorodō dicit. Latas uētris tineas in cibo sumptum abigit. Vrinās detrahīt. Contra uiperarum iectus, et priuatim hemorrhoidum prodest, ita ut non aliud magis, si cū uino iugiter adsumatur, aut tritum in eodem ebibať. Cōtra rabioforū morsus, et illitu, et cibo ualet. Magne et Allio utilitates cōtra aquarū mutationes. Vocem clarificat. Veterem tussim crudū, coctum uē lenit. Potum aut cū origani decocto, pediculos et lēdes enecat. Cremati cinis illitus, fugilatiōibus cum melle, et alopecijs cum nardino unguine medet. Eruptiones papularum cū oleo et sale sanat. Vitilignes, lichenas, lētignes, ulcera capitis manantia, lepras, et fures eximit. Cum thure et tēda decoctum, dentium dolorem leuat, si in ore contineatur. Contra uenenatos muris aranei morsus, cum ficulneis frondibus, & cumino illinitur. Feruēscia comae ius, fēminarum defēssionibus additum, menses & secundos partus extrahit. Allium eiusdem gratia sufficit. Factum ex eo & nigra oliuā intritū, esu cit urinā. Laxat uenarū spiracula. Hydropicis uile.

The. li. 7. ca. 4

BARBARI COROLL.

Allium, siue caput Allij, habet plures uelut coherentes nucleos, siue spicas, quas Greci Gēges, & Aglithas. Dorice ipsum quoq; Alliu Aglidion appellant. qnq; Discrimen, qd aliud prequox est, sexagesimo die maiorefcens. Aliud serotinum, qd in magnitudine diuerfitas. Vlpiciū nominatur pregrande. Greci Cyprium, & Antiscorodon, quippe celebratum Africa, ob id & Aphroskorodon, siue a spuma dicitur, a nostris Allium Maricum uocari consuevit, sed crudum, inter pulmentaria ruris, que Myrtos appellat, Allio trito in oleo & aceto: ut mirari sit, quantū ita increfcet spuma. Myrtos ab odoris fastidio est dictus. In hūc & casē qd addebat. Alij genus placentē faciūt ex oleribus, ut Phorid. Nos in Dioscoride qd hac parte Myrton legitur, Myrtotō legendū monemus. Est & in nucleis diuortium: quo em plures fuere, hoc asperius sentit. Genus esse Theophrast. ait, sine nucleis. Radix primo extumescit in nucleos: deinde curuatur: ubi accreuit, diducit iterū in nucleos, & ex uno plura fiūt, pferim Vlpiciū, ut Cepe: nisi matura prius uellat. Scordio a Scorodo, idest, Allio, itē ab Ophioscorodo, idest, Allio syluestri differt. Quāq; impitua medicorū sit, ut Alliu syluestre pro Scordio in pastillos theriacos addi soleat: cū tñ Scordiu folio Trixaginis, nō Allij descriptū legant: si mō autores bonos audire sustinent. Sunt in Allio qdem capita, sed nō solo: nam & in Cepa, & in Porro capitis et capituli nomen legas apud Columellā. Alliorum Manipulum Greci τριπυλον appellant, adhiberi solitū quibusdam sacris, ut Photion inquit: in quibus mos erat, Allium manficare, ne unguenta redolerent. Comas eius cum capite solo Molyzam Hippocrates appellat. Caput ipsum eūdem Datis uocatur. Quāq; Datis Lampadem quoq; pusillam significat. Galenus autor.

EX M. VERC. COMM.

Fit quidam, & adhuc est Alliu, sicubi lōgius ab urbibus inuocētius uiuitur, honestū simul & gratū rusticæ plebi obsoniū. Nisi em id sit, nō cōtundisset messoribus suis Allia Serpillūq; Maroniana illa Testilis, quos uerisimile iussūq; erat, laudore epulo p messem sole & ope defatigatos, a muliere excipi: nec q in comœdia inexpectatā fortunē feruus mutationē Theatro significabat, ridicule dixisset, tā beate tunc agere omnes, ut q antea calculis ab egesto statim fimo sedē exterere cōsueuisset, tūc relatis ad eā partē integris Allijs idē facerēt: quasi nihil ex antiqua paupertate numerare sibi liceret, quo neglectio melioris fortunæ mensuram augere posset. Eaq; ob causam, in ruris honore, & hortorum disciplina nō contemnendum locum inuenit Allium.

Docuerūt ueteres longius, quot Alliorū genera, & quo cultu in hortis colenda essent, nō neglīgenda ab his, q̄s aut nūq̄ satis cognita naturæ maiestas delectat, aut ad iustas, piasq; & certas opes a fœnore & mercatura innocēs augēdæ rei studiū cōuertit. Poterūt nouisse ea oīa cupiētes Pliniū, Columellā, Palladiū, mille alios de rota hac re longius agētes cū uoluerint audire.

De Scordopraso.

CAP. CLXX.

Scordoprasum magnitudine Porrum æquat, qualitatum Porri & Allij particeps. Vnde promiscuas sibi uires ex utroq; uendicauit, effectus Allij & Porri præbens, inefficacius tamen. Coctum Porri modo dulcescit, & in olerum uicem transit.

EX M. VERG. COMM.

Quale hoc simul Allium & Porrum ueteribus fuerit, incertū nobis est. Plinius, quod hætenus legerim, nullibi eius meminit; nec rei rusticæ scriptores alij: solus Paulus Aegineta, breuissimeq; in sexto inter Allia id numerauit. Verba eius sunt. Porri & Allij mixtas habet qualitates & uires Scordoprasum. Monstrum aliquod naturæ credimus id fuisse, coactis humano opere coalescere simul, non dissimilibus penitus oleribus duobus: qualia in re rustica aliquando excogitata in maiore ocio ab aliquibus fuerunt.

De Sinapi.

CAP. CLXXI.

Sinapi hortenarium, aliqui Napi, Romani Sinapi utocant. Eligi debet maturum, ualde rufum, non magnopere siccum, sed quod fractum interne uirescat, & quodam succo madeat, cæsum colore. Siquidem recens id genus, adultumq; habetur. Ad calfaciendum, extenuandum, extrahendum efficax est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur. Contra præduros tonsillarum tumores, ac ueterem callosamq; arteriæ scabritiem, succus ex aqua & melle conuenienter gargarizatur. Sternutamentum tritum & naribus admotum. Comitialibus quoq; auxiliatur. Fœminas uulnæ strangulatu oppressas excitat. Lethargicis, derafo capite, illinitur cum ficis ammistum, donec rubescat locus. Ad coxendici cruciatus, lienes, & omne genus dolores confert, cum permutandæ ualitudinis causa, ex alto uicia extrahenda sunt. Alopecij illitum medetur. Faciem purgat. Sugillata cum melle, adipe, aut cærato rapit. Feræ impetigines, & lepræ, eo cum aceto perunguntur. Contra febrium circumitus aridum bibitur, aut potui polentæ modo inspargitur. Extrahentibus emplastris, scabiemq; extenuantibus utiliter ammisceri solet. Graui tati aurium & sonitui, cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudines oculorum, & genarum scabritias magna utilitate illinitur. Expressus recenti semine succus in sole siccatur.

BARBARI COROLL.

Sinapis, & Sinapi, & Sinape media producta legitur. Græcia & Napy uocat, quā Naphy, ut Athenæus interpretatur, quoniam acris, & proinde incommoda natura esse uideatur, addit & pusillo corpore. Sinapi uero dici putat, quia olfactum luminibus officiat, ut Allium. Athenienses etiam Thapsi, & Saurion appellant. Quinto die post satum comparet, eoq; semel satum, uix est liberare locum: quia semen cadens protinus uiret. Tria eius genera. Gracile. Secundum Rapi folijs, Tertium Erucæ. Optimum Aegyptium, præsertim ad Sinapismum: in quo usu & Syriacum dabatur. Succus tribus modis exprimitur. In fictili, calefcitq; in eo rhodice ad solem. Exit & cauliculo inciso lacteus, ad dentium dolores cum induruit. Fit & oleum ex semine, ut docuimus. Pro pulmentario quoq; in patellis decoquitur, citra intellectum acrimonie. Coquantur & folia, sicut & reliquorum olerum. Pythagoras principatum ei dedit inter ea,

A

scordoprasum

sinapi

B

Pli. li. 20. ca. 22.

C quorum uis in sublime fertur: quia non aliud magis in nares & cerebrum penetret. Sinapis finus a Dropace distinguitur, q̄ Dropax cum pice fit: eoq; Pittorais, & Pittosis quoq; dicitur, hoc est, Oppicatio. Sinapis finus e Sinapi conficitur, multoq; uehementior est Dropace. Propterea Sinapis finum Dropax uel præcedit, ut præparet, uel consequitur, ut reliquias ab soluat. Maxime laudatur Dropax, Gallus cognomine.

E X M. V E R G. C O M M.

Fuit Samio sapienti quondā Sinapis in maximo hortensium omnium, quibus tantū cum toto discipulorum grege magister uescebat, honore & precio. Neq; ex tam multis, quas habet in sanitate & ualitudine uires & usus Sinapis, aliquid magis priusq; admirabatur & amabat Pythagoras, q̄ in altū sublimeq; ferri uim eius, & quasi in cælū niteretur, cū per nares in cerebrū penetrasset, purgatoria & ad usum mentis uegetiora illic omnia ab ea fieri. Laudata ab his magnopere etiā, qui medicinā homini in tam multis quotidie morbis facientes, nihil ad calefaciendum, siccandūq; aptius & præsentius datū sibi a natura inuenerūt. Recepta eadem in uiscæ & sanitate usu iam pridem est: nec hyeme ad intinctus quicq; frequentius ubiq; cibis intermiscetur, grauisimo obsoniorū condimento, nisi acrimonia feruoreq; suo non sternutamēta tantū, sed lachrymas etiā cietet. Quod solū in carmine suo Columella illi obiecit, dicens. Seq; lacessenti fletum factura Sinapis: quasi omnium animantium sensu, modoq; & ipsa nocētib; sibi renoceret.

De Nasturcio.

C A P. CLXXII.

ναστούριον

Cardamon, alijs Cynocardamon, alijs Iberis, alijs Cardamina ca, Aegyptijs Semeth, Romanis Nasturcium dicitur. Optimum constat esse Babylonicum. Omnium semen est acre. Excalfacit, Stomacho aduersatur. Aluum turbat. Tineas excutit. Lienem immittit. Partus exanimat. Vrinam cit. Venerem stimulat. Sinapis & Erucae simile intelligitur. Lepras & impetigines abstergit. Illitum cum melle, lienem extenuat. Fauos expurgat. Pulmonū uitia extrahit, sorbitionibus incoctum. Serpentiū uenenis potum resistit, atq; eas suffitu fugat. Capillorum defluuia cohibet. Carbunculos ad suppurationem perducit & rumpit. Coxendicibus cum polenta comode ex aceto illinitur. Turiores collectionesq; discutit. Emittere furunculos, illitum cum muria. Hærbæ ad omnia eadem effectus, licet minor.

Nasturtiū die quinto enascitur: duorum generū, mite, ac syluestre. Prioris quoq; ratio duplex, albi, & nigri. Nomen ei a nariū tormento, uigoremq; uel prouerbio significat, iubente Nasturtiū mandendū inertibus, quasi torporem excitet, animūq; obacuat, contra uenerem inhibeat: q̄q; Dioscorides accendi eam putet. Miræ amplitudinis in Arabia dicit gigni. Nasturtiū herbis reliquis succū adimit iuxta satis, quod & apud Aristophanē poetam legit. Hanc Græci non modo Cardamū, sed etiā Cardamida uocant, ut Galenus inquit, & Hippocrates Sauridion, a Sinapis, quod & Saurion dicit, similitudine. Milesium Nasturtiū ueteribus laudatissimum fuisse, Iulius Pollux auctor est. Persas id cū sale mensis apponere solitos, celebre est, cum principio frugalitatē amplecterent, mox aucto imperio, in omne genus luxus prolapsi.

E X M. V E R G. C O M M.

Eius plures quondā, ut uidet, appellationes fuerunt: sed oēs ex eodē principio, & ab eadem Cardami appellatione, excepta Hiberide, q̄ agreste Nasturtiū est, ut in. uolumine diximus, in Dioscoridis cōmentatiōes has irrepsērūt. Cynocardamon em̄, et Cardamārice solo noīe statim Cardamon indicāt. Hiberis uero, ut hic paulo ante dixit, & ut nos auctore Paulo Aegineta tūc cōfirmauimus, agreste Nasturtiū est. Has ipsas uoces oēs Apuleius etiā in Cardamo numerauit: inuicē sibi ideo rudentes, quoniā inter satiuū & agreste Nasturtiū maxia similitudo partū & uirū oīm sit. Ob eamq; cām uagis appellationibus inter se utunt. Notū nunc olus ubiq; Nasturtiū est. Contra uenenata p̄cipue usus eo Nicāder: usus & hic ipse cōtra Cenchridis uenentū, quēadmodū tunc copiosius docebimus: usus & Paulus Aegineta. Græcorūq; medici oēs totiens, & in tā multis, ut non contemnendā medicinæ partē solum Nasturtiū expleat.

Pli. li. 20. ca. 13.
lib. 19. ca. 8.

T De Thlaspe. CAP. CLXXIII.
Thlaspi, aliqui Thlaspidion, alij Sinapi persicum, alij Myiten, alij sylvestre Sinapi, alij Dasmophon, alij Myopteron, alij Biron, Aegyptij Sintempsum, Romani Scandulatum, alij Capsellam, aut Pedem gallinaceum uocant. Hærbula angustis folijs, digitali longitudine, in terram uersis, subpinguibus, in cacumine diuisis, sesquipedali cauliculo, tenui, non sine adnascentibus ramis, fructu circa ipsum totum, ab extremo in latius se pandente, semine Nasturcij incluso, lenticulae effigie, nisi quod infringitur. Vnde nomen accepit. Flos albicat. Nascitur in semitis, & sepibus, fossisq;. Semen asperi gustus, exalfaciens. Bilem & pituitam utrinq; extrahit, potum acetabuli mensura. Prodest ischiadicis infusum. Sanguinem potu educit. Internas subpurationes rumpit. Menses ciet. Sed partus enecat. Alterum Thlaspi tradit Crateias, quod aliqui Persiconapi uocant, latis folijs, radicibus magnis, utile ischiadicorum infusioni.

T BARBARI COROLL.
Thlaspe, loculos fert peltarum similitudine, in quibus sit semen. folia latitudine digitali, & longitudine. Galenus Thlaspen, Dioscorides Thlaspi neutro genere pronunciat. Thlaspidion, & Thlasposin Hippocrates, Peltam amazonicam Iulius Pollux, hederæ frondibus assimilat.

G EX M. VERG. COMM.
Galenus genere foeminino *Θλάσπιν* nominauit: & quod hic ait, potum sanguinem trahere, ille contra coxendicis dolorem clystere infusum *ἀμαρῶδιν κινῶν*, quod est, cruenta euacuare dixit. Adiecit præterea Dioscorides persicum & erraticum Sinape a quibusdam Thlaspi hoc dici, ex similitudine ut credimus uirium. Plinius non hoc, sed alterum illud genus quod auctore herbario Crateia hic ipse in extremo capite testatus est, persicum Sinape uocari: nec aliunde uidetur in primum illud genus, q̄ ex secundo hoc appellatio illa irrepsit. Cæteræ Thlaspis appellationes illæ causam & originem suam nobis non ostendunt, eamq; ob causam sine honore commentationis huius nostræ a nobis relinquuntur.

D De Arabide. CAP. CLXXIII.
Drabis hærbula ad cubiti altitudinem assurgit, tenues spargens ramos, & ex utroq; latere folia, ceu Lepidij, sed molliora, & candidiora. In cacumine uero Sambuci umbellā gerit, candidos flores habentem. Hærbula hæc cum ptisana coquitur, in Cappadocia maxime. Semen aridum pro pipere obsonijs ammiscetur.

L BARBARI COROLL.
Egebatur Draba, non Araba. Sed huius secundi calce, ubi caput hoc repetit, Arabis, siue Araba, non Draba scriptum est. Galenus, Paulusq; nullā mentionē huius herbarum faciunt.

E De Irione. CAP. CLXXV.
Erysimon, aliqui Chamæplion, Latini Irionem uocant, Magi Herculis Alphita, Aegyptij Erethmon. Iuxta urbes, domicilia, hortosq; nascitur, folijs Erucae sylvestris, cauliculis in lori modum lentis, floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, ut scænogræco corniculatis, semine Nasturcij, exiguo, urentis gustus. Contra thoracis fluctiones efficax est, & si purulenta extussuntur. Regio morbo, & laborum uitijs prodest. Contra uenena in delinctu cum melle datur. Illi

C nitur ex aqua, aut melle utiliter cæcis, carcinomatibus, parotidibus, duricijis mammarum, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & calfacit. Mitius multo ad clysteres fiet, si aqua madescat, atq; torreatur: uel linteo illigatum, oblito adipe perassetur.

Pli. li. 13. ca. 10.

B A R B A R I C O R O L L

Erysimon Galli Velarū, Irionem Romani appellant. Inter fruges annuerat, caule serulaceo, ut Sesama, flore item ut Sesama foliaceo, amarū, fruticosum, folijs Erucae angustioribus paulo, & sanguineis, omninoq; ut Theophrastus inquit, Sesama proximū: nisi esset pinguiusculū. Erysimon nostri herbarij significant, quæ uulgo, nobilis Eruca dicitur, quam & Erucae præferunt; ut mirū sit, quam obrem inter fruges a Plinio constituta uideatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Si esset frugibus, leguminibus, & oleribus idem qui homini sensus: liceretq; illis, ut in republica sæpe aliqui fecerunt, mutata fortuna transfugæ, modo harum, modo illarū partium esse: dicerem ego, græcis Erysimon, latinis uero Irionem Bacchi illius modo, qui ab Aristophane bitur: in alijs scriptoribus inter fruges, in alijs inter olera numerari uoluisse: tam incerta in antiquis scriptoribus historia eius est, tamq; aperte a Theophrasto & Plinio frugum, ab hoc ipso, mon, seu Irionem aliquis, Theophrastum de eo sic docentem audiens, quo loco lib. 9. de plantarum historia, de frugum culmis in uniuersum sic agit. τὸν δὲ θειράν κίχρον μὲν καὶ μάλιστα καυώδης, ἐνθά μὲν δὲ καὶ ἱριόν μὲν καὶ ἱριόνην καὶ ἱριόνην. Quod est. Aestiuarum autem, Milij scilicet & Panicis, ἱριόνην δὲ ἐνθά μὲν ἱριόνην καὶ ἱριόνην, ἱριόνην καὶ ἱριόνην, &c. Ex quibus ratiocinari licet, in censu frugum numeratum Erysimon frugem esse, & ex culmo inter olera censeri non posse. Plinius item, Theophrastum secutus, frugibus Irionem ubiq; adnumerat, libro 13. Primum capite. 7.

D

Mox iterum eodem capite. Sesamo & Irioni sanguinea folia. Nec multo post eodem libro, sed capite. 10. Sesama ab Indis uenit: ex ea & oleum faciunt. Color eius candidus. Huic simile est in Asia, Græciaq; Erysimon: idemq; erat, nisi pinguius esset, quod apud nos Irionem uocant, medicaminibus adnumerandum potius q̃ frugibus. Idem etiam libro. 22. capite ultimo ait. Irionem inter fruges Sesamæ similem esse diximus, & a Græcis Erysimon uocari. Contra hæc olus aperte Dioscorides, non frugem describit, a Nasturtio statim & Thlaspi, folio erucæ, coliculo, non culmo, cornutis in summo siliquis, non spicis aut paniculis, & si fœnograeco similibus: quodq; frugi nuncq; conueniat, inter rudera, & circa hortos nasci. Et præter Dioscoridem Paulus Aegineta libro primo capite de Veneris utilitate & usu: quo loco docens, quibus cibis ad uenerem uti oporteat, inter cetera monet comedenda, καὶ τὰν λαχάνων τὸ ἱριόν, τὸ ἱριόν καὶ τὸ ἱριόν, &c. manifeste inter olera Erysimon numerans, ut uidetur. Elsetq; Plinius, præcipueq; libro. 22. capite quo paulo ante diximus, quo loco integrum, & ipsidem uerbis totū hoc caput latinis reddidit, quod cognouisse omnibus paratum, & in promptu est. In tot itaq; tamq; diuersis antiquorum scriptorum auctoritatibus, temere & impudenter fecerit, qui in hoc, aut illo genere Irionem numerabit: præsertim docentibus Theophrasto & Plinio, feri in agris, & inter fruges Irionem: Dioscoride autem & Paulo Aegineta, per se nasci locis incultis: & si feratur, in hortis inter olera quod olus sit ferendum esse. Nobis, ut credamus frugem a multis existimatum Erysimon fuisse, in caussa siliquæ sunt, quas fœnograeco similes Erysimon habere hic ait: q̃q; inter fruges pabulo destinatas numeratur: a multis uero olus, folio agresti Erucæ, & semen Nasturtio simile. Antiquiores omnes non secus q̃ de quoridiana & uulgari re de eo agunt. Alicubi nunc genus etiam parum cognitum est, ignotæ & appellationes illæ aliæ, ideoq; a nobis relictæ.

C De Pipere.

C A P. CLXXVI.

πινπι

Piper in India nasci, breui arbore traditur. Quæ inter initia, prælongum fructum, ueluti siliquam promit. Quod longum Piper est. Habet intus aliquid tenui Milio simile, quod tandem in perfectum Piper

per euadit. Id autem suis temporibus adultum, racemos emittit grana fe-
rentes, quæ noscimus. Ea acerba, candidum Piper faciunt, aptum ocu-
laribus remedijs, antidotis, & medicaminibus quæ contra uenenata pa-
rantur, Theriaca uocant. Longum uero uehementius mordet. Et quo-
niam priusq; ematurescat decerptum est, subamarum relinquitur. Anti-
dotis, & theriacis medicaminibus expetitum. Nigrum uero, utpote quod
tempestiua maturitate collectum sit, odoratum esse constat, candido sua-
uius, acrius, & ori gratius, necnon ad condimenta utilius. Sed candi-
dum adhuc in acerbum uergens, prædictis infirmius est. Eligi oportet gra-
uissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens, minime furfuro-
sum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina macie confecta, cas-
sa, & inania, quod uocant Brasma, Indorum lingua, sic significante abor-
tum. Vis omnium excalfacit. Vrinam ciet. Concoquit. Extrahit. Discu-
tit. Abstergit caliginem quæ oculis obuersatur. Piper febrium rigori-
bus, siue potu, siue illitu, subuenit. Serpentium moribus auxiliatur.
Partus extrahit. Conceptum adimere creditur, statim ab initu suppositum.
Tussi, omnibusq; pectoris uitijs, siue eclegmate, siue potu, succura-
rit. Anginæ eo & melle conuenienter perunguntur. Potum cum recenti
bus lauri folijs, tormina discutit. Cum uua passa manducatum, pituitam
a capite elicit. Valitudinem tuetur. Dolores finit. Appetentiam mouet. B
Concoctionem adiuuat, in embammata additum. Strumas cum pice
discutit. Vitilignes ex nitro emaculat. Fictili nouo, ut aiunt, motum, tor-
retur. Non est huius arboris radix Gingiber, ut aliqui existimauere, si-
cuti paulo post ostendemus. Namq; Piperis radix Costo similis est, gu-
stum calfaciens, eiq; Hygræ cognomentum est. Hæc lienem reprimat,
cum aceto illita aut pota. Caput etiam purgat, manducata cum uua ta-
minia, quam Staphidem agriam uocant.

B A R B A R I C O R O L L.

Piperis genera duo Theophrastus constituit. Rotundi ut Eruu, putamine carneq; subrutilla
ceu lauri baccae. Oblongi, nigri semina continētis papaueracea, qd multo ualidius priore iudi-
carur. Passim in India sunt, ut Plinius existimat. Quæ Piper gignunt arbores, Iuniperis nostris
similes, q̄q; in fronte Caucaſi, solibus opposita, nasci tantū eas aliqui putauere. Semina a Iuni-
pero distant paruulis folliculis, quales in Phaseolis uidemus. Piper quod intēperie cœli carboni-
culatur, lingua Indorum Bregma dicitur, significans abortū. Hoc & pallidum est & asperum.
Tria cæteri fecere genera. Nigrū, quod & Cōmune dicitur a medicis, Dioscoride, Paulo, Ae-
tio. Lenius longo & nigro est, Candidum, Piper longū facillime adulterat Alexandrino Sina-
pi. Emitur hoc in libras. 25. album. 17. nigrū. 14. utiq; Plinij tēporibus. Nicæder Colophonius,
uetus statis studiosus, non peper, sed Peperion appellat. Hippocrates uero medicū Pharmacū.
Aliud genus est apud eūdem Hippocratem Indicum Pharmacū, quo foeminae, quibus anima
foetet, ora sibi colluit. Medicamentū id est, cuius compositionē reddit ipse. Cæteri est ubi Pi-
per semen Indicum dicitur ab Hippocrate: in quo rotundū, quod inest, Myrtidanū uocari pro-
dit. Est etiā ubi rotundū Piper Strongylen Myrtidani scriptum reperias in eodem auctore. Syl-
uestre porro gentibus suis est Piper. Piperis arborem iam etiā habuit Italia, maiorem Myrto,
nec absimilem. Amaritudo eadem recenti, & cum lætescit, quæ Piperi. Desyderat rosta illa ma-
turity. Ideoq; & rugarū deest, & coloris similitudo. Huiusmodi est & quod Lusitani regis dili-
gentissimi Liburnica, magna parte meridiani situs ambitu Mauritaniæ circūuecta, retulere hoc

Pli. li. 12. ca. 7.
Theophra. li-
bro. 9. cap. 22.

*

Strabo, lib. 17

C anno. Sed abest illa, ut dixi, retorrída rugosaq; maturitas. Nam solibus tostium Piper, e candido & leui mutatur in nigrũ rugosumq;. Adulteratur Iuniperi baccis, mire uim trahentibus, in pondere uero multis modis. In Aegypto granũ Piperi simile paulo tantũ maius nascit, Cori- on uocatũ, ut Straboni placet. Est etiã in India Piperis granis simile, quod uocat Garyo- phyllon, grandius, fragiliusq;. Tradit in luco Indico id gigni. Aduchebat odoris gratia. Nunc & cibi, ut Piper, Septentrionis maxime populis. Paulus Aegineta Caryophyllon, non Garyo- phyllon uocandũ existimauit, quasi nucifoliũ: etiamsi hanc inquit non habet naturã, quã no- mine pretenditur. Sed flores arboris cuiusdam Indicæ festuacei sunt, & nigri, longitudine pol- licari, acres, odorati, subamari. Lignũ eius Xylocaryophyllon appellant. Ab huius odore uio- larum genus altitium Caryophyllon, uulgo dicitur, ubiq; modo nascens.

E X M. V E R G. C O M M.

Fruticem, non arborem Piper ferre affirmat, albæ uiti, quæ in sepibus plarunq; inuenitur, si- milem, propinuas scandentẽ arbores: quæ racemosum fructum ferat, magnitudine ea qua ui- detur, sed uiridem, nec aliter q̃ in Ligustro coaceruatum, anteq; maturitate nigrescat: lectumq; ætate, ante integram maturitatem sub sole in palmeis tegetibus expandi, caloreq; solis & æstu corrugari, & nigrum fieri. Nec longum, aut album Piper aliquod uidisse illic se dicunt: esse qui- dem arbores alias, quæ sapore Piperis aliquid ferant, & inter eas, cui conferre in nostro orbe ali- quam posse se negant, quæ oblongum ueluti uillum inter folia ferat, ponticæ nucis floribus si- milem, quod illic longum Piper incolæ appellant. Folium Piperis ipsi uidimus ab eis allatum, colore pallido magis q̃ herbaceo, longitudine quantum diuicati pollex & index humani di- giti aperiuntur: latitudine qua parte maxime patet, quatuor digitorũ; Plantaginis figura, præ- terq; in summo, cui habet numero pares & figura similes a tergo fibras septem per longitudi- nem extensas, mediam claudentibus utrinq; trinis: non tamen ut in Plantagine, utrinq; binæ a- media nascunt, sed inæqualibus interuallis utrinq; prodeunt. In summo fastigiatũ, & acumina- tius q̃ Plantaginis extremũ folium est. Desinitq; in mucronẽ eodem, quo in malo medica mo- do uidetur: non omni, sed in qua folium acuminatum est: idq; in Piperis frutice breui pediculo- cta longius a nobis sunt, nõ ut antiquorum historias damnemus, sed ut meminerint toto hoc opere legẽtes, q̃ difficilis omnibus medicæ materiæ fuerit, & futura semper cõmentatio sit, præ- fertimq; ubi parum integra ueterum cõmentaria totam rem miscent.

D

γίγγις

De Gingiberi. C A P. CLXXVII.

Gingiberis sui gñis planta est, in Troglodytica Arabiã magna ex parte nascẽs. Qua uirẽte, ad multa, perinde ad q̃ nos Ruta, utun- tur. Et primis potibus, & edulijs ammiscunt. Huius radices Cyperi mo- do paruæ sunt, candicantes, & odoratæ, atq; Piper sapore imitantur. Eli- gi debent quæ teredines non nouerunt. A multis tamen ob id condium- tur, q̃ celeriter cariem sentiant. Ficilibus in Italiam asportantur. Gingi- beris cibo conueniens est. Et cum condimẽto assumitur. Excalfactoriam uim, & excoquentem habet. Alium leniter emollit. Stomacho utile est. Efficax aduersus ea quæ oculis caliginem offundunt. In Antidota addi- solet. In totum Piperi uiribus non dissimile.

Pli. li. 12. ca. 7.

B A R B A R I C O R O L L.

Zinziber, in Arabiã & Troglodytica in uillis nasci dicitur. Parua herba. Precium radicis in- libras sex. Quidam hanc & Sinsiberim, & Gingiberim appellant. Facile pertũditur Zinziber, ob incoctã quandam & excrementitiã corporis uliginem, ut Galenus inquit.

E X M. V E R G. C O M M.

Quide Piperis, ex India ad nos reuersi, quæ superiore capite dicta a nobis sunt, retulerũt, i- dem Zingiber graminis simile in India nasci dixerunt: geniculatũ, nouasq; subinde radices agens, longius sub terra augeri, inueniriq; ubiq; non aliter, q̃ & nostrum gramen: bisq; aut ter folia per annũ proferre, quæ harundinacea sint, sed nõ tantæ longitudinis, latitudinisq; nihil eo frequentius tota illa regione & copiosius nasci, ingensq; saporis discrimen ex tempore;

quo lectū fuerit sentiri. Quodq; Gal. & post eū Paul. Aegineta dixerūt, ideo terebinib. tentari, sentireq; cariem, & pforari, q; crassioris cuiusdā & inuictæ humiditatis particeps sit, fieri id illi dicunt, cum importune per uer ante maturitatem lectum fuerit: esseq; opportūnū legendi tempus, cum folia illa aruerint: idq; in effodiendo Zingibere ab Indis obseruari.

De Hydropipere. CAP. CLXXVIII.

HYdropiper apud aquas nascitur, quæ stagnant, aut pigro lapsu repunt. Caulē ædit angulosum, prædurum, multis alis concauum, folia menthæ, maiora, molliora, cædidioraq; gustu Piperis acri, citra tñ illam odoris gratiā. Fructum acrem in surculis paruis, prope folia racematim cohærentem. Folia cum semine illita, tumores, ueteresq; duricias discutiunt. Sugillata delent. Quæ postq; inaruerunt, tusa pro Piperis in obsonijs ammiscentur. Radix parua, nullius in medicina momenti.

BARBARI COROLL.

HYdropiper, quale sit in Plinio, nondum comperi. Nam Piperitis, quæ & Siliquastrum dicitur, nonnihil ab Hydropipere uidetur differre, non solum medicinæ usu, uerumetiam descriptione. Monstratur enim caule rubro, et longo, densis geniculis, folijs Lauri, semine albo, tenui, gustu Piperis, uulgo dicta Costum. Distat porro Siliquastrum a Salicastro, ut in mentione sua docebimus, sicut & a Seliquastro. Etenim Seliquastrum herba non est, sed antiq; gn̄is sedile, ut Pöpius inq; Georgius Tiphernas, Siliquā Cerauniā, in Strabone Siliquastrum interpretatus est pessime. Non desunt qui Perficariam mō nominatam Hydropiper esse suspicentur, quanq; foliū Perfici huic reddatur, unde nomē, Hydropipi uero Menthæ atq; Lauri. Est & in folio Perficariæ litura, macule modo inscripta: quæ si fuisset in Hydropeperi, fortasse nō omisissent autores. Est ergo Perficaria folio Perfici, flore cædido, spicaceo, gustu acri, semine minuto, caule nodoso, rubenti, longo: quæ sunt oīa & Hydropeperi tributa. Liberū sit æstimantibus iudicium.

EX. M. VERG. COMM.

NVlla Plinio, latinisq; alijs scriptoribus sub Hydropiperis titulo & uoce planta hæc est. Nec qualem hic describit prope aquas nascentem, inuenire adhuc licuit. Vidimus tamen in antiquissimo latino Dioscoride, & qui longobardis literis scriptus, sexcentorum annorum uetustatem refert, Hydropiperis appositam imaginem, diligēti ut erant ea tempora pictura, effigiatam. In qua descriptioni huius scriptoris omnia conueniunt, caulis, geniculi, alarum concauitates, folia, foliorumq; color. Vnum in fructu discrimen tantum est. Quod enim hic ait, in ramulis secundum folia nasci, & acinosum esse: in ea pictura in summis ramulis est uasculi potius q; folliculi, aut siliquæ figura: indicatq; in eo claudī semen, quod hic cum fructu miscet, fructum, uasculum, & in eo semen simul appellans. Quod deficientibus coniecturis alijs, non penitus ab re audisse fuerit. Quemadmodum nec inutile etiam, ex aliquarum plantarum natura cognoscere, quæ aliquando nobis in hoc opere Alarum concauitates in plantis sunt. Græci translata ab humano corpore appellatiōe *μαχαλας* dicunt caua, quæ aliquando bina, aliquando singularia, & ex intervallo semper in plantis uidentur, humanis alis similia, in quibus ueluti lacuna est. Sunt autem homini alæ qua parte brachium humero coniungit ex interiore parte, in quibus non aliter q; in pectore pubes aliqua nascitur, uirosi plerumq; odoris. Earū similitudine, concauos geniculos, quales in harundinibus, & plerisq; alijs sunt, *μαχαλας* græci, Romani Alas dixerūt. Ab Adnatis eo differētes, q; ex alis noua semper germinatio prodit: Adnata uero nullam habent certam partem unde emergant.

De Ptarmica. CAP. CLXXIX.

PTarmica frutex est, surculos habens paruos, multos, & rotundos, Abrotono non dissimiles, & circa eos folia oleæ, longa, & in cacumine capitulum uti Anthemidis, paruum, rotundum. Quod suo acri odore sternutamentum excitat. Vnde nomen accepit. Folia cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores sternutamēta efficacissime mouent. Nascentur in montibus & petrosis.

D I O S C O R I D I S

C P B A R B A R I C O R O L L.

Parmice, sub falso herba gustu, Diptarmice a quibusdam uocari solita, quoniam sternu-
tamentum iterari faciat.

E X M. V E R G. C O M M.

Ex re nomen habet Parmice; Parmion enim græci sternutamentum uocant. In quo egregi-
am necesse est habere uim: ex quo tam præsentis salutis augurio & honore, dignata eam Græ-
cia est. In nullo, quod hæcenus sciam, herbarum censu sub hoc nomine latinis Parmice est:
& si Barbarus in Corollario suo testetur, a quibusdam hanc ipsam Diptarmicem dici. Me-
minerunt eius tamen inter græcos Galenus, & Paulus Aegineta, eadem omnia quæ Dioscorid.
posse eam testari, adijcientes tñ, uiridem sugillata, liuoreq; alios disijcere.

De Radicula, seu lanaria hærbæ. C A P. CLXXX.

στρούθιον
στρούθινόμηλον

STRUTHION ab aliquibus Cerdon, ab alijs Catharlis, ab alijs
Struthocamelus, a quibusdam Chamærrhyton, a magis Calyrhy-
ton, a Latinis Lanaria hærbæ, aut Radicula appellatur. Nota est hæ-
rbæ, qua purgandis lanis utuntur, qui eas eluunt. Huius radix est acris.
Vrinam ciet. Prodest tussi, quam iecur excitauit, & orthopnceæ, ex mel-
le sumpta cochlearis mensura. Aluum soluit. Eadem cum Panace &
Capparidis radice, calculos frangit, & cum urina exturbat. Duriciem lie-
nis absomit. Menses imposita trahit. Partus enecat. Cum polenta aut
em & aceto illita, lepras tollit. Tubercula discuit, cum farina hordea-
cea & uino decocta. Miscetur & malagmatis, & colyrijs, claritatis causa.
Sternutamenta mouet. Per os purgat, trita cum melle & naribus infusa.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 24. ca. 11

D

Struthion, a nostris Radicula uocatur, spinosa herba, non tamé acanaceæ, flos sine odore,
specabilis æstatibus, caule lanuginoso, Semen nullum, Radix magna quæ conciditur purgan-
dis lanis. Mirum quantum conferens candore, molliciaq; Nascitur Satiua ubiq; sed sponte in
Asia, Syriacq; saxosis & asperis locis præcipua. Trans Euphratem tamen laudatissima, caule se-
rulaceo, tenui, & cibus indigenarum expetita, & tingenti quicquid sit, cum quo decoquatur.
Folium Oleæ, a medicis aureum Poculum uocatur. Hippocrates eö mendat nascentem in An-
dro insula littoribus. Ab hac similitudine potiori quoddam uasculum fortasse Struthion ap-
pellatum sit. Smyrnæa mulier Galena, florē hunc non Struthiō, sed Strythion uocauit. Porro
Strutheum latine, ut est apud Festum, a salacitate passeris membrū uirile significat, præcipue in
mimis: ut qui passerem, in Martialis & Catulli uersibus, aliter accipiunt, nihil mihi dixisse ui-
deantur. Ne quis in ea re Politianum, quia sine autore loquitur, somniasse cauilletur.

E X M. V E R G. C O M M.

Plinius. 19. uolumine cap. 3. ad candorem & molliciem lanarum Struthij succo usos fuisse
antiquos ait. Idē mox tñ. 24. cap. 11. quod nos paulo ante diximus, his uerbis testatur. Tingen-
tibus & radícula ramos præparat, quam Struthion uocari diximus a græcis. &c. Diuiditq; in
eodem usu, quod in græcis alioquin unum est: & ramulis Struthij tribuit, qd radicibus illi tri-
buerūt, quæ succo saporeq; asperæ, ad imbibēdos colores unguine sordidas præparat lanas. Possūt
qdem qd Plinius ait, purgatas æsypo lanas cādidiores reddere: sed illud obit est. Qd aut ab in-
sectoribus primū, & ut græci dicunt στρούθιον a Struthio quærebat, purgato sordidū & æsypi un-
guine erat. Nescimusq; nos, quosnam Plinius ramulos in Struthio appellauerit. Radicibus em
in tingēdo, ut diximus, utebant: oñditq; latinū nomen, radicū tñ fuisse usum. Neq; em aliā ob
causā radícula, qd ex potiore usu dicta a Romanis est. Quinetiā, nihil fere excepta radice Stru-
thion est, quam per longitudinem, & in latera sub terra, non in altum extendit, proferentibus
se ex interuallo graminis modo & quasi ex geniculis, quinq; in unum collectis plerunq; folijs,
ex quibus coliculi cum floribus prodeunt. Vulgaris, & ubiq; locis incultis nascens herba, fo-
lio ut diximus in cespitem conferto, & per interualla ex eadem radice erumpente. Lauri figu-
ra, uerum maiore. Latini ab usu Lanariæ radicem, & herbam, & ab eius præcipua & utiliore
parte Radiculam dixerunt. Vnde autem græci Struthion nominauerint, nō satis nunc patet:

nisi forte a foliorum positura, quæ auium alas quadamtenus imitantur, nomen illi fecerunt. *σποδόν* enim, & *σποδίων* ea gens passerem, & minores alias appellat aues. Quod si in cibos radix hæc transiret, crederemus ob caliditatem, quam in quarto ordine habet, Venerem stimulare, & ob id Struthion dictam. Græci enim *σποδόν* passerem dicunt: & ab eius auis salacitate *σποδόν*, quasi passerem ad Venerem procliuiores homines, & ex ea ratione id facientem herbam Struthion etiam dicere potuissent. Sed nihil horum pro comperto est.

¶ De Cyclamino. CAP. CLXXXI.

Cyclaminus a quibusdam Cysanthemon, ab alijs Cysstophyllon, ab alijs Chelonion, alijs Ictyopheron, ab alijs Silene, a Zoroastre Triphalites, ab Osthane Aspho, a Magis Miaspho, Aegyptijs Theſce, a Romanis Rapum terræ, aut terræ Umbilicus uocatur. Folia habet hæderæ, purpurea, uaria, in quibus fusq; decq; albicant maculæ, caule nudo, quaternos digitos æquante, floribus in eo purpureis, rosarum effigie, radice nigra & aliquantum lata, ut Rapum uideri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam, aquamq; detrahit. Menſes potu appositue citet. Tradunt, si prægnans radicem transgrediatur, abortum fieri. Partum appensa accelerat. Contra uenena, præsertim leporis marini, ex uino bibitur. Illita, contra serpentium ictus remedio est. Radix immista uino, inebriat. Regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis uestibus contentum, loco calido, & perfrictiõibus tuto recumbere, quo facilius exudet. Eiecti autem sudores fellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur. Ad deſicienda quoq; alui excrementa, in uelle re sedi subiicit. Illito umbilico & imo uentre coxarum tenus, alui emollit. Sed abortum efficit. Suffusionibus, & retusæ oculorum aciei, oblitus cum melle succus, prodest. Medicamentis abortum inferentibus, amiscetur. Succus cum aceto illitus, prociduum sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat. Eruptiones popularum reprimat. Vulneribus ex aceto, aut melle medetur. Liezem absumit. Vitia cutis in facie, & alopecias emendat. Eius decocto, luxata, podagras, & capitis ulcuscula, pernionesq; foueri congruum est. Ipsaq; in oleo uetere seruefacta, illito oleo, ulcera ad cicatricem perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum thyrrenicæ ceræ momento, ut stigmati crassitudinē unguentum contrahat, cum primis utile pernionibus. Radix Scyllæ modo concisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in umbrosis, maxime sub arboribus.

BARBARI COROLL.

Cyclaminos a nostris Rapum, & Tuber terræ dicitur, ut inquit Plinius, non malum terræ, ut Theodorus putauit. Nam Malum terræ, ut Dioscoridi uidetur, Aristolochia est. Erraticum uero malum a Plinio uocatum, & ad calculos radice commendatum, quale genus sit, nondum comperi: præterq; si quis pro Anthemide accipiat, quando utilem uesticæ uitæ eam nouimus. Et Chamæmilon, hoc est, malum terrestre, dicitur a Græcis Cyclaminos. Folia habet minorâ q; Hedera, nigriora, & tenuiora, sine angulis. Flos ei, ut Plinius scribit, colossinus, & in corollâ

A ij

κυκλάμινο

B

Pli. li. 21. ca. 9.
lib. 25. cap. 9.
lib. 26. cap. 12.

D I O S C O R I D I S

Cnas admitti solitus. Est autem genus in eo nomine coloris, ut Straboni placet a Colossis urbe Troadis, ubi præcipua lanitij commendatio fuisset: quemadmodum Laodiceæ, Coracinum pecus, a colore item uelleris appellatum. Sed cum duo florum genera Cyclamino reddantur, purpureum, & candidum, uter eorum Colossinus dici possit, extimandum relinquimus. De Coracino Laodicensium uellere, etiam Vitruius. Pernicialia Cyclamino cum olere sunt odia. Siquidem aduersam ei Brassicam inarescere affirmant. Sphæritis herba quæ sit Actio, nõ constat. Quid si Cyclaminon interpretetur: cum q̃ alopecias emendat, cum q̃ Cyclaminos Or bicularia latine dicitur, hoc est, Sphæritis.

E X M. V E R G. C O M M.

Est præter numeratas a Dioscoride Cyclamini appellationes, ubi nostra ætate porcorum, ubi terræ Panis Cyclaminus appelletur. Nullusq̃ non audito alterutro nōmine, ubiq̃ fere inter sepes & uepres nascentem plantam intelligit, quam subulci pecori suo gratam cognouerunt, et ab eo nomen illi fecerunt, porcinum Panem appellantes. Cæteri antiquum Cyclamini nomen ignorantes, a panis figura sub terra latentem eius radicem, terræ Panem uocauerunt. Nihil in agro agentibus nunc etiam notius, nigro colore: radix in orbem circumacta, non tamen in globum surgens, sed ueluti pressa pondere, in latitudinem se explicans, eadem forma qua nunc in quotidiano usu panes uidentur. Qui primi nomen illi fecerunt, circumactam in orbem eius circinationem contemplati, ἀπὸ τοῦ κύκλου, quasi ab orbe Cyclaminon, id est, orbicularem dixerunt. Fuitq̃ hæc prior & antiquior plantæ huius appellatio. Secuta ætas, non radicem, sed folia eius contemplata, q̃ hederacea essent, Cissanthemon, et Cissophyllon eandem nominauerunt. *καὶ οὗτοι* enim græci Hederam dicunt: & si in prima hac Cyclamino longe maiora q̃ Hederæ folia sint, solamq̃ Hederæ figuram in folio referat. Non defuerunt quondam etiam, qui a testudinis forma, Cheloniam eandem dicerent: quemadmodum non defuntritidem, qui ideo testudinis nomen retulisse dicant, quoniam ea id animal uescatur: quemadmodum contra pisces oderunt, qui non secus q̃ ueneno aliquo in aquam coniecta Cyclamino enecantur: ideoq̃ piscium Venatio dicta fuerit. Plinius tertiam Cyclaminum id facere dixit, cuius hic non meminit. Romani hic dixerat radicem esse nigram, Rapum similem. Umbilicum autem, quoniam ut in aliquibus circinata forma umbilicus est, sic & Cyclaminus sub terra uideatur. Dico autem umbilicum, non qualis in homine ceterisq̃ animalibus media pars est, sed quales in Epigrammate suo Martialis dixit, iam peruenimus usq̃ ad umbilicos, extremam uoluminis clausuram, quæ aut nudus, aut fibula opus claudebat. Vidimus nos aliquando Cyclamini radicem, globo & latitudine amplissimi panis: ex qua folia erumpebant: & inter folia flos breui pediculo, potius q̃ pediculo surgens, in quo color erat qualem hic describit, Plinius Colossinum uocat. Nec ambigendum de eo colore erit, qui Cyclaminum florentem uiderit. Eundem lib. 25. idem purpureum dicit. Nec uidetur tantus scriptor in his sibi constare. Habet ut uidetur Cyclamius numerosas, & egregias in medendo uires, quas paulo minus q̃ omnes nouit & indicauit ante Dioscoridem Theophrastus lib. 9. de plantarum historia, ostendens & ipse, adaffigatum Cyclaminum partus adiuuare: prodesse ad amores: subdi mulieribus: purgare caput: ulceribus ex melle maderi: & ne longiores simus, nihil non idem in utroq̃ est. Addidit Theophrastus, tantum cremari radicem Cyclamini, tum uino restingui, cineremq̃ eodem quo sex modo in pastillos conformatum seruari.

¶ De Altera Cyclamino. CAP. CLXXXII.
Est & altera Cyclaminus, quam Cissanthemon, aut Cissophyllon uocant, minoribus q̃ Hederæ folijs, geniculatis caulibus, crassissq̃, circa uicinas arbores capriolorum modo se uoluentibus, flore candido, odorato, acinis Hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris, radice superuacua. Nasctur in asperis. Huius acini drachmæ unius pōdere poti cum uini albi cyathis duobus triginta diebus, lienem per urinam & aluum absumunt. Ad Ortopnceam bibitur. Reliquias a partu purgat.

BARBARI COROLL.
Cyclaminos altera est, cui nomen ab Hederæ floribus impostum Cissanthemos, de qua hic agitur, Plinius & tertiam, Cyclaminon demonstratam sibi prodidit, cognomine Chamæcis.

son, uno omnino folio, Radice ramosa, qua pisces necantur. Ideoq; hanc proprie Ichthyoterā uocari autumo, quanq; nomen hoc a Dioscoride Cyclamino primæ datur.

E X. M. V E R G. C O M M.

Alteram Cyclaminum hanc a supriori illa diuersam faciunt, minus in latitudine exequa-
ta, & globosior radix; longiores coliculi, quibus in alias arbores uitium modo ascendit; folia
longe q; illius minora, quantitate, incisuris, totoq; habitu hederacea. Ob quā causā Plinius ait,
hanc tantū Cissanthemon dictā fuisse. Flores candidi, odoratiq; qui in illa purpurei sunt, & si-
ne odore. Acinosus fructus, & qualis in Hedera corymbaceus; & qd ad medicinā pertineat, ra-
dix inutilis, quæ sola in altera illa expetitur & usum habet. Hæc aspis locis nascens, illa in ue-
pres & in sepibus. Hanc ipsi non uidimus, nec possumus oculati testes eius legentibus esse.

De Dracunculo. C A P. CLXXXIII.

DRACCVNTIVM magnum aliqui Aron, alij
Isaron, alij Iaron, alij Geracicon, alij Biaron, alij Armiagrion,
alij Cyperida uocant. In umbrosis sepibus gignit. Caulem habet rectū,
lauem, duum cubitorum, baculi crassitudine, uersicoloribus draconum
maculis, purpureis tamen euidentibus. Folia Rumicis, inflexa. Fructū
summo caule facit racemosum, coloris primum cineracei, mox per ma-
turitatem in crocum & purpuram uergentis, radicem prægrandem, ro-
tundam, candidam, cortice tenui uestitam. Colligitur, & dum matu-
rescit succus exprimitur, sicuturq; in umbra. Radix quoq; messibus ef-
foditur. Elotaq; particulatim conciditur, & funiculo transfixa sicatur
in umbra. Cum diluta potione crudam, coctamue, cum melle delingi
prodest, contra orthopnceas, rupta, conuulsa, tussim, & destillationes.
Pota cum uino uenerem stimulat. Vlcerā quæ cacœthe uocantur, at-
que phagedænica expurgat, præsertim cum uite alba. Ex ea & melle col-
lyria ad fistulas, & partus euocandos componuntur. Ad uiliginēs cum
melle efficaciter illinitur. Polipos, & carcinomata absumit. Succus ad o-
culorum medicamenta, item contra nubeculas, caliginem, albugines
que effectum præbet. Herbæ, radicisq; odor, teneros conceptos abortu
uitiat. Item si triginta grana eius in posca bibantur. Sunt qui eius suc-
cum cum oleo, aurium doloribus infudere. Quinetiam folia, utpote
quæ adstringant, uulneribus recentibus imposuere, & cocta in uino
pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicem exemerit, posse
a uipera feriri, inficiantur.

B A R B A R I C O R O L L.

DRacunculus a caule uario draconis more dicitur: siue a cauda, quæ illi subrutilla est, &
draconis intorti modo conuoluta. Dissonāt aliquatū in hoc genere scriptores. Alijs Dracun-
culum ab Aro separantibus. Alijs idem existimantibus. Glaucias Dracunculum syluestrem
Aron uocabat. Phenias Aron, & Aroniam. Aliqui radicem Aron appellauere, caulem Dra-
cuntion. Theophrastus Aron putauit genus esse, sub quo species quasi multæ continerentur.
Dioscorides quatuor uidetur fecisse genera, Dracunculum maiorem, Dracunculum minorem,
Aron, & Arifaron, quanq; in describendo Aro, discrepat a Plinio. De Dracunculo quoq; pa-
rum conueniunt inter eos, ut sequenti capite liquet. Dracunculus hordeo maturecente fodit,
luna crescente, Serpentariam sunt qui uocent. Inuenio apud Hippocratem & Ophin herbam,
semine muliebribus medicinis utilis probari. Nec an eadem sit cum Dracuntio satis constat, eū-
am si a serpente nomen habeat. Idem Hippocrates candidam radicem cum nominat, Dracun-
ti radicem, ut Galenus uult, intelligit.

A

δρακόντιον

B

The. li. 9. ca. 32

A iij

C E X M. V E R G. C O M. M.

Rit legendis & nobis non leue laboris compendium, si antequā de maiore Dracunculo agatur, tota minoris medicina & historia pariter reddita fuerit. Sunt enim utriq; paulo minus q; cuncta communia, tamq; in minore incerta, mixtaq; cum maiore multa, ut continuato sermone de utroq; utilius dixisse fuerit. Aequo animo ob eam causam tātisper dum hoc agimus, differri sibi nostram Dracunculi commentationem legentes patientur.

De Dracunculo paruo. C A P. CLXXXIII.

Dracunculus paruos folio constat hederaceo, magno, candidis notis insigni, caule recto, bicubitali, uersicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem plane referat, baculi crassitudine. Fructus summo caule racematim cohæret, colore primum felleo, & cum ematuruit, croceo, gustu feruens, mordaxque, radice rotunda, bulbosa, raphano non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus umbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat. Naribus etiam ex lana impositus, polipum absumit. Carcinomata illitu sistit. Triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt. Odorem aiunt posteaquam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix excalfacit. Orthopnoeis, ruptis, uulsis, tussi, destillationibus auxiliatur. Humores pectoris excreatu faciles reddit, siue cocta, tostaque cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur. Vrinam pellit. Venerem excitat, cū uino pota. Phagædenas ulcerum, & quæ cacœthe uocantur, trita cū melle & Brionia alba, expurgat, & ad cicatricem perducit. Collyria ex ipsa ad fistulas, & eijciendos partus fieri solent. Qui radice suas manus perfricuerunt, a uiperis feriri negantur. Illita ex aceto utiligines emaculat. Folia recentibus uulneribus, conceptorum lintheolorum uice, conuenienter imponuntur. Decoctam in uino pernionibus appouisse prodest. Caseus folijs inuolutus, a putredine defenditur. Succus radicis ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctaue, ad sanorum usus, pro olera recipitur. In Gymnetidibus insulis, quæ Calarides uocantur, coctā radicē cū melle multo, in conuiujs placentarū loco offerunt. Radix messibus effoditur, lotaq; frustatim concidit, & lino traiecta siccat in umbra, & ita reconditur.

B A R B.
Pli. li. 24. ca. 16

Dracunculi duo sunt Dioscoridi, maior, & minor, ut prædiximus. Plinio tres. Vnus folijs latq; tribus omnino cauliculis. Tertius folio maiore q; cornus, radice arundinea, totidem (ut aiunt) geniculata nodis, quot habet annos, totidem etiam folijs. Aetius Dracunculi semen occultari terra, & piperi simile describit. Olitores & Draconem uocatam ferunt, huic toto genere dissimile, quam mirabili quodam modo nasci prædicant ex lini semine incluso, raphanis, aut scillæ bulbis, atq; in terra obruto. Pusilla herba, nigro ac minuto semine, folio tenui & oblongo, acri, & utraq; originē prodente, linguam & folio & radice amburens, & acetū & salis gustu. Pyretrum sunt qui a ueteribus appellatam falso putent hanc, inter olera acetaria gratissimā. Ita em uocare institui, quicquid crudū manditur ex aceto, sale, oleo. Quanq; hortos suos prisci Acetaria uocabant: non ab aceto, ut quidam rati sunt, sed ab accipiēdo, quasi acceptaria: quippe quos, ut inquit Cicero, quasi alterā succidiā ueteres habuerint. Ab eodē uerbo et Acetabulum deducit, etiā Græci Oxybaphō ab intinctu acetū nomināt, ita em aceto uas dicatū uocabat.

ut Athenæus testatur. Quæ & mensuræ genus significat, quod & Cochleare dicimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Miscuerunt adeo ueteres cum Aro Dracunculū, totque nunc iisdem, nunc diuersis notis descripta Dracunculi genera ab illis fuerunt, ut nihil in re aliogeni satis nota, difficiliter aut ipsi fecerint, aut per se legentibus ostendat. Quodque anxios diu nos habuit, & adhuc habet, nec aliter in partes trahit uarias, perque omnia uersat, quæ qui in amoribus Medæ ab Apollonio primū descriptus est, solis ex aqua fulgor, summi feriendi laquearia testis, nuncque stabilis, sed continua uersatione in omnes discurrens partes, Dioscorides est: & quæ in cunctis græcis duo maioris, minorisque Dracunculi capita in eo legunt, nullibi quod egregiā diuersitatē faciat, uariata eorum historia, aut medicina, & si alterū Rumicis, alterū Hederæ folia habere hic dixerit. Multiplex enim huic scriptori similitudo est coloris, figuræ, quantitatis, uirium, aliorumque huiusmodi. Fitque ob eam causam sæpenumero, ut quod totū diuersum est, in partibus simile dictū, totam similitudinē referre male credat: & quod undique simile est in partibus, differre dictum totum dissimile falso habeatur. Quod in utroque scriptoris huius Dracunculo fieri facile potuit. In quorum altero folia Rumici in quantitate & figura, in altero Hederæ in colore comparari potuerunt. Nihil enim nobis, excusso diligenter utroque capite, inuentum est adeo dissimile, diuersumque, ut alterā oportuerit, præsertim tam longæ rei & medicinæ ipsædem uerbis historiā conficere. Auxitque suspicionē nostrā, quod nec Galenus, nec post Galenū Paulus Aegineta diligentissimus in græcis medicinæ auctor, & qui scriptoris huius dicta ubique bona fide retulit, alterū hunc, & minorē Dracunculū nouerunt: nec post græcos latini scriptores Apuleius, Ioannes Serapion, & quod multi apud nos est, uetustissimi latini codices, in quibus unius tantū Dracunculi caput, alterius uestigiū nullum ostendit. Ex eo factū est, ut crediderim, & adhuc credā, unum tantū a Dioscoride Dracunculū hoc loco describi. Neque enim uerisimile, si alter ille in natura Dracunculus esset, & ab hoc scriptore descriptus fuisset, relinquendū ab illis penitus fuisse. Et nihilominus in cunctis & antiquissimis græcorum codicibus, utrumque hoc caput adhuc legit. At non est eadē utriusque historia & medicina. Concedimus id quidē: monemus tamen uocū magis quam rerū diuersitatē esse: nec ad constituendū rei genus satis id esse. At minori Dracunculo aliquid tribuit, quod in maiori non legit: quale est, incorruptū seruari, folijs eius inuolutū caseum. Neque id etiā diuersitatis necessitatē facit. Potuit enim in noua alterius eius capitis descriptione illud addi. Siquidem non Dracunculo Plinius, sed Aro eam uim tribuit: possuntque eandem habere rationem quæcunque alia minori addita magis quam alia inueniuntur.

De Aro. C A P. CLXXXV.

Aron apud Syros Lupha uocitatum, aliqui Alymon, alij Thyamon, alij Dracontiam, Cyprij Collocassion dicunt. Folia emittit Dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis, caulem subpurpureum, dodrantralem, pistilli specie, a quo croceum semen exit. Radice Dracunculi alba, quæ decocta estur, utpote cum minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se, decocta manduntur. Radix, semen, & folia Dracunculi uires habent. Priuatim radix ex fimo bubulo podagris illinitur, & Dracunculi more reponitur. In totum ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

B A R B A R I C O R O L L.

ARorum Theophrastus inquit radices, inhibita germinatione fiunt atiles, folijs uidelicet terra obrutis. Prægrandia hæc sunt. Item caua, cucumeracea. Radix nuda cortice, quæ mandipossit. Nam & folia in aceto inquit decocta eduntur, nec insuauis cibus est, caulem ei nullum reddendo. Differt a Dracunculo, si Plinium sequamur: qui radicem habet nigram, in latitudine rotundā, multo maiorem, & qua manus impleatur, Dracunculus subrutillam, & intortam. Semē ei feruēs ac mordax, Aro lenius. Quod & Galenus confirmat. In cibis Aros forma præfertur: quoniā mas sit dulcior, & in coquendo lentior. Folijs Ari, caseum ne cōputrescat, seruari affirmant: quod quidem a Dioscoride, maiori, aut minori Dracunculo tribuitur.

Chorēsia, his uerbis. Est inter genera Bulborū, quod in Aegypto Aron uocant, Scyllæ proximū amplitudine, folijs Lapathi, quæ Rumex est; caule recto, duum cubitorū, baculi crassitudine:

A iij

A

B

ἀρον λούφα

Theophr. li. bro. 7. cap. 11. Pl. li. 24. ca. 16.

V E R G.

D I O S C O R I D I S

Cradice mollioris naturæ, quæ edatur & cruda, &c. Folia enim Lapathi, caulis rectus, duū cubitorum altitudo, & baculi crassitudo ex maioris Dracunculi historia cuncta sunt: nec Aro congruunt, cuius caulis semipedalis pistilli figura est. Quam formā in nostri orbis Aro quotidie licet uidere. Confundendiq; simul diuersa genera, nulla maior, ut credimus causa fuit, q̃ similitudo primū: mox antiquorū historia, in qua totū hoc genus Aron aliquando, nonnunq; priuatim illud Dracunculus, hoc Aron dictum est. Discreuit tamen alterum ab altero natura: & illud procerius, hoc breuius fecit. In illo figura est, qualē superiore capite tradidimus; in hoc ubi q̃ cognosci potest. Reliquit in hoc etiā Dioscorides inuolucrū illud, & cucullum, quo inuolutum semen claudit, pallido magis q̃ herbaceo colore, non ut in Dracunculo purpureū. Numbatur quondā, ferebaturq; inter olera Aron: quod uix credibile sit, tantā habet radix, quæ in ciborū usu erat acrimoniā. Cogitandūq; alterum est, aut aliunde inuectū mitius fuisse, aut cultura genere aliquo & humano artificio meliorescere nunc etiam posse.

De Arifaro.

CAP. CLXXXVI.

ἄριστον

Arifarum exigua herbula est, cuius radix oleæ magnitudinem implet, longemaioris q̃ Aron acrimoniæ. Vnde illitu nomas sistit. Fiunt collyria ex ea ad fistulas. Illitu radices, genitale animalis cuiuscūq; in perniciem agit.

BARBARICOROLL.

Arifaros, siue Arifaros, in Aegypto nascitur. Similis Aro herbæ, minor tamen multo, minoribusq; folijs, & utiq; radice: quæ tamen Oliuæ magnitudinem prægrandis impleat. Alba, geminum, altera unicum emittente caulem. Corrupte nomen huius herbæ medici, ut ab ipsis iam non Arifaros, sed detritis duabus literis, Asarus dicat: quod quidem & in Asari mentione constat. Aris & instrumenti quoddam genus est.

EX M. VERG. COMM.

DCongeneres, ut uidetur, plantæ tres hæ sunt, Dracūculus, Aron, & Arifaros Bulbosas em radices oēs habent: & in reliquis non adeo dissimiles, in medicina conueniūt. Plinius lib. 24. ca. 16. Erin, sed ut credimus, corrupta ex Arifaro uoce appellat. Additq; in historia eius, nasci in Aegypto. Et quod hic ait, emplastri modo impositā radicem, omniū quadrupedū genitali- genitali cuiuscūq; foeminini generis, animal in perniciem agi. Hic autē non magis foeminini, q̃ masculini sexus id malum fore ostendit. Signauimus hoc, ut suspicari & quærere legentes possint, huic ne capiti aliquid desit, an aliter Plinius rem intellexerit. Dubitauit in Pliniani ca- da planta hæc sit: quoniā Arin Hippocrates, herbā sibi tamen ignotā appellauerit: & q̃ Arifa- ron oīa minora q̃ Aron haberet. Sed uocandā Arifaros esse Paulus Aegineta lib. 6. testatur, di- cens multo breuius Aro Arifaros esse, uocatq; Arifaros manifeste, non Arin.

De Hastula regia.

CAP. CLXXXVII.

ἡστυλῆ

Hastulam regiam Græci Asphodelon, alij Narthecion, Romani Albucum uocant, uulgo notum. Folijs est maioris Porri, caule læui, ferente in cacumine florem, quē Anthericon appellat. Radices sub- iacent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres. Quæ ex calfaci- unt. Urinas, & menses epotæ cient. Lateris doloribus, ruptis, conuulsis, & tussibus, drachmæ pondere potæ ex uino medentur. Ea uero uomiti- ones adiuuat, ludicri tali magnitudine cōmanducata. A serpente demor- sis datur aptissime. Verum trium drachmarum pondere, folijs, floribus, & radice ex uino morsus illinire oportet. Item ulcera sordida, & depascen- tia. Mammarum quoq; & testium inflammationes, tubercula, furun- culosq; , decoctis in sæce uini bulbis. Recentibus oculorum inflam-

mationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto uetere uino dulci, myrrha, & croco decoquitur, fitq; perq; utile oculis medicamentum. Ad purulentas aureis per se, aut cum melle, uino, & myrrha tritus, prodest. In contrariam aurem infusus, dentium dolorem mitigat. Cinis e radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum in excauatis radicibus igni decoctum, illitu exulceratis pernionibus, & ambustis igni, conducit. Surditati, instillatus in aurem, auxiliatur. Candidam uutiliginem lintheo antea perfrictam in sole, illita radix emendat. Semen, floresq; in uino potati, scolopendræ, & scorpionum uenenis, mirum in modum resistunt. Aluum purgant. Floret messibus Albucum. Quare æquinoctio uertio, antequam semen adoleuerit, demetendum. Radicem aiunt potam, ueneris cupiditatem inhibere. Quod hæbarius Crataeas asseuerat. Addiditq; sanare podagræ dolores, si drachmæ pondere bibatur.

BARBARI COROLL.

Asphodelus, de clarissimis herbarum Hastula regia uocatur, radice cibus apta, folio Porri syluestris, angusto, prælongo, subleno, caule præcellenti, qui cubitalis est, & sæpe duum cubitorum, Antheriscos, siue Anthericos a Græcis, Albucus a nostris proprie uocatus. Differt Antheriscus ab Anthrisco, ut ex mentione Scandicis facile colligitur. Asphodelus, & aqua, & sicco uiuit. Lignosum ei semen, copiosum, triquetrum, colore atro. Nascitur in orbiculo subiecto flori, decidens ætate folliculo dehiscente. Particularim floret Asphodelos, incipiens ab imo. Vermes in eo uolucres, specie flosculorum erosæ, floris incipientis operimento euolant. Proprium huic cauli, q; tametli leuis & angustus, in ramulos tamen fundit superne. Torretur hic in cinere ad esum. Itæ bulbus cum semine, oleo, & sale addito, cum ficiis quoq; tundit, præcipua uoluptate, ut uidetur Hesiodo, in syluis eum nasci prædicante. Mentionem Asphodeli & Homerus fecit. Heroion, siue ut alij codices, Erineon appellat ab aliquibus uideo. Cochleæ terrestres mire in Campania caulem eius persequuntur, & sugendo arefaciunt. Bulbos eius Napis modicis similes octuaginta sæpe simul aceruatos autumnio colligunt, cum plurimum ualent. His mures necant, & cauerna præclusa immoriuntur. Amuletum esse putant, in domibus ante portas sacrum. Hellanicus prodit, quosdam esse Nomadas in Libya, qui nihil aliud possideant, q; situlam, gladium, & calicem, & ex Asphodelo casulam, umbræ tantum gratia; quam & circumferant. Eius tamen genera duo faciunt, Albucum intelligentes candidum: cui scapus cubito amplior, purus, leuisq; . Asphodelum uero, siue Hastulam regiam, cui acinosus sit caulis. Dionysius discrete uitæ sexu, marem, & foeminam, pronuntiando in ea.

EX M. VERG. COMM.

Vix credat nostra ætate aliquis, in cibos & sanitatis usum uerisse quondam Asphodelum: tam alienus homini nunc cibus est, tamq; inter medicamenta magis q; olera merito censet: nisi Hesiodum audierit canentem, nescire homines iniuste rem suam augentes, ὅσον ἐν μαλάχῃ καὶ ἀσφodelῷ, graue potam, sapientemq; & cuius carmina in priuata uita pro oraculo a professoribus sapientiæ recepta semper fuerint. Et post Hesiodum Plinium, manducae Asphodelum, semine tosto & bulbo dicentem: & ad temperandam eius acrimoniam ficiis misceri iubentem: Tantam rudi, nouoq; adhuc sæculo, aut indiscreta ciborum frugalitas erat.

De Bulbo uomitorio. CAP. CLXXXVIII.

BVLBVS QVEM uomitorium uocant, folia habet lentiora multo & longiora Bulbo cibario, radicem similem, cortice magno. Ea mansa, aut decoctum eius potum, uesicæ malis medetur. Vomitiones mouet.

BARBARI COROLL.

Bvlbus Vomitorius, a Græcis Eméticos uocatur, folijs nigris.

Plin. lib. 21. cap. 17.

B

Bulbus

C De Bulbo cibario. CAP. CLXXXIX.

βουλβος ὁ κνίσιος
μυρ

CIBARIUS BVLbus uulgo cognitus, a nobis estur. Stomacho & aluo utilis rufus, & ex Aphrica delatus. Amarus uero, & scylinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat. Bulbi omnes acrimoniam habent. Excalfaciunt. Venerem stimulant. Linguam, tonsillasque exasperant. Multum alimenti præbent. Carnes creant. Inflationem pariunt. Luxatis, fractis, articularum doloribus efficaciter illinuntur. Spicula extrahunt. Gangrænas, & podagras ex melle, aut per sese, hydropicorum tumores, & canum morsus cum melle & piperis polline illiti cohibent. Stomachi dolores mitigant. Furfures & ulcera quæ in capite manant, cum tosto nitro abstergunt. Sugillata, uarosque per se, aut ex ovi luteo, & lentigines cum melle & aceto, emendant. Fractis auriculis, unguibusque, ex polenta medentur. Idem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus. Item cum cinere e manarum capitibus, impositi. Cremati uero, & cum alcyonio misti, uitia cutis in facie, atrasque cicatrices, in sole illiti emaculant. Faciunt adrupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum. Quoniam neruos tentant. Cocti cum polenta, & ex suillo adipe impositi, tumores ac tubercula uelocissime ad supurationem perducunt, & rumpunt.

Pli, li. 19. ca. 5.

D BARBARI COROLL.

BVLbi foliū angustum, ut omnibus fere bulbosis. Radice seritur horrensis. Nam semine partim primo, partim sequenti anno prouenit: quod & in Auena, Loto, Betaque conspicitur. In Taurica Cherfoneo tam dulces sunt, ut crudi mandant. Laudant ex Alcatheo, Pelasga, ut Ouidius ait, urbe candidus, hoc est, ut puto Megaricus, auctore Pausania, sed ad uenerem. Idem auctor. Daunis, an Libycis Bulbus tibi missus ab oris.

An ueniat Megaris, noxius omnis erit.

Est & Bulbi genus circa ripas amniū, cuius inter esculentā partem, & summū corticem lanæa contineatur natura: ob id Eriophoros appellatū, ex qua uestes quoque fiunt. In Indis Bulbi non lanigeri, sed criniti nascuntur. Bulbis amaritudo in uertice. Habetur & Bulbina, rubicundo radicis bulbo. Item candido, & squamis carente, folijs Paracæ, ut inquit Plinius. Codices antiqui nuntur Bulbina, quam Maurice Buberigi cognominant herbarij, folijs croci, flore uiolæ, purpureo, siue ferrugineo in spicis, nigro semine. Syluestrium Bulborum florem, coronis inferuere ueteres, Anemonem uocantes post Narcissum, ut Theophrastus inquit, exeuntem uere. Conditio Bulbi eum florē Græci appellant: haud scio an hic sit, qui per initia mensis Aprilis Narcisso similis erumpit, maioribus diuisuris, ceu stella quaternis folijs cædus, cum caecis interioribus, & odoratus, fronde porracea, radice bulbosa, ceu Allium, sine odore glutinosa. Bulbum rufum Græci Bolbon, & Hippocrates Bolbion pyrron uocant. Inuenio apud Hippocratem genus syluestris oleris Omocnitidem, siue Oloconitidem uocari, dulcem, Bulbo simili radice, uerum parua, & Oliuæ magnitudine, ad secundas trahendas utili.

E X M. V E R G. C O M M.

Peregrinos Græciæ diu & Italiæ fuisse Bulbos, aut peregrinis quasi ad omnes usus melioribus usas fuisse has gentes, & plura eorum fuisse genera Græcorum antiqui, & probatioris fidei scriptores omnes testantur, Theophrastus primum, s. de plantis uolumine, cuius ea de Bulbis historia est. Bulborum autem plura esse genera, manifestum. Magnitudine siquidem, colore, figura, & sapore differunt. Alicubi enim adeo dulces nascuntur, ut per se sine condimento alio edantur: quales in Taurica Cherfoneo sunt. Post Theophrastum deinde Athenæus secundo sui diopnosophistæ libro inter cætera, quæ de Bulborum huiusmodi natura multa dixerat, Regios uocari aliquos ait: quos cunctis alijs prætulit. Post Regios a colore Rufos laudauit. Subijciens

statim Candidos, Lybicosq; in genere Scyllarū magis, q̄ Bulborum esse. Aegyptios omnium deterrimos: quemadmodū contra, auctore Nicandro, cunctisq; alijs, Megarenses omnium optimos. Quod genus conferi praecepit Cato iussit, & Columella in carmine suo his uerbis instituit. Iam Megaris ueniat genitalia semina Bulbi: Et quæ Scylla uenit getulis obruta glebis. Primum illud Ruffum & optimū, mox Candidum, Libycumq;: & Scyllæ magis q̄ Bulbo simile genus describens. Addidit eodem libro Theophrastus, quod & Athenæus pariter retulit, maximā & huic generi propriā Bulborum differentiā esse, quā ad maris littora aliquibus locis nascentes Bulbi ostendūt. Inueniūt enim littorales, in quibus intra primas tunicas lanæ sint, inter id quod manditur, & extimam tunicam mediā, tam uera & præfenti natura lanæ, ut uestes ex ea texant: uocariq; ob id Lanosum Bulbū: non quemadmodū in India nascentē Capillatum noiant. Hoc genus, q̄ ad mare, & littora nascit, & cum eo reliquos Bulbos oēs, quoniā congeneres inter se sunt, iuniores aliqui marinā Cepulam dixerūt. Cum tū Lanosum illud genus ad mare nascens, priuatim cognōie illo discerni debuerit. Serebat in hortis diligenter antiquitas hoc olus, eratq; illis in quotidiano usu, irritamentū Veneris potius, q̄ uitæ necessarius cibus. Nihil em ab antiquis aliud in eo laudat: neq; ex alia naturæ ui Columella, quod paulo ante diximus, genitalia semina Bulbi, appellauit. Et Martialis in Xenijs suis. Cum sit anus coniux, & sint tibi mortua mēbra, Nil aliud Bulbis q̄ satur esse potes. Idem tot alijs locis salaces eos uocans, nec aliā uim, nec aliū usum cognouisse in Bulbis uidet. Indicant idē in antiquis Græcorū Comædijs sales & dicteria in Theatris iactata: quale illud est, *βολέων χύτραν καταφαγών*, qd est, Bulborū pleno fictili satur: contra salaciores dictū. Et contra Veneris impotentes *ὀυδὲν ὀνήσει βολέος ἄν μὴ ἄλυσ' ἔχῃς*, id est, nihil pderit Bulbus, nisi farinā habueris. Sesami enim farina, caseo, melle, & aceto ad cibum condebantur Bulbi. Perse enim amari, nec in cibis grati sunt. Numerauitq; Tarentinus Heraclides Bulbum hunc inter ea quæ seminis abundantia faciunt: hic inflare dixit, quæ ad Venerem non minor q̄ illa occasio est. Priuatim, ut a principio diximus, totū hoc genus Bulbos antiquitas uocauit. Alioquin commune omnibus his Bulborum nomen est, quorum radices sub terra sic crescunt, ut ad nouam quotannis sobolem decerpi aliqua pars possit: ut in lilio, croco, & plerisq; alijs sit. Non sic tamen certa est nominis huius ratio, ut ad alia genera aliquando etiam non trahatur: a quibus licet non auellatur noua illa soboles sub terra, tamen augentur. Sed illa est totius bulbacei generis propria nota.

¶ De Scilla.

CAP. CXC.

Scilla uim acrem atq; feruentem habet. Assatam multo utiliore esse constat. Polline, aut luto oblita, in clybanum conijcitur, aut carbōnibus obruitur, donec obducēs farina sufficienter inposita fuerit. Quæ exempta, si non emollescat, altera farina, aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius fiunt. Nam quæ ita non assatur, interaneis maxime noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnum demittatur. Sumi etiam solet medium, direptis uiuotenus tunicis: quod frustra tim confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinem, aut acrimoniam habeat: traiectaq; lino frustra siccantur in umbra, ita ut ne ulla quidem parte se contingant. His Scillæ segminibus ad oleum, uinum, aut acetum scillinum utimur. Ad rimas pedum, interna pars crudæ Scillæ in oleo feruefacta, aut cum resina liquefacta, imponitur. Decocta in aceto, demorsis a uipera, cataplasma est. Ad singulas assæ parteis, adiectis octonis tosti salis, cochlear unum, aut alterū damus ieiunis, ad emolliendam aluum. In potu autem & odoratis medicaminibus, quibus urinā ciere uolumus, hydropicisq; & stomachicis, quibus innatat cibus, Regio morbo, torminibus, in tussi uetere, suspiriosis & cruenta extussientibus, tres obolos in delinctu ex melle sumpsisse satis est. Coqui

D I O S C O R I D I S

Cur cum melle, & estur eorūdem gratia, maxime ut cōcoctionē adiuuet. Strigmenta per aluū extrahit. Cocta, & simili sumpta modo, eosdem præbet effectus. Sed cauendus Scillæ usus, his qui intestinum sentiunt ulcus. Ad peniles verrucas, & perniones, tosta efficaciter illinitur. Tritum semen, & in carica, aut melle deuoratum, aluum emollit, Scilla in limine ianuæ suspensa, mali medicamenti noxam arcet.

Pli. li. 19. ca. 5.
lib. 20. ca. 9.
Theophr. lib. 7. cap. 11.

B A R B A R I C O R O L L.

Scilla, siue ut Varro appellat, Squilla, Hippocrates uero etiam Scella, & terra & mari alitur. Radix sit Bulbus, an Cyma, siue fructus, a Theophrasto dubitatur. quoniam sunt qui radicem in ea geminā demonstrant. Vt cūq; tenera esu est, non omnis, sed eius quæ ab usu Epi-
menidia Scilla dicitur, angustiore folio, ac leuiore q̄ reliqua eius genera, quibus omnino lata ea sunt. Germinant celerius quædam intra Scillam consita. Nam & fructus condendos, præsertim granata seruat, exempto pediculo prius. Folio caulis, ut in Croco & Narcisso profilit. Flo-
demū emicant. Scillarū in medicina species duæ, Alba quæ masculus, Nigra, quæ femina. Ge-
nus unum Scillæ, aut Bulbum eius omnē Hippocrates Schoenon uocat, ut Galenus inquit: q̄q; sunt qui Schinon scribant, non Schoenon in Aristophane poeta.

De Pancratio.

C A P. CXCI.

πανκράτιον

Pancratium, quod aliqui Scillam appellant, radice est magni bulbi, ruffo colore, aut subpurpureo, gustu amaro ac feruente. Folijs lilij, sed longioribus. Scillæ uires & præparatiōem habet. Eodemq; pon-
dere in morbis efficaciter assumitur. Cui tamen mitior q̄ Scillæ facultas inest. Radicis succus, cum Erui farina digeritur in pastillos, qui hydropi-
cis, splenicisq; cum hydromelite, commodissime dantur.

D

B A R B A R I C O R O L L.

Pancration, quam & Scillam pusillam uocamus, folijs Lilij albi crassioribus aspicitur.

E X M. V E R G. C O M.

Eandem penitus, non similem Scyllæ Pancration hoc nostra ætate Herbarij ostendunt, con-
funduntq; simul, alioquin diuersa genera: tanta nataliū similitudo & mixtura est. Nos utramq;
simul uisam, præterq; colore, & id quidē non satis manifeste, diuersam secernere nequimus.

De Cappari.

C A P. CXCI.

καππάρις

Capparin aliqui Cynosbaton, alij Capriam, alij Corui malū, alij Ophioscorodon, alij Phyllostaphylon, quidam Thalliam, aut Petræam, alij Olophyton, alij Ionitem, nonnulli Oligochloron, aut Ascontion, aut Hippomanes, alij Trichomanes, Magi Potera, alij Penthesron, aut Cor lupi, alij Alochorodon, Romani Inturim, Aphri Harbiezathon. Capparis aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagat. Spinis ut rubus habet, in hami modū aduncas. Folia mali Coto-
nei rotunda, fructū oleæ similē: qui cū dehiscens pandit, florem candidū promittit: quo excusso, nō nihil glandis oblongæ figura inuenit: quod aper-
tum, grana acinis puniceorū similia ostendit. Radices lignosas spargit, grādes, numerosasq;. Tenui solo, asperisq; locis, in insulis iuxta domicilia nascitur. Caulis, & fructus cibi gratia condiunt. Aluū turbat. Stomacho aduersatur. Sitim gignit. Cocta tamen, stomacho q̄ cruda utilior est. Fru-
ctus drachmis duabus in uino potus, quadraginta dieb. lienē absūmit.

Et urinam, cruentumq; excrementum emittit. Bibitur utilissime in coxarum doloribus, & neruorum resolutione, item ruptis & conuulsis. Menfes ciet. Caput purgat. Dentium dolorem sedat, semen ex aceto decoctū, colluto inde ore. Aridus radicis cortex ad eadē proficit. Vlcera omnia uetera, & sordida, & quæ occalluerunt, expurgat. Lienosis cum farina hordei illinitur. Dente demorsa dolori eius auxiliatur. Cum aceto trita, uirgines albas absterget. Radix, foliaq; intrita strumas, ac duricias discutit. Aurium uermiculos infusus succus enecat. Aphrica, & Marmarica Capparis, uehementer inflant. Apula uomitus facit. Libyca, & quæ Rubro mari defertur, mirum in modum acris est. Siquidem in ore pustulas excitat, gingiuaq; offensus exest: quare in cibis non ab re damnatur.

BARBARI COROLL.

Capparin, siue ut Palladius Cappar, alij diligentia marcescere affirmant, alij negant. Frutex est firmioris ligni, seminisq; & cibi uulgaris, caule q; una plerumq; decerpto, aculeatos rose modo ramos habet, folio quoq; horridulo ac spinoso, radice una, caule humili. Germen & flos æstate roseus, odoratusq; folium ad uergilias usq; uiget, fabulosis macrisq; gaudet. Quatuor ei genera. Arabicum, quod & pestilens est, ut Plinius, & Galenus ait. Africum, Marmaricum, Apulū, omnia quondam infesta, nunc mitia undecumq; illata. Quidam eum Phyllostaphylon, Ophiocephylon uocant. Innocentius Italicum cibū. Capparis nisi area defossa, hoc est, circulari serbo coerceatur, & ripis, undiq; circumstructis lapide, late serpit, euagaturq; per agros, & cogit solum sterilefcere.

Pli. li. 13. ca.

EX M. VERG. COMM.

Vulgaris, quotidianiq; usus cum suo fructu herba Capparis est: & quod cōmunior cunctis ubiq; gentibus, & ubiq; nascens, eo plures appellationes inuenit, singulis eam suo nomine indicantibus. Quo fit, ut exceptis paucis, nullum habeant reliquæ intellectum. Cynosbatus tamē, id est, caninus rubus, ob hamatos quos habet tubo illi similes aculeos, dicta Capparis est. Quemadmodum Phyllostaphylon, q; inter folia fructum quasi uuam fert; & si hic paulopost Oliuæ comparauerit. Sic Petraea a natalibus suis, quos inter lapides & rudera inuenit. Cur autem Sinapi persicum a Romanis hic Capparin uocari dixerit, incertum nobis est: quemadmodum contra notum omnibus, Capparin a cunctis rei rusticæ scriptoribus appellari. Vsum eius ante alios cibos in sanitate cōmendauit Paulus Aegineta: iussitq; sumi ex aceto mulso, aut ex aceto & oleo. Monuit præterea, excitare Capparin cibi appetentiam: iecur, lienemq; laxare: & pituitam per aluum deijcere: idq; est quod hic ait, aluum turbare.

B

De Lepidio. CAP. CXCI.

Lepidium aliqui Gingidium uocant. Herbulæ uulgo nota. Muria cum lacte seruatur. Vis foliorum acris, et exulcerans. Quapropter ischiadicis illita, præsentissimum est auxilium, si cum helenij radice quarta parte horæ illinatur. Lienosis simili modo prodest. Lepras eximit. Raddix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

Aemid. 109

BARBARI COROLL.

Lepidium, Aegineta Paulus Hiberida, siue Hiberida iam uocari ceptum scribit, a Galeni (ut arbitror) temporibus. Lepidium ab eo, q; lepidas & maculas in facie deijciat ac repurget: quas Columella Fucas uocauit, appellatum Græci putant. Idem autor Columella, duo genera Lepidij esse intelligit, syluestris, & satiu: ut syluestre quidam accipiant pro Hiberide, satiuū pro Lepidio. Peregrinum inquit Plinius fuit & Lepidium, feritur a fauonio. Dein cum frutificauerit, iuxta terram præciditur. Tunc runcatur stercoraturq;. Per biennium hæc, postea ipsæ fruticibus utuntur, si non seuitia hyemis impediatur: quando impatientissimū est algoris. Exit & in cubitalem altitudinem folijs: non ut Hiberis nascitur, sed laurinīs, utiq; per initia, uerū molibus. Post Gladioli retusi fere speciem accipiunt, usq; eius propter acrimoniam non sine la-

Pli. li. 19. ca. 8.
lib. 20. cap. 17.

B

D I O S C O R I D I S

Cste. Herbarij modo hanc, non Lepidium, sed Raphanum appellant, in Pannonia frequentem: ubi ferunt eam non aliter q̃ radice scobe. Paulus Lepidium inquit, quod apud nos habetur, folio Lauri, sed maiore multo nascitur: quod ei tamen ætate nullum est.

De Ranunculo. CAP. CXCIII.

Βαρβαχίον

RAnunculum, aliqui sylvestre Apium uocant. Complura eius genera. Vis tam omnibus una, acris, & uehementer exulcerans. Nam unum Coriandri folijs cōstat, latioribus, subalbidis, pinguibus, flore luteo, interdum purpureo, caule gracili, cubitum alto, radice alba, exigua, amarac̃, multis capillamentis hellebori modo fibrata. Nascitur in liminibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plerumq̃ in Sardinia proueniens, q̃ acerrimum: quod sylvestre Apium appellāt. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. Folia, flores & cauliculi recentes, illi exulcerant, & crustas nō sine dolore gignunt. Quare ungues scabros exstricant. Scabiem eximūt. Stigmata delēt. Formicantibus uerrucis, & pensilibus, alopecijsq̃ paulisper illinuntur. Tepente decocto perniones fouentur. Sicca radix, tritaq̃, sternutamenta ciēt, naribus admota. Dentium dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

Pli. li. 27. ca. 12.

BATRACHION, siue Ranunculus, siue Strumea: quoniam medetur strumis, nam Strumus Sclani genus est. Dicitur & Apiastrum Ranunculus, hoc est, Apium sylvestre, uenenatū in Sardinia, manifesto Nigidij doctissimi uiri errato: qui Apiastrum pro Mellisophyllo appellat: quāq̃ hunc & Varro sequitur et Dioscorides, Opacis gaudet. Primum genus, cui et color liuidus, ad latitudinem Maluæ accedentibus folijs. Secundo generi, caules ut Plinius inquit alti, ut Dioscorides, minores q̃ priori: nisi librariorum culpa fuerit, μικροκαυλότερον pro μικροκαυλότερον scriptum. Genus ab his diuersum in totum uidetur, Barachion, cognomine Polyanthemus, caustica ui exulcerans cicatrices, & ad colorem eas reducens, & utiligines concorporans. neq̃ aliter indicatur a Plinio quale sit: nisi quis & hoc in unam quatuor specierum contribuat, ac reponat: illam uidelicet, quam plurimis foliorum diuisuris & Plinius & Dioscorides deliniant, uulgo dictam Pes Coruinus, alteram omnino q̃ Coronopus, de qua superius habita mentio est. De uenenato Salustius, In Sardinia inquit quædā herba nascitur, quæ Sardoia dicitur, Apiastri similis. Hæc ora hominum & rictus dolore contrahit, & quasi ridentes interimit. In eainsula, ut Pausaniæ ac Solino placet, locis riguis prouenit iusto largior: nec tamen aquas inficit. Strabo ex hac ipsa herba Hispanos toxici genus conficere ait: quod urgente ui maiore hausit, citra dolorem humanis rebus exigat. A qua σαρδάνιον uulgo γλαυρ, quod & Dioscorides in uenenis meminit. Homerus Sardanion risum uocauit illo uersu,

μείδων δὲ θυμὸν σαρδάνιον μάλα τοῖον.

Vide Erasmi Chiliadas.

Meminit & Plato in Repub. Timæus aliā originem prouerbio huic reddidit, aliā Clitarchus, aliā Sophocles & Simonides poetæ: nos id in annotationes Plinianas distulimus.

De Fremio. CAP. CXCV.

ἀνιμών

FREMIO, græci Anemonem, alij Agriam, aut Nigram uocant, alij Anemonem phœnicam, alij Euemion, nonnulli Meconion, alij Tragoceros, alij terræ Parinem, aut Barbylam. Oftanes Berilion, item Ornios Cheranion, Pythagoras Attraculida, Magi Cnicum agriam, Romani Orci tunicam. Duo Fremij genera. Vnum sylvestre. Alterū in cultis nascens, Cuius multæ species. Vna phœ-

niceum florem profert. Altera candidatem, aut lacteum, aut purpureum. **A** Harum folia Coriano similia, tenuioribus prope terram diuisuris: caules lanuginosos, tenues, in quibus flores ut Papaueris, & in medio capitula nigra, aut cærulea. Radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grande: scit, fermeq; geniculis quibusdam cingitur. Syluestri amplitudo maior, latioraq; folia, & duriora. Oblongius caput, flore puniceo, multis radicibus capillamentis. Acrior est quæ nigra habet folia. Vis omnium acris. Ea de causa succus naribus infusus, purgat caput. Commanducata radix, pituitam trahit. Decocta in passo, & illita, medetur oculorum inflammationibus. Cicatrices eorundem, & hebetudines emendat. Sordida ulcera abstergit. Folia & caules, si cum præsana decocti edantur, copiam lactis præbent. Menstrua ciunt, uellere appositi. Illiti quoq; lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, Argemonem nominari Eupatorium putent. Quoniam a syluestri Fremio, Argemonem, & Papauer, quod Rhœam appellant, de quo inter Papaueris genera referemus, propter colorum cognitionem in floribus, distinguere non possunt. Verum Papaueris & Argemonæ color, minus puniceus spectatur, & utraq; tardius floret. Quinetiam Argemonæ croceum succum, gustu admodum acrem reddit, Rhœas uero candidiores & acrem. Insuper Fremio & Rhœadi capitula syluestris Papaueris similia insunt, sed in Fremio supne crassiusculū, in Rhœa de angustius, Fremij genera nec succum remittunt, nec caput habent, sed quasi Asparagi cacumen. In aruis illa sæpius enascuntur.

BARBARI COROLL.

A Nemonem quidam Fremium uocari putant, sed scribendum est Phenion, auctore Plinio. Edit florem suum haud multo post germen. Erumpit autumnino post Aphacem a primis imbribus. Inter aculeatas, sed mitioris generis Anemonem collocant. Quatuor sunt nominis huius fastigia. Duo coronis dicata, hoc est, syluestris bulbi florem uocatum Anemonem: et aliam Anemonem, quæ Timonia, siue Limonia potius cognominatur, post Heliochryson florentem, & cum Viola nigra uere. Duo medicinis, syluestrem, & satiuam, de quibus præsens mentio copiosissima omnium est, phœniceum florem habens, inter satiuas. Satiuis omnibus folia Apio similia, nec fere semipedalem excedunt altitudinem, cacumine Asparagi. Flos nunq; se aperit, nisi uento spirante, ob id Anemone dicta. De Othonna syria herba, quam quidam Anemonem existimauere, dicemus in loco. Nicander Anemonem, Anemonida solet appellare, eamq; ex Adonidis cruore natam prodit. Sosibius Anemonas a Spartanis Phœnidas uocari tradidit. Horus Anemonæ flores inquit in Aegypto pingi, quoties morbos hominum intelligi uoluit.

EX M. VERG. COMM.

V Agum, cōmuneq; plantis aliquot, & si congeneres omnino non sint, earumq; floribus fuisse quondam Anemonas, nomen, testes, & indicio sunt Theophrastus, Plinius, hic ipse, & Bucolicorum insignis poeta Theocritus: modo eius legitimum poema sit, quod passim legitur Adonidis Epitaphium carmen. Nominisq; inconstantiam, & cōmunionem hanc, papauera ei præcipue, in cunctis his, floris figura fecisse nobis uidetur. Neq; enim satis constat, tam multum diuersis temporibus prodeuntes flores, Anemonæ omnes dicti quondam fuerint: q̄ non nisi spirante uento dehiscerent, & in folia se explicarent: quod manifeste patitur, quæ priuatim primoq; Anemone dicta ab antiquioribus græcis est: quam uim naturamq; eius ex re factum illi nomen indicat, & Plinius lib. 21. cap. 27. his uerbis testatur. Flos nunq; se aperit, nisi uento spirante: unde & nomen accepit. Potuit quidem in proferendis floribus eadem omnium infirmitas esse: uerum tamen quod obseruasse uolentibus difficile non erit, cur Anemone omnes dicerentur, cōmunis omnibus tota floris figura maxime fecit: pauciora tria, scilicet & ad summam, quæ in

Pli. li. 21. ca. 11
& 27.

B ij

D I O S C O R I D I S

C floribus folia, grandia, eadem, infirma, & quavis iniuria decidua: quodq; non minus obseruandum fuerit in cunctarum medijs floribus, inter folia surgens apex, cacumen, capitulumue, aut papaueraceum uasculum; quæ notæ papaueracei floris omnes sunt. De coloribus nō agimus: quoniam nullibi magis luisse uidetur natura, & in Anemonis his tam uarij & inconstantes sunt, ut nihil quod certum & exactum sit doceri possit. Tamq; late quondam paruit Anemonarum nomē, ut quod posteriores rubrum Papauer dicunt, in triticea & hordeacea segete, Maio men se puniceo colore florens, de quo nunc agitur, Anemonem ueteres etiam dixerint: & si contra credi possit multa indicio sint.

De Argemone. CAP. CXVI.

ἀργεμόνη
δινώνη ἀνθεμίσ
ομόνοια
ἀνθος πιδύων

ARGEMONEA Græcis Oenone uocatur, ab alijs Anthemis, alijs Homonœa, aliquibus Flos campestris, Romanis Concordialis, aut Pergalia, Alijs Lyburnia, Gallis Corona. Syluestri Papaueri similis est. Folia habet Fremij, ditiusa, florem puniceu, caput in cauliculo. Papaueris rhœadidis, oblongius, & summis partibus latum, radicem rotundā. Succum Croci colore acrem dimittit. Argema & nubeculas expurgat. Folia illitu inflammationes compefcunt. Ea, ut herbarius Crateias autor est, contusa cum axungia, strumas discutit. Cribrata eius farina cum nitro & sulphure ignem non experto, contra uiliginēs efficax est. Easq; sicco linteo antea confectas in baln eis sanat. Facit & ad scabiem.

BARBARI COROLL.

Pli. lib. 27. ca. 9

Argemonen, & Argemida puto dictam a Dioscoride, ubi de Anemone loquitur. Folia habet Anemonēs æqualia, et Apij modo secta. Nascitur in aruis apud nos, ut Plinio placet. Genera eius tria faciens, ut id demum probetur, quod radice Tus redoleat. Diuersum uidetur genus esse quod apud Plinium Argemon uocatur. Argemonēs radicem Eupatorium a recentioribus appellari quandoq; uideo, autoritate (ut arbitror) Dioscoridis in Anemone hoc inuenta, ut aliud tamen intelligatur genus esse quod Eupatorium proprie uocari solet.

EX M. VERG. COMM.

Fuit, & adhuc est magnæ litis cum Eupatorio Argemone, duo simul diuersa genera miscen-
tibus cunctis. Nec satis adhuc constat, nominis ne, an rei controuersia hæc sit. Si quam nostræ ætatis in Ethruria medici Argemonem circūferunt contempletur aliquis, nihil cum uera Eupatorio, descriptaq; hoc loco Argemone cōmune uidebitur habere, si quam iuniores scriptores tradiderunt, & nos in antiquissimis eorum cōmentarijs pictam uidimus Eupatorium, mutato nomine Argemonem appellasse, merito credentur. Eupatorii em̄ a Dioscoride traditas in quarto uolumine notas omnes, in historia & pictura illi assignant. Nec est q; demiretur aliquis, nos picturarum fide ad hanc rem utentes. Calami enim, & penicilli eadem pene ratio & usus est: nec alter altero minus, incertiusue nostri animi sensus alijs ostendit. Verisimileq; est, relictas ab illis medicæ materiæ picturas, ex his quæ tunc in communi æstimatione erant, relictas fuisse. Quod totum non sine causa a nobis dicitur. Vidimus enim, & nunc in manibus habemus sexcentorum annorum latinum Dioscoridem, regium, ut tunc tempora erant, opus, in quo diligentissima pictura omnes Eupatorii notæ Argemonæ huic adiectæ fuerunt: quæ ex historia huius scriptoris tribuendæ Argemonæ non erant, quam agrestis Papaueri similem dicit, folio Anemonēs incisuris diuiso, flore in caule puniceo, & in flore erratici Papaueris capitulo: quorum nihil in Eupatorio uidetur. Miscuit hæc, & ignorari fecit similitudo: quodq; hic superi ore capite in Anemone ait, nescientes, syluestrem Anemonem ab Argemone hac, ob similitudinem discernere imperiti herbarij, syluestrem Anemonem, et Argemonem hanc unam eandemq; crediderunt, & esse tradiderunt: & ne ociosum in incognita re uacaret Argemonēs nomē, adpellauerunt. De Eupatorio copiosius suo loco agetur. In Argemone hac autem satis illud nouisse sit, sui generis esse herbam, syluestri Anemonæ adeo similem, ut discerni nequeat: appella tamq; a ueteribus Argemonem, q; oculorum & lucis uitio, quod græci argema uocant, illita

medeatur. Plinius plures, maioresq; q̄ hic & alias illi uires assignat. Videturq; in ampliore, & honestiore medicinæ & remediorum censu eam constituisse: quo fit ut suspicemur, potuisse eū scriptorem Argemones nomine etiam pro Eupatorio uti. Non tamen hoc constituimus. In Eupatorio enim certius tota hæc agitur res.

A De altera Argemone. CAP. CXCVII.

Alter est Argemone, quam Artemonen aliqui, alijs Arselā, aut Sarcocollam uocant, Romani Argemoniam. Ea folijs syluestri Papaueri similis est. Recens trita, intercisiones impositu sanat. Oculorū inflammationes mitigat. Pota cum aqua, dysentericis auxiliatur. Vulnēra conglutinat. Conuulsis, & uellicatibus, imposita medetur. Inflammationibus utilis. Contra serpentium morsus cum uino bibitur.

Serpentibus & uenenis Argemonem aduersari nouimus, & ob id fortasse nomen habet. cū sit Arges Hippocrati nomen anguis, ut Galeno placet.

BARBARICOROLL.

Tria Argemones genera Plinius sua ætate cognosci, & numerari a Romanis tradidit: probari tamen unum tantum, & id, cuius radix Tus olet. Antiquiores græci, Galenus. f. & Paulus Aegineta, unam tñ Argemonem nouerunt. Hic primam & alterā descripsit, & medicinæ utilē tradidit. Dicimus aut in hoc duo eius gñā legi, ut in impressis, & q̄ circumferunt græcis codicibus inueniunt. Nā in uetustissimis nullū est alterius Argemones hoc caput: nec quē nos habemus uetustissimū latinū Dioscoridē, alteram hanc Argemonem ostēdit. Obseruauimusq; nos in multis, pares uetustate græcū & latinū Dioscoridē, quē tam sæpe citamus, fide pares etiā esse, nihilq; aut in altero inueniri, aut deesse, qd non in altero pariter inueniat & desit. Quā legi timū itaq; scriptoris huius caput hoc sit, uiderint p̄tiores. Nobis inclināt animus, ut credamus adulterinū, supposititiumq; esse. Vtimurq; ad hāc suspicionē, nō tam quas pauloatē diximus rōnibus, q̄ q̄ pleraq; sunt in eo alienę huic scriptori elocutionis indicia. Dubitamus preterea, de esse huic Capiti aliquid, quo loco. f. sanare præcisiones Argemone hæc legitur. Desyderatur enim cuius partis præcisiones. Nobis inclināt animus, neruorum intelligi oportere: quoniam hic, & alijs græcorū medici *διακοπή*, quæ uox huic scriptori eo loco est, in neruis priuatim plerumq; appellat. Plinius præfectiones eas dixit undecimo uolumine, capite. 37. Eius uerba sunt, Mirumq; uulneratis neruis summus dolor, præfectis nullus.

A De Anagallide. CAP. CXCVIII.

Anagallis purpurea, quibusdam Aëritis, aut Aegitis uocatur, alijs Sauritis, a Magis Oculi sanguis, aut Chelidonium, Romanis Macia, Ethruscis Masytipos, Gallis Sapanā, Dacis Cerceraphron. Anagallis communis, a quibusdam Corchoron, alijs Halicacabō, alijs Zeliaurus, Magis Nycteritis, Aegyptijs Mecij, Romanis Aneciaton, Aphris Asirrisce. Duo eius genera, quæ tantum flore distant. Nam quæ cæruleo flore est, foemina dicitur: Mas, quæ phcenico. Frutices sunt parui, in terra iacentes. Folijs in quadrāgulo caule pusillis, subrotundis, ad Helxinæ folia accedentibus. Semine rotūdo. Vtraq; mitigandi uim habet. Inflammationem arcer. Adactos corpori aculeos extrahit. Nomas cohibet. Succus caput gargarizatu purgat. Et naribus infusus, dolo-rem dentium lenit, si in aduersam narem iniiciatur. Argema cum melle attico emendat. Retusæ oculorum aciei auxiliatur. Contra uiperarū morsus, iocineris et renum uitia, ex uino bibere prodest. Tradunt eam quæ cæruleum adit florem, prociduam sedem reprimere. Quæ uero

B iiij

σαρκοκόλλα
ἀρτεμώνη

B

ἀναγάλλισ
αἰρίτις αἰγίτις
σαυρίτις

C phoeniceum, illitu euocare.

Pli. li. 26. ca. 7.

B A R B A R I C O R O L L.

Frutice tenero Anagallides, non altiores Palmo nascuntur in hortis & aquis. Prior floret cerulea. Mirum quod feminam pecora vitant: aut si decepta similitudine (flore enim tatum distat) degustare, statim eam quoque (asyla, siue, ut alij codices scripsere, casyla uocatur, a nostris ferus oculus) in remedio quarunt. Præcipitur effossuris, ante solis ortum, priusque quicquid aliud loquantur iter salutare eam, tum sublatam exprimere, ita præcipuas esse vires. Anagallin Dioscorides Sauritin quoque dici perhibet. Sunt exemplaria in quibus Gauritis, non Sauritis legitur. Hippocrates Anagallin dicendo, utilem mordendis & assiccandis ulceribus Anagallidem uidetur intellexisse. Aetius Nycterida herbam ad oculorum albugines comprobat, pro Anagallide ut puto accipiendam reliquit, quandoquidem et Nycteritis a Dioscoride uocatur. Errant qui Passerinam uulgo dictam, florem candidum ferentem, Anagallida existimant. Quem admodum & qui Myosotin, idest, muris Auriculam pro Anagallide compictam præferunt. Anagallidem phoeniciam, a colore Paulus Aegineta Corallium quoque dici meminit. De quo & compositioni datum nomen, quod Diacorallin. Quamque passillus est hoc cognomine, sed in eum lapis Corallius, non hæc herba sumitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Non demirabitur aliquis, in humili & neglecta nunc ab omnibus herba, tam multas appellationes. Plærumque enim sit, ut ubi maior fortunæ & uirtutis gloria splendet, illic etiam numerosus nominum ambitus audiatur. Plinius ex tam multis quæ nunc in scriptore hoc numerantur, unum tantum retulit, Anagallida dicens aliquos Corchoron uocare: quæ uox antiquissimis græcis ad maledictum translata est, contra eos, qui in humili & indigna fortuna, maiores ea honores sibi quærent. Frequensque in græcis dictum est, κόρχος ἐν λαχνοῖς, quod est, Corchorus inter olera. Quoniam hæc necessarium, gratum, & utilem usum habent: ille uero miscet se quidem in horto oleribus, sed ob humilitatem suam sine gratia, aut maioris utilitatis spe. Theophrastus tamen libro. s. de plantarum historia, in prouerbum & maledictum transisse ob amaritudinem testatus est. Verba eius sunt. καὶ ἕτερα δὲ πλείω τούτων ἐν οἷς καὶ παροιμιασμένοι ἐσὶ διὰ πικρότητα κόρχος. τὸ φύλλον ἔχειν ἀκμώδεις. &c. Quod est. Et præter hæc plura alia, inter quæ & Corchorus est, ob amaritudinem in prouerbum translatus, folio Ocimi figura. Quod si hac ratione intelligendum id erit prouerbum, contra eos dicetur, qui paratam homini uoluptatem, & suauiore rei alicuius usum, tristi & amaro aliquo turbabunt. Fuerunt deinde, qui colorem floris Anagallidi adijcentes, Puniceam, & qui Aeridam, idest, æriam a ceruleo colore nominarent, genera eius potius distinguentes quam nouis appellationibus indicantes. Quemadmodum & Augitum a fulgore coloris & luce aeris, quam græci ἀγὺν uocant, alij pariter indicauerunt. Alacertis deinde notissimo insecto, quas græci σαῖρας dicunt, Sauritis appellata Anagallis fuisse credi potest: quoniam succo eius uiperarum moribus antiquitas mederetur, quæ lacertis quadamtenus similes sunt: uel quod frequens hoc insectum in aruis inter Anagallides inueniatur. Acceditque sententiæ huic testis Nicander in Theriacis suis, σαῖραν herbam appellans, contra uenenata utilem. Quam ob causam, mutata tatum nominis forma, hic Sauritum ab aliquibus appellari dixit. Non tamen ex Nicandro colligi, & pro comperto haberi potest, σαῖραν ne ille Anagallidem, an aliam in olerum genere herbam sic uocet. Nosque ad hanc rem coniectura magis quam ratione, aut aliorum autoritate usi sumus. Fecit præterea similitudo, ut Hirundinaria, & Alicacabus, alterius generis herbæ, sola appellatione in Anagallidum censum & nomenclaturam uenerint. Et hæc pro tam multis Anagallidum nominibus dicta satis sint. Cætera enim incognita nobis, alijs docenda relinquuntur. Restituimus huic capiti etiam quod in eo perierat, mederi scilicet Anagallides præterquam iocinorosis, curam subeuntibus aquis. Id enim in exscribendo relictum a librarijs fuerat, nec nisi in antiquissimis græcis & latinis seruabatur.

C De Hedera. C A P. C X C I X.

Hedera aliquibus Citharon, alijs Cissaron, alijs Chrysocarpus, alijs Poetica, alijs Corymbethra, alijs Cyssion, alijs Dionysia, alijs Ithytherion, alijs Perlis, alijs Cemos, alijs Asplenos, Romanis Syl-

ua mater, alijs Hedera, Gallis Suibites. Hedera differentias multas in specie sortitur, generalissimas autem treis. Nam quædam candida est. Altera nigra. Tertia Helix. Candida fructum fert candidum. Nigra nigrum, aut Croci æmulum, quam uulgus Dionysiam uocat. Helix fructum non gignit, sed tenues habet palmites, & folia parua, angulosa, & rubra. Hedera omnis acris est, & adstringens. Nervos tenet, Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in uino bis die potus. Ambustis cum cærato illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborum succus, cum irino unguento, melle aut nitro, naribus infunditur. Et contra ueteres capitis dolores, caput eo cum aceto & rosaceo perfundi utile est. Purulentis auribus, aut dolentibus cum oleo medetur. Nigræ Hederae succus, aut epoti corymbi corpus infirmant. Mentemque turbant largius sumpti. Acini quinque triti, calfactique in punico cortice cum rosaceo, si instillantur a contraria aure, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in uino decocta illi nuntur omnium ulcerum generi, etiam si cacœthe sint. Vitia cutis in facie, & ambusta sanant, uti antea diximus decocta. Mouent menses triti, & subditi corymbi. Iidem poti post purgationes fœminarum, drachmæ pondere, concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorum melle irrigatus, ac uulua inditus, menstrua & partus extrahit. Instillatus succus, putrida tædia narium, graueolentiamque emendat, & sanitati restituit. Lachryma Hederae Psilothrum est. Illitu pediculos enecat. Succus in aceto potus, contra phalangia prodest.

B A R B A R I C O R O L L.

Hedera frutes qdem uendicâ, sed arborum magnitudinē crescendo æquat. folia primo angulosa, processu rotundant. Multa ei gēa. Humi repit Chamæcissos; de qua in loco, Celsarum tria capita. Candidū. Nigrum. Et Helix, id est, Clauicula, siue Pampinus uocata. Candidū aliud fructu solo, aliud fructu & folio. Id qd fructu solo cander, aut crassiusculū, densum, globatumque habet eum, & Corymbias uocat. Athenis uero Acharnicon irriguū, aut minorem acinum, sparsioemque Racemū, & Silenition appellant. Simili modo in nigra, cui & suæ quædam differentia sunt, sed minus perspicua. Alicui em semen nigrū. Alij crocaceum, cuius coronis poetæ utant, folijs minus nigris: quā & Nysiam, & Bacchicā, & Dionysiam uocabāt, maximis inter nigras corymbis. Alij duo genera fecerunt a colore acinorū, Erythronon, & Chrysocarpion. Helix ab Hedera distat apertissimo discrimine. Primū folia huic angulata, concinna, exigua: Hederae simplicia, rotundioraque. Distat & longitudine internodiorū, præcipue tamē sterilitate: quoniam fructum non gignit. Quidā hoc ætatis utiū intelligunt, primoque esse Helicem, & Hedera senectute fieri: qd quidē falsum esse Theophrastus & Plinius contēdunt: cū quia foliū & germen Helicis ab Hedera quolibet annosæ folio plurimū differat: tum quia plures eius differentia noscant. Herbacea, seu uirens, quæ numerosissima est. Altera folio alto. Tertia uersicolore, quæ Thracia uocat. Herbacea duplex genus. In uno tenuiora folia, digestaque per ordinē, longiora densioraque: in altero diuersa oia in minus. In uersicolori quoque alia folio crebriore, tenuiore, ordinato; in altera incondito, nūc maiore, nūc minore, maculosoque. In candido gēa, alia plus, alia minus sunt candida. Crescit in longitudinē potissimū Herbacea. Nunc reuertor ad Hedera. Hedera ubi semetescere occupit, germē sublimē, rectūque agit. Radice numerosa, conorta, densa, crassa, lignosa; nec admodū profunda, pferim nigra. Et candidarū quæcūque asper rima imitissimaque est. Hæc & arbores amplexu & succu stragulat, tanta crassitudine, ut ipsa per

Theophr. lib. 6. cap. 2.
Pli. lib. 16. ca. 34.
lib. 24. cap. 10.

Lyrici dixerunt flexipedes
hederas, quid hæc & illæ
inapant. Hedera enim
sæpè arare diuinitas
et aqua Virgilium Eclo-
ga quarta uidere est.

B iij

D I O S C O R I D I S

C se arbor fiat. Signa eius, folia maxia & latissima, mamas, hoc est, germina subrigens, quæ sunt cæteris inflexæ. Racemi stantes atq; recti. Radicosa & robusta. Huic maxime uni brachia. Post ipsam Nigræ: sed propriū Albæ, q̄ inter media folia emittit brachia, qbus arbores cōplectit, & parietibus obrepit. Pluribus hæc locis succisa durat, atq; uiuit, & tondē initia radices habet, q̄ brachia, ob id flexipedē cognomēto apud poetas. In nigra & alba alijs dulcedo Acini: alijs tanta amaritudo, ut aues nō attingāt. Est & rigens Hedera, q̄ sine adminiculo stat sola oīm generū, ob id uocata Cisso a Theophrasto & Plinio, quasi Columellā in eo uocabulo significent. Sed summa diuisio ipsæ auctoribus, in marē, & fœminā, q̄ altera foliū durius, pinguius, maius habet, & florem ad purpurā accedentē: altera non habeat. Vtriq; tñ flos syluestri rosæ similis, sed minor & inidoneus. Quæ descriptio uidet̄ recetioribus quibusdā non Hedera, sed Cisso cōueniens, cui & sexus & flos punici tribuit̄. Sed Theophrastū sequutus est Plinius li. stirpiū sexto, hæc ipsa non de Cisso, sed de Hedera prodentē. Hedera Theophrasti ætate in Asia nasci uō poterat: nec in India, nisi mōte Mero, unde ortus est Bacchus. Frustra & Harpalū laborasse oīmodo tradūt, ut sereret eam in Medis. Inimica arbor satis oībus, sepulchraq; ac muros rīpens. Serpentū frigori gratissima. Vfos in funes, et armamēta nauū Hedera ueteres, auctor est Athenæus, quā e Rhodano petebāt, ut Canabim. Catonis experimentū, uolenti scire, aqua in uinū addita sit, nec ne: ut uasculū e materia huius faciat, uinū quod erit dilutū, transluet, aqua manebit, nec em continet uinū inquit uas Hederaceum. Quod poculi genus græci Cissybion, ab Hedera uidelicet appellant, q̄q̄ pro quocūq; ligneo id accipitur. In quo significatu & Cymbiū, & Cypellū quandoq; sit. Alij uetustos calices Cissybia intelligunt, propterea q̄ in Didymeī Iouis dedicatione folijs hederaceis libare moris fuisset. Cymbia uero, quæ anis careant, oblonga & angusta, nauigij spēm præbentia. De Hedera Cilicia, quæ tamē Hedera non est, in Smilace nachea quarto uolumine monstrabit̄. Cisson, hoc est, Hedera pusionē Liberi patris fuisse Græcia confinxit, in noīs sui fructū conuersum, dū minister cū eo deo saliens, terræ allisus perijt. Athenienses Citron ipsum Bacchū uocant, & apud se Acharnis uico natā Hedera primo uolunt, ut inq̄ Pausanias. Syluestre Hedera cerui phalangio pculsi mandūt, & liberant̄. Aelianus auctor.

E X M. V E R G. C O M M.

D N Vmerantur a Plinio uiginti Hederarū genera, folijs, corymbis, uiticulis, altitudine, humilitateq; & usu diuersa, oīa a Theophrasto diuersis locis accepta. Copiosiorq; ille generū numerus, quē in ore oīm fuisse quondā uerisimile est, occasione ut nos credimus scriptorē hunc excubantibus attulit, ut a principio statim Hederarū historie rā multis, tamq; diuersis appellationibus, non una noīaretur planta, sed unius plura numerarentur genera.

De Chelidonia.

C A P. CC.

Χηλιδονία
παριονία
ηπαταιά

C Helidoniā magnam, nonnulli Pæoniā uocāt, alijs Crataeam, alijs Aubion, alijs Glauciā, quidam Philomedion, alijs Othonon, Romani Fabium, Galli Thonan, Aegyptij Nothoth, Daci Crustana. Chelidonia maior, caule est cubitali, aut altiore, surculoso. Folijs Ranunculi, multis, mollioribus tamē, & colore cæsijs, flore uiolæ albæ, secundū singula folia prodeunte. In ea succus croci, mordax, acris, & aliquātulum subamarus, grauiter olens. Radix superne singularis in multa crocea capillamenta fibratur. Siliqua ceu corniculati Papaueris, tenuis, longa, in qua semen Papauere maius recluditur. Succus in æreo uase, cū melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos Radix cum aniso, & uino albo pota, medetur regio morbo, & ulceribus quæ serpunt. Imposita cum uino, aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi uidetur uendicasse, q̄ aduentu hirundinum exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant hirundines matres excæcatis pullis adferentes hærbam uisum restituere.

EX M. VERG. COMM.

Chelidonium, siue Chelidonia, siue Chelidonea, hoc est, Harundinaria maior, fruticoso caule, folio Pastinacæ erraticæ ampliore, ipsa altitudine duum cubitorum, flore luteo. Collyria quoq; quibus ex hac utuntur, Chelidonia appellantur.

EX M. VERG. COMM.

Fecit Hirundo, quā Græci Chelidona uocāt, notissima auis, notissima omnibus etiam nūc herbæ nomen. Vtq; id pro cōperto est, sic contra non satis certū, quid sibi & aui tam cōmune sit: quidue inuicem agentes, patientesue cōmunicato nomine inter homines censeantur.

De Chelidonia minore. CAP. CCI.

Chelidonia minor, quam Tyripon syluestre aliqui nuncuparūt, hærubula est stolonibus constans, sine caule, folijs Hederæ, multo rotundioribus, & minoribus, teneris, & subpinguibus. Radices habet complures pusillas, in granorū tritici modum acervatim congestas. Quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas nascitur. Vis ei acris & Fremij modo summā cutem exulcerat. Psoras, & scabros ungues eximit. Succus radicibus expressus, ad purgandum caput, naribus infunditur. Decoctū eius cum melle gargarizatum ualide caput inanit: & omnia pectoris uitia extrahit.

B A R B A R I C O R O L L.

Chelidonia minor, folia Hederæ habet, minus candida.

EX M. VERG. COMM.

Emendauimus ex antiquissimorū græcorum latinorumq; codicum fide, in minore Hirundinaria quod male in impressis uulgatioribusq; πύριον legebatur: diximusq; agreste triticum, id est, πυρίον uocari minorem hanc Hirundinariam. Nec tantū antiquitatis fide & testimonio id fecimus, q̄ ex historia scriptoris huius, qui habere eam ait inter cetera, radices tritici modo coaceruatas. Satisq; pro ea dicta hæc sint.

De Othonna.

CAP. CCII.

Othonna aliqui maioris Chelidoniæ succum esse aiunt. Alij succum floribus corniculati Papaueris expressum. Alij permistos cæruleæ Anagallidis, Hyoscyami, & Papaueris succos esse contendūt. Alij Troglodyticæ hærbe succū, quæ Othonna uocatur: nasciq; eam in eo Arabia tractu, qui ad Aegyptū spectat. Othonna similis Erucae, perforatis crebro folijs, & ueluti a tinea derosis, squallore oblitis, paucis. Flore Croci, latifolio. Quare quidā Fremij speciem esse putauerūt. Extractus succus oculorū medicamentis adiicitur, ubi expurgare est opus. Mordet enim, & abstergit omnē caliginem, quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quendā ex hærba emanare, qui elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affirmāt, lapidem esse Aegyptiū, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, candido colore, gustu cum feruore quodam & adstrictione mordaci.

B A R B A R I C O R O L L.

Othonna herba nascitur in Syria, Plinio secundo. Paulus Othonnam uocando in compositionibus plerisq; maius Chelidonium interpretatus est. Sed aliud tamen genus est Othonna, quod hic describitur.

EX M. VERG. COMM.

Quis audeat ætate hac nostra, cui præteritorū seculorum negligentia & temporū iniurijs notissima quæq; adeo perierūt, ut quæ in hortis etiā quodidie per se, aut humano o-

A

Theophr. li. bro. . cap. 14.
Pli. li. 27. ca. 8.

χελιδόνιον το
μικρόν
τύριον ἀγρίον

B

Othonna

Pli. li. 27. ca. 12.

C pere nascunt, ex antiquis appellationibus signari & ostendi digito nequeant, qualis, & quæ quidam Othonna fuerit dicere: Scriptori huic, & post eum cunctis alijs non satis cognita, & ex aliorum fama historiaque tantum tradita: quodque magis miremur, omnes in diuersis penitus generibus numerata, alijs succum, & hunc multarum simul & per se herbarum, alijs herbam cuius longior sit historia, alijs lapidem in Thebaide Aegypti nascentem eam indicantibus. Quo fit, ut propter ea quæ a posterioribus tradita de ea fuerint, nihil nos dicere, & in tanta tot scriptorum unius rei uarietate censere ualeamus. Plinius lib. 27. cap. 12. herbam tantum credidit. Verba eius sunt. Othonne in Syria nascitur, similis Erucae, perforatis crebro folijs, flore croci: quare quidam Anemonem uocauerunt. Succus eius oculorum medicamentis conuenit. Mordet enim leniter, & calefacit, adstringitque siccando. Purgat cicatrices, & nubeculas, & quicquid obstat. Quidam tradunt lauari, atque ita siccatam digerit in passillos. Quæ omnia paulo minus, quam ipsi dem uerbis ex hoc scriptore accepta sunt. Videturque Plinius, relictis de Othonna opinionibus alijs omnibus, in herbarum genere eam pro conperto constituisse. Paulus Aegineta de simplicibus sexto uolumine agens, non herbam hoc nomine, sed herbarum succum in Arabia ad Aegyptum nascentis appellauit. Idem eodem loco retulit, & eodem quo hic scriptor modo dicere aliquis lapidem Aegyptium esse Othonnam. Hic ipse propterea in confectioibus medicamentorum quorundam, Othonnam interpretatus est, maioris Hirundinarie succum. Nos illud iam pridem cogitauimus, & in eam partem inclinamus, ut credamus sui generis herbam omnino esse Othonnam: quæ uero alia de ea tradunt, a uirum & potestatis similitudine ab alijs credita, dictaque fuisse: & ex eorum ratione, quæ graeci ἀντικαλλόμενα, id est, nostræ ætatis medici uocant, quid pro quo, ad Othonnam translata fuisse. Quod autem dicimus, huiusmodi est. Potest Othonna oculis mederi: atque hic χρυσόθαι ὕος τὰ ὀφθαλμικά ὅπως ἀποκαθαίρειν, quod est, exprimi ad oculorum medicinam ex ea succum, ubi purgandum extendunt aliquid sit. Quod totum pariter potest Hirundinarie succus, de qua hic ait, ἀρμόζειν πρὸς ἡσυχασίαν: quod est, conferre oculorum claritati. Causaque hæc, ut nos credimus fuit, ut Othonna Hirundinarie succus esse crederetur: non quia idem illi esset, sed quia idem posset, nec aliunde quam ex eadem hac parte Glaucium esse Othonnam, pariter tradidisse aliquis. Siquidem & Glaucij (ut hic in eo dicit) χρυσόθαι ὕος τὰ ὀφθαλμικά, quod est, usum Glaucij ad oculorum medicinam esse: quibus cornutum Papauer etiam, Anagallis, Apollinarisque herba pariter utiles (ut ex earum historia medicinarum legentibus patebit, nos enim breuitatis causa suis locis dicenda iterum, nunc relinquimus) succo suo in Othonnae appellationem uenerunt. Ex his facilis coniectura est eius, quod paulo ante diximus, quia pro Othonna, quam non facile omnibus locis inuenisse erat, in Arabia & Trogloditis nascentem, a medicis alia illa imperari soleret, ideo credidisse multos sui generis herbam aliarum multarum succum fuisse: qui legitime deficientem eam, in oculorum uitium, ob æquales uires, in usu esset. Nec alia ratione Aegyptius lapis Othonna etiam creditus est: quoniam ex eo, scilicet collyria ad eadem oculorum uitia conficerentur. Eum lapidem Barbarus æris colore, quasi χαλκοχρῶν, secutus quorundam codicum fidem dixit. Nos uetustiorum, meliorumque lectionem λευκόχρῶν, id est, candido colore.

μυρὸς ὄτη

M De Auricula muris. **C A P. C C I I I I.**
 Myosota, alij Myoton, alij Anthilion, alij Alsinen, nonnulli Myorthochon, alij Myrtosplenon, Latini muris Auriculam uocant, Aphiri Labatholabat. Nomen ideo accepit, quia musculorum aures folijs imitetur. Lucos, & sabulosa loca amat, ideo Alfine dicta est. Ea Helxinæ similis, sed humilior, ac folijs minor. Vim refrigeratoriæ am habet. Oculorum inflammationibus conuenienter ex polenta illinitur. Succus eius aurium doloribus instillatur. In totum eadem potest quæ Helxinæ.

Pli. li. 27. ca. 12.

B A R B A R I C O R O L L.
 Myosotis Alfine cognominata, quasi nemoralis. Nascitur & in hortis, & maxime in parietibus. Incipit a media hyeme. Arescit æstate media, cum prorepit auribus musculorum expressis. De hac sub uocabulo Alfine repetuntur omnia hæc libro quarto. propterea nihil ibi diximus. Dicuntur Myosotides, & Myosotæ a Galeno.

E X M. V E R G. C O M M.
 Satis cur Myosota, & Alfine herba hæc quondam dicta fuerit, hic scriptor ostendit: & qui

græcas nouerunt literas, auditis tantū uocibus illis, idem intelligent. Plinius etiā libro. 27. capite quarto eam describens ait. Cum prorepat, muscutorū aures folijs imitatur. Cuius animallis uox alijs appellationibus coniuncta, eandem causam habet. Siquidem Myotoni, muris aurem pariter significat: & Myotosplenon, ex muris aure & aspleno herba composita uox est: quæ ab altera muris auricula ad priorem hanc trāslata fuit. Siquidem hic in ea quæ paulo post sequitur Scolopendrio, quæ eadem Aspleno est, similem esse dicit. Est illud in appellationibus his etiā animaduertendum, de eadem herba doceri hoc loco sub titulo Myosora, iterumq; in quarto sub titulo Alfine: esseq; eandem utrobique historiam eius & medicinam: ideoq; cum semel hic de ea actum fuerit, non esse de ea iterum agendum. Cum eo peruenerimus, iterum legentes idem monebimus. Illud etiā significasse uolumus: quæ plerumq; inuenitur, & quam nos aliquando uidimus Muris auriculam, altera, & quæ statim sequitur est.

¶ De altera Auricula muris. CAP. CCIII.

Muris Auricula quā Myosotida uocant, hærba est caulibus pluribus ab una radice, aliquatenus rubetibus, concauis ab imo. Folijs angustis, oblongis, dorso acuto, nigricantibus, per interualla assidue geminatis, atq; in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis, ex alarum sinu prodeuntibus, flore cæruleo. Radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. In summa, Scolopendrio similis, sed breuior, minor. Radix illita ægilopia sanat. Sunt qui Helixinen, muris Auriculam uocent.

BARBARI COROLL.
Myosotis hæc quæ posterior describitur, iustius Myosotis tantū dici solet q̄ proxima, quæ Alfine potius, q̄ Myosotis appellata sit ueteribus.

EX M. VERG. COMM.
VNum tantū nos uidimus Muris auriculæ genus, alterum scilicet hoc, & secundo loco a Dioscoride traditum: respondentq; sensui omnes eius notæ: prioris nullum inuenimus oculatum testem. Antiquissimi etiā latini Dioscoridis codices, posteriorem hanc solam ostendunt. Quinetiam Plinij ætate, si quis uerba eius sagacius odoretur, non satis certa res erat. Ait enim post descriptam Alfinem, Sed aliam docebitur quæ iustius Myosotis uocetur. Paulus Aegineta postremo unum tantū genus eius in sexto pariter agnoscit. In omnibus tñ græcis duo capita hæc legunt, quo uertimus modo ubiq; scripta: eaq; ob causam qualia erant latinis reddita.

¶ De Glasto satiuo. CAP. CCV.

ISatis satiuæ, aliquibus Augion, Magis Arusion, Romanis Gluta, laut Glastum dicitur. Glastum quo infectores lanarum unūtur, foliū habet Plantagini simile, uerū pinguius, nigriusq;. Cuius caulis duum cubitorum altitudinem excedit. Illita folia, tumores omnes discutiunt, Cruenta uulnera glutinant. Sanguinis profluuiā sistunt. Ignem sacrum, phagedenas, putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanant.

BARBARI COROLL.
Isatim Lactucis syluestribus annuerant. Duo ei genera Plinio redduntur, itemq; Dioscoridi. Nascens in syluis. Alterū infectoribus dicatum: quod & satiuum Dioscoridi, Galenoq; uidetur. Plinius syluaticum uocari tradit, simile Lapathio syluestri folijs, nisi plura essent & nigriora, quam uulguis modo Gualdum, ueteres Glasdum, siue Glastum lingua gallica dicebant. Eo Britannii mares & foeminae oblinebant se. Mares, ut cæruleo colore metum hostibus afferrent. Foeminae, ut in quibusdam sacris incederent nudæ, colorem Aethiopum imitantes. Isatim Dioscorides Egnen quoq; uocari prodit. Credo hanc ab Hippocrate Icnen, siue Ignen dici. Dioscorides Isatin latine dici Rutam, Apuleius Alutam scribere. Falsum utrunq; suspicor, & Lutam, siue Luteam uocari credo. De Lutea herba Plinius & Victruuius inter colores tantum loquuntur. Plinius, Chrysocolla inquit illa quoq; herba tingitur, quam Luteam appellant. Idem paulo post: Luteam Chrysocollam ab herba Lutea dictam putant, quam ipsam cæ-

A

B

isatim
uulgi

Pli. li. 28. ca. 7.

D I O S C O R I D I S

Ceruleo sublitā pro Chryfocolla inducūt. Viētruius, qui non possunt inquit Chryfocolla propter raritatem uti herba, quæ Luteum appellatur, cæruleum inficiunt: & utunt viridissimo colore, hæc autem inquit, Infectiua appellatur.

EX M. VERG. COMM.

Nihil nunc Isatide notius, Maximūq; sibi uestigal ex ea fecerunt, qui Tiphernates agros ad Tyberim, omnemq; regionis eius tractū, neglecta omni alia annona, hac tantū herba conserūt. Tantus nūc tinctis colore eius lanis honor est. Guadū nostra ætas appellat. Apuleius in commentariolo illo, quod de aliquot herbis reliquit, Alutam ab Italis uocari ait. Quæ uox q̄ integra in eo scriptore sit, non satis cognitū nobis est: quoniā nihil herba huic cū corio. Quæcūq; autē ea futura sit, eam credimus esse quā hic pariter uitiosa uoce Rutam a Romanis uocari ait, cōmune nihil, aut simile illi habentē. Non tamen ab re est, ex Ruta, & Aluta uitiosis uocibus, neq; Isatidi conuenientibus tertiā aliquam suspicari, Luthem, scilicet quā Romani aliquot seriores inter colores retulerūt, Viētruiusq; præsertim, ad extremū septimū uolumen dicens, Qui non possint propter caritatē, Chryfocolla uti herba, quā Luthem appellant, cæruleū inficere. Barbari quondā tingendis corporibus suis tam uiri q̄ foeminae ea utentes, Glastum uocabant. Eratq; in tingendo præcipuus eius usus. Antiquiores græci, latinūq; inter syluestres Lactucas eam numerauerūt. Plinius longissime de ea egit. 20. uolumine capite septimo.

De syluestri Glasto.

CAP. CCVI.

ἄγρια ἰσάτις

Syluestre Glastum satiuo simile est. Folia fert maiora, lactucacis proxima, caules prætenues, multifidos, rubicantes. In quorum cacumine folliculi dependent, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen. Flore tenui, luteo. Eadem quæ & supradicta præstat. Potu & illitu lienosis auxiliatur. Sed sciendum est, ne tradita errorem

Dariant, satiuum Glastum, luteum florem, tenuiores, multifidosq; ramulos proferre: in cacumine autem folliculos linguæ speciem representantes, in quibus semen continetur, Melanthio simile, caulemque supra binum cubitorum altitudinem attolli. Syluestre uero nigriora ferre folia, caulem minorem, sed crassiorē. Florem purpureum, aut cæruleum, fructum cruciformem, asperum, in quo semen, folijs exilibus quinquepartito diuisum.

DE BARBARI COROLL.

DE hac Isati dictum est in satiuo proxima: qui & Radiculā, quæ sit Struthion, Isatin uocari putent, ducunt mendofo loco: quē nos in Plinio correximus. 19. naturalis historiae libro.

EX M. VERG. COMM.

Abundabāt in syluestri Isatide multa, quæ ab eo quo nos desijimus loco in alijs legunt: eāq; ob eam curtū, minusq; omni ea parte nos fecimus hoc caput. Nec sine rōne, ut credimus: quādo in antiquissimis græcis, q̄s licuit uidere, nulla ea est. Neq; is quē nos habemus, longissimē antiquitatis latinus Dioscorides id habet. Quodq; pluris facere nos decet, q̄ absurdū uidet, post utriusq; Isatidis decreta, hunc ipsum scriptorē, quæ a se facta fuerant dānare, legētes q; his uerbis monere. Cæterū scire oportet, falsas esse descriptiones has. &c. Cum liceret quæ male incepta a se fuissent, anteq̄ ederent, in melius, & quod uerū esset mutare. Accreuit ea pars scriptori huic ab aliquo, qui aut certius de Isatide omnia nouisset, aut nouisse se crederet. Multa huic scriptori hac rōne adscripta a medicis, a librarijs deinde illi cōmixta, & inserta mala insinione, in unū corpus coaluerunt. Quæ nisi diligentius & cautius excutiantur, & purgent, multis locis, usum eius & gratiā dehonēstabunt. Est illud etiā hoc loco repetendū, quod non multo antea in Arabide dictum a nobis est, abundare, scilicet hoc loco, quod Isatidem statim sequitur, Arabidis caput. De ea enī quæcūq; ea sit, q̄d oportebat, dictū hoc ipso uolumine fuit.

De Telephio.

CAP. CCVII.

τηλεφίον
αἰσιῶν ἄγριον
ἀνδροχύν ἄγρια

Telephium aliqui syluestre Semperuium, alijs Portulacam syluestrem appellāt, Romani Illecebram, Aegyptij Anoth, Aphri

Tirtopurin. Hærbæ Portulacæ similis & caule & folijs, habens geminas alas, singulis foliorum geniculis inhaerentes: a quibus rami seni septeni-ue fruticant, a radice referti cæruleis folijs, crassis, lentis, carnosis. Flore luteo, aut candido. Nascitur in cultis, & maxime inter uites. Tempore uerno folia senis horis illita, albam uutiliginem sanant. Sed postea hordeacea farina illini debet. Perunctam etiam in sole uutiliginem tollunt. Sed ubi inaruerunt, absterguntur.

BARBARI COROLL.

Telephion uagum et cōmune plusculis herbis nomen. Dioscorides senos septenosq; ab radice ramos ei tribuit, Plinius etiam octonos. Differre hanc merito existimant ab alia quam diximus hoc libro Telephion, & Andrachnen agriam uocari: quandoquidem tam Dioscorides q̃ Plinius medicinas earum, atq; notas seorsum utriusq; reddunt, ceu duorum generum. Telephion hic descriptam, sunt qui eam putent esse, quam Romanæ officinæ Pulmonariam uocāt. Vegetius in Mulomedicina Pulmonariam, siue Pulmonatiam appellat: quam & Consiliginē dici tradit, bubulcis & mulomedicis, hoc est, ueterinarijs præclare cognitam.

EX M. VERG. COMM.

Telephion. 27. uolumine capite ultimo breuius certiusq; scriptore hoc Plinius descripsit. Nihil tamen non acceptū ab eo est. Quo fit, ut suspicemur uitū aliquod in historia Diosc. esse. Sunt em̃ pleraq; parum certa, nec sequaci uerborū serie tractata. Nos tñ nihil mutauimus: nomenusq; tm̃ p̃ter sex horas, q̃ tēporis spacio hic iubet leucem Telephij folijs illini, addere Pliniū ternis mensibus id faciendum esse: quod in scriptore hoc desiderari posse uidetur. Manifestam tamen causam id non habet, longiusq; id tempus merito alicui pro rei necessitate uideatur.

The. li. 9, ca. 19
Pli. li. 27, ca. 13

¶ Finis LIB. Secundi.

PEDACII

B

DIOSCORIDIS

De Medicinali materia. LIB. Tertius.

IO. RVELLIO interprete.



SUPERIORIBVS charissime Ari cōmentarijs, tradidimus de aromatibus, unguentis, oleis, arboribus, & prodeuntibus ex eis fructibus & lachrymis. Item de animalibus, frumentis, oleribus, & hærbis acrimonia præditis. In hoc autem Tertio de radicibus, succis, seminibus, hærbis quæ & uernacula consuetudine usurpantur, quæq; pluribus scatent remedijs, differemus.

¶ De Agarico. CAP. I.

Agaricum radix fertur Laserpitio similis, sed facie summa soluti- or & fungosa tota. Duo eius genera. Fœmina rectis uenarum discursibus constat. Mas rotundus est, & undiq; compactior. Vtrique gustus in initio dulcis, mox in amaritudinē transit Sarmaticæ in Aqu

D I O S C O R I D I S

C folia prouenit. Sunt qui radicem esse Plantæ affirmant. Alij ut fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine. Gignitur in Galatia Asiæ contermina, & Cilicia in cedris. Sed friabile & infirmum. Ad stringendi, calfaciendiq; naturam habet. Contra tormina, & crudirates, rupta, præcipationesq; efficax. Datur duobus obolis in uino mulso, febrim non sentientibus. Febriculosis uero in aqua mulsa. Arquatis quoque, suspiriosis, iocineris, renumq; uitio laborantibus, dysentericis. Item si urina ægre reddatur, si uulua strangulatus urgeat, si pallor membra decoloret, drachma una dari solet. Si tabes infestat, ex passo. Si lien negocium exhibet, ex aceto mulso. Si dissolutio stomachi est, ita ut cibi tenax non sit, manditur, & sine ulla humoris sorbitione deuoratur. Simili modo acide ructantibus propinatur. Sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum & articulorum dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur. Menses ciet. Fœminis, quas inflatio uulua uexat, utiliter æquali modo datur. Rigores soluit, datum ante februm significationes. Alium purgat drachma una, aut altera, si cum aqua mulsa bibatur. Venenorum antidotum est, drachmæ instar, cum diluta portione sumptum. Si serpentes ictu uibrarunt, morsumq; subfrixerunt, tribus obolis ex uino potum, mire auxiliatur. In summa, internis omnibus uitij conuenit, p uiribus et ætate datū nunc ex aqua, nunc ex uino, ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

HERMOLAI BARBARI

Patricij Veneti, & Aquileiensi Patriarchæ Collegiariorum LIB. Tertius.



Pli. lib. 25, ca. 9

AGARICVM in arboribus nascitur, fungi similitudine circa Bosphorū, colore candido. Masculus amarior. Galliarum quoq; glandifera maxima arbores Agaricum ferunt. Est autem (ut dixi) fungus odoratus, in fumis arboribus nascens, noctibus relucens, & candidus. Ideoq; in tenebris decerpitur. Dioscorides Agaricum ueneni uim habere, sed id quod nigrum est affirmat: & regione Sarmatarum, quæ ἑρπία, hoc est, syluestris dicitur nasci. Quidam codices non Agriam, sed Agariam habent. Vtrumq; tueri possumus. Primum ex Plinio, Regio inquit Sarmatiæ syluestris Hyleum mare, quo alluitur, cognominauit. Alterū ex Ptolomæo, qui Agarum & urbem, & amnem in Sarmatia uocari tradit. Appianus Alexandrinus, Agaros scythicam gentem contra serpentium morsus adhiberi solitam refert, propter quod Mithridates eos apud se habuerit.

De Rhapsontico.

CAP. II.

82 820v

RHa aliqui Rheum, aliqui Rhiā, Latini Rhapsonticum uocant. Prouenit in ijs quæ supra Bosphorū sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, Centaurio magno similis, sed minor & rufior, fungosa, aliquantum leuis, sine odore. Optimum habetur quod teredines non sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lentescat, manducatumq; colorem reddat pallidū, aut ad crocū inclinantē. Id eptū facit ad inflatiōes, stomachi imbecillitatē, & omne genus dolorū, ad conulsa, lienosos, hepaticos, tormina, ad renū, uesicæ, & pectoris uitia, aduersus intenta præcordia, & uulua mala, coxendicum dolores, sanguinis

excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & coeliacorum affectus, contra februm circuitus, & uenenatorum morsus. Datur in singulis ualitudinibus eodem quo Agaricum pondere, & cum eisdem liquoribus: si febris careant, in mulso: si aliter, ex aqua mulsa: si tabe experiuntur, ex passo: si lienis exercet, in aceto mulso. Si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione ulla deuoratur. Liuentia, lichenasque tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omnes ueteres ex aqua oblitum dissipat. Summa eius uis adstringens, cum aliquanto calore.

BARBARI COROLL.

Rhaponticum, radicem Ponticam a Cornelio uocari censeo, a Galeno & Paulo Rheon, a Plinio Rhacoma, nisi deprauatus (quod fere suspicor) locus sit, uulgo Rheu. Actius Rhaon. Plinius Costo nigro simile demonstrat, in cetera cum Dioscoride conueniens. Habetur & Rha Barbarum, multo praestantius, efficaciusque Pontico, sed ante Paulum Aeginetam fere medicis incognitum. Eius mentionem auctor is, in compositione quadam ad podagras habuit.

EX M. VERG. COMM.

Quis supra Pontum & Cymerium Bosphorum ad Panticapeum regionis eius metropolim uicinus Tanais, in Meotidem paludem influit, maioris illius fluminis luce & nomine, non satis in Geographia clarius quondam Rha dictus fluuius, Ponticae radici huic nomen dedit, & in ripis suis nascentem, ueluti adoptione quadam in sui nominis honorem admisit. Nec alia nominis eius, quam a natali solo causa & ratio est, ab Ammiano Marcellino historiae suae. volumine his uerbis tradita. Tanais, qui inter Caucasas oriens rupes, per sinuosos labitur circumflexus, Asiamque ab Europa determinans, in stagnis Meoticis delitescit. Huic Rha uicinus est amnis. In cuius supercilijs uegetabilis quaedam eiusdem nominis gignitur radix, ad multiplices medelarum usus proficiens. Quod nouisse non parum hijs fuerit, qui sollicitis animis diu fuerunt, & adhuc sunt, Ponticae ne huic radici eadem, an alia sit quam nostra aetas in quotidiano medicinae usu Barbaram appellat, facti enim dimidium, ut poeta cecinit, qui modo caput habet. Auditis siquidem Ponticae huius radicis natalibus, non difficile erit, diligenti per mercatores qui ad nos Barbaram illam afferunt, a uenditoribus facta perconatione, nouisse, an quae nunc Barbara dicitur, Ponticae eadem sit: et an his quibus locis nasci eam Marcellinus ait, an alibi nascatur. Nobis pro comperto haecenus nihil est, & si diligentiores in quaerenda tota hac re fuerimus. Si enim quae nunc ad nos Barbara affertur, aliud quam Rha fluminis supra Pontum & Cymerium Bosphorum ripas natale solum habebit, radices duas eodem nomine, sed diuerso patriae & gentis cognomine tunc esse constituendum erit. Sin contra, ex quibus Amianus Marcellinus locis tradidit ad nos afferri, unum tantum radicis huius faciendum erit genus, & in eo ex diuersis notis, non eadem bonitas. In quam partem inclinat animus nobis. Quo autem maxime inter se differunt, odor est: qui in Barbara uehementissimus, in Pontica nullus, si huic scriptori credendum est, sentitur. Nos certe scimus, sine odore uisam aliquando radicem quae Barbara uideretur, & crederetur, non tamen esset, ideoque a medicis in usu damnatam. Quocumque autem modo id fiat, non uidetur hic scriptor, siue alia penitus, siue bonitate a Pontica diuersa sit, Barbaram cognouisse. Nunquam enim *ῥυπον*, id est, sine odore eam dixisset. Ceterae in hoc & in alijs scriptoribus Ponticae radicis appellationes, ex eodem principio, primaque illa Rha fluminis appellatione fluxerunt, ideoque a nobis & alijs relinquenda. Relinquenda & quam Plinius dixit Rhecomam, sine ratione aliqua, nunc in eo scriptore & incognitam penitus.

De Gentiana. CAP. III.

Gentianam aliqui Centauriam radicem, alij Aloen Gallicam, alij Narcem, alij Chironion, Dardani Aloitin, Romani Gentianam, uel Cicendiam, alij Ciminalē uocant. Huius inuentio prima assignatur Gentidi Illyriorum regi, a quo cognomen habuit. Folijs proxime radicem, Iugladi, Plantaginiue similibus, subrubris, a medio caule, praesertim iuxta cacumē paulum dissectis, caule cauo, & inani, digiti crassitudine, geni

γλυτικὴν
καὶ τὸν ῥυπον

D I O S C O R I D I S

Culato, & ex interuallis maioribus foliato, binū saepe cubitorū. Semine in calycibus lato, leui, paleaceo, satis ad Sphōdili semē accedente. Radice longæ Aristolochiæ, crassâ, amara. Nascitur in sublimibus montium iugis, umbrosis locis, aquosisq;. Vis radicis excelsatoria, & adstringens. Contra morsus serpentium, duabus drachmis cum pipere, ruta, & uino pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deuolutis, ruptis, & conuulsis prodest. Hepaticis & stomachicis, pota cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita, partus eiicit. Imposita ut lycium, uulneraria est, & ulcerum cuniculatim depascentiū medela. Succus præcipue eodem effectu prodest. Oculis inflammatione laborantibus illinitur. Pro meconio collyrii acribus imiscetur. Radix utiliginem absterget. Succi extrahendi ratio hæc est. Con- tusa radix quinq; diebus aqua maceratur. Postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices. Et ubi refrixit aqua, lintheo excolatur, Mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat. Ficiliq; reconditur.

B A R B A R I C O R O L L

Pl. li. 27. ca. 7.

Gentianam ubiq; nasci, sed copiosissimam sub Alpinis montibus in Illyrio, præstantissi- mam affirmant, folio fraxini, magnitudine lactuæ, caule tenero, trium aliquando cubitorum radice lenta, subnigra, sine odore, aquosa.

E X M. V E R G. C O M M.

DNota omnibus nunc etiam Gentiana est. Eam Centaurio similem Centauriam radicem ali- qui nominauerunt, & ex eo Narcem: quoniam Narce Centaurium etiam dicatur. Fuerunt qui Aloem Gallicam, nulla foliorum, sed radicis similitudine aliqua, quam utrūq; genus recta sub terram agit. Chironia a centauro Chirone dicta itidem est, quoniam et Centaurium ab eodem Chironia pariter nominetur. Credimus præterea, quoniam Aloe diceretur Gentiana, a Dar- danis Aloem pariter nominatam fuisse. Suspiciamus tandem in extremo capite uitium esse, il- lic scilicet ubi de radicis coctura agitur, quam coqui hic iubet usq; dum radix illa superfuerit & e- mergat. Qui sensus rei non satis responderet. Neq; enim ponderosæ radices, quanta uoluerit ali- quis coctura coctæ per se emergent. Potuit quidem sic intellexisse, tamdiu coquendam Gentia- næ radicem, donec decrecente paulatim aqua desinat radix sub ea esse, eaq; ratione superfuerit. Verum hic nunq; cocturæ alicuius spacium sic docuit. Præterea antiquissimi latini omnes pro eo habent, donec uirtutem ex se dimiserit: manifesto argumento, aliam fuisse quondam eius lo- ci lectionem. Potest tamen ut diximus, defendi res: ideoq; nos cōmunem aliorum omnium le- ctionem secuti sumus, & nihilominus quod obseruatum etiam a nobis fuerat, alijs significau- mus. Non sunt etiam de Gentianæ natalibus Barbaro, & nobis eadem omnia. Ille in altissimis montium crepidinibus nasci eam, nos in altissimis montium uerticibus diximus. Dioscorides in ἀκροτάτοις ἀκρωρίαις ait: quæ uoces nihil aliud q̃ altissimos uertices significat. Siquidē mon- tes omnes a grecis trisariam diuiduntur: τὸς τέρμας, quod imas partes & radices significat, τὰ ἀκρωρία, idest, montium cacumina, & τὸς ἀπόρτιας, qua uoce descendencia iam montium late- ra indicantur. Aitq; hic ἀκρωρία, & addidit ἀκροτάτοις, idest, uerticibus altissimis. Cur autē ille crepidines uerterit, quæ fundamenta maioris alicuius molis sunt, non satis uideo.

De Aristolochia rotunda. CAP. III.

Aristolochia
græcè
quare ita di-
catur.
Germ: ostentia.

Aristolochia rotunda nomen ex eo sibi adoptauit, q̃ existimetur optime puerperis opitulari. Tria eius g̃na traduntur. Vna quæ foemina uocatur, folijs hederaceis, præstā- ti odore, cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab una radice germinibus, prælongisq; palmitibus, flore cādido tanq; pileolo, rubro, grauiter olente.

BARBARI COROLL.

Aristolochia color ater, folium Alfinæ, ut Theophrastus inquit, rotundius. Nascitur in montibus præcipua. Genus quadruplex in ea latini seruant. Vñ Rotundæ, quam & Pheuxiæteron uocabant aliqui, folijs inter maluam & hederam nigrioribus, pinguioribusq;: qua cōtusa cum calce, in mari sparfa, pisces aduolant cupiditate mira, ut ait Plinius, uidisse id testatus. Continuūq; exanimati fluitant: ob id piscatores, inqt, Campaniæ uocabant hanc Venenum terræ. Nunc & Cyclamini radice id contigit in eadem terra: ut putant. Alterum mascule, atq; Longæ. Tertiū radice longissima, quasi uitium nouellarum, efficacissima: quæ & Cretica nominatur, florē purpureo, colore buxæo, bacculas ferens ut Capparis: quæ tamē tria in omnibus quodq; inueniuntur generibus. Est & quarta Pistolochiæ nomine, tenuior q̃ tertia, densis radicis capillamētis, iunci plenioris crassitudine. Hanc quidam Polyrrhizon cognominant, & Satyrion esse dicunt, ut in eius mentione docui. Odor omniū medicatus, sed Clematiti, hoc est, tertiæ iocundior. Nardinis quoq; unguentis conueniens. Effodere eas messibus tempestiuū est. Maxime tamen laudat Pontica, & in quocunq; genere ponderosissima, quæq; medicis aptissima. Nascuntur fere pinguibus locis & plano, ut quidam scripsere.

De Aristolochia longa.

CAP. V.

Aristolochia longa, mascula appellatur, nonnullis Dactylitis, alijs Melocarpos, alijs Teuxinon, Latine Aristolochia, longiore q̃ rotunda folio, tenuibus ramulis, dodrantalibus, flore purpureo, grauiter olente, qui marcescens in Pyri similitudinem cōformatur. Turberibus radicum rotundis, ut Rapum. Longæ uero radix digiti crassitudinem, & palmi longitudinem implet. Nonnūq; paulo grandius adolefcit. Ambæ colore intus buxæo, gustu amaro, & graui. Est etiamnum tertia longa, quæ Clematitis uocatur, ramulos habens tenues, refertos folijs subrotundis, minori Semperuiuo similibus, flores Rutæ, pleniores, radices longiores, tenues, crasso cortice odoratoq; uestitas, unguentorum spissamentis conuenientes. Rotunda cæteris uenenis resistit. Longa uero aduersus angues & uenena, drachmæ pondere ex uino bibitur & illinitur. Pota cum pipere, & myrrha, menses, partus, et omnia uuluarum onera ejcit. Eadem efficit subdita in pello. Rotunda ad eadem pollet. Insuper singulibus, suspirijs, rigoribus, lieni, contulis, laterum doloribus, pota cum aqua singulariter auxiliatur. Aculeos & spicula extrahit. Ossium squammas illitu adimit. Vlcera putrida exest, & fordida expurgat. Caua cum iri & melle explet. Gingiuas & dentes extergit. Clematitis ad eadem pollere creditur. Viribus tamen inferior est. Appellatur a quibusdam Ararisa & Melecaprum, Ephestios, Lestitis, Pyxionix, Dardanion, Iontitis, Gallis Theximō, Aegyptijs Sophœoph, Siculis, Chamæmelon, Italis Malū terræ, Dacis Absinthiū rusticum. Nascitur in montibus & calidis locis, aut campestribus et petrosis. Ad grauem febrim efficax est. Si nidore subditis carbonibus febricitans suffiatur, febris leuatur, Vulnura imposito sanat. Carcinomatosis narium, cum cypiro & dracunculi semine, & melle prodest. Rigoribus medetur, cocta in oleo, aut adipe suillo, illitaq;.

BARBARI COROLL.

De hac qualis esset proxime indicatum nobis est. De Tertia, in primo Aristolochiæ genere

C ij

A

Pli. li. 26. cā. 7.
lib. 25. cap. 8.Aristolochia rotunda
calce confusa, in
mare sparsa, pisces
mira cupiditate ad
uolans.aristolochia
mascula
dactylitis
melocarpos

B

C

De dulci Radice.

CAP. VI.

γλυκύριζα

Glycyrrhizam aliqui Ponticam, alij Glyceraton, quidam Symphyton, alij Leonticam, alij Glycyphyton, aliqui Scythion, alij Adipson, alij Sylithrā, alij Lybiestafon, alij Omœnomœon, alij Penthaomœon, Latini dulcem Radicem appellauere. Plurima gignitur in Cappadocia, & Ponto. Fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus, folijs Lentisci, densis, pinguibus, tactuq; gummosis, flore hyacinthi, fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, qui filiquas lentium modo habet, ruffas & paruas, radicibus longis, ut gentianæ, coloris buxei, subacerbis & dulcibus, quæ densantur in succum Lytj exemplo. Is in arteriæ scabricia efficax habetur. Verum oportet ut linguæ subditus eliquescat. Aestuanti stomacho, thoraci, ac iocineri conuenit. Sanat uesicæ scabiem & renum dolores cum passo potus. Idem eliquatus situm sedat. Vulneribus illitus accommodatur. Cōmanducatus, stomacho prodest. Recentis radicis decoctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygij commodissime inspargitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 22. ca. 9.

Glycyrrhiza, siue ut Palladius, Glycyridia. Sunt qui hanc & Eryngem eadem esse falso putent, quoniam spinosa, & foliata uideretur. Fruticosa est, præstantissima in Cilicia, deinde Ponto. Adipson uocatur: quia situm, famemq; sedet. Carpitur Vergiliarum occasu: quæ longa est ceu uitis, colore buxeo. Melior nigra, quæ lenta, q̃ quæ fragilis.

E X M. V E R G. C O M M.

D

Solo nomine in fingendis componēdisq; uocibus suis Romanis feliciores Græci, amabilem omnibus Glycyrrhizam fecerūt. Nec aliter q̃ in comœdia Glycerium, & in Venusinis carminibus Glyceram grato dulcedinis sensu in amorum leporibus poetæ illi illustrarunt: sic Ponticā, siue ut Theophrastus appellauit Scythicam radicem hanc, grata naturæ eiusdem dulcedinis nota, sola appellatione gens illa cōmendauit. Nec tantum ut amarent eam omnes effecit, sed in Scythia & Ponto sub septemtrionibus nascentem, propriam sibi, noui, & a se facti nominis alij cuius adoptione fecisse conarentur: laborarentq; libenter pro ea omnes, quæ in sanitate & ualitudine tam suaues posset hominī rependere gratias. Quod nos modo agimus, præsentī quotīdie ab ea fructu & spe in tussi, & exasperatis faucibus: quo malo, frigiditate, tenuitateq; nostri aeris sæpenumero tentamur. Eam Theophrastus nono de plantarum historia, uolumine nondum facto illi a græcis, aut saltem non recepto ab omnibus, Glycyrrhize nomine Scythicam radicem uocauit. Estq; hoc quod Dioscorides ait, Scythicam ab aliquibus dici: & si passim in græcis non Scythicam, sed scythion corrupte legatur. Verba eius sunt. γλυκύριζα δὲ καὶ ἡ σκυθική. ἡτοι δὲ ὑπεργλυκύαν αὐτὴν καλοῦσιν. γίνεται δὲ περὶ τὴν μαίωτιν. Quod est. Dulcis & Scythica radix, quæ aliqui Euthyglyciam uocant. Nascitur circa Mæotim paludem. Idem eodem loco causam reddidit, cur Adipfos etiam diceretur, non tam quia situm simpliciter arceat, q̃ quia Scythæ ea, & Hippæce, de qua diximus superiore uolumine, decem, & aliquando duodecim diebus sine alio cibo purarent. Verba eius sunt. Δύναται δὲ καὶ τὴν δίψαν πάνιν ἰάνασθαι ἐν τῷ σώματι ἔχει. Διὸ ταῦτα τε καὶ τὴν ἰσχυρὰν δάμνην φασὶ τοῦτο συνέσθαι ἡμῶας καὶ δίκαια καὶ δωδεκά. Quorum sit sensus qui pauloante dictus a nobis est. Eadem ratio fuit, cur Pontica itidem diceretur: cur autē Symphytō, uirium similitudo fecit. Est enim, ut in quarto nolumine certius patebit, Symphyti radix dulci & saluam prouocante sapore. Pectoris & illud uitia emendat: faucium asperitati confert: postremoq; situm cōmanducatum arceat: quæ omnia dulcis Radicis propria sunt. Credimusq; nos, ἡ τῶν ἀντιπαλλομένων, idest, ex æqualibus, & eorum comparatione ad dulcem Radicem alterius plantæ translatus nomen fuisse. Dico autem æqualia, quæ nostræ ætatis medici, quid pro quo, appellant. Numerantur & aliæ ab hoc scriptore appellationes. Glyceraton, & Glycyphyton: a dulcedine factæ omnes, sola nominum conformatione diuersæ: quarum altera dulcem plantam, altera quod dulcedine sua amabile sit, significat. Celsus quod hic ipse testatur libro quinto

capite. 20. dulcem radicem simpliciter uocauit; quæ nos imitari; dulce Radicem, & si græca uoce Plinius usus fuerit, Glycyrhizam diximus. In cæteris appellationibus non est quod legentes moneamus, barbaræ enim sunt, aut adeo corruptæ, ut a barbaris nō differant.

De Centaurio magno.

CAP. VII.

Centaurium magnum aliqui Narcent uocant, alij Limneshon, alij Maronem, alij Plectroniam, alij Chironiam, alij Limnestin, Magi Herculis sanguinem, Romani Fel terræ. Folia habet iuglandis, oblonga, uiridi Brassicarum colore, serrata in ambitu, caulem ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita ceu Papauerum, in rotunditate oblonga, flos cæruleus, semen Cnideo simile, floccis quibusdam inuolutum. Radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cum adstrictione aliqua, & dulcedine acris, & rubeasceus. Amat solum pingue & apricum, ac syluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribusque locis circa Pholoen, Lyciam & Smyrnam. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, halitus difficultati, ueteri tussi. Sanguinem expuentibus, drachmis duabus trita datur: si febris sit, in aqua, cæteris in uino. Item ad tormina & uulua dolores. Ramenta eius in collyrii formam uulua subdita, menses atque partus extrahunt. Succus eadem præstat. Vulneribus prodest. Nam recens tusa, aut arida ante madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro Lycio utuntur. Panacia appellata est, quoniam omnia mitiget uitia, quæ inflammationem minantur, plurimisque scateat remedijs. Pulsationes uulnerum, urinæ stillicidia, calculosorum cruciatus, clystere immissa sedat. Legitur matutinis, sole ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia complentur.

BARBARI COROLL.

Centaurion maius, caules habet geniculatos, folia lata & oblonga, & ab radice densa, radix tenera, fragilisque. Durat annis nec ultra duodecim. Cõmentatissima in ijs quattuor Dioscorides meminit regionibus, præterque in Alpibus. Dicitur & Centaurea, & Chironion, quia curatus ea Chiron sit, cum Herculis pertractanti arma sagitta excidisset in pedem. Nostri herbarij aliud Centauriū maioris cognomine demonstrant, flore luteo, folijs per interualla binis, auersa parte candicantibus, interna uirentibus, Salice maioribus, & connexis fere.

Pli. li. 25. ca. 6.

EX M. VERG. COMM.

Quæ Centauriū a biformi quam fabulati poëtæ sunt natura eius dicta fuerit, Chironia a nomine, Pelethronia a Thessalia monte, in quo Lapithæ quondam equitadi peritæ gens, fræna & giros, ut poëta cecinit, alios docuerunt: inter quos & Chiron censebatur. Eandem hic Maroniam uocari ait, non amplius ex Thessalia, sed ex Thracia, in qua Maronius mons & Maronia ciuitas Homero notissima erat: quo loco copiosum forte, aut probatū nascitur Centauriū. Limneshon idē a natalibus suis Centauriū aliqui uocauerunt, quod secundū paludes, quas Græci limnas dicunt, & aquarū scatebras nascit: quod & Plinius testatur, Libadion eadē aquarum significatione uocari dicens. Quæ deinde Romanæ uoces Centaurio in Dioscoride accreuerunt, Vnefera, & Phieri, nullam nobis significationem habent. Et quod Fel terræ in maiore hoc Centaurio legitur, ex minore adiectum contrario sensu est. Siquidem ab hoc ipso maioris, radix dulci sapore describitur, minoris amaro. Præter quæ id sensus & experientia etiam ostendit, Alterius enim dulciior, alterius amarior in gustu sapor sentitur. Quo fit, ut Fel,

C iij

D I O S C O R I D I S

C quod amaro sapore est, minori, nō maiori cōueniat. Aperte id Plinius etiā lib. 25. ca. 6. testatur, de minore agens his uerbis. Hoc Centaurion nostri Fel terra uocat, propter amaritudinē sum mā. Ex eo facile fuit, ex maiore in minus appellationē eam transſerre. Et hæc pro Centaurij ap pellationibus dicta hætenus ſint: in quo ueluti inutilia, nec huic ſcriptori legitima reliquimus, quæ in extremo capite in impreſſis, alijsq; quibuſdā græcis codicibus legūtur ab eo loco, ſcili cet qui in græcis eſt, *καλὸν δὲ πανάκεια*. &c. In nouiſſimis autē latinis, cognominata eſt & Pana cia. &c. Fecimusq; id uetuiſſimorū græcorum & latinorū fidem ſecuti, in quibus tota ea pars nulla eſt. Et ſi in Plinianis caſtigatōibus hac ſola auctoritate nixus, qd in Plinio legebat, me detur & ouīū morbis decoctæ ſuccus, non ouīū, ſed omniū ſcribi oportere Barbarus decreue rit; propterea, q; Panaciā dici etiā Centauriū in Dioſcoridis hac parte legiſſet, quæ uox omniū morborū remedia pollicetur. Verū id nos non pbamus, & nihilominus unicuiq; ſuū ſeruatur iudiciū. Perſuaſitq; id p̄cipue, qd ultimū in ea parte ad ſuperſtitiōē ſolam p̄tinet, legendū eſſe, Centauriū appetente ortu ſolis, caſto tēpore, quo oīa pleniora & p̄fectiora ſunt, quæ ætate hu ius ſcriptoris inſueta, et naturā docente homine indigna erant. Scimus qdem Theophrastū lib. 9. de plantarū hīſtoriā, multas huiuſcemodi obſeruatiōes p̄currere: & in fodienda Centaurij ra dice neſcio qd de Triorchæ accipite dicere, quæ tunc cauere oporteat. Sed nihil qd ad ſolem & tēporis obſeruatiōē pertineat, in eo legitur: & nihilominus cuncta ab eo ex uulgi opinione re feruntur: & quatenus tutū ſapienti erat, contra plebis ſuperſtitiōes conari, ab eo damnatur. Cautius enim eo loco Theophrastus, ne uideretur religioni obſtrepere, ait. *τόδ' ἐπευχόμενον ἴ- μιν ἐν δὲ τῷ ἄρτον*. quod eſt, præcedente autē precatione aliqua, radices fodere nihil abſurdum. &c. Verum nos latinorum omniū, & meliorum græcorū, in quibus nihil huiuſcemodi legi tur, fidem ſecuti, omnē eam partem expunximus: & nihilominus poterunt uolentes ab alijs eam ſi placuerit repetere. Diximus deīde, naſci Centaurium, & amare ſtūpibus & arboribus conſerata loca, *ἀρτυμός* ſic appellantes, non ſepes, ſed arboribus fruticibusq; denſos montes. Licet em̄ a quercu, quæ *ἀρτυς* græce dicitur, *ἀρτυμός* fieri uideatur, nihilominus in cōmuni ſigni ficationis æſtimatione, ſyluoſus ſtūpe omnis locus ea uoce indicatur.

D

κενταύριον μί- κρον

De Centaurio minore.

C A P. VIII.

Centaurium minus aliqui Limneſion, alijs Elleboriten, alijs Amma cranton, Magi Herculis ſanguinem, Latini Febrifugam, alijs Au ram, multi Radicem, Daci Tulbellam appellant. Limneſion aliqui uoca uere, quoniam rigua amet loca. Hærbæ Origani, aut Hyperici ſimilis, caule anguloſo, palmum excedente, flore Lychnidis, e puniceo in pur puram uergente, folijs Rutæ prælongis & paruis, fructu tritico ſimili, ra dice puſilla, læui, & ſuperuacua, quæ guſtātū amaritudinem adfert. Hærbæ recens tuſa, ſuo illitu uulnera conglutinat. Vetera ulcera purgat, & cic catrice obducit. Bilem, craſſosq; humores per aluum exigit, ſi decocta de uoretur. Ius decocti iſchiadicis conuenientiſſime infunditur. Trahit em̄ ſanguinem, & dolorem leuat. Succus oculorum medicamentiſ perq; uti lis. Siquidem cum melle caliginē oculorum expurgat. In uellere ap positus, menſes & partus extrahit. Epotus peculiariter neruorum ui tijs ſuccurrit. Legitur ſemine prægnans, & diebus quinq; madefacta, decoquitur donec ſuperemineat aquæ. Mox ubi reſrixit, lintheolo ex primitur. Et eiecta hærbæ, iterum decoquitur, uſquedum mellis craſ ſitudinem habeat. Nonnulli eam recentem, grauidamq; contundunt, atq; ſuccum ſicili non picato exprimunt, & in ſole lignea rude aſſidue mouentes, inſpiſſant. Quod ſi quid concretum faucibus uasīs adhære ſcat, detrahunt, reliquoq; humori permifcent. Noctū diligenter operiūt. Namq; ros nocturnus, liquores coaleſcere non ſinit. Quæ autem ſiccis ra

dicibus, aut hærbis liquamenta exprimuntur, decocta ut in Gentianæ mentione retulimus, præparantur. Sed quæ ex corticibus humidis, aut contulis hærbis factitatur, in sole, uti ante dictum est, coguntur. Sic e Tapfia, sic e Mādragora, reliquisq; similibus succus, sic ex acerbis uuis Meligo elicitor. Lycium tamen, & Absinthium, Hypocistis & consimilia, decocta eo quo diximus modo coguntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Centaurion minus, a foliorum tenuitate Lepton cognominatū, sicut Libadion, quoniam secundum fontes nascitur. Ipsa herba legitur autumnō. Succus e fronde, aut caulibus concisus madefactisq; is, diebus capitur. Hoc Centaurium nostri Fel terræ uocant, propter amaritudinem summā, Galli Exacon, quoniam omnia mala medicamenta potum exigat per aluū. Est & Centauris appellata, cognomine Triorches. Hæc qui eruit, iubentur accipitrem cauere, dictum a numero testium Triorchem; quoniam ut Theophrastus inquit, raro non uulneratur ab alite, qui colligit. Tradunt & per se infestam esse carpenibus, raro unq; non ferientibus se, dum secāt. Hæc succum sanguineū mittit. Imperiti miscent has notas, & uni generi assignāt. Nam quod Ceutaurion Panaces uocat, alterius est naturæ, ut in Panace monstrabimus, Huius radix minoris, penitus inutilis medicinæ est, ut Galenus quoq; scribit.

Theophrā.
lib. 9, cap. 9.

E X M. V E R G. C O M M.

Cur Elleboritem ab aliquibus uocari Cētauriū minus in hoc scriptore legatur, difficilem habet coniecturā. Nihil enim inter eas tam simile est, ut misceri & cōmunicari diuersarum plantarū nomina potuerint. Incertum itidem, quæ Amaranthi nominis in eo causa sit, & ob quas uires Romani Febrifugiam dixerint, & Multiradicem herbam. Cum Amaranthus spica portus q̄ flos sit purpurei coloris, quia nuncq; marcescit, sic appellatus. Nisi forte ex colore floris tantū captata similitudine sic uocari ab aliquibus coeperit: unaq; tantū radice nitatur Centaurium, & nullis febribus mederi hic dixerit. Quales itaq; in scriptore hoc a nobis inuentæ sunt, tales etiam post nos alijs relinquuntur.

B

De Chamæleone albo.

CAP. IX.

Chamæleo albus quibusdam Chrysisceptron, alijs Ixia, Romanis Carduus marinus, Aegyptijs Ephear dicit, alijs Ephthoschin. Ixiam ideo aliqui uocauere, q̄ quibusdam in locis uiscum circa radicem inueniatur: quo pro mastiche utuntur mulieres. Folia habet Sylibo, aut Carduo similia, asperiora, acutiora, nigroq; Chamæleone ualidiora. Caulem non promit. Verū ex medio spinas Echini marini, aut Cinaræ modo erigit. Flores purpureos ueluti papporum lanugines emit. Semen Cnici simile. Radicem in lætis collibus crassam, in montosis uero graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcem. Quæ pota acetabuli mensura, latas interaneorū tineas pellit. Bibitur autem in uino austero cum Origani feruescenti succo. Hydropicis commodissime drachma in uino datur. Etenim eos extenuat. Contra difficultatem uring decoctum propinatur. Hausta in uino, serpentū uenenis resistit. Occidit canes & fues. Mures item necat subacta cum polenta aut aqua, & oleo madefacta.

χαμαιλέον
λευκός

B A R B A R I C O R O L L.

Chamæleon album, a Theophrasto Ixinē uocari Theodorus existimauit, quia Cardui pineam interpretari uoluit; quæ nihil aliud est, ut Dioscoridi placet, q̄ albus Chamæleon. Plini-

Pli. li. 21, ca. 18.
& 21, ca. 16.

D I O S C O R I D I S

Cus in Theophrasto non Ixinem, sed Helxinem uidetur legisse. Fere suspicor utrūq; falli, Theodorū, & Plinium; Theodorū, quia Chamæleontē album Ixiam quoq; dici nouerat. Sed aliud est Ixinē, aliud Ixia Theophrasto noni uoluminis intio, ubi non omaibus locis. sed in Creta la chrymā ab Ixia, hoc est (ut arbitror) Chamæleonte albo fundi scribit. Pliniū quoq; decipi exi stimo, affinitate uocis, Helxinē, pro Ixine capientē, librarijs alterū pro altero scribentibus: qui modo parū diligentes, modo nimis scioli, peruertunt oīa. Tres igit herbx sunt, Helxine, Ixine, Ixia. Ixia Chamæleon albus est Hippocrati, & Galeno. De Helxine suo loco ageſ, ubi de Ixina quoq; disſerendū nobis erit. Chamæleontē album Ixion quoq; dici uideo, quia uiſcū gignital bum, nō ubiq; sed ſub aliſ foliorū, maxime circa Canis ortū, cum Tura naſci dicūtur. Succus radicis decoctæ mures cōtrahit & necat, niſi protinus aquā ſorbeant. Volētibz ſcire, uicturus ſit æger, nec ne: præcipiūt radicis diluto pſundi triduo qui langueat: moriturū negantes, qui ter rias uices pſferat. Theophrastus auctor. Naſcit æque oībz locis, capite magno, & Acanth her bx ſimili: unde quidā inquit, eam uocauere Acanon, qđ quidē & Ixine appellata cōtinet.

E X M. V E R G. C O M M.

IN Lacertarū genere Aegyptus, Africa, & India Chamæleones paſſim, & quotidie uidet, ma ter herbarū Italia, regionesq; aliæ oībz fere locis: tā undiq; ſpinis & aculeis fertiles agros, an nonamq; ſuā natura omnibus miſcet & turbat. Deſcripſit animal Pliniū longiſſime octauū uo luminis capite. 22. facileq; eſt legentibus nouiſſe, unde factio a leone ferociore, grandiq; beſtia nomine, paulominus q̄ integram Lacertā, & minori Crocodilo ſimile animal, humilem, & ue luti per terrā ſerpentem Leonē Græci uocauerint. Deſcripſit idem herbā eiſdem operis uolu mine. 22. capite. 18. poſſuntq; legentes in eo itidē cognofcere, unde ab animalīū genere in her barū cenſum humi repens leo ille tranſierit. Quod non totius, aut partium, diuerſorū in natura generū figura & ſpēs fecit, ſed idem mutationis euētus. Vt em animal mutabili coloris natura eſt, mutatq; cum ſubinde, & oculis, & cauda, & toto corpore: reddiq; ſemper quēcūq; proxi me attingit, præter rubrum & candidū (& ſi diſcrepent in hoc antiqui ſcriptores, excipiantq; ali qui candidū tantū) eodē modo & herbā cū terra colores mutat: hic nigra, illic uiridis: alibi cya nea, alibi crocea, atq; alijs coloribus. Nec alia noīs huius in herbā, q̄ a coloris mutatione, quā ſimilē cōmunemq; cū eo animali habet ratio, in græca appellatione eſt. Alioquin in cenſu Car duorū uterq; Chamæleon eſt, candidus, ſcilicet & niger. Dico aut Carduos nunc, ſpinofum o mne illud genus, qđ ſiue altius a terra erigat, ſiue humilius ſerpat: ſiue his, aut illis, hac ue par te, aut illa aculeatū ſit, ſpinofum florē aliqūe profert, in quo lanis & pappis ſemina inuoluunt. Neq; erit difficile, diligenter pingua, inculta loca, præſertimq; rudera menſibus Maio & Iunio obſeruātibus, utrūq; hoc genus, & eorū diſcrimina obſeruafſe: præcipueq; ex floribus, qui ex latiore ueluti pyxide in altero purpurei prodeunt, in altero quo mox colore deſcribentur. Fue runt qui hunc Pineum Carduum huic ſcriptori additum legerent.

De Chamæleone nigro. C A P. X.

χαμαιλέον
μύλας

Chamæleo niger, quem Pancarpon aliqui, alij Vlophonon, alij Ixiam, alij Cynomazon, alij Ocimoïdes, alij Cnidion coccon, alij Cynoxyllon, Latini Carduum nigrum, aut Vernilaginem, Aegyptij Sobel uocant, folijs Scolymo ſimilis eſſet, niſi minora, tenuioraq; ac ru bro diſtincta uiderentur. Caulem emittit dodrantalem, craſſitudine digi tali, ſubrubicum & in umbella flores ſpinofos, tenues, hyacynthi æmu los, uerſicolores, radice craſſa, nigra, denſa, interdum exeſa, quæ diſſecta flauēſcit, & commanducata mordet. Prouenit in campeſtribz ſiccis, & cliuoſis traçibus, & maritimis. Radix trita, addito attramenti ſutorij exiguo, cedrino oleo, & axungia, ſcabiem abigit. Eadem cum ſibi ſulphur & bitumen aſciuit, & cocta in aceto illinitur, impetigines abſter get. Decoctum collutione dentium dolorem mitigat. Cum pari pipere & cæra oblita radix, dolenti denti auxiliatur. Radice concifa & in aceto decocta dentes ſouentur. Eos quoq; frangit, ſi ſcriptorio ſtylo ſeruens ad

moueat. Vitia cutis in facie, uiriliginescq; cum sulphure emendat. E^s rodentibus medicamentis ammiscetur. Phagedænas, tetracq; ulcera illi^{tu} sanat. Quare Chamæleo uocetur, a uarietate foliorum euenit. Mu^{tant} enim cum terra colorem: hic uiridia, illic albicantia, aliubi cæru^{lea}, nonnusquam rubra inueniuntur.

BARBARI COROLL.

Chamæleon niger, spinosi generis, uerū folijs aculeatis non constat. Gelidis & inertibus lo^{cis} prouenit. Ex nigris, aliqui marē dixere, cui flos esset purpureus: foeminā, cui uiolaceus. V^{no} nascitur caule, cubitali. Vlophyton uocatur, quoniā anginae modo iuuecas necet, & ab o^{do}ris grauitate Cynozolon. Ferunt & nigri uiscū: sed qd pro Mastiche non sit, ut ex albo.

EX M. VERG. COMM.

Communis utriq; Chamæleoni Ixiæ uox & appellatio est, falso tamē, & sine causa: quo^{nam} albo tantū adnascitur uiscum, unde ea facta est, illiusq; propria, ceteras nigro relinquit. Quarum Plinius duas numerauit: Vlophonon, q; ricinos canum necat: iuuecas quoq; An^{ginae} modo perimit. *ὄνλιον* enim, & *φόνος* græcis exitium significat. Cynozolon item, propter grauitatem odoris: quoniam *ὄνλιον* olere iisdem græcis est. Nos illud addidimus, ideo Cynoma^{zon} dici, q; in pulte necadis canibus detur, quam Græci *μάραν* dicunt. In ceteris non est quod legētes moneamus, præterquā, non uideri integrum, quod redditum est, Librario stilo eadem^{denū}, in quo dolor est. &c. Neq; enim rationem nobis aliquam, cur sic fieri debeat, id osten^{dit}. Cogitq; id suspicari antiquissimus latinus Dioscorides, in quo nihil est, quod ad Librari^{um} stilum pertineat: sed in carbonibus combustam radicem Chamæleonis, dentibusq; admo^{tam}, eos frangere indicat. Communem tamen omnium Græcorum, & aliorum interpretum^{lectionem}, secuti & nos sumus.

Pli. li. 22. ca. 19.

De Crocodilio.

CAP. XI.

Crocodilion Chamæleontis nigri figuram habet. Nascitur in syl^{uosis}, radice longa, læui, aliquantum lata, odore ut Nasturcij acu^{to}. Feruefacta in aqua, & pota radix, sanguinem copiosum per nareis pel^{lit}. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, du^{plex} uti scutum. Quod suapte uⁱ urinam ciet.

BARBARI COROLL.

Crocodilion radice longa, æqualiter crassa, odoris asperi. Aetius hanc fortasse intelligit, cum radicem Crocodiliadis eius quæ maxima est, commendat in eo capitum dolore, qui Ce^{phalæa} dicitur.

EX M. VERG. COMM.

Differt ab utroq; Chamæleone Crocodilion: q; eorum alter albus scilicet, sine caule in me^{dio} inter folia spinam marino Echino similem profert: Niger non unam, uerum duas, tresue aliquando coliculis potius q; caulibus impositas ostendit. Crocodilion autē singularem mit^{tit} caulem, & in caule spinosum Echinū. Est & alia differentia: q; illi pinguibus, campestribus & maritimis locis nascuntur: hic inter stirpes, & confertis arboribus locis. Differunt & radi^{ce}: quæ in illis est, qualis ab hoc describitur: in Crocodilio longa cum latitudine aliqua, alijs^q notis illis, quæ descriptæ paulo ante sunt. Nasci Crocodilion Barbarus a Plinio acceptum in fabuletis dixit: quæ uox *τὸ ποιεῖν ἀπὸ μυῶν δει*, quibus hic nasci eam ait, nullatenus ut credimus responder: modo fabuleta illi significant, quod in ruris disciplina cunctis alijs significant. In medicina hoc amplius Græcorum ueteres medici tradiderunt, prodesse Crocodilij radicem^{pētoris} excreationibus.

De Labro Veneris, seu Dipsaco.

CAP. XII.

Dipsacum aliqui Crocodilion uocant, alijs Chamæleonem, alijs^{Onocandion}, alijs Veneris Lauacrū, Romani Labrum ueneris, alijs Carduū ueneris, Aegyptij Sefeneor, alijs Chir, alijs Meleta, Daci Scia^{ram}. Aculeatarū generis est. Caulē habet altū, spinis horridū, folia Lactu

B

κροκόδιλιον

δὶ ψάκῃ

D I O S C O R I D I S

Cæ, aculeata, prælonga, bullas intus & extra spinosas in dorfi medio, binis folijs geniculatim caulem amplectentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: unde Dipsaci quasi sitientis nomen traxit. In cacumine caulis, singula furculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis, quæ arefacta candida spectantur, dissectaq; medullatenus, uermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis fistulasq; si tusa & decocta in uino radix, usq; dum sit crassitudo cæræ, immitatur. Medicamentum ærea pixidere condendum. Aiunt fornicationibus, uerrucisq; pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorū in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

Pli. li. 24. ca. 13.

DIPSAcos, folio cauo, in quo salsus ros. Nascitur in aquosis & flumine. Huius herbæ carduus is est, quo rudes panni, uelut echino quodā, ut inquit Plinius, uestes expoliuntur, & coluntur. Floccis siue fimbrijs, quas Græci Crocydas appellant, detractis, complanatisue. Hic frutex Labrum Veneris, aut Venereum latine dicitur.

TOTA Romana & antiqua uox est, Labrum Veneris, nō ab oris humani parte sic dicta, sed ab his Labris quæ Maro dixit, plena musto in uindemia spumare. Indicatq; id, q; Græci Romam uocē inuitati, ἀφροδίτης λουτρόν eam dixerūt: quod erat in latinis Labrum, græcæ λουτρόν, ex usu balneorū transferentes. Sunt em̄ græcis λουτρά quæ lauandis corporibus parantur: quemadmodū in balneis labra etiam Romanis. Nota res est, latet tñ causa: nec nos hactenus inuenimus, cur Labrū Veneris spina hæc ab illis quondā dicta fuerit. Videmus quidē quot annis, catos dies seruatur humores. Sed quomodo his Venus laualet, aut se aliquādo lauisset ignoramus. Græci a sitj ἀλ-ακων eam dixerūt: uel ut hic ait, quoniā humorem illū contra eam paratū semper habet: uel quæ nobis ex natura magis causa uidetur, q; secus fontes, aquarū scarebras, aquosos limites & fossas nascit, nec alijs locis raro inuenit. Egregia est plantæ spēs, quæ supra hominis altitudinē aliquādo crescit: quodq; in ea contemplari aliquis gaudeat, bullantes toto eius corpore spinæ sunt, & ueluti peluem constituētia bina illa folia, intra quæ humor semper inuenit. Cum creuit, in summo singulorū caulium singulos Echinos in oblongo rotundos profert, flore qui purpuream lanuginem refert. Oēm eius spēm diu nos obseruauimus: in Echinis autē nascentes uermiculos inuenire non licuit, & nihilominus græci latinique, quod merito credendū sit, oēs testant. In medicina usum radix tantū habet. Nosq; quibus ea medet rimis, fistulis, formicis & uerrucis iam pridem diximus, qualia mala illa omnia in homine sunt.

D

ἀκοντα λουτρον

¶ De Spina alba.

C A P. XIII.

SPina alba, quam Agriocinnaram, alij Donacitin, alij Erysisceptrum uocant, Romani Spinam albam, aut Regiam, alij Cardum Ramptarium. Nascitur in montibus & syluosis. Folia albi Chamæleonis, angustiora, & candidiora, aliquantum hispida, & aculeata, caulem supra bina cubita altum, digitū magni aut pollicis crassitudine, albicantem, intus cauum. In cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum. Flores purpurei, in quibus semē ceu Cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, coeliacis, stomachicis, & ijs qui cruentata extussunt, efficax est. Vrinam cit. Tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen conuulsis infantibus, & a serpente demorsus auxiliatur. Gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

BARBARI COROLL.

A Cantha leuce, hoc est, spina candida, ut superius quoque diximus, aliud genus est, quod Leucacantha, siue Leucacanthos, etiam si & hanc nonnulli Galeno teste Leucacanthon uocare consueuerunt. Habetur, sed inter arbores uel promiscua, quæ Spinus albus uulgo dicitur, cortice ligni candido, molli folio: aculeata tota, Pruni magnitudine. Quo nomine ueteribus cognita hæc sit, haud possum reddere.

EX M. VERG. COMM.

Spina hæc alba alia est ab ea, quæ primo uolumine ab hoc ipso scriptore, & a nobis longius descripta fuit. Illa inter spinosas arbores genus suum habet: hæc inter aculeatos frutices, & cum reliquis carduis, quorum multiplex genus est, numeratur. Illa λευκάκανθα, composito & coniuncto nomine, hæc discretis uocibus ἀκανθα λευκή appellatur. Illa undique suis spinis, & quales in arboribus uidentur infesta riget: hæc præter spinas in folijs aculeatum etiam echinum in summo caule habet. Illa in sepibus, hæc montanis & siluosis nascitur locis. Illa tandem solidam habet materiam, hæc concauum & inanem caulem. Sunt præter hæc in utriusque historia & medicina discrimina alia etiam. Quæ poterunt uolentes ex hoc scriptore, & ex ipsa facillime cognoscere. Nullibi enim non nota omnibus hæc spina est, cuius flore ad lactis coagulum multis locis in E-thuria pastores & uillicæ in casei confectioe utuntur. Eam hic ait syluestrem Cinaram uocari, propterea quod satiuæ Cinaræ comparata, minora aliqua, asperiora uero omnia habet. Est enim Cintera altitudo Cardui omne id genus, quod siue in globis squamatis corticibus, intus nitentibus tumet: siue calathi figura longioribus & in exteriorem partem descendentibus, iisdem squamatis corticibus aperitur: quæ ueluti naturæ monstra in ganeam gulæ procures uerterunt.

De Spina arabica. CAP. XIII.

ARABICÆ spinæ, quæ Acanthis aliquibus dicitur, naturæ, albæ spinæ similem esse constat. Ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæterasque fluctiones radix etiamnum ualet. Prouenit in asperis.

BARBARI COROLL.

ACanthen, hoc est, Spinam arabicam nonnulli hanc esse putant, quam Plinius Lamam uocauit, etiam in India nascentem, a qua gummi adulterio Myrrhæ prouenit, ut in Myrrha & Masliche notauimus. Eandem hanc cum ægyptia spina Acaciam fundente nonnulli faciunt: quoniam Galenus & Paulus hanc & ægyptiam & arabicam appellant.

EX M. VERG. COMM.

Inter congeneres herbarum spinas, non inter aculeatas arbores Arabica, siue Ægyptia spina hæc numeranda est. Eam ueteres greci utriusque gentis nomine indicauerunt. Ideoque nos inuenta in antiquissimis grecis, alia illa uocem Ægyptiā, s. addidimus. Maximas etiam in adstringendo siccandoque uires illi tribuerunt. Peregrina quondam Italiæ ea fuit, nunc quod sciamus, nulla est.

De Carduo. CAP. XV.

CARDVVVS græce Scolymos, alias Pherusa, alias Pyracantha nominatur, in Ægypto Cnus. Folia Chamæleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, & crassiora. Caulem longum ædit, foliosum, capite spinoso. Radice nigra & crassa, quæ illa graueolentiam asparagum, totiusque corporis emendat. Item si decocta in uino bibatur. Copiosam autem urinam fetidamque expellit. Hærbæ cum recens tenere solet, in olera Asparagi modo transit.

BARBARI COROLL.

Scolymos a Theodoro, Carduus, diu floret, ac sero. Distat a cæteris spinosis, quod radix eius uescendo est, decocta & cruda, maxime dum florescit: quodque lacteum succum durata emittit. circa solstitium flos incipit. Senescens in pappos amittitur, quod quidem est huic generi commune. Mirum quod sine interuallo tota æstate, aliud floret, aliud cōcipit, aliud paritur. Semen uliginosum & armatum aculeo. Folium arefcens desinit pungere. Caput ei Theophrastus contra quod Dioscorides, spinosum negauit, sed oblongum haberi dixit: quod in hoc uno tantum spectetur.

A

The. li. 6. ca. 3.

ἀκανθα ἀραβική

B

σκολυμω

Pli. li. 21. ca. 16
lib. 22. cap. 22.

D I O S C O R I D I S

C inter ea, quæ lanugines folio spinosas obtinent. Nascitur similis Scolymo Carduus circa Teges, radice dulci: quam, cum Pandius statuarum magister esitauisset, alienatus mente ferri. Hactenus Theophrasti de Scolymo sententia. Nunc quæ ceteri scripsere uideamus. Scolymon oriens & Limonia uocauit. Frutex est nunc cubitali altior, utique in montibus, & quædiu syluestris, & nodum altilis. Alioquin in Mauritania caulis ei duodecim cubitos altus. Palmos quaternos crassius esse dicit, thyrsumque foliorum ac radice dulci: laudata quondam in pauperis cœna. Florente Scolymo, & cadas acerrimi cantus esse, mulieres libidinis auarissimas, uiros contra in coitu pigerrimos, scripserunt Hesiodus, & Alcæus poete. Differ ab hac, quæ a Plinio ite Lemonia uocatur, contra serpentes, herba lacteo succo manans, cœrescente gumi modo in humidis locis, affirmare non ausim. Est & Lemonion pro syluestri Beta ueteribus acceptum, graui lapsu Theodoti, Limonia, quæ Scolymus est, pro syluestri Beta in Theophrasto capietis, & aculeato folio eam prodētis. Habet & Anemone genus unum, cognomine Limonia, ut dictum est suo loco. Sunt qui & Cynoglosson herbam Limonion appellent. Sane Scolymos Carduus intelligitur syluester. Syluestrium autem Carduorum genera duo. Alterum fruticosius, a terra statim. Alterum unicauale, & crassius. Vtrique folia pauca, spinosa, muricatis cacuminibus, lanuginoso caule. Sed alter floræ purpureum mittit, inter medios aculeos celeriter canescentem, & abeuntem cum aura, qui proprie Scolymos dicatur. Radicis horum ex aqua decoctæ natura, sitim potioribus uini facere. Hinc illud Columella de Cynara.

Quæ dulcis lacho

Potanti ueniat, nec Phœbo grata canenti.

Quid autem sit in Columella uersu, mirtolum in Cynara crinem spectari aliquod, nihil habeo quod afferre possim: nisi quis non mirtolum, sed mirtolum, uel muriceum certe legat. Sunt enim muricata Scolymo cacumina, ut inquit Plinius. Murtioli mentionem in Columella & alio loco uideas, ubi hæc uerba sunt ultimo uolumine. Habeto inquit, uiridis feniculi femina, & lentisci destricta & purgata murtiola. Fateor nescire quid sit murtolum. Scio Murcum montem Romæ dictum, qui sit & Auentinus, autore Festo: ut obiter corrigamus locum in Plinio iuniore, Auentinum & Martium montem, ab Anco Martio Urbis adiectos prodente: non enim martium, sed murtium legere oportet. Scio & intimum circum Romæ a mutis cognomen habuisse, quasi ab urceis, quæ ibi fingerentur, ut Porcilio plater: siue a propinquo Veneris murtæ facello, quæ postea Murteam, & Murtiam uocare coeperint in Auentino colle, ut Varroni. Hinc & Myrtum arborem uulgo, & Murtum, & Murtellam uocamus hodieque. Plinius certe duobus locis Scolymum, & medicinas eius ceu duarum rerum descripsit. Cynaram porro Carduum intelligit fatuam: ita enim Lucius Columella uocat. Palladius Carduum a cinere, ut quidam autumant, quo letatur, uocatam. Sunt qui puellæ nomen in eam herbam uersæ inrelligant, Paulus, & Aetius Scolymon a Cynara discriminant: priorem stomacho prodesse, Cynaram officere morifantes. Proxima certe genera uidentur esse. Fuit hæc ueteribus maximi res questus, ex Carthagine magna & Corduba precipue, sestertia fena millia, carduetis etiamnum paruis inferetibus ærario. Tantis est earum rerum prouentus, quæ Veneri obsonantur et ganæ: ut nihil iuuerit portenta quædam naturæ uideri Carduos, & quæ refugiant quadrupedes, quo minus in luxum eos humana gula uerteret. Adhibentur Cynaræ conuiuijs, Asparagi modo coctæ iuribus: nec sine ijs magnifica, aut adicialis ulla est cœna, utique si neque locus, neque tempus obstat. Ligures Arcocum uocant, quasi alcoccalon: ut prima eius uerbi syllaba pro articulo sit, quem Mauritanio omnibus fere uocibus preponunt, ut in Hyoscyamo ex Plinio quoque usu ostendimus. Coccalus uero græce idem est quod Strobilus, hoc est, nux pinea, cui similis est Scolymus. Dioscorides, Romani Scolymum uocant inquit, Strobilum. Nondum irrepsit hoc ferculum Venetis, una tantum eius planra Mauriano uico cernitur in hortis barbaricis.

EX M. VERG. COMM.

V Agum per aculeatas omnes plantas Pyxacanthæ nomen est: quæ primo uolumine Lyciffi uocari etiam diximus: suisque spinis tamen, non ubique spinosis omnibus adest. Impudentem quidem, sed multo impudentius a suo genere in aliud ab his translata, qui naturam ignorantes, temere omnia miscent. Strobilum a Romanis Carduum uocari Dioscori ait, græca quidem uoce, sed tunc forte quotidiana, & in usu populi: quæ a Pineæ nucis figura cui simile in summo Cardui capitulum habet, facta est. Græci enim στροβίλον arborem Pinum, & nucem eius pariter uocant. Quæ quoniam coni figura in Pinastris, & oblonga est, quam formam Cardui capitulum habet, communica appellatione Strobilos, Carduus hic a Romanis aliquando dici potuit. Siquidem Plinius, 16. uolumine cap. 11. de Pinastris agens ait, Eadem arbores alio nomine per ora Italiæ quas

Scrobilos uocāt, ut pleriq; arbitrātur. Ex quo patet, scribēte etiā Plinio historiā suā, fuisse eā uocē in Pinastri Italię popularē. Similē Chameleoni Cardui, Nicander, Theophrastus, oēs q; aliq; fecerūt. Sed Theophrast. hoc amplius: nō solū habere Carduum radices, quę crudę parē & cōctę in hominis cibos ueniant, qd priuatim solus hic in spinoso gñe habet, uerū q; easdē cū florēt optimas habet: quodq; uix credibile uideat, cū duratę p̄ etatē fuerint, & quasi in lignum transferint, candidum liquorē ex se mittere. Estq; hic Scolymus, siue Carduus is, quo per foliū tūm florēt, Hesiodus ait, in arboribus maxime canere cicadas, acerrimeq; ad uenerem stimulari fœminas, uiros aut̄ ignauissimos tunc ad eam fieri. Descripsit, & remedia eius tradidit pluribus locis Plinius: a quo poterunt uolentes multa audire ad omnes Carduos pertinentia, priuatimq; ad Scolymum hunc, qui priuatim Carduus ab omnibus dicitur, & est.

De Poterio.

CAP. XVI.

Poterium aliqui Phrynion, Iones Neurada, aliqui Acidoton uocant. Large fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, Tragacanthę proximis, folijs paruis, rotundis, flore exiguo, candidi coloris. Seminis nulli usus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in aquosis & collibus. Radices demittit binum, ternumue cubitorum neruosas, & firmas. Quę proxime terram recisę, dant succum gummi similem. Tussę, pręcisus neruis, & uulneribus glutinandis illinitur. Decoctum quoq; eius neruorum affectibus prodest.

BARBARI COROLL.

Poterio circūfodit autumnō, pręciditurq; ad succum. Radices habet multas, bene olentes, sed duas, aut tres, cubitorum binū. Galenus hanc Neuradis appellatione intelligit. In Plinio nō Poterio, sed Pontirrim, nec Phrynion, ut in Dioscoride, sed Parcenio. 27. lib. legi uideo, corrupte utrūq;. At. 25. non parcenion, sed Phrynion, nec Pontirrim, sed Polyrrizon mendose item scribitur. Phrynion porro a Rubetis ranis dicta est, quibus aduersat. eas Gręci Phrynos uocāt.

EX M. VERG. COMM.

Quę Poterio in Dioscoride adiectę sunt Neurados, & Phrynij appellationes, in alijs gręcorum & latinorum scriptoribus, Galeno, f. Paulo, Plinioq; pręcipue & post se illam trahentes sunt. Siquidem priores duo illi Neurada tantum uocant, Plinius Phrynion; omnes tamen Poterion ab alijs appellari addunt. A neruorum medicina & ope alterum: a rubetis ranis, quibus ea medetur, alterum nomen illi factum est.

De Acanthio.

CAP. XVII.

Acanthium albę Spinę simile, folijs aculeatis per extremitates, et lanugine araneosa obductis, quę collecta & in unū acruata Bōbicis effigiē p̄bēt. Folia, uel radices ad remedia opisthoni bibunt.

BARBARI COROLL.

Acanthion spinulam significat. Est enim spinę albę proxima, sed minoribus multo folijs.

EX M. VERG. COMM.

Perisse capiti huic aliquid, sermonis parum sequax ductus ostendit. Quid aut̄ desyderare, & amissum instaurare nos oporteat, Plinius. 24. uolumine, cap. 12. manifeste indicat: q; de aculeatis plantis quibuscūq; agens, Acanthiū hoc his uerbis descripsit. Huic similis est spina illa quę gręci Acanthion uocant, minoribus multo folijs, aculeatis per extremitates, & araneosa lanugine obductis: qua collecta, etiā testes quędā Bōbicis similes in oriēte sūt. Ipsa folia uel radices ad remedia opisthoni bibunt. Et hactenus Plin. Quę siq; ab eo dicta cū scriptore hoc cōtulerit, oīa eadē utrūq; esse inueniet. Pręterea, quę Plinius ait, lanugine obductis, in nullis gręcis hactenus inuenta, uerū ad explendā Acanthij & scriptoris huius historiā tā necessaria esse, ut sine eis nō possit integer sensus Diosc. esse: cōtraq; suo loco instauratis nihil aptius audiat. Erit ergo hic sermonis ductus. Spinę albę similia habet folia Acanthium, in summis extremitatibus aculeata, araneosa lanugine obducta: qua collecta, simulq; composita, bombicinis similes uestes sūt.

C
 ἄκανθα
 ἰπνιδία

De Acantha. CAP. XVIII.

ACANTHAM, aut Hærpacantham, quidam Melamphyllon, Romani Pæderotam, aliqui Topiariam, alij Mamolariam, quidam Cræpulam uocant. Nascitur in hortis, petrosis, & riguis. Folia habet multo lactucaceis latiora, & longiora, Erucae diuisura, nigricantia, pingua, laeua. Caulem binum cubitorum, digitali crassitudine, laeuem prope uerticem, ex interuallis circumdatum, foliolis paniculas oblongas referentibus, Hyacinthi similibus. E quibus flos prodit albus, semen oblongum, luteum, caput thyrsi specie. Radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis. Quæ uitis igni, & luxatis artubus illitæ subueniunt. Potę urinam ciunt, sed aluum cohibent. Ruptis, conuulsis, tabem sentientibus, mire profunt.

BARBARICOROLL.

Pli. li. 22. cap.
 20. & 22.

ACantha, siue Acanthos, topiaria & urbana est herba, elato longoq; folio, crepidines marginum allurgentiumq; puluinorum toros in hortis, historiali facilitate uestiens. Duo generis sunt, Syluestre, aculeatum, crispum, quod & breuius est, Agriacanthos appellatū. Alterum lene ac satiuum, quod proprie Pæderota uocant, alij Melamphyllon, de qua hic agitur. Vnguenti quoq; genus est, quod Pæderota nominabant, quo & Demetrius Phalereus sibi os linebat. Alexis poeta fœminas, quibus nimis candida cutis esset, Pæderote uti solitas in comœdia significat: quod & Aegyptium unguentum dicitur: ut in Staete diximus. Pausanias auctor est, genus herbae Sicyonis in uno tantum ueneris septo nasci Pæderota nomine, folio minore q; fagi, maiore q; ilicis, & omnino quernis simili, altera parte candido, altera subarbo, ut albe Populi: hanc ibi tm spectari, præterea nuscq; gentium. Sit autem Acanthus hæc uulgaris spina, cuius & in Aspalatho meminimus, nec ne, dubito. Plinius certe duobus locis, altero Acanthon, altero Spinam uulgarem appellando, easdem utiq; medicinas tribuit. Spina est, & Appendix uocata: quoniam bacca in ea puniceo colore nominentur Appendices, siue ut ueteres dicebāt, Ampendices. Ii & Lumam pratenfis spinæ genus appellabant, & ab eo Lumeſta, & Lumarias falces, autor Varro: dictam ita, q; a terra soluunt, idest, luunt eas agricolæ. Acanthos, Seruius inquit grammaticus, in Aegypto & Cyrenaica insula nasci fertur. Sed homo literator, herbarumq; parum gnarus, cum Spina ægyptia confundit, quæ ab Acantho prorsus alia est, ut facile dignosci potest.

Seruius.
 Achantus arbor est
 in Aegypto, semper
 frondens, ut china,
 lanius. Et Achantus
 dicta quasi spinis
 plena, anarib; D
 enim spina est: nam
 est spinosa arbor.
 Abundat hæc etiam in
 Cyrenaica insula.
 Vide Pomp. subum
 in Commentarijs su
 pra Virgilium in Ge
 orgijs, folio 218

EX. M. VERG. COMM.

Hæc est Acantha, siue Acanthus ille (utroq; enim genere a græcorum medicis, scriptoribusq; & poetis alijs omalbus dicitur) quæ antiquis in tanto laudum & honoris ambitu fuit. Quæ Maroni pastoralis poculi ansas amplectabatur: quæ in hortis crepidines marginum, allurgentiumq; puluinorum thoros, longioribus & latioribus folijs uestiebat: et in architectura Corynthiæ columnæ, capitulum grato foliorum amplexu nunc etiam ornat. Quæ inter aculeatas non censeretur, nisi in oblongis foliolis nucamenti modo caulem eius per interualla uestienti- bus, & ex quibus flos prodit breues aculeos natura illi seruasset. Quod ceteri interpretes cōmuni & uulgari græcorum codicum lectione decepti, ad Hyacinthinum colorem retulerunt: cum ad spinas referendum esset: uariisq; legentes, quod est Hyacinthinis, cum ἄκανθῶς dicitur, id est, spinosis & aculeatis legendum esset, nulla Acanthi cum Hyacintho foliorum coloris in flore, nucamenti, aut Spinæ cōmunionem, similitudineue. Descripsit Acanthum Plinius. 22. uolumine, & eiusdē numeri capite, Melamphyllōq; & Pæderota uocari & ipse ait: sed nullā earū uocū causam docuit: p̄sertimq; cur Pæderota eā aliq; dicerēt: quæ tota græca uox est, nec aliud q; puero rū amorē, aut qd a pueris amef significat. Quo magis demiret aliq; qd in Diosc. legit, a Romanis Pæderota Acanthū dici: cū uocis eius, quæadmodū & aliarū illarū græci tm auctores fuerint.

ἀγρία ἄκανθα

De Syluestri spina. CAP. XIX.

Est & syluestris Spina Carduo similis, aculeata, breuior q; quæ in hortis satiusq; pueniat. Cuius radix ad eadē ad quæ supior pollet.

DE Agriacantha, hoc est, sylvestri spina, proxime dictum est, ubi alterum spinę genus sylvestre nominavimus.

¶ De Anonide.

CAP. XX.

ANonis, quam aliqui Onotida appellant, ramos habet fruticosos, dodrante maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitibus rotundis, folijs lenticulę, pusillis ad Rutę, aut pratenfis Loti folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non iniucunde olentibus. Muria conditur anteq̃ spinosa fiat. Cibis gratissima. Rami acutioribus spinis, & ueluti durioribus aculeis horrent. Radicem mittit candidam. Quę excalfacit, & extenuat. Huius cortex ex uino potus, urinam ciet. Calculos comminuit. Margines ulcerum erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium collutione mitigat. Decoctum eius potu hæmorrhoidas sanare creditur.

BARBARI COROLL.

Anonis, & Ononis quandoq̃ dicitur, ut Galeno Theophrastocq̃, spinosa post uer, folio rutę, aculeata, ramis ut Tribulus. Nascitur solo culto, præcipueq̃ in segetibus, aratro inimica, uiuaxq̃ unice. Propagat se in annos, ideoq̃ runcanda & extirpanda tota est, cum terra maduit imbris. Germinare incipit æstate, a frugibus perficitur autumno. Durat anno folium toto caule per interualla collocatum, ut corona. Flos mutilis in filiqua, nec conspectus. Est & alia Ononis, cognomine Flomitis, quę a Dioscoride Onosima dicitur, quanq̃ sunt qui Onomida, non Ononida uocent, hoc uolumine a nobis reddendam. Ononim porro dictam Photio uult, q̃ asinos se ad illam terentes & scabentes iuuat. Plinius Anonin similem Fœno Gręco, Dioscorides Loto fenarię, aut Rutę faciunt, ut æstimare liceat, Lotum fenariam, cum Fœno Græco eandem uideri, aut persimilem.

Pli. li. 29. ca. 4.
The. libro. 6.

EX M. VERG. COMM.

Inter aculeatas plantas omnib. facile cognoscenda quotañis renascit Ononis, unice uiuax, & in annos ipsa seipsam propagans: nisi cū terra imbris maduerit totā runcauerit & extirpauerit diligēs agricola. Frondet ea uiuitq̃ in aruis, sed lætior in proscisso iteraroq̃ agro surgit, labore hominū ut ceterę fruges & ipsa pficiens: nihilq̃ aliquibus locis hac peste frequentius: quę non solū pedibus ingredientiū aculeis suis nocet, sed aratorē etiā remorat, aratro inimica, & ille implicans. Descripserunt Ononin antiquiores oēs qui de medica materia, aut de plantis aliquando egerunt, sed unus omniū felicissime Theophrastus, s. de plantarū historia uolumine.

¶ De Leucacantha.

CAP. XXI.

LEUCACANTHAM quidam Polygonaton, alij Phyllon, alij Ischiada uocant, Romani Spinam albam. Radice Cyperi ualida & amara. Quę manducata, dolorem dentium sedat. Veteri laterum dolori, atq̃ ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex uino poto. Eadem ruptis & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eodem præbet effectus.

λευκακανθα

BARBARI COROLL.

Leucacantha, siue Leucacanthos, ab Acantha Leuce differt, ut sæpenumero cōmonui: priorem gręce Plinius fere appellat: posteriorem latine Spinā candidā, id est, Acanthā leuce.

EX M. VERG. COMM.

VNo, eodemq̃ breuissimo capite Plinius, 22. uolumine omnem Leucacanthę huius historiam & medicinam complexus est: dicendum ideo nihil nobis aliud superest, q̃ ex similitudine aliarum plantarum Polygonaton Phyllon, & Ischiada dictam ab aliquibus fuisse: quemadmodum ex earum plantarum historia cognouisse licebit: in quarum singulis aliquid est q̃h Leuca-

D iiij

Canthæ huic æquale, aut commune sit. Sine caule, sine flore, sine Echino spina hæc est, folijs longis, aculeatis, Lactuæ similibus.

τραγάνθη

De Tragacantha. CAP. XXII.

Tragacanthæ radix lata & lignosa, summo cespite nititur, furculos humiles, robustos, latissime fundens, in quibus minuta folia, nonnunquam tenuia exoriuntur. Quæ sub se spinas albas, relictas, & firmas occulunt. Est etiamnū Tragacantha lachryma, quæ, uulnerata radice manans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, sincera, & subdulcis. Cutis spiracula ut gummi obstruit. Huius increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas uoces, cæterasque destillationes, cum melle in delinctu. Subdita quoque linguæ, liquefcit. In passo madefacta drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & uesicæ rosiones, mixto cornu cerui usto & eloto, aut scissi aluminis momento.

Pli. li. 13. ca. 21.

BARBARICOROLL.

Tragacantha, siue Tragacanthos, radicem spinæ albæ continet: in Creta nasci tantum creditur. Sed & in Achaia, & apud Medos quoque prouenit, in Arcadia largissime: nec Cretica deterior, aspectu tamen prælata: lachrymam non incisura, sed sponte manando spissescere Theophrastus existimat. Precium Creticæ in libras. 13. apud quam uidelicet & dignatio remansit.

EX M. VERG. COMM.

In quotidiano medicinæ usu Tragacantha est: utque omnes lachrymā passim nouerūt, sic peregrinam Italiæ stirpem. Si Theophrasto credimus, pauci nouisse nunc possunt in Creta, Arcadia, Peloponnesi Achaia, & Asiæ Mediā nascentem. Quo magis græcos demiretur aliquis, qui natam apud se plantam, & plantæ lachrymam corrumpi in hoc scriptore permiserint, perireque legitimam & necessariā eius in sole densationem. Quo enim loco hic ait, Vocatur Tragacantha etiam sectæ radici inherens lachryma, &c. defunt necessariæ uoces aliquot, quibus doceatur, sectam radicem spinæ huius lachrymam mittere quæ in sole densetur.

ἐρύγγιον

De Eryngio. CAP. XXIII.

Eryngion aliqui Eryngen, alij Caryon, alij Gorginion, alij Heronion, alij Origanum, Chlounion, alij Myracanthos, alij Moly, Aegyptij Crobyson, Magi Siserton, Romani Capitulum Martis, Daci Sicupnoex, Hispani Centumcapita, Aphri Cherdam, alij Oriam Chloem, alij Chida appellant. Aculeatarum generis est. Cuius folia in principio sale condita, in cibos recipiuntur. Lata autem sunt & extremo ambitu aspera, gustu aromatica: quæ cum adolefcunt, per multas caulium prominentias spinose inhorrescunt. In quorum summitatibus, globosa capitula, durarum acutissimarumque spinarum ambitu stellatim circūuallant: quorum colos alias uiridis, alias albus, interdum cæruleus inueniunt. Radix oblonga, lata, foris nigra, interne candida, pollicis crassitudine, odorata. Nascitur in asperis, & cæpestribus. Vim habet calfactoriam. Pota menses & urinas pellet. Tormina, inflationesque discutit. Contra iocinerum uitia, serpentium morsus, & hausta uenena, cum uino prodest. Bibitur aduersus plurima, cum seminis Pastinacæ drachma una. Appensa illitaue tubercula discutere proditur. Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis, & comitialibus medetur.

BARBARICOROLL.

Eryngion, clara in primis aculeatarum herba est. Genera eius duo, albicans, & nigricans. Priorem Græci Hecaton cephalon, nostri Centumcapita uocant, omnes caule & radice in cibos græcorum receptæ, utroque modo, siue coquere libeat, siue cruda uesci. Radicem eius, alter utrius sexus similitudinem referre prædicant. Raram inuentu. Et si uiris contigerit mas, etiam amabiles fieri. Ob hoc Phaonem Lesbium dilectum a Sappho. Ipsa dura, fruticosa, caule geniculato, cubitali maiore aliquando, & satiuā quidem est: sed & sponte nascitur in asperis, & saxosis, & in littoribus maris, durior nigriorque, folio Apij. Sub solstitio colligi eam iussere quidam. Sunt qui & Acanon Eryngion ascribāt, sicut & Glycyrrhizam falso Asclepiades, ut meminuit Aetius, Eryngion cui Orion, hoc est, montani cognomen est, folijs describit paruis & angustioribus, flore aureo, & oculi figura. Ex Eryngij radice Gallia Cisalpina confectionem cum fæscaro, aut melle condit, Eryngiatum uocatam.

Si Eryngij caulem, ex grege ouis, capellæ aliquæ morfu defectum ore substulerit, totus statim subsistit grex, relictoque pascendi studio, nouo ueluti spectaculo attonitus, non prius admiri rem desinit, quam accedens pastor caulem illum abstulerit: abiectoque longius, inutile gregis sui ocium, ea ratione castigauerit. Auctores eius rei, Aristoteles primus, qui in nouo grege, & si gregis dux id fecerit, euenire dixit. Post eum Plutarchus, pluresque alij. Quo magis miretur aliquis in huiusmodi re Plinij silentium, qui similia his pluraque alia de candida Erynge tradiderit. Hic enim, ut herbarium decebat, necessarias medicinarum Eryngij uires tantum tradere debuit. Cuius numerantur plures ab hoc scriptore, modo eius sint, appellationes: sed tam incertæ, & ex alijs plantis tam obscure repetitæ, ut nulla hæcenus earum coniectura uti potuerimus. Id tantum monemus: quæ a prima statim sequitur, solo genere in declinatione a priore differre: neutro enim, & foeminino declinatur. Neutro hic, & Græci alij usi sunt: Plinius foeminino, uicesimo secundo uolumine capite septimo his uerbis de ea agens. Et clara in primis aculeatarum Erynge est, siue Eryngion. &c. Idem etiam, quam hic Hispanis Centumcapita tribuit, Romanam suæ ætatis appellationem fuisse testatur, sed candidam tantum ea uoce uocari solitæ. Græci etiam eadem ratione *κατονιφαλον* a numero capitum dicunt. Quæ deinde Myracantha inter alias numeratur, a ui & radice odore facta est. Nihil enim aliud quam odoratam spinam ea significat uox, Cæteræ quales illic leguntur, tales alijs relinquuntur. Notum nunc etiam Eryngium est, pluribusque locis in Italia antiquum seruat nomen & usum: melleque seruatur radix eius, nec habet ingratum in cibis saporem.

A
Pli. li. ii. c. 21.

VERG.

B

De Aloe.

CAP. XXIII.

ALOE ALIQVIBVS Amphibion, alijs Herminion, alijs Eryngion, alijs Tragoceros, Romanis Aloa, Barbaris Aloe dicitur. Cuius folium Scyllæ similitudinem habet, crassum, pingue, latum, rotundum, retrorsus pandum. Folia utrinque gerit, ex obliquis spinosa, rariuscule striata, breuiā. Caulis emittitur non dissimilis Antherico. Flos albus. Fructus Hastulæ regię cognatus. Graui tota est odore, & gustu amarissima. Radice una, cœu palo in terram depacta. Plurima, præpinguisque in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nasctur etiam in Asia, & Arabia, in insulis quibusdam & maritimis, ut in Andro, minime succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda uulnera sane quam utilis, si detrita illinatur. Duo succi genera. Quoddam harenosum, quod fidens crassamentum purissimæ esse uidetur. Alterum ad iocineris imaginem uergit. Eligi debet syncæra, quæ nihil doli sentit, nitida, calculorum expers, rufi coloris, friabilis ac iocineris modo coacta, facile liquefscens, eximie amaritudinis. Improbatur nigra, & fractu contumax. Gummi eam adulterant, quod deprehenditur gustu, amaritudine, & ualido odore. Eoque argumēto, quod digitis friata non ad minima usque fruat.

D iij

D I O S C O R I D I S

Csta resoluitur. Nec defunt qui Acaciam immisceant. Natura eius est spissare, exicare, somnium allicere, & corpora densare, aluum resolvere. Stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua frigida, aut lacte pota. Sanguinis reiectiones sistit. Regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu. Deuorata cum resina, aut cum aqua, uel melle cocto sumpta, aluum soluit. Purgationis perfectæ causâ tribus drachmîs sumitur. Alijs purgatorijs medicaminibus ammixta, præstat ut minus stomachum infestent. Sicca glutinandis uulneribus inspargitur. Vlcera ad cicatricem perducit, cohibetq;. Eadem peculiariter ex ulceratis genitalibus medetur. Disrupta infantibus iungit. Condylomata, rimasq; sedis ex passo sanat. Hamorrhoidum abundantiam, & sanguinis eruptiones sistit. Pterigia ad cicatricem ducit. Liores & insignita, ex melle tollit. Priuatim scabras, lippitudines, pruriginisq; angulorum permulcet. Dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo. Capillum fluentem continet, cum uino. Tonsillis, gingiuis, & omnibus oris ulceribus, cum melle & uino proficit. Oculorum medicamentis torretur, in munda & candenti testa, pennaq; subinde uersatur, ut possit æqualiter torreri. Lauatur, ut quod sit harenosissimum, tanq; inutile subsidat, & leuac pinguißimum assumatur.

B A R B A R I C O R O L L

Pli, li. 27. ca. 4.

ALoe laudatissima ex India, post ex Syria Coele, ut Galeno placet, & Arabia. Improbatur e Syria, quasi multo dilutior & languida. Serit eam Asia, in turbîbus cadorû, ut Sedum maius. Caulis eius tener rubet medius. Inuenitur & per se lachryma adhærens: ob id pauimentandum, ubi sata sit, præcipiunt: ne lachryma quæ manat, absorbeat. In Iudæa super Hierosolyma, fossilem gigni, & metallicam, fuere qui traderent, omniû deterrimâ, humidissimâ, nigram. Negat id huius operis præfatione Dioscorides. Familiarè constrînîs Aloen, nemo ignorat, Virentem semper, propter Semperviuû marinum, appellatâ uulgo, Aloidarium uero, medicina dicitur ex Aloe, ad uentrem soluendû, in Oribasio, Philagrîo, Aetio.

E X M. V E R G. C O M M.

ASpinis, quas cõmunès Aloe cum Eryngio habet, Eryngium & ipsa ab aliquibus dicta est, sed mala similitudine: quando in cæteris nihil dissimilius q; Eryngium & Aloe uidetur. Fuerunt etiam qui Amphibion hanc dicerent: quod nisi eadem illa ratione dicatur, qua in genere animalium Amphibia a græcis aliqua dicantur, incertam nobis causam habet. Sunt autè græcis Amphibia, quæ communem & ambiguam in utroq; elemento, terra, scilicet & aquis uitam degunt: qualem hic Castora secundo uolumine descripsit, & quales multæ aues ubiq; sunt. Pateruntq; aliqui sic Aloem uocasse, q; procul a mari, & maritimis locis, ut hic ait, pariter nascitur: & si ut Amphibios diceretur, non satis discrimen id fore uideri possit. Neq; enim diuersa elemento sunt maritima, & quæ procul a mari distant. Orminion ab aliquibus dicta Aloe pariter fuit, q; utraq; altiore caule est: & quemadmodum Aloe in folijs aculeatas eminentias magis q; spinas habet, sic & Orminium, ut in historia eius certius patebit. Tragocerota postremo eandem Aloem certiore similitudine aliqui appellarunt: ab hircorum cornibus facta appellatione, quibus folia eius quantitate, longitudine, figuraq; apposite respondent. Est & inter appellationes has illud animaduertendum ex antiquissimorum græcorum fide, non dixisse nos in foliorum Aloes historia, habere eam utrinq; folia ex obliquo spinosa, sed utrinq; spinulas. In melioribus enim legitur *ἀνδροειδῆς*, id est, spinulas, non *ἀνδροειδῆς*, quod commune nobis cum Barbaro est, & si naturæ rei: id non magnopere interfit.

De Absinthio.

CAP. XXV.

ABSINTHIUM aliqui Bathypicron, Aegyptij Soma, Romani Absinthium. Herba uulgo cognita. Præstantius in Ponto & Cappadocia. In monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi & adstringendi. Bilem expurgat, quæ & stomacho & uentri inhæsit. Vrinam cit. Crapulam præsumptum arcet. Ad inflationes uentris, & stomachi dolores prodest, cum seseli & nardo gallico potum. Fastidia discutit. Arquatos sanat in defæcti dilutum, aut decocti ius, cotidie tribus cyathis haustum. Menses cit potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. Aduersatur Ixiæ uenenis cum uino, Item cicuta, & muris aranei morsibus, & draconis marino. Anginæ eo cum melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad sugillata, & oculorum caligines ex melle illinitur. Item auribus, si manat sanies. Dentium, auriumque dolores decoctum, uaporis suffitu compescit. Decoctum in passo, dolentibus oculis oblinitur. Item præcordijs & iocineri, tritum cum cærato cyprino. Stomacho quoque longa ualitudine laboranti cum rosaceo. Cum ficis autem, aceto & Erui farina, aquæ inter cutem lineosque subuenit. Vinum ex eo fit, quod Absinthiten uocant, præsertim in Propontide & Thracia, quo ad antedicta utuntur, cum febris carent. Alioquin in æstate propinant, & acceptam huic uino incolumitatem referunt. In sparsum arcis Absinthium, uestes ab erodentium iniuria uindicat. Culices eo, & oleo perunctis abigit, & a corpore arcet. Atramentum librarium diluto eius temperatum, literas a murium erosionem tuetur. Existimatur liquamentum eisdem præstare effectus. Attamen potionibus improbat: quoniam stomachum male habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta Amurca liquamentum adulterant.

BARBARI COROLL.

Absinthii frigidis prouenit. Latinarum ferijs certabant in Capitolio quadrigæ, uictorque Absinthii bibebat: sanitate interpretantibus in eo præmio maioribus. Poetæ Græci sunt, qui Absinthium quandoque dixerint. Hippocrates, Absinthium Cyprium commendat.

De Marino Absinthio.

CAP. XXVI.

RBSINTHIUM Marinum, quod aliqui Seriphum, Latini Centonicum uocant, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam, & in Taphysiri Aegypti gignitur. Quo Asiatici pro Oliuæ ramo utuntur. Herba est tenuis, Abrotoni parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. Ea grauiter olet, & cum quadam calfactione adstringit. Id per sese, aut cum Oryza coctum, interaneorum animalia, teretesque tineas, adiecto melle enecat. Aluum laxat. Cum edulio autem, uel lenticula decoctum, eadem præstare potest. Pecora maxime pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus Absinthio assignatur, quo Galatia Alpibus finitima scatet. Id patrio nomi-

A

αψινθιον

vinum factum ex
Absinthio.

B

Pli. li. 27. ca. 7.
Theoph. li. 9.αψινθιον θα-
λασσιον

Cne Santonicum uocant, regionis in qua nascitur cognomento, Absinthio non dissimile, uerum subamarum est, non adeo seminis fecundū. Eadem quæ Seriphium potest.

B A R B A R I C O R O L L.

Absinthium Seriphion, siue Seriphon, angustius priore, minusq; amarū. Absinthij genera plura. Vulgare, siue Ponticū, de quo diximus. Seriphium, id est, marinū, de quo hic agitur. Ponticum a Ponto ueniens, ubi pecora pinguescunt illo, & propterea sine felle reperiuntur, neq; aliud præstantius, multumq; Italico amarius, sed medulla dulci. Tertium Santonicum a Gallia ciuitate appellatum. A Columnella uero Santonica herba dicitur.

De Santonico, proxime dictum est. Illud notatu dignum arbitror, Santonicum Absinthio similius describi, quam Seriphium, aut quod idem est, marinum: quoniam marinum Abrotoni potius, q̃ Absinthij figura demonstratur ab Dioscoride ac Plinio, ut prædixi. Recentiores contrarium decernunt. Et sane uidentur haud falsa dicere: Marinum, siue Seriphium docentes Absinthio q̃ Abrotono similius, Santonicum Abrotono, q̃ Absinthio. Marinum certe, id quod passim in littoribus, & secus mare nascitur, sapore salso, & folio albicāte, notum omnibus, nihil fere commune cum Abrotono. Galenus quoq; Seriphium inquit, & conspectu & gustu Absinthio simile est, præterq; q̃ minus linguā adstringit, q̃ Absinthium, sed plus excoquit, & cum quodam salis gustu, amarum sentitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Tria diuersis locis a Plinio etiā Absinthij genera numerantur, Ponticum, Santonicum, & quod Seriphion, siue Marinū a cunctis uocatur, religioni in Aegypto consecratū, cōmune & ubiq; proueniens. Ponticum est, a regione, in qua optimū nascitur, bonitatis magis q̃ naturæ merito inuenta appellatione. Hoc in Dioscoride legitur Rusticum a Romanis uocari: sed nullā habet ea appellatio rationē. De Santonico hic certissime egit, quondāq; in honore & nota Absinthij gentis nomen id fuit, ut cum cecinit ille, Santonica medicata dedit mihi pocula uirga.

DQua parte autē Santones in Gallia ultra Alpes quondā fuerint, & adhuc sint, omnibus patet. De Seriphio, quod & Marinū dictum quondā est, duobus locis Plinius egit lib. 27. cap. 3. his uerbis. Est & Absinthiū marinum, qd quidam Seriphium uocant, probatissimū in Taphosiri Aegypti. Huius ramū liliaci præferre solene habent, angustius priore, minusq; amarum, stomachoq; inimicū. Iterumq; lib. 33. capite. 1. quo loco de eo sic ait. Nascitur & in mari Absinthium, quod aliqui Seriphium uocant, circa Taphosirim Aegypti maxime, exilius terrestri. Quæ id eo repetita a nobis hoc loco sunt, ut quæ a principio capitis huius incerta, aliundeq; repetita, & mixta simul difficilem habent intellectum, legentibus certiora fierent: intelligerentq; omnes, ex Pontico Absinthio ad Seriphium, siue marinū hæc translata esse, quæ in alijs leguntur. Largissime in Cappadocia, & monte Tauro prouenit. Quæ Pontica sunt, & superiore capite, uulgari Absinthio in censu bonitatis ab hoc ipso dicta. Cum probatissimum in Ponto & Cappadocia nasci ait. Miscere enim diuersa hoc est, intellectumq; rerum adeo confundere, ut nullus possit huius scriptoris usus esse. Qui enim potest Seriphia herba, & ad mare nascens in Cappadocia, & Tauro monte inueniri? Ideoq; nos omnem eam partem, ueluti inutilem, omnemq; illic sensum turbantem expunximus.

¶ De Abrotono.

C A P. XXVII.

Abrotonum aliq̃ Abutonon, aliq̃ Absinthium, aliq̃ Heraclion, aliq̃ Cholopœon, aliq̃ Absinthiomenon, aliq̃ Theliphthoricon, aliq̃ Procampylon, Magi Neura phoenicos, aliq̃ Cynanchiten, Romani Absinthium ponticum, nonnulli Thelythamnium, aliq̃ Glycyn ancona uocant. Duorum est generum. Fœmina quadam arboris specie fruticans candicat, circum ramulos folijs Seriphi modo minutim incisis. Floribus referta est, comantibus in summo fulgore auri corymbis. Quod per æstatem prodijt, suauiter olet, cum grauitate quadam & amaro gustu. Id geminus Siculum esse constat. Alterum mas uocatur, sarmentosum, tenui semine uti Absinthium. Plurimū in Cappadocia gignitur & Galatia Asia

*Abrotonon
Germanice
Anbrun.*

tica, atq; in Syriæ Hierapoli. Crudum semen, tritum & fertiefactum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, urinae angustijs, mensibus suppressis, aut remorantibus. In uino potum exitialem uenenorū antidotum est. Rigoribus ex oleo illinitur. Serpentes & substratu & nidore fugat. Contra ictus eorū cum uino potum prodest. Priuatim efficax contra scorpionum & Phalangiorum uenena. Oculorum inflammationibus commode illinitur, cum cotoneo cocto, aut pane. Tritum cum farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit. Iri ni compositionibus ammiscetur.

B A R B A R I C O R O L L.

A Brotonū campestre, ac montanū. Hoc foeminā intelligunt, illud marem. Amaritudo Abinthij in utroq;. Vacuum sponte prouenit, cacuminē suo se propagans. Seritur quoq;, sed melius semine, q̃ furculo, aut radice. Numerosum eius semen. Radix una, quæ alte descendit, ceteris in summo terræ leuiter hærentibus. Floret cum Fraxino. Siculū laudatissimū, dein Galaticū. Pamphilus, Abrotonū a Romanis Santonicū appellari credit, a Galeno reprehensus. Græcū uulgus, a contrario Melitinē uocat Abrotonū, sicut semen acrius, & ab interitu tinearum Helminthoboronom, Dioscorides a quibusdā Thelyphthoron, & Thelythānon, & Glycyna Aconna dicit appellari. Saneq; uidetur ij ad historiā, & uetus prouerbiū respicere. Ea est huiusmodi. Lydi gens in libidinē effusissima, foeminas ingenuas constuprare in hortis, ad hoc flagitiū questis, amoenitatibus excultis, aliquādiu impune solita est. Demū Omphale mulier, dominatione haud magno negotio, effeminatis & luxu diffluentibus excussa, imperitare cœpit ipsa; ubi eos cruciatibus uarijs affectos, ulta est, in uxores eorū desēuit: inclusas enim eas, eisdem septis prostituit seruitijs. Inde uiridario nomen, Glycys ahecon, quod & Thelyphthori, & Thelythamni uocabulo significatur, ceu Abrotono consitus fortasse locus esset is.

Pli. li. 27. ca. 7.

De Hyssopō.

CAP. XXVIII.

Hysopum aliqui Later uocat, alij Cassialam, Aegyptij Pesalem. Hærbæ nulli non cognita. Duum generum est, montanum, & hortense. Optimum est Cilicium. Vim habet extenuandi & calfaciendi. Decoctū cum ficis, aqua, melle, & ruta, potumq; peripneumonicis, diuturnæ tussis, suspiriosis, destillationibus & orthopnoicis auxiliatur. Tinē as enecat. Idem facit, si cum melle delingatur. Crassum humorem per aluū extrahit, decoctum ex aceto mulso epotum. Ad subducendam aluū cum ficis uiridibus detritis manditur. Vehementius addita Iri, Cardamomo, aut Irione, derjcit. Colorem in corpore fouet. Lienī, & aquæ inter cutem, cum fico, nitroq;, inflammationibus quoq; ex uino illinitur. Cum feruente aqua impositū, sugillata discutit. Cum decocto ficorum optime anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto, dentium dolorem in collutione sedat. Inflationes auricularū uaporis suffitu discutit.

B A R B A R I C O R O L L.

Hysopum, siue Hyssopus. Præfertur Hippocrati Cilicium, sed e Tauro monte; Dein Pamphilum, & Smyrnæum.

Pli. li. 27. ca. 11.
lib. 26. ca. 11.

E X M. V E R G. C O M M.

Non negligendi usus in medicina Hyssopus est: quā inter cætera hic ait aluū multo efficacius purgare, additis Irīde, aut Irione: aut ut cæteri interpretes uerterunt, Cardamomo: ut autem nos ueterū codicum fide admoniti, Nasturtio. Multa enim, quoniā facilis lubricusq; est salpūs a Cardamomo ad Cardamum, quod Nasturtium est, duarum huiusmodi uocum inter se in scriptoris huius, nouis & antiquis codicibus commutatio & alternatio est. Nobis præ-

Cter meliorū codicum fidem, aptius ad deſciendā aluum Naſturtium q̃ Cardamomū etiam uſum eſt. Siq̃dem in Cardamomi decretis nihil q̃d ad hunc uſum p̃tineat, in Naſturtio aut̃ legitur, & inter cæteras eius uires numeratur aluū turbare, q̃d a deiectione eius non longe abeſt.

De Stichade.

CAP. XXIX.

σιχάδω

Stichas, quā aliqui Syncliopa, alij Alcibiadem, alij Pancration, nonnulli Styphoniā, Aegyptij Suphlo, Magi Pythonis oculū, Romani Sciolebinam uocitant, iuxta Galliam in inſulis eiſdem nominis, e regione Maſſiliæ gignitur, unde cognomentū accēpit, Herba tenui ſemine, coma Thymi, longiore folio, ſubamara guſtu, & aliquātum acris. Cuius decoctū Hyſſopi modo ad pectoris uitia efficax eſt. Antidotis miſcetur. Viſcera omnia, & uniuerſum animantis habitum extenuat.

Pli. li. 17. ca. 12.

Stœchas, odorata herba Hyſſopi, aut Thymi coma. Confudere quidam recentiorum Stœchaden cum Stachye, Item cum Santonico Abſinthium.

BARBARI COROLL.

Maſſiliam incolentibus cunctis notiffima Stœchas, eiſq̃ gentis mulieribus poſt puerperitiū in quotidiano uſu eſt. Siq̃dem incenſa, Stœchadis ſuffitu a partu ſtatim adhuc confirmat, præteritū puerperij laxamenta, omnemq̃ corporis infirmitatem. Quæ eius uires in græcis aliquot non legūtur. Verūtamen reſtituendæ huic capiti fuerūt, propterea q̃ in antiquioribus & melioribus adhuc legūtur. *ἡ φράσις λεπέται, ῥόπις καὶ ῥώννους.* Quinetiam Paulus Aegineta in. 6. has illi uires præcipue tribuit, *σιχάδω ἡ φράσις, ῥόπις, ῥώννους: τὰτε ἀσλάχνα καὶ ὅλην τοῦ ῥώννους ἔστιν.* Quod eſt. Occludit Stœchas, abſtergit, confirmat interanea, & torum animalis habitum. Quorum aliqua in impreſſo non leguntur: ideoq̃ cum pleriq̃ alijs a Barbaro relictæ, quoniā quod Dioſcorides codice ille utebatur, nihil huiſcemodi habebat: ſed ex meliorum codicum fide, & Paulo Aegineta reſtituenda erant. Quod nos fecimus.

D

De Origano.

CAP. XXX.

ὀρίγανος ἡρακλιδωτικὴ καὶ χοχίλη

Organum Heracleoticum, quod & Cornelion uocant, folium habet Hyſſopo non diſſimile, umbellamq̃ non in rotæ ſpeciem orbiculatam, ſed ueluti multifidam, ſemine in ſummis uirgis haudquāquam denſo. Excalfacit. Vnde decoctum cum uino potum demorſis a ſerpente conuenit. Si cicutam, aut meconion hauſerunt, ex paſſo: ſi giſplum, aut ephemerum, ex aceto mulſo propinatur. Ruptis, conuulſis, hydropicis cum fico eſui datur. Aridum acetabuli menſura potum in aqua mulſa, atros humores per aluū extrahit. Menſes ciet, & tuſſi cum melle linctum medetur. Ad pruriginem, pſoras, regiumq̃ morbum decocti ius, in balneis prodeſt. Succus uirentis tonſillas, uuam, & oris ulcera ſanat. Et per nares ex oleo irino inſuſum trahit. Aurium dolores cum lacte mulcet. Conſicitur ex eo & cepis & rhois frutice quo ad obſoſia utuntur, uomitorium medicamentum, his omnibus in cupreo uaſe per tricenos dies inſolatis, dum caniculæ ſyſtus ſagrat. Hærbæ autē ſubſtratu ſerpentes fugantur.

Pli. li. 21. ca. 10. lib. 20. ca. 14.

BARBARI COROLL.

Organum, nigrum, & candidum. Priori nullum ſemen, candido perq̃ minutum. Id autē cui odor eſt, Creticum uocatur. Negant in Arcadia erumpere, quo ſtatu a mari non accedit. A ſatu non ante trigeliſmū diem emicat. Folia ei cadunt a cacuminibus. Aemulus Thymbæ, hoc eſt, Cunilæ uocatæ ſapor. Nunq̃ utrumq̃ additur, quippe ſimilis effectus. Origanū ei tamē dumtaxat Aegyptiū præfertur. De Cunilæ tribus generibus, in Thymbra diſputabitur:

sicut de Cunilaginis quatuor in Conyza. Origanum tam pertinaci cum Brassica dissentit odio, ut arefaciat, sugatque aduersum. Origani multa sunt nomina. Heracleoticum, quod a nostris Cunilaca, siue quod magis probò, Cunila Gallinacea uocatur, ab Heraclea Ponti dictum, uel Plauto teste in Triumfo.

In Ponto inquit, ubi Absynthum fit, & Cunila Gallinacea.

Sub qua tam Creticū, quā Aegyptium intelligunt, de qua praesens mentio. Deinde est Origanū Onitis, de quo proxime differendum est. Tertium Heracleoticū syluestre. Quartū Tragoriganū. Eius duae species a Dioscoride redduntur, quae a Plinio tribuuntur sunt Heradio. Non est autem omnino idem, Heracleoticū, & Heradium. Prius inter Cunilas accipitur a nostris, posterior pro Tragorigano sumptum uidetur a Dioscoride. Origanum, & Origanus dicitur, producta quae ante ultimam est syllaba. De syluestri & Tragorigano statim prodetur.

EX M. VERG. COMM.

Prima Origanus illa ab Heraclea Ponti ciuitate, bonitatis notam & laudem nominis eā inuenit; dictaque Heracleotica est, ut gentis cognomine illo, a syluestri, & ab Onitide distinguere tur, & prima probaretur. Quae itidem causa fuit, ut Heradios eadem diceretur; quod Plinius 20. uolumine, cap. 17. indicat; & si hic uideatur tertium illud & agreste genus potius Heradium uocare. Deerat in aliquibus graecis Heradij illa uox; nosque eam ex meliorum codicum fide huic scriptori restitimus. Fecimusque id autore Nicandro in Theriacis suis: qui non tantum πανάκτιον κοιλίαν eam uocari tradidit, uerū ἡράκλειον ὀρίανον. Versiculi eius sunt, πανάκτιον κοιλίαν ἡν τε καὶ ἡράκλειον ὀρίανον ἀμφερίπνοσι. Adiecitque antiquissimus eius interpret ex autoritate Dioscoridis, Cunilam ab aliquibus Heradium uocari & Origanum, ab aliquibus autem syluestrem Origanum: & Panacem, siue Panactiam, quae omnibus morbis medeatur: nihilque Onitidis eius, quae secundum genus huic scriptori facit, aut Nicander, aut interpret eius meminerunt. Vocavitque Dioscorid. Panacem agrestem illam tantum, quae sibi tertium genus facit, cum tamen Nicander priorē illam ea laude ornauerit. Quae omnia, quod paulo ante dictum a nobis est, indicant, non posse in tam diuersa de Origano tradentibus antiquis scriptoribus, certum aliquid constitui. Nihil etiam in Plinio, multis locis, minus certum Origanos et Cunilas plures quam hic, Theophrastusque, et aliter tradente, graecisque aliquando nominibus, aliquando latinis, nulla certa ratione utente, praefertimque in Cunila. Quae graeci uocant κοιλίαν, pene eadem multis locis legentes, merito suspendit. Ob eam causam nos nihil censere ausi, nihil maluimus quam quod nesciremus dicere. Eam hic scriptor ait μέλαινα κατὰ κοιλίαν ἄγειν. quae si uerbum de uerbo ueritas, nihil significabunt aliud, quam per aluum nigra ducere Origanum. Plinius de Origani uiribus & medicina libro. 20. cap. 17. agens, extenuare eam ait crassiores pituitas & nigras: eumque imitatus Barbarus, extenuare per aluum, & ipse pituitas nigras dixit. Nos alios omnes secuti, nigra illa ad atram bilem tantum contraximus, nullibi pituitam nigro colore tradi simpliciter inuenientes: in quo posterioribus medicis subscribentes, qui omnes melancholicos humores purgare Origanum dixerunt, certius rem docere arbitrati sumus.

De Onitide. CAP. XXXI.

Quae Onitis appellatur, candidiore est folio, non dissimilis Hysopo. Semen ueluti coniunctos corymbos habet. Vis ei Origani Heraclei, sed multo inefficacior.

Barbari Coroll. Origanum Onitis, siue Prasson. Quidam & Ornithis, quasi Gallinaceum dixere, sed genus illud Heracleoticum uocari cerno: quemadmodum proxime indicatum est.

De Syluestri Origano. CAP. XXXII.

Syluestre Origanum aliqui Panaces Heracion, alij Cunilam uocant, ex quibus est Nicander Colophonius. Folijs est Origani, ramis tenuibus palmum altis, in quibus umbellae Anethi insunt. Flores candidi. Radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis a serpente, folia & flores ex uino poti, auxiliantur.

Barbari Coroll.

In primo genere quod Heracleoticum uocatur, Galenus Origanum syluestrem, Panaces Heraclei.

D I O S C O R I D I S

Craction, & Cunilam quoque dici solitum affirmat.

αργύριον

De Tragorigano. CAP. XXXIII.

Tragoriganum tenuis frutex est, sylvestri Serpyllo, aut Origano similis, folio & ramulis. Quibusdam in locis uirentius inuenitur, & latioribus folijs, satis glutinosum. Alterum exilibus furculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui Prassium uocauere. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio, Cooque proueniens. Omnia excalfaciunt. Vrinam cient. Aluo accommodatur. Decoctio potu bilem deiciunt. Lienosis ex aceto bibere prodest. Contra pota ixiæ uenena in uino bibuntur. Menses trahunt. Peripneumonicis, tussientibus, ex melle in eclegmate dantur. Grata ac mitis eorum potio est. Quare cibum fastidientibus, & stomacho acide ructanti, imbecilloque traditur. Item si a maritima iactatione nausea, & æstus præcordiorum excitetur. Tumores uero cum polenta discutiantur.

BARBARI COROLL.

De Tragorigano dictum est in Origano Heracleotico.

EX M. VERG. COMM.

Doffumus autore Paulo Aegineta, de tam multis Origanis dicere, quod de tam multis antiquorum Dñs sapientiores quondam dicebant: nominibus tantum distingui Deos, unam tñ omnium potentiam esse. Simul em de omnibus lib. 6. is egit, complexusque cunctas, incidere, exrenuare, ficcareque, & calefacere in tertio ordine Origanos omnes dixit: quod parum ab eo abest, si qs dicat nominibus distingui Origanos, omniū tñ similes & easdē uires esse. Quo sensu intelligēda sunt que ab hoc ipso scriptore hoc capite dicuntur, *εργαυτικαὶ δὲ πᾶσαι καὶ ἐν πνεύματι καὶ ἐν κρύσταλλῳ*. &c. Quod est, ut nos reddimus, Omnes calefaciendi uim habent. &c. Plinius tamen Tragorigano priuatim uires quaspiam alias tribuit, quas poterunt uolentes in eo uidere quod diximus uolumine & capite.

αλχων

De Pulegio. CAP. XXXIIII.

Glichona Græci, aut Blechro, alij Arsencantho, Latini Pulegium uocant, Galli Aluolū, Aphri Apoleium, Quidam Galiosolim. Herba uulgaris noticiæ. Extenuat, calfacit, decoquit. Menstrua, secundas, ac partus eiicit. Pulmonis uitia ex melle & aloe potum extrahit. Conuulsis auxiliatur. Nauseas, stomachicque intercisiones, ex postea permulcet. Atram bilem per aluum exigit. Bibitur in uino utilissime contra serpentium morsus. Defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum. Gingiuas arefacti cinere corroborat. Illitum cum polenta, inflammationes omneis sedat. Podagris per se subuenit, impositum usque dum rubescat locus. Cum cærato uaros extinguit. Lienosis cum sale utiliter illinitur. Decoctum eius ablutas prurigines mitigat. Conuersas uulvas corrigit. Contra inflationes duriciasque uulug, in defessiones conuenienter adijcitur. Vocant aliqui Blechona: quoniam dum floret gustatum a pecoribus, balatum concitat.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 20. ca. 74.

Pvlegium, ipso brumali die germinat in carnarijs, refloretque. Ramulis etiam a parente abiunctis ut Scylla. Nascitur hoc etiam non satum. Semel uero satum, diutina ære durat. Magna cum Nepeta & Mēdia Pulegio societas. Formina in eo efficacior, florem habet purpure-

um, Mas candidum. Vtriusq; recens incensus pulices necat: unde nomen Pulegio. Habetur & Pulegium sylvestre, Origano simile, folijs minoribus q̃ satium, & a quibusdam uocatur Dictamnus: occasiōe hinc orta, Dictamnū Creticam Pulegium sylvestre nominātum. Pulegium grāci Glecona, & artice Blechon, sed & Blechon quoq; uocant, ut inq̃t Dioscorides. Ego Blechon Hippocrati, pro legumine quodam accipi uideo apud Galenū. Pulegium (ut dixi) brumalis herba dici potest, quemadmodum & solstitialis aliquæ dicuntur. Plinius, Condurdō inquit, solstitialis herba, flore rubro, suspēsa in collo cōprimit surmas, Plautus q̃q; in Pseudulo. Quasi solstitialis, inquit, herba paulisper fui, Repente exortus sum, repentino occidi.

E X M. V E R G. C O M M.

Quas Plinius uigefimo uolumine, cap. 14. de hoc ipso Pulegio agens, intercisiones uocat, non satis certa nobis indicatione, priuatim ne labem aliquam eius partis sic appeller, an late parentes in hoc scriptore & alijs *Λυγμωρ*, idest, morsus & erosiones. Intulit contra concloni castigationis graui amaritudine græcus sapiens idem Pulegium, quo tempore dissidentibus & lasciuientibus ciuibus suis, in pulpitem progressus, nihil locutus aliud, uerum sola prolata pulte, cum eam Pulegi ramulo identidem miscuisset, e concione abiit: humili quidem, & facile contemnendo præcepto, nisi intellexerit aliquis, nullas comitari frugalitatem ciuium infamations, quod cum polenta Pulegium stomacho præstat: neclasciue petulāterq; aliquid acturos homines, qui paucis contenti, ex horto & agro, non ex macello & foro uitam sibi quesierint: et quas Pulegiū cū posca stomachi erosiones sanat, frugi id uitæ genus, nihil male cogitantes ciues, cōcordiā et cōmunē dignitatē amare cōegerit. Erat, ut ex his cōjungere licet, q̃tidianus in sanitatis usu Pulegi cibis. Seruabātq; id sale aliorū Salgamorū mō, ut autor ultimo sui opis uolumine Columella est. Necq; inmerito tā multos habet in medicina usus, q̃bus & in sanitate utile etiā est.

De Dictamo. C A P. XXXV.

Dictamnū, aliquibus sylvestre Pulegium uocatur, alijs Emba-
cton, alijs Belouacos, alijs Artemedeion, alijs Cretica, quibus-
dam Ephemeron, nonnullis Eldia, aliquibus Belotocos, aut Dorcidia
on, aut Helbunion, Romanis Vstilago rustica. Cretensis hærba est, a-
cris, læuis, Pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodam,
spissaq; lanugine pubescunt. Florem nullum, aut semen profert. Præ-
stat omnia quæ satium Pulegium, sed efficacius multo. Non potum
modo, sed appositum quoq; aut suffitum, defunctos partus eijcit. Pro-
dunt in Creta capras sagittis percussas, huius hærbæ pastu, eas excute-
re. Purgandi uim habet succus illitus, aut cum polenta tritus. Hærba
impactos pedibus, reliquoue corpori aculeos, illitu refigit. Ad lienis do-
lorem efficax habetur. Siquidem ipsum imminuit. Metunt semen æsta-
te & autumno. Radix eius gustu calfacit. Partus accelerat. Succus cū
uino potus, contra serpensium morsus præsidio est. Tanta hærbæ fa-
cultas est, ut olfacta abigat bestias quæ uenenato ictu sæuiunt, appen-
sæque exanimet. Vulneribus ferro illatis, & uenenatis morfibis, infu-
sus succus præsentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in
potu assumatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Dictamnū, nō Dictamnū ex Theophrasto, & Virgilij quodā uersu lego. Ramis hoc p̃tenue,
Pulegio etiā gustu simile. Caulis nullus, radix gracilis & superuacua, & in Creta quoq; nō spa-
ciosè nascit: nec nisi in asperis, quæ uera Dictamnus sit, minimo pōdere, accendēs os; quo argu-
mento a falsa procinus discernitur. Qui legere eam, manipulos in ferula, uel harundine con-
dentes præligant, ne potentia euanescat. Mire a capris expetitur. Dictamnū legitimam in Fe-
licis horto Patruj uidisse crederem, folijs interpūctis, quemadmodum & pingitur, nisi q̃ non
E ij

Δικταμνος

B

The. li. 9. ca. 16

D I O S C O R I D I S

C alibi q̄ in Creta prouenire scribunt. proinde Pseudodictamnnum potius eam fuisse, q̄ Dictamnnum arbitror.

ψευδοδίκταμον

¶ De Pseudodictamo. CAP. XXXVI.

Q V O D Pseudodictamnnum uocant, multis in terris nascitur, antedicto simile, sed minus q̄ illud acre. Eosdem effectus præbet, sed inefficacius multo.

BARBARI COROLL.

Pseudodictamnnum, folio simili, ramulis minoribus, a quibusdam Chondris uocatum. In pinguibus agris nascitur.

¶ De Cretensi Dictamo. CAP. XXXVII.

D Efertur a Creta alterum Dictami genus, folijs Sisymbrij, ramis maioribus. In quibus flores syluestris Origani, nigri, molles. Odor foliorum inter Sisymbrium & Saluiam iucundissimus. Efficax ad eadē, sed uehementius nares ferit. Miscetur emplastris, & medicaminibus quę aduersus serpentū iniurias confingunt, Theriaca uocāt.

BARBARI COROLL.

Dictamnnum hoc neq̄ facie, neq̄ effectū simile uero est.

EX M. VERG. COMM.

D Væ desyderari posse in hoc scriptore uidentur, quæq̄ nobis prima fuit causa, cur omnē Theophrasti de Dictamnīs historiam commentationibus his nostris adijceremus, quibus quod ad eius appellationes pertinet, addendum adhuc est. Artemidion, s. dici Dictamnnum a uenatrice dea Diana, quam Græci Artemida uocant: qm̄ uulneratæ ab ea in uenatione capræ & ceruæ, eius herbæ pastu sanarentur. Quod erat numini in primis gratum, sine maleficio & naturæ iactura, studium & uoluptatem suam amanti. Eademq̄ de causa Dorcidion, quæ si cerualem (dorcada enim græci Inulum, & in ceruorum genere minores) uocāt: quod animal Plinius ait Dictamnnum hanc ostendisse: uulneratis eo pastu, statim decidentibus telis. Fœminino genere hic Dictamnnum ueluti herbā, Theophrastus, pluresq̄ alij neutro tradiderunt. Quę generis mutatio multa in plantis est: non tam quia sexu aliquę a ueteribus discretæ fuerunt, q̄ quia alterutro genere eas antiquissimis appellare placuit: interposita q̄, n, litera Dictamnnum, non Dictamus dicenda est. Inducant id græcorum codices omnes Theophrasti, huius, aliorūq̄ omnium qui forte Dictamni meminerunt. Indicat & poeta noster in. 12. Aeneidos suæ canens. Tum Venus indigno nati concussa dolore, Dictamnnum genitrix Cretæa carpit ab Ida, Puberibus caulem, folijs, & flore comantem Purpureo: non illa Seris incognita capris, Gramina cū tergo uolucres hēdere sagittæ. Nisi enim producta sit eius uocis penultima syllaba, stare uersus non possit. Quod bene, & ex antiqua Dictamni appellatione feliciter dictum, eandem in homine totius naturæ alioq̄ peritissimo diligentiam desyderari sæpenumero nos cōegit: & in Dictamni pictura, quam ille æternam in suo carmine faciebat, tria eius nō misuisse gñā. Quod em̄ in eo est, Dictamnnum genitrix Cretæa carpit ab Ida Puberibus folijs, ex uera ueri Dictamni historia est. Siquidē in Creta priuatim nascitur: & ut hic ait, γναφαλοειδῆ τὰ φύλλα ἔχει. καὶ ἰσχυρὰ τινὰ ἐπιφυσίῳ. Quæ enim hic ait, tomentosa folia, & lanosam adnationem, ille ab hominis lanosa pubertate, felicissime indicauit. Quod uero statim ait, caulem & flore comantem purpureo, non ex ueri Dictamni, sed ex eius historia est, quod Theophrastus tradidit, solo nomine Dictamnū esse Sisymbrij folio maioribus ramulis, nec eiusdem usus, aut potestatis. Quodq̄ hic præterea ait, agrestis Origani flore esse medio inter Sisymbrium & Eleliphacō odore. Dictamnū em̄ cretensem herbam omnes sine caule, sine flore, & ob id sine semine, excepto Theophrasto, descripserunt: q̄ quo diximus loco, semen Dictamnno tribuere uidetur: & si semen, prius etiam florē. quando hic naturę ordo est, ut in cunctis semen ex flore aliquo fiat. Verba eius sunt, χρῶνται δὲ τοῖς φύλλοις, ὅν τοις κλωνίῳ, οὐδὲ τῷ καρπῷ. quod est. Utuntur autem folijs, non ramulis, nec semine. Negat Theophrastus seminis usum: qui negandus non fuerat, si natura illud negasset. Ceteri oēs caulem & florem, & semē in Dictamnno negauerunt. Porritq̄ Maro hunc sequi, & si tantus erit, qui aliorum exemplo, in fabulosa re uoluptati magis q̄ utilitati legētiū cōsulere.

Nec nos aliam ob causam locum indicauimus, q̄ ut legētes moneremus, aliam ex professo ali-
quid scribentibus, q̄ poētis in tradendo rationem esse. His enim suae artis priuilegio agentibus
sibi concessio, licuit, semperq; licebit, non quae optima & ex re, sed quae speciosissima sint dicere.
Est & illud in Dictamno animaduertendum, quod hic ait, facere Dictamnū quaecunq; & sati-
uum Pulegium, non ad omnium malorum remedia referendum esse, sed ad menses, secundas
& partus: quae omnia hic Pulegium ducere dixerat. Indicatq; id quod sequitur statim. Non em̄
potum tantum, sed subditum & suffitum enectos in utero foetus pellit. Quod itidem ab hoc di-
citur, Habet & succus purgandi uim, a Theophrasto sic tantum traditur, Habet Dictamni suc-
cus aliquid Pulegij succo æquale: nihil aliud intelligens, q̄ qd hic in Pulegio dixit. *ἔχει δὲ ἴσην*
κατὰ ποιότητα μελάνην, quod uersum a nobis est, per aluum nigram trahere bilem. Et hæc satis pro
Dictamnīs omnibus dicta hæcenus a nobis sunt.

De Saluia. CAP. XXXVIII.

Eleliphacon, alij Elaphoboscon, aliqui Phacon, alij Ciosmin, a-
lij Phagnon, Aegyptij Becion, Romani Saluiam uocant. Frutex
est ramosus, longus, uirgas habens quadrangulas, & canas. Folia mali-
cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quae sensim attrita-
rum quasi uestium scabriciem referant, hirsuta, subalbida, perq; iucun-
do odore, sed graui. Semen summis in caulibus syluestri Orminio simi-
le gerit. In asperis nascitur. Menses cit, & urinas decoctum foliorum, ra-
morumq; potum. Partus extrahit. Pastinacæ maris icibus auxiliatur.
Capillos denigrat. Vulnerū sanguinem cohibet. Tetra ulcera purgat.
Testium pruritus sedant rami, foliaq; si decocto eorum foueantur.

BARBARI COROLL.

Eleliphacos, ut Theophrastus inquit, differt a Sphacelo: q̄ altera mitior est, altera syluestri
or. Sphacelo folium breuius, & leuius: Eleliphaco squalidius & scabrius. Sed aliter fere Plini-
us. Syluestris inquit lens est Eleliphacos, a Græcis dicta, satia lente leuior, & folio minor, at
q̄ sicciore & odoratiore. Est & alterum genus eius syluestris, odore graui, hæc mitior: nostri q
nunc inquit sunt herbarij, Saluiā appellant, Menthae similem, canam, odoratam. Eleliphacon
sunt qui Hieram botanen, hoc est, faciam herbam cognominent, ut Agrippa, salutarē ad mul-
ta, præsertim ad fecunditatem: ut inde Saluia fortasse a nostris dicta esse uideri possit. In Aegy-
pti Copto, multis pestilentia sublati, coactæ sunt mulieres huius herbae succo ad cōceptū uti.

EX M. VERG. COMM.

Magnæ litis nostra ætate Eleliphacos, quam quondam Plinius Saluiam dici testatur, cū
simili & quasi congener fruticosa herba est, cui a claritate oculorum, quibus prodest, nomen in-
gente nostra factum fuit. Censentibus alijs, quam hic Saluiam uocari a Romanis inquit, alterā
illam mutato in uicem nomine esse. Alijs cōtra nitentibus. In quorum numero non pudet nos
etiam numerari. Neq; em̄ turpe nobis fore aliquando credimus, autoribus Diosc. Plinio, Apu-
leio, Serapione, totq; alijs, credidisse id, & constituisse. Siquidem non uerisimile solum, sed pau-
lominus q̄ necessarium est, testantibus idem tam multis, antiquā plantæ eius eam appellationē
per manus traditam, continua eiusdem rei significatione ad nos peruenisse. Quid enim, ut cete-
ros omittamus, aliquando Plinius apertius docuit dicens: Nostri qui nunc sunt herbarij, Elelif-
phacon græce, latine Saluiam uocant, &c. Aut quis Apuleio non credat, Saluiam toridē quor
Diosco. nominibus indicanti, & in medicina iubenti, ad pruritus uerendorū decocto eius infe-
riores partes fouere? Quod ultimum hic scriptor etiam iubet, dicens finire genitalium prurigi-
nes foliorum, ramorumq; Saluiæ cum uino decoctum, si eo abluantur. Accedunt his deinde
caulis, foliorūq; tam p̄sentes notæ, ut suspicari nemo aliud facile possit. Fruticis nō adeo, p̄cera
altitudo, fruticosus, ramosusq; habitus: quadrangulæ uirgæ, in his & in folijs albicans color:
foliorum tam multis additis exceptionibus similitudo: & quod præcipue contempletur, & ad
hanc rem amert aliquid, attritæ uestis modo aspera: quarum alteri illi aliq; congruunt, huic ue-
ro omnes. Egit Theophrastus libro. 6. de plantarum historia de Eleliphaco hac: simulq; de
congenere illi alia, quam Sphacelon nominauit.

A

ἑλεσιφακόν
ἑλεσιφακόν
ἑλεσιφακόν

B

The. li. 6. ca. 2.
Pl. li. 22. ca. 25

E iij

C

De Mentha.

CAP. XXXIX.

ἡδύσμον μινθῆν

Hedyosmon satiuū alij Mintham, alij Calaminthan, Latini Mentham uocant, alij Nepetam, Aegyptij Tis, alij Perxo, alij Macetho. Cognita hærba est. Calfaciendi, adstringendi, atq; exiccandi uim habet. Sistit sanguinem, potio ex aceto succo. Tineas in uentre teretes enecat. Venerem stimulat. Singultus, uomitiones, choleraeq; sedant, terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet. Mammæ si tendantur, aut lacte turgeant, compescit. Cum sale, canum morsibus illinitur. Aurium doloribus cum aqua mulsa subuenit. Vuluæ ante coitum admota, conceptioni resistit. Linguae scabriciem conficta læuigat. Coire lac, densariq; in caseū non patit, si folia potionibus lactis imergant. In summa, stomacho utilis est. Et in condimentis peculiarem grauiam habet.

The. li. 7. ca. 7.
Pli. li. 19. ca. 9.
lib. 20. cap. 14.
& de planta.
caus. li. 2. & 5.

BARBARI COROLL.

Mentha æstate uiret, hyeme flauescit, humido minus gaudet, semel facta pluribus annis re subili fertilitate durat. Menthae nomen suauitas odoris apud Græcos mutauit (hoc enim significat Hedyosmos) cum alioquin Mintha uocaretur: unde ueteres nostri Menthā appellauerunt, aut fortasse quoniam odore mentem excitat. Theodorus Hedyosmon in Theophrasto Mentham interpretatur, ut a Mintha in eodē autore separaret. De Menthaastro statim prodetur. Galenus porro Mintham quæ sit odorata, Hedyosmon, idest, Mentham uocari tradidit, Mintham uero quæ sine odore sit, Syluestrem esse Mintham, & pprie Calaminthā appellari uoluit. Strabo in Achaia montem esse iuxta Pylum scribit Mintham nomine, a Plutonis pellice in hac herbam conuersa, Proserpinæ inuidia, quæ uocatur inquit a quibusdam Hedyosmos. Ouidius. Femineos hortos in olentes uertere Menthas Persephonæ licuit.

D Quærit Aristoteles in problematis, quamobrem dicatur, Mentham in bello nec edendam, nec ferendam? Soluit. Qm inquit refrigeret, absumendo genituram: sed cum alijs oēs ex calfactione uim Menthae ascribant, fieri potest, ut per se calficiat, per accidens refrigeret: quod & in alijs plerisq; conspicitur.

EX. M. VERG. COM. M.

Solo nomine in græcis Mentha cōmendatur: nec quisq; est qui eo audito, suauitatem odoris in notissima omnibus herba non amet. Id enim Hedyosmos græcis est. Quod ambitiose nescio, an molliter ab eis factum fuit: qui antiqua Minthes appellatione, quæ hominis in eam cotiuersæ honorem haberet, parum contenti, nouo, & quod uitæ tantum delicias indicaret, uliginosis locis feliciter prouenientem herbam nomine ornauerunt. Quo secuta ætas, uoluptatis suæ magis q̃ alieni nominis ambitiosa, libentius & frequentius q̃ antiquiore illo usa est. Theophrastus enim nō alio q̃ Minthes nomine, pluribus locis Mentham indicauit: & ante eum nota Græcia, præsertimq; Arcadia: in qua non procul a Pylo nobilis Minthes cognomine mons fuit: quā Plutonis pellicem poetarum fabulæ, & a Proserpina, ut solent pellices semper odifese uxores, in hortensem Mentham transformatam fuisse narrant, æterno in æterna planta hominis monumento. Quam uocem Romani magis amantes, q̃ in ea male habitæ ob amorem puellæ memoria seruaretur, una tantum & altera mutatis literis græcorum, Minthen, Mentham suam fecerunt. Quotidiani in sanitate usus, & præsentis in medicina contra tot mala remediij. Quam cum Calaminthe, quæ Nepeta est, miscere non decet. Sui enim generis Calaminthe herba est, a Menthaastro statim a nobis dicenda: quæ ab imperitis alijs Menthae appellationibus importune adiecta est.

ἡδύσμον ἡδύσμον

De Menthaastro.

CAP. XL.

SYLVESTREM Mentham Latini Menthastrū uocant, hirsutius folio, et prius maiore q̃ Sisymbrij, grauiore odore. Quare

minus ad sanorum usus expetitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Menthastrū, hoc ē, sylvestris Hedyosmos, aliter a Plinio describitur, foliorū specie a sativa differens, quasi figura Ocimi, colore Pulegij: propter quod quidam sylvestre Pulegiū uocant. Dioscorides hoc non Menthastrū, sed Calaminthæ genus unū (ut arbitror) existimat.

E X M. V E R G. C O M M.

Sylvestris Mētha Menthastrū est, in hortēsi & rustica re cūctis notissimū, satis a Dioscoride descriptū, & quale passim ab oībus & quotidie uidetur. Inter cætera maius & procerius Sisymbrio ab hoc scriptore dictū fuit: q̄ multa inter Sisymbrium & Mentham similitudo est: mutaturq; & degenerat in Menthā neglectum Sisymbriū, quemadmodū secundo & quinto uolumine de causis plantarū testatus Theophrastus est. Quæ fuit huic scriptori causa, ut procerius eo Menthastrū esse diceret, ne multæ similitudinis inter se plantæ uidentes fallerēt, haberentq; herbarij certā ex proceritate notā, qua Menthastrum a Sisymbrio discernent.

De Calamintha.

C A P. X L I.

EX Calaminthæ generibus, quædam montibus familiaris, folia Ocimi habens, incana, surculos aridos, & caules angulosos, purpureum florem. Altera Pulegio similis est, sed maior. Quam sylvestre Pulegium ideo appellarunt, q̄ odore ipsum æmuletur. Nepetam Latini uocant. Tertia Menthastro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus q̄ superioris, sed uiribus inefficior. Omnium folia gustu feruentia & acria. Radix superuacua. Nascitur in campestribus, asperis, & aquosis. Potu, aut illitu demorsis a serpente opitulatur. Decoctum potu menses & urinas expellit. Ruptis, conuulsis, orthopnceæ, torminibus, cholera, rigoribusq; auxiliatur. Regium morbum expurgat. Præsumpta in uino uenenis resistit. Tineas, cæteraq; interaneorū animalia, cum sale & melle pota, enecat. Nec secus cocta crudæ si teratur. Elephanticos esitata adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in uellere subiiciantur, menses extrahunt, & partus enecant. Accensa, aut substrata serpentes fugant. Nigris cicatricibus candorem reddunt, in uino cocta & illita. Sugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, ut concretum humorem euocet, summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

B A R B A R I C O R O L L.

Calaminthā, nostri fere Nepitā appellant, etiāsi Dioscorides spēm eius unā priuatim Nepitā uocari tradat. Profus tāta inter Menthā, Mēthastrū, & Nepitā societas est, ut mirū nō sit misceri q̄nq; ab auctorib; earū & spēs & noīa. Alioq; & q̄d modo Pulegiū officinis & ruribus uocat, haud plane scias Calaminthæ genus sit, an uerū Pulegiū. Nepita etiā nō sata nascit. Calaminthā græce Cæterā quoq; dictā fuisse, testis est Strabo, q̄ nōnullos scribit existimare, Lacedæmonē ab Homero nō cetoeslam a magnitudine, sed cetoeslam a Calaminthæ copia uocari.

E X M. V E R G. C O M M.

Congenerem aliqui, similem tantū aliqui Menthæ Calaminthem, quā nos Nepetam diximus, in græcis fecerunt. Subscribitq; illorum sententiā, nomen quod coniunctam sibi habet Mentham. Habent contra posteriores illi figuram, quā Menthæ similem faciunt: naturā uerō & uires, qui sui generis herbam esse dicūt. Triplicem hanc Dioscorides ait: diuersisq; notis intercem separat, sed nō facile cognoscendis: tanta trium generū similitudo est. Plinius unum tantū constituit genus lib. 20. cap. 14. Nepetāq; id uocat. Nicander in theriacis suis duo tantū, & aliter Calaminthes gñā cognouisse uidetur, aquaticā, palustre q; alterū: montanū uero alterum: haud sane, quia montanā Calaminthē ille dicat, sed cum aquaticā & riguis gaudentē dixit, pro

E iij

A

Pli. li. 20. ca. 4.

καλαμίνθη

B

C prium signasse genus uidetur: cui diuersum montanum, & in siccis nascens sit. *Vericuli eius sunt. τῆμος δὲ ποταμοῖο πολλὴ γὰρ καταδυνασ. ὑδρὸν καὶ μὲν ἐν ὁρίῳ χαλκίαν. πολλὰ γὰρ ὡς παρὰ ἵσταται ἐμφύτι χρίδι ἔρεται, ἀγρῶν οἰσιν ἀγαλλομένη ποταμοῖσιν.* Quorum sensus est. Sumito runc circa resonantis fluminis uortices comosam frondentem Calaminthem. Copiosa enim prope aquarū scatebras, & circa labra earum nascitur, fluminibus gaudens. Ex quibus pro comperio habendum est, Nicandro duo hæc tantū genera esse, locis in quibus nascuntur distincta. Hic tamē ex foliorū, ramulorum, florum, & odoris diuersis notis sua genera separat. Non facile, ut diximus, inuenienda & cognoscenda: tanta est nataliū mixtura, & naturæ cognatio. Apuleius, quicūq; ille fuit, in cōmentario, qd de aliquot herbis reliquit, Nepetā hanc ait montanā Mentham a græcis dici, a Magis sanguinem Hammonis, ab Italis Nepetam montanam.

De Thymo.

CAP. XLII.

T Hymon quidam Cephaloton, alij Epithymum, alij Thyrsion, Latini Thymum, Aegyptij Stephanen, Daci Mosulam. Thymum ab omnibus cognoscitur, surculosus frutex, exilibus folijs & angustis circumdatus, capitulis in cacumine flore purpureo refertis, Gracili solo & petroso prouenit. Vim habet hanc, ut cum sale & aceto potum, pituitam per aluum detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelatoribus. Tineas uentris exigit. Menses, partus, & secundas pellit. Vrinasciet. Cum melle in eclegmate faciles facit excreationes. Recentes tumores discutit cum aceto illitum. Concretū sanguinem dissoluit. Verrucas Thymi colorem reddentes, pensilesq; tollit. Ischiadicis cum uino & polenta impositum subuenit. Hebetibus oculis in cibo prodest. Perq; utile pro condimento, dumtaxat ad usum eorum, qui recte ualent.

D

Plin. lib. 21. capit. 10. & 21.

T Hymū, siue Thyma pluratio numero, siue Thymus, in mari quoq; nasci traditur, extra Herculis columnas, quod eiectum in pumice durecat. In Heroo sinu, color etiamnū floris in eo est, ceu nondū absoluti pars. Quæ aquis extat, duricia lapidis aspicitur, similis tamē uiuenti. Sero floret Thymū, per solstitia fere cum & apes decerpunt, & auguriū mellis est. Seritur flore, in quo semen intelligitur: etiam si oculis deprehendi non potest. Coalescere quidam Thymū negant, nisi afflatu maris seratur. Ideoq; translātū ex Attica non durasse in Arcadia. Nunc prouincia inquit Narbonensi Plinius, lapidei campi Thymo scatent. Flos Thymi perit imbribus. Duo autem sunt genera eius. Candidum radice lignosa, in collibus nascens, quod & præfertur. Alterum nigricans, florisq; nigri. Colligunt in flore Thymum, & in umbra siccant. Epithymum quidem pluribus uidetur flos eius Thymi esse, q; & durius sit, & similitudinem Cumilæ nostratis habeat. Sed de Epithymo posterius. Thymum e Thyna laudatur ab Hippocrate. Est autem, ut inquit Galenus, Thyna in terra Thraciæ locus.

EX M. VERG. COMM.

Prima Thymo laus in antiqua plantarū historia græcis a Theophrasto est: qui a principio statim sexti de plantarum historia uoluminis longiore descriptione totā eius naturā fortunāq; complexus est. Post Theophrastum latinis a Plinio, & ante Plinium plerisq; alijs, qui Romanorum, Italiæq; hortos & mellationem instruxerunt. Omnium uero maximā & æternam æterno carmine Maro illi fecit, cum in Georgicis suis cecinit. Redolentq; Thymo fragrantia mella, Romana breuitate, & poetica dignitate, omnē plantæ huius honorem & usum in ruris & apium disciplina complexus. Quæ licet præcipui saporis, & egregij odoris hominī mel dederit, in quo extremā suauitatis lineam natura clausit: nec secus q; in humana fortuna totum in regibus, aut etore Pindaro, fastigiū definit, sic mellis extrema in saporibus dulcedo sentiat: non tamē tanta illi gloria hæcenus fuit, aut posthac erit, suauitate mellis suauiorē hominī fecisse coenam, q; multiplici remedio sanitatem eius, & uitā instruxisse, cuius nullū obrepit hominī quacunq; ætate fastidium, κέρων δ' ἔχον ὅς μιν, ut lyricorum maximus Thebanus poeta cecinit. Quæ ad Thymi historiā, factiq; ex eo mellis bonitatem pertinent, Theophrastus quo diximus loco, Plinius ab illo accepta omnia, 21. uolumine capite decimo, Columella quo loco de apium pabu-

lo & cibarijs agit, in mellificio tandem, ne longiores simus, iam pridem plerique alij prosecuti sunt: possuntque uolentes ex tam multis auctoribus ea repetere. Nobis satis est, locos, & auctores legentibus signare. In quibus monemus, quaecumque a Theophrasto dicta fuerint, a Plinio totidem uerbis reddita ciuibz suis fuisse, nec desideranda Plinium legentibus quæ Theophrastus tradiderit: qui Thymum in duo genera diuidens, candidum, & nigrum, monuit nos quod in Dioscoride legitur, ab aliquibus candidum Thymum dici, non appellationem, sed alterum genus eius esse, a Theophrasto ad hunc scriptorem importune translaturum, qui nulla huiusmodi diuisione usus est. Coloris autem discrimen id Theophrastus in folijs tradidit, in altero genere albicantibus, in altero nigrescentibus. Florem enim hic *πορφύρεον*, id est, purpurascens tradit, inter purpuram, & candorem medium: qualis etiam passim uidetur. Sunt Thymi appellationes aliæ, Epithymis, & Thymon, solo declinationis genere diuersæ: antiquæ & ipsæ. Si quidem Theophrastus genere neutro Thymon dixit: sic fœminino genere Epithymida alij herbam, scilicet intelligentes. Potuerunt Aegyptij accepta a græcis uoce, quoniam forte eo coronarentur, Stephanem, id est, coronam appellasse. Quemadmodum & græci Thyrsion, quoniam Bacchicas hastas, quas in orgijs eius dei Thyrsos uocabant, pro Hedertis, ramulis Thymi forte inuoluerent. Suspitiones tamen, seu malis dicere, coniecturæ hæ sunt. Quod postremo est *κεφαλών*, quod capitatum significat, certam ex figura floris capitulorumque eorū in quibus hic florem Thymi purpurascere dixit, rationē habere potest.

De Satureia.

CAP. XLIII.

Satureia nota est. Gignitur in asperis locis, & tenui solo, Thymus similis, minor tamen & tenerior. Desert spicam florum plenam, diuque permanentem. Eadem potest quæ Thymum, si modo consimili sumpitur. Aptus sanis usus. Est etiamnum quædam satiuua, syluestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam commodius in cibos recepta est.

BARBARI COROLL.

Thymbra post trigessimū diem nascitur in maris afflatu sata, nec ut quidam putant aliter. Hæc apud nos & Cunila uocatur, & (ut arbitror) transmarina Cunila est. Apud Columellam Thymbra est condimentarij generis. Satureia quoque a nonnullis Thymbra dicitur. Columella Thymbrā a Satureia diuisit, & Cunilā nostratē esse docuit: quā rustici Satureiam nomināt, colore floris purpureo, ut Thymbrā herbaceo. Quintus Serenius spēm Thymbræ Satureiam intelligit, ut Satureia sit non Thymbra simpliciter, sed Thymbra cephalote, quā Plinius Cunilam capitatā semel tantū, quod meminerim, opere toto nuncupat, intra hæc quæ in Cunilagine dicuntur. Cæterū Cunilæ præter satiuam plura sunt in medicina genera, fortasseque hanc Hippocrates intelligi uoluerit, ubi Origanum Cephaloides appellat. Bubulam appellant, semine Pulegij. Origanum ab Aristotele putant, cuius pastu Testudines cum Serpētibz pugnatæ, uires suas recreant: quamque in hunc usum nonnulli Panaceam uocant. Quidam falso Ligusticum interpretati eam sunt. Corrupta est in L. Columella dictio, ubi cuniculabula, & interim culabula, pro eo, quod est Cunila bubula, inter pecoris medicinas legitur. Plinius Origanum multis locis, non aliter quæ Cunilam bubulam conuertit. Est & Cunila gallinacea, de qua in Origano Heracleotico dictum est. Non omittendum, aduersa dicere hoc loco Dioscoridem, & Plinium. Omnia inquit syluestria fere sunt, & folijs minora, & caulibus succo acriora: sicut Cunila, Origanum, Ruta. Dioscorides contra hic prodidit de Thymbra. Sunt e græcis utique recentioribus, qui non Thymbram, sed Thymbra neutro genere, plurali numero pronuncient. Et nos quandoque seruamus in Satureia. Ouidius, Sunt qui præcipiant herbas Satureia nocentes, Sumere. In Thymbra Paulus Epithymbrum uocari tradit id, quod in Thymo Epithymū. Ridentur merito grammatici fere omnes, in herbarum exponendis, iudicandisque nominibus, in quo & Seruius honoratus sepiissime decipitur, & in hac ipsa Thymbra Placidus Lactatius is, qui Papinij Thebaida interpretatus est, Thymbram, a qua Thymbræus Apollo cognominatus sit, latine dici Polium affirmans.

EX M. VERG. COMM.

Habemus antiquissimū & probatissimæ fidei scriptoris huius codicē, in quo plures Thym

A

Thymbræ

B

Pli. li. 19. ca. 8.

Cbra a principio appellationes alia leguntur, Clinopodion, Probation, Ageratum, Origanus agrestis: & post barbaras, nulliusque intellectus plerasque alias, a Romanis Cunilam rusticam appellari Thymbra. Id ueterum latinorum decretis additum facile confirmauit, quod constitutum iam pridem a nobis fuerat, in Cunilarum genere Thymbra esse. Siquidem Columella decimo sui operis uolumine de apium passionibus agens, inquit. Eademque regio sit fruticis exigui, foecunda, & maxime Thymi, aut Origani, aut Thymbrae, uel nostratis Cunilae, quam Satureiam rusticam uocant, Plinius iidem. 19. uolumine capite. 7. inter Cunilas Thymbra his uerbis numerauit. Thymbra uero quae sit Cunila, hoc apud nos habet uocabulum, & aliud Satureia dicta in condimento genere. Estque quod Columella ait, sic intelligendum, ut ultima illa disunctio, uel nostratis Cunilae, &c. non herbas, fruticesque duos, sed unius duas appellationes alternet; indicetque autor ille, non Thymbra, & praeter eam nostratam Cunilam, sed hac, aut illa appellatione unam tantum significari: & quam antiquus Dioscorides hic noster a Romanis Cunila rusticam uocari dicit, Columella nostratam peregrinitatis ratione in alio genere dixerit. Transmarina enim Cunila etiam quondam numerabatur. Sicque bifariam a duobus scriptoribus idem dictum: a Columella nostras, ut eo pronome a transmarina distingueret: a Dioscoride rusticam, ut a satia separaret, inutili & minoris efficaciae. Fuisse autem satiam Satureiam, & condimentariam idem, in carmine suo restat Columella, cum cecinit ferendum in hortis Nasturcium, Et Satureia Thymi, referens Thymbraeque saporem. Quae quoniam multo minore acrimonia quam rustica illa esset, ideoque medicinae inutilis, mutato nomine a graecorum Thymbra, & latinorum Cunila, Satureia dicta est. Eadem quidem, sed diuersis locis nascens, & ex eo diuersae bonitatis, non ipsam ubique appellationibus indicata. Quod Plinius aperte ostendit, dicens. Thymbra uero quae sit Cunila, hoc apud nos habet uocabulum, & aliud, Satureia dicta in condimento genere. Nihil certius ex his est, quam unam & eandem Thymbra Cunilam dici, habereque in Romana gente id uocabulum: mox aliud Satureiam, scilicet in condimento genere: quod nihil aliud est, quam satiam Satureiam dici. Cunila itaque Thymbra sit Columella nostras, ut a peregrina & transmarina discernat: Dioscoridae uero rustica, ut a satia separetur: Plinio Cunila, incultis & asperis locis: Satureia, in hortis nascens & satia. Hoc nos de Thymbra, Cunila, & Satureia sentimus, quod auctoritatibus, ueterumque indicibus alijs multis confirmari poterat. Sed breuitati consulentes, caetera omnia relinquimus, praesertim uno Satureiae nomine totum hoc genus, ubicumque nascatur, indicantibus aetate nostra herbarijs omnibus: quibus nullum Cunilae alicuius nomen est: utinamque agrestem Origanum, Thymbra, & Thymum non simul misceret. Non uerum nunc rura omnia, asperis & incultis locis, montibusque plerumque nascentem Satureiam, ipsam omnibus notis, ab imperitis etiam cognoscendam. Omnem hanc cognoscendam ex antiquis appellationibus plantarum difficultatem, non tam similitudo, eademque multarum uires & notae, quam in secerendis diuersa appellatione similibus herbariorum neglegentia fecerunt: eoque res perducta est, ut tres toto genere diuersas plantas, una appellatione monstrari aliquando audierimus.

De Serpillo.

CAP. XLIII.

Σερπύλλος

Serpillum aliqui Zygin syluestrem, alij Polion uocant, Aegyptij Meruopyum, Latini Serpillum. Duorum generum est. Hortensium odore Sampsuchum imitatur, atque in coronas addi solet. Cui a serpendo nomen inditum est, quoniam si qua eius particula terram attingat, inibi radices demittet. Folia & ramulos Origani habet, sed candidiores. In maceris multo procerius assurgit. Syluestre Zygis appellatum non serpit, sed in altitudinem increscit, ramulos aedens tenues, furculosos, folijs refertos longioribus quam Rutae, & durioribus, angustis. Flores iucunde olent, gustati acres. Radicis nullus usus. Nasctur in petris satiuo efficacius, atque magis exalfaciens, & ad medendi usum aptius. Menses trahit. Urinam potu ciet. Torminibus, ruptis, uulsis & incineris inflammationibus auxiliatur. Et aduersus serpentes potu illitum. Capitis dolores mulcet coctum adiecto rosaceo, & madefactum in aceto. Maxime uero Phreniticis & Lethargicis conuenit. Cruentos uocant

mitus sedat, succus drachmis quatuor ex aceto potus.

B A R B A R I C O R O L L.

Serpillo radix multifida, sublimis, retorrída. Crescit in altitudinem quamcūq; adminiculo, aut sepibus appositum. Aqua ei modica satiffacit. Fimo, præcipue sumetorum gaudet. Sed & demissum in puteos, & circa piscinas, & stagna lætissimū prouenit, obnoxium squalori. Translatum uehementer iuuatur, autumno fere feritur. In montibus plerisq; copiosissimū, ut Thraciæ. Seritur autem Sicyone. Athenis quoq; ex Hymeto deferentibus auulsos ex ijs ramos a- quis. In montibus natum, Satureiæ odorem habet, uehementissimum illum quidem, sed gra- tum atq; mollem. Satiuum non serpit Plinio, sed ad palmi altitudinem increscit. Voluntariū, id est, syluestre, serpit in petris maxime: hoc & pinguius, & candidioribus folijs atq; ramis: Dioscoridi contra serpit satiuium, non syluestre.

E X M. V E R G. C O M M.

Serpillum nouerunt, quæ urbes & agros incolunt gentes omnes. Pauci tamen syluestre a sa- tiuo discernere didicerunt: tam paratū ubiq; satiui est, humana opera a syluestri & horridiore illius aspectu, ad mitiorem & speciosiore habitū translaturum. Quo uno habitu, & ramulorū infirmitate, a syluestri differt. Fit enim in satiui Serpillo, quod in urbanis & elegantioris uitæ hominibus, ut per se rigentibus ramis stare nequeat, sed hortorum delitijs, & nimia humoris copia uireat quidem speciosius, infirmius tamen per terram serpat. Qua fortuna in urbibus o- mnia fere sunt, quæ comparata agro sanitatis, uirium, patientiæ, aliorumq; uitæ laborum, & munerū minus habere ubicunq;prehenduntur. Neq; Serpillum a Græcis, & ex eo Serpil- lum a latinis dictum est, q; per terram simpliciter serpit, quæ latini nostra ætate fortuna est, sed q; ut Theophrastus ait lib. 6. de plantarum historia, proprium quoddam est ramulorū Serpilli incrementum. Priuatim enim possunt in quantā uoluerit aliquis longitudinem trahi, adiecto il- lis pedamento aliquo: aut si prope sepes plantetur: aut ex altiore loco aliquo deorsum dimit- tatur. Sic enim in longū protrahuntur: & ab hac plantæ in ramulis eius natura, q; in longū Ser- pillum latini & græci osus hoc nominauerūt. Syluestris contra illius quod Zygidā hic ait uo- cari, nulla est nominis eius inuenta nobis ratio. Nisi forte a trutina, quā græci Zygon uocant, rectitudinē eius ad rectitudinem ramulorū in syluestri Serpillo translata ea uox sit. Aut quia ramulis his natui lentore ad uinciendum, & utiliū usum aptis, in re rustica forte uteretur an- tiquitas, Zygis hoc Serpillum dictum fuerit: & q; eo iugarentur uites, quod ὑγιῶν græci ali- quando dicunt, in eadem significatione, in qua ligare & uincire passim latini utuntur. Sylue- stris Serpilli huius, quod tacuit hic scriptor, duo genera numerauit Theophrastus. Alterum Thymbreā, quod Thymbræ parem acrimoniam habet. Alterum quod odoratus & molli- us sit. Hic autem nullā forte in medicīna eorū diuersitatem sentiens, unius generis syluestre Ser- pillum dixit, & ex præcipuo discrimine a satiui discerni monuit. Multa alia Theophrastus etiā de Serpillo dixit, qualia sunt. Longissime & speciosissime frondere Satiui, si in puteum descen- dere dimittatur, podio eius impositū, nec aliud quodpiam genus eius est: plantariq; Serpillum autumno plerunq; plantari etiā uere: amare domos & hortos: gaudereq; aquis & stercoreati- one: præsertimq; ex iumetorum fimo: & meliorescere sæpius translaturum.

De Sampfuco.

C A P. XLV.

Sampfuchum aliqui nomināt Amaracum, alij Triphyllon, alij A- gathides, alij Cnecon, alij Acapnon. Pythagoras Thramben, Aeg- yptij Sopho, Armenij Myurō, Magi Ichrei asinū, aut Hecigonon Isidis, Romani Maioranam. In Cypro & Cyziceno laudatissimum. Secundum sibi locum uendicauit Aegyptium. Amaracum gens Si- cula & Cyzicena appellat. Herba est ramosa, per terram repens, fo- lijs eius Calaminthæ, quæ tenui folio constat, Letophyllos appellatur, hirsutis & rotundis. Suauissimum odorem spirat, ideo coronis inferi- tur. Vis eius excalfaciens. Succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos urinæ difficultas, aut tormina exerceant. Illi- ta ex melle arida folia, sugillata tollunt. Menses subditi in pello tra-

A

Pli. li. 19. ca. 9.

B

αμυγχοῦ
ἀμαράκων

C hunt. Contra scorpionis ictum ex aceto & sale illinuntur. Luxatis tumoribusq; carato excepta imponuntur. Aduersus oculorum inflammationes, tumoresq; cum polline polentæ illini prodest. Acopis malagmaticisq; calfaciendi gratia commiscetur.

Plin. lib. 21. ca
pit. 11. 21.

SAMPFUCHUS in Syria & Aegypto dicitur, Amarantus uero & Amaracus a Siculis. Item a Theophrasto. Semen ei copiosum, odor molliter iucundus. Radix arida, tellure summa hærrens, multifida. Floret æstate, non omnis, sed quam Phrygium cognominant. Semine & auulsiōe prouenit. Transserri & plantæ solent.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus primo uolumine, cum de Sampfuchino & Amaracino unguentis ageretur, de Sampfuchō & Amaraco ex Plinij historia, quæ satis ad eam rem tunc fore credidimus: distulimusq; in hunc locum, quæ alia tunc ex aliquot græcis scriptoribus omitenda alioquin non erant, nisi ea nunc repetenda fuissent. In quibus præfari illud inutile non fuerit: Magni in plantarū historia referre, quos scriptores, & quibus temporibus scribentes aliquis sequatur: & quæ diuersis locis iisdem, aut alijs nominibus appellantur, obseruasse. Nisi em̄ id fiat, geminari aliquando & augeri in numerū contingeret, quæ unum sunt: & quod idem natura, aut paulo diuersum ubiq; fecit, aliud uideri: eaq; ratione confundi intellectu, & misceri rerum historiā. Quod in Sampfuchō hac fit: in qua si Galeum, hunc ipsum scriptorē in unguētis, & Paulum Aeginetam aliquis sequatur, aliud ab Amaraco uidebitur. Siquidem omnes seorsum de utraq; egerunt, aliasq; in medicina uires alterutri assignarunt: Amaracum calefacere in tertio, in secundo uero ordine siccare dicentes. Sampfuchum extenuādi, discutiendiq; uires habere: & in tertio ordine calefacere & siccare, & in unguentis a Dioscoride diuersa, multa in utroq; numerari, quæ tractata suis locis iam pridem a nobis fuerunt. Si Theophrastum, Plinium, poetasq; Latinos, Lucretiū, Maronemq; & Columellā, eandem Sampfuchō Amaracū omnes intelligent. Nihilq; certius Plinij decretis in hac re est. Primū lib. 11. capite. 11. quo loco auctore Diole ait, quod Aegyptus & Syria Sampfuchum uocat, Siculos Amaracum appellare. Mox eodem uolumine iterū, sed capite. 22. Sampfuchum, siue Amaracum in Cypro laudatissimū & odoratissimū. Nec multo post. Fit ex eo oleū, quod Sampfuchinū, aut Amaracinum uocatur. Maro, quod pueri omnes nouerūt, super alta Cythera per Venerem auāam Ascanium transtulit, ubi mollis Amaracus illum. &c. Lucretius itidem. Aut Amaracini blandum Staetq; liquorem. Columella etiā in carmine suo Romanorum hortos excolens ait, Grataq; iam ueniant hilari Sampfucha Canopo, peregrina uoce Romanā Amaracum axpellans. Et ne longiores simus, hic ipse etiā hoc capite, in Sicilia Amaracū uocari Sampfuchum dicit: nec esse inter Sampfuchum & Amaracū, nisi appellationis discrimen. Graues contra, græcorū medici illi, quos paulo ante nominauimus auctores, ad hanc rem sunt: nec nostrū est, ut in Buccolicis legitur, tantas componere lites. Non tacebimus tamen, uideri nobis aliam historiā, q̄ medicinæ rationē in multis esse: fieriq; posse, ut, quod idem & congener sit, non tam quia diuersis locis aliter atq; aliter nominetur, q̄ q̄ diuersis locis natū, diuersas uires habet, diuersum in medicina & historiā censeat: duplexq; Sampfuchū, scilicet & Amaracū fecerint græcorū medici, quod unū idemq; genere est: quoniam non idem uiribus & natura diuersis locis proueniens esset, diuersisq; gentiū appellationibus, ad constituendas diuersas eorū uires, usi fuerint: non duas in natura plantas, sed in una diuersas nominibus illis uires intelligētes: duplexq; Sampfuchinū & Amaracinum unguentū hac ratione a Dioscoride in primo traditum fuisse: nunc autē in plantæ seorsum, ab unguētis historia & medicina, solum Sampfuchū tradidisse, & de Amaraco id solum testatum fuisse, a Cyzicenis & Siculis Amaracum Sampfuchū dici: quod & in Amaracino unguento etiā dixerat, in Cyzico probatissimū fieri: quoniam in ea gente, quod alibi Sampfuchū uocabatur, Amaracus nominat. Quod & Plinius fecit lib. 13. capite. 1. seorsum de Amaracino et Sampfuchino & ipse agens. Esseq; idem Dioscorid. Sampfuchum & Amaracū illud, in hoc capite præsertim indicat, qd̄ hic ait, probatissimū in Cyzico & Cypro. De Sampfuchō agebat, & nihilominus in Cyzico, in qua Amaracinū probatissimū unguentū fiebat, nasci testat. Manifesto argumēto, eandē Sampfuchō Amaracū, & Amaraco Sampfuchū esse: quodq; Plinius tot locis ait, nihil aliud indicat, q̄ in Aegypto & Syria Sampfuchū, in Asia deinde, tota Græcia, Sicilia, & ut in uicino sit in Italia Amaracum uocari. Nec si quis uterū græcorum, latinorūq; historiā

& medicinam diligenter eruscabit, aliter iudicio nostro, de his colligere, ratiocinariq; poterit, præsertim nullam ex professo Amaracum docente Dioscoride, quod relinquendum in quoridiani usus planta, tamq; ob odoris suavitatem amabili, diligentissimo homini non fuerat, Cui a principio adiectæ in Sampfuchum tam multæ appellationes, nullam habent nobis rationem, aut causam: nec nos ab eo commentarijs suis additas credimus, sed per tempora illi accreuisse: quodq; hic proposuerit, Sampfuchum tantum fuisse, tum in bonitatis censu Cyzicentū & Cyprium cæteris omnibus anteposuisse, mox ab eo Aegyptium laudasse, & a Cyzicenis & Siculis Amaracum uocari. Hæc enim in uetustissimo quem habemus latino Dioscoride tm legunt. Quo fit, ut miremur in hoc etiam Barbarum, qui a Cyzicenis & Siculis non Amaracum, sed Amaranthum uocari Sampfuchum dixerit: præsertim docente id tam multis locis Plinio.

De Sertula campana. CAP. XLVI.

SERTULA CAMPANA laudatissima in Attica, & Cyzico, & Carthagine nata. Cuius color uicinus est Croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nolam, colore in luteum linguefcente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam. Inflammationem omnem emollit, præsertim quæ in oculis, uulua, sede, aut testibus erūpat, si ex passo cocta illinatur. Interdum autem addito oui luteo affato, aut scenigræci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis Papaueris, intybo ue. Recentes meliceridas per se cum aqua, & ulcera manātia in capite, illita cum creta chia, uino, aut galla sanat. Stomachi dolores, & cruda & cocta cum aliquo ex antedictis leuat. Doloribus auriū mitigādis cruda ex passo instillatur. In aceto, aut rosaceo madefacta, capitis dolorē lenit.

BARBARI COROLL.

Melilotos, alij Sertulam campanam, Cato Sertam campanicam, quia folium eius corona mentis sit dicatum, in Campania Italia cōmendatissima, ut nostri uolunt, odoratioq; & candida: deinde Attica in Sunio, mox Chalcidica, ubicurq; uero asperis & syluestribus nata, recens, nec candicans, & Croco q; simillima. Melilotos arida, diutius odorē continet: qui et Croco uicinus est, quemadmodum & flos. Ipsa cana, placet maxime, folijs breuissimis atq; pinguisimis. Inter aromata, quibus defrutum condiri solet. L. Columella Cripam pampinacam nominat. Deprauatū esse locum arbitror, & Sertam campanicam, non cripam pampinacam legendum. Nec ignoro & Crepin, & Crepulam haberi herbas, sed quibus ad unguentum & aromata nihil sit opus.

EX M. VERG. COMM.

Campanā Sertulā Plinius & Celsus Romani sermonis candidi autores, Melilorum appellant. Cato nulla diminutione usus, Sertam Campanicā dixit, ab usu & natali solo tota appellatione hac illi facta. Nosq; his autoribus græco nomini, latinā uocē in titulo capitis addidimus. Nec ratiocinantes facile, quo referenda uox illa *κροκίσων* esset, quæ Croci aliquid habentem significat, ad colorem contraximus, qui tm nullibi q; in flore uideri potest. Virescūt em folia. Fecimusq; id autōre Plinio, qui de ea lib. 21. ca. 9. agēs ait. Odor eius Croco uicinus est, & flos. Neq; em ad odorē referri & cōtrahi uox illa in hoc scriptore poterat. Sequebatur em statim *ἰσώδης* quod odoratum significat. Nisi forte *κροκίσων* & *ἰσώδης* eodem pertinēt: dixeritq; hic bis quod ad odorem pertinebat: quod tamen parū uerisimile est. Quod erat etiam *ἰν καρπιδόνη*, quæ uox Carthaginem significat, ad Calcedonem detorsimus: qm in græcis aliquot & latinis omnibus sic legitur. Nisi forte neutrum eorum legendum eo loco sit, sed in Chalcide. Siquidem Plinius ibidem ait. Est enim in Campania Italia laudatissima: græcis in Sunio: mox Chalcidica, & Cretica. Ethæc pro Sertula Campana notissima nunc etiam omnibus planta, satis hætenus dicta sint.

De Maro. CAP. XLVII.

MARV aliqui Origanida, aut Hysobrion uocant. Hæc ba cognita uulgo, surculosa, flore Origani, folijs multo cāndi-

D I O S C O R I D I S

Cdioribus, flore odoratiore. Vim habet Sisymbrio confimilem. Substringit enim, & modice calfacit. Qua de causa illitu, serpentia ulcera sistit. Et in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiam & Traleis copiosissima gignitur.

Pli. li. 12. ca. 24

B A R B A R I C O R O L L.

DE Maro Plinius inter odoramenta sic loquitur. In Aegypto inquit nascitur Marum, peius quā Lydium, maioribus folijs, ac uarijs: illa breuia, minuta, odorata. Lydium Marum Plinio fortasse fuerit, quod Dioscoridi Magnesium: eum sit Magnesia Lydiae ciuitas penes Sipylum, cui uicina Caria est, in qua Tralles, ubi Marum quoque nascitur. Est & Magnesia penes Maeandrum, et Tralles in Caria: non tamen ut Lydium propterea decernam idem esse quod Cartum, gentis suae, ut Plinius ait, appellatum nomine, cuiusque principale, ut in Cario demonstrabitur. Habent & Arabes suum Marum, siue Maru, sed penitus diuersum, & magnis ambagibus impeditum: inter quas illam sit satis indicasse, quod species eius sunt Mellisophyllon, Marubium, & Buglossa: quo nihil dici poterat ineptius.

E X M. V E R G. C O M M.

Semel tantum Mari (modo illud huic idem sit) Plinius meminit, 12. uolumine cap. 24. tantae breuitate, ut quale id sibi fuerit, non facile intelligatur. Nihil enim ultra tradidit, quā nasci in Aegypto Maron peius quā Lydium, maioribus folijs, ac uarijs: illa breuia, minuta, ac odorata. Nihil enim de Maro in censu medicae materiae Paulus Aegineta docuit, Et qui nobis sunt graecus & latinus uetustissimi Dioscori codices, nullum hoc loco, neque alibi Maron ostendunt. Ex eo nihil in peregrina planta, & ad Meandrum in Lydia nascente, praeter pauciora illa ex Plinio accepta, dici a nobis potuerunt. Non tacebimus tamen, uideri nobis in eius historia non satis inter se conuenire, scriptorem hunc nostrum, & Plinium. Hic herbam omnibus notam, surculosam, flore Origanis: ideoque Origanida, quasi minorem Origanum dictam, caedidioribus Origanis folijs, & multo odoratiore flore describit: inter nostrates praeterea, & hi ad Magnesiam & Tralles nasci dicat, nostrique orbis odoratas alias numerat herbas Melilotum, Acinon, & Bacccharem. Ex quo credendum, similem, & natura congenerem illis esse. Plinius contra, suum Maron inter peregrinos odoratos frutices numerat Ligustrum, & Aspalathum: & ab historia Aspalathi statim in Aegypto nasci Maron dicit: non absurda penitus suspitione, si quis dubitet, non esse Plinii & Dioscori idem Maron. Nobis ob eas quas diximus causas, inclinatur animus, diuersa esse. Acceditque opinioni nostrae, quod Plinius in Aegypto nasci Maron tradit: licetque peius Lydio, in quo poterit Magnesium hoc, & Trallianum forte intelligi: quā ad Meandrum in Lydia utraque ciuitas illa fuit: hic tamen Aegypti non meminit, quiddam relinquendum in censu bonitatis non erat, sed simpliciter ad Magnesiam & Tralles nasci dixit. Plinius praeterea folia Lydij Mari, hic flores odoratos esse dixit. Sed quod ratiocinari in tota hac re & animaduertere aliquem oporteat, historia utriusque scriptoris est: quorum alter inter herbas Maron numerat, & Origano comparat: alter fruticibus coniungit, nec aliter quā de frutice omnia tradit.

ἀκινός ἀκινός

De Ocimaistro. CAP. XLVIII.

ACINOS, aut Aconos a Graecis dicitur, ab alijs syluestre Basilicum. Latinis Ocimastrum, tenui siccoque ramulo herba, Ocymo similis, odorata, sed hirsutior. Qua coronae factitantur. A nonnullis olitoribus colitur. Menses & aluum pota sistit. Illita panos, ignemque sacrum sanat.

Pli. li. 31. ca. 17.

B A R B A R I C O R O L L.

Differt Acinos ab Acono: quod Acinos Ocimastrum est, siue Ocimi syluestris genus: Aconos spinosa, breuis & lata herba, Eryngio a quibusdam contributa, spinis latioribus. Acinos familiaris Aegypto herba, coronarum & ciborum gratia obseritur: sponte uero nascitur aequinoctio. Hanc et Acinon, & Acinean Plinius appellat, & Epipetron, nuncque florentem. Aequinoctio inquit nascuntur Aphace, Achine, quam Epipetron uocant. Vt nesciam tamen, legendum ita sit, an illo modo potius, Aequinoctio nascuntur Aphace, Acinos, & quam Apipetron uocant, quae nuncque floret. Vt duo genera faciamus, Acinon, et Epipetron. Alioquin Theophrastus, unde Plinius mutatus est, Epimetron quidem (ita enim ipse nominat) nuncque florere scribit. De Acino

mentionem nullam habet. Hippocrates Epipetron ad tumores & inflammationes cōmendat, illi tu folijs eius decoctis & impofitis. Hanc ipsam proprietatem, Acino Dioscorides adscripsit: ut coniectari liceat, Plinij uerba quæ prætexui, legenda esse in hunc modum, Aequinoctio nascuntur Aphace & Acinos, quam Epipetron uocant. Mirum grauissimos autores Plinium, & Dioscoridem in huius herbæ medicinis cōtraria præcipere, alterum cieri ea posse menses & urinas, altero contineri. Nec illud mihi abierit indicium, primo & uigesimo libro, priore mentione (his enim loquitur ibi Plinius de Acino) in uetustis aliquot codicibus, non Acinon, siue Acinonem, sed Chenopus legi, quo nomine anserino pedi similis herba significatur. Sed corruptum locum suspicor, etiam si Chenopus quoque celebratur herba.

EX M. VERG. COMM.

Quod hætenus legerim, nulla Theophrasto in plantis suis Acinos est. Plinius pluribus locis Acini meminit: sed ut modo Acinon, modo mutatis aliquibus literis Acinonem, librarij magis scripserint quæ ipse: nihilque certius his quæ ab hoc scriptore accepta lib. 21. cap. 27. his uerbis tradidit, Acinon & coronarum causa, & ciborum Aegyptij serunt. Eademque erat quæ Ocimum, nisi hirsutior ramis & folijs esset, & admodum odorata. Quod solū non est illi cum hoc scriptore idem, menses & urinae sunt: quos hic sistere, Plinius cieri Acinon testatur. Dioscoridi tamen subscribit Paulus Aegineta in .6. mediocres adstringendi uires habere Acinon, dicens, ideoque potius menses & aluum sistere. Nunquam florere Acinon, idem Plinius eodem uolumine, sed cap. 15. ait. Qua floris priuatione & nota, non male forsitan suspicetur aliquis, quæ Theophrastus, s. de plantarum historia uolumine Epimetron uocat, hisque uerbis tradit, *ἡνία δὲ καὶ ἄλλω ἀναγνῶν, κατὰ πρὶν καὶ τὸ ἐπιμύτρων*, quod est, Quædam etiam omnino non florent, ut Epimetron, Acino huic eandem esse, & quam Plinius eodem loco Epipetron dicit: ut in alterutro uerbi literæ tantum uitium sit. Plinij uerba sunt. Et æquinoctio nascens Aphace, Acinos, quam Epipetron uocant, quæ nunquam floret. Seri in hortis Acinon a quibusdam hic ait, Aegyptios intelligens: qui ad coronas & cibos ea passim uteretur. Ocimo notissimo cunctis oleri similis Acinos est: ob eamque similitudinem a posterioribus addita huic scriptori uox illa est. A quibusdam syluestre Basilicum dici Acinon: quoniam quod græcis & latinis Ocimum fuit, nobis ex multo tempore Basilicum in quotidiano sermonis usu est. Non multi tamen facienda uox ea est.

De Bacchare. CAP. XLIX.

BACCHARIS hæba fruticosa, quæ in coronas addit. Cuius folia aspera sunt, media Violæ & Verbasci magnitudine. Caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, adnatis appendicibus aliquantulum asperis, flore purpureo subalbicante, odorato. Radicibus Veratro nigro similibus, quibus odor inest Cinnamomo proximus. Asperum, squallidumque solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, uulsis, præcipitatis, spirandi difficultati salutaris. Item diurnæ tussi, & urinae difficili. Menses pellit. Contra serpentium morsus utilissime datur in uino. Recens radix apposita, partum extrahit. Puerperis eius decoctum in deflectionibus prodest. In diaphasmata utiliter inseritur, iucundi odoris gratia. Folia, utpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu profunt. Oculorum inflammationibus, mammis tumentibus a partu, ægilopijs incipientibus, ignibusque sacris auxiliantur. Odor somnū gignit.

BARBARI COROLL.

Baccharis, quæ & Baccar dicitur, qua fascinum depellitur, radicis dumtaxat florisque odorati est: a quibusdam uocata Nardum Rusticum falso, cum Nardus Rustica sit Asarū. Oleum, & unguenta ex ea radice fieri solita, Hippocrates, & Cephisiodorus, & Aristophanes poetæ testes sunt. Vnde quidam errore ducti, Barbaricam eam uocabant. Addit Cephisiodorus, & pedes eo lini confueuisse, ut Aegyptio manus, Sisymbrio brachium, malas & papillas Palmeo, Amaracino comam & cilia, Serpillino ceruicem & genua: quod & in comœdia cecinit Antiphanes. Baccharis inquit Galenus, Hippocrati unguentū quoddam Lydium significat. Similli

D I O S C O R I D I S

Cum Bacchari Combretum, sed pcerius, & foliorū exilitate usq; in fila extenuatum. Baccha-
rem Plinius Asarū, Dioscorides a nostris appellari uolūt Perpensam, Aretij, & in Illyrico nascē
tem, cōmendatissimam ad calculos: si modo eadem est cūm Perpressa: utroq; em̄ mō legitur, &
alterutram lectionē deprauatā esse duco. Sunt exemplaria, in quibus nec Perpsa, nec Perpres-
sa, sed spersa, siue sparsa scriptum sit. Nō defuere, qui Baccharem genus esse floris existimaret:
quem mō Caryophyllon uocamus, sed syluestris: nunc altilis ij spectantur, ab odore ita cogno-
minati, tāta uarietate, amplitudine, pulchritudine, ut Rosę pares, non inferiores uideri possint,
cū eaq; de principatu certent: quando nec colore superantur purpureō, uermiculato, candido:
nec odore, nisi q; a longinquo plus olet recens Rosa. Iam nihil Rosa fugacius. lōgissima namq;
decerps mora dies. Caryophyllo in triduū, & amplius uita, uigorq; durat. Aliquis tanta ma-
gnitudo, Parauinarum p̄cipue matronarum cura, ut orbem utraq; manu complecti fere ne-
queas. Folia quaterna, quinaq; nonnullis Rosę mō numerosa, mirabili quorundā alabaastro cul-
ture ratione: q; dehiscens, ipso staminum loco alabastrum ostendit alium, pandentem se paulo
post in florem, caliculo priore consenscente. Scio putare aliquos Caryophyllon ueteribus fu-
isse Caltham. Sed cum Virgilius nobis eam luteolo cecinerit colore tinctam, nec Plinius a Vir-
gilio dissentiat, nondum uideo qui possit ita statui. A Caltha porro Calthuē uestis genus dici-
tur, ut a Croci similitudine Crocotula. Quę sit autem Barbarica, cuius mentionem supra mo-
do fecimus, non constat. Nam Sylua barbarica, idest, Conseminea omnino aliud est: quippe
quę ager sit glandibus, & quę sunt ijs similia, manu constitus. Nam & uinę Conseminales di-
cuntur, in quibus diuersa uitium genera conseruerint, auctor Columella. Nam sylua Ciminia,
cuius omnes fere mētionē habēt, Strabo, Plinius, poeta Virgilius, & Silius, in Ethruria mon-
stratur inter coloniam Tusellanam, & Viterbium, & ubi nunc uici lacus dicitur. In ea sylua lo-
ca sunt, in quibus depacta in terram non extrahūtur. Fuisse quidem inter Romanum Sabinūq;
agrum quę Sylua diceretur, scio autore Stephano. De Sylua quoq; populi Romani propria,
seu hac, seu alia Cicero in actionibus suis contra Rullum Tr. Pl. meminit.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus primo uolumine cum de Asaro ageremus, multa quę ad Baccharem pertinerēt.
Illudq; p̄cipue tunc legentes monuimus, non illic, sed hoc loco priuatim de ea nobis agen-
dum fore: quod reddere modo nos decet: & si non adco multum sit quod in notissima omni-
bus planta rep̄ti ex antiquis possit, aut debeat. Satis eam descripsit Plinius libro. 21. capite. 6.
satis & rura omnia uolentibus eam ostendunt. Nosq; utriusq; Plinij scilicet, & ruris auxilio, qd
erat in scriptore hoc, amare Baccharem aspera loca, & *uivux*, idest, uliginosa & humentia, in cō-
trarium habitum detorsimus: diximusq; rati antiquam fuisse lectionem, *uivux*, nec humida:
propter ea, q; Plinius ait, Gracili, nec humido solo prouenit: & in quibus ea nascitur locis, *aq;*
& humore omni pl̄rumq; carent.

De Ruta. C A P. L.

Ruta duplex, Montana, quam aliqui Rhyten montanā uocāt:
& hortensis, quā Aegyptij Epnubū, Syri Armala, alij Besafa.
Aphri Churima. Mōtana syluestrisq; acrior est, & in cibis damnata. Sa-
tiua uero quę sub arbore Ficus enascitur, magis in cibos admittit. V-
traq; urit, calfacit, exulcerat. Vrinā ciet. Mēstrua pellit. Aluū sistit potu,
ciboue. Lētaliū medicamentorū antidotū est, si semen ex uino acetabu-
li mensura ebibatur. Folia per se p̄sumpta, aut cū nuce iuglādē, aridif-
q; ficis, inefficaces uenenorū uires reddūt. Cōtra serpētes simili mō su-
mere cōuenit. Geniturā cibo, potuue extinguit. Cū Anetho sicco deco-
cta, tormina sedat. Facit ad pectoris laterūq; dolores, difficultatē spirā-
di, tusses, pulmonis inflāmatōē, coxendicū articularūq; cruciatus, &
rigores febriū circūitu repetentes, pota ut antedictū est. Item ad inflati-
ones coli, uulū, rectiq; intestini, decocta & imposita. Fœminas uul-
uē strangulatu liberat, si a genitali sedetenus cum melle subiiciatur.

A Feruefacta ex oleo & pota, uētris tineas excutit. Articularijs doloribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illinitur. Eisdem in potu auxilia-
tur, decocta in uino ad dimidias parteis, & oblita. Cruda, conditaq; ci-
bo, uisus aciem excitat. Dolores oculorum cum polenta lenit. Dolori-
bus capitis cum rosaceo, & aceto illita auxiliatur. Profluentem naribus
sanguinem sistit, trita et indita. Testium inflammationibus cum laureis
folijs imposita, & eruptionibus papularum cum myrto & cærato pro-
dest. Cum pipere autem & nitro affricta, albæ utiligini medetur. Cū
eisdem illita fornicationes tollit, & uerrucas quæ thymi florem repre-
sentant. Contra impetigines cum alumine & melle utilissime imponi-
tur. Succus in mali punici calyce calfactus, aurium dolori efficaciter in-
funditur. Hebetudinem oculi qui sensere, Ruta cum Fœniculi succo
ac melle peruncti iuuantur. Ignem sacrū, ulcera quæ serpunt, aut in ca-
pite manant, cum aceto rosaceo & cerusa per sanat. Mansa Alliorū, Ce-
parumq; acrimoniā domat. Montana si copiosius estur, interficit. Dum
florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, et rubore quodam
inficit, cum pruritu ac uehementi inflammatione. Oportet itaq; eam un-
ctis antea manibus & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pul-
lis insparsum feles arcere. Adijciūt eam quæ in Macedonia circa Olci-
mū amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus aut is locus, ui-
peris scatet. Semen eius potū cōtra intestina uitia efficax est. In antido-
ta cōmode additur. Contra incontinentiam urinæ, tostū semen septe-
nis diebus potui datur. Radix huius montanum Moly uocatur. Sylue-
stris Ruta satiuæ similis est. Prodest comitialibus, & coxendicum do-
loribus. Menstrua mouet. Partus enecat. Acrior est uiribus q̄ hortens-
is & ualidior. Syluestris, utpote noxia, cibis abdicatur.

BARBARI COROLL.

Rutam, ut alia quoq; olera, quæ diu uiuunt, unitas caudicis, & p̄grandes rami, quos Acrē-
monas, & Cremonas quandoq; Græci uocant, arborem uideri faciunt. Latiora satiuæ folia,
Rami fruticosiores. Cicuta Rutæ aduersa, probabili argumento: quoniam colligentes Rutam,
manus Cicutæ succo muniūt sculptores, pictoresq;. Ruta in cibo utuntur, ppter uisum. Mustel-
la cum serpente dimicatura, in murium uenatu, Rutam prius edit. Pythagoras marem minori-
bus & latioribus folijs, & coloris herbacei, discreuit a fœmina & odore. Humore, simū, hyemæ
Ruta odit: apricis gaudet & siccaneis, terra q̄ maxime lateritia, & cinere: qui & miscetur semen-
ti, ut careat erucis. Mustū Rutarum populo Romano dari solitum, non ignotum est.

Pli. li. 26. ca. 9.

De Syluestri Ruta. CAP. LI.

Rutam syluestrem aliqui appellant Hypericō, alij Androsēmō,
alij Coron, alij Chamæpityn, Romani Hederalem, aut Cento-
nalē, Aphri Churma semmaced. Odor seminis resinofus est. Ideo Cha-
mæpitys aliquibus nominatur. Frutex est surculosus, rubescens. Foliā
Rutæ figura, flores lutei, qui digitis triti sanguineo succo manant. Vn-
de Androsamon uocitarūt. Ramuli subhirsuti. Siliquæ teretes hordei
effigie, in quibus semen nigrū resinā olens, Gignitur in cultis & aspe-

F iij

πύραρον ὑγρίον

D I O S C O R I D I S

Cris. Vrinam ciet. Menses appositu trahit. Pota cum uino, quartana liberat. Folia cum semine ambustis illitu medentur. Et diebus quadraginta epota ischiadicos sanant. Vocant etiamnum hoc modo syluestrem Rutam, quod in Cappadocia & Galatia Asiae finitima Moly dicitur. Frutex est, qui ab una radice multos emittit cauliculos. Folijs multo ^{q̃} alterius Rutae longioribus, tenerioribusq̃, odore graui, flore candido, capitulis in cacumine paulo maioribus ^{q̃} satiuæ Rutae, quae tribus maxime partibus constant. In quibus triangulum semen, subruffum, gustu amarum recluditur. Cuius est usus. Semen autumnino maturefcit. Quod cum melle, uino, croco & sceniculi succo, ac gallinaeo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam Armalam uocent, Syri Befassan. Qui Cappadociam incolunt, Moly, quoniam quandam cum Moly seruet similitudinem. Radice nigra, flore candido. In collibus & laeto solo prouenit.

Ruta syluestris proprium genus est. Montana haec, & uulgaris. Sed & Hipericon nonnulli ad Rutam syluestrem referunt; de quo inferius.
Ruta Galatica haec est, quam Plinius intelligit praecipuam in antidotis.

B A R B A R I C O R O L L.

Moly aliqui syluestre Leucoion appellant. Folia habet graminis, latiora, humi sparsa, florem albae uiolae similem, sed minoris, lactei coloris. Caulem candidum, quaternum cubitorum. In cuius cacumine inest aliquid quod Allij speciem referat. Radix parua, bulbosa, quae mirum in modum ualet ad aperiendas uulvas, si trita cum iri no unguento in pessa subiiciatur.

De Moly. CAP. LII.

Moly Homericum, Phineo & Cyllene Arcadiae uernaculum, radice nigra, Cepae magnitudine, rotunda, folio Scyllae. Negat Theophrastus uerum esse quod Homerus cecinit, disti- culter effodit; affirmat Plinius. Hanc uates ille a Dijs uocari putat Moly, Mercurium inuento- Pacifer huic florem dederat Cyllenius album, Moly uocant Superi, nigra radice retentum.

B A R B A R I C O R O L L.

Aliqui florem eius non candidum, ut Homerus, sed luteum pinxere. Plinius in Campania effossam, aegre inter difficultates faxeas & allatam sibi meminit, radice triginta pedes longae, ac ne sic quidem solidae, sed abruptae. Tale uerum est Moly. Dicitur & Moly Ruta Galaticae, de qua diximus: quod solum aetate nostra medici nouere, Harmela uocantes: quemadmodum & Dioscorides & Galenus a Syris dici eam testantur. Differt ab hac Molon, quam & Syron dici tradit Plinius, etiam si Oestron, non Syron in exemplaribus quibusdam legitur, scapo striato, folijs paruis, mollibus, radice quatuor digitorum, in qua extrema Allij caput est: anhelantibus, & stomacho, pdesse credita.

E X M. V E R G. C O M M.

QUOD in graecis & latinis poetis passim auditur, & celebratur Moly, Homericum, illud est, quod contra Circes ueneficia Vlyx Mercurius armauit: & in quo describendo poeta ille pluries decima Odysseae Rhapsodia cecinit uersus. *ὅς ἦρα φωνήσας πέρι φάρμακον ἀργυρόντι, καὶ γαῖον ἔρυσας, καὶ μοι φέρειν αὐτοῦ ἰδμεῖν. εἴ μιν μέλαινα ἰσὺν γάλακτι δὲ ἑκτόν ἄνθος. μῶλυ δὲ μιν καλεῖται, καλεῖται δὲ τ' ὀρέσταιν. ἀνελπίδες γέννηται θεὸς δὲ τι πάντα δύνανται.* Quodq̃ Naso in Transformationibus suis dixit. Pacifer huic florem dederat Cyllenius album, Moly uocant Superi, nigra radice retentum. Et quod in Priapeis carminibus audit. Hinc legitur radix de qua flos lacteus ex- it, Quam cur Moly uocant: mentula Moly fuit. Omnia nullam habent, nisi ex Homericis illo

figmēto causam & rationē. Quam tamē graues græcorū & latinorū scriptores, honorem hunc principi omnium poetarum, ut nos credimus, habentes, tanti fecerint, ut Theophrastus libro nono de plantarum historia Moly describens, Homero, præterquam in radice, subscripserit: testatus in Phæneo & Cyllene Arcadiæ nasci, quale Homērus cecinit, radice rotunda, ceposaque, folio Scyllæ: usumq; eius contra ueneficia & excantationes esse: non tamen difficulter, ut Homerus dixerat, ex terra effodi. Et post Theophrastum Plinius libro uigesimo quinto capite quarto, omnia a Theophrasto dicta Romanos docens, hæc amplius tradiderit, nigro colore radicem eius esse: nec candido flore, sed luteo ab aliquibus græcis describi: nasciq; in Italia, & ab herbarum peritis medicis sua ætate allatum sibi ex Campania, inter difficultates saxæas natum, radicis triginta pedum: quæ nec tota effossa esset, sed abrupta. Ex his tam multis, tantæq; auctoritatis ad hanc rem testibus, ratio cinari, colligereq; necesse est, proprium habere genus inter herbas Moly: nomineq; hoc non syluestrem Rutam, sed sui generis herbam communiter indicari: in Galatia tamen & Asia priuatim syluestrem Rutam eo appellari. Quod manifeste in sexto Paulus Aegineta indicat, de eo his uerbis agens. Moly, quod agrestem Rutam aliqui, &c. Et præter Paulum in græcis & latinis omnes fere alij in agresti Ruta hoc nomine utentes, non aliam ob causam, q̃ q̃ in Cappadociæ & Asiæ Galatia syluestris Ruta, ut hic paulo ante testatus est, eo indicabatur. Neq; ætate hac nostra Moly aliud, q̃ syluestrem Rutam significat: eam scilicet quā Plinius in Galatia nascentem, in antidotis præcipue laudauit, Galatiam appellans. Dioscorides tamen aliud a Ruta Moly esse intelligens, cum de agresti Ruta testatus esset Moly a quibusdam uocari: de eo quod priuatim Moly ab Homero & Theophrasto dicit, egit, ex proprijs notis eum legentibus ostendens. Vidimus nos undiq; scriptoris huius historiae, præterq; in flore, respondentem plantam: quem luteo, non candido, & ut hic ait lacteo colore ostendebat: ex quo non penitus uanum opinati sumus quod a Plinio dicitur, tradidisse quosdam luteo flore Moly esse. Verumtamen contra Homerum & Theophrastum temere quispiam aliquid dixerit: neq; ego id ausim: cum similitudo naturæ in huiusmodi late pateat, & ea multiplici uarietate solita sit suos diuersis locis flores effingere. Non relinquendum illud etiam, q̃ parum uerisimile est, proferre Moly hoc caulem altitudine cubitorum quatuor: suspicamurq; nos in cubitorum numero uerum esse: neq; enim herbæ, fruticisue, quale Moly nunc ostenditur, sed arboris legitima altitudo ea est.

De Panace.

CAP. LIIL.

PAnax nonnullis Heracleum dicitur. Ex quo Opopanax colligi solet. Plurima ex parte in Beotia, & in Phocide Arcadiæ nascitur. Ibiq; compendij causa studiose colitur. Folijs est asperis, in terra iacentibus, hærbacei coloris, ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinquepartito diuisis. Caule, ut Ferulæ altissimo, qui lanugine quadam incanescit. Folijs etiam minutionibus obsitus. Muscarijs ceu Anethi in cacumine. Flore luteo, & semine odorato, feruenteq;. Radices habet multas ab origine una candidas, graue olentes, crassi corticis & amari. Nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui siccatus, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, folijs excauato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule messibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus albæ, rigidæ, & siccæ, ingustabiles, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex mediâ Ferula cibo idoneus est. Sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur, q̃ amarissimus, interne albus, aut subfultuus, foris ad croci colorem inclinans, læuis, pinguis, friabilis, statim in aqua eliquesceus, gra-

D I O S C O R I D I S

Cui odore. Niger improbat ac mollis. Adulteratur Ammoniaco, aut Cera. Sed synceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluatur, & lactescat. Excalfacit, mollit, extenuat. Febriū rigoribus, uulsis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio urinæ conuenit. Contra uesicæ scabiem ex aqua mulsa, aut uino bibitur. Menses trahit. Foetum enecat. Inflationes quæ uuluam male habent, duriciasq; ex melle impositus discutit. Ischiadicis illinitur. Acopis, & capitis medicaminibus ammiscetur. Carbunculos rumpit. Podagricis cum uua passa illitus, subuenit. Dolor dentium liberat, cauis inditus. Oculorum aciem excitat. Ex eo & Pice optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Ramenta radicis uuluæ admota, partus extrahunt. Ad uetera ulcera efficax est. Nudata ossa, corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum Absinthio sumptum, menses pellit. Cum Aristolochia prodest aduersus animalia, quæ uenenum ei aculantur. Contra uuluæ strangulatus in uino bibitur.

Plin. lib. 25. capit. 4. & 12.

PANACES generibus continetur pluribus. Syriū nascitur unguētis: quod & in Psophide Arcadiæ, circaq; Erymanthi fontes gignitur. Ferula sui generis quinq; cubitorum, folijs quaternis, mox senis, humi stratis, ampla magnitudine, rotundis in cacumen, oleagineis. Radix autumno, caulis messibus inciditur. Precium succo, in libras bini asses, erant candido. Laudatur enim in primis candor eius coacti: sequens pallido statera. Niger colos, & mollitia improbat: id quod ex Macedonia affertur. Bucolicon uocant: quoniā armentarij succum excipiant eum penē sponte. Hoc celerrime euanesce. Secundū genus Asclepion. Tertium Heracion. Quartum Chironion. Quintū Centaurion, & Pharnaceon. Theophrastus primū genus Heracion uocauit, folio magno & lato, undiq; sesquipedem. Radice digitum crassa, bifida, trifidaq; sub falsa, odore turis. Idem auctor & Panaceam noiat, circa Clitorium nascentem in Arcadia. Nec constat, an hæc idem sit habenda, quod Panaces Arcadiæ, de quo per huius capituli initia disserui. Panaces ipso nomine morborum omnium remedia promittit: ob id & medicamento ad uina quæ corrumpi nolunt, Panaceæ nomen dedere scriptores Græci. Radice huius euulsâ, religio erat, impleri scrobem eius uario frugum placentarumq; genere: in mercedem uidelicet & piamentum terræ. Panaces, & Panax, Galeno teste dici solita.

LEX M. VERG. COMM.
Libet in Herculeo Panace hoc, & alijs quæ statim sequuntur, Asclepio scilicet, & Chironio, ut in honorū uirorū arbitrijs quotidie sit, tertium aliquē dari mihi uelim, qui diuersa, contrariâq; de omni Panace sentientibus duobus maximis auctoribus, scriptore hoc, & Theophrasto, alteri accedens, non leuē dirimeret litem, & certiore aliqua nota, ex tam multis unū saltem Panaces nobis ostenderet. Turpiter em, nec sine graui iactura ignoratur, quod solo audito nomine, malorū omnium medicinâ, & remedia homini pollicetur. Liceret ad hæc rem Plinio uti: sed alienæ potius historiæ interpret, q̄ suæ assertor ille est: miscensq; duorū sapenū numero simul scriptorum dicta, difficiliora omnia, & minus certa legentibus facit: nunc peregrinâ Italiæ plantam, & unguentis utilem in Syria nascentem, nunc in hortis nostris consitam, & in uitæ quotidiano usu receptâ: nunc ex tam multis eius generibus unum tantū docens, modo multa & plura q̄ hic & Theophrastus numerâs. Quo fit, ut in tanti nominis apud ueteres planta, nostra uero ætate non satis nota, difficiliora omnia futura sint.

PANAX Asclepij caulem a solo emittit tenuem, cubitalem, geniculatum, maioribus q̄ sceniculi folijs, hirsutioribus, odoratis, aureo flore, acri, odorato, ex muscarijs dependente. Radix parua est & tenuis.

Auxiliarem uim habent flores & semina, contra ulcera, phagedaenas & tubercula, si trita cum melle imponantur. Aduersus serpentes ex uino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui Panaces syluestre Origanum uocant, alij Cunilam: de qua in Origanum mentione diximus.

B A R B A R I C O R O L L.

Panaces Asclepium, dictum aiunt, quoniam is filiam Panaciam uocauerit. Huius radicem Theophrastus multi & falsi corticis haberi dixit: quod quidem priori generi a Dioscoride tribuitur. Est & Heracion appellatum, Herculi ascriptum inuentori, quod ab alijs Origanum Heracleoticum syluestre accipitur. Quidam Heracion intelligunt genus id, quod mentione proxima descripsimus.

B A R B A R I C O R O L L.

Quae hic Asclepium Panaces, folia Feniculo similia habere dixit Theophrastus li. 9. de plantarum historia, Thapsia nulla diuersitate comparauit. Si quidem Thapsia Feniculi folio est: ut hic in eius historia non multo post dicit. Idem radicem Panacis huius crassam, & candidam esse dixit. Verba eius sunt, τὸ δ' ἀσκληπιὸν τὴν ρίζαν μῆκος ἔχει ὡς σισυάμην, λευκὴν δὲ καὶ παχίαν ἐφ' ἑσθ' αὐρᾶς. Eiusque nos accedere testimonio probauimus, quod in uetustissimo & optimo, probatissimo mihi codice legebat, ρίζα δὲ μικρὰ λευκὴ, quod est, breuis & candida. Multus, & paulominus quod ubique in impresso codice hic error est: ut λευκὸν, & λευκόν, quorum alterum tenue, alterum candidum significat, inueni cōmutent. Quaeque alij tenuem uerterunt, nos Theophrasti et melioris codicis fide adiuti, candidam diximus. Non posse autem tenuem legi, idem Theophrastus indicat, dicens, σφόδρα παχίαν, i. ualde crassam esse. Superest, ut de longitudine eius etiam aliquid dicamus. Theophrastus σισυάμην, i. do drantalem dicit: hic μικράν, i. parua, & si in melioribus graecis μικράν, i. longam legatur.

De Panace Chironio.

CAP. LV.

Panaces Chironium, in Pelio monte maxime prouenit. Folium eius Amaraco simile. Flos aureus. Radix parua, quae non alte demittitur, gustu acris. Pota radix serpentium ueneno resistit. Illita coma eadem praestat.

B A R B A R I C O R O L L.

Panaces Chironion, & hoc ab inuictore. Folium Rumicis Theophrastus & Plinius ei reddunt, maius tamen & hirsutius, radice parua. Nascitur locis pinguibus: cuius flos efficacissimus, eoque amplius quod superaddita prodest. Est & genus aliud Panacis ab eodem Chirone inuentum, & Centaurion cognominatum. Sed & Pharnaceon in controuersia inuentionis a Rege Pharnace deductum. Seritur hoc longioribus quod caetera folijs, & serratis. Radix odorata, in umbra siccatur, & gratia uino adjicit. Huius duo genera fecere, alterum leuioris folij, alterum tenuioris.

EX M. VERG. COMM.

Discrepant toto genere in historia foliorum Chironij Panacis Theophrastus, & hic scriptor. Ille enim Lapathum, quae latinis Rumex est, ea comparauit. ἔχει δὲ τὸ μὲν χειρῶνιον φύλλον μὲν ὁμοίον λαπάθῳ, μῆλον δὲ καὶ στενέτερον. Quibus uerbis, nisi uictiosa sint, certius aliquid audiri non potest. Hic, φύλλα δὲ ἔχει ἀμαράκῳ ὅμοια, quae id indicant, quod nos paulo ante diximus, folio Amaraci est: quod in tam grauibis, antiquisque scriptoribus merito aliquis demeret: multoque magis, quod uterque habet antiquos alios scriptores idem in commentarijs suis testatos. Hic scriptor Nicandrum in Theriacis suis, qui de Chironio Panace hoc agens, ait, πρῶτην μὲν χειρῶνος ἱπαλθία ρίζαν ἔχει, κεντάρων κρονίδαυ φερώνυμον ἢν ποτε χείρων, πηλὴν ἢν νιφίτοι κίχον ἱφράσαστο διερῶ, τῆς μὲν ἀμαράκῳ καὶ περὶ δὲ δρομῶν καὶ τῆς ἀνθῆς. &c. Quorum is est sensus, qui non multo ante in Herculeo Panace dictus a nobis fuit, idque amplius. Quod Amaraco similis fusa circūuoluitur coma, amaracum enim ille Amaraco similem dixit. Ille Plinium, qui lib. 25. capite. 4. de Chironio Panace ait, folium eius Lapathum simile, maius tamen, & hirsutius. Quae licet istis uerbis ex Theophrasto reddita ab eo fuerint, nec maior ob id fides huic historiae accedat, antiquam saltem Theophrasti eam fuisse lectionem testantur. Graues utrinque scriptores stant, nec leui auctoritate utrinque pugnatur: & in re non satis nostra aetate certa, difficillimum est censere aliquid: inuenisseque, quomodo Rumicis & Amaraci folijs, quorum grandius alterum, alterum breuius est, comparari eodem tempore folium aliquod possit. Nisi forte dixerit aliquis, in altero figuram, in altero quantitatem in comparatione aestimari. Verum in tanto discrimine parum uerisimile id

D I O S C O R I D I S

C est. Solent enim cognomines plantæ, quales hæ sunt, maiore sui parte inuicē sibi similes esse. Idque in Origanis, Vellicarijs, utroque Elleboro, alijsque huiusmodi manifeste deprehenditur. Neque ego is sum, qui facile persuadear. Si Herculeum Panaces, quod hic ait folia habere *πρὸς τὰ τῶν οὐκ κκς*, quod est, ad ficulnei folij figurā, multoque magis magnitudinē: & Theophrastus *φύλλον ἰχθυμίας χροῖ πλάτυ καὶ τρισπίδαμον πανταχῇ*, quod est, habere Herculeum Panaces folium grande, latum, & in omnes partes trinis dodrantibus, Chironium hoc ob similitudinē Panaces, itidem appellatum folio Amaraci esse. Inclinat ob eam causam animus in Theophrastum, qui Rumi cis folio Chironij huius Panacis folia comparauerit, quæ grandia Panacum omniū folijs magis congruent. Quodque a Nicandro & scriptore hoc de Amaraco dicitur, odoris, coloris, aut figuræ tantū rationem habere. Legentibus tamen & herbarum peritioribus liberum & arbitrium hoc, quemadmodum & multa alia, relinquatur.

De Ligustico.

C A P. LVI.

Λιγυστικόν

Ligusticum, quod alij Panaciam, alij Panaces uocāt, plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino, Alpibus contermino. Unde nomen traxit. Panaces incolæ non ab re appellant. Quoniam & radice & caule Heracleotico Panaci simile sit, & uiribus eisdem præditum. Gignitur in altissimis asperisque montibus, ac umbrosis, maxime iuxta riuos. Cauliculum fert Anethi, geniculatum, tenuem, & in circumitū folia Sertulæ campanæ molliora, odorata, prope uerticem graciliora, & longe magis diuisa. In cacumine muscarium, in quo semen dependet nigrum, durum, & oblongum, fœniculo proximum, gustanti acre & Aroma olens. Radix candida, Heracleotici Panacis similis, odorata. Radicis feminisq; uis excalfactoria, concoquens. Prodest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones. Item ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgeat. Et contra serpentium ictus. Urinas, & menses potu trahit. Eisdem præstat effectus appositæ radix. Semen cum radice oxyporis, & medicamentis decoquentibus ammiscetur. Stomacho per se utile. Quare pro pere utuntur eo indigenæ ad obsonia. Adulteratur semine quodā simili. Quod facile gustu discernitur. Amarum enim est. Alij semen Fœniculi, aut Seselis ammiscentes, Ligusticum dolo uitiant.

Pli. li. 19. ca. 3.

Ligusticum syluestre est in Liguria suæ montibus: sed scribitur ubique, quod & suauius est, quæp sine uiribus. Crateias apud Græcos, Cunilam Bubulam eo nomine intelligit falso. Cæteri fere Cunizaminem, Cunilaginemque. Ligusticum Galenus unius inuersione literæ, Li-byfticon appellat.

E X M. V E R G. C O M M.

Pro Piperi Ligustici semine utebatur ubique antiqua & rustica plebs, serebatque in hortis suis: licet non adeo efficax, ut in montanis Liguria per se nascens: non tam quia Piperis eam nondum copiā miserat India, quā nostra ætas, peragrato omni Indico mari, habet: quando, quia peregrinis mercibus libenter abstinentes, non minus sibi, quæ alijs in obsoniorum condituris liberalem fuisse naturā indicare uoluerunt. Ideoque quibus regio hæc nostra abundat, libenter utebantur. Sentiebant etiam, quas habet nimias Piper in calefaciendo & siccando uires, parcentesque illi, ex montibus, hortisque suis ad coenam saporem, uiresque eius alias quærebant. Præstabant id multa quondam in herbarum & seminum genere, sed Ligusticum præsertim: quo Columella ultimo ultimi libri capite ad Oxypora uti docuit. Frequens peculiarisque Apennini montis ad Alpes planta hæc est: a gente inuento nomine, quod etiam a græcis omnibus receptum fuerit, idque ex Galeno scriptore hoc, cunctisque alijs patet, in Liguria nasci testantibus: & si ut paulo ante diximus, in hortis feri postea coeperit: ne ex India, longinquisque locis repe-

tendum esset, quod sapore Piperis obsonia & pulmentaria eorū temporū cōmendaret. Crēdimusq; nos, esse hoc quod Columella lib. 12. Panacis nomine autumnū, & uere feri iubet, leni & subacta terra, raris interuallis, quo maius incrementū capiat. Idem quo diximus paulo ante loco Oxyporis misceri Ligusticū iubet; & qualia antiquis Oxypora essent, & quo modo conficerent, longissime etiā docuit: sic dicta, q̄ aceto condita ad intinctus seruarentur.

De Pastinaca.

CAP. LVII.

Pastinacam syluestrem, aliqui Cerasconiam uocant, Latini rusticam Pastinacam, aliqui Carotam, Aegyptij Babubyron, Aphri Sicham. Folia Gingidij habet, latiora, subanara, caulem rectum, scabrum. Umbellam similem Anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam, ferme croceum. Radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum uel impostum menstrua mouet. Iis conuenit in potione, quos urinæ difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cutem subiit. Serpentium moribus ictibusq; prodest. Præsumentes eam, nulla affici iniuria a serpentibus traduntur. Conceptus adiuuat. Radix urinam pellit. Venerem stimulat. Partus apposita eiicit. Folia trita, & cum melle imposita, phagedænas ulcerum purgant. Satiua ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo aptior.

BARBARI COROLL.

Pastinaca syluestris, siue quod idem est Erratica & pratensis, ad differentiam satiuæ dicitur. Præfertur satiuæ syluestris in medicina, magisq; in petrosis nata. Pastinacæ omni radicibus calens natura, sapor uehemens, ob id Venerem cire creditur, & propterea Philtron uocari. Cartilaginei omnis generis. Satiua in cibum utilis esse incipit annicula. Bina utilior, gratior autumnū, patinisq; maxime, & sic quoq; uirus intractabile illi est, ut inquit Plinius. De Hibisco & Dauco, quæ simillima existimantur Pastinacæ, dicemus suis locis. Diximus & de Sifere, cui cum Pastinaca uicinitas eadem est. Pastinacam Diocles medicus non Staphylinum, ut cæteri, sed Astaphylinum uocauit, duodecim cubitorum in Mauritania magnitudo caulis, crassitudo palmorum quaternum.

EX M. VERG. COMM.

Dvplex genus Pastinacæ, satiuæ, scilicet & agrestis. Rursusq; agrestis multiplex. Potius diuilio q̄ genus suspicionē quorundā merito auxit, sit ne agresti Pastinacæ idē Daucus, an alteri us generis herba: præsertim duobus capitibus, diuersisq; locis de utroq; tradente scriptore hoc. Verum ex his, quæ in græcis & latinis obseruata diu a nobis fuerunt, sciendum illud est, Staphylinum a græcis simpliciter Pastinacam dici olus, & oleris notissimam, & quotidiani usus radicem: nullaq; adiecta nota alia, satiuam semper intelligi. Sic Columella in carmine suo cecinit. Latetur, mollemq; sinum Staphylinus inumbret. Serenda enim in hortis tunc numerabat. Idem libro decimo capite quarto. Tunc agrestis Pastinaca, & eiusdem nominis Edomita, quam Græci Staphylinum uocant: Edomitam satiuam intelligens. Sic rei rusticæ & hortensium scriptores ali. Plinius, quoniā utriusq; quotidianus esset usus, satiuæ, agrestis uel addito discrimine, alterutrum præuocare indicat. Habet satiuæ hæc, ut fere in plantarum genere omnia, diuersam sibi syluestrem nascentem ubiq;: multi usus & ipsam, & in medicina præsertim. Nam satiuæ illa præcipuum habet in sanitate inter olera usum. Syluestris uenit & ipsa quidem in quotidianos cibos, sed ob multas, quas habet medicas vires, a medicis celebratur, & expetitur magis. Hanc Græci nunc, nisi addito syluestris discrimine, appellant, σαφύλινον ἄγριον uocantes, id est, Pastinacam syluestrem. Intelliguntq; eam, quæ locis incultis nascens, Satiuæ pariter frondeat & floreant, sed minore radice, & magis fibrata sit. Syluestrem hanc idem Græci, ut certiore uocis discrimine a satiuâ illa separaretur, Daucum dixerunt. Testis pluribus locis Galenus: qui de utroq; Staphylino agens, ait, ὁ σαφύλινος ἄγριος ὁ δὲ σαφύλινος καλοῦνται. Quod est, Satiuæ quidem Pastinacæ ignauior: agrestis uero, quā Daucū uo-

σαφύλινος ἄγριος

Pli. li. 19. cap. 5.

B

Cant. &c. Agrestem Staphylinū, Daucum tantū nominis auctor uocari tradidit. Testis Paulus Aegineta lib. 6. de simplicibus agens. *σταφυλίνος ὁ καὶ σταφυλίνος*, quod est, Daucus, qui & Staphylinus. Sed manifestius primo uolumine capite de his quæ edendo radices habent: in quo cum plures alias numerasset radices, *σταφυλίνου καὶ σταφυλίνου* ait: quod est: Staphylini autē & Dauci, satiuam, & syluestrem Pastinacā intelligens. Plinius præterea multis locis, & ipse congenerū duarum radicū discrimina aperte indicauit. Nec dubitandū cuiusnam esset, quin Staphylinus græcis, & Pastinacā latinis simpliciter dicta, in hortis consistā non significet, longiorem, crassiorē, nec fibris capillamentisue tot quot syluestris in terra hærentem: Daucus uero illis, nobis agrestis Pastinaca, syluestrem illam significet in aruis, pratis, & inculdis locis per se nascētem. Cuius radice per hyemem satis grata in cibis etiā sit. Estur enim cruda in acetarijs, sed cocta suauius responderet & sapit. Rura nostra satiuā illam Pastinacam, Syluestrem non multo diuersa uoce, mutatisq; tantū aliquot literis appellant: ut ex hoc etiā congeneres herbas esse conijcere liceat. Superest modo, ut dicamus, si satiuā tantū, & agrestis Pastinaca sit: illaq; simpliciter Pastinaca, hæc Daucus quondā, aut syluestris Pastinaca dicta fuerit: cur duobus capitibus, diuersis locis, primūq; sub titulo agrestis Pastinacæ, mox sub Dauci uoce de eadē planta hic scripsit egerit. Quod ex Theophrasto, Plinioq; nouisse difficile non fuerit. Neq; em̄ hic, quia diuersi oīno generis sunt, syluestris Staphylinus, & Daucus duobus locis, & duplici historia de eis egit: sed quod uarietate in diuersis gentibus earum herbarū natales & uires natura, testari in medicina seorsum id oportebat. Plura em̄ Daucorum gēna numerauit antiquitas, non gēne, sed natali solo diuersa. Indicatq; id Plinius lib. 19. cap. 4. qui cum agrestem, satiuāq; Pastinacā numerasset, moxq; tertiam, quā ille Hibiscum noīat, statim subiecit. Est & quartū genus in eadem similitudine Pastinacæ, quā nostri Gallicā uocant, Græci uero Daucon. Ex quibus conijcere facile est, quondā in græcis non omnē syluestrem Pastinacā Daucon, ut postea factū est, sed propriū, priuatimq; aliquod eius genus uocatū fuisse: quale Theophrastus lib. 9. de plantarū historia his uerbis indicauit, *σταφυλίνος δὲ περὶ τῆς σαπυλίνης τῆς ἐχέας διαφέρει διὰ τὸν φόνον, ὅτι τῆς ἐχέας μὲν αἰσιναι*. quod est, Egregia bonitate autē Daucus in Achaia Spartensi agro, calefacit natura, & nigrā habet radicem. Qui color in satiuā & agrestis Pastinaca nescio an in Italia uisus aliquādo fuerit. Ex eo nō fuerit in hoc scriptore absurdū, his de eadem plāta diuersisq; nominibus actū fuisse. Primū, ut quas habet in medicina uires agrestis oīs Pastinaca, ubiq; nascens indicaret: mox Dauci appellatione Cretica, ut ille in Dauco ait, & certis locis nascens doceretur: cuius propriæ uires propria sibi etiā historia exigerent. Potuit & illud in causā esse, quod quo tēpore hic medicinā suam cōmentabatur, Dauci appellatio non oībus syluestribus Pastinacis respondebat, sed Creticæ tantū. Quos em̄ nos testes citauimus Galenū, & Paulum Aeginetā, cum ostenderemus paulo ante eundē illis esse Daucū, & syluestrem Staphylinū, huic scriptori posterioris fuerūt: & quod certe rei ante eos æstimationē habuerat, mutata ut in cæteris humanis rebus sit uocū fortuna, aliud significare potuit. Quotidie em̄ fieri uidemus, qd Flaccus ait, perire multas, renasci multas subinde uoces, si uelit usus. Quæ penes arbitriū itus est & norma loquendi. Nobis, ut tā multo tēpore esse, & a latinis Erraticam Pastinacā uocari: & in hoc scriptore non damnandā eiusdem plantæ duplicem historiā. Factum em̄ id est, uel ob diuersas uires & notas, quas Cretensis & in Achaia nascens Daucus haberet, ob quas hic a cōmuni Staphylinō hac uoce separauit: uel in quā partem nos propensiores trahimur, quoniā Dauci uox, antiquiore illa ætate, priuatim inter syluestres Staphylinos, aliquē indicans, a posterioribus ob similitudinē ad totum eorum genus translata fuerit: pertinetq; eo quod Plinius ait. Est & quartū genus in eadē similitudine Pastinacæ nascens, quā nostri Gallicā uocant: Græci uero Daucon. Ex his em̄ ratiocinari licet, Daucum similē Pastinacæ erraticæ esse, non eundē: & a Romanis nomine gentis distingui, quemadmodū in græcis a Staphylinō agrestis alio noīe distinguebatur. Hunc, siue syluestrem Staphylinū, siue Daucon appeller aliquis, hic *κέρας*, id est, cornu uocari ait. Quod & græcorū Lexica testantur, in quibus legitur *σταφυλίνος ὁ ἀγριος ὃν ἔχει κέρας καλεῖται*. Credimusq; nos, quod paulo ante dictū est, a cornu forma & longitudine sic dictū a Græcis fuisse. Potuit tamen & alia rōne sic uocari, a fibrata & capillata radice, quā habet, *κέρας* em̄, ut testatur Plutarchus in li bello, cui titulus est, Vtrobī, in terrestribus. s. an aquatilibus maior prudētia sit, antiquis græcis *τρίχας*, i. capillū significabat. Cuius significationis indicium est *κέρας* uerbū, quod tondere est: & *κονὴ* nomē. i. tonsura: & qui apud Archilochū *κισσὸς* legebat ὁ περὶ κῆμιν καλλωπιστής, i. qui in ornāda coma occupat. Quæ snia melior & probanda magis uidet, ob id quod statim sequitur. Sunt qui & comā Staphylinū agrestem, ob eandem scilicet causā uocent.

De Sefeli. CAP. LVIII.

Sefeli Massiliense, quod nonnulli Sphagnon uocant, folia Fœni-
culi habet, crassiora, caulem uegetiorem. Umbellâ Anethi, in qua
semen oblongum, angulosum, degustanti acre. Radix longa est, iucun-
di odoris. Semen & radix excalfaciendi uim habent. Potu stranguriæ
& orthopnoæ medentur. Suffocationibus mulierum, comitialibusque
profunt. Menses & partus trahunt. Ad omnia interna mala pollent.
Tussim ueterem sanant. Semen cum uino potum concoquit, & tormi-
na discutit. Epialis febribus utile. Contra perfrictiones in itineribus, cū
pipere & uino bibitur. Capris, cæterisque pecudibus datur in potu, quo
facilius suos foetus enitantur.

BARBARI COROLL.

Sefeli Massiliense optimum. Lato enim grano & fuluo est: quo & Vultures uescant, & Cer-
uæ parituræ. Sefeli & Sili dicitur, & Seli apud Hippocratem, unde orta confusio Siler pro Sefe-
li uocantiū Arborefcit porro Siler, ut baculos rustici ex eo quæ faciant, in aquaticis nascens.
Molle Siler

Pli. li. 20, ca. 54

^a Poeta dictum neutro genere, quod perçrarum sit in arboribus latina lingua. Refugiunt hoc
serpentes. At Sefeli frutex non est aquaticus: quod quidem aliqui distinguere putantes, non Si-
ler, sed montanum Siler appellauerunt id, quod Massiliense est Sefeli.

EX M. VERG. COMM.

A seminis figura latum Cuminum in græcis, Massiliense Sefeli aliqui ut uidetur appellau-
runt. Ea uox in antiquis eorum codicibus adhuc seruatur: nec nos eā negleximus, dicente Pli-
nio optimum Massiliense: lato enim grano, & fuluo est.

B

De Aethiopico Sefeli. CAP. LIX.

Aethiopicum Sefeli, quod Aegyptij Cyonum phricen uocant,
folia habet Hederae, minora, & ad Periclymeni modū oblon-
ga. Frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipe-
dalibus, capitulo Anethi. Semine in Tritici morem denso, nigro, ama-
ro, Massiliensi odoratiore & acriore, multum suauis.

ἄθιοπικόν σέλιον

BARBARI COROLL.

Sefeli Aethiopico dignitas secunda. Hoc & nigrius est, & nascitur hodieque apud nos: sed fru-
stra, medicis officinisque incognitum.

De Peloponnesi Sefeli. CAP. LX.

Peloponnesense folia habet Cicutæ, latiora, & crassiora. Caulem su-
pra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latum in cacumi-
ne capitulum, in quo semen latius, odoratum, & carnosum pendet. Eif-
dem uiribus præditum est. Nascitur in asperis, riguis & collibus. Inue-
nitur etiamnum in Ida monte.

De Cretico Sefeli. CAP. LXI.

Tordylium, quod aliqui Creticum Sefeli uocant, iuxta Cilici-
am in Ameno monte nascitur, hærbula furculosa, semine du-
plici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra urinæ diffi-
cultatem bibitur. Potu cit menses. Succo seminis caulisque uirentis, ter-
nis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est ra-

τὸρδύλιον

G

D I O S C O R I D I S

C dix ad ciendas pectoris excreationes in delinctu cum melle.

BARBARI COROLL.

Tordylon, & Gordylon, & Tordilon & Tordyle dicitur, & Sefeli cognomēto. Creticum inter omnia genera odoratissimum. Tordylon porro, alij semen Sefelis dixerunt, alij herbā per se, quam & Syreon uocauerunt, de qua nihil aliud proditum inuenisse Plinius fatetur, q̄ q̄ in montibus nascitur, Paulus non Tordilon, sed Gordylon appellauit.

EX M. VERG. COMM.

Non habet certum in antiqua medicina Tordylon hoc nomen, nec certam penitus historiam: aliter alijs id appellantibus, & de eo tradentibus. Plinius non satis cognouisse rem uidetur, diuerfas ante se scriptorum sententias tantum referens. Paulus Aegineta in sexto, Gordylon, non Tordylō uocat: facile tamen & lubrico in una tantum litera ad uirtutem lapsu, quo loco eadem huic scriptori uires illi adscribit. Alij sceminino genere Tordylem uocauerunt. Alij Sefelis semen hoc nomine censi uoluerunt. Alij sui generis herbam Græciæ & Italiæ peregrinā, ideoq̄ parum notam. Nec nos quod pro ea dicamus aliud habemus, q̄ Sefelis genus esse credere nos: ex quo hic statim ab omni Sefeli eā descripsit: propriūq̄ & priuātū ab illis aliud a gente in qua nasceretur nomen sibi inuenisse. Fecit rei incertitudo hæc etiam, ut in fine capitis ab alijs quo qui deprehendisse Tordylon se crederet, accreuerint aliqua quæ in impresso & pleriq̄ alijs leguntur, ab alijs interpretibus continuata sermonis serie reddita. Nos ea reliquimus indigno huic scriptori uerborum ductu tractata, & in uetustissimis græcis latinisq̄ nusq̄ inuenta.

De Sifone. CAP. LXII.

Sifon exiguum semen est in Syria natum, Apio simile, nigrum, feruens, oblongum. Contra lienis uitia bibitur. Vrinæ difficultatem potu emendat. Remoratos menses citat. Quo in condimentis cum Cucurbita & aceto indigenæ utuntur. In cacumine granula multa gerit.

BARBARI COROLL.

D Sifon, siue Sinon, & Senon Hippocrati, & quandoq̄ Silion uocatur, quaternis constare ramis scriptum reperio.

EX M. VERG. COMM.

Cognouit Hippocrates Sinnon. sic enim eum appellat. Cognouit & Paulus Aegineta, qui calidū, & subamarum esse testatus est: ideoq̄ concoctiones adiuuare, menses pellere, & interanea, quæ græci ανδροχνα dicunt, laxare. Latini scriptores, quod hæcenus legerim, aut meminerrim, nihil de eo egerunt. Hic etiā exiguum semen in Syria nasci dicens, importune relicta herba historiam eius incepit. Fuisse rem & usum eius satis Hippocrates, Paulus, græciq̄ omnes & latini huius scriptoris codices testantur.

De Aniso. CAP. LXIII.

Anisum semen paruum est in Syria natum. Apio simile est, magnum, feruens, oblongum. Contra lienem et urinam quæ ægre redditur, bibere prodest. Retardatos menses pellit. Id incolæ ad condimenta usurpare solent, & cum Cucurbita in aceto decocta assument. Anisum in summa exalfacit, exiecat. Oris halitum iucundiores facit. Doloris leuamentum præstat. Vrinam ciet. Aquam quæ subijit cutem dissipat. Potū sitim cohibet. Animalium uenenis aduersat. Valet ad inflammationes, aluumq̄. Alba sceminarū profluuiā sistit. Lac ad mamas elicit. Venerē stimulat. Dolores capitis leuat, suffitū narib. Cū rosacco tritū, instillatūq̄ fractis aurib. medet. Melius semp recēs, plenū, non fursuro sū, odore p̄stans. Inter prima laudatū est Creticū. Proximū Aegyptiū.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 20. ca. 17
lib. 19. cap. 8. 2

Anisum culinis gignitur, crudum, decoctum, uiuens, aridum, panis etiam crustis inferioribus subditum. Succis quoq̄ laudatur additum cum amaris nucibus commendando uino. Ani

cetum & hoc uocatur Anethi modo, quoniam appetentiam præstet ciborum. Aegyptium Ligustici uicem præbet in condimentis. Efficacius semper recens & nigerrimum. Stomacho tamen inutile est, præterquam inflato.

¶ De Caro. CAP. LXIII.

Carum semen est uulgaris notitiæ. Excalfacit. Vrinam concitat. Stomacho utile. Os commendat. Concoctionem adiuuat. Mistum antidotis & oxyporis Anisi uicem præbet. Radix cocta Pastinacæ modo manditur.

BARBARI COROLL.
Caros arbitror hoc esse, quod Plinius Carium, siue Careum græcis suæ nomine appellatum dixit: ab aliquibus Careosemen, & Caroum: culinæ principale, in quacunque terra ferendum ratione qua olus atrum. Laudatissimum in Caria, proximè Phrygia. Caros Græci, ut Pathos nostro genere pronuntiant & inflectunt. Dicitur & Caro, ultima producta. Caron Athenæus Pastinacam maiorem esse putat, & multo præstantiorem sapore, quam Pastinacam uulgarem. Est & radix Cara, de qua in rebus gestis a Cæsare mentionem facit Hirtius. Hac lacti admixta, multum leuasse dicitur inopiam, similitudine representata panis. Meminit & Plutarchus, sed nomen herbarum non reddidit.

EX. M. VERG. COMM.

Medicinam pluribus subinde remedijs instruens hic scriptor, Cari semen præcipue commendauit. Athenæus contra, ganeam cibosque Dipnosophistas illos suos nono sui operis commentario docens, radicem celebravit, Maiorem Pastinacam appellans, uulgari hac & quotidiana meliorem. Idem Paulus Aegineta libro primo capite de radicibus quæ edendo sunt, tres has ueluti congeneres his uerbis coniunxit. *σαφύλινον δὲ καὶ δαύκον καὶ κάρον, αἱ μὲν ἵψαι ὀλιγοτροφώτεραι τῷ γογγυλίδων ἴσσι, θερμὰ δὲ καὶ ἀρωματίζονται σαφέστε καὶ οὐρητικῇ.* &c. Quod est, Pastinacæ uero, agrestis Pastinacæ item, & Cari radices minus quam Rapa nutriunt: calent tamen, odorataeque sunt, & manifeste urinam cient. Ex quibus ratiocinari & colligere licet, aut Pastinacis congener, aut illis non dissimile Caron hoc esse.

¶ De Anetho. CAP. LXV.

Anethum quod estur, aliqui Polygida uocant, alij Anicetum, Magi Cynocephali genituram, aut capillos, alij Mercurij semine, Latini Anethum, Aphri Sicciriam, Aegyptij Adracum. Daci Pulpum. Aridi Anethi comæ seminisque decoctum, potu lac euocat. Inflationes & tormina sedat. Aluum uomitionesque sistit. Vrinæ ciēt. Singultus lenit. Oculorum aciem hebetat. Genituram restinguit assidue potum. Fœminis uulvæ malo opportunis ad deflectiones utile. Condylomata illitus eius cinis tollit.

BARBARI COROLL.

Anethum, culinæ Anisi modo gratum. Coronabantur hoc & in conuiuio recenti, atque roscido, ad conciliandum, ut uidetur Galeno, somnum.

¶ De Cumino satiuo. CAP. LXVI.

Cuminum satiuum ori gratum est. Sed multo magis Aethiopia tenet Aegyptium. Reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Therentia, & plerisque alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exiccat. Ad tormina inflationesque conuenit, coctum & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca. De morsu a serpente in uino. Testium collectionibus auxiliatur, impositum.

G. n.

ἀνέθον

Anethum & habere acutissimum sorem.

Pli. li. 19. ca. 8.
lib. 20. cap. 18

κύνινον

Cum cum uua passa, aut lolij farina, cæratoue. Mensium abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis p^{er}fluuia sistit. Colorem bibentium, aut perunciorum mutat in pallorem.

Pli. li. 20. cap.
14. & 15.

B A R B A R I C O R O L L.

Cumino semen angustum, nudum, canaliculatumq; facile inarescens frumenti modo, ubi plane accreuit, defluū atq; lubricum. Peculiares Cumino morbi, scabies, & falsilago. Nascit in summa tellure, uix hærens, & in sublimē tendens; in putribus & calidis medio ferendū uere. In Carpentania maxime laudat; alioquin Aethiopico, Africoq; palma. Quidam huic Aegyptium prætulere. Hippocrates in segetibus inquit triticeis, præsertimq; in Aegypto nascitur semē Aethiopico similē Cumino, uehementis acrimoniæ, ad conceptus seminarum utile, si uuluis apponatur. Hoc ego Cuminum Aegyptiū interpretor. Basilicum & Aethiopicum apud Hippocratem, pleriq; interpretantur Ammi.

E X M. V E R G. C O M M.

Meliore scēre feliciusq; provenire Cyminum, lib. s. de plantarū historia testatus Theophrastus est, si in ferendo maledicant, imprecanturq; illi mala qui id ferunt: nec minus gaudere maledictis his & imprecationibus, q̄ laudibus & blanditijs in spem honoris erigantur homines.

Ἐγρίον κύμινον

De Syluestri Cumino. C A P. LXVII.

Syluestre Cuminum, siue syluaticum, plurimum efficaciusque in Lycia & Galatiæ Asia, atq; Carthagine Hispaniæ gignitur. Frutice paruo, dodrantali caule, ac tenui, quaternis aut quinis folijs tenuibus, ueluti ferratis, & Gingidij diuisura. In cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda, in quibus est semen acerosum, gustu satiuo acriorē. Nascitur in collibus. Bibitur semen ex aqua aduersus tormina, inflationesq;. Item cōtra uenenatas bestias ex uino. Singultus ex aceto sedat. Somacho utile, quem humor uexat. Sugillata tollit, si manducatum cum melle et uua passa illinatur. Testium inflammationibus, adiectis eisdem medetur. Est & aliud syluestris Cumini genus, satiuo non dissimile, quod a singulis floribus pensilia promit cornicula, in quibus semen est Melathio simile. Quod potum omniū serpentium moribus præsidio est. Calculosis, & ijs qui urinæ stillicidio uexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur. Sed Apij semen feruēfactum postea bibendum est.

B A R B A R I C O R O L L.

Cuminum syluestre est, quod & Rusticum & Thebaicum appellat. Aetius Cuminum inquit syluestre, hoc est quod modo Aethiopicum uocari coepit.

Ἐγρίον κύμινον

De Ammio. C A P. LXVIII.

AMMI, LATINI Ammum Alexandrinum, nonnulli Aethiopicum, quidam regium Cuminum appellant. Plerique diuersarum naturarum esse Aethiopicum Cuminum, & Ammum existimant. Vulgo notum est, semen exile, multo minus Cumino, Origanū resapiens. Eligendum est purū, minime fursurosum. Vis ei excofactoria, feruens & exiccās. Facit ad tormina, urinæ difficultatē, serpentium ictus cū uino potū. Menstrua ciet. Miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ Ecdoria uocant, ut inde exortis urinæ difficultatibus resistat. Sugillata cum melle tollit. Colorem potu, aut illitu

mutat in pallorem. Suffitum cum uua passa, aut resina, uulvas purgat. **A**

BARBARI COROLL.

Est Cumino simillimum quod Græci uocant Ammi, tantum candidius & exilius Cuminum. Similis autem & huic usus, nam & panibus alexandrinis subigitur, & alimentis interponitur. Herbam quoque ipsam græci uocant Ammi.

EX M. VERG. COMM.

Peregrinum semper Græciæ & Italiæ fuit, siue sui generis herba & semen, siue Cymino cōgener Ammi sit, meliusque & efficacius in Aegypto nasci. Eamque ob causam usa eo antiqua medicina est, aliunde inuecto. Fuit in Aegypto quondam domesticus Amos huius, & quotidianus usus: panibus enim cōpinsebant, & alimētis miscebant. Calefacere, siccareque in tertio ordine ueteres græci id dixerūt, maioreque in extenuando uique Cymini esse. Quæ aut a principio statim leguntur, uocare quosdā hoc Aethiopicū, & regium Cyminum, ex aliorū opinione, nō huius scriptoris decreto intelligenda sunt. Neque enim ipse id probat, sed a quibusdā sic uocari tū testatur. Siq̃dē Aethiopicū, et regij uoces, bonitatis a gēte in Cymino notæ sunt, nō generū diuersitates.

De Coriano. CAP. LXIX.

Corium, aut Corianum Aegyptij Ochion uocant. Vulgaris est notitiæ. Vim refrigeratorem habens. Quare illitum cum pane, aut polenta, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt medetur. Epinyctidas cum melle, uel uua passa, testium inflammationes, carbunculoseque sanat. Cum faba fresa, strumas & tubercula discutit. Tineas interanorum expellit, semen cum passo potū. Geniturā adauget. Largius tū sumptum, mentem non sine periculo mouet. Quare continuo & copioso re usu abstinentum. Succus cum cerusa, spumaue argenti, necnon aceto & rosaceo illitus, arduentes summæ cutis inflammationes emendat. **B**

BARBARI COROLL.

Coriandrum, Corion, & a Theophrasto Corianifon uidetur appellatum, siue ut magis probō Coriannon. Ita uocari solitum a ueteribus, testis est Galenus & Dioscorides. Seritur maio, & contumax prouentu scribitur. Radice breuiuscula, nec admodum fibrata: caulibus ramisque multis, nudo semine, ac firmo & diutino. Sub canis ortum nascitur. Inter syluestria Coriandrum nō est. Huic subrito cum aceto, uis tanta, ut carnem incorruptam seruet æstate. Xenocrates tradit menstrua cōtineri uno die, si unum granum biberint foeminae: bido, si duo; & totidem diebus, quorū grana sumperint.

EX M. VERG. COMM.

Crediderūt Coriandro aliqui in Græcis nomē fecisse Cimices, quos folia eius & caules olent. Et quoniam insectū id græci Corin uocēt, ideo olentē eos plantā Corion nominauerint. Sunt contra, qui quod Corian nō græci frequentius quod Coriō Coriandrum uocent, nō a Cimicibus, sed quasi Coriambon, i. hebetantē oculorū pupulas dictum fuisse uelint. *κόρυ* enim oculi pupulā, & *ἀμβλύνειν* hebetare idem græci dicunt. Quod quod uerū sit, peritiores intelligent. Ab hoc enim nihil quod ad oculos pertineat priuatim in Coriandro decernitur. Omnium eius appellationū prior illa in hoc, & alijs medicinæ scriptoribus frequentior est. Alterā illā in cōmuniore sermonis usu fuisse, indicat in equibus suis Aristophanes. Quocumque aut nomine uocetur, nota omnibus planta est, semperque precipue: ideoque nō ultra a nobis tractanda. Numerat ab hoc ipso scriptore, s. uolumine inter uenena: odoreque præsertim deprehendi, quod similis uiuenti Coriandro toto corpore sentiat. Meminit & Nicæder in Alexipharmacis suis, quod loco interpretis eius syluestri Coriandro ueneni masculicū inesse ait: quod ab eo describitur latioribus longioribusque folijs, multis adnatis, & numerosa radice, copiosoque flore. Quod nescio an uerum sit: testante Plinio. 20. uolumine eiusdem numeri capite, non inueniri inter syluestria Coriandrum. De eo iterum in. 6. agendum nobis erit.

De Hieracia. CAP. LXX.

Hieracia magna, alijs Sonchites, Romanis Lampuca, Poenis Si thileas, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum, *ισχυρόν & μέγαν*

D I O S C O R I D I S

C folia, ex interuallis rariuscule diuifa, similia Soncho per ambitum, luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modice substringendi. Vnde illita, stomacho aestuanti, inflammationibusq; prodest. Succus erosionem sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, uibrata a scorpione ictibus auxiliatur.

Pl. li. 1. §. 4. ca. 11.

BARBARI COROLL.

DE Hieracio inter Lactucas syluestres meminimus: quoniam Romani Lactucam folio rotundo & breui Hieracion intelligebant. Dicta est ex eo, qd accipitres scalpendo eam, & oculis succo tinctis obscuritatem cum sensere, discutunt.

ἱερᾶκιον ἢ μικρόν

De Hieracia parua. CAP. LXXI.

Hieracia parua, quam aliqui Sonchiteni, alij Entimō agrion, Romanij Intybum syluestre uocant, folia ex interuallis habet diuifa in ambitu. Cauliculos teneros, uirentes, in quibus lutei flores orbem circinantes emicant. Vim suam ad eadem quæ superior impendit.

BARBARI COROLL.

Hieracium, & hoc superius etiam Hieracia dicitur Aetio atq; Horo, cuius succo palpebræ reglutinant. Idem autor eodem loco, Anacollia inquit appellantur, quum lachryma incōmodates pilos corrigit. Quid aut sint Anacollia nō cōpi: nec simplex, an cōposita sit facultas scio.

EX M. VERG. COMM.

Accipitres, quos græci Hieracas dicunt, Hieracio quondam nomen fecerunt: scalpentes eā, si Plinio credimus, succoq; oculos tingentes, ut eorum obscuritatem cum sibi obrepisse eam senserunt, discutiant. Apuleius, quod fabulosum uideatur, his addidit, Aquilam in altum alis se tollentem, ut rerum naturam certius contempletur, Lactucæ siluaticæ (Hieracium hanc intelligens) folia euellere: succoq; sibi oculos tingentem, optatam eorum claritatem acquirere. Sed quodcunq; id sit, ab his auibus græci Hieracium dixerunt. Sæpe enim a brutis, naturæ necessitate impulsis, ignotum aliquid nobis fit. In quo eorum sensus ignari homines, quod uero similius, non quod uerum sit comminiscuntur: quemadmodum longius in utroq; Echino dictum secundo uolumine a nobis est. In Lactucarum sponte nascētium censu ab omnibus propter similitudinem Hieracion hoc numeratur. Plinius. 10. libro, capite. 7. ultimam hanc in eo genere describit, folijs rotundis, & breuibus. Apuleius in agresti Lactuca Hieracifon uocari dicens, meminit eius. Hic Lactucam erraticam dici a quibusdam tradit: quæ uox & appellatio quoniam in scriptore hoc perierat, ex melioribus græcis a nobis instaurata est. Non meminit eius in medicæ materiæ censu Paulus Aegineta: credimus, qd nullas hanc forte intelligeret, diuersas ab agresti Lactuca ures habere. Multa siquidem in Lactucarum censum & nomen uenerunt: Tichymallus, quæ ab aliquibus Caprina, ab aliquibus Marina Lactuca dicta est. Vtræq; istatis, quam Glastum, siue Luteam uocari diximus. Hieracia postremo hæc. Omnium eadem ratio & causa fuit, qd latiore, f. & ampliore folio, quali Lactuca est, omnes sunt, & omnes lactis liquorem aliquem sectæ reddunt. Et nihilominus, quoniam priuatim aliquid singulæ habent quod Lactucæ & alijs non congruat, alijs appellationibus dictæ, & in alijs generibus constitutæ fuerunt. Sonchitem maius Hieracium uocari a quibusdam hic ait, manifesta ratione, quoniam am & hæc & illa concauo, & lacteum succum remittente caule est. Foliorum enim quantitate longius interuallo distat Sonchus ab agresti Lactuca, & ex eo ab Hieracio hoc: eamq; ob causam inuenientes in melioribus græcis, quo loco hic ait habere folia Hieracium per interualla incisuris diuifa, Soncho ἰσοπέρι, id est, æqualia, non Soncho, quæ nostris Cicirbita est, sed τὴν ἰδίαν, id est, Betæ naturam et rem secuti, Betæ folio, non Sonchi Hieracij folia comparauimus. Lactucæ enim Betæ uerius qd Sonchus in foliorum quantitate comparatur. Quemadmodum & minus Hieracium illud quod sequitur, agresti Intybo in foliorum quantitate exæquatum pariter est. Omnia enim eo pertinent, ut Lactucæ simile Hieracion sit. Eius unum tantum caput, Maioris scilicet in melioribus græcis legitur. Nec Plinius nisi unius meminit. Quo sit, ut suspicemur alterum hoc, & minus Hieracium priori illi accretuisse ab aliquo, qui inuentum forte breuius, & ut cœli terræque uis potest huiuscemodi uariare, alterum crediderit a superiore illo esse. Indicaturque id, quod neque in historia, neque in medicina posterius hoc a superiore illo diuer-

sum aliquid habet. In censu & genere sylvestrium, & sponte nascentium Lactucarum, sine unum, siue duo sint, Hieracia hæc numeranda sunt. Ostenduntque id Paulus Aegineta, qui nihil de his in medica materia egit. Indicant & latini omnes, in quibus Hieracii nulla historia est. Et quem nos habemus antiquissimum Dioscoridis latinum codicem, nihil quod ad Hieracia hæc pertineat, ostendit: cui in huiusmodi antiquitatis uestigijs, & ueræ lectionis coniectura, ob uetustatem suam, nos multum deferimus.

De Apio.

CAP. LXXII.

Satium Apium ad eadem quæ Corianum conuenit. Inflammationibus oculorum cum pane, aut polenta illinitur. Aestuantem stomachum mulcet. Mammarum duriciam reprimat. Urinam ciet, siue crudum, siue coctum edatur. Decoctum eius radicisq; potu, uenenorum noxæ resistit, quum uomitiones excitet. Aluum cohibet. Semen uehementius urinam pellit. Contra serpentium uenena, aut epotam argenti spumam auxiliatur. Inflationes discutit. Ammiscetur medicamentis quæ dolorum leuamenta præstant, Theriacis quoq; ac tussis remedijs.

BARBARI COROLL.

Apium & Apium Græci Selenon uocant. Durat biennio. Prouenit crispus, pedibus, aut cylindro, pilæ pulsatum, quinquagesimo a satū die, quadragesimo cum ocysime. Apium aliud folio spisso, hirsuto, crispo. Aliud raro, expanso, caule item maiore. Item aliud caule albo, aliud purpureo, aliud uersicolore. Syluestriora hæc, ut Theophrastus inquit. Propriū Apio, quod colorem mutat. Rami eius per iura quoq; uulgo innant: & in condimentis peculiarem uoluptatem præbent. Pisces quoq; si ægrotant in piscinis, Apio uiridi recreantur. Honos ei in Achaia, coronare uictores sacri certaminis Nemeæ. Apud eruditos, non aliud erutum terra in maiore sententiarum auctoritate est. Distinguitur sexu. Fœmina ut sit crispioribus folijs, atq; duris, crasso caule, sapore acri & feruido. Mas folijs nigrioribus, breuioris radicis, uermiculosisq; gignens. Neutrum ad cibos admittebant, Nephastrum existimantes, quoniam defunctorum sit epulis feralibus dictum: & ut Plutarchus inquit, coronentur Apio sepulchra: unde uetus illud, indigere Apio, de his qui profligata ualitudine uruntur. Vermiculos & fœminæ caulibus innasci: propterea eos qui ederint, sterilefcere utroq; sexu. In puerperis uero ab eo cibocomitiales fieri, qui ubera infantes hauserint. Innocentior tamen esse marem, eaq; causa est, ne inter Nephastrum frutices damnetur.

Pli. li. 20. ca. 11.
lib. 19. ca. 7. d.

EX M. VERG. COMM.

Quæcunq; a Plinio de Apio lib. 19. capite. 7. eorumq; folijs, caulibus, coloribusq; dicuntur, multo ante a Theophrasto de plantarum historia octauo uolumine dicta fuerant: Differre scilicet Apiorum inter se genera, folijs & caulibus: Esseq; hoc denso, crispumq; & hirsuto folio, illud raro & lato: hoc maiore caule, illud minore. Et in hoc genere rursus aliud candido, aliud purpureo, aliud uersicolore: totumq; hoc genus syluestri simillimū esse. Rursusq; eodem libro. Quod grande, palustre, montanumq; appellatur, inter se & a satuo differre: quoniam palustre prope aquarū riuos, & in palustribus nascatur, raro folio, nec hirsuto: simile tamen Apio esse odore, succo, & figura. Quod grande, folio palustri simili, hirsuto, & altiore caule, radiceq; Raphani crassitudine, colore nigro, semine itidē nigro, maiore q; Erui: duobusq; hæc cōtra urinæ angustias, calculosq; credi uim habere in albo dulci uino pota. Nasci hoc ubiq; conrescereq; in eo lachrymam Myrrhæ odore, quam ueram esse Myrrham aliqui crediderunt: Montanum maiores adhuc, & certiores habere differentias. Cicuta enim folio est, radice tenui, caule Anethi, uerum minore. Vsum huius esse ad muliebria, id est, menses in uino austero. Et hæc Theophrastus quo diximus loco. Quæ omnia a Plinio qua cætera breuitate consuevit, antedicto uolumine numerata, & descripta fuerunt. Columella libro. 12. in hortorū prosa foliorum discrimina hæc, quæ a Theophrasto natua numerantur, culturā & artificio humano facere his uerbis docuit. Apium quoq; possis plantis ferere, nec minus semine. Aqua precipue lætatur, & ideo secundū fontes comodissime ponitur. Quod si quis id ueluti folij facere, quantum possint tres digiti seminis comprehendere, raro linteolo illiget, & ita in areolas dispositum religet. Vel si crispæ frondis id fieri malueris, semen eius inditum pilæ, & saligneo palo pinsum, expoliaturq; similiter in linteolis ligatur obruas.

Apium palustre ubi
nascitur.

D I O S C O R I D I S

C Potest etiā citra hanc operā fieri crispum qualitercūq; satū, si cum est natum incrementū eius, superuoluto Cylindro coēceas. Quæ omnia de satiuo intelligenda in eo scriptore sunt: ideo longius a nobis repetita, ut sciant, meminerintq; legentes: si natua foliorum Apij Theophrasto discrimina illa sint, licere, sperandumq; homini labore, diligentiaq; sua non imitari, quod multæ aliæ possunt artes, sed in ruris disciplina naturā etiam æquare.

¶ De Eleoselino.

CAP. LXXIII.

ἐλεοσελίνον

Eleoselinum, quod a quibusdam Pedinon, ab alijs Hydroseli-
non agrion, Romanis Apium rusticum appellatur. In humidis na-
scitur. Satiuo grandius, & ad eadem efficax.

BARBARI COROLL.

Eleoselinon, Paludapium, sicut ut solet nomine Theodorus appellauit, quia in paludibus nascatur, secundumq; aquæ ductus, folio raro, nec hirsuto, simile Apio sapore, figura, odore. Homerus Apium Eleothrepton uocauit, hoc est, palustre.

EX M. VERG. COMM.

Satis ex Theophrasto superiore capite dictū est, quale hoc Apium sit, & quæ a satiuo & ab alijs discrimina habet: caules scilicet & profluentes aquas prope quas nascitur, rarius foliū, sed non hirsutum: satiuo Apio odore, succo, & figura simile. De eo Palladius in Aprili sic ait. Eleoselinon molli folio, & caule tenero, quod nascitur in lacunis.

¶ De Oreoselino.

CAP. LXXIII.

ορεοσελίνον

Oreoselinon, quod aliqui Petroselinon syluestre appellant, Aegy-
ptij Anonim, caule est palmum alto, ab radice tenui exeunte. Ra-
mis & capitulis Cicutæ, multo tamen tenuioribus, semine Cumini, ob-
longo, acri, & odorato, tenui. Nascitur in petrosis & montibus. Vrinam
ciet semine acradice, in uino potis. Menses trahit. Antidotis, necnon me-
dicamentis urinam cientibus, & excalfactorijs inseritur. Nec hallucina-
ri nos oportet, existimantes Oreoselinum esse quod in saxis prouenit.
Aliud enim est Petroselinum.

BARBARI COROLL.

Oreoselinon, a quibusdam Orthoselinon: quia frutice recto nascitur. Caule Anethi exi-
liore tantum, folio ut Theophrastus inquit cicutæ, nisi quis deprauatum in eo locum putet.
καὶ τὰ φύλλα ἔχει καὶ οὐκ ἔμφερῶς, pro eo quod est, κεφάλια ἔχει μακρὰ καὶ ἔμφερῶς. hoc est, capitula Papa-
ueris similia, ut Dioscoridis uerba sunt.

EX M. VERG. COMM.

Diximus in satiuo Apio, quæ Theophrastus in montano discrimina ab omnibus alijs nu-
merasset: ea superuacaneum & inutile repetere nunc fuerit.

¶ De Petroselino.

CAP. LXXV.

πέτρεον καὶ τὸ
πετροσελίνον

Petroselinum in Macedonia prouenit, in præruptis locis. Semine
Ammij, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam cit ac
menstrua. Contra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest.
Laterum, renum, & uesicæ doloribus in potu subuenit. Ammiscetur an-
tidotis urinam cientibus.

BARBARI COROLL.

Petroselinon, hoc est, Apium in saxis natum. Addidere quidam Buselinon, differens breui-
tate caulis a satiuo, & radicis colore rufio. Galenus Petroselinon in Ciliciæ Amano monte na-
tum Smyrnion potius, q̃ Petroselinon uideri sibi tradidit.

EX M. VERG. COMM.

Indicat uox ipsa, in petris & saxis natū Apium, Petroselinon a Græcis quondā dictum fuisse.
Hic tantū in Macedonia natale solū illi assignat. Palladius in latinis nihil aliud de eo, q̃ locis a-
spersis maxime prouenire ait. Nec nos credimus, alia q̃ nataliū ratione a satiuo differre. Mede-

ri inter cetera saxatile Apium crassioris intestini, quod colon dicunt, inflationibus, hic scriptor ait, non totā, neq; ex quacuncq; causa factā colicam affectionē intelligens, sed quæ priuatim ex crasso & quasi peditu efilitur, non transeunte illhac spiritu sæpe fit.

¶ De Olusatro.

CAP. LXXVI.

Hipposelinum aliqui Grielon, alij Agrioselinum, Latini Olusatrum appellant, aliqui Smyrnion, quāuis aliud sit, quod proprie Smyrnion dicitur, ut paulo post referemus. Est autem maius, & satiuo Apio candidius. Caule alto, cauo, molli, habente ueluti lineas. Folijs latioribus, in puniceum uergentibus, coma Rorismarini. Dependentibus in cacumine corymbis, anteq; deflorescat. Ea semine turget nigro, oblongo, acri, solido, aromatico. Radix demittitur tenuis, odorata, candida, quæ os commendat. In umbrosis & palustribus enascitur. Olerum generis ut Apium. Radix cruda, coctæue estur. Folia cum caulibus decocta manduntur, & per se, aut cum piscibus præparantur, crudaq; muria condiuntur. Vim hanc habet, ut potio semine ex mulso uino menses ciet. Rigentes calfacit potu, aut illitu. Vrinæ stillicidio auxiliatur. Radix eosdem præstat effectus.

ἵπποσελίνον

Hipposelinon Theodorus ab equis dictum, Equapiū uocare maluit, cum latine Olusatrum, & Olus pullū dicat. Virei foliū cacumine perpetuū, palustri simile, sed pilosum, caule grādi. Radice crassa, mō Rhaphani, sed nigra, fructu Erui maiore, atro. Nascit ubiq; e lachryma sua: quā nihil differe a Myrrha dicit. Auctorq; est Theophrast. Myrrha fata natū. Serit & radice.

¶ De Smyrnio.

CAP. LXXVII.

Smyrnion, quod in Cilicia Petroselinum uocant, passim in Amasno monte gignitur. Caulem habet Apij, & stolones multos, folia latiora, pinguis, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucunda, colore in luteum languescente. Capitibus caulium orbiculatis, ut anethi. Semine Brassicæ, rotundo, nigro, acri, myrrhæ sapore: ita ut alterum alterius loco cedat. Radix quoq; odorata, gustu acri. Fauces mordet, succosa, mollis. Cortex eius foris niger, intus uiridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis & collibus, atq; squallidis, & limitibus terrenis. Vis radice, hærbæ & seminis, excalfacere. Folijs muria maceratis, ad obsonia utuntur. Aluum sistunt. Radicem contra serpentium ictus bibere conuenit. Tusses & orthopnceas mitigat. Vrinæ difficultati medetur. Recentes tumores, collectiones, duriciasq; discutit. Illita uulnera ad cicatricem perducit. Partus abortu uitiat, si feruefacta subiiciatur. Semen, lienis renum, & uesicæ uitij prodest. Menses & secundas pellit. Commode datur ischiadicis in uino. Inflationes stomachi lenit. Sudores ciet & ructus. Semen peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

B

σμύρνιον

Smyrniū, caulē habet, q̄ æstate incipiente arefcit. Cortex radice intus, & pallet cortice arido. Ad obsonia utunt, cū Mulso, & Oleo, & Garo, maxie in elixis carnibus. Radix sapore Pipi similis. Odor herbe Myrrhæ, unde nomē. Hoc & Petroselinō syluestre uocari scribit Galenus.

Sentebat iam tum cum hæc scriberet Dioscorides a grauissimis plantarum & hortenſium ſcriptoribus confundi cum Olufatro Smyrniū: miſceriq; ſimul cōmunicata inuicē appella-
tione, ſimiles quidem, & congeneres, non tamē eaſdem plantas: ideoq; in Olufatro, cuius ſu-
periore capite tractata hiſtoria & medicina eſt, aperte omnes monuerat, aliud eſſe Olufatrum
ab eo quod proprie uereq; Smyrniū diceretur. Et in Smyrnio eas numerauit nataliū, uirium,
feminis, foliorum, aliarumq; partiū notas, ut his qui Olufatrum nouerunt, nihil facilius poſthac
ſit, q̄ alterum ab altero ſecernere, præſertimq; ex Myrrhæ guſtu, ideoq; pari & promiſcuo al-
terutrius uſu. Quod in noſtri orbis Olufatro ſentiri, deprehendiq; nequit. Miſcuiffe autē uete-
res inuicem ſimiles & cōgeneres plantas, in latinis Columella teſtis eſt lib. 12. capite. 3. ſcribens.
Atrium olus, quod quidam græcorum uocant Hippoſelinon, nōnulli Smyrniō. Teſtis Theo-
phraſtus. 9. de plantarum hiſtoria uolumine, Hippoſelinū nominans quod hic Smyrniō, &
quæ Smyrni in hoc ſcriptore ſunt Hippoſelino tribuens. Locus eſt, ubi de excipiendis planta-
rum liquoribus ille agit, inter quas Hippoſelinon numerat. Suntq; eius hæc uerba. *ἵναι δὲ ἐν
ταῖς ῥίζαις ὡς περ τοῦ ἱπποσελίνου, quod eſt, Aliquorū etiam in radicibus quemadmodū Hippoſe-
lini. Paulōq; poſt. τὸ μὲν οὖν τοῦ ἱπποσελίνου παρόμοιον τῇ σμύρῃ, καί τινες ἀκούσαντες ὅς ἐν ταύτῃ ἡ σμύρ-
νη, ἡγοῦνται βλαστάνειν ἐν αὐτοῖς ἱπποσελίνου.* Quorum ſenſus eſt, Hippoſelini autē lachryma Myr-
rhæ ſimilis eſt. Audientesq; aliqui hinc eſſe Myrrham, naſci apud eos Hippoſelinon exiſtimāt.
Ex quibus facile ratiocinari eſt, a Theophraſto Hippoſelinon dici, quod ab alijs Smyrniō uo-
catur: peregrinamq; Græciæ fuiſſe plantam, & lachrymam odore & ſapore Myrrhæ habere,
quod hic ſemini tribuit. A Myrrha enim, quā Græci Smyrnem uocant, Smyrniō nomen Græ-
ciā fecit. Teſtis Nicander etiam in Theriacis ſuis: qui Smyrniō uocat, *ἵναι δὲ καὶ σμύρνην ἀν-
ερνῖς*, &c. adiectiua forma *σμυρνήνιον* Hippoſelinon uocans, hoc ſcilicet, ut ab illo ſepararet: ad-
diditq; interpres eius, magno Apio, id eſt, Hippoſelino ſimile eſſe Smyrniū: uocariq; Smyr-
niū, quoniā Myrrham odore refert: uocari & Coptium, auctore Anacreonte in cōmentario
de radicū ſeſſione. Similitudo hæc miſcet, & in ueterū hiſtoria confundi cogit, quæ alioquin
diuerſa ſunt: ut hic, & alijs græcorū medici docent. Poterūtq; qui certius nouiſſe id cupient, col-
lati inuicē duobus capitibus, duarum plantarū multa inueniſſe diſcrimina: nec natali ſolo tan-
tum diſſerre, quod ad faciendā naturæ diuerſitatē magnas habet uſres, ſed ex uniuerſæ plantæ
notis & partibus congeneres quidem, diuerſas tamen penitus cognoscere.

De Elaphobosco. CAP. LXXVIII.

ἐλαφοβόσκον

Graci Elaphoboscon, aliqui Elaphicon, alijs Nephron, alijs O-
phigenion, nonnulli Ophioctonon, aliqui Herpyxen, alijs
Limen uocant, Romani Cerui ocellum, Aegyptij Chemin, Aphri
Aſchancam. Foeniculaceus caulis eſt, aut Rorimarino ſimilis, geni-
culatus, folijs duum digitorum latitudine, ut Terebinthi prælongis,
aliquantum aſperis, circumſractis. Adnata multa caulis habet, ſeren-
tia umbellas Anethi ſimiles, & ſemina eiufdem, ſtorem ſubluteum. Ra-
dice ternum digitorum longitudinis, & craſſitudinis unius. Candida,
dulcis, eſui apta. Caulis tener pro oleris manditur. Contra ſerpentium
iſcus, datur ſemen in uino. Fama autem eſt, hoc pabulo ceruas ſerpen-
tium morſibus reſiſtere.

**ELAPHOUOSCON, ferulaceum eſt, geniculatum, digiti craſſitudine. Semen in corymbis de-
pendentibus ſimilis effigie, ſed non amaris. Folia oleris auri.**

EX M. V E R G. C O M M.

Quæ Elaphobosci, id eſt, Ceruiocelli (modo id Romani ſic appellauerint) a principio
tam multæ numerātur appellationes, unā eandemq; cauſam & originem habent,
& eam quā hic ipſe non procul a fine capitis, & Plinius. 12. uolumine eiufdem numeri capite
indicauerunt: quoniā ſcilicet fama ſit, hoc pabulo ceruos reſiſtere ſerpentibus. Eo ſiquidē per-
tinet, quæ prima illic auditur Elaphicon, id eſt, ceruina herba, Mox Nebrium, ex eodem euen-

tur: νεφεον enim certiorum inulos Græci uocant. Ophigenium itidem, & Ophiostonon: quarum altera ab eneatis serpentibus manifestam habet significatiōem: altera, q̄ serpentes aliquo huiusmodi malo uexet. Corrupta enim est: nec licuit eam instaurare, quemadmodū & eam quæ sequitur Herpyxem. Suspiciari tamen in ea licet, ἡ τὸν ἱππιτῶν, quæ græcis reptilia & serpentes sunt, in ea aliquid fuisse.

De Fœniculo.

CAP. LXXIX.

Fœniculum, si herba edatur, aut semen cum pitisana bibatur, mamas lacte replet. Comæ decoctum, in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinam excitet. Contra serpentium ictus in uino conuenienter bibitur. Menses ciet. In febribus nausæam & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum sedat. Contritæ radices, & cum melle illitæ, moribus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus in medicamenta adijcitur, quæ ad excitandam oculorum aciem commode temperantur. Extrahitur etiam semine uiridi, ramulisq̄, & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia succum reddit gummi similem. Caulem medium dum hæba floret rustici demetunt, igniq̄ admovent, quo facilius ui caloris exudans gummi remittat. Quod efficacius succo est ad medicamenta oculorum.

Fœniculum in Hiberis Hispaniæ laudatissimū, condimentis prope omnibus inseritur. Quin & crustis in panificio aptissime subijcitur.

EX M. VERG. COMM.

Fœniculū, si Nicandro in Theriacis suis, q̄ mox subiiciemus, scribenti credimus, nobilitauere serpentes, gustatu eius senectā exuendo, oculorūq̄ aciem succo eius reficiendo. Versiculi poë eius sunt. τῆμος δὲ αὐτὸν φολιδῶν ἀπιδύσατο γῆρας. μῶλις ἱππείχων δὲ φολιδῶν ἔαρ φέγων. ὁμασιν ἀμειλῶσαι, μαράθρου δὲ ἐνέχυτος ἔρπας, βωσκῆτις ὠκύντι καὶ ἀνυμέντα τισίν. Quorū sensus ille est. Quo tēpore relicta arefcentium squamarū senectute, torpidus & segnis ingrediens, uenatq̄ tempestatē cauū suum fugiens, hebetibus oculis cecutit: uerū depastus Fœniculi comosus ramus, celerem, & claræ lucis eum efficit. Nobilitauere & homines, toto anno quondā uiridi, sicco, seruatoq̄ sale, totaq̄ mensa, non ut nostra ætate fit in secūda, et ad augendā suū tantū, nec semine solū, sed coma & caulibus utentes. Neq̄ it̄merito tā multæ in sanitatis & medicinæ usu dotes illi sunt: quas hic scriptor profecutus, labori huic parcere alios uoluit.

De Erratico Fœniculo.

CAP. LXXX.

Græci Hippomarathrū, aliqui Marathin, alij Marathrū agrion, Aegyptij Sampsoth, Magi Thymarnolion, Latini Fœniculū erraticū, aliqui Mion, Galli Sistrameor. Syluestre est Fœniculū, magnū. Fert aut̄ semen Canchry simile. Cuius radix iucūde olet, potaq̄ stranguarie medet̄. Menses iposita ciet. Ventrē sistit, radice, aut semine poto. Contra serpentū morsus auxiliat̄. Calculos cōminuit. Regiū morbum expurgat. Lactis abundantia facit. Decoctum foliorū haustum, scēminas a partu purgat. Traditur aliud Hippomarathri genus, longo, exili & angusto folio, semine Coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excalfaciendi naturā habet, & uiribus Fœniculo respondet. Ad omnia infirmius.

B A R B A R I C O R O L L.

Hippomarathrū, a magnitudine uidet̄ appellatum: qd̄ aliqui Mysineti uocant, folijs maioribus, gustu acriore, procerius, crassitudine brachiali, radice candida. Nasct̄ in calidis, sed saxosis, tāte amplitudinis in Mauritania, ut cūlis, n. cubitis assurgat, crassitudine palmorū quatuor.

D I O S C O R I D I S

C Hippomarathrū aliud hoc est, quod tradidit Diocles: foliū habet angulosum, atq; longū.
E X M. V E R G. C O M M.

Grande est erraticum Feniculum. In cuius appellationibus quæ fœminino genere Marathris dicta est, solā habet ex sexu a superiore illo discriminis causam: qualia in hoc opere multa alia audiuntur, quemadmodum agreste Marathrum eandem Hippomarathro significationem. Ferre erraticum Feniculum hoc semen Cachryi simile Dioscorides ait, Cachry id intelligens, quod ab eo in Libano tēde mox describetur, & quod in umbella eius fruticis concipitur et maturatur: cui erraticum Feniculum hoc similem suam habet.

σταυρος
δίσκοις

De Dauco. CAP. LXXXI.
Daucum aliqui Dircaum uocant. Creticum, folijs Fœniculo simile, minoribus & tenuioribus, caule dodrantali, umbella coriandri, flore albo, semine acri, candido, hirsuto, suauissimi odoris in mandendo. Radix digitali crassitudine, & palmi longitudine adolefcit. In saxosis nascitur, & locis sole illustratis. Aliud eius genus syluestri Apio simile, acre, odoratum, aroma olens, feruentis gustus. Probatissimum Creticum. Tertium assignatur genus folijs Coriandri, floribus albis, capite & semine anethi, muscario Pastinacæ, semine oblongo ceu Cumini, acri. Omnium semen excalfacit potum. Vrinam, menses & partus extrahit. Torminibus liberat. Veterem tussim mitigat. Phalangiorum morfibz potum in uino auxiliatur. Tumores illitu discutit. Seminis dumtaxat in alijs generibus inualuit usus. In Cretico etiam radicis. Quæ maxime contra uenenatorum iniuriam in uino bibitur.

Daucus, quæ a nostris Gallica Pastinaca dicitur, specie Lauri, colore Croci, radice nigra Theophrasto. Dauci quatuor nōnulli fecere genera. Dioscorides & Plinius tria persequuntur. Probatissima in Creta. Mox in Achaia, Patrensi & Spartano agro, & ubiq; in ficcis. Priori generi folia etiam hirsuta, caulis rectus, radice suauissimi gustus & odoris. Reliqua genera passim nascuntur, terrenis collibus, limitibusq; nec nisi pingui solo, folijs Coriandri, caule cubitali, capitulis orbiculatis, sæpe plurimis q̄ ternis. Radice lignosa, & cum inaruerit superuacua. Semen Cumino simile: prioris Milio. Album, acre, odoratū omnibus, & seruēs. Secundū priore uehementius est, eoq; parce sumi debet. Tertium genus simile Staphylino, semine oblongo, radice dulci. Omnia hæc, & hyeme & æstate, quadrupedi sunt intacta, nisi post abortus. Quidā, ut Paulus, & Galenus prior eo meminit, Daucū nihil aliud esse uoluerunt, q̄ Staphylinū syluestrem: q̄ uidetur a Dauco aliud genus esse Daucos herba cognominata, apud Galenum duas Daucos seorsum indicantem. Nisi quis librariorum accuset, q̄ quæ Galeni non sunt, adiecerint. Hippocrates Daucum Aethiopicam laudat.

Pli. li. 19. ca. 5.
lib. 25. ca. 9.

Asculino genere, & neutro Daucum dici in antiquis obseruauimus. Nos hunc scriptorem secuti, masculino eum semper indicauimus. Quodq; inter appellationes eius male, Dircaon legebatur, ex Nicandro in Theriacis Daucion emendauimus. Sic enim ille appellauit. σταυρον βίλας τετρωνιάς, quod est, Daucum, & Bryoniæ uitis radices. Fuerunt etiam in antiquis, qui Daucum scriberent, duoc; eius tantū genera facerent, Creticum, & Asiaticum: hic tamen tria, Plutarchus uero plura Daucorum fecit genera. Illud etiam a principio statim quod hic ait, habere Creticum Daucum Feniculo similia folia μικρότερα δὲ καὶ λεπτότερα. Quorum nisi utrum sit, sensus est, minora tamē & tenuiora: Plinius & Plinium secutus Barbarus, candidiora dixerunt, quasi λευκότερα, non λεπότερα legendum sit.

Δελφίνιον

De Delphinio. CAP. LXXXII.
Delphinium Græcis Diachysis, alijs Diachytos, alijs Paralysis, alijs Camarus, alijs Hyacinthus, alijs Delphinias, alijs Neria-

dion, aut Sofandrō, aut Cronion, Romanis Bucinus minor uocatur. **A** Surculos emittit a radice una sesquipedales, aut maiores, a quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, praelonga, quæ Delphinorum effigiem representant. Vnde tractum nomen est. Flos uiolæ albæ non dissimilis, purpureus, & semen in siliquis, milio proximum. Quo non aliud utilius bibi potest ab scorpione percussis. Aiunt enim, obiecta hæba, scorpiones resolui, atq; ignauos torpescere. Semota uero ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis.

¶ De altero Delphinio. CAP. LXXXIII.

Alterum est Delphinium, quod Romani Bucinum uocant, superiori simile, sed folijs & ramis longe gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

EX M. VERG. COMM.

Quam nostra ætas Senam officinis omnibus & uulgo notā uocat, antiquitas, ut opinati aliqui sunt, Delphinion appellauit. Posterioris & quo nunc medicina utitur nominis incerta ratio nobis & causa: antiquioris notissimi nauis in mari pisces autores sunt: repando dorso, repandas Delphinij huius siliquas, non folia a se uocari & indicari gaudentes: ut non tantum maris honor Delphinus esset, sed haberet nutritrix & parens omnium terra quod ex eo pisce in suis opibus etiam numeraret. Vtq; in mari beneficis homini semper Delphinus fuit, multisq; salutem humanitatis nostræ sensu quodam attulit, sic etiam in plantis aliqua esset quæ Delphinorum figura, repandoq; siliquarum suarum inflexu salutem homini faceret. Eiusq; beneficii merito Sofandros etiam diceretur. Id enim ea uox significat. Dictumq; Delphinium hoc Sofandros est, q̃ τὸν ἀνδρῶνα εὐφύ, id est, uirum & roboris firmitatem seruat. Fuerunt qui mutata tantum declinationis forma, Delphiniada, s. herbam uocarent, & qui a floris figura Hyacinthum. **B** *ἡ ἀλὴ* enim a græcis, id est, Hyacinthinus flos eius describitur. Legitur postremo inter appellaciones has a Romanis Delphinium hoc Bucinum minorem dici, quod nullibi hætenus comperit nobis est. Facilis tamen nominis coniectura. ut enim græci a Delphinis & ex mari nomen illi fecerunt, sic posteriores etiam latini potuerunt ex eodem elemento, sed ab alijs piscibus eam indicasse. Sunt enim Bucini in purpurarum gñe, sed non repando dorso ut Delphini. Quod mirret q̃s in Delphinio hoc illud est, nihil agere de eo Plinius: nec Delphinij aut Sofandri, quod hætenus legerim in tota eius historia, sub his nominibus unq̃ meminisse. Nihil etiam Paulū Aeginetam: qui cum medicam omnem materiā lib. 6. per capita numeraret, quotidiani in medicina usus herbam, remediumq; relinquere non debuerat. Dubitamus ob eā causam, latere in antiqua etiam medicina Delphinium hoc sub appellatione aliqua alia.

¶ De Pyrethro. CAP. LXXXIII.

Pyrethrum aliqui Dorycnion, alij Pyrinon, alij Pyroton, aut Pyrothron, alij Arnon pyriten, Magi Pyriten, Romani Saluarem uocant. Folia caulemq; emittit ut Daucum syluestre, & Fœniculum, umbellâq; Anethi circinata rotunditatis. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituitam elicit. Ideo in dolore dentium decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur. Mansa pituitam extrahit. Sudores ciēt, peruncto ex oleo corpore. Diuturnis rigoribus efficax. Contra perfrictiones membrorum, resolutionesq; eximie conducit.

BARBARI COROLL.

Pyrethro depictum coloribus umbraculum, purpureo, cædido, luteo, porraceo, ut scripsere quidam. Sunt qui hanc interpretentur quam uulgo rustici & olitores, Draconem Acetarium uocant, ut aliubi notauimus, omnino dissimilem eius quam Dioscorides hoc capite demonstrat. Sed æstimanda res tota diligentius.

Pli. li. 28. ca. 9

H

D I O S C O R I D I S

C N E X M. V E R G C O M M.

Non dedit ut forte opinabitur aliquis in græcis Pyrethro nomen ignis, sed qui in ea similis igni feruidus sapor est. Qui tantus adeoque uehemens in ea sentitur, ut plures in gentibus ab eadem uel appellationes inuenerit. Quæ enim in hoc scriptore numerantur ἀπὸ τοῦ πυρός incipient res uoces, eandem omnes habent causam: & quæ Romanorum appellatio fertur Saluaris herba, a feruidi saporis eius euentu causam & originem duxit. Commāducatum enim copiosam oris saluam prorit: qua potestate plerumque sunt feruida omnia: ideoque ueteres græcorum me dici, ad purgandas capitis pituitas eo utebantur. Præcepitque id inter cæteros Paulus Aegineta lib. 1. capite quo de purgantibus caput apophlegmatismis agit: qui græcis sunt medicamenta omnia quibus per os capitis pituita purgat. Hanc ipsam nō Pyrethron, sed Pyretida Nicander in Theriacis suis uocauit. Versiculus eius est, ἡσπότε δ' ἰδελωθροῖς πυρετρίδος λυχλα πύλλα. Cur autem Doryenion uocari etiam feratur, incertum nobis est. Inter uenena enim Dorycnion numeratur, ut sexto uolumine priuatim dicetur.

ἀσπυρίδις

De Rosmarino. C A P. LXXXV.

DVo Rosmarini genera. Alterum fructiferum, aliquibus Zea, aut Campsanema appellatum. Cuius semen Canchrys uocatur. Folia Fœniculi habet, crassiora & latiora, in Rotæ speciem humi sparsa, iucunde olentia, caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis comæcauum alis. In cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylo simile, rotundum, angulosum, resinaceum. Quod in mandendo linguam exurit. Radix Tus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum uti sphondylion odoratum, minime exurens, radice foris nigra, intus alba. Verum id quod sterile dicitur, illorum plane similitudinem refert. Sed neque caulem, neque florem, neque semen promit. Nascitur in faxosis & asperis. Trita omnium hæba communiter hæmorrhoidum profluentia sistit. Sedis inflammationes, & condylomata mitigat. Concoquit strumas & abscessus, qui ad maturationem ægre perducuntur. Sicque radices cum melle ulcera purgant. Torminibus medentur cum uino potæ. Et contra serpentium morsus conueniunt. Menses & urinas cient. Veteres tumores illitu discutiunt. Tam radice quam hæbæ succus, adiecto melle illitus, oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet. Si comitialiale malum sentiatur, aut uetus pectoris uitium, auxilio est. Regio morbo laborantibus, cum uino & pipere datur. Sudores mouet cum oleo perunctum. Ruptis & conuulsis prodest. Podagris cum lolilacea farina, & aceto tritum illinitur. Purgat uirilignes, addito aceto quam acerrimo. Semine in potionibus utendum, eius quidem quod Canchryn non ferat. Quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum Erica nasci, folijs Lactucæ syluestris, asperioribus, candidioribusque radice breui, Theophrastus autor est. Potumque id ipsum alterutra parte purgare.

ἀσπυρίδις

De Canchry. C A P. LXXXVI.

CAnchrys uim habet excalfaciendi & uehementer exiccandi. Quare abstergentibus medicamentis inseritur. Contra oculorum fluctiones capiti illinitur, ita ut tertio die soluatur.

BARBARI COROLL.

Libanotidis uocabulo, multa genera feruntur. Vnum inter Cunilagine a nobis dicendum. Alterum, de quo hic, in species ternas diuisum. Tertium coronariæ: quam Rosmarinum proprie uocari Dioscorides existimat. Libanotis porro, de quo præfens caput loquitur, radicem habet Olusatris: locis putridis, macris, saxosis, & roscidis prouenit: feritur semine, quod quidem fertili Rosmarino, scabrum & oblongum a Theophrasto redditur, folio palustris Apij, minore multo, sterili, folium Lactucæ syluestris & amaræ, candidius & asperius, radice breui. Vestibus interposita Libanotis, abigit tineas. Carpitur per messem fertilis. Caulis quoque, non modo semen, resinaceus. Folijs & radici odor Turis, unde nomen. Libanotidem cum Ericæ lætissimam nasci Theophrastus inquit. Theodorus locum, non ubi Erice, sed ubi dictum est, conuertit, pro eo quod est *ἐν τῇ ἰσθμῷ*, legens *ἐν τῇ ἰσθμῷ*, librariorum græcorum sane culpa.

EX M. VERG. COMM.

Plures quondam non Dioscoridi tantum, sed cæteris græcorum herbarijs & medicis omnibus Libanotides fuerunt: ut eodem Turis cognomine omnes, sic non eodem eius odore insignes. Vna enim, & quæ Canchry fert, primo & per se, quæ radix eius Tus olet, ab eo indicari merita est. Cæteræ aut congeneres, aut aliqua parte illi similes, in censum et nomen eius uenerunt. Satisque certa earum diuisione hic usus, posteriores græcorum medicos & herbarios alios subseribentes sibi habuit. Siquidem omnes, excepta Coronaria, quæ statim ab ijs describitur, tria eius genera fecerunt. Fœcundam, fructumque ferentem. Et hanc duplicem. Tum sterilem nuntiantes: peregrinas, ut nos credimus, Italiæ plantas, & quarum omnis miscetur historia, si Theophrastus audiatur, præsertimque in foliorum figura. Quæ palustri Apio in primo genere, in sterili uero amaræ Lactucæ familia ille facit. Cum hic Fœniculo compareret, & crassiora tantum, latioraque esse dicat: quæ una foliorum forma, uulgarem nostratam & coronariam Rosmarinum cognomen ille fecit. Alioquin nulla erat ex similitudine causa, cur quondam Libanotis, & nunc tota græcia Dendrolibanon coronaria Rosmarinus diceretur: nihil enim simile, commune uel aliud habet. Quodque facile ex historia earum intelligat aliquis tota, & undique diuersa. Siquidem coronaria Rosmarinus frutex magis, quam herba, ramos habet: illæ caulem, & quæ fructum inter eas ferunt, umbellam etiam. Hæc a terra erigitur, illæ per terram folia spargunt: & ne longiores simus, plures habent illæ notas quibus a Coronaria separantur: quin etiam in folijs prius illud genus suas habet itidem differentias. Quo autem maxime differunt Canchry, est: quod in secundo utroque illo genere in summo caule simile arborum Canchryi surgit, in quo concipitur & maturatur semen. Quid autem Canchrys sit, & quomodo in arboribus nascitur, dictum iam pridem a nobis est. Quæ una nota a coronaria Libanotide, reliquum omne hoc genus præcipue separat. Nec Nicander aliter eam signat in Theriacis suis, *ἢ καὶ χρυσόαν ἴλαν περιβαλ-
πιαρίαν*, quod est. Sumito & calidam radicem *καρχυρίαν*, .i. cachry hoc ferentem Libanotidis (secundum illud genus significans) Rursus *ἀμυγὰ καρχυρίαν λεονάτιδι*, quod est. Simul cum Libanotide cachry ferente. Vna autem hac nota Libanotis præcipue discernebatur, quod in medicina cachryos huius, .i. seminis tamen usus esset. Eaque ob causam seorsum a reliqua plâta Paulus Aegine-
ra de eo egit, fructum, seu seminem Libanotidis uocans: uiresque illi exterendi, discutiedî, & calefaciedî tribuens. Vfus illo etiâ est ex oleo contra febrium perfrictiões, & cum tremore algores. Duplexque illud Libanotidis genus secundum ex cachry hoc dictum est. Tertium enim quia eo caret, ideo *καρχυρίαν* sterile & sine fructu a græcis nominatur: prioribus præterque in hoc simile.

De Rosmarino coronario. CAP. LXXXVII.

Rosmarinum quo coronarij utuntur, ramos mittit tenues, et circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, superne uirentia, graui odore. Excalfactoria ui præditum est. Regium sanat morbum, si decoctum in aqua ante exercitationes bibatur, & ubi laborans exercitationi se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis, gleucinoque unguento ammisceri solet.

BARBARI COROLL.

Libanotis Coronaria, differt quidem folio a prioribus, sed comprehensa forte a Plinio est inter fertiles. Nisi quis hanc pro Cunilagine accipiat. Ea quæ Libanotis uocatur, & in coronas admittitur, Paulus, & Galenus, Dioscoridem secuti, quatuor Libanotidis genera connume-

H ij

A
Pli. li. 19. ca. 12

B

D I O S C O R I D I S

Crat. Vnam sterilem. Fecundas duas, Quartam generis coronamentarij: quam a Romanis priuatum Rosmarinum dici uolunt, etiam si priora quoque genera Plinius ita uocari prodat.

E X. M. V E R G. C O M M.

Coronaria quondam uulgaris haec nostras Libanotis fuit; nec certior habuit hic scriptor nota qua legentibus eam indicaret. Quotidianus enim hic usus eius erat: necessebanturque in coronis ramuli eius non aliter quam Serpillum, & quae alia Theophrastus *φριανική* uocat, toto corpore odorata. Nunc alius eius usus est. Descripsit eam satis Diosc. nihilque in tota foliorum figura desiderari potest. Vnaque haec foliorum similitudo, quae omnibus in se par aequalisque est, et quale paulo ante in coronaria hic descripsit, in Libanotidum nomen et censum eam asciuit. Quis licet in priore illo genere foeniculacea sint, ut hic ait, eamque ob causam *τριχιδίον*, i. comosa & capillata: nihilominus quam in comoso illo habitu latiora & crassiora Foeniculo sunt, ad formam foliorum Libanotidis huius, i. coronariae nostraeque Rosmarini accedunt. Fitque haec illis eatenus tantum similis. Quatenus enim Tus Libanotides aliae olent, nihil huic simile habent.

De Sphondylion. CAP. LXXXVIII.

σφονδύλιον

Sphondylium aliqui Arangen uocant, alij Phalangion, alij Astereion, nonnulli Nesyron aut Sphondylin, quidam Chorodanon, aut Oenanthen, Romani herbam Rutinalem. Aegyptij Apsaphear, Magi Osirin. Folia Platani & Panacis habet. Caules foeniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex Sefeli simile, sed latius, candidius & magis paleaceum, grauis odoris. Flores eius albi, aut pallentes. Radice Rhaphani candida. Nasitur in palustribus & aquosis. Potum semen pituitam per aluum extrahit. Medetur iocineris uitij, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, uuluarum strangulationi. Venerosus suffitu reuocat. Cum oleo comode infunditur capitibus phreniticorum, & lethargicorum, item capitis doloribus. Cum Ruta illitum, serpentia ulcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris uitia. Circumrassa eadem, callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisque accommodatur. Qui caeterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

B A R B A R I C O R O L L.

Sphondylii succus qui exprimitur, mire appetitur a muscis, & quae sunt ijs similia. Sphondylium ferula est, differens a Panace folijs, quia sunt minora & Platani diuisura. Non nisi in opacis gignitur, in palustribus Patauini agri saepe uisum. Huic semen eodem nomine medicinae tantum utile.

De Ferula. CAP. LXXXIX.

φέρουλα

Eviridi Ferula medulla pota, utilis est ad cruentas excretaiones, Ecceciacosque. Contra uiperarum morsus in uino datur. Erumpentem naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosis auxiliatur. Sudores ciet, uncto ex oleo corpore. Caules si edantur, capitis dolores faciunt. Muria condiuntur. Ferula itaque caulem profert ternum saepe cubitorum, folia Foeniculi, longe asperiora, & latiora. Qua ab immo caule uulnerata, Sagapenum efficitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 12. ca. 22.
lib. 10. cap. 27.
lib. 24. cap. 11.

Adescribitur arborum generi Ferula: quoniam teneritudo eius processu transit in lignum. Propterea Clearchus inter quaestiones luforias, quas nostri Scirpos, Graeci Gryphos, & Aenigmata uocant, Ferulam dicit esse, lignum non lignum: sicut Pumicem, lapidem non lapidem, & Noctua, uolucrum non uolucrum, Calidis Ferula nascitur locis, atque trans maria, geniculatisque

uices nodata scapis. Duo ei genera. Narthecem Græci uocant, assurgentem alte. Nartheciam uero semper humilem: quæ ab aliquibus Ferulago dicitur. Quancq; et Thapsia Ferulago appellari solet. Est & instrumentum medicinale Ferula, siue Narthex. A genibus folia exeunt grandia, mollia, multifida, maxima, ut quæq; terræ sunt proxima: caulē amplectantia ut Harundines: sed magis scinditur in coliculos, quibus flores lutei & semen Anethi paulo maius infidet, sed quæ ab uno caule diuiditur in cacumine, femina putatur. Germinat uere primum folio, tū caule: qui annuus ei est. Radice singulari, profunda. Ferulæ lignum omne corticis loco habent, hoc est, forinsecus: ligni autem uice fungosam intus medullam, ut Sambuci. Nonnullæ inanitatē, ut Harundines. Nulli fruticum leuitas maior. Ob id senectuti Baculus. Semen Ferulæ Thapsiam uocauere aliqui falso. Hoc in Italia cibus est. Conditur quippe, duratq; anni spacio in urceis. Caules quoq; decocti eduntur, Commendanturq; musto & melle. Corymbiam nominant: sicut racemos eius quos item condiunt Corymbos: quibus & in coronas utebantur. Ignem Ferulis optime seruari certum est, easq; in Aegypto præcellere. Natura Ferularum Murensis infestissima. Moriunt ea tactæ. Asinis gratissimæ sunt in pabulo. Ceteris iumentis presentaneo ueneno: qua de causa id animal Libero patri assignatur: cui & Ferula. Ferulā nō minus afferuendo dictam uideri facit Hippocrates: qui eam Plestinga uocauit. Inter fortunatas insulas, Norion uocatur. In qua Ferulæ tanta crescunt amplitudine, ut arbores fiant. Earum nigra succo amarissimo damnantur: candidæ probantur, adeo, ut poculentus quoq; sit.

EX M. VERG. COMM.

Condiebatur quondā, seruabaturq; sale ad cibos Ferulæ coliculus toto aſſo: si huic scripto ri primū, mox Columellæ credimus. 13. operis sui uolumine, cap. 7. iubenti cum plerisq; alijs oleribus & hunc condi. Nec fuit hic usus parum in ea laudandus: & si copiosior eius cibus capitatis dolores faciat. Primas enim mensas in acetarijs, secundas uero cū obsonijs cocta multa frugalitate instruebat. Eadem senectuti, & a longa ualitudine se recolligentibus auxilio fuit, et adhuc est: quoniam nulli frutici leuitas maior, et cum leuitate ligni firmiter duricies, & rigor. Quā etiam ob causam Libero patri, Sileno, alijsq; numinis eius comitibus dedicata & concessa est, ut infirmos in ebrietate pedes leui hoc pedamento regerent.

De Peucedano. CAP. XC.

Peucedanum aliqui Agrion uocant, alij Agriophyllon, Magi bonum demonem, Romani Satariam. Caulem emittit tenuem, gracilentum, Foeniculo similem. Comam habet statim ab terra foliosam, spissamq; flore luteo, radice nigra, crassa, firma, graui odore, succosa. Gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello conciditur, profluentq; e plaga succus, umbræ mandatur. In sole siquidem confestim euanesceat. Colligit capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & uertigo sentiat. Assata radix utilior fit. Tam lac, q; succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti e Mandragora. Verum inefficacior lacte succus habetur, & uelocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lachryma Turis similitudine, caulibus, radicibusq; adherens. Præfertur succus e Sardonia, & Samothrace, colore ruffo, odore graui, seruens gustu. Ex oleo & rosaceo illitū pdest lethargicis, phreniticis, uertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis. Omnibus in uniuersum uitijis neruorum, ex oleo & aceto illitum prodest. Eius olfactu respirant uulnæ strangulatus, & ueternosi reuocantur. Incensum serpentes abigit. Auriū doloribus cōuenienter ex rosaceo instillatur. Cauernis dentium inditum, mitigat dolorem. Contra tussim efficacissime ex ouo assumit. Suspirijs, torminibus, & inflammationibus subuenit. Ventrē leniter emollit. Lienē absumit. Dis-

D I O S C O R I D I S

C ficiles partus mire adiuuat. Facit ad uesciæ cruciatus, & renum distensiones potum. Vuluam aperit. Radix ad eadem utilis est. Sed inefficacior. Eius decoctum bibitur. Farina eius sordida ulcera purgat, & uetera cicatrice obducit. Squamas ossium extrahit. In cærata & calfacientia malagmata additur. Eligi debet recens, esu difficile, firmum, odoris plenum. Succus ad potiones amaris nucibus, aut Ruta, aut pane calido, aut Anetho resoluatur.

Pli. li. 25. ca. 9
lib. 26. cap. 5.

B A R B A R I C O R O L L.

Peucedanum, siue Peucedanus nomen a Pinu inuenit, ut Myrtidanum a Myrto, quancq̃ & amaritudinem uocabulum id significat apud poetas, celebrata inter primas herba. Laudatissimum in Arcadia Plinius existimat. Foditur exitu autumnii. Placent tenerimæ, & altissimæ radices. Hæ conciduntur in digitos quaternos ossis cultellis, funduntq̃ succum. Probatum hic & crassitudine mellea, & odore suauiter graui. Peucedanum officinæ ostendit quale Dioscorides in cætera tantum, radice non succosa, sed lignosa, nec graui odore, sed iucundo. Quod nos admonitionis causa dictum uolumus.

E X M. V E R G C O M M.

Fecit Pinus, quæ græcis Peuce dicitur Peucedano nomen: non congener congeneri, aut similis simili planta, sed speciosa & procera arbor, parem folio tantum sibi humiliorem fruticem, ut inter homines quotidie fit, sola eius partis similitudine in genus & nomen suum sibi adopravit: quod posteriores intelligentes latini, Pinafellum eam uocauerunt. Cuius uocis autor Apuleius est. Sic enim emendanda est quæ corrupte in impresso codice Pinafellum legitur. Idem quod in Diosc. simpliciter agrion nominatur, ab eo Sison agrion dicitur, quasi ex similitudine Peucedanus hæc Sison etiam diceretur, de quo non multo ante actum est, sed syluestre. Nobis uero ab re non fore, si quis suspiceretur, deesse uoci illi agrion, quæ syluestre significat Marathrum: ut quoniam similes illi caules, & capillata folia habet, syluestre Marathrum diceretur. Quem admodum quod sequitur Agriophyllum, agreste Feniculū potuisse quondam legi. Suspiciones tñ hæ sunt: nec nos aliquid mutare ausi sumus, præterq̃ ex Apuleio agrion .i. agreste Sisonem uocari Peucedanum inter alia dicentes. Quæ nō tñ a Peuce arbore dici in græcis potuit, q̃ ab amaritudine, quæ in eadem gente eadē illa uoce indicatur. In Arcadia nasci Peucedanū Theophrastus ait. 9. de plantarum historia uolumine. Verba eius sunt *γινεται δὲ ἐν ἀρκადίᾳ*. Quem autorem secutus Plinius lib. 25. cap. 9. laudatissimam in Arcadia nasci tradidit: tam aperte, tam q̃ uetusto autore, ut non dubitandum fuerit, in Arcadia ne, an in Sardinia legendus locus sit. Theophrastum enim secutus Plinius est. Neq̃ obstat q̃ hic dixerit, expressum in Sardinia et Samothrace liquorem, probatissimum esse. Hic enim succum in his gentibus expressum laudauit, illi plantam in Arcadia nasci laudatissimam dixerunt. Eius in antiqua medicina multus usus. Tradiditq̃ hic inter cætera, mederi Peucedani liquorem conuulsis: Græci *καταμύειν κῆρ* *καταμύειν* uocant, Romani græcæ uocis imitatione, conuulsa appellauerunt.

¶ De Gith, seu Melanthio. C A P. XCII.

μελάνθιον

Gith ex Græcis aliqui Melanthium, alij Mecona agrion melana, Romani Papauer nigrum appellant. Exiguus frutex est, sæpe binos palmos excedens. Folijs ut Senecionis minutis, sed multo tenuioribus. Capitulo in cacumine tenui, ceu Papaueris oblongo, intercurfantibus intus membranis. Quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum fronti, subuenit. Discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex Irino, & infusum naribus. Tollit lepras, lentigines, duricias, tumoresque uetustos cum aceto illitum. Circumscarificatos clauos excutit cū uetere uino impositum. Dentium doloribus decoctum cum aceto & teda

prodest. Teretes uentris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico. De A
stillatione laborātes adiuuat, tritū in linteo & olfactū. Vrinā & menstrua
ciet, multis diebus sumptū. Et lac extrahit. Difficultatē spirandi cū uino
potū leuat. Phalangiorū morsibus ex aqua drachmā pondere haustū au
xilia. Incenso serpentes fugant. Tradunt largius epotum enecare.

M B A R B A R I C O R O L L.

Melanthion, qd & Melanspermon, & Melanthe interim ab Hippocrate uocat: & a Theo-
phrasto, ut Theodorus existimat, Anthemon, siue Anthemion, Nigellam interpretatus. Qz qd
Anthemon oīno alia species est, qd Melanthion, siue Git, siue ut Palladius, Giddi. Nam & Me
lanthemom Chamemilon est, Melanion uero nigra Viola. Optimum Git, qd excitatissimi odo
ris, & qd nigerrimū. Culices suffitu necat, & muscas. Succum eius largius sumēti, uenēti esse,
mirari licet: cū semen ipsum, inferiorē crustam panis, cereali sapore condiat gratissime. Aliud
oīno genus uidetur esse Git, qd in segetibus passim nasci cernit: & Pseudomelanthion uocari
potest, & Gitago, folijs fere Porri oblongis, flore purpureo, semine ac toto frutice maius qd Me
lanthium, nec odoratū. At uerum Git, de quo praesens Dioscoridi mētio est, folium habet Fo-
niculi, Senecionisue, florem ceruleum. Odor semini iocundus, nec ubiq; prouenit. Hippocra-
tes Cyprium cōmendat. Alia est herba Melandryum, in segete pratisq; nascens, albo flore, o-
dorata, cuius cauliculum iocineri tritum, ex uino uetere probant.

Pli, li. 20. ca. 17.
& 22. ca. 21.

E X M. V E R G. C O M M.

Vident Maio & Iunio mensibus in pratis, sepibus, limitibusq; oibus nascentē rurā oīa Ni-
gellā: nihilq; eo frutice frequētius, simul & uilius. Quondā grato sapore panē Nigellae semen
cōmendabat. Inspergebatur em ante cocturā illi tritum, quemadmodū & Papaueris: non aliter
qd & nos modo dulciarijs potius qd pani Anisum miscemus. Quod in Nigella merito mire-
tur aliquis, sagacis naturae artificii est, in conformādīs eius uasculis: quibus concipit, matura-
tur, & seruat semen, colore nigrū, Panici seminis magnitudine. Sunt ea uascula longe papau-
raceis minora, nec in mensura sua, ut illa longa. Nullā praeterea habent qualē Papauera in sum-
mo stellā, sed latiorē umbilicū: neq; intus eodē modo discurrentes membranas seminū locos
dissepientes. In Papauere em sulcorū modo intercedente, quasi aggere quodam canales sunt: in
Nigella per mediū transeuntes, quasi parietes, quibus loculamenta illa seminū diuiduntur. Est
illud discrimen etiā, quod singula in singulis Papauerū caulibus uascula sunt, in Nigella nume-
rosiora: ut quod numero seminū in singulis uasculis deest, uasculorū numero expleat. Solaq;
haec uasculi forma fecit, ut syluestre & nigrū Papauer a quibusdam Nigella diceretur. Graeci a
colore seminis Melanthion, & eorum exemplo latini Nigellam nominauerunt.

B

De Lasepicio, & Lasere.

CAP. XCIII.

Laserpiciū in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule fe-
rulaceo, quem Maspetum uocant. Folijs Apio similibus, lato se-
mine. Radix excalfacit. In cibis aegre concoquitur. Vesicae noxia. Sugil-
latis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum caerato, medetur. Ischi-
adicis conuenit cum Irino, aut Cyprino caerato. Excrecentibus circa
fedem tollendis, illinitur cum putamine mali punici & aceto decocta.
Venenis pota resistit. Os commendat, cibis aut sali permista. Laser
e radice, atq; caule scarificatis colligitur. Praefertur autem ruffum trans-
lucens, Myrrhae aemulum, non porraceum, odore ualens, suauis gustu.
Quod dilutū facile albescit. Syrenaicū si quis degustarit, humorem to-
to corpore ciet, blandissimo odore, adeo, ut ne os quidem gustanti, nisi
paululū spiret. Medicum & Syriacū minus uiribus ualent, & grauiorem
reddunt odorem. Laser omne antequā siccescat adulteratur sagapeno,
aut fabae lomento. Quod maleficiū deprehenditur gustu, odore, uisu.

H iij

D I O S C O R I D I S

- C** & madefactione. Caulē aliqui Silphion, radicē Magudarī, & folia Maspeton uocauere. Efficacissimū Lāsēr, mox folia, postremo caulis. Acrem uim habet. Inflationes facit, Peruncias cum aceto, pipere, & uino, alopecias sanat. Oculorū aciem exacuit. Incipientes suffusiones, illitum cum melle dissipat. Cauernis dentium in dolore inditur, aut cum Ture in linteo circumligatur, aut cum Hyssopo, Ficis coctis in posca, os colluitur. Iis prodest, quos bestia in rabiem efferata momorderit, uulneribus immixtum. Valet aduersus uenena telorum, & animalia omnia quæ uirus ei aculantur, potum, aut illitum. Scorpionum plagis oleo dilutum circumlinitur. Gangrænis præcoërcitis immittitur. Et cum ruta, nitro, & melle, uel per se carbunculis. Clauos, callosq; prius circumrasos uellit. Cærato, aut aridorū ficuum carne præmolitum, recentes Lychenas ex aceto sanat. Et excrecentia in carne, polyposq; si aliquot diebus cum atramento sutorio, aut erugine illinatur. Extuberantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium scabricis opitulatur. Grauem, subitoq; irrauescentem uocem, dilutum aqua sorbitione confestim expedit. Vuam illitum cum melle reprimat. Anginis ex aqua mulsa utilissime gargarizatur. Vescētes eo, lætiore colore mangonizat. Tussi commodē in sorbili ouo datur, & pleuriticis in sorbitionibus. In fellis suffusione, & aqua inter cutem cum aridis Ficis. Rigores discutit cum uino, pipere, & Ture potum. Neruorū contractionibus, opistho tonicisq; datur oboli pondere deuorandum. Hærentes gulæ hirudines, gargarizatum cum aceto decutit. Ad lac intus coagulatum bibitur. Comitialibus ex aceto mulso proficit. Menses ciet cum pipere & myrrha potum. Celiacos adiuuat in acino uuæ sumptum. Cum lixiuio autem potui datum, repente conuulsis ruptisq; prodest. Ad potionē resolutur, nucibus amaris, aut ruta & calido pane. Foliorū succo ad eadē proficitur, sed multo inefficacius. Cum aceto mulso manditur, ad expeditendam arteriam, maxime cum uox retunditur. Eo cum lactucis utuntur, exitq; in uicē Eruçæ. Fertur & altera Magudarī in Libya nasci. Radix Laserpicio similis, sed minus crassa, acris & fungosa. Ex qua non profluit succus, Eiusdē cum Lasere facultatis.
- D**

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 19. ca. 3.
lib. 22. cap. 27.

Silphio, id est, Laserpicio, radix crassa, multaq; Caulis annuus, altitudine & crassitudine quasi Ferulæ. Foliū simile Apio: qd̄ ineunte uere proflit, deciduūq; est, eximī purgandō & faginandō pecori. Carne mirabilem in modū iocunda. Folio amisso, caulis emicat: qui omnibus modis paratus igni manditur, hominēq; diebus quadraginta purgat omni uitio. Semen ei latum, foliaceum. Succus duplex e scapo, Caulias uocatus. E radice Rizias, uilior ac putrescens. Radici cortex niger, qui & detrahitur ad mercis adulteria. Preparatur uero succus admixto fursure, aut farina. Subinde concutiendo uas, quatenus ad maturitatem perducant, id est, quatenus sudare desinat, & colorem suū capiat. Ita inueteratum a situ uendicant & carie, Lāsēr uocātes. Perlucidior hic & purior a radice, dulcior a caule: ob id farina inditur, ut coeat. Natum ferunt Silphii hymbre crasso & piceo, repente madefacta tellure circa Hesperidum hortos, Syrtinque maiorem, septem annis ante oppidum Cyrenarū conditum. Vim autē illam, quatuor stadiis.

rum spacio in Africa ualuisse, rem ueram & contumacē, atq; si coleretur, in deserta fugientē. Quidā radicem Laserpicio maiore fuisse cubitali perhibent, e cuius medio caput sublime conspiciedumq; tuberet, unde primū succus ceu lacteus erumpat. Supernasci caulem Magydarin uocatum. Quē & semen eius quoq; Magydaris ab aliquibus dicitur, ut Galenus scribit, folio aurei coloris: quo seminis uice, austrinis flatibus decusso, a canis ortu Laserpiciū nascatur: eodemq; anno & scapum, & radicem aboleri, solū circumfodi subactum, glutumq; fieri. Radices eius recens præfectas ex aceto mandī. Pecora non purgari eo, sed si ægrotant, aut sanari protinus, quod fere consequitur, aut emori. Prior opinio uidetur persico Silphio congruere, multo infra Cyrenaicum nascenti. E Syria quoq; importari maxime solebat, Parthico, siue Persico deterius, Medico præstantius. Actius Laser a Cyrenaico lacte separauit, siue quia Laser succus ipse Silphij, non lac esset: siue quia Laseris appellatione Persicum, aut Medicum, ut cognobiliora, non Cyrenaicum ueniret: quippe quod ad pondus argenti denarij pendebatur, multisq; iam annis, ut Plinius ait, non inuenitur. Cum comedit ouis caulem, protinus dormit, capra sternutat. Tauros inflammari naribus illitis. Serpentes audidissimas uini admixtum rumpit. Præcipit autē se quidam ex alto, cum in dentium dolore cauis addidisset inclusum, cæra. Laser Græci Opon uocant. Et quanq; Opos manantem herbæ cuiusq; succum, ex uulnere significet, Cyrenaicum tamē absolute pronunciatum indicat, ut Varroni placet: qui coagulari lac eo tradit. Post Cyrenaicum auctoritas deinde Medico, & Syriaco, ut Galenus inquit, Hippocrates, Phyllon Libyon, & Aethiopicum uocando ipsum Silphij semen significat Galeno: ut qd præ sua latitudine foliaceum sit. Interim Phyllon uocat hoc, nec adijcit Libycum. Radicem huius proprie Silphion appellat. Caulon uero, & eccalema, scapum, id est, colem, ut Herodotus. Solini quoq; uerba de Silphio subiiciam. Apud Cyrenenses inquit Syrpe gignitur, odoratis radicibus, uirgulto herbido magis quā arbusco: cuius e culmo exudat æstatis tempore pingue rosicidum, idq; pascentium hircorum inhæret barbulis: ubi cum arefactum inoleuit, guttis steriacis legitur ad usum menfarum, uel medelæ potius. Dictum est primum inquit Syrpicum, quia manat in modum lactis. Deinde usu deriuante, Laser nominatum. Paulo post Asbiæ inquit, uiuunt Lasere, hoc aluntur, hoc illis dulce est. Ex his uerbis Solinus satis indicat, se de Silphio loqui uoluisse quidem, sed parum nouisse quid diceret, ita salebrosus & defuetus in eo genere sermo eius est. Plautus in Rudente.

Speras inquit tibi multum hoc anno futurum Syrpe & Laserpiciū. Sed cur Varro Draconon appellari dicit ipsum lac Cyrenaicum? An non Draconon, sed Diaconon legi potest? quia odorem intentum & uehementem habeat: & an Draconon a colore rubro. Talis enim præfertur. nam & herba Rubia, quandoq; apud Græcos Cinnabaris, & Draconon uocata est, auctore Dioscoride.

Magydaris siue, Magudaris, a Laserpicio differt teneritudine. In Syria & Parnasso monte plurima. Theophrastus & Plinius in Libya eam nasci pernegāt. Sunt qui & hanc Laserpiciū appellent. Periti uero facile discernunt uel aspectu.

E X M. V E R G. C O M M.

Longissime omnium Theophrastus de Silphio in sexto de plantarū historia egit. Licetq; Plinius, & præter Pliniū plures alij plantam, partesq; eius omnes longiore historia illustrauerint. nihilominus quoniā cuncta alij ab eo accæperunt, singulicq; aliquid, quod dixisse oportebat, reliquerunt, operæ præcium erit, ex eo scriptore hñdem uerbis omnia semel reddidisse. Quæ huiusmodi sunt. Habet Silphium numerosas radices, & crassas: caulem qualis in Ferula est, & crassitudine illi æqualem. Folium, quod Maspeton uocant, Apio simile. Semen latum, foliaceumq;. Caulem non ultra annū prorogat, quemadmodū & Ferula. Vereq; primū folia & Maspetum hoc profert: quo oues mirifice purgantur, & pinguescunt, egregia odoris suauitate canes cōmendans. Post hæc caulē profert cibis quocunq; modo aptum. Tostus siquidem, & elixus estur. Feruntq; quadraginta diebus corpora purgare. Destillat duplicem liquorem Silphium: a caule alterum, ab radice alterum. Vocantq; hunc a caulibus Cauliam, illum a radicibus Rhiziam. Habet radix nigrum corticem: auferuntq; in usu eum. Sunt & radicum, sectionisq; mensuræ quædam, quibus quantum oportet, cedunt, reliquum ad sectiones seruantes. Neq; enim in secando errare, neq; ultra q̄ constitutum sit secare oportet. Corripitur enim, putrescitq;, si aliter fiat. Curant autē in Pyreæo, Athenas ferentes Silphium hoc modo. Cum in uasa coniecerint, farinam illi miscent, multoq; tempore cōmouent: eaq; tractatione colorem contrahit, rationeq; hæc curatum incorruptum permanet. Quæ igitur in secando, curandoq; Silphio seuanda sunt, sic se habent, Libyæ latos occupat campos; siquidem spacio ultra sta-

C diorum quatuor milia nascitur: copiosumque prouenire ab Hesperidum hortis ad Syrtim. Proprium illi est, cultos odisse locos: & si colatur, in deserta fugere, uelut id quod ferum sit, & cultura non indigeat. Narrant Cyrenæi, septem ante conditas Cyrenas annis apparuisse. Ex quo autem ædificata urbs est, trecenti intercesserunt anni, magistratum gerente Athenis Simonide. Et hæc quidem sic ferunt aliqui. Alij radicem Silphij ferunt cubitalem, pauloue ampliorem nasci: tumereque in medio ueluti caput, quod sursum in sublime fertur, pauloque minus quam supra terram emergit. Ex qua erumpit quod Lac uocatur. Tum caulis. Et post hunc quod Magydaris, & folium dicitur, quod semen est. Cumque ualidus spirauerit Ausfer post caniculares dies, uento id spargi: ex eoque nasci Silphium. Eodemque anno radicem fieri, & caulem. Verum non est hoc Silphij proprium. Habent enim & alia. Nisi hoc forte dicunt a sparso semine statim nasci. Quod uero priuatim, & ab alijs diuersum Silphium habet, illud narrant. Oportere annum fodi. Si enim relinquatur, semen totum, caulemque proferre, deteriusque ea ratione fieri & hoc, & radicem eius. Narrant præterea, fieri meliores circumfossas radices: quoniam renouetur terra. Sed hoc contrarium illi est, quod dicitur odisse culturam Silphium. Narrant & comediri radices recentes in acetum concisas, & folium colore auri esse. Contrarium his etiam, purgari oues folium comedentes. Ferunt enim, hyeme & uere in montem exire oues, uescique eo, & alio quod Abrotono simile sit: & quod utrunque calefaciendo est, non purgare, uerum siccare, & concoctionem adiuuare: ideoque fieri, si morbosam, maleque affectam ouis aliqua accedat, conualescere statim, aut mori: uerumtamen sæpius conualescere. Hæc autem utro modo se habent, considerandum est. Quæ uero Magydaris dicitur, aliud a Silphio est, rarius, & minore acrimonia, succoque carens: discernitur a peritis solo aspectu. Nascitur in Syria & Cyrene. Narrant & in Parnaso nasci copiosam: & hanc Silphium esse. Si uero culta fugit loca, uelut Silphium, considerandum erit. Similiterque an simile, æqualeue aliquid in folio & caule habet. In uniuersumque, si lachrymam destillat. Et hæc Theophrastus longius forte quam legentium aliquis æquo animo ferre potuerit ab eo & a nobis dicta: sed non inutilia, ut quæ a Dioscoride dicuntur, certius intelligi possint. Siquidem & ille de foliaceo semine, de Maspeto, Magydari, alijsque omnibus pariter egit: & ut tunc ferebat fama, totam Lasercij historiam tradidit, quod Cyrenaico agro probatissimum nascebatur. Tantumque illi ex eo laudis & honoris accreuerat, ut Catullus una hac nota Cyrenem illustrauerit, Laserciferas in epigrammate suo Cyrenas uocans. Nouerant enim tunc omnes, quod ubique nunc ignoratur. Eratque in quotidiano ciborum usu Lasercium, quos grato sapore & odore commendabat. Miscebatur id, ut indicat Columella, oxyporis: & ut plures alij testantur, Lasercium acetum in multo usu erat. Longior erit commentatio hæc nostra, si quorū usus Laser habuerit (sic enim Plinius etiam uocat) numerare uoluerimus. Illud dixisse satis sit, quod Martialis de simila ait. Nec Laseris dotes poteris numerare, nec usus. Cum medico totiens, cum sit & eoque totiens aptum. Vtebatur eo passim antiquitas, ob egregiam calefaciendi uim quam habet. Nunc autem tantum abest, ut nostrorum temporum Lasercio uti, ganea, aut medicina possit: ut rem ipsam utraq; ignoret, nec coniectura saltem ostendere possit. Nouerunt quidem nostræ ætatis medici Opon Cyrenaicum, sed nomen tantum, & in eo nomine, quod longissime ab antiquo Opo Cyrenaico differat. Idem enim Opos Cyrenaicum, & Lasercium hoc quondam fuit: nunc autem in fetida Asa ea uoce utuntur: quæ tetri & ingrati odoris sensu, tantum a Lasercio differt, quantum uersimile est quondam discrepasse eorum usus. In medicina sane infinitus pene fuit eius usus: indicantque græcorum medici omnes, qui adhuc supersunt. Indicat Plinius uigessimosecundo uolumine capite uigesimo tertio, longissimeque omnium hic scriptor. Ex cuius remedijs nos tantum signabimus, quæ nobis non sunt cum Barbaro eadem, duoque præsertim. Quorum id primū est, quod ille ait, mederi Lasercium neruorum contractionibus: contractiones neruorum uertens, quod Dioscorides tetanicos dixit, longe ab illis diuersos. Qui quales sint in Sampfucino unguento dictum longius a nobis est. Alterum uero, quo loco uertit, dari Lasercium his qui lactis coagulum biberint. Quod γαλακτορμωμίνον hic scriptor uocat, in uenenorum censu ab eo libro sexto numeratum.

De Sagapenio.

C A P. XCIII.

σαγαπένιον

Sagapenium ferulaceæ hærbæ succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter Laser & Galbanum redolens, gustu acri. Prodest la-

terum & pectoris doloribus, tussibus uetustis, conuulsis & ruptis. Crassam pulmonis pituitam expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis. Item contra neruorum resolutionem, perfrictiones, & febrium circumitus in potu. In unguenta probe admittitur. Menses pellit. Sed foetum exanimat, cum hydromelite potum. Prodest ex uino haustum serpentium icibus. Olfactum ex aceto uuluarum strangulationes excitat. Oculorum cicatrices, offusam caliginem, hebetudines, suffusionesque detergit. Resoluitur succi modo, ruta, aqua, & amaris nucibus, aut melle, aut calido pane.

SAGAPENUM medicinae tantum feritur in hortis. Dicitur & Sacopenium. Quod apud nos gignitur, in totum transmarino alienatur. Illud enim Hammoniaci lachrymae simile Sagapenum uocant, fruticis sui nomine, ut Galenus inquit, per abusionem.

Pli. li. 19. ca. 8.
lib. 20. cap. 18.

EX M. VERG. COM M.
Estati sunt ueteres Graeci, Ferulam Sagapenum ferentem, nullos habere in medicina usus: quodque in ea expetitur, liquorem solum esse: nec ultra id historiae eius aliquid addiderunt. Hic etiam Graeciae peregrinam fecit, in Media nasci dicens: & ex quo ferulaceam herbam dixit, genus, formam, partesque eius ignorasse uidetur. Plinius in Italia nasci Sagapenum testatur, dicens, 20. uolumine capite. 18. Sagapenum quod apud nos gignitur, in totum transmarino alienatur. Neque ipse etiam ferentis id fruticis, aut herbae naturam tradidit. Ob eam causam, nec nos longius de eo agemus. Et si Plinius, ut paulo ante diximus, Sagapenum Italiae plantam dixerit, & praeter ea quae paulo ante ex eo citauimus libro. 19. capite septimo, in hortis, sed medicinae tantum feri dicat. In qua separarunt alij interpretes, perfrictiones a circularibus febribus: cum tamen ab hoc scriptore dicatur, dari Sagapenum contra perfrictiones quas circularium febrium accessiones faciunt.

B

De Euphorbio.

CAP. XCV.

EUPHORBIA Libyca arbore est, Ferulae speciem habens, quae in monte Atlante iuxta Mauritaniam inuenitur. Ea acerrimo succo turget. Cuius eximium feruorem expauescentes incolae, ouillos uentres elutos, arbori circūligant, & eminus caulem contis incidunt. Confestimque plaga perinde atque uase quodam, in uentriculos copiosus lactis humor effluit, praeter id quod sparsi in humum, uulnus ei aculatur. Duo succi genera. Vnum Orobi magnitudine, Sarcocolae modo emicat. Alterum in uentriculis concreuit, atque uitreum spectatur. Eligendum est translucens, & acre. Euphorbium adulteratur Sarcocollae, & glutini mistione. Sed difficile quidem experimentum. Quippe cum leui gustu, os accensum diu detineat, adeo ut quicquid ori obijciatur plane Euphorbium respiciat. Eius inuentio tempore Iubae regis Libyae cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutit. Potus tota die exurit. Quare melli, collyriisque pro acrimoniae ratione ammisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odoriferam potionem haustus. Squammas ossium eadem die eximit. Verum eo uidentes necesse est linamentis, aut caeratis communire corpus, quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoriae prodiderunt, percussos a serpente nihil molesti passuros, si incisa ossa tenus capitis cute, intritus succus infundatur, uulnuscque postea consueatur.

Euphorbia

D I O S C O R I D I S

C **E** **B** **A** **R** **B** **A** **R** **I** **C** **O** **R** **O** **L** **L**
Pli. li. 26. ca. 11. lib. 25. cap. 13.
 Euphorbium, & Euphorbiam, Iuba Ptolomei pater, in Atlante gigni herbā scribit, dicato priuatim uolumine, folijs acanthinis, appellatam nomine inuentoris eius medici sui, & fratris Musæ. Suscipitur lac non omni uentriculo, sed hædino. Qui colligunt clarius uident. Siccatur Conto, ut effigiem Turis habeat. Adulteratur hædino lacte. Sed discernitur igni. Quod enim syncerū non est, fastidiendum odorem habet. Mustū infra hunc succum est, qui in Gallia fit ex herba Chamælea, granum Cocci, ut Plinius inquit, ferente. Fractus, Hammoniaco similis est. Accendit os semel gustatū, & magis ex interuallo, donec fauces quoq; assiccet. Galenus & Paulus Phorbion, siue Phormion herbam quandā nominant, longe ab Euphorbio diuersam: cuius folio & semine, ad albugines utantur cum melle: spicula quoq; corporibus extrahi persuasum est. Græci codices Euphorbion, pro Euphorbio fere scribunt.

De Galbano. CAP. XCVI.
χελιδν
G **A** **L** **B** **A** **N** **O**
 Albanū succus est nascentis in Syria Ferulæ, quod nonnulli Me-
 topiū uocant. Maxime laudatur cartilaginofum, merū, Thuris
 effigiem præbens, minime lignosum, retinens, nonnihil adiecti seminis
 aut Ferulæ, graui odore, neq; humidū, neq; aridū. Adulteratur faba fre-
 sa, & Hammoniaco. Galbanū excalfacit, urit, extrahit, discutit. Menses ac
 partus trahit, appositū, uel suffitu. Lentigines aceto & nitro peruncias
 tollit. Deuoratur ad tussim ueterem, difficultatē spirandi, suspiria, rupta,
 conuulsa. Aduersat toxicis potū cum aceto & myrrha. Simili modo sum-
 ptum, mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus, & furuncu-
 lis. Comitiales, & uulua strangulatus, & uertiginosos olfactu suscitatur. Si
 uratur, fugat nidore serpentes, & peruncias feriri non patitur. Serpentes
D cum oleo & sphondylo circumpositū necat. Dentū dolorem oblitū, aut
 cauernis inditum, mitigat. Vrinæ difficili prodesse existimatur. Resoluitur
 ad potiones amarissimis nucibus, aqua, aut ruta, aut calido pane, mulsaue.
 Alias meconio, are usto, aut felle liquido. Si purgare Galbanum uoles,
 in feruentem aquam demittito. Namq; cum liquefactum fuerit, eius for-
 des fluitabūt. Quas hoc modo facile separabis. Mundo linteo alligatum
 in fictili, aut ærea pixide ita pendeat, ut imum uasis ne tēgat. Operitoq;
 uase in feruidam aquam demittito. Sic enim syncarum, ueluti per colum
 eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

Pli. li. 12. ca. 25. lib. 24. cap. 5.
B **A** **R** **B** **A** **R** **I** **C** **O** **R** **O** **L** **L**
 Galbanum, Chalbanen Græci uocant, & ferulam, & lachrymam. Item Stagonitū, & Me-
 topion. Laudatur simile Hammoniaco. Adulteratur Sagopeno. Permutatur in libras quinque.
 Medicinæ hoc tantum Galbanon a colore dictum candido existimant: a quo & uestis no-
 men Galbanum Iuuenali. Vulgo quoq; nautica opera sic uocamus. Nam Galbecum, ut
 Tranquillus ait, remedia sunt lanis inuoluta.

E **X** **M** **V** **E** **R** **G** **C** **O** **M** **M**
Satis fore legentibus credimus, quod in Galbano natura ostendit: q; in Syria nascens, &
 doramentorum omnium fecunda genitrice, ut auctor Theophrastus est, ingrato odore tetrum,
 regionis eius hanc felicitatem turbauit. Nisi forte quæ in agendo sagax natura est, Galbanum
 Balsamo, Casia, Cinamomo, odoratisq; Calamo & Iunco ideo miscuit, iisdemq; locis nasci
 uoluit: ut quātum ingrati odoris ex terra Galbanū in se traxisset, tantū purioris odoris illis re-
 linqueretur: damnareturq; una Galbani ferula, ut felicius cætera agerent. Quod illi, & hortos
 conferentibus consilium aliquando est, male & grauiter odoratis plantis, eodem loco confitis,
 aliarum odores augere. Nihil tamen sic etiā a natura damnatum, inutile homini penitus ge-
 nitum est. Habet enim, ut cætera relinquamus, suas uires & laudes Galbanum. Solum aucto-

te Theophrasto, grauitur odoratum in Syria nascens. Potestq; præter alia quæ illi in morbis ab hoc scriptore, & ab alijs tribuuntur, ingrato agitare graues nidore chelidros: ut Maro cecinit. Et Nicander. *ναιμην καὶ βαρυσόμοσ ἐπὶ φλογὶ μνηστῆρα χαλδῆνα, καπνὸν ἄγχι καὶ φέρον ὀσμὴν.* Poutit quondam etiam, ne bellorum & fortunæ gloria, & honoribus careret, oppida expugnare: illisq; liquore suo facibus, Hispaniæ oppidum frustra diu oppugnatum, succendere: eaq; uictoria Romanis ciuibus gentile nomen ex se dare: quod non multo post a Domitij Neronis turpi & funesto principatu, inter Cæsares coleretur: essentq; a Galbano, quo usi in incendio oppidi in Hispania fuerant, Galbæ Romana gens, per Cæsarem suū toto orbe clari. Ex eo non paruum Galbano honoris accessit incrementum. Nōsq; hæcenus a fortunæ gloria laudatum, ad naturam transferimus. Primumq; illud legentes monemus, non Turi tantum, sed Hamoniaco liquori simile Galbanū cæteros dicere, Pliniumq; presertim. Quo fit, ut deesse huic scriptori id suspicemur. Quod præterea in impresso Diosco. legebatur, toxicis mederi *σὺν ἔξῃ*, quod est, cum aceto, ex ueterum meliorumq; codicum fide, cum uino uertimus. Peruasitq; id Plinius lib. 24. cap. 5. aduersari uenenis, maximeq; toxicis, cum Myrrha & uino dicens. Fecit eiusdē scriptoris autoritas etiam, accedente ueterum codicum eadem fide, ut quod erat *συνὲ καὶ ἀποσποροῦσι ποτὶν*, significareq; uidebatur, facere ad urinæ angustias, ad contrarium sensum deflecteretur: indicaretq; urinæ nocere, & eius angustias facere, Plinius enim eodem loco ait, Nocere urinæ existimatur.

De Ammoniaco. CAP. XCVII.

Ammoniacum hæba est, ex qua Ammoniæ fit suffimen qd Tymiamia uocant, aliqui Agazyllon, alij Criothem, alij Helistrum, Romani Guttam appellant. Ferulæ succus est, quam iuxta Cyrenem Aphrica gignit. Cuius fruticem cum radice Agasyllim uocant. Probatur bene coloratum, ligni & calculorum expers, Turis similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. Hoc genus Trausma, id est, friaturam appellant. Quod uero terram & calculos collegit, Phyrama, quod significat misturam. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit. Tubercula duriciaq; discutit. Potum aluum soluit. Partus extrahit. Lienem consumit, drachmæ pondere haustum. Articulorum coxendicumq; doloribus liberat. Auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Itē quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptisanæ succo sorbeatur. Cruentam urinam pellit. Albugines oculorum abstergit. Genarum scabriciam absomit. Tritum autem cum aceto & impositum, iocineris lienisq; duricias sedat. Discutit tofos, qui in artubus concalluerunt, cum melle, aut cum pice illitum. Lassitudines & coxendicum dolores eo perugi utile est, cū nitro et cyprino oleo uice acopi.

BARBARI COROLL.

Ammoniæ dicitur, quoniam stillat in harenis, iuxta Iouis Hammonis oraculum restæ modo, aut gummi ipsum Thrausma, siue Thraustum. Turis habet masculi similitudinem. Phyrama uero pingue, resinofumq;. Adulteratur harenis uelut nascendo apprehensis, igitur q; minimis glebis probatur, & q; purissimis. Precium optimi in libras asses quadraginta. Metopion arbor ipsa dicitur, ut Galbani a Solino Metops.

EX M. VERG. COMM.

Habet salem, habet liquorem medicina Hamoniæ. Vtrūq; ab harenis, sed diuersa ratione dictum. Illū, q; sub harenis concreseat, et inueniatur. Hunc, q; in harenosa Libya ad Hammonis Iouis templum ex Ferula in harenas destillet, & ut in Ture fit, concretis grumis inter eas

αμμωνιάκη

B

Pli. li. 12. ca. 33.
lib. 24. cap. 6.

D I O S C O R I D I S

C inueniatur. Græci ab harenis, quas ἡμῶνος dicunt, utrumq; indicauerunt, sed illum salem, hūc liquorem Hamoniacum, quasi harenosum uocantes: graui periculo miscendi simul diuersa, nisi eorum exemplo discrimen aliquod ex rei substantia addatur. Quod nos timentes, ut illū salē suo loco uocabimus, sic hunc autore Diosc. guttam uocauimus: quasi & hic quemadmodum Tus Stagonias aliquando dictus fuerit: quæ uox in græcis stillicidium & guttam significat. Plinius Hamoniaci lachrymā eiusdem rei significatione appellat. Græci Hamoniakon simpliciter, ut tunc erat eius uocis æstimatio, uocant. Fugientesq; nos æquiuocæ appellationis periculum, guttā Hamoniacam diximus, lachrymam liquoremq; significantes Ferulæ, quæ priuatim in Libya ad Hamonis Iouis tēplū tūc nasci ferebat. Quæ siue ab harenis, siue ab Hamonis Iouis templo uocari dicat, eandē rationē habet: qm̄ & Deus q̄ int̄ eas harenas colebat, mortalibusq; respōdebat, ab ipsē harenis nomē a græcis inuenerat. Ideoq; Criotheos a forma eius, q̄ aricino capite pingebat, eadē hęc Ferula, liquorq; eius parit dictus est. Satisq; hic natale solū illi assignauit, dicens primum nasci in Lybia ad Cyrenem: mox in Libya ad Hamonem, Iouem illum intelligns qui in templo inter Libyæ harenas coleretur. Ceteræ eius appellationes barbaræ sunt, ideoq; nunc omnibus incognitæ.

De Sarcocolla. CAP. XCVI.

σαρκόκολλα

Sarcocolla lachryma est arboris in Perside nascentis, pollini Turis similis, ruffa, gustu amara. Vulnere glutinat. Oculorum fluxus inhibet. Emplastris inseritur. Adulteratur ammisto gummi.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 24. ca. 14

Sarcocolla uetustate nigrescit maxime. Melior, quo candidior. E spina reddi putant, com quadam acrimonia dulcem.

EX M. VERG. COMM.

D Inter gummi genera numeratur a Plinio Sarcocolla: eodemq; nomine arbor, & ex ea destillans gummi appellatur: quod ex ui, potestateq; sua nomen inuenit. Carnes enim, quas græci σάρκα dicunt, in uulneribus glutinat: quod eiusdem gentis uerbum κολᾶν significat. Plinius idem Plinius utilissimum etiam dixit.

De Glaucio. CAP. XCIX.

γλαύκιον

Glaucium succus est herbæ quæ in Hierapoli Syriæ nascitur, folijs fere corniculati Papaueris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari. Tota croceo succo madet. Folia in olla ficuli semifrigidis clibanis calfaciunt indigenæ, usq; dum flaccescant. Deinde contulis succum exprimunt. Cuius est usus ad oculorum medicamenta. Vtpote cum inter initia refrigeret.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 20. ca. 19
lib. 27. cap. 10.

Glaucion & in Parthia nascitur, folijs densis, minoribus q̄ Papaueris sordidioribusq; gustu amaro, cum quadam astringitione. Granum habet croci coloris. Hinc temperatur collyrium: quod medici Diaglaucion uocant, in quod recentiores Papauere cornuto utuntur, aut etiam Ghelidonio maiore: ut nihil profecerit Dioscoridis attestatio in mentione Papaueris illius, cū alioquin magno periculo hac parte hallucinentur, q̄ Chelidoni & Papaueris eius natura erodendo sit, Glaucij multo mitior, & refrigerando fere. Propterea collyrium ex illo iumentorum oculis adhiberi solet, ex Glaucio humanis.

EX M. VERG. COMM.

Sunt Plinio, & Dioscoridi in Glaucij medicina & historia eadem fere omnia. Hic ad Hierapolim Syriæ, ille in Syria & Parthia nasci tradit. Ambo humilem herbam, sed ille simpliciter folijs Papaueris, hic cornuti Papaueris priuatim describit. Hic pinguioribus q̄ Papaueris, Plinius sordidioribus dixit: magno discrimine interfordidum, & pingue. Diuersitatis ea potuit esse causa, ut quod nunc legitur λιπαρότερα, certa pinguedinis significatione, tunc ὑπεραιότερα, i. e. sordidiora legeretur, facillimo & lubrico, ut in Galbeano paulo ante diximus, in unius literæ figura, & sensu ad contraria & alterutram significationem lapsu. Locum in Plinio est. 27. uolumine cap. 10. Nobis aptius uisum est, Dioscoridem, q̄ Plinium sequi.

De Glutino. CAP. G.

A

Glutinum quod Xylocollan, alijs Taurocollan uocant, præstantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur. Id candidum est & translucens. Nigrum uero minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines, leprasque cutis delet. Ambustis igni ex aqua calida impositum, pustulas erumpere non patitur. Vulneribus prodest melle, aut aceto madefactum.

BARBARI COROLL.

Glutinum, siue Gluten, Græce Colla, Præstantissimum fit ex auribus taurorum, & genitalibus. Sed adulteratur nihil æque, quibusuis pellibus inueteratis, calciamentisque etiam decoctis. Rhodiaceum uero fidelissimum, eoque & pictores, & medici utuntur. Lignosum improbat. Contexi par est et reliqua Glutinum genera. Auro Glutinum est Santerna, ferro Argilla, gris massis Cadmia, laminis Alumen, Stagnum æramentis, stagno Argentum, marmor, & plumbum Refina, Plumbum nigrum albo, album ipsum sibi oleo. Est & Glutinum auri cum inducit ligno, Leucoporon, siue Leucophæon uocatum, ex pluribus compositum, Sinopidis pontice selibra, Silis lucidi, pix, & melini greciensis duobus mixtis, tritisque una per duodecim dies. Est & Lithocolla Glutinum ex lapidibus, sicut Ichthyocolla ex piscibus. Habetur et Gluten librarium ex simila & polhne. Nam Gluten Atticum pro gummi ex amygdala quoad accipitur a Chymicis.

Pli. li. ii. ca. 39

De Glutino piscium. CAP. CI.

Glutin piscium, uenter est piscis cetacei. Præstat candicans, natione Ponticum, subasperum, carens squamis, & quod celerrime liquefit. Vtile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanothris, quæ cutem faciei erugant & extendunt.

BARBARI COROLL.

Ichthyocolla appellatur piscis, cui glutinosum est corium. Idemque nomen Glutino eius; quod alijs ex corio, alijs ex uentre putant fieri. Ichthyocolla inuentum Dædali. Laudatur carens uenis, squamisque. Madescere debet concisa in aqua, uel aceto nocte & die; mox tundi marinis lapidibus, ut facilius liquecat.

Ichthyocolla

Pli. li. 32. cap. 7

B

EX M. VERG. COMM.

Norum cunctis piscium Gluten est. Indiget enim eo uita quotidie & utitur; nec possunt sine ope eius feliciter in artibus tractari multa. Ob eam causam nihil ultra de eo agetur.

De Visco. CAP. CII.

Viscum optimum est recens, intus porraceum, extra fuluum, quod asperi nihil, aut fursurosi concaperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxæ fruticis folio. Contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. Sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo, pyro, & plerisque alijs arboribus. Quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollit, discutit, extrahit. Parotidas, tubercula, cæterasque collectiones, ad maturationem perducit. Cum resina autem & cera pari, epinyctidas in splenio sanat. Vetera ulcera, suppurationesque, quas cacœthe uocant, ex Ture mollit. Lienem cum calce, Gagete, aut Asio lapide, impositum absūmit. Cum sandaraca, aut auripigmento illitum, unguis extrahit. Mistum cum calce & uini facie, suam uim intendit.

ixos

BARBARI COROLL.

Viscum Græce Ixos; & Ixias stutex ipse, ut Athenæus ait. Porro Viscum illud, quod inter

Pli. li. 16. ca. 44

I η

D I O S C O R I D I S

C uenena ponitur a Dioscoride, Galeno, Plinio, Ixiam Græci uocant, & Vlochon, siue Vlophonon: quibus nominibus Chamæleontem quoque dici constat: radicemque affirmant esse hoc genus Visci, quod interficit: unde orta dubitatio est, Viscum hoc pro Chamæleontis, an pro sui generis, aut pro fruticis ipsius radice capiamus, ex quo Viscum conficit: Paulus, & Aelius in uenenis Ixiā a Chamæleonte separant, alias & notas & medicinas reddendo. In Quercu, Ilicē, Pruno syluestri, Terebintho, nec alijs arboribus adnascitur. Dioscorides addit Malo, & Piro. Copiosissimū in Quercu. Plerique putant, quod Dryos, Hyphear uocāt, Ion poeta sudorē quercus: namque quod in Abiete & Larice fit, Stelim Eubœa dicit. Hyphear Arcadia nō Viscū. Viscū porro gña bina, uel terna faciunt, & in omni arbore, excepta Ilicē, & Quercu. Differentiā cōstituit odor uirusque, & folium, non iocundi odoris. Viscū coloris, ut poeta ingratas aures, amarū & lentū, e Robore præcipuū. Hyphear uero, ad saginanda pecora uulius, quā & alimentū plus & pinguetudinis in Larice et Abiete sit. Vina purgat primū: dein pinguefacit, quæ suffecere purgationi ut Silphium. Quibus sit aliqua tabes intus, negant durare. Edendi ratio ætatis quadragenis diebus. Adijciunt aliqui discrimen in hijs, quibus folia decidant & Visco decidere. Cōtra inhære nato in æterno fronde. Omnino autē satū nullo mō prouenit: unde Maroni dictum, Quod non sua seminat arbor.

nec nisi per aluum simo redditum, maxime palumbis & turdis. Siue ut quidam ex Theophrasto, picis, *κίττα* pro *κίττα* legentes: cum alioquin Plautus, autore Seruio grammatico, de turdelis intellexerit: cum inquit, ipsa sibi auis mortem creat. Est autem Turdela, Turdi genus alterum, quod in Venetia prouincia, Drexanos uulgo nominant. In Liguria priscū nomē retinent maiores. Turdo sunt penna subtrus uaria. Græci Cossyphos modo appellant, ut quibidā uideat. Drexanos porro, quasi Dryxanos, hoc est, quercus approdētes uocatos existimāt. Cossyphos certe Aristoteles merulas intelligit, item Corthyphos, Palūbos Græci Phattas, siue Phalias uocant. Sed genus eorum unum, cuius simo Viscum nascatur. Athenæus Oenadem appellari tradit: quam Theodorus noster, in Aristotele Vinaginem interpretatus est. Altitudo eius nō excedit cubitalem, semper fruticosi ac uirentis. Mas fertilis, femina sterilis. Aliquando nō fert. Viscum fit ex acinis imaturis, hoc est, uiridibus, nondum candidis, quod eis per maturitatem contingit. Hi per melle collecti, siccati, atque tusti, deinde putrefacti aqua, duodenis fere diebus, mox in profluente rursus malleo runduntur, amissis corticibus, interiore carne lentescentes. Quidā decoquunt in aqua tustum, donec innatet. Nonnulli cōmanducantes acinos, expuunt cortices. Optimum est quod sine cortice est, quodque leuissimū. Quidam efficacius futurum promittunt, detractum prima luna e robore sine ferro. Visco nihil est glutinosius, pennis maxime uolucrum ligandis, Iugladium oleo subactum, cum libeat insidias molliori. Druydes in Gallia nihil habent Visco & arbore in qua gignatur, si modo sit Robur, sacratius, nec ulla sacra sine ea fronde faciunt. Quicquid hys adnascitur, e cœlo missum putant. Inuentu rarum, magna religione peritur, & ante omnia sexta luna. Post sacrificium & epulas, sub arbore sacerdos ueste candida, falce aurea id demetit, candido excipiente fago: taurosque duos coloris candidi, tum primū cornibus uinctos imolant, precantes ut suum donum deus prosperum faciat. Fecunditatem eo poro dari, cuiusque animalium sterili arbitrantur, contraque uenena omnia esse remedio. Fit & ex alijs quoque rebus Viscum in Syria. Ex acinis, quos ab Augusti honore, ut coniunctio, Sebastos appellantur. Hec Myxa ueteribus fuisse interpretor: quæ per diminutionem quoque Myxaria dicuntur. Arbusti eius ligno, cortex albus, ramis uirens, folio rotundo, amplo, fructus in racemo dulcis, candido lentore plenus, cum interiore nucleo quasi oliuæ siccatur. Hic in medicina uentrem soluit, destillationesque comprimit, & rosiones Vesicæ, & intestinorum animalia. Damascenum inde Viscum paratur, commendatissimum aucupijs, præterque aquatiliū uolucrum. Fingitur & ex radice quadam Viscum Lātanzæ dicti fruticis, æque ueteribus incogniti, folio hirsuto, molli: flore candido, odorato: quem sustinet umbella. Viminibus lentis ad nexū acinis ut uua, primo rubentibus, post nigrantibus.

E X. M. V E R G. C O M M.

Q uale solet siluis brumali frigore Viscum, Fronde uirere noua, quod nō sua seminat arbor, tale & suum Dioscoridi describitur, nulla appellationū eius addita diuersitate. Quales in secundo de causis plantarum numerauit Theophrastus, Hyphear, Stelida, & Ixon, siue Ixiā, eandem rem aliter alijs in Græcia uocantibus. Et si non deessent tunc etiam, qui in diuersis arboribus nascens Viscum diuersa appellatione ostenderent, nascique Hyphear & Stelida in abiete & picea dicerent: Viscum uero in quercu, terebintho, alijsque multis. Fuerunt etiam, qui in diuersa parte eiusdem arboris nascens, diuerso nomine indicarent: hincque Hyphear, illine

Viscum; & Stelida natum appellarent. Quæ nos, nouisse ea uolentibus legenda in Theophrasto relinquimus, & præter Theophrastum in Plinio. 16. uolumine, capite. 45. quo loco reddita iisdem uerbis ex eo scriptore a Plinio omnia fuerunt.

¶ De Aparine. CAP. CIII.

Aparinen aliqui Ampelocarpon, alij Omphalocarpon, nonnulli Philanthropon uocant, ramosam hærbam & quadrangulam, ex interuallis orbiculato foliorum ambitu, ut in Rubia. Flos albus, semen durum, rotundum, concauum, album, umbilici figurâ, asperitate uestium tenaci. Ea pastores coli uice utuntur, ad eximendos e lacte pilos. Seminis caulium ac foliorum succus, potu cōtra uiperarum, phalangiorumq; morsus auxiliatur. Infusa aurium dolori medetur. Hærbæ cum axungia trita strumas discutit.

ἀπαρίνη

BARBARI COROLL.

Aparine, quam nostri & Lappam uocant, Hippocrates Philistion, & Phileterion quoq; ut Galenus putat. Non euidens, sed occultus in ea flos maturescit, & intra se germinat semen: uelut animalia quæ in se pariunt, ut uiperæ. Nascitur in frumentario agro, inter Lentem præcipue, item pratis, hortisq; Ramosa hæc & hirsuta, quinis sentisq; in orbem circa ramos, folijs per interualla, Semen subdulce, Omphalocarpon a Plinio, Galeno, & Paulo Aegineta dicitur. Nisi quis Omphalocarpon ex Dioscoride legi malit, ab umbilici similitudine, quam semen præfert. Philanthropos uero dicta est hæc a nonnullis herba, quia uelut amici solent, cōmeantium lacinijs obhæreat. Aliud floris genus est, quod in Parthis nasci scribit Apollodorus, Philadelphum appellatum, ex argumento, qd rami eius ex interuallo sponte cōeant, cū amantes: post digrediantur, concipiant, atq; pariant. Huius tenuissimis uirgis reticulatum compositis, atq; ita confitis, hortorum septa impenetrabili compage fieri.

Pli. li. 27. ca. 5.

EX M. VERG COMM.

Cognitu & inuentu facilem, inter legumina & in frumentaria segete Aparinem sua descriptione Theophrastus & Diosc. fecerunt: ipsa etiam tenaci nexu prætereuntium uestibus hærens, & quale hic descripsit semen ostendens in medio umbilicatum, ad cognoscendâ se, suisq; cōtempationem nolentes etiam couertit. Persequuntur eam quotannis Maio & Iunio mensibus manu, mellioraq; falce agricolæ, pestem satis suis eam sentientes, nihilq; apricis & pinguibus agris frequentius nascitur. Copiosior tñ inter legumina q̃ inter frumenta inuenitur. Nouerunt calamitatem suam rustici. Nomen tñ, & maleficij eius causam ignorant. Et ut in similibus fit, quorum ignoratur nomen, Lappam uocant. Qua uoce non in Aparine tñ, sed in cunctis quorum matura semina uestibus prætereuntium inherant, ignari utuntur. Quæ sanè multa sunt, & inter alia Eupatorium etiam, de quo suo loco dicemus. Ex quo factum est, ut non ætate nostra tñ, sed antiquis etiâ temporibus parum certa in huiusmodi fuerit nominum ratio. Arcionq; Lappam tñ aliqui dixerint, alij Aparinem hanc, alij plures alias quarum semen aut q̃a asperu, amatu ue, aut cuspidatu est uestibus hæret: quasi ad faciendū genus & nomē una hæc nota satis esset.

B

¶ De Alyffo. CAP. CIIII.

Alyffon, aliq Aspidion, alij Aplophyllō, alij Accysitō, alij Adeston nuncupât. Fruticosa hærbula est, unicaulis, rotundis folijs fructu duplicium scutorū effigie, in quo est semē quadatenus latū. In montibus & aspīs locis emicat. Eius decoctū singultus sine febris potu discutit. Idē efficit, si qs eā aut teneat, aut odoret. Cū melle trita, uitia cutis in facie, et lētigines emēdat. Cōrusa ī edulio, rabiei canis mederi putat. Domib. appēsa, salutaris esse credit. Et hominibus, atq; animalib. fascini, amuletum. Pupureo linteo circumligata pecorum morbos abigit.

ἀλυφσον

BARBARI COROLL.

Alyffon, distat a Rubia, folijs tantum ramisq; minoribus, ita dictum, qd rabiem canum de-

Pli. li. 24. ca. 11

I iij

D I O S C O R I D I S

C fendat. Saniem conspecto eo sicari tradunt. Autor est Aetius, quosdam existimare hanc herbam nihil differre ab Sideriti Heraclea: quæ tertia est inter Siderites, a Dioscoride monstratas. Sed & Photion grammaticus, folio eam subpurpureo describit: quod & Siderites habet terra: ut Dioscorides est autor, Ego Alysson ab hac Sideriti plurimū differre nihil dubito. Alysson & poculi genus est, uerū scriptura separat, q; & per simplex, f, & per, u. scribitur: at p herba captum per, y, & per duplex, fl. Sunt qui Cruciale herbam uulgo dictā, pro Alyssō demonstrant. Sed interest, q; Alysson quinis per interualla folijs ostēdimus, Cruciale quaternis, unde nomē, & minus hirsutis. Exilius & huic semē q; Alyssō est, minus etiamnū, anguloso caule. Flos Alyssō candidus, Cruciali uero luteus. Cæterum impudentius falluntur, qui Alysson p ea capiūt, quæ Liliago, siue Liliarca, et Martegonia rustice uocāt, folio quadatenus et flore Lili purpureo.

E X M. V E R G. C O M M.

Fecit sibi ex re nomen Alysson, & ex pluribus quas habet in medendo uires, eam unde uocaretur elegit, quæ grauiori hominis malo succurreret. Et qm rabidi canis morsus sentire non patitur, ideo Alysson passim dicta est. Celebrauit eā symposij sui tertio volumine Plutarchus: numerauitq; inter eas quæ solo contactu, halituue, aut aspectu prodesse homini possunt: non tamē contra rabidi canis maleficiū, sed contra singultum. Verba eius sunt. τὴν δὲ ἄλυσσον καλοῦ-
μένην βοτάνην, καὶ λαβόντες ἕως τὴν χεῖρα μόνον, οἱ δὲ καὶ προσέχουσιντες ἀπαλλάττονται λυγμοῦ. Πιπταὶ δὲ
καὶ ποιμνίους ἀναθῆναι καὶ ἀπὸ βλαστῶν παραφυτινομένη τῷ σὺν μάνδρῳ. Quæ uerbū de uerbo sic uertat alijs.
Quin etiam herbam quam Alysson uocant, alij in manus accipientes, alij conspicientes solum
a singultu liberantur. Ferrur eadem ouillo & caprino pecori salutaris esse, prope caulas et septa
eorum consita. Quod ab hoc ipso primum & ultimum inter uires & remedia eius numeratur.
Quemadmodum quod ad rabidi canis morsus pertinet, a Paulo Aegineta in quinto traditur,
quo loco Cataplasma contra rabiem canis quoddam instituit, iubetq; decocto eius uti, his uer-
bis. μετὰ ἀφεισμάτος ἑλκισφάμου, ἢ τῆς σιδερίτιδος τῆς ἱερουλίας ἢ καὶ ἄλυσσον καλοῦσι τινὲς. Quorum
sensus est. Cum decocto Saluix, aut Hieraciæ Sideritidis, quā aliqui Alysson uocant. Ex quo
dubitari cōtigit, sit ne hæc sui generis herba, an Sideritidi re ipsa eadē, nōmine uero tm diuersa.
D Hic propriū genus habere Alysson, separat ab illa eius historia et medicina ostēdit. Plinius hoc
ipsum lib. 24. cap. 11. confirmat, Rubiæ similem his uerbis describens. Distat Erithrodanus ab
eo quæ Alysson uocāt, folijs tm & ramis minoribus. Verū huic nō cōuenit, q foliō rotundo,
cōtra q in Rubia est, Alysson describit: & præter folia singularē causē Alyssō tribuit. Fruticosa
aut Rubia est, Alyssō semē est in latitudine se explicās, Rubia rotundū habet. Et ne lōgiore sim
us, nihil qd certā similitudine faciat nobis in Rubia inuenitur. Credimus ob eā causam, postea
oribus his scriptoribus nō satis certas fuisse Alyssi huius historiā & notas: ex quo alij Sideritum
eā crediderūt: & alij Rubiæ, pterq; iu folijs & ramis similē fecerunt. Nos Diosco. descriptione,
& Plutarchi testimonio contenti, sui generis herbam antiquis fuisse dicemus.

De Asclepiade. C A P. C V.

ἄσκληπιάδης

Asclepiadem aliqui Cission, alij Cissophyllon nominant. Ra-
mos emittit longos, folia Hederæ, radices numerosas, tenues,
odoratas. Floris uirus graue. Semen Securidacæ. Nascitur in montibus.
Radices ex uino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium
ictus. Folia aduersus uulux mammarumque ulcera, quæ cacœthe uo-
cant, illinuntur.

E X M. V E R G. C O M M.

Habēt Cissios, & Cissophyllos, aliæ Asclepiadis appellationes, manifestam ex foliorū for-
ma, quemadmodum & nos diximus, causam. Omnes enim qualis et ea est Hederæ folio descri-
bunt. Cū aut Asclepias primum dicta sit, coniecisse etiam difficile non fuerit. Vt enim ab in-
uentoribus suis plures aliæ nomen inuenerunt, sic & ab Asclepio faciente homini medicinæ an-
tiquo autore Asclepias nominata hæc est. Non parū hoc uno argumento laudanda, et in hono-
re habēda, cui pter ea quæ a Diosco. dicta hoc capite sunt, plures in historiā nōtas, & in medicī-
na uires græcorū herbarij alij tribuerunt, Nepetæ similem caule, & toto frutice esse dicētes: &
Hederæ quidē folia habere, uerū lōgiōra & lanuginosa. Habere itidē, ut hic ait, florē graueolen-
tem, sed Rosæ figura, nasciq; nō simpliciter in mōtib, uerū in aquosis mōtib. In medicina autē

tradiderunt posse radicem eius tantū deraſam, ut nihil aſperitatis habeat, in fiſtulas demiffam callos earum abſumere & implere: Nec folia tantū, uerumetiam flores maleficis mamarum, & muliebrum locorum uitijſ prodeſſe. Quinetiā eandem radicem ſiccata, moxq; in puluerem tuſam, & cum axungia coactam, malagmaris modo impoſitam, inflammationes diſcutere, & neruos mollire. Flores præterea, foliaq; ſiccata, mox trita, in ſumma cute uulneribus utiliter in ſpergi. Sordida purgare ulcera, & ad cicatricem perducere, genitaliumq; uitijſ egregie mederi. Quæ omnia ex antiquis græcis collecta, a nobis hiftoriæ & medicinæ huius ſcriptoris liber ter addita ſunt, ne quid relinqueretur, quod legentibus prodeſſe aliqua ratione poſſet: Quam deinde nos Securidacam diximus, cuius ſemini ſimile Aſclepiadis ſemen hic ait, ea eſt quam Theophraſtus, pluresq; alij Pelednum, a ſecuris forma dixerunt.

De Atractylide.

CAP. CVI.

Atractylis, quam aliqui Amyron uocant, alij Cnicon ſylueſtrem, alij Aſpidion, Magi Aphedron, Aegyptij Chenon, Romani Præſepium, aliqui Fuſum agreſtem, alij Colum ruſticam, ſpina eſt Cnico ſimilis, folia multo longiora ferens, in ſummis uirgis, magna parte nuda, aſperaq;. Qua ſceminæ pro ſuſis utuntur. Capitula in cacumine ſpinis horrent. Flos luteus. Quibuſdam in locis purpureus inuenitur. Radix tenuis, ſuperuacua. Coma, ſemen, & folia cum pipere & uino teruntur utiliſſime contra ſcorpionum icſus. Percuſſos tradunt, quamdiu ea teneatur hærbæ, nullum experiri dolorem, ipſumq; depoſita ſtatim recrudere.

BARBARI COROLL.

Atractylis aculeata eſt, ſed & acanæa, hoc eſt, & conceptu & floris ſede, aut etiam ſemine, fructuq; ſpiñoſo: laborantibus Græcis uno uerbo, tres affectus & qualitates includere: idem erat, quod Acorna, ſiue Acarna, niſi candidior eſſet, & niſi decerpta, cuteq; adhibita ſanguineum ſuccum funderet. Qua de cauſſa Theophraſto Phonos, & Androſemon quoq; uocatur ab Aetio, odore grauiſ, peſtemq; denunciâns. Sero matureſcente ſemine, nec ante autumnum. Quanquam hoc de omnibus ſpinofiſ dici poteſt. Acornæ ſpina, pro folio, ut Theophraſtus inquit. Cneco Urbano ſimilis, colore tantum ruſſo, pingui ſucco. Atractylis Cnecum eſt ſylueſtre. De ſatiuo dicitur in mentione ſua. Sylueſtre iterum ſecatur, una mitior & ſatiuo ſimilior: caule rectiore, ac rigido exiliſ. Itaq; & pro colu antiquæ mulieres utebantur: ex eoq; hanc proprie Atractylida nominabant, ſemine candido, grandi, amaro. Altera hirtuſior, toroſiore caule, quaſi Sonchi, & qui pene humi ſerpat, ſemine minuto, amaro, frequentî, pilloſo.

EX M. VERG. COMM.

Cogimur ex Theophraſto, pluribus locis de plantarum hiftoria, certius eam nouiſſe: qui primum inter gênera agreſtis Cnici Atractylidem numerat. Dico autem Cnicum, quem nunc medicina Carthamum, & rura noſtra Crocum ſaracenum uocant. Suntq; poſt multa de Atractylide libro ſexto uerba eiſ hæc, ἀτρακτύλις δὲ τις καλεῖται καὶ κινκστὴρ τούτων. ἴδιον δὲ ἔχει τὸ φύλλον, ὅτι ἀφαιρούμενον καὶ τῇ σαρκὶ προφειρόμενον αἰματώδην ποιεῖ τὸν χυλόν. Διὸ καὶ φέρον ἔνιοι καλοῦσιν αἰκάνθην ταύτην. ἔχει δὲ πῶς δαμνὴν διενὴν καὶ φονάδην ἐπὶ δὲ καὶ τιλυοὶ τὸ κερπὸν πρὸς τὸ μιντόπερον. Quod eſt. Vocatur & quædā Atractylis, candidior hiſ: cuius foliū priuatim id habet, ut auuſum, carniq; confricatū, ſanguineum reddat ſuccū. Eamq; ob cauſſam phonon. i. cædem aliqui ſpinā hanc uocant. Habet præterea grauē & ſanguinis in cæde odorē. Sero, nec niſi per autumnum fructū abſoluit. Idem libro. 9. de plantarū hiftoriā a principio ſtatim, de liquore ſuccoq; plantarum & eiſ diuerſitate agens, ſanguineū ſuccum Atractylidi tribuit. Quæ cauſſa fuit, ut a quibuſdā Androſemos uocaretur: quoniā & illa ſanguineo ſucco eſt, ut certius in ea docebitur. Quemadmodū & Cnicos agreſtis: quod a Theophraſto dictum libro ſexto paulo ante reſtat ſumus. Cur aut præſepium (modo integra ea uox ſit) Romani eā uocarent, incertū nobis eſt. Cur aut Colum ruſtica, & agreſtem Fuſum, ex herbæ figura factū eſt: quæ glabro, nudoq; penitus caule ſurgens, & cum aruit in flexili duricie rigente, aliquando cubitali altitudine,

ἀτρακτύλις

Pli. li. 21. ca. 17.

B

D I O S C O R I D I S

C plerunq; autē minor, nec nisi in summo foliosa & aculeata, in maiore illa altitudine colum, in minore fusos rusticiis foeminis ad lanificium dedit. Vidimus nos, licetq; omnibus per astatem uidere, locis incultis & nemoribus nascentem spinis suis, in summo sic dispositis, ut impositos laniarum peniculos, sine uinculo, nextiue alio quopiam sustinere facillime possint. Numerauit eam Paulus Aegineta libro primo inter olera, carduisq; his uerbis coniunxit, τὰ δὲ ἀκανθώδη πάντα ὅντων ἐκώλυμεν καὶ ἀτρακτύλις καὶ τὰ τριᾶντα. Quod est. Aculeata uero omnia, quales Carduus, & Atractylis est. Credimusq; nos, Atractylidis nomine hoc satium Cnicum intellexisse: in cuius genere Theophrastus eam numerauit: & natura praesenti similitudine constituisse uidetur. Ob quam, ut paulo ante diximus, agrestem Cnicum hanc aliqui uocauerunt: & inter eos Theophrastus quo diximus loco.

De Polycnemo.

C A P. C V I I.

πολύννημον

Polycnemion quidam Clinopedion, alij Polygonaton, alij Iouis colum, alij Echeonymon uocant. Frutex est furculosus, folijs Origanī, caule Pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui in cacumine corymbo, boni odoris & acris. Vulneribus adglutinandis recens, aut aridum cum aqua, efficaciter illinitur. Sed quinto die solui debet. Ad urinæ stillicidia, ruptaq; cum uino bibitur. Edocuit experientia contritos in uino albo ramulos, ijs qui affectibus laborant, quæ Violentiae uocantur, magno esse praesidio.

B A R B A R I C O R O L L.

Polycnemion, & Cunilae bubulae similis appingitur, odoratis corymbis, acris & dulci odore.

De Clinopodio.

C A P. C V I I I.

κλινωπόδιον

D

Clinopodion aliqui Cleonicon, alij Ocimoides, alij Zopyron uocant, fruticem folijs Serpyllo similem, furculosum, duum palmorum altitudine. Nascitur in petrosis. Flores Marrubij, ex interuallis speciem lectipedum praebent. Bibitur haerba & succi eius decoctum, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus. Menses & partus pellit. Et pensiles uerrucas, quas Acrochordonas uocant, eiecit aliquot diebus potum. Aluum sistit, decoctum ad tertias, potumq; si febrim sentiunt ex aqua. Alioquin ex uino.

B A R B A R I C O R O L L.

Plin. li. 24. ca. 154

Clinopodion, non desunt, quibus herba Orbiculata uulgo dicta, Serpyllo similis etiam si non serpit, aut eadem, aut propinqua esse uideatur: quoniam orbiculato florum habitu a Plinio tradatur. Dubitationem facit Dioscoridis adiectio, dicentis, ex interuallo Marrubij similitudine flores in ea cerni: quod quidem in ea, quæ Orbiculata dicitur, non est: sed continua florum series subalbentium, acinis in summo ternis, quaternisue, radice fibris multiplici.

E X M. V E R G. C O M M.

Ex triclins suis quondam in agrum exeuntes graecorum herbarij, pedumq; lectorum suorum imaginem animo seruantes, facile inter alias quaeritum oculos fallentem, Clinopodion herbam inueniebant. Quodq; illis quotidianum, fabrica spectaculum fecerat: diligentius & speciosius elaboratum, natura locis incultis ostendebat. Nunc mutata artium & fabricae ratione, si quis nouisse id cupiat, herbam inuenisse prius oportebit: tum ex floribus eius in antiquorum lectis, pedum quibus fulcirentur formam didicisse. Verumtamen, ut illud ratione carebat (natura enim artibus exempla in cunctis ex se proposuit, neq; ab artibus ad naturam motus est) sic nostra aetate difficillimum, in tam multa florum naturae uarietate, tam multisq; eorum formis, hoc uno argumento herbam deprehendere. Et si Plinius, 24. uolumine capite, non parum ad hanc rem contulerit, orbiculato florum ambitu eam describens, Cuius formae

adfectione satis descripsisse rem uidetur. Omnes enim nouimus, quid orbiculato, quid florum, & quid ambitu significetur: plures scilicet simul surgere flores, circulum per ambitum facere, & ex eo orbiculum describi: in quo relictis inter eos flores medijs spacijs, inane aliquid & uacuum relinquatur: quam Pedum in antiquis lectis fuisse formam, facile conijcere est. Siquidem his exemplis pictores, statuarij, architecti que sua opera adhuc exornant. Nihilque non una hac ratione inuentum ab illis, & tractatum semper est.

De Leontopedalo.

CAP. CIX.

Leontopedalon aliquibus Leontopodion, alijs Leuceoron, alijs Leontion, alijs Doris, aut Dorideris, alijs Lychnis agria, alijs Par-dale, alijs Horybethron, alijs Rhapeion, Romanis Parabelclon, aut Semen leoninu dicitur. Caulem emittit dodrantalem, aut altiore, plurimis alis concavum, & in cacumine semina duo aut tria, in filiquis ciceris modo. Flores Fremio similes, punicei coloris. Folia Brassicae, sed Papaueris diuisura. Radicibus nigris Rapae similibus, torosis. Nascitur in aruis & segetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus ex uino pota. Nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.

λεοντοπέδαλον

BARBARI COROLL.
Leontopetalon radice grandi. Vocatur & Dorypetron a Plinio.

EX M. VERG. COMM.

Descripsit Leontopetalon libro. 27. capite. 11. Plinius hisdem uerbis, Rapeion alijs uocari dicens, folio Brassicae, caule semipedali, alis multis, semine in cacumine in filiquis Ciceris modo. Radice Rapo simili, grandi & nigra. Nasci eam in aruis, & omnium generum serpentibus in uino potam radicem aduersari, nec quicquam celerius proficere. Quae omnia ab hoc ipso scriptore multo antea dicta fuerant. Nomen a ferocissimo & generosissimo omnium animali in antiquis Graecis inuenit. Quid autem illi cum leone conueniat, non satis certum nobis est. Si nominis origo expendatur, nihil Leontopetalon erit quam leonis folium. Sed quae leonis partem, uerbi causa pedem, aurem, linguam, aliamue huiusmodi folium referat, non satis pro comperto nobis est: praesertim uariantibus alijs appellationibus Leontio, scilicet Leontopodio, & Leonino semine. Quae omnes a Leone causam nominis, sed non eodem modo habent. Siquidem Leontion leunculus est, Leontopodion leonis pedem significat: & leoninum semen causam nominis in semine, non in folio esse ostendit. Cur autem agrestis lychnis diceretur floris figura in causa, est: quae Anemonem & syluestre papauer dici etiam Leontopetalon fecit. Omnes enim hi flores magnitudine, colore, totaque figura similes, aut non dissimiles saltem inter se sunt.

Pli. li. 26. ca. 9.

De Teucrio.

CAP. CX.

Teucrion, siue ut alijs placet, Teucris, haerba est uirgae refo-rens effigiem, Trifaginis similitudine, tenui folio, non multum a Cicere alieno. Haec in Cilicia iuxta Gentiadem Scissadema uberrimum prouenit. Recens cum posca, aut aridae feruefactae ius, potu lienem potenter absumit. Lienosis cum aceto & ficis illinitur. Item serpentium moribus ex aceto solo, siue ficis.

τευκρίον

BARBARI COROLL.
Teucrion hoc (ut puto) & ramis Hyssopi describitur a Plinio: surculosa, folio fabae. Colligi florentem adhuc iubent, adeo florere non dubitant, maximeque ex Cilicijs & Pisidijs montibus commendant. Dicitur eadem Teucra. Quidam & aliam Teucrion uocarunt, de qua in Hemionitide scribendum nobis est.

Pli. li. 25. ca. 6.
lib. 26. cap. 6.

EX M. VERG. COMM.

Miscet, confunduntque aliqui Teucrium hanc cum Aspleno, & Hemionitide. Non ob aliam, ut credimus causam, quam quod eadem potestate sunt, Oes enim lienem medentur: sed nullas habent rationes alias notas, ut ex earum historia cognoscere oibus facile est. Diuersa sunt nomina, discrepant partes, seorsumque ueteres Graeci de singulis tradiderunt, Plinius, quod paulo ante diximus, uirgas Teucrii fucos uo-

D I O S C O R I D I S

Cauit, lentore & tenace flexura uirgarum in Teucrio contemplatus: & ex pluribus Iuncorum notis ea elegit, quod multis alijs in plantarum historia congrueret: nec priuatim, proprium iuncum genus faceret. Quod enim Iuncum indicat, nomenque & genus illi facit. Nudus glaberque surculus est. Cetera enim communia illi cum plerisque alijs sunt, sed hoc primum illi mox per eum alijs natura dedit. Dico autem foliorum totius caulibus, & uirgis eius priuationem, quae in Teucrio sunt in uirgis eius pendetia, natio lentore uiliu modo flexibilibus. Ob quam naturam & formam, non defuerunt qui Teucrium hanc agresti Sedo & Portulacae similem dicerent, & eorum nominibus etiam indicaret. Volumus & illud legentibus significare, quod ab hoc remedium lienosis instituitur, cum ficis ex aceto illini Teucrion, &c. credere nos non simpliciter ficos, sed caricas intelligendas esse.

De Trifagine.

C A P. CXI.

χαμαίδρως
χαμαίδρως

Chamædrys Græcis, alijs Chamædrops, Latinis Trifago dicitur. Sunt qui eam Teucrion appellauere, propter eam quam cum Teucrio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis. Frutex do drantalís, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quercus. Flore pene purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potu rutilibus, indurato liení, urinæ difficultati, incipientibus hydropicis auxiliatur. Cit menses. Partus extrahit. Lienem ex aceto pota consumit. Ad uersus serpentium uenena ex uino, potu, illituque efficacissima. Trita digeritur in pastillos ad supradicta. Purgat uetera ulcera cum melle. Cum oleo illita, caliginem oculorum discutit. Natura eius est calfacere.

B A R B A R I C O R O L L.

lib. 24, cap. 15.

Chamædrys, quæ & Serrata dicitur, quod ab ea ferram inuentam putent, folia habet magnitudine Menthae. Fit & uinum ex ea medicis.

E X M. V E R G. C O M M.

Dioetæ breuitatis Quercus quædam Trixago est: & inde illi in græcis nomen. Neque enim Chamædrys aliud, quam humile & terrestrem Quercum significat. Ab eadem breuitate aliud Chamæropis nomen illi ab aliquibus factum est. Sic enim ex ueterum græcorum & latinorum fide legendum esse existimus. Et si hic Chamædropa uocari tradat, Plinius enim codices omnes ante Barbari castigationem Chamæropem, non Chamædropem uocari Trixaginem dicebat. Eam uocem scriptoris huius lectio ille emendauit. Is etiam quæ nos habemus longobardis literis scriptam latinum ueterem Dioscoride, Chamæropa, non Chamædropa Trixaginem dici testatur. Nec nos rationem, aut eam habemus, cur hoc magis, quam illud dici oporteat. Et si excogitata aliqua sit, nulla uero similior erit, quam quoniam humi ferpat sic dicta quondam fuerit. Et si id recipiat, tunc Chamærops dicenda potius erit. Nos in ambiguo plures ueluti testes secuti, Chamæropem potius diximus. Cur autem Teucrion hæc etiam diceretur, eam hic ipse ostendit: ideoque a nobis relinquenda est: qui multo labore quaesita Romanæ appellationis originem nondum inuenimus. Nihil enim Plinius aliud inquit, quam Trixaginem latine dici Chamædyn herbam. Descripsit tamen eam, & quæ hic folia parua dixit, ille Menthae magnitudine: & quæ hic figura & incisuris quernis similibus, ille colore & diuisura Quercus. Adiecit præterea Serrata ab alijs hæc herbam dici: & ab ea, id est, ab incisuris illis, quæ per ambitum habet, eodem quo nunc modo in ferra uidentur dentes, inuentam fuisse Serram. Theophrastus cum lib. 9. de plantarum historia eius meminisset, de notis partibusque eius breuiter egit. Sed quas habet in medicina uires multas, numerauit alias ab hoc scriptore: ideoque repetendas hoc loco a nobis: quæ huiusmodi sunt. Trixaginis autem folia ruptis, uulneribusque præfunt: in quæ usum ex oleo trita imponunt. Profectum & depa mouere. Habet Trixago quernis similia folia, totumque eius incrementum dodrantale est: quod a nobis in Dioscor. expansæ manus mensura significatum est. Adiecit præterea Theophrastus odoratam, suauemque Trixaginem hanc esse, facile inuentum, & ubique ex his notis cognoscendam herbam.

De Leucade.

C A P. CXII.

λευκάδα

Leucas montana, latioribus quam urbana folijs, semine acriore, amarior, ori ingrato, Efficacior tamen quam satiuâ habetur. Vtraque ex ui

no contra animalium uenena, præcipue marinorum, opitulatur.

BARBARI COROLL.

Lucas, eadem fortasse fuerit cum Leuce, ut Plinius uerba usurpem. Verum Leucadis inquit speciem, auctores non tradunt. De Leuce uero Mercuriali herbarum similem dicunt, nomenque ex causa accepisse, per medium folium candida transcurrente linea, quare Mesoleucon quidam uocant. Leuce dicitur & ipsa radix, Armoracia: Itemque Androsaces. Est & arboris nomen Leucæ, hoc est, albæ Populi.

A

Pli. li. 19. ca. 5.
lib. 27. cap. 11.

EX M. VERG. COMM.

Specta omnia. Si quidem Plinius nihil certum de Leucade hac tradidit: nec dubitasse tantum, sed sub hac appellatione ignorasse eam uidetur. Hic ipse etiam parum certe historiam ex his, quæ modo leguntur eius tradit. Fuisseque quondam certioris eius descriptionem, indicio est latinus Dioscorides, & eius præcipue qui apud nos uetustissimus codex est. In quo a necessaria diuisione caput hoc, & his uerbis incipit. Leucæ duo sunt genera. Vna est montana, & altera hortiuæ. Mox sequitur quod nunc in Dioscoride legitur, Montana latiore, quæ satiuæ folio est. Videturque hic ordo necessitatem habere, ut facta prius diuisione, Alterius generis historia, & uires tractentur. Sunt præterea in medio capite, quæ manifeste in impressio Dioscoride, & alijs græcis desint: quæ poterunt uolentes facile inuenire. Nobis paulo minus quæ pro comperto est, nullibi incole esse hoc caput: & quod restitui in integrum non potest, quasi desperatum ulcus relinquitur.

De Lychnide.

CAP. CXIII.

Lychnis coronaria, quam aliqui Athanaton uocant, alij Acyloni: 20xvi6
on, alij Ballarion, alij Geranopodion, quidam Corymbion, alij qui Taurion, alij Sceptum, aut Maloion, Aegyptij Semeon, Magi sanguinem Apocathemenes, Romani Genicularem, aut Balariam, Flore est albæ Violæ simili, quo corollæ faciuntur. Contra scorpionum ictus B
semen in uino potum auxiliatur.

BARBARI COROLL.

Lychnis æstate florere. Lucernulam Theodorus conuertit. Plinius quodam loco Flammeam cognominat, alibi Rosam Græcam. Non nisi in humidis locis prouenit, nunquam excedens quinque folia, Violæ magnitudine, odore nullo. Et hæc ab altera Græcula uocata differt, de qua diximus inter Rosas. Differt & a Lychnitide: de qua in Phlomidibus. Amerias Rhizotomus Lychnin e Veneris labro natam putauit, cum a Vulcano compressa lauit se: præstantissimamque haberi in insulis Cipro, Lemno, Strongyle, Herice, Cytheris. Lychnin hanc & Taurion dicti scribunt. Alia tamen est quæ Taura uulgo nominatur, siue Tora, flore ceruleo, folio rotundo. radice Polypodij hirsuta, & uermis nigri effigie. Venenosa herba: cui per antipathiam naturæ alia occurrit herba Antitaura, & Antitora cognomine, folio rotundo.

EX M. VERG. COMM.

Quo argumento nauis in mari sæpe uisum piscem Lucernam ueteres Romani appellauerunt, ignea per os exerta lingua, tranquillis noctibus relucens: eodem in humidis nascentem magnitudine Violæ, sed figura Rosæ, florem Lychnida, ut fertur, ueteres Græci dixerunt. Noctibus enim hic etiam fulgere creditur, & ut nomen ex re illi factum indicat, ignis fulgore quodam uidentium oculos in se conuertere. Non aliter quæ & Felium oculi flammæ modo in tenebris fulgent, & putres in humidis caudices eodem tempore ignium speciem quandam uidentibus afferunt. Quorum & si diuersa materia sit, communis tamen omnibus causa humoris copia est. Nisi forte in Felibus, quod ab Aegyptijs obseruatum fuerat, non in humore, sed in lunæ luminibus lucis eius causa sit: ad quorum quotidiana incrementa augeantur, dilatenturque in eius animalis oculo pupillæ: & cum toto orbe mortalibus fulget id sidus, tunc etiam copioso lucis fulgore intra domus stercos parietes animalis eius nobis oculus splendeat. Quemadmodum secundo uolumine in Mufela longius testati sumus. Verum tamen alterius questionis est, & huius, & eorum quæ paulo ante dicta a nobis sunt causas & rationes inuenisse. Nunc quod herbarium & scriptoris huius

D I O S C O R I D I S

C interpretem deceat, floris omnē naturam dixisse satis sit. Nascitur locis humentibus hic flos, a Theophrasto ad extremū sexti de plantarū historia uoluminis primus inter aestiuos flores numeratus. Habet enim hac naturae pars sua discrimina. Nec difficile est in ea, eiusque scriptoribus uernos, aestiuos, autumnales & hyemales obseruasse flores: & in aestiuis Lychnidem hanc, quā Plinius flāmeam aliquando ex eo quod diximus argumēto, aliquādo a gente grācam Rosam nominauit, colore purpureo, quinque folijs tantū: & si in satia obseruauerint quidam senis fere aliquādo folijs, agrestem quinis semper. Magnitudo illi est Violae, quā hic nō multo post matronale uocat: eam scilicet quae prima uer nunciat, omnesque alios praue nit flores, & quod propriū eius est, multa uno pediculo pender. Figura Rosae est, folijs Rosarū modo dispositis & pendentibus. Nullū habet odorē: quod demiret aliquis: ex quo coronarius flos est, & coronarij nominis honore ab agresti distinguit: deficienteque eo, uerisimile est solam floris spēm in coronis amarā fuisse. Ob quā causam in magno nominū & appellationū ambitu in gentibus fuit: alijs Athanarū, i. immortalē appellantibus, quod longissime a prima aetate ad extremū autumnū floret: alijs Bellaryon, quae uox licet incertā modo habeat in græcis significationē, antiquam tamen fuisse in lexico suo Ischius indicat: Ballarin trifoliam herbam esse dicens, nec ultra quicquam de ea testatus est. Plinius lib. 21. capite. 26. radicem Lychnidis non coronariae & satiauae, sed agrestis Asianos Bolitē appellasse tradidit. Porueruntque hęc simul misceri, & in duabus uocibus quae principij similitudinē aliquā haberēt, in diuersam penitus librariorū incuria sine euasisse. Verū ut saepe alias testati sumus, nō multifaciēda hęc sunt: eaque ob cām cetera a nobis relinquunt.

De syluestri Lychnide. CAP. CXIII.

ἄνθη αἰγυπτίας

Lychnis syluestris, Tragonoton, alias Atocion, alias Hieracopodion, aut Lampas uocatur. Aegyptijs Semura, Magis Apocathemenes Taurus, Romanis Agreste Intubum. Omnia urbanae similis. Bilem per aluum detrahit, semine duabus drachmis poto. Ictis a Scorpione subuenit. Aiunt huius haerbae appositu, scorpiones torpere & inertes prorsus reddi.

D BARBARI COROLL.

Lychnidis syluestris radicē Asiani Boblitem uocāt. Hanc a nostris Accipitrinū pedem appellari scribit Dioscorides, quod Accipitrinus pes apud nostrū uulgus est, quae Corneola quoque dicitur, folio Salicis fere pusillo, flore subluteo, cum siliquis Ciceri similibus, & in ijs semen in ficere capillos dicitur, colore rubro. Qualis autē sit Pes milui, siue Pes miluinus, dicta Colu-mellae inter herbas, quae in usum colligi & reponi oportet, ipse non explicauit.

EX M. VERG. COMM.

Communes satiauae, Coronariaeque Lychnidis agrestis & rusticae appellationes similitudo fecit. Et quā hic agrestem Hieracopodion, id est, accipitrinū pedem uocari ait, illic satiaua Gruinū notari dixerat, nulla, aut exigua diuersitate. Credimusque nos, foliorū herbae, non floris notam hanc esse. Quemadmodū certa floris est, quā hic Lampada dixit, manifesta significatione a luce, fulgoreque illo, de quo in Satiaua dictū longius est. Foliorū itidem, nō floris notā habent agreste Intybi, & Seris. Ceterae a peritioribus docendae relinquuntur. Agrestis Lychnidis tantū in medicina usus est. Nec refert, quod hic satiaue semen scorpionibus aduersari dixerit. Id enim primū & efficacissime agrestis potest. Nec Plinius aliter decreuisse creditur, & ante eum Nicander in Theriacis suis. ὁ ἀγρὸς τοῦ λυχνὸς ἐν ἰσχυρῶν . &c. Quo loco interpretis eius de agresti hac intelligi tantum iubet, unamque hanc ἰσχυροδυνάτωρ καὶ σκορπιόδυνάτωρ mederi.

De Lilio. CAP. CXV.

ἄνθη

Graeci Crinon Basilicon uocant, alij Crinanthemon, alij Calirion, Magi Martis sanguinem. Osthanes auram Crocodili, Aegyptij Simphaphon, quidam Tialon, Latini Lilium, aliqui Rosam Iconis, Syri Safa, Aphri Abiblabon. Lilia coronamentis se dedunt, Lyria a quibusdam uocata. E quibus unguentum temperatur, quod aliqui Lirinum, alij Susinum appellant. Neros, & priuatim uuluae

duricias emolliens. Folia hærbæ illita, contra serpentium ictus auxiliantur. Feruefacta, ambustis proficiunt. Aceto condita, uulneribus optulantur. Succus adiecto melle, aut aceto, in æreo uase coquitur, conuenienti medicamento uetustati ulcerum, & ad recentia uulnera. Inassata radix, & ex rosaceo trita igni, ambusta sanat. Vuluiam emollit. Menses eiect. Ulcera cicatrice obducit. Cum melle detrita, neruis præcis, luxatiscq; medetur. Vitiligines, furfures, & lepras emendat. Ulceraq; in capite manantia expurgat. Abstergit faciem, & erugat. Teritur in aceto, cum Hyoscyami folijs, et farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen potum, moribus serpentium aduersatur. Ignibus sacris semen, & folia cum uino illinuntur. Tradunt & rubra esse Lilia. In Syria autem & Pisidia Pamphiliæ, efficacissima unguentis nascuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Lilium Græci Crinon, sed fruticem eius Crinoniam, quasi Liliarium, ut uiolarium, & rosarium appellant. nam Lilieta, rosæra, uioletaq; aliud sunt, ut constat. Liliū e Iunonis lacte natum, Græci perhibent, resperfa terra, dum Hercule dormienti uberibus admoto, mox post sumtum digresso, late fluxit. Ob id Liliū a nostris Iunonia rosā dictum uideri potest. Philinus a quibusdam Ion uocari quod sit Liliū existimat. Ambrosiam Corinthi Nicander, & Aphrodites Charma, hoc est, quasi Veneris uolupiam cognominari a quibusdam cecinit. In Cō insula, ex Alexandri statua enatam in capite Ambrosiā, Carystius, quæ nihil aliud sit q̃ Liliū, memorie proditum reliquit. Nascitur e lachryma sua Liliū, inarescente cum defluxit, uelut Oluſarum. Liliū quadruplex genus in Theophrasto. Primi, flos Vere cū Viola sepe alba, paulouē postea erumpit. Hoc ab eo proprie Crinon, hoc est, Liliū uocatur. Alterū genus Liriū appellat, uere quidem omnino flōrens, uerū serius cum Narcisso. Forteq; hoc sit quod a Plinio Liliū trans maria nuncupatum est. Tertium æstate flōret, & Cerinthum priuatim uocari puto, q̃q̃ et alias res Cerinthus significat; ut inferius liquebit. Quartū genus, qd itē Liriū Græci nomināt, Autumno flōret; enicacq; primis hymbribus. Est & rubens Liliū, differēs (ut arbitror) a purpureo, uisum a nobis Patauij in Felicis horto. Probatissimum in Antiochia, & Laodicea Syria; mox Phaselide: quartum locum obtinente: qd in Italia nascitur. Hoc genus pprie Crinon a Græcis uocari, & flōrem eius Cynorhodon, autor est Plinius. Hoc & Hippocrates accepit, cum rubentia Cynorhoda feminarum purgationibus cōmendat in uino. Lilia purpurea & arte sunt, maceratis in fecē uini scapis antequam serantur mense Martio, & in scrobe circumfusi eadem fecē: in quem usum scapos areſcentes colligunt Iulio mense, Lilia in fumo suspendētes. Cāule gemino Purpurea uisuntur aliquando, carnosiore tantum radice, maiorisq; bulbi, calix herbaceus. Post arcturum & æquinoctium autumni flōrent Purpurea: quorum genus unum uocant Narcissum: cui uidelicet in radice sunt folia. Calices, ut diximus herbacei, cetera eadem quæ candidis. Albo nihil est fecundius, una radice quinquagenos sæpe nutriente bulbos. Liliū Rosæ nobilitate proximum. Ideoq; Iunonis rosā dicitur. Nulli flōrū proceritas maior, in terim cubitorum trium: languido semper collo, & oneri suo impar: candor eximius, folijs eius foris striatis, & ab angustijs in latitudinem paulatim se laxantibus, calathi effigie, resupinis per ambitum labris, tenuiq; filo & semine stantibus in medio croceis. Ita odor, colorq; duplexq;: alius calicis, alius staminis. Differentia angusta. Raro duplex caulis in Lilio. Singulis caulibus Lilia modo singula, modo plura sustinentur: quod & rarius est. Pandit se, uel detractum parienti, etiam si tristius & exilius. Lilio simile in Aegypti palustribus gignitur, sed folijs copiosis, colore admodū uirētibz dispositis, et quasi uno uersu cōditis, ad mulierū profluvia, & fracturas medicis quæſitū. Cerinthus, de qua scribere distulimus, & Rhitacē, siue ut Aristoteles, Crithacē significat: quæ & Sādaraca appellat, & a Dioscoride Cerāthemōs, libro qnto, ex arborū succo, gumī mō genita & uerno rorē. Vnde Vernigini quoq; uulgo nomen. De hac & in Propole nō nihil diximus, africi flatu minor, austri, nigrior, aquilonibus melior, et rubēs. Plurimū in Græcis nucibus, apū cibo aptissima dū operatur: q̃ sepe inuenitur in fauorum inanitatibus sepositus, amari saporis, & humore plenus. Menecrates, sed nemo præter eum, ut inq̃ Plinius, autor

Pli. li. 21, ca. 5.
The. li. 6, ca. 6

B *Pamponius Sabinius.*

D I O S C O R I D I S

C est, Erithacem, aut Cerinthum florem esse futuræ mellationis indicium. Est & Cerinthe quæ uocatur herba propter apes ferenda, folio candido, incuruo, cubitalis, capite concauo, mellis saccum habente: cuius gramen Virgilius esse dixit ignobile. Quæ nominum uicinitas, fortasse Menecratem fecellit. Nam & Aristoteles Cerinthi florem ad hunc usum citat in libro de animalibus: quanquā in eo non Cerinthus, sed mendose scribitur, calythrus.

E X M. V E R G. C O M M.

Exigebat floris maiestas, ut longius de eo ageremus: sed tamen certa in Plinio, Theophrastoque, et in his quæ eos scriptores commentationibus suis miscuerunt, historia est, ut nihil dicendum nobis reliquum fuerit. Non tacebimus tamen quod hic ait Lirium a quibusdam Liliū dici a Theophrasto uolumine. de plantarum historia, non magis Lilio quæ Narcisso tribui. Verba eius sunt, ὁ δὲ Νάρκισσος ἢ τὸ Λίριον, οἱ μὲν γὰρ τοῦ τοιοῦτο καλοῦσιν. Quod est, Narcissus uero, aut Lirium, Hi enim sic, illi eo nomine uocant. Verum certius suo loco Narcissi tractabitur historia.

De Ballote, seu Marrubio nigro. CAP. CXVI.

Balloten, nomine alio nigrum Marrubium, aut magnum uocant, aliqui Nophthan, alij Notianoscemin, alij Nosprasson, alij Nothera, alij Nochelin, aut Nostelin, alij Nophrim, alij Gnoturim, Romani Uicerariam, aut Marrubium nigrum, alij Canthurinum, Aegyptij Asphon, Magi Isionis sanguinem. Caules edit quadrangulos, nigros, subhirsutos, complures ex una radice. Folijs maioribus quæ Marrubij, hispida, intercedente spacio, subrotundis, graue olentibus, Apiastro proximis. Vnde aliqui Apiastrum eam uocauerunt. Caulibus albis, orbiculato florum ambitu, qui Rotæ speciem præbeat. Vis eius efficaax aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis. Feruenti cinere flaccescunt folia, ut cōdylomata reprimāt. Purgāt & sordida ulcera cū melle.

Pli. li. 27. ca. 9.
lib. 24. cap. 15.

B A R B A R I C O R O L L.

Ballote, fruticosa est herba. Nec uideo qui possim tueri Plinium, qui ait, Græci Porrum nigrum uocant. Et infra. Ballote inquit folijs est Porri maioribus, nigrioribusque. At Græci non Porrum nigrum, sed Marrubium nigrum Ballotem, sine ulla controuersia cognominant. Nec folia ei sunt porracea, sed Marrubij & Citraginis. Deceptum affinitate nominum constat Prasōn, melan, pro prasōn legentem. Est autem Prasōn Porrum, Prasōn Marrubium. Idem error a Plinio committitur in herba Stachye.

E X M. V E R G. C O M M.

Deprehenderunt iam pridem & alij turpem Plinij in Ballote lapsus lib. 27. cap. 9. Porrum nigrum eam appellantis. Diuque iactatus contra eum scriptorem hic error est: quæ nulla ratione excusari in homine potest, tam apertam culpam, & ex culpa facilem criminationem habet. Id nos relinquimus, quod semel in iudicium delatum fuerit, ad nouam reuocare censuram asperius existimantes. Nec aliud bonarum artium, præsertimque græcarum literarum cupidus monemus, quæ nullam fore unquam satis in earum professione illis diligentiam, ex quo in unius tantum literæ mutatione, adiectione, detractiōeue tantum uersatur periculum: ut pro Marrubio, Porrum aliquis alios doceat. Nota omnibus modo etiam Ballote est, a foliorum similitudine Marrubium, a coloris diuersitate Nigrum dicta. Siquidem candidus Marrubio, Ballote uero niger. caulis est, reliqua omnia similia & æqualia habentibus: ut ex utriusque historia cognouisse facile est. Hanc Marrubium, alterum Marrubium, id est, secundum aliqui manifesta indicatione dixerunt: quoniam illud prius, hoc posterius sit: non naturæ ordine, sed hominum honore & appellatione. Habet & ulceraria appellatio alia certam ex usu & uiribus causam: quemadmodum & Marrubium Cantherinum a Romanis dici potuit, quæ eo pascerentur cantherij.

μελισσόφυλλον

De Apiastro. CAP. CXVII.

Melissophyllon Græci, alij Melithæum, alij Melithænam, alij Meliphyllon, alij Erythran, Latini Apiastrum, aut Citraginem, Galli Merisumorion uocant. Id sibi nomen usurpauit, quoniam apes ipsa

hærbæ delectantur. Cauliculi & folia Ballotæ, de qua paulo ante dixi **A** mus, similia essent, nisi minora, tenuioraq; nec ita hirsuta spectarentur. Citreum malum olent. Folia cum uino pota, aut illita, profunt contra ictus phalangiorum, scorpionumq;. Item aduersus canis morsum. Decocto eorundem gratia, foueri prodest. Defectionibus fœminarum ad ciundos menses conuenit. Dentes eodem in dolore colluuntur. Dysentericis infunditur. Fungorum strangulationibus folia, addito nitro, potu auxiliant. Torminibus, & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale strumas discutiunt. Vlcera purgant. Articulares dolores illita sedant.

BARBARI COROLL.

Melissophyllon, siue Melinon, Apiastrum ab Igin o uocari cepit, eruditissimo alioquin uir, sed quæ omnes hac in parte damnant. Et quod magis mirere, sequantur tamē. Nam & Dioscorides, & Varro ita eam uocant. In coronamenta folio & hæc uenit. Adeo autem nullo magis flore apes gaudent, ut si perungantur alucaria eo, non fugiant, & in copia eius examina facillime contineantur. Citraginem a nostris uocari & hanc Dioscorides affirmat, ab odoris similitudine. Palladius uero q̄ recte, nescio, Melissophyllon aliud a Citragine, siue quod idem est, Citreagine uidetur intellexisse, in mentione apum.

Pli. li. ii. ca. 20
lib. 20. cap. 11.

EX M. VERG. COMM.

Omnes Apiastri in græcis appellationes, exceptis barbaris, latinisq;, a melle & ab apibus sunt. Satisq; indicadis his, ne tot alios numeremus, Nicæder in græcis, Maro in latinis est. Quorum alter fame pressis, aut morbo laborantibus apibus apponi iussit trita Melissophylla. &c. Alter in theriacis suis longius descripta re cecinit. τὴν ἴστω μέλισσαν ἐπικρίουσι βοτάνῃς διὰ μέλιτος τὰιναν, τὴν γὰρ περὶ φύλλα μέλισσαι. ὅδ' αὖ κελεῖται μέλιτος τοῖς φύλλοις ἵενται. Quin etiā Plinius. 21. uolunt mine & capite uicelimo Melitenā uocari Apiastrū dixit. Omnibus, ut testati paulo ante sumus, mellis, aut apium ratio & significatio coniuncta est.

B

De Marrubio. CAP. CXVIII.

PRASSIONE Græcis aliqui uocant, alij Eupatorium, alij *πράσιον* Phyllophares, alij Tripedilon, alij Camelopodion, Aegyptij Asteropen, Magi Tauri sanguinem, aliqui Aphedron, Latini Marrubium, aliqui Labeoniam, Aphri Atierberziam. Frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis. Folium pollicem æquat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro. Semen in caulibus, & ex interuallis flores uerticillato ambitu asperi. Nasquitur propter ædificia, & ruderata loca. Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut uiridium succus, datur cum melle suspiriosis, tussibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam e pectore pituitam, cum sicca Iri eijcit. Mulieribus a partu non purgatis datur, ut menstrua & secundas extrahat. Item in difficili partu, & his qui uenena hauserunt, aut a serpentibus demorsi sunt. Vesicam, renescq; lædit. Folia cum melle illinuntur sordidis ulceribus purgandis. Pterygia, nomasq; sistunt. Latetum dolores mitigant. Succus folijs contulis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet. Cum uino & melle illitus, oculorum claritatem adiuuat. Naribus regium morbum expurgat. Aurium doloribus conuenienter instillatur, per se, aut cum rosaceo.

K ij

D I O S C O R I D I S

BARBARI COROLL.

Pli. li. 20. ca. 22

Marrubium duplex, folio herbaceo, & incisuris altioribus serrato, unguentarijs, ut Theophrastus ait, quaesito ad quaedam. Hoc & candidum appellauerim. Alterum folio rotundiore, uehementer squalido, ut Saluia, & obscurius serrato: quod quidē ego, aut Balloten ipsam, de qua diximus, aut ei ualde similem interpretor. nam & medicinae congruunt in Plinio.

EX M. VERG. COMM.

Fecit Theophrastus libro sexto de plantarum historia Marrubij duo genera. Alterum quod magis herbaceum, magisque incisuris diuisum folium haberet: quo qui pharmaca & morborum remedia tractant, in aliquibus uterentur. Alterū quod rotundiore & squalidiorē folio esset: quale in altero Saluia genere, quod Sphacelum nominant, uidet & in eo tenuioribus incisuris. Videturq; diuiso haec in hoc tantum Marrubij genere facta ab eo fuisse. Quam uero Plinius, autore Castore, in nigrum & candidum tradidit Ballotem, paulo ante descriptam, & hoc manifeste complectitur. Nisi forte quod hic colore tantum discreuit, Theophrastus incisuris foliorum indicauit, & praeter incisuras herbaceo colore & squalore: ut ex his niger color, & candidus intelligeretur. Siquidem nigredo in plantarum folijs, plenior & obscurior uiredo intelligenda est: & in squalore cinereus et albicans color in plantis plerumq; uidet. In quam partem inclinat animus nobis: nec aliud, sed aliter a Theophrasto & Plinio dictū fuisse de utroq; Marrubio existimamus. Fuit hoc olus in multo nominum honore apud ueteres, quemadmodum multis in medicina etiam usus, praesertimq; in laxandis liene & iecore, curandisq; tot alijs morbis & uitijs, quae hoc capite a Dioscoride numerantur.

De Stachye.

CAP. I.

CXIX.

56xv7

Stachys frutex est, Marrubio similis, sed longior. Folia ferens numerosa, hirsuta, rara, praedurā, cana, odoris iucundi, & complures uirgas ab radice exeuntes, Marrubio candidiores. Nascitur in montibus & asperis. Vim habet excalfactoriam & acrem. Foliorum decoctum potu pellit menstrua & secundas.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 24. ca. 17

Stachys, folijs colore in luteum inclinante, nec Porri, ut Plinio placet, sed ut Dioscoridi, qd & nos uidimus, Marrubij similibus: quod & in Ballote idem autor peccauit. Vidimus eam Romanæ, ubi & Nauiculam, & alij Coronatam herbam uocant.

EX M. VERG. COMM.

Sinominis in Stachy hac ratio expendat, spicatus credetur frutex: quales pleriq; alij, & herbe quotidie uident. In frugibus em̄ primo Stachyn græci adhuc Spicā uocāt. Sed nullū Spicę uelut gium in eo deprehendit. Hic nihil qd eo pertineat dixit. Nec Plinius lib. 24. cap. 17. de eo agens Spicę aliqd simile in eo ostendit. Græcorū medici nihil addiderunt, p̄terq; amaro sapore esse Stachyn, tertiu in calefaciendo ordinem habere: nec solū menses et secundas pellere, sed abortiuum etiā esse. Quod uero omnibus cōmune sit, Marrubio similē oēs fecerunt. Qua una similitudinis ratio, nullam in eo Spicam cōscire licet. Habet qdem græcorum Stachys p̄ter primam illam Spicę significationē plerasq; alias. Nam & in medicina nexus, uinculiq; modus & ratio quædam Stachys dictus est. Er̄ in nauium fabrica, alijsq; aliquot artibus nomen hoc inue[n]itur: sed ubiq; a Spicis translaturum. Fecit rem minus certam Plinius etiam, qui contra hunc scriptorem colore in luteum inclinato folia describit, quæ hic candida tradit.

De Phyllitide.

CAP. CXX.

9vllv7

Phyllitis, quam aliqui Phyllin, alij Acaulon, alij syluestre Lappathum uocitant, folia promit Rumici similia, longiora, & uiridiora, sēna, aut septena, quæ parte anteriore læuiā cernunt, a tergo aut em̄ pensiles quasi uermiculos ostendunt. In umbrosis, & opacis hortorū ambulationibus emicat, gustu acerbo. Neq; caulē, neq; semē p̄fert. Folia in uino pota serpētū moribus aduersant. Quadrupedibus pos infusa auxilio sūt. Et si dysēteria, aut resoluta aluus exerceat, potui dant.

BARBARI COROLL.

Aliud uidetur genus Phyllitis esse, q̄ Phyllanthion. Est aut̄ Phyllanthion cognomento Dy-
ticon apud Democritum, ad purpuram tingendam satis celebre, nec præterea quale id sit mon-
stratur. In Theophrasto ac Plinio legitur & Phyllanthes herba, inter spinosas, sed mitior acule-
is, & ab radice tantum foliata.

EX. M. VERG. COMM.

Foliosus cespes potius q̄ planta Phyllitis est, ubiq; ad parietū radices nascens. Ob quam cau-
sam ex antiquis græcis & posterioribus latinis aliqui, non Phyllitida tantum a folijs, sed Pyrgi-
tim a turribus etiam, q̄ ad radices earum nascitur eam dixerunt. Viret diu herba, contra geli-
cidia hyemis contumax, nullo unq; prolato caule: ex quo Acaulos etiam dicta fuit. Id enim ea
uox græcis significat. Feliciq; similitudinis comparatione usi sunt, qui Rumici eam, ut est, simi-
lem uidentes, syluestrem Rumicem appellauerunt. Rigent recta in altum surgentia eius folia.
Ex quo hic interiorem eius partem appellauit, eam scilicet, quā se inuicem folia spectant multo
læuore nitentia, extrinseca autem qua parietes & terram. Negauit hic ultra caulem, flores & se-
mine ferre Phyllitim: nec nos aliter obseruauimus. Dubitandum tamen, & querendum de se-
mine est, cum copiosa, & quibus locis antea non fuerat nascatur. Paulus Aegineta nihil de ea
aliud tradit, q̄ acerbo sapore esse, ideoq; potam fluores alui compescere.

De Phalangio. CAP. CXXI.

Phalangium a quibusdam Phalangition uocatur, ab alijs Leu-
cacantha. Ramuli sunt ei duo, pluresue, in diuersa tendētes. Flos
candidus, Lilio similis, multas incisuras habens. Semine nigro, lato ad
Lenticulę dimidiatę figuram, multo tenuiore. Radice parua, tenui, hæc
bacei coloris, dum a terra eruitur. Prouenit in collibus. Huius folio, se-
mine, flore cum uino potō, auxiliatur contra scorpionum, phalangio-
rumq; ictus. Tormina quoq; discutit.

BARBARI COROLL.

EX. M. VERG. COMM.

Phalangion, & Leucanthemon, & Leucacantham uocant. Flos Lilio rubro similis.
Omittimus quæ Paulus Aegineta libro. 6. de ea dixerit, *φαλαγγίτην ὀνόμασαι μὲν ἀπὸ τοῦ τοῦ
φαλαγγιδίου τοῦ βουθίν.* Plinius enim satis unus est idem testatus lib. 27. Huius folio, uel flore, uel
semine contra scorpionum, phalangiorumq; & serpentium ictus auxiliatur. &c. Tantaq; illi,
& tam presens contra Phalangiorum morsus uis est, ut uno hoc salutis humanę auxilio cla-
ra inter alias plantas semper fuerit. Nec tantum illi ad gloriam nominis profuit Lilio similis &
candidissimus flos, ob quem Leucacantha dicta etiam est. Candorem enim floris utraq; ea uox
indicat, quātum a ueneno insecti illius per eam seruata homini salus. Habet Phalangites notas
ubiq; & adhuc omnes illas quæ a Diosco. & ab alijs in historia eius illi tribuuntur. Nec diffici-
le est locis inculcis eam inuenire. Nosq; ex obseruatione eius, non sine ratione persuademur qd
nunc in Diosco. legitur, flores multas habere incisuras, non de floribus, uerum de folijs rectius
intelligi posse. Plures enim quales in quercu folium eius incisuras habet, idq; mediocris Betæ
quantitate est: nihil tamen in communi græcorum omnium lectione mutatum a nobis est. Eo
dem modo quod *παχύ*, idest, crassum in cunctis legitur, *πλετύ* latum legi debere. Plinius enim
lato semine eam describit: & hic dimidiæ Lentis quantitate dicit esse: pauloq; post Lente graci-
lius, quod crassitudini non respondet.

De Trifolio. CAP. CXXII.

Græci Triphyllon, alijs Oxyphyllon, alijs Menyanthes, alijs As-
phaltion, alijs Cnicion uocant, Romani Trifoliū, aut acutum,
aut odoratum. Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, uirgas habes
tenues, iunceas & nigras, e quibus ramulares enascuntur appendiculæ,
quæ in terna singulis germinationibus exeunt folia, Loto arbori simi-
lia. lis recenter enatis Rutæ odor inest. Vbi autem adoleuerunt, bitu-
K iij

A

Plin. lib. 21. cap. 15.

φαλαγγίτην

φαλαγγίτιον

B

τριφυλλον

D I O S C O R I D I S

C men olent. Florem ædit purpureum, semen quadamtenus latum, sub-
hirsutum, ex altera extremitate exertum, ueluti corniculum gerens. Ra-
dix tenuis, longa, ualida. Semen & folia in aqua pota pleuriticis, urinæ
difficultati, comitialibus, & ijs qui aquæ inter cutem principia sentiunt,
fœminis quoque uulvæ uitio opportunis, auxiliantur. Menses cit, ternæ
drachmæ e semine dari debent, e folijs uero quaternæ. Contra serpen-
tium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradunt
aliqui totius fruticis, radices, foliorumque decoctum fotu dolores eorum
finire, quos serpentes percusserint. Quæ autem aqua huiusmodi sana-
tus quis fuerit, si ea quispiam alius foveatur, qui ulcus habuerit, perin-
de afficitur ut a serpente demorsus. Quidam terna folia, aut semina in
tertianis, cum uino potui dedere, & in quartanis quaterna, ut quæ fe-
brium circuitus discuterent. Radix antidotis inseritur.

Pli. li. 29. ca. 6.
lib. 21. cap. 9.

T RIFOLIUM tribus generibus. Minyanthes, siue Asphaltio, siue Asphaltidis, ut Archigenes,
maiore folio: quo utuntur coronarij. Alterum acuto, Oxytriphylon cognomine. Tertium ex
omnibus minutissimum. Herba optima in prato Trifolij est. Præfagia tempestatum habet. in-
horrescit enim, & subrigitur contra eas. Sophocles pœta uenenatū id existimat. Serpentes in
Trifolio nunc spectantur. Columella Trifolium Simoniamum, & acutum quoque dici hoc tra-
dit, fragosis locis inueniri, longis, hirsutisq; folijs uirere, caulemque robustiorem facere, q̃ Tri-
folium pratense.

E X M. V E R G. C O M M.

D Quæ in scriptore hoc a principio capitis huius statim numerantur Trifolij tres appellatio-
nes, Oxytriphylon, Memanthes, & Asphaltion, non satis certam in antiquis scrip-
tibus rationem habent: nec constitui ex illis facile est, sint ne diuersorum Trifolij generum di-
uersæ notæ, an eiusdem plantæ diuersarum gentiū diuersæ tñ appellationes. Nicander in The-
riacis suis unum esse Trifolium quod pluribus nominibus censeatur, his indicat uerbis. *οὐ μὲν
καὶ τριφύλλον ὀπάσει. &c. τὴν ἴστωι μινιανθὸς ὃ δὲ τριπίτκον ἰνίσσῃ, χαίτην μὲν λυτοῦ πυτῆρι μὲν ἴκλον
ὀδμήν.* Quod est. Sumito & Trifolium, quod Menianthes aliquis, aliquis uero Tripetalon uo-
cat. Pro quibus interpret eius a Dionysio herbario Trifolium Menianthes uocari ait: habere-
que Loto simile folium, odorem uero Rutæ cum nondum creuit: postquæ uero exoleuit, deflu-
entibus iam folijs, odore bituminis sentiri. Quæ omnia huic scriptori eadem sunt. Qui, modo
integra in eo pars illa sit, non aliter de Trifolio sentire uidetur, q̃ unū, idemque omne esse, diuer-
sisque his nominibus ob diuersas censi causas. Nec aliud Paulus Aegineta etiam libro sexto
de Trifolio tradidit, *τριφύλλον* dicens *ἰσὶ δὲ ἀσφάλτιον, ἰσὶ δὲ ὀξυτρίφυλλον, ἰσὶ δὲ μινιανθὸς.* Quod est.
Trifolium, quod alij Asphaltion, alij Oxytriphylon, alij Menianthes uocant. Plinius contra
uicesimo primo uolumine, capite nono diuersa genera his uocibus indicari tradidit. Folio co-
ronat & Trifolium. Tria eius genera, Menianthes uocant græci. Alij Asphaltion maiore folio,
quo utuntur coronarij. Alterum acuto, Oxytriphylon. Tertium ex omnibus minutissimum.
Manifesteq; Menianthes, & Asphaltion illi idem est: Oxytriphylon autem diuersum. Colu-
mella grauis & ipse autor, lib. 7. ca. 15. de Trifolio hæc ait. Vel simonianū Trifoliū, qd inuenitur
fragosis locis efficacissimū tradi, odoris grauis, neq; ab similibus bitumini, et iccirco græci Asphal-
tion appellant. Nostri aut propter figurā uocant acutum Trifoliū: nam longis, & hirsutis folijs
uiret, caulemque robustiorem facit q̃ pratense. Quæ Plinio contraria sunt. Ille em Menianthes, &
Asphaltion idem facit: hic Asphaltion & Oxytriphylon. Theophrastus semp sere Menianthes
Trifoliū omne uocat. Ex his non facile censere in Trifolio est, quæ nā eius gñæ, & generū appel-
lationes qñdam fuerint. Nobis ex his quæ diu obseruauimus, in eam partem inclinat animus,
ut duo sint Trifolij genera. Cōmune et pratense hoc, omnibus notū. Et acutioris folij alterū, qd
græci Oxytriphylon dixerunt: & hoc Menianthes & Asphaltio uocari. Factaq; illi primā apel-
lationē, q̃ flore suo se indicet: id em ea uox significat. Secidā uero, cū iam ab integra ætate dissi-
bi cœpit, & bituminis odore cōtraxerit, inuenisse. Suum tñ unicuique iudiciū & arbitrium erit.

¶ De Polio.

CAP. CXXII.

A

Polium montanum, aliqui Theuthrion, alij Feuxaspidion, alij Achamenin, alij Ebenitin, alij Melosmon, nonnulli Belion, quidam Leontocharon uocant. Duo genera eius. Montanum, cui Teuthrio nomen est, & cuius est usus. Tenuis frutex est, candidus, neq; palmo altior, semine refertus. Capitulo in cacumine quandam corymborum speciem præseferente paruo, canis hominis simili, grauitè olente, non sine quadam suauitate. Alterum fruticosius, non usque adeo ualens odore, & uiribus infirmius. Potum feruescitur ius auxiliatur serpentium ictibus. Hydro picis, morbo regio, & lienosis ex aceto. Stomachum male habet. Caput doloribus afficit. Aluum & menses ciet. Substratum, suffitumue serpentibus abigit. Illitum uulnera conglutinat.

BARBARI COROLL.

Polium carnosum, ut alia multa, folio, uestibus interpositum, arceat animalium nocentia. Cules ab eo, caprifici modo generari, Theophrastus scribit. Herba indyta Hesiodi, & Musæi, laudibus ad oia utilem prædicantium, & ad famam quoq; dignitatis perungi, tractari, coliq; iubentium. Folia eius mane candida, meridie purpurea, sole occidente cerulea spectari: quod quidè a Dioscoride Tripolij floribus ascribitur. Theophrastus certe modo Polium, modo Tripolium eandem uocauit herbam. Ideoq; a Tripolio differre quidam negarunt. Folia Polij, canis hominis similia, a radice protinus nuncq; palmo altiora Plinius existimat. Quidam folia Thymi reddunt, nisi q; molliora sunt, & lanatiore canicie. Nulla magis herba conuenit medicamentis, quod Alexipharmacum uocant: in quod minore, ut Galenus inquit, utimur.

Pli. li. 21. ca. 7.
26. cap. 7.
Theoph. li. 1.
de hist. plant.

EX M. VERG. COMM.

Non potest, Polium cum Tripolio diuersi generis plantas, tam multis locis miscens, defendi Plinius: nec eius scriptores auctoritate excusari, qui commentationibus suis, dissimulato hominis errore, eadè illa ut erant, adiecerunt. Contra Plinium enim scriptor hic, Theophrastusq; & quod pluris merito faciendum est, res ipsa stant. Polium siquidè uidere passim licet, nullas Tripolij notas habens. Obseruauit multo ante hæc tempora in Plinio, qd dicimus, & commentario quodam suo declarauit Leoniceus, uir nostra ætate huiusmodi doctrinarum peritissimus. Eaq; ob causam, non erimus nos in his ultra longiores. Satisq; græcarum literarum imperitis nouisse fuerit, caniciem Polio nomen fecisse, quæ in summo plantæ cacumine pendens, canos hominis capillos præfenti quadam imagine ostendit: consueuissq; Græcos scriptores, cum maioris amaritudinis indicatione aliqua uti uellent, a Polio hoc rationem & exemplum sumere: semperq; βαρύδαιμον, quod est graue olens, appellare. Theophrastus primo de plantarum historia uolumine, quod ad seruandam rem domesticam pertineat, Polio tribuit, ut uestibus interpositum ab insectis, quæ eas erodendo dehonestant, incolumes seruet. Verba eius sunt. τούτο δὲ καὶ πρὸς οὐρανὸν τοῦ ἐν τοῖς ἡμαθίαις ἀγαθόν. Meminit eius & Nicander in Theriacis suis. ἡπιόλιον βαρύδαιμον ὅλην γῆνισιν ὠφέλει. Laudauitq; præcipue contra uenenata.

B

¶ De Scordio.

CAP. CXXIII.

SCORDIVM aliqui Scorbion, alij Pleurit, alij Dysofmon, alij syluestrem Calaminthen, quidam Chamædryn, alij Mithridation, Magi Podotis sanguinem, Aegyptij Apho, Romani Trisaginem palustrem appellant. In montibus & palustribus nascitur, folijs Trisaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum Allia redolentibus, gustu amaris & adstringentibus. Quadrangulis caulibus, sub rubro flore. Herba uim excalfactoriam habet. Urinam ciet. Cocta recens aridaue cum uino, aduersus uenenatos serpentium morsus bibitur. Ad stomachi quoq; rofiones, dysenteriam, & urinæ difficultatem, bis

ἐκόςδαιμον

K iij

D I O S C O R I D I S

Cnis drachmis cum hydromelite. Crassamen purulentum peſtore expel-
lit. Facit aridæ farina ad ueterem tuſſim, rupta, conuulſa, ſi cum naſtur-
cio, melle, & reſina miſceatur in eclegmate. Inſtammata modice præcor-
dia cærato excepta, recreat. Cum aceto acri, aut aqua, podagris conueni-
enter illinitur. Menſes impoſita mouet. Vulnera conglutinat. Vetera ul-
cera purgat, & ex melle ad cicatricem perducit. Sicca excreſcentias in car-
ne cohibet. Succus ad eadem uitia bibitur. Inter prima efficax Ponticum
natione, Creticumq;

Pli. li. 25. ca. 6.
26. cap. 8.

B A R B A R I C O R O L L.

Scordion, item Scordotis Mithridati aſcripta eſt: cuius depictâ manu Crateias medicus ui-
dit, magnitudine cubitali, ramofam, folijs lanuginofis. Reperitur in Ponto, campis humidis,
pinguibus. Eſt & alterius generis latioribus folijs, Mēthaſtro ſimilis. Alia eſt a Mithridate ſimi-
liter inuenta, quam Mithridation uocant. Huic folia inquit Plinius, duo a radice Acantho ſi-
milia, caulis inter utraq; ſuſtinens roſeum florem. Hanc ipſam puto eſt, quâ idem Plinius Cha-
mæropa uocauit libro ſexto & uigeſimo, iſs uerbis. Eoſdem inquit effectus habet, lateris do-
loribus Chamærops, myrteis circa caulem geminis folijs, capitibus græculæ Roſæ.

V E R G.

Habet certas, & cum ſcriptore hoc cunctis alijs eaſdem, quibus inueniri & inuenta cogno-
di poſſit paluſtris Trixago notas: odorē, qui illiberalis, nec Allio abſimilis illi eſt: & poſt
odorem ſerratam foliorum formam: quibus primo & per ſe dictam totam Trixaginem reſert.
Habet & quæ numeratæ a Dioſcoride non ſunt, in ſummis caulibus roſeos flores, & in quibus
uariet antiquis ſcriptores proprios & natales eius locos: cenſente hoc in mōtanis, Plinio aut-
em in campeſtribus naſci herbam. Cuius ob diuerſas, multasq; has notas plura fuerunt quon-
dam nomina. Scordion, quæ uox ab Allijs facta illi eſt: cuius odore ſentitur. Scordon enim
Græci Allium uocant. Quo etiam Scordotis pertinet a Plinio dicta, & ab hoc Dyſſolmon ma-
li & ingrati odoris ſenſum indicans. Quemadmodum agreſtis Nepeta, a Plinio autem Men-
thaſtrum dicta, generis nota magis q̃ appellatio alia eſt. Siquidem Plinius. 25. uolumine capi-
te. 6. ait. Eſt & alterius generis latioribus folijs Menthafro ſimilis. Ex quo factū eſt, ut quæ di-
uerſi generis nota quondam fuit, inter appellationes ab imperitis numerata fuerit. Vt autem
Trixago appellaretur, ſimilitudo fecit, & Mithridanes Ponti rex, medicinæ tantopere fauens:
ut inuentionē eius Crateias herbarius illi adſcripſerit. Habet poſt omnes paluſtris Trixago Ro-
mana uox, certam ex ſuperioribus cauſſam. Trixagini em̃ ſimilis eodem nomine dicta eſt. Palu-
ſtris uero, quoniā ut Plinius, & hic dixerunt, humentibus locis naſcitur. Cōueniuntq; in hoc
omnes, diſcrepant autē in reliquis. Hic enim ὀφρύνος, id eſt, montanis, Plinius campis humidis,
pinguibusq; naſci dixerunt: nō leui diſcrimine, inter campeſtre, & montanū terreni genus. No-
bis in Plinij ſententiā magis inclināt animus. Vidimus em̃ in incilis margine campeſtri agro na-
tam rubēte roſaceo flore, certiffimo Alliorū odoris ſenſu. Multi in medicina uſus paluſtris Tri-
xago hæc quondā fuit. Noſq; inter cætera diximus, purgare quæ in peſtore hæſerunt, craſſa
purulenta. Non purulentas exſcreationes illas intelligentes, quas Græci empyemata noiant,
ſed pituitā, craſſoſq; humores qui frigore, gelicidiorq; aliquo in peſtore puris modo albeſcen-
tes concreuerint. Id enim ſignificare nobis uidetur πύξις πύξις.

D

De Tuſſilagine. C A P. CXXIII.

πύξις

Bechion Græci, quidam Richion, alijs Petrinam uocant, alijs Pega-
ton, alijs Pithion, alijs Pagonaton, alijs Chamæleucen, alijs Proche-
ton, alijs Arcophyton, alijs Chamægiron, Aegyptij Saarthan, Latini
Tuſſilaginem, quidam Pharphariam, aut Puſtulinem, Beſſi Aſa.
Folia ei ſunt maiuſcula q̃ Hedere, ſex, aut ſeptem a radice, ſubalbida a
terra, ſuperne uiuentia, in plures angulos exeuntia. Caulis palmum altus,
flos luteus. In uere flore & caule confeſtim exiuitur. Inde nonnulli his
uacare exiſtimauerunt. Radix tenuis eſt & ſuperuacua. Naſcitur in a-

moenis & riguis. Folia ex melle trita igni sacro, & omnibus inflammacionibus illitu medetur. Aridae fumus per infundibulum hianti ore raptus, hos sanat qui sicca tussi, atq; orthopncea infestantur. Pectoris uomicas rumpit. Eundem effectum præbet suffita radix. Decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus eijcit.

BARBARI COROLL.

Bechion, siue Bechicon, duo habet genera. Sylvestris ubi nascitur, subesse aquas credunt. Et hoc habent signum aquilegi. Describitq; hanc Plinius aliter, q̃ Dioſcorides, folia eius tradendo superne pallida, subalbida a terra, sine caule, sine flore, sine semine. Altera a quibusdam Salvia dicitur, similis Verbasco. Hanc a Dioſcoride Verbascum sylvestre dici puto, ita scribente. Habetur inquit & Verbascum sylvestre altum, uirgis arboreis, folio Salviae, orbibus uirgas cingentibus, ut Marrubium, floris lutei, fulgore auri. Quidam priorem Arcion, & alio nomine Chamæleuce, quam nostri Farfugium uocant, folio Populi, sed ampliore, nascens iuxta fluuios: unde Populago dicta sit a nostris. Hanc & Farfariam uocari Dioſcorides testis est, a fluuiio fortasse Farfaro, quem Virgilius Farbarim appellat. In Sabinis Plautus, Dissipabo inquit te ut folia Farfari.

Pli. li. 16. ca. 6.

Itemq; in Penulo.

Prosternebam inquit eos, ut folia Farfari.

EX M. VERG. COMM.

Haec est Tussilago illa, quam hic in totius operis proëmio dixerat, falso credidisse quosdam, nec caulem, nec florem, nec semen ferre: & quam ignorantia eorum causam tunc reliquerat, legendam uolentibus hoc loco tradidit: ferre quidem illa aliarum plantarum modo restatus: sed tam brevis uitæ cuncta esse, ut obseruari facile non potuerint: quodq; obseruatum non fuerat, negatum naturæ imprudenter fuisse. Quæ si ad Hypanim fluuium, qui ab Europæ parte in Pontum influit, in animalium censu bestiolas genuit, quæ unum diem uiuunt: in plantis multo facilius eandem potuit ostendere fortunam: herbasq; aliquas esse, quæ pro loco caule statim decaulescerent, & pendente se flore deflorescerent. Qualis Tussilago hæc est, a Græcis Bechion ideo dicta, q̃ tussi & tussientibus medetur: non omnibus, sed his qui tantum tussiant, nihil autem pituitosi excrementi simul extussiant. Quod genus hic, siccam tussim dixit: Plinius ueterem nominauit. Ex quo factum est, ut Plinij uerba exscribens in Dioſcoride Barbarus, quod *ἐξ ὧν βήχας*, id est, siccam, siue aridam tussim hic dixit, ueterem ille dixerit. Sic autem sicca & uetus tussis eadem, an inter se discrepent, medici censebunt.

B.

De Artemisia.

CAP. CXXV.

ARTEMISIA RAMOSA, Græcis quibusdā Monocloſanos, alijs Toxitesia, alijs Ephesia, alijs Anaſtorios, alijs Sozusa, alijs Lycophryx, Magis hominis Sanguis, alijs Crysanthemom, Romanis Hærbæ regia, aut Artemisia, alijs Rapium, aut Tertana, Gallis Pona, Dacis Zuoste dicitur. Magna ex parte in maritimis nascitur. Absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus folijs, ramisq;. Tenuior autem flore est paruo, tenui, candido, graue olente. Aestate floret. Sunt qui in mediterraneis Vnicaulis nomine appellent, tenuem hærbulam, simplici caule & minuto, floribus scatente, flauo colore. Hæc iucundiorẽ q̃ præcedens efflat odorem. Vtraq; excalfacit, extenuat. Feruefactæ conuenienter in muliebres defessus adiiciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq;. Item ad præclusioſnes uulua, & eiusdem inflammationes. Calculos comminuunt. Remorataſ urinam cient. Menses pellunt publi illita, Succus uulua in

ἐξ ὧν βήχας
Germanice βήχας.

D I O S C O R I D I S

Cditus ex Myrrha eadem quæ incessio trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

B A R B A R I C O R O L L.
 Pli. li. 25. ca. 7. & decimo. **A**rtemisiam, & Lachanôn Basilicon, hoc est, olus Regium nonnulli uocant. Dictam putant ab Artemisia uxore Mausoli: quæ sibi hanc herbam adoptauerit, cum antea Parthenis uocaretur. Sunt qui ab Artemide cognominatâ putent: quoniam priuatim medicatur foeminarum malis: quibus Artemis, hoc est, Diana præsit. Secundo generi teneritudine tribuunt, non nisi in maritimis nascenti. Tertiò minima folia florenti, cum uua maturefcit: quod quidam Botryn, alij Ambrosiam uocari tradunt: qualis in Cappadocia proueniat.

E X M. V E R G. C O M M.
In multo nominum ambitu & honore quondam Artemisia fuit, Parthenis, id est, uirginis primo dicta, quæ uirgo Dea scilicet nomen illi dederit. Mox βασιλικὸν λικάνον, id est, regium olus. Tum ex eadem causa, Anaclonium. Anaclasis enim Græci uocant. Ephesia a regione dicta eadem est. Quemadmodum a præsentis remedio & ope, Sozusa, id est, salutaris. Romani Regiam herbam Græcorum exemplo: & si recipiendum id sit a similitudine, Serpyllum maius dixerunt. Et hæc antiquioribus Artemisiam nomenclatura fuit. Ex posterioribus alij in Cannabibus genere Artemisiam numerauerunt: congenerem illi facientes, & eodem illi nomine eam indicantes. Alij Matricariam, notum omnibus olus esse Artemisiam testati sunt. Quod non aliunde, ut credimus, quæ ex duplici eius genere factum est. Quæ enim ab hoc scriptore Monoclonos, a Plinio aut simplicis caulis nominatur, non dissimili penitus figura, præsertimque ob singularem, quæ profert caule, a Cannabe describitur. Quæ contra Absinthij modo fruticosa ab hoc, & ab alijs traditur, facile ob quas habet uires ad nostri orbis, & nostræ ætatis Matricariam transferri potuit. Quod & si Græcorum de Artemisia historiae oïno non respondeat, nec certo aliquo auctore confirmari possit, non reiiciendum tamē penitus est. Egregia enim in mulieribus. Dico autē nunc muliebria, quæ Græci γυναικία uocant. Longius in Acoro a nobis tractata Artemisiam uis est. Credendumque, non aliunde quæ a matricibus posteriori Matricariæ nomē fecisse posteriores.

D **De Artemisia tenuiore.** **C A P. CXXVI.**
Altera tenuioribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarum ductus nascitur. Cuius flores & folia contrita, Sampsiaci odorem reddunt. Si quis stomacho laboret, hærbam cum amygdalino oleo bene contundat, in malagmatis lentorem, & stomacho imponat, sanitati restituetur. Qui neruorum dolore cruciantur, si succum ex rosaceo illinant, sanantur.

B A R B A R I C O R O L L.
In quibusdam exemplaribus Artemisiam hanc multis nominibus inuenias. Toxicisiam, Ephesiam. Parthenicon, Hypolysson, Anaclonium, Sozusan, Lian, Leucophryca. Prophetæ Sanguinem hominis, Romani Valentiam, nonnulli Persepollentem, alij Herbam regiam, Galii Ponem, Daci Zonustem.

E X M. V E R G. C O M M.
Desyderatur, sed sine iactura aliqua, in uetustissimis Græcorum, latinorumque codicibus hoc caput. Accreuisseque huic scriptori inuuliter multa indicat. Phrasis primū, sermonisque forma: quæ in Græcis a scriptoris huius indole longe absunt. Mox nulla eorum quæ in eo iubent, necessitate.

De Ambrosia. **C A P. CXXVII.**
Ambrosia, quam Romani Caprum syluaticum uocant, quidam Botryn, alij Apium rusticum, Aegyptij Merseon. Tenuis frutex est, ramosus, trium fere palmorum, folijs Rutæ, circa imum caulem exiguis. Cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, nunquam flores pariunt. Odore uinoso, suauis. Radice tenui, sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius, reprimere ac repellere, et illitu adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

AMBROSIA, uagi herba nominis, & circa alias quoque fluctuans. Athenienses in dedicatione Iouis Ctesti, Ambrosiam in cado ferendam iubebant. Non herbam intelligentes eo nomine, sed ut Athenæus inquit, fruges omnijugas, et oleum, & latices.

EX M. VERG. COMM.

Non inter herbas aliquas fluctuans & uagum nomen tantum quondam Ambrosiæ fuit, sed quodcumque odoris, aut cibi suauitate placeret in poetis scriptoribusque alijs, eodem hoc nomine ab antiquis dicebatur, & quasi immortalitatem utentibus faceret, sic appellata illis fuit. Frequens & notum ubique nomen, ignota tamen res, & inter herbas non facilis inuentu: alijs aliter eam ostendentibus, & cum Artemisia miscentibus fere cunctis. Audent tamē nostræ ætatis herbarij eam ostendere, trium dodrantum altitudine, & altiore aliquando herbam, ut hic ait, ramosam, semine per totum caulem racemoso, sed longe maioribus quam Rutæ folijs: & quod hic ait, nunc florentibus racemis, lanuginosis, papposisque, nullo nec uini, nec alterius rei odore. Quo fit, ut in peregrina Italiæ, ut nos credimus, herba nihil pro comperto constituere audeamus. Plinius. 27. uolumine capite. 4. integrum scriptoris huius caput commentationibus suis inseruit: cum tamen non multo antea libro. 25. capite septimo de Artemisia agens, dixisset. Sunt qui in mediterraneis eodem Artemisiæ nomine uocant simpliciter caule, minimis folijs, odore non iniocundo, quam quidam Botryn, alij Ambrosiam uocant. Ex quo manifeste deprehenditur, quod paulo ante diximus, uagum per multa Ambrosiæ nomen esse plantas, cibos, & pocula: eo usque, ut Athenienses hoc nomine omnigenas fruges, oleum, uinum, laticesque alios, quos Djs in ara offerrent, Ambrosiam nominarent. Nobis inclinatur animus, ut peregrinam nostrum orbi, peculiariter Cappadociæ herbam existimemus: nam quæ a nostris herbarijs hoc nomine ostenditur, uulgaris, & ubique nascens, inuentu facillima est, præsertimque ex capitulorum racemis, quos habet pappi plenos, nuncque a nobis florere uisos.

De Botrye.

CAP. CXXVIII.

BOTRYS fruticosa hæba est, lutea tota, & in multas alas sparsa. Semen circa ramulos prouenit. Folia Cicorio similia. Tota suauem odorem spirat. Quare uestimentis interponitur. Inuenitur in torrentium ripis. Pota Orthopnoceas mulcet. Hanc Cappadoces Ambrosiam uocant, alij Artemisiam.

BARBARI COROLL.

Botryn Cappadoces & Ambrosiam uocant. Alij Artemisiam.

EX M. VERG. COMM.

Totidem, hysdemque uerbis genti suæ quondam Plinius cognoscendam Botryn tradidit, quos quibusque antea grecis Diosco. eam descripserat. Verba eius sunt. Botrys fruticosa herba est, luteis ramulis. Semen circa totam nascitur. Folia Cicorio similia. Inuenitur in torrentium ripis. Medetur Orthopnoicis. Hoc Cappadoces Ambrosiam uocant: alij Artemisiam. Quæ collata Diosco. eandem in utroque medicinæ & historiam faciunt. Posteriores etiam Græcorum medici, qualis Paulus Aegineta est, nihil ab hoc scriptore traditis addiderunt. Eius uerba sunt lib. 6. Botrys ὅς ἐστι ἀμύρσιον ὅς ἐστι ἀρτεμισίαν φυτόν ἐστιν ἐν ὁδῶν ἱκανῶς. εὖν δὲ καὶ γόνυ πρὸς τὸν ὁρσπονοικόν ἀφελεί. Quod est. Botrys, quam aliqui Ambrosiam, aliqui Artemisiam dicunt, planta est ualde odorata. Hæc cum uino pota, orthopnoicis medetur. Sunt de Botry hac totidem, & eadē a cunctis dicta: nec nos habemus, quod eorum decretis & historiæ addamus.

De Geranio.

CAP. CXXIX.

GERANION aliqui Peloniten, alij Trica, alij Geranogeronta, Romani Vchinastrum, Aphri Lescen appellant. Folijs Fremij, diuisuris longioribus, radice rotunda, dulci. Quæ drachmæ pondere in uino pota, uulnæ inflationes discutit.

BARBARI COROLL.

Geranion, & Myrtidō uocatur Genus primum. Geranion uera creditur a quibusdam, sed & secundum utique, si descriptionem græcorum sequare, non latinorum: ut mox docemus.

A
Pli. li. 27. ca. 4.
& 25. ca. 13.

Botrys

B

γεράνιον

D I O S C O R I D I S

C

De altero Geranio.

CAP. CXXX.

Geranium alterum, aliqui Myrrhin, alij Oxyphyllon, alij Cardamomum, alij Origanum uocant, Magi Hierobryncas, Latini Gruinam, aut Pulmoniam, aut Cicotriam. Caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus, folijs maluae. In summis alijs sursum spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina usus.

Pl. li. 16. ca. 11.

GERANION secundum medicis inutile, aliter a Graecis, aliter a latinis describitur. Dioscorides & omnino Graeci, folijs paulo candidioribus q̃ Maluae, ramofum ex interuallis. Hanc ego aut eandem, aut omnino similem esse uideo cum ea, quam Galliae transalpinae uulneribus & fistulis in potum commendant, & herbam Robertianam cognominant, coliculis rubentibus, flore paruo, subpurpureoq̃, ac ceteris notis omnibus: quae hoc loco a Dioscoride Geranio redduntur, etiam si ab eo medicinae aliena existimetur. Quid em̃ prohibet, ignoratas eius uires fuisse olim? Nostri, ut inquit Plinius, Geranion ostendunt Cicuta folijs minoribus, & caule breuius, rotundo, saporis & odoris iocundi. Verum haec proprie Geranion non est, sed Myrrhis: de qua post agemus: confusione orta, q̃ Geranion a quibusdam Myrrhis etiam dicatur: unde natum & illud sit, ut Geranion in latino Cicutaria nomen habeat: cum aliqui Cicutariae proprie Myrrhis esse uideatur.

E X M. V E R G. C O M M.

D

GERANION haec est, in qua Gruini capitis imaginem in summo eius plantae capitulo contemplant Graeci, nulla similitudine aptius rem indicare potuerunt. Vidimus nos altera Geranion, paucis statim a radice prodeuntibus Maluae folijs, ut hic describit. Tum nudo surgente caule, dimidij cubiti altitudine: crassoq̃ in caulis illius cacumine, folioso inuolucro tumentē, ex quo per longitudinem ex altero latere dimidiati digiti longitudine acutus procedebat apex. Erantq̃ in folliculo illo cum uiridi colores alij plures, praesertimq̃ cinereus: tam praesenti rotius colli, capitisq̃, & rostri Gruini imagine, ut aptiore pictura ostēdi a peritissimo pictore animalis eius tota ea pars non potuisset. Alteram, quae Cicuta folijs est, ipsi non uidimus. Obseruauimus tamen in antiquis scriptoribus, Plinioq̃ praesertim, utriusq̃ huius herbae misceri historiam. Nec satis cognosci in eo posse, Gruino ne collo et capite utraq̃ sit, an altera tantū. Id certe ex Dioscoride collegisse facile est, Cicuta folijs altera earum esse: ideoq̃ Cicutariam dici, & Myrrhida: quonia & Myrrhis Cicuta folio sit: quemadmodū hic quarto uolumine docebit. Cur autem priorem Romani Echinasrum dixerint, non satis pro comperto nobis est. Quemadmodū in altera per se patent Cicutaria & Gruina ex foliorum & Gruini capituli forma factae appellationes. Longissime de utraq̃ Plinius uolumine. 26. capite. 12. agit. Poteruntq̃ in eo uolentes uidere, quam nos paulo ante diximus, utriusq̃ Geranij historia uarietatem.

γναφάλιον

De Gnaphalio.

CAP. CXXXI.

GNAPHALION, alij Hires, alij Ampetocon, alij Anaxiton, alij Anaphalin, Aegyptij Semeon, Galli Gelasonen, Latini Centunculum uocant, quidam Tucularem, alij Albinum. Cuius folijs mollibus minutisq̃ pro tomento utuntur. Bibuntur efficaciter folia in uino austero ad dysenteriam.

Pl. li. 27. ca. 10.

GNAPHALION, alij Chamazelon uocant. Gnaphalio porro dicitur, quasi herba fulloniae, siue Tomenticia. Quemadmodū & piscis quidam Gnapheus, hoc est, fullo dictus est, quonia oēs maculas decoctū eius eluat. Hanc uto esse, quae ab Alceo poeta Gnaphos appellatur: aut eam quae Hippophanes nomen habet. Nam & illa fullonibus est propria. Est apud Aristotē & auis dicta Gnaphalus, quā miror a Theodoro praetermissam, imo uero cum altera, quae uocatur Helea confusam ab ipso. Tomentū a nostris dici quidā putant Gnaphalio. Tomentū certe in Plinij codicibus impressis legitur, Tomentū in scriptis manu: qui tamen non Lomentū dici,

sed pro lomento esse scribit; quod & Dioscorides quoque affirmat. Etenim Creta, qua füllones in albandis & poliendis uestibus utuntur, Lomentum a nostris, Gnaphalion & Gnaphalis græce dicitur: ut in Ceruleo notauimus ex Plinij sententia. Sed & fabacea farina Lomentum est: quod Aetius Fabam nominat quandoque. Ego Tomentum potius quam lomentum dixerim hoc loco, ut tamen sciamus, Gnaphalion utrumque uideri significare, tam Lomentum, quam Tomētum. Addu cor eo, quod Dioscorides Centunculum uocari hanc Romæ, prodat. Est autem Centonibus cum Tomento maxima cognatio. Nam & folia Dictamni, quod mollia esse uideantur, tomentitia, & lanea dicuntur a Dioscoride, hoc est, Gnaphalide. Sed & pars Cucurbitæ interior, quæ semen complectitur, ab Aetio Gnaphalides esse dicitur, ob candorem cum mollicia.

VERISIMILE EST, rusticā plebem diu hac usam fuisse: quemadmodum & adhuc in Alpibus, ubi frondium copia est, fieri passim uidemus. Græci enim γνάφαλον inter cætera Tomentum uocant. Est autem laniis Tomentum omne id, quo culcitæ ad molliorem & calidiorem quietem infarciantur: siue id lana sit, siue pluma, siue quod uoluerit aliquis excipiedis mollior & fouedis calore corporibus nostris aptum. Sic Suetonius, sic in re latina plures alij indicauerunt, Græci etiā, ut hic ipse in Dictamno dixit, γνάφαλον quasi Tomentitia huiusmodi omnia appellant. Quam ob causam nos Tomentum herbam diximus: & præter Tomentum, autore hoc ipso, Centunculum. Et diuersum quadamtenus usum Centones, & Tomenta habent. Vulgaris herba hæc est, candicans semper, præsertimque in maturitate. Folia eius non adeo magna sunt. Flores minimi, & ipsi albescetes. Cum creuit, sternitur per terrā. Nascitur pingui solo, præsertimque in marginibus itinerum, in hortis, & inter uites. Nullus nostra ætate usus eius est: nec quicquam in herbarum censu uilius modo, & neglectus uiret, & cum aruit minus cognoscitur.

De Typha. CAP. CXXXII.

TYpha folium ædit Cyperidi simile, caulem album, leuem, æquabilem, florem in cacumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod lanuginē aliqui nominant. Huius herbe flos, suillo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

BARBARI COROLL.

Differre Typham a Tiphā, quæ frumenti genus est, & per litteram iota scribitur, existimo: sine geniculis, scilicet modo nascens, radicibus multis, ut triticum ordeumque, folliculo multiplici, culmo simplici, leuissima frumentorum, solo etiam gracili facile proueniens, tritico persimilis ut Zea. Pistam ferunt, qui mutari uolunt in triticum, idque anno demum tertio procedit. Theophrastus sine folio gigni Tiphē uocatam prodidit, Orchomenium circa lacum, parte radii proxima, esu præcipue pueris tenera. Idem, an diuersum genus faciat cum prædictis, æstimandum relinquo.

EX M. VERG. COMM.

Palustrem esse plantam Typham, satis unus testari posse uidebatur Plutarchus cap. 2. de naturalibus causis, inter plerasque alias palustres his uerbis eam numerans. ἀλλὰ ἔλαθε τὸν λαΐτον ὅτι καὶ τὰ λιμναῖα φυτὰ τύφη καὶ φλίω καὶ θρύον ἀναυγὴ καὶ ἀβλαστὴ μῖνει. Quærebat enim, cur coelestibus aquis magis quam profluentibus proficerent ad generationem & incrementum semina. Disputantque contra laicum quendam, qui diceret, cadentibus pluuijs aperiri terram: pulsusque illo apertam citius ad radices per se aquam transmittere. Contraria ratione a palustribus his plantis ratiocinabatur, ad quarum radices non transit aperta terra hymber. Numerabatque eas quas paulo ante diximus. Esse autem palustrem, & præter id caulem habere enodem Theophrastus indicat: qui primo uolumine de plantarum historia, de fruticoso & sarmentoso genere docens, & quales in caulibus ramulisque suis differentias hoc genus habet, totam his uerbis rem docuit. περὶ δὲ τὰ φρυγανιὰ καὶ θαμνώδη καὶ ὅλας τὰ κλύματα καὶ ἄλλας τίς ἂν λαβοῖ διαφοράς. ὁ μὲν γὰρ κάλαμος γονατώδης ὁ δὲ βάτος καὶ ὁ παλινύρος ἀκανθώδης. ἡ δὲ τύφη καὶ ἕνθα τῶν ἑλίων ἢ λιμναίων ὁ μείζων ἢ ἀσφρακτα, καὶ ὁμαλὴ καθάπερ χρίνος. Quorum sensus hic sit. In furculosis autem & fruticosis, in uniuersumque Viticulis alias constituere differentias aliquis poterit. Harundo enim geniculata, rubus, & paliurus aculeati. Typha autem, & aquaticorum palustriumque aliqua nullo intercedente nodo qui partes dissepiat, per totum æqualia sunt: qualis luncus est. Folia postremo an-

D I O S C O R I D I S

C guloso, odorato Iunco similia hic fecit, qualia ea etiā sunt, Intelligitq; in Iūcorū gñe Cyperū, de quo primo uolumine lōgius actum est. Quem gñe foeminino Cyperida hoc loco uocauit, qm̄ eo nomine radix eius appellatur; ut in cōmentationibus nostris r̄u longius dictū fuit. Non aliā ob causā, nisi quia radicis eius tm̄ usus est. Et quemadmodum latini Iunci radicem plantam uocant, sic gr̄ci Cyperida ex radice genere foeminino Iuncum ipsum aliqui nominauerūt.

¶ De Circaea. CAP. CXXXIII.

Circaea, quam & Dircaeam aliqui uocant, folijs est hortensis Solani. Agnatis crebris, flore nigro, pusillo, copioso. Semine Mili nāscente in quibusdam corniculis. Dodrantali radice, triplici ferme, aut quadruplici, candida, odorata, excalfaciente. Nascitur in apricis, saxis & uento perflatis. Radicis tusc̄ triens, in sextarijs tribus uini dulcis, per diem & noctem maceratur, potuq; triduo uulūas expurgat. Semē forbitionibus datum, lacte mammas nutricum explet.

BARBARI COROLL.

Circaeam a Circe dictam, nonnulli uerisimile putant. Quēsitum est autem a nobis, quid esset apud Columellam Circea. Nunquid pro Circea deprauatus esset locus: Respōdi, non Circeā, sed Cymam legendum.

EX. M. VERG. COMM.

D Vnt in gr̄cis qui neutro genere Circeon hanc uocent, notam, ut ex commentarijs eorum ratiocinari licet, tunc omnibus herbam. Nunc quod uiderim, nulli nisi in ueterū Plinijq; pr̄sertim commentarijs auditam: qui uolumine. 27. capite. s. non ijsdem omnibus cū scriptore hoc in historia notis, neq; in medicina obseruationibus eam descripsit.

¶ De Oenanthē. CAP. CXXXIIII.

Oenanthē, quam aliq; Cerascomiō, aliq; Leucanthon uocitant. Folia habet Pastinacae, florem candidum, caulem crassum, palmi altitudine. Semen Atriplicis. Radicem magnam, in multa rotunda capitula extuberantem. Nascitur in petris. Caulis eius & folia, cū melle & uino pota, secundas eiciunt. Radix e uino urinae stillicidio conuenit.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 12. ca. 29
lib. 21. cap. 24.

Oenanthē a Theodoro Viriflora dicitur, post Narcissum uere floret. Plurimum durat, si diuulsa crebro prohibeatur sementescere. Flos ei candidus in racemis, ut Labrusca: odore germinantis uuae, unde nomen. Nascitur locis tepidis, obseritur semine. Habetur & altera Oenanthē, inter uites dicenda.

EX. M. VERG. COMM.

Alia haec Oenanthē est ab ea de qua quinto uolumine agetur. Illa in uitium genere Labruscae flos est: haec in herbarum censu a Theophrasto inter coronarias plantas & flores, qui secundi per uer florent numeratur. Illa primo & per se Oenanthē est, uinum & florem ipso nomine indicans. Haec, ut fit, deficientibus proprijs, indicationem & nomen floris & odoris sui similitudine ab illa facile impetrauit. Nec ideo Oenanthē dicta est, quia Labruscae flos fit, sed q; candidus illi flos, racemi ut in Labrusca specie fit: & pr̄ter racemosum florem illum, odor qualis in pubescente uite floreque eius sentitur. Amat haec tepidiora loca. Quondamq; ad coronas in hortis etiam ferebatur: in quibus non tantum odore, sed longiore florum suorum uita placebat. Hanc Dioscorides ait Cerascomen uocari: qua uoce Staphylinum, id est, Pastinacam a quibusdam nominari dixerat: cui quoniam haec folio similis est, ideo & nomine illius etiam indicabatur. Quid autem Cerascome significet, in Staphylino & Pastinaca quaerendum est. Eandem Leucanthum uocari hic ait, manifesta a florum candore significatione. Neque enim alia eius uocis uis est. Quae deinde hic dixit, habere Oenanthem hanc in radicibus numerosa & rotunda capita, tubera sunt, & ueluti tumores quibus ea inaequaliter tumet. Plinius ad radicū copiam id retulit: radice magna, numerosa dicēs: cū tm̄ gr̄adi radice hic Oenanthē dicat, et in radice illa multis rotundis capitibus, quae ad radicū copiosiores numerū, referri posse non uidentur.

De Conyza magna. CAP. CXXXV.

Conyza magna ab aliquibus Cynozematitis, alijs Danaïs, alijs Tanachion, aliquibus Phycos, alijs Ichis, alijs Dinofmos, Magis Brephoctonos, quibusdam Anubias, nonnullis Hedemias, Aegyptijs Creti, Romanis Militaris, aut Deliarium, aut Febrifuga, alijs Fraginsa nuncupatur.

BARBARI COROLL.

Conyza, quæ nostris Cunilago dicitur, et Plinio Cunila quandoque libro decimo, & a Theodoro Pulicaris, quia pulices necat. Folio coronat, & maior & minor appellata. Maior dicitur esse mascula, folio aspero, pinguiore quam minoris, et imbricato, torosiore caule, magisque ramoso, radice lignosa: quæ a quibusdam ut herba quoque ipsa, Libanotis dicitur, autore Plinio. Manipulo eius abiectione, omnes etiam a tota domo blattæ conveniunt ad eam. Vtrumque genus serotinum, ut quod post arcturum germen, floremque mittat. In summa Cunilaginis appellatione, quatuor herbae veniunt: mascula, et foemina. Et quæ tertio loco ponitur foedissimi inter omnes odoris. Quarta reddit Plinius: quæ appellatur sativa Serpyllo similis, et Cunilagine morana facta. Est & quinta eius species Hippoc, ut dicitur paulopost. Cunilago dicitur et ipsum Ligusticum ab aliquibus, sed falso. At Cunilæ tria sunt genera siue nomina. Capitata et nostratæ, quæ Satureia sit, vocamus Gallinaceam quæ Origanum, Heracleoticum: Bubula, quæ quæadmodum a Græcis dicitur, aliud non copiam, quam quæ eam Plinius per Origanum accipere multis locis videtur, in qua significatione vocabulo eo et nos uti sumus.

A

κόνυς μέγα

Pli. li. 21. ca. 10
lib. 26. cap. 15.

De Conyza parva. CAP. CXXXVI.

Conyzæ duo genera. Quæ parva vocatur, odore præstantior est. Maior uero frutice altior, & folijs latioribus, graui odore. Vtriusque folia Oliuæ similia, hirsuta, pinguis. In maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur. In minore pedem æquat. Flos squalidus, lutei, aut fului coloris. Quin in pappum abit. Radices superuacue. Suffitu, substratuque frutex animalia fugat. Culices abigit, & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac uulneribus. Flos cum uino ad menses partusque efficiendos bibitur. Item contra urinæ stillicidia, arquat morbum, & tormina. Comitiales potus ex aceto adiuuat. Decoctum in deflectionibus medetur uulnæ malis. Impositus succus abortum facit. Ex oleo efficaciter rigoribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat.

BARBARI COROLL.

Conyza minor eadem foemina, Hippocrati Cunilago semper mollis vocatur. Folia huius trita, mellis odorem habent, digitis tactu coherentibus. Hanc Dioscorides Libanotidem appellat, cum Plinius masculam ita nominet. Pilosiora minori folia & rami: qui & aculeati sunt. Flos squalidior, odore acriore, qui tamen grauior sit masculæ.

κόνυς μικρά

B

Pli. li. 21. ca. 10
lib. 26. cap. 15.

De Altera Conyza. CAP. CXXXVII.

Est & tertium Conyzae genus, quod aliqui Paruam, alijs Panion, alijs Libanotidem. Magi Cronon uocant. Caule crassiore, ac molliore. Folijs quam Paruæ maiusculis, minime pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & iniucundioris, sed inefficacior. Prouenit locis non riguis.

BARBARI COROLL.

Hippocrates Cunilaginem, siue Conyzam, præter supradictas, aliam describit. Apio crispo similem: in maritimis, sabulosisque nascentem, odoris teterrimi, & maxime fastidienti: quam cum

L ij

D I O S C O R I D I S

Cum melle atq; uino foeminarum locis, quæ fortum non recipiant, admoueri præcipit, libro de muliebribus causis secundo.

E X M. V E R G. C O M M.

Confundit, miscetq; Plinius pluribus locis cum Origano Conyzam. Nec facile est eodem nomine duas diuersasq; plâtas ab eo sepius appellatas, in historiæ medicinq; gratiam & usum secernere. Longior fuerim, si omnia quæ tam multis locis de Conyza, Cunilagine, & Cunila ab eo dicta sunt, coaceruare hoc loco cogitem. Superuacaneum id etiam fuerit, qm signanda non multo post & repetenda a nobis omnia, aut plura saltē ex illis erunt. Aliud itaq; prius agemus, & ut nouerint omnes, non esse Conyzam Origano eandem, neq; ediuerso utriusq; proprias numerabimus notās: ut propositis his, quæ a Plinio miscentur certius pateant. Incipimus autem ab Origano, quam hic ait folium Hyssopo simile habere, umbellā non comosam, uerum diuisam, & in summis uirgis semen. Et quod ad alia Origani genera pertineat Onerida candidioribus folijs, sed magis Hyssopo similibus esse: semine uero corymborum mō: & quā agrestem Origanum dicunt, folia priori Origano similia habere: uirgas dodrantes, in quibus Anethi modo umbellæ sint, & candidi flores. Et hæc omnium Origanorum in hoc scriptore notæ sunt. Conyza uero, quas paulo ante diximus folium oleaginum, non Hyssopi, hirsutum, pingueq; caules bicubitales: flores lutei, fragiles, subamari, & qui in pappos euolent. Quorū nihil habet Origanus aliqua. Plinius autem lib. 19. cap. 7. autore herbario Crætea, Ligusticum primo seu Panaces Cunilam bubulam uocari tradit; ceteros hanc Conyzam græce appellare, & ab eodem Cunilaginem dici. Idem non multo post uolumine. 20. cap. 15. Cunilæ præter satiuam plura sunt in medicina genera. Quæ Bubula appellatur, semen Pulegij habet: utile ad uulnē cōmanducatum, impositumq; ut quinto post die soluatur. Contra serpentes quoq; in uulno bibitur, ac tritum plagis imponitur. Vulnē ab his facta conficitur. Item testudines cum serpentibus pugnatuæ, hæc se muniunt. Hic ipse Plinius sequenti capite etiam ait. Est alia Cunila appellata a nostris, a græcis Origanum Heracleoticum. Totoq; hoc capite nihil, nisi multiplex Cunila ab eo tractatur: manifesteq; Conyza hæc Cunilæ nomine censetur, cū ait. Pulices etiam contrita cum aqua sparſæ necant. Quod priuatim Conyza habet. Poterant & alia repeti, sed ad eam quam cogitauius rem satis hæc sunt. Nec nobis aliud modo propositum est, q̃ monere ex his quæ paulo ante dicta sunt, toto genere differre inter se Origanum omnem, & Conyzam omnem, Pliniumq; Cunilæ nomine in utraq; passim uti. Omitimus quod primum ille ait. Ligusticum, seu Panaces Cunilam a quibusdam dici. Falsum enim non multo post esse id ipse testatur. Quod autem lib. 20. cap. 15. ab eo dicitur, Cunilæ præter satiuam plura sunt genera, &c. ad Origanum manifeste pertinet: præsertimq; quod de testudinibus cum serpentibus pugnatuæ eo loco tradit: si Plutarcho credimus in naturalibus causis dicenti. ἡ δὲ χιλιὰν φάρμακον τὴν σάρκα τοῦ χυλοῦ ὀρίανον ἵπποβιαι, quod & si idem penitus non sit, eandem tamen rationē habet. Quæ deinde statim ab hoc loco descripta ab eodem sunt. Est & alia Cunila a nostris appellata, a græcis Origanum Heracleoticum, ad Origanū similiter pertinent. Cumq; plura Cunilæ genera fecisset, uni ex his omnia Conyzae huius tribuit. Tamq; uagus in hoc Cunilæ nomine, incertusq; est, ut nihil nos ex decretis eius certum asserre audeamus. Quod autem conijcimus, huiusmodi est. Origanum græci uocant notam omnibus herbā: & ut sit in gentibus, quibus semper & ubique non fuerunt eadem rerum nomina, eandem Conilam uocauerunt. Testisq; hic ipse in Origanis, sed multo certius in Theriacis suis Nicander dicens. κόρχορον ἢ μνῆντα πανάγκειον τιμονίαν, ἢν τι καὶ ἱράκλειον ὀρίανον ἀμφίπουνι. Quorum sensus est. Et corchorū clauso folio, & omnia sanantem Conilam, quam Herculeam Origanum appellant. Nihil autē quorum duorum scriptorum, ut uideretur, certiore fide cōfirmari poterat. Pro compertoq; est, Conilam antiquis græcis Origanum fuisse. Potuitq; Plinius eorum autoritate Origanum Conilam uocare. Nescimus tamen, an Cunilam, quæ si latinis est quæ græcis Conyza, misceri totiens ab eo non debuerat. Suspiciamusq; nos, quod est minimum inter duas has uoces discernimen (una siquidem litera uariant) causam Plinio dedisse, ut diuersas plantas eiusdem Cunilæ nomine totiens misceret: cum tamē Origani græca uox, Conila per, o, latina uero Conyza, modo hæc illi respondeat, per, u, scribenda sit. In græca illa uoce certa omnia sunt: in latina facile est ratio cinari, Cunilam: siue malis Cunilaginē appellare Conyzam hanc, aut illi similem fuisse. Est enim non Plinio tantum, uerum Columellæ, alijq; scriptoribus frequens hæc uox: Pliniusq; priuatim græcorum Conizam Cunilā manifeste appellauit libro decimo, capite. 20. cum ait. Non potest petris auelli polypus. Idem Cunila admota, ab odore protinus resiliit. Acceptum id ab Aristotele est libro quinto de historia animalium his uerbis idem docente.

καὶ οἱ πολὺ ποδὲς ὅν τινος προσέρχονται ὥστε μὴ ἀποσπασθῆναι, ἀλλ' ὑπομένειν ἀποτεμένους. ἴαν δὲ τὸ
 κανὺν προσενέμῃ ὡς φασὶν ἰνδὸς ὀφθαλμοῖς ἀφίσσιν. Quod ab hoc scriptore relictum, alterius au-
 toritate & testimonio addere placuit. Et ut meminissent legentes, non posse Conyzam teterri-
 ni & grauissimi odoris herbam, cum Origanis misceri: neq; si diuersarum gentium uoces for-
 tuito concursu eundem sonum reddant, ideo eandem in illis rerum esse significationem. Fiunt
 enim in græcis & latinis multa huiuscemodi: suum tamen in sua gente intellectum omnes ha-
 bent. Dicimus id, quoniā si latinis Cunila est quæ græcis Conyza, non debuerat uicinitate no-
 minis ad Origanum, quæ Conila græcis est, transferri, & cum illa misceri. Nec dicimus, p cō-
 perto habere, latinam Cunilam græcam Conyzam esse. Verū illud testamur, ex quo tam mul-
 tis ea uox in usu est, in eam partem propensiores esse, & per, u, in principio scribendam: quem
 admodum cum Origanū ostendere uolumus, per, o, illam Cunilā; hanc Conilā dicentes. Pul-
 cariam simpliciter in Aristotele quo diximus loco Conyzam uertit Theodorus gaza; factū ex
 euentu illi hoc nomine, quia, s. pulices enecet; alioquin in nomine nulla est pulicum ratio. No-
 bis Conyzam hanc magis placuit uocare: ut quarto uolumine descriptam, & Psyllion appella-
 tam herbam, certius ex græco nomine Pulicariam appellemus. ψύλλα enim græcis pulex est: &
 ψύλλον herba a pulcibus uocat: q; insectis his similis femina habet parua, nigra, & tota pulicū
 figura. Erit ob eam causam duplex in hoc opere nobis Pulicaria, altera præcedente Conyze no-
 mine signata, altera simpliciter a pulcibus nominata. Quemadmodum tunc etiā iterum a
 nobis dicitur. Habet Conyza hæc pulicaris, quo in græcis modo leguntur, numerosas appel-
 lationes, fereq; omnes incertas: ideoq; non tractandas a nobis, præterq; Dinofmon: quæ uox
 a grauitate odoris illi facta est: & Pissam, quæ pix græcis est, a glutinoso lentore dictam: qd Pli-
 nius significauit dicēs. Trita mellis odorem habet digitis tactu eius coherētibus. Tria eius gña
 Diosc. numerat, maiorem, minoremq; & tertiam inter utraq; mediam: crassiore mollioreq;
 caule: folijs maioribus minore, minoribus uero maiore. Theophrastus alijs nominibus duo
 genera tantum Conyze facit, s. de plantarum historia uolumine, his uerbis. Conyze duo ge-
 nera, mas altera, femina altera. Differentias inter se habent, quemadmodum & alia quæ sic di-
 uiduntur. Femina tenuiore folio, & constrictiore est, in uniuersumq; minor. Mas maior est,
 crassiore caule, ramosior, & folium maius, pinguiusq; habet, & præter hoc florem magis splen-
 dentē. Semen fert utraq;. In uniuersumq; sero germinat & floret. Nec nisi circa, aut post arctū-
 rum. Grauis masculæ odor, feminae acrior. Quam ob causam contra uenenata utilis. Et hæc
 a Theophrasto dicta sic se habent. Quæ cōmentationibus his nostris placuit addere, ut duorū
 scriptorum concors eademq; historia Conyze cognosceretur: & si non iisdem uerbis, neq; eo-
 dem modo ab utroq; omnia dicta fuerint. In Dioscoride autem quod ad floris colorem perti-
 net, qui duplex in cōmuni græcorum lectione legitur, μέλιον ἢ υπόκιρον luteus & subrufus, mu-
 ratum a nobis est: secundamq; illam uocem ὑπόκιρον, quod est, subamarum fecimus, luteum
 & subruffum diuersos colores male coniungi & misceri sentientes: mox monentibus uetustissi-
 mis græcis & latinis codicibus, in quibus amarum adhuc manifeste legitur.

De Lilio syluestri. CAP. CXXXVIII.

Graci Hemerocallen, alij Hemerocalacton, alij Crinon agrī-
 on, alij Crinanthemon, alij Porphyranthes, alij Bulbum hæ-
 maticon, alij Anticantharō, Romani Bulbum, aut Liliū syluestre, aut
 marinum, Aphri Abiblabon uocant. Foliū & caulem habet Lilij, por-
 raceo colore. Flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni ex-
 rumpunt, Lilij diuisura, quoties dehiscere cœperunt. Colore perq; pal-
 lido. Radix magna est atq; bulbosa. Quæ pota, aut cum melle & lana
 in pello apposita, aquam educit et sanguinem. Folia trita, mammarum
 inflammationes a partu contractas, oculorumq; collectiones mitigant.
 Radix & folia igni ambustis utilissime illinuntur.

BARBARI COROLL.

Hemerocalles, Elium a Theodoro dicitur, q; in Dioscoridis exemplaribus deprauatis Eli-
 um marinum dici, a nostris eum florem legisset. Ego Liliū marinum, non Elium in Dioscori-
 L ij

A

B

ημεροκαλλίς

Pli. li. ii. ca. ii.

D I O S C O R I D I S

C de legendum arbitror: nam & græce Crinon a quibusdam, & a nostris Lilium idem auctor uocari tradit. Coronamētis folio tantum dicata hæc est. Pallidum hoc e uiridi, & molle habet, radicem odoratam. Seritur semine. Antiquus grammaticus Theodorus, cognomine Panages, Hemerocalles Athenis dici prodidit, non florem, sed uellus, aut lenniscum puniceum, & uerſi colorem, quo in ſacris utebantur. Dioscorides & hanc & Lilium a ueteribus Crinanthemon uocari tradit. Hippocrates quoq; Crinanthemon duplex haberi ſignificat: cum alterum ingreſſe in ædibus noſtris proueniens.

E X M. V E R G. C O M M.

Serebatur quondam in hortis ad coronas Hemerocallis, æmulus cum rota planta Lilio flos, & quaſi rudimentum naturæ Lilia facere conſciſcentis: nunc totis agris, & inter ſegetes præſertim pallore ſuo ſe indicat: longe Lilio minor, figura pene illi idem. Differt tātum, q̃ in Lilio floris folia cum tota ſe in calathum aperuerunt, reſima a ſuperiore parte ſe inuertunt: in hoc dum deſtoreſcat, recta diu rigent. Vnaq; hac nota maxime legentes fallere non poteſt. Color enim non tam diuerſus: licet in Lilio candoris ſuperbia, in Hemerocallide palloris triſtitia ſit: ut non ſimilis, et paulo minus q̃ idem facile uideatur. Eamq; ob cauſam, a Lilio, Lilioq; ſimilibus alijs floribus pleraſq; appellationes inuenit. Agreſte Liliū, Crinanthemon, quæ Lilio uox etiam adiecta eſt. Porphyranthes, & Bulbus uomitorius: quæ Narcissi nomina ſequenti uolumine erunt. Liliū marinū, & Anticantharon: quæ uox aduerſari ſcarabeis hunc florem ſignificat, quemadmodum & Roſæ: quibus obrutum id animal perire naturales aliqui dixerunt. Breuiſſime Plinius libro uiceſimo primo, capite eiufdem numeri de Hemerocalli hac egit: quodque hic dixerat, folia caulemque Porri modo uiridia habere, ille pallidum e uiridi dixit, medium Porri inter uiredinem palloremq; colorem ea ratione indicans. Nobis ex uerbis ſcriptoris huius rem demonſtrare placuit.

De Viola alba. C A P. CXXXIX.

λευκοίον

Leucoion ex Græcis aliqui Baſilion uocant, Latini Violam albam, aliqui Auguſtiam, nonnulli Violam autumnalē, aut Paſſa-
Drinam. Vulgaris eſt notiſſimæ, ſed in floribus differentia quædam. Nam q̃ aut cærulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Luteæ uero præcipui in medicina uſus. Huius aridi flores ſeruſfacti in deſeſſioni-
bus, ualent contra uulſæ inflammationes. Et menſtrua expellunt. Sa-
nant oris ulcera cum melle. Cum cgrato rimas ſedis. Semen duum dra-
chmarū pondere ex uino potum, aut cum melle inditū, menſes, ſecun-
das, & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ lienem reprimunt, &
podagricos iuuant.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 11
lib. 6. cap. 19.
The. li. 6. ca. 7

Leucoion, & ſi candidam Violam ipſo nomine ſignificat, tamen & pro lutea, & cerulea, & purpurea ſæpe capitur. Hinc apud Columellam candida Leucoia, quaſi & nigra quædam ſint. Hippocrates certe, nigra inquit, Leucoia quaerantur, Paulus, Ioton inquit oleum, hoc eſt, Violaceum, modo ex purpureis, modo ex candidis, modo ex croceis conſici ſolere Violis. Sciendum & illud eſt, Dioscoridem hoc loco ſcribere Violam, quæ græce Leucoion dicatur, a Roma-
nis Liguſtiam quandoq; nominari: etiamſi codices ſunt, in quibus non Liguſtria, ſed Augu-
ſtia legatur: ut fortalſe Colnmella in horto ſuo intelligat de Viola cum cecinit,
Nigro cōmiſta Liguſtro.

Seruius
Liguſtrum flor
ex candidiſſimis
ſed uiliſſimis.

Comperimus Sabini

Liguſtrum arbor eſt.

quam graeci Cyprianū no-

tant, & ſolū folijs, ſed etiam

uicioribus & ualſioribus.

et ſunt folia & lili;

ſeu candidiſſima, odorato.

Liguſtrum uocant, & huiusmodi floris: inſit mulieribus.

Hæc etate forma & odoris gratia ſunt ex liguſtri

ligno teſtatur.

Nam Liguſtrum candidum, pro Cypri flore capitur. Cæterū de purpurea, ſiue nigra, ſeu ſolum poſt dicitur. Cerulea quæ ſit, non conſtat, niſi quis Cyanū hāc intelligat. Eſt aut Cyanus flos, roſam excipiens: cuius color honorem, nomenq; dederit cæruleo. Cyanū Amarāthus excipit. Triuiſialis, ut qdā exiſtimauere, flos eſt Cyanus, in frumētariis naſcēs agro, & hortis q̃q; ruſtico rū & puellarū corollis, calice Roſarum, ſed ſquarroſo, atq; triſti, ſine odore, utriū ſuma coloris gratia, q̃ & Baptiſecula ruribus dicatur: qm̃ ſecantibus & metentibus officiat, reſuſa in occuſu eiufalce. nam & Seculā ueteres dixerat falcē. Florū porro prima ſe oſtendit alba Viola, nec dū exacta hyeme. Sub idē fere tempus, exit & Viola cognomēto flamēa, quæ Phlogion uocatur: Sylueſtris tantum ab aliquibus Phlox: ut errare putem, qui Phlogiō candē eſſe cū lutea Viola

scribere, quod quidem ex sequentibus apertissime liquebit. Theodorus flammam uocauit, colore commendabili, odore nullo, semine proueniens coronis: Non est hæc autem Iouis flos, aut quod idem est, Iouis flamma, hoc est, Diosanthos. Idque neu dubitem, facit, quod Iouis flos, licet sine odore sit, & coronarius, & obseruatur semine, tamen aestate floret, non per hyemem, ut Flammea. Plinius quoque, Iouis inquit flos, colore tantum commendatur, odor abest, sicut & illi, qui a Græcis inquit Phlox uocatur. Diximus & Lychmion uocari quandoque Flammeam, sed inter Rosas potius quam Violas. Aliud est apud Græcos Phlogis. Nam & uestis genus significat, quod nos flammeam, et flammearios opifices in Plauto uocamus, & carnem tostam, ut est apud Stratidem. Violarum ergo Alba & Flammea plurimum durat. Sed satius maxima auctoritas Luteolis: qui colos in nuptialibus Flammeis quaesitus, ritu antiquissimo & foeminis totus concessus traditur: ideoque fortasse non numeratur inter principales, hoc est, communes maribus & foeminis: quoniam coloribus societas principatum dabat. Genera Lutearum Tusculana, & quæ appellatur Marina, folio aliquanto latiore, sed minus odorato: in totum uero sine odore, ac minuto folio. Calathiana, munus autumnii. Cæteræ ueris. Proxima ei Caltha est, concolori amplitudine, uincit numero foliorum Marina, quinque folia non excedentem. Eadem odore superatur. Est enim grauis Caltha, non leuior ei, quam Scopam regiam appellant. Quamquam folia eius oleant, non flores, ut inquit Plinius. Quod autem genus ei sit inter Violas Scopam regiam, parum liquet. Dioscorides Scopam regiam Naporum generi connumerat. Plinius alio loco Sideritin, quæ latissimo folio sit, Scopam regiam a nostris dici uult. Viola odor e longinquo suauior, propinquus hebetatur. Vita longissima Candidæ, triennium. Ab eo tempore degenerat & minuitur: floresque assidue candidiores affert. Minor uis est recentibus. Ideoque aridis utuntur post annum. Honor Violis apud antiquos post Rosam & Lilium. Violam iccirco dictam Ion Græci putant, quod cum Io in uacem a Ioue conuersa esset, terra florem illum pabulo bouis eius fuderit. Nostri quoque Violam, quasi uitulam, imitatione græca uideri possunt, appellasse.

EX M. VERG. COMM.

DEulit candori multum in hoc flore antiquitas, nec leuem splendoris sui gratiam illi habuit, una ab eo facta appellatione tres alios colores indicans: qui in toto hoc Violarum genere a scriptore hoc numerantur, & uno excepto a cunctis passim quotannis uidentur. Leucolorum enim nomine in græcis omnes indicantur Violæ hæ, quæ primæ flores suos proferunt, ubi mitior & tepidior aer fuerit ab hyeme statim: ubi asperior & frigidior, postea: ubi quoque autem per uer primæ noui anni aduentum nunciantes, pluresque non uno tantulo tantum, sed uno pediculo florentes: quæ causa fuit, ut a quibusdam Polyphræ inter alias appellationes dicerentur. Id enim ea vox significat. Florent hæ passim triplici colore, candido, luteo, & purpureo. Qui quartus deinde ab hoc numeratur, ceruleus in Violarum genere hoc, quod sciam, in Italia nullibi uidetur. Ex eo oborta nobis suspitio est, posse in græcis abundare eam uocem, & si in cunctis pariter legatur: is etiam quem nos habemus egregiæ antiquitatis, & fidei latinum Dioscoridem, longobardis literis scriptum, tres tantum colores illos notos omnibus numerat: quartus hic ceruleus nullus in eo est. Nec nos tantum illi deferimus, ut uinum uelimus pro cunctis alijs nobis esse, sed accedente rei naturæque & suspicioni huic nostræ hoc ueluti teste, qualiscunque ille est, non fore credidimus inutile hoc etiam legentes monere. Præsertim nullibi, ut paulo ante diximus, ostendente in hoc flore eum colorem naturæ. Alioquin oportebit, quæ primo uolumine in lasine dicta a nobis fuerunt, meminisse: & quæ longius illic de Violis docentur, in hunc locum referre: opinarique in ceruleo colore hoc, aut alijs locis nasci hunc florem. Latè enim patet naturæ uis, & admirabilis eius manifestas: quæ potest multa ubique uariare, & quæ nobis, & nostro orbi negauit, alijs dedisse: aut Violarum appellatione alia etiam censeret florum genera. Quales Iesiminos omnes tunc esse diximus, modo magnitudine & forma pares & similes illis sint: & intellexisse in Dioscoride necesse erit, florem quempiam alium cerulei coloris: qualis uerbi causa Cyanus est, sic a Græcis a colore dictus, uulgaris flos, omnibus notus inter segetes, Maio & Iunio mense nascens. Quem rura nostra florem Alysum uocant, triplici & ipsum colore, candido, purpureo, plerumque autem ceruleo. Nobis tamen in priorem illam sententiam inclinat animus. Credimusque quantum illum colorem huic scriptori temere accreuisse. Vitimurque ea ratione præcipue, quod non uerisimile est, miscuisse diuersa simul genera Dioscoridem: & cum de Leucoijs certo scilicet genere priuatim ageret, de cunctis Violis, quæ Græci ἰα, non λευκοῖα uocant.

L iij

D I O S C O R I D I S

C agere cogitasse. Obseruauimus enim τῶν ἰῶν, id est, Violarum latius patere appellationem, pluresq; complecti flores: Nigram, seu malis ferrugineam Violam, leuissimos omnes, Calathianam, & quam Græci Phloga, Plinius Flammeam uocat, pluresq; alios qui figura, quantitate, foliorum positura, aliq; huiuscemodi ratione aliqua proprie dictis Violis similes æqualesue sint. λευκοῖων autem triplex tantum hoc genus, quod solo colore differt, quodq; nos paulo ante ex Theophrasto descripsimus. Solæ enim hæ Violæ Leucoia dicitur. Accedit & illud, q; si Cyanus in hoc genere intelligendus erit, ex qua uoce nos credimus irrepsisse eum colorem in has Violas, uidebitur temere miscuisse Dioscorides, quæ non eodem tempore florent. Illæ enim ab hyeme statim aliquibus locis, ubiq; autem & semper uere florent, Cyanus autem prima æstate tantum. Ille sponte sua in parietibus, & murorum pinnis aliquando, illi inter segetes passim nascuntur. Possunt quidem ambo in hortis conseri, sed nos simplices naturæ natales & notas, non coacta artis opera tractamus hoc loco.

De Cratægono.

CAP. CXL.

κραταιόγονον

C Ratægonum, siue ut alijs placet, Cratænon, folijs tritico simile est, multis calamis ex una radice emicantibus, multorumq; geniculorū. Semine Milij. Nascitur in opacis & frutetosis, summopere acre. Traditum est a quibusdam, quod si bibat ieiuno ore, ter in die post menses purgatos, tribus obolis in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptionem quadraginta diebus, & uir modo consimili, totidem diebus ante coitum hauriat, uirilis sexus partum futurum.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 26. ca. 10.

D

E St & alia Cratægon, siue Cratægonos, siue Cratægonos, quæ Theligonos uocatur. Differentia intelligitur lenitate gustus. Hippocrates Polycriton appellat: quam Cratægonon cæteri, Plinius Cratægonon, spicæ tritici similem demonstrat. Dioscorides Melampyro. Theophrastus lino tritico, id est, λίνω πυρίνω, fortasse hoc intelligens, quod Plinius culmum, siue spicam tritici. Theodorus nescio q; diligenter lini modo rufum uertit: quia πυρρόν, non πυρίνόν in Theophrasto legerit. In Theophrasto arboris etiam genus est Cratægos, siue Cratægona: quam Italia uocat Aquifolium: neq; magna ualde, neq; crassa, ligno robusto, uersicolore, flauo, cortice læui, ut Mespilo, folijs item Mespili, hoc est, promissis, uerum latitudine ac longitudine maioribus, nec ad eundem modum serratis, fructu plurimum rotundo: qui maturefcens siccatur, nigrescitq; gustu & succo Mespili: fereq; Mespilus syluestris fuerit, ut Theophrasti uerbis utar. Aquifoliam porro, siue Aquifolium, ipse nihil aliud ueteribus fuisse uideo, q; Illicem. Illex porro duo habet genera, minus, & prolixius.

EX M. VERG. COMM.

Tota stat gentium uulgiq; fama & fide Cratægoni in scriptore hoc & Plinio medicinar: neq; in historia, quod sciam, ex antiquo illo tempore a quoquā additum illi aliquid est. Nos etiā quod præter dicta a duobus his Cratægono adiciamus, non habemus. Monuisse tamē obiter legentes inutile non erit, ideo Cratægonon a græcis dictam fuisse, q; ui, potestatemq; sua κρατὶ τοῦ γόνου, euincit scilicet, superatq; & genituræ dominatur. Potestq; humani seminis naturam ad mares conceptus cōgere.

De Phyllo.

CAP. CXLI.

φύλλον

Phyllon aliqui Elæophyllon uocant. Nascitur in saxis, sed quod Thelygonon uocant, est ueluti muscus, folio Oliuæ, magis hærebacei coloris. Caule tenui ac breui. Radice minuta. Flore candido. Semine Papaueris simili, maiore. Sed Arrhenogogon cætera huic simile, solo fructu distat. Habet enim uuas deflorentibus oleis non dissimiles. Arrhenogogon potū, masculi sexus facere partus, ut Thelygonon foeminei proditur. Horum Cratæas author est. Sed huiusmodi historiatus, mihi produxisse uidetur.

B A R B A R I C O R O L L.

Phyllon radicē parua. Differt ab hac Phyllitis: de qua diximus. Differt & Phyllandron, siue ut alij scribunt, Phellandron: de quo nihil aliud proditum inuenio, q̄ in palustribus nascitur, folio Apij: q̄q̄ semen eius propter calculos, & incōmoda uescicæ bibitur. Ab hoc sunt qui Phellandron, eandem esse cum Helioselino, id est, Apio palustri censeant. Herbam quoc̄q̄ illam, quæ a Plinio Silaus appellari traditur in glareolis, ac perennibus riuus, Apij folio nata, quam ad uescicæ incommoda coquendam præcipit. Sunt qui pro Phellandrio Heleoselinoq̄ accipi putēt. De hoc in Sio plura diximus & Lauere. Non Silaum scribi posse, cum inibi, tum in Apologia quoc̄q̄ nostra ostendimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Descripsit Folium hanc, s. de plantarū historia uolumine Theophrastus his uerbis. *ἵνα δὲ ἴναι τις τὸ ἀρρενογονεῖν ἢ θηλυγονεῖν. διὸ καὶ καλοῦσι φύλλον τὸ μὲν ἀρρενογονεῖν τὸ δὲ θηλυγονεῖν, ὁμοία δὲ ἄμφω καὶ μορφὴν ἔχοντα ὁκίμου. ὁ δὲ καρπὸς τοῦ μὲν θηλυγόνου καθάπερ ἑλαιοῦ βρύον ὡχρότερον δὲ τοῦ ἀρρενογόνου, οἷον περὶ ἑλαιοῦ ὅταν ἄρτι φύσῃ καὶ τοῦ βρύου. Δίχρον δὲ ὡς περὶ ὄρχιδος ἀνθρώπων.* Quorū sensus sit. Quædam præterea esse maribus, aut alterius sexus concipiendis foetibus apta, eamq̄ ob causam Folium aliam mares, aliam fœmineos conceptus facientem dixerunt: sibi inuicem similes, & Ocimi figuram habentes ambas. Est tamen alterius quæ fœminarum conceptus facit, semen muscoso flori Oleæ simile, pallidiusq̄: q̄ alterius, figura nuper ex muscoso flore incipientis Oliuæ, coherens sibi, geminumq̄ Testiculorum hominis modo. Et hæc quidem Theophrastus eadem huic scriptori, si diligentius omnia expendantur.

De Testiculo Canis.

CAP. CXLII.

TESTICVLVS Canis, quem Græci Orchin, aut Cynosorchin uocant, folijs circa caulem mollis, Oleæ similibus, in terra stratis longioribus, angustis, læuibus. Caule dodrantali, floribus purpureis, radice bulbosa, oblonga, Oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbi. Ex quibus si maiorem edant uiri, mares generari dicuntur. Si minorem, fœminæ, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos cōitus. Aridam uero, ad inhibendos. Et alterum alterius potu resolui. Nasctur in petrosis & sabuletis.

B A R B A R I C O R O L L.

Orchis, qui priuatim Cynosorchis, id est, Testiculus canis dicitur, inueniri solet fere in uineis, folijs ternis, paruis, semipedalibus, radice ad formā testium hominis, alternis annis intumescere ac residere. Atq̄ hic mas est & fœmina eiusdē nominis: quæ distinguitur internodijs, & ramosiore frutice, radice fascini. Nasctur fere iuxta mare Cynosorchis, & Satyrion uocat, minus proprie. Aliud em̄ genus est, quod proprie Satyrion appellant, ut paulo post monstrabitur. Est & Orchis cognomine Serapias, de qua modo prodendum.

E X M. V E R G. C O M M.

Aliter potius q̄ aliud de utraq̄ Orchis, id est, Testiculi huius radice docuit Theophrastus nono de plantarum historia uolumine. Quo loco cum de nouis, & uix credendis plantarum quarundam uiribus ageret, numerassetq̄ fabulosa etiam aliqua de sterilitate, fœcunditateq̄ ad conceptus & partus agere incipiens, subiecit, *καθάπερ ἔστι τοῦ ὄρχιδος καλουμένου. Δυσὸν γὰρ ὄντιν, τοῦ μὲν μεγάλου, τοῦ δὲ μικροῦ, τὸ μὲν μέγαν ὑπεργότερον ποιεῖ πρὸς τὰς ὁμιλίας, σπινθάκτι διδιδύμου ἐγγὺς ὅρις τοῦ τὸν δὲ ἰσθμὸν σίνεσται καὶ κωλύει. ἔχει δὲ τὸ μὲν φύλλον σκυλλώδες, λευότερον δὲ καὶ ἑλαφές, τὸν δὲ καυλόν, ὁμοιωτάτον ἀπίω.* Quorum summa & sensus est, Quemadmodum in ea quæ Orchis, id est, Testiculus uocatur. Qui cum duo sint, maior aliter, minor uero alter, Maior ad Venerem efficaciorē hominem facit, in lacte capræ, in montibus pastæ sumptum. Minor autem nocet illi & impedit. Habet planta Scyllaceum folium, minus tamen, & minore læuore nitens. Caulem postremo agresti Raphano, quam Græci Apion dicunt, simillimū. Et hæc Theophrastus de Testiculo herba: quam hic petrosis & sabulosis locis nasci tradidit, contra q̄ græcorum & latinorum aliqui testati fuerunt, ad mare nasci affirmantes.

A

Pli. li. 22. ca. 16.

27. cap. 12.

Theoph. li. 9.

ὄρχις

κυνὸς ὄρχις

B

Pli. li. 26. ca. 10.

C De altero Testiculo. CAP. CXLIII.

Testiculus, qui alio nomine Serapias, Andrea auctore, uocatur, quoniam radix inter pauca utilis sit. Folijs est Porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis. Caule palmeo, floribus perne purpureis. Radice Testiculis simili. Quæ illita tumores discutit. Vlcera purgat, & serpere eadem non patitur. Abolet fistulas. Et illitu inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhibent. Sanantque oris putredines, & ulcera cacoethe. Aluum sistunt e uino potæ. De hac, eadem quæ de Testiculo canis produntur.

BARBARI COROLL.

Orchis Serapias, quæ Triorchin cognominat Aetius, folium habet Scillæ, ut Theophrastus & Plinius testatur: non Silphij, siue Laseris, ut Theodorus cõuertit, Silphiodes, pro Scillo des in eo legens. Etem Silphio foliū est Apij, non Scillaceū, aut Porraceū, ut Serapiadi. Spinofus huic herbæ caulis, & Apio, i. Raphano syluestri, non ut Theodorus inquit, Piro similis.

EX M. VERG. COMM.

Priori Testiculo cõgener posterior hic est, radicum numero diuersus, & alter ab illo dictus. Duabus em, & quales descriptæ sunt, ille nititur. Hic a Diosco. minimis Testiculis, nullo eorū de creto numero similes radices habere traditur. Ab alijs tñ Triorchis noiat: manifesto ex ea appellatione argumēto, non duabus, sed tribus testiculatis radicibus niti in terra. Sic em posteriores medici appellauerūt, præsertimque Paulus Aegineta ultimo suæ medicinæ libro, capite de fordidis ulceribus, *σαρapiάδος ῥίζα καὶ τριόρχις*, id est, Sarapiadis herbæ, quæ & Triorchis dicit. Mox lib. 6. de simplicibus *ῥχισ ἢ σαρapiάς ὀνόματι τριόρχιν*. Quod est. Orchis, aut Sarapias, quæ quidam Triorchin uocant. Sic etiā Aetius, sic posteriores alijs. Ex quibus uidere licet, non uiribus in medicina tantū, sed historia etiam a priore illo hunc differre. Cur aut Sarapiada hic uocari dixerit, quoniā multos habet radix eius usus, non satis certum nobis est.

D

C De Satyrio.

CAP. CXLIIII.

σατύριον

Satyrium aliqui Trifolium uocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, Rumici, aut Lilio similia, minora tamen, ac rubra. Caulem cubitalem, nudum. Florem Lilij effigie, candidum. Radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam, intus ut ouū candidam, gustanti dulcem, & ori non ingratam. Quam in uino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. Utendū ea dum concumbendū incescit cupiditas. Siquidem ea proniores ad uenerem fieri affirmant.

BARBARI COROLL.

Satyrii primū genus, caule leui, radice gemina, hoc est, duplici ordine, a Plinio describitur.

C De Satyrio Erythronio.

CAP. CXLV.

σατύριον τὸ ἔρυθρον

Satyriū Erythronion, aliqui Erythraicon, alijs Melion aqueum, alijs Entaticon, alijs Priapicon, aut Satyriscon, aliqui Satyri Testiculū appellant, Latini Molorticulum Veneris. Semine lini, maiore, duro, leui, splendente. Quod fertur, non secus atque Scincus libidinē excitare. Cortice radicis gracili, ruffo. Intus aut album includitur, sapore dulci, non ingrato ori. In montosis & apricis enascitur. Venerem, ut produnt, si oīno manu teneatur radix, stimulat, Eoque magis si bibatur in uino.

BARBARI COROLL.

Satyriū hoc notum pastoribus, quoniam arietibus & hircis fegnioribus in potu datur, &

In Sarmatia equis ob assiduū laborem pigrioribus in coitu: quod uitium Proledamū uocant. A In totū quidem Græci concitationē hanc uolentes significari, Satyrion, & Satyrifmon, & Satyriflin appellant, ideo & Aristocholix genus unum, quod Polyrrizon cognomināt. Satyrion ex facto uocari cenſeo. Herbam quoq; illā Satyrion Indam appellauerim, Theophrasto allatā ex India: cuius contactu libidinē durare septuagesimo cōitu meminerit, nec speciem eius, aut nomen aliud reddiderit. Habēt hodieq; Syri herbam simili effectu, Bucheidenq; nomināt, & Indi eam Satyrion: fortasse cum ea, cuius mentionē Theophrastum fecisse diximus, eandem radice candida & dura, cōmendatiore quo crassior & rugosior, & albior, podagris utili. Est & alia Satyrifini significatio Hippocrati, pro tuberculis prælongis, qualia Satyrorū pingūtur, sub ipsas aures, quæ a quibusdam & Thères, & Pheres appellantur, ut inquit Galenus.

E X M. V E R G. C O M M.
Omnes Satyrj huius appellationes, aut ex colore radice, aut ex uiribus, impetūq; eius ad Venerem factæ sunt. Neq; enim Erythron, & Erythroccum aliud significant, q̄ rubens simpliciter, & ueluti cocco infectum. Quæ deinde uox Enaticos sequitur, non aliunde q̄ ἀπὸ τοῦ ἐννέου est. Græcis enim intendi, & arrigere ea uox significat. Quemadmodum Priapiscus, Satyriscus, & Satyrj Testiculus. Omnes enim a salacitate Veneris ad hanc herbam translatæ sunt. Priapum quotidie in hortis suis uidebat antiquitas ad Venerem semper paratum, & qualem in Priapicis carminibus audire adhuc licet.

De Horminō. CAP. CXLVI.
HORMINVM fatium a Latinis Geminalis, a Dacis Hormia dicitur. Folij est Marrubio similis, caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ filiquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur. Siquidem in syluestri rotundum, fuscumq; inuenitur. In altero nigrum, & oblongum: cuius est usus. Ad Venerem stimulant, cum uino bibi uolunt. Purgat cum melle argema, albuginesq;. Illitum ex aqua tumores discutit. Eo etiam extrahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illitæ hærbæ. Syluestre magis uiribus pollet. Quare unguentis præsertim gleucino permiscuntur.

B A R B A R I C O R O L L.
Horminon amarum, nigrumq;, nec Cumino penitus ab simile, dodrantali Plinio altitudine: medicamentis annumerandum potius, q̄ inter fruges. Dictum ita, quia Venerem extimulet. Seritur cum Sefama & Irione, omninoq; cum æstiuis, hoc est, cum his quæ æstate ante Ver giliarum exortum seruntur. Est & Horminiū, siue Hormienon, & Hormenion, sed illud Cor ruda intelligitur. Plinius huic folium Porri tradidit. Ceteri Marrubio simile fecerunt: qui error fatalis fere Plinio est, ut in Ballote & Stachye.

E X M. V E R G. C O M M.
Frugum generi adnumerauit aliquot locis de plantarū historia Horminon hoc Theophrastus. Idem Theophrastum secutus decimo octauo uolumine Plinius tradidit capitibus. 10. & 7. Quinetiam post hæc. 22. uolumine, capite ultimo duorum generum, & ipse Horminum fecit: alterum nigro, ut hic semine; alterum candido, contrā q̄ Dioscorides, qui παλόν dixit: quæ uoce Græci indicant, quæ nigrescunt magis, q̄ quæ nigra sunt. Alij inter medicamenta, & frutices potius, q̄ inter fruges numerare Horminum maluerunt. In quam partem & nos propen siores sumus. Neq; enim antiquis in usu ciborum fuit, & ætate hac nostrā uix ab agricolis cognoscitur. Descripserunt satis id antedicti scriptores, Ciminoq; simile, præsertim semine fecerunt. Ob quam causam nihil ultra de eo nos agemus.

De Securidaca. CAP. CXLVII.
HEdysaron unguentarij Pelecinum, id est, Securidacam uocant. Fruticosa est, folijs Ciceris. Semen ruffum in filiquis fert, corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim æmulator. Vnde nos

A

B

Pli. li. 19. ca. 17.
lib. 22. ca. ult.

Hedysaron

D I O S C O R I D I S

C men accipit. Amarum gustu. Stomacho utile in potu. Additur in antidotis. Cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit. Nas-
citur in segetibus & hordeis.

Theoph. li. 8.
Pli. li. 27. ca. 12.

B A R B A R I C O R O L L.
Hedyfaron, quoniam Pelecinon a Græcis dicatur, a nostris Securidaca nomen habuit, stru-
nicola cauliculis, semen filiquis ternis, quaternisq; quale Gite nouimus amarum. Nas-
citur in segetibus. Hac Lentem necari, Plinius, & e Græcis aliqui recentioribus existimant. Theopha-
stus Aphacen. Lentem uero ab Aparina, quæ Lappa fit, strangulari complexu scribit. Ita sape
fallit uocabuli similitudo. nam Græci Lentem Phacon uocant, non Aphacen. Sciebant & hoc
discrimē illi qd dubitat sed liberariorū culpā, ut sapenūero cōtingit, hallucinādo suā fecere: qd
quidē & nobis accidisse aliquibus locis hoc opere nō dubitamus. hoc em̄ est hominē esse.

E X M. V E R G. C O M M.
Nasci Securidacā in hordeacea & triticea segete hic ait. Secutusq; eum Plinius, in segetibus
inueniri lib. 27. cap. 12. tantū testatus est. Theophrastus tamē octauo de plantarū historia uolu-
mine, Lentibus noxiā & pestilentem dicens, non aliter q̄ tritico lolium, & auenā uerisimile fe-
cit, illic potius inueniendam ubi magis grassetur. Hac enim malorū, nozarūq; omnium natu-
ra plerūq; est, ut ubi maleficiū suum exercere possint, illic libentius agant, & frequentiora in-
ueniant. Pelecinus ab antiquioribus dicta in græcis diu planta hæc fuit; nec nos, præterq; in no-
uissimis scriptoris huius codicibus alio noīe descriptā in Dioscor. hæcenus inuenimus. Is etiā
quē nos egregiæ antiquitatis habemus latinū Dioscoridem, Pelecinū, non Hedyfarum legen-
tibus proponit. Quō fit, ut suspicemur posteriorem hanc esse plantæ huius appellationē, & a
suauitate odoris, usq; unguentariorū factam huic scriptori a posterioribus græcorū medicis
accreuisse. Dico autē posteriores, qui Theophrastum, & scriptoris huius tempora secuti sunt.
Paulus Aegineta utroq; nomine eam in. 6. his uerbis indicauit. Hedyfaron, quæ & Pelecinus.
Eius semen ante coitum ex melle appositum hic ait ἀρόγον esse, id est, sterilitatem facere. Bar-
barus autē aliter penitus uertit, dicens cū melle appositū ante consuetudinē prohibere partus.
D Nos unam eandemq; uocis significationem semper secuti sumus; ille quod alijs locis abortiuū
dixerat, hoc loco contrario penitus sensu partus prohibere dixit.

¶ De Onosmate. C A P. CXLVIII.
Onosma aliqui Osmaden, alij Ononin, alij Phlonytin appellant.
Oblonga folia habet, ad similitudinem Anchusæ, longitudine
quattuor digitorum, & duū latitudine, mollia, in terra iacentia. Sine cau-
le, sine semine, sine flore. Radice nititur longa, tenui, infirma, rubescēte.
Gignitur in asperis. Folia in uino pota partus extrahunt. Prægnās si eam
supergradiatur, abortum facere dicitur.

Pli. li. 27. ca. 12.

B A R B A R I C O R O L L.
Onosma, & Oenoma, & Onoma, & Onomis, & Ononis, & Phlōitis, & Phlomitris poti-
us, & Hyperbaron nocatur. Folia eius non ad quatuor, sed ad tres digitos longa Plinius scri-
bit, strata in tetram, tria, incisaq; . Quid sit Hippocrati Oxosma, quo Lichenes tolluntur, haud
comperi; nisi quis acetariam compositionem in eo uocabulo contineri censet. Acetum sane
contra Lichenas pollere nemo dubitat.

E X M. V E R G. C O M M.
Breuis, & p̄ter a Dioscoride dicta nulla est Onosmatis huius in alijs scriptoribus historia.
Plinius. 27. uolumine cap. 12. eadē huic scriptori oīa reddidit. Quā solū foliorū longitudinē hic
quattuor digitorū, ille triū fecit. Paulus Aegineta etiā nihil addidit aliud, q̄ acetem amarāq; esse
eamq; ob eā folia eius in uino pota enecare simul, & pellere ex utero humanos fetus.

vvμφαιε

¶ De Nymphæa. C A P. CXLIX.
Nymphæa nascitur in paludibus, & stagnantibus aquis, folijs ci-
borio minoribus, & longioribus. Alijs in summa aqua, alijs de-
mersis, pluribus ex radice prodeuntibus. Flore Lilio simili, albo, & in me-

dio crocos habente. Cum defloruerit, ut rotundum malum, aut papaveris caput, extuberat. Nigro semine, denso & lato, lenti gustus. Caulis est laevis, niger, minime crassus, ciborio cognatus. Radix nigra, scabra, clauæ similis. Quæ autumno secatur. Sicca cum uino pota coeliacis, dysentericisq; auxiliatur. Lienem absumit. Radix stomachi ac uescicæ doloribus illinitur. Vitilignes ex aqua emendat. Imposita cum picce, alopecijis medetur. Eadem contra ueneris insomnia bibitur. Siquidem ea prorsus adimit. Pota assidue aliquot diebus, genitale infirmit. Idem semen potum efficit. Nymphææ nomen sibi uendicasse uidetur, quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Helide, in Anygro amne, & in Beotiæ Haliarto.

BARBARI COROLL.

Nymphææ radix dulcis: quam & in sole siccant. Nata fertur a nympha erga Herculem zelotypa, proptereaq; mortua: quare Heracleon uocant aliqui. Alij Rhopalon, a radice clauæ simili, laudatissima in Orchomeno & Marathone. Sed & in Creta quoq; ut Theophrastus putat. Bœotij Manodion, siue Madon, ut idem Theophrastus indicat, appellant, edentes semen.

Theo. lib. 9.

EX M. VERG. COMM.

Non comparauit Theophrastus nono de plantarum historia uolumine Nymphæam describens, folia eius Aegyptiæ Fabæ folijs, uerum simpliciter grande folium sub aqua habere dixit. Addidit præterea, sistendo sanguini utilia esse folia eius, ideoq; trita uulneribus imponi. Quod hic non testatur uesci radice eius gentes in Orchomeno Bœotij, Marathone, & Creta, quibus locis copiosam nasci Nymphæam tradidit. Numeraturq; ab eo inter radices dulces, qualis Scythica est, pluresq; aliae. Satis hic nominis causam declarasse uidetur: & si ex ueteribus fabulati aliqui fuerint, a Nympha priuatim nomen herbæ factum fuisse, quæ claua ab Hercule interfecta sit, uel ipsa zelotypia eius intabuerit, in palustrem hanc plantam mutata. Vulgaris & nota omnibus herba, qua nihil in palustribus speciosius nascatur & uiuat. Facileq; est ex folio eius, quale Aegyptiæ Fabæ folium sit ratio cinari. Hoc enim illi comparat Dioscorides. Nec præterq; figura simile illi facit. Grandius enim illud est, & quale secundo uolumine in Aegyptia Fabæ ex ueterum monumentis & historijs descriptum a nobis est.

B

De altera Nymphæa. CAP. CL.

Et altera Nymphæa, cuius flos Blephara dicitur, folijs antedictæ. Radice alba, scabra, flore luteo, nitente, Rosæ simili. Huius semen & radix, contra sceminarum profluuiâ efficaciter ex uino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia amne Peneo.

BARBARI COROLL.

Nymphæa alia caput habet Rosæ magnitudine.

EX M. VERG. COMM.

Quam habet nominis causam Nymphæa, eandem & Nymphon. Folia hæc superiori similia habet. Quod discrepat, radice color, & floris, & præter colorem floris figura est: quæ in illa Liliij, in hac Rosæ describitur. Non facile inuicem discernuntur, nisi quis a primo ex aqua earum emerfu, dum deflorescant, utranq; obseruauerit.

De Androsace. CAP. CLI.

Androsaces, sunt qui Picrada appellant, alijs Leucen, alijs Thalassiam. Hærbæ est amara, tenues spargens iuncos, sine folijs. Folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. Gignitur in Syriæ maritimis. Ea drachmis duabus in uino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini potato, & hærbæ decocto. Po-

in Androsace

M

D I O S C O R I D I S

C dagris utiliter illinitur.

EX M. VERG COMM.

Sapor Picrida, color Leucem, ortus Thalassiam Androsaces uocari fecit. Prima enim uox illa amaritudinem, altera candorem, tertia mare & maritimum significat: quæ tota fere eius historia est. Amarescit enim, albescit, & maritimis locis in Syria nascitur: unde repetenda alia essent. Sed nimis a nostro orbe distat regio illa: ob eam causam Dioscoridis & Plinij in Androsace historia contenti, Asplenon nostro orbi cognitam, neque inuentu difficile tractabimus.

De Asplenio. CAP. CLII.

Asplenium

ASPLENIVM aliqui Scolopendrium uocant, alij Splenion, alij Hemionium, alij Pteryx, alij Lonchitum, alij Aturion, alij Phrygium, aut Phrygitum, aliqui Philrodoten, Magi mustellæ sanguinem. Folijs est multis, Scolopendræ animalis similibus, ab radice uerna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisque siliceis, & opacis. Nec caulem, nec florem, nec semen habet. Folia Filiculæ modo diuiduntur. Subter flauescencia hirsutacq, superne uiridia. Vim hanc habent folia in aceto feruifaccta, ut per dies quadraginta pota, lienem absument. Quibus etiam contritis, lienem ex uino illini oportet. Stranguriæ, & regio morbo prodest. Singultum sedat. Calculos in uesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese, aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia effodiendam.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 27. ca. 5.

D

Asplenon, folijs tridentibus, radice limosa, cauernosa sicut Filicis, candida, hirsuta. Gaudet humidis. Laudatissima in Creta, ubi & repertam Viétruius affirmat, circa Potereum amnem: qui duas urbes Gnoson & Cortynam interlabitur, parte quæ ad Cortynam spectat, pecoribus sine liene inuentis: quia herbam eam roderent, ex altera parte quæ ad Gnosum est, lienem habentibus: quia ibi herba illa non appareret. Theophrastus Hemionion hanc appellat. Theodorus Mulam uertit, folio Scolopendrij, radice multiplici, mortuosas petrosasq, planicies amat, delectari cibo eius Mulas, & ob id datum ei nomen. Fœminas steriles cere quæ hanc herbam in cibo sumperint, admixta Mulae ungula, & corio, aut semine: prout aliqui non derma, sed sperme in Theophrasto legunt. Quod autem Scolopendrij folio describit eam, uidetur aliud genus quod Scolopendrium, siue quod idem est Asplenon haberi uoluisse Theophrastus: nisi quod ab eo Scolopendrium, & Scolopendra sumptum intelligat.

EX M. VERG. COMM.

Hemionion Athenis Theophrastus, quod muli libenter ea uescuntur, uocari Asplenon tradit. Cretes Asplenon, quod primi in ea insula Cortynæ obseruauerint, ad Potheriæ fluiuium pascencia hanc herbam pecora sua, lienem inuenire. Vulgus ubique Splenion, quod longitudine latitudineque sua fasciæ, & ut sic loquamur, emplastelli formam habet. Posteriores usque ad ætatem hanc nostram, Scolopendriam, a Scolopendrarum similitudine & figura, quam habet, foliosum magis cespitem quam plantam uocauerunt. Indicata alijs etiam appellationibus est, sed non adeo certa rei indicatione.

De Hemionitide. CAP. CLIII.

Hemionitis

HEMIONITIS, quam aliqui Splenion uocant, folium emittit Dracontuli, lunatum. Radicibus cohæret multis, tenuibus. Nunquam flores, neque semen, neque caulem gignit. In petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absument.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 27. ca. 5.
lib. 26. cap. 7.

Hemionitis, uidetur esse quam Plinius Hermion, & Teucron, ab inuatore Teucro uocata perhibet, uigesimo quinto historiae naturalis uolumine, natam in asperis, austero gustu, nec florere, neque semine, lienibus medentem: quæ omnia et Hemionitidis a Dioscoride tributa sunt. Nam quod

Plinius fungos tenues spargentē describit, Diosc. radice multiplici, & exili demonstrauit: q̄ il-
le folijs paruis, hic folijs Dracuntij, lunæ modo incuruis deliniat, id est, *μυνοιδῆς*, proindeq; non
folijs paruis, sed folijs curuis, in Plinio scribendum cenſeo locum eum. Inuentam ſic affirmat,
cum exta ſuper eam proiecta eſſent, adhæſiſſetq; leni, eumq; exinanīſſet, propterea & Spleni-
on uocatam. Sues quoq; qui radicem eius ederint, ſine illo uiſcere compertōs.

EX M. VERG. COMM.

Non temere penitus ſuſpicati ſunt ex antiquis & poſterioribus medicis aliqui, eandem Af-
pleno Hemionitū hanc eſſe; nec duplicem, ſed unam utriuſq; hīſtoriam & medicinam in ſcri-
ptore hoc legi. Vtraq; enim a mulis factō nomine indicatur. Vtraq; nec caulē, nec florem, nec
ſemen fert. Vtraq; in petris naſcitur. Vtraq; lienes minuit: & quod in folijs alterius diſſerre ui-
deatur, idē facile eſſe poteſt. Longitudine enim & figura non adeo diſſert a Scolopendria Dra-
cunculus, ut non potuerit alterutro aliquid comparari: diuq; nos in ſuſpitione hac ancipites,
autoribus antiquiſſimis, & optimis græcorum medicis, præſertimq; Paulo Aegineta, ſeorſum
de utraq; agentibus, ſeorſum tandem de utraq; egimus: illam Aſplenon, hanc priuatim Hemi-
onitū uocari tradentes: congenerem illi quidem, foliorum tamen aliqua diuerſitate diſſimilē.
Nec uiribus æqualem. Si quidem extenuat Aſplenos, non tamen calet, Hemionitis adſtringen-
di uires cum amaritudine habet: ut teſtari de utraq; meliores græcorum medici fuerūt. Magna
inter eas foliorum ſimilitudo: quæ non ſatis fuiſſet, ſimpliciter lunata dixiſſe a ſcriptore hoc
μυνοιδῆς appellata. Habet enim id ſidus plura luminum incrementa: eademq; luna, non eadem
luce ſemper fulget, ſed eſt cum toto orbe fulgens, totam illuſtrat noctem. Eſt cum utrinq; gib-
boſa, quam ueteres græci *ἀμφικυρτον*, ut illam *πανσέληνον* uocant, maiorem noctis partē copioſa
impleat luce. Eſt cum dimidiato globo ſplendens, *διχόμανος* a græcis dicitur. Eſt tandem
cum a ſole digrediens uſq; ad quartam diem, non multa luce adhuc fulget: eoq; tempore græci
plerumq; *μῆνιν* uocant. Et in hoc lunæ interuallo Hemionitidis folia ſideri illi comparauit hic
ſcriptor. Alioquin ſi lunatum ſimpliciter eius folium dixerit aliquis, incertam ex incerta eius ſi-
deris quantitate & ſpecie figuram ſignificabit. Veritq; nos, ne quod in lunæ amoribus fabula
q̄ aliqui ſunt, nobis accideret, pluribus græcam uocem *μυνοιδῆς* uertimus: diximufq; lunę nō
dum tumentis in globum, ex Hemionitidis folio lunæ lumina deſcribentes.

De Anthyllide. CAP. CLIII.

Anthyllis, quam quidam Anthemida uocant, alij Eranthemin, *ἐρανθῆμις*
alij Leucanthemon, alij Soranthin, alij Campeſtrem florem,
Romani Solaſtrum, duplex eſt. Quædam enim Lenti ſimillima, folijs
mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine, radice parua, tenui. Naſcitur
in ſaliſ terris, & a ſole illuſtratis, non in ſulſo guſtu. Altera eſt folijs ra-
mulisq; Triſagini ſimilis, hirsutioribus tamen, breuioribus & aſperio-
ribus. Flore purpureo, odoris admodum grauis. Radice Cichorij. Po-
ta drachmis quatuor, urinæ difficultati, renibuſq; plurimum prodeſt.
Tritæ, uulue pituitas emolliunt, cum roſaceo & lacte impoſitæ. Vulne-
ribus medentur: quæ autem Triſaginis ſimilitudinem refert, pota cum
aceto mulſo comitiales ſanat.

BARBARICOROLL.

Anthyllis, & Anthyllion, & Anthycellion uocatur. Genus eius primum in ſabuloſis. Alter
um naſcitur in ſaxoſis. Eſt & in Aegypto fructus non quidem Anthyllion, ſed Anthaliō uoca-
tus, a Theophrasto Malum Anthali, magnitudine & rotunditate Meſpili, ſine nucleo, ſine cor-
tice, folijs Cyperti: haud procul a Nilo, etiamſi Plinius ſcribat longius a flumine. Decoquit ibi
hæc in Bryto hordeaceo, uehementer iocunda & dulcia, & quæ bellariorum uicem in ſecundis
menſis impleant.

Pli. li. ii. ca. 29
lib. 26. cap. 8.

De Anthemide. CAP. CLV.

Anthemida aliqui Leucanthemon, alij Heranthemon, quoni-
am uere floreat, alij Chamæmelon, quoniā mali odorem ha-

ἀνθεμίδα

M ij

D I O S C O R I D I S

C beat, nonnulli Melanthemum, alij Chrysocomam, alij Calliam, Romanij Mallium, Aphri Astertiphen appellant. Genera eius tria, tantum flore distantia. Rami palmum non excedunt, fruticosi, alis multis, concavi. Tenuibus ramulis, rotundis capitulis, floribus in medio aurēis, foris secus orbiculato ambitu, candidis, melinis aut purpureis, magnitudine foliorum Rutæ. Nascitur in asperis, & iuxta semitas. Colligitur uere. Vim habent radices, flores, & herba excalfaciendi, extenuandiq; Potu & infusione pellunt menstrua, partus, urinam, calculosq; Aduersus inflammationes, & ilei tormenta bibuntur. Bilem suffusam expurgant. Iocinerum uitia sanant. Decocto earum uesicæ fouentur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. Hanc proprie Heranthemon uocant. Ea cui Leucanthemo nomen est, item quæ Crysanthemum dicitur, uehementius urinam ciunt. Aegylopijs illitæ medentur. Comanducata, ulcerum eruptiones in ore sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo utuntur. Teruntur in farinam ad abigendos febrium circuitus. Flores & folia recondi debet, & priuatim tusa, in pastillos digeri. Radix quoq; sicari, dūq; ingruit necessitas, binæ partes herbe dari, modo floris aut radicis pars una, modo contra, floris partes duæ & herbae una, permixtatim duplicato pondere alternis diebus. Bibere autem oportet in uino mulso diluto.

Pli. li. 22, ca. 21
The. li. 7, ca. 13

B A R B A R I C O R O L L.

Anthemis, quæ & Leucanthesis uocatur, per ea quæ Chamemilon uulgo dicitur, magnis est ab Asclepiade celebrata laudibus. Theophrastus Anthemon, & Anthemion appellat, quæ Dioscorides Anthemida, & Hippocrates (ut arbitror) Euanthemion. Duo genera constituit. Vnū eius, quæ ab radice distaxat foliata sit. Alterum quæ caule tñ. Deserere incipit utriq; cacuminibus, cū ceteræ ab imo incipiant. Flore candido, in orbem medijs herbaceo. Semini colos q; floriri. Decidere hoc sicut & spinosis, cōceptaculo inani relicto. Theodorus Anthemō, p Melarthio uidetur intellexisse, ut qui Nigellam interpretatus sit. Reponuntur Anthemidis flores in coronamenta, sed collecti uere. Est & saltationis apud Athenæum cuiusdam popularis nomen Anthema, cum illo ioculari numero. Vbi rosa, ubi Viola, ubi florens Apium? Vbi hæc rosa? ubi hæc Viola? ubi hoc florens Apium?

E X M. V E R G. C O M M.

In Anthemide hac nulla est ex tam multis appellationibus, quæ non certam & rei coniunctam significationē habeat. Omittimus quas hic ipse declarauit Eranthemon, q; uere floreat: & Chamæmalum, q; pomi odorem habet dici. Ceteræ etiam ex floris colore, odoreue cōsensu aliquarum gentium factæ sunt: quæ ut interiorem, exterioremue floris colorem magis amauerant, sic Leucanthemon a colore albo, aut Chrysanthemon, Chrysocomenue a flauo auri colore eam indicauerunt. Vtroq; enim modo in scriptore hoc legitur. Quemadmodum ab odore Mali quæ habet, Malanthemon. Mali enim florem ea uox significat. Libet his addere a Theophrasto libro de plantarum historia octauo, sæpius genere neutro Anthemon dictam fuisse. Et qui passim in græcis modo leguntur, dodrantes ramuli, in uetustissimis utriusq; gentis codicibus, duorum dodrantum altitudine herbam describunt. Nec multo post, ubi passim legitur, κλωνάγια μικρά λεπτά φυλλάδια, legi oportere, non ramulos, sed foliola. Prius enim de ramis actum fuerat, tunc autem de folijs herbae agendum erat. Inducant id uetustissimi græcorum codices, & antiqua Dioscoridis interpretatio: quorum ope nos quæ miscuerant alij interpretes, redire in sua loca cōegimus: diximusq; foliolis paruis, tenuibus, numerosisq; &c. Cetera in Chamæmalis satis nota per se sunt, ideoq; a nobis longius non tractanda.

¶ De Parthenio. CAP. CLVI.

PArthenium aliqui Amaracon uocant, alij Anthemida, alij Leucanthemon, alij Camemelon, alij Chrysocalin, alij Melabathron, nonnulli campestem florem, Romani Solis seculum, aliqui Millefolium, Etrusci Cautam, Aphri Thamath. Folijs est Coriandri, tenuibus, flore per ambitum albo, intus melino, odore graui, sapore amaro. Sic catum cum aceto mulso, aut sale potum, non secus atq; Epithymum, & bilem & pituitam detrahīt. Suspiriosis prodest, & melancholicis. Hærb sine flore a calculosis, et anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad insedendum in duricia uluarum & inflammationibus. Illinitur sacro igni & collectionibus cum flore.

B A R B A R I C O R O L L.

PArthenij flos odorem habet Mali. Nascitur in sepibus: Matricaria dici eā multi putāt. Sunt qui Cotulam appellēt. Nam & ipse Dioscorides testatur ab Etruscis uocari Cautā, unde Caula deducitur, ac deinde Cotula. Sed & Leucanthen, & Tamnacū Plinius hanc appellat. Nisi librariorum menda sit, Tamnacū p. Amaraco scribentium. Nam & Amaracus a Diosc. uocāt: nec aliter a Galeno, atq; Paulo. Celsus apud nos Pallescū, & Muralium appellat, ut Plinius intelligit. Ego Celsum de alia Parthenio Muraliū dixisse autumo: quæ non in sepibus, sed in muris, parietibusq; nascitur: ob id & Parietaria uulgo nominata, ut in Helxine docuimus. Est & Parthenis pro Artemisia: quanq; sunt qui Artemin legant, nō Parthenin, castigando proinus errore medicorum: q; Parthenion, de qua modo loquimur, Artemisiam esse uoluerunt. Apud Hippocratem quæ sit herba Parthenion cognomento Microphyllon, hoc est, Paruifolia, dubitatur a Galeno: qui Dioscoridem pro Helxine, aut etiam Mercuriali capiēdum existimasse scribit. Sed quid si eam pro Artemisiæ secundo genere Hippocrates intelligit, cuius minuta folia traduntur: aut etiam pro Matricaria, de qua hic agitur, quæ folijs Coriandri describitur?

E X M. V E R G. C O M M.

ALia hæc Parthenion est ab ea quam Celsus lib. 3. Perdicō uocari etiam tradit, reprimereq; simul, & refrigerare. Illa Elxine muralis, & Perdicion dicta: hæc pluribus ab Anthemide inuentis appellationibus, similis congenerq; illi credenda est. Illa a Nicandro in Theriacis uenentis mederi prodita: hæc sanandis suspirijs, atræ bili, calculosisq; inflamatis, duratisq; muliebribus locis apta. Hæc Chamemalo similis, flore per ambitum candido, in medio luteo, illa Mercurialis herbæ folijs descripta: & ne longiores simus, notis omnibus inter se diuersæ, solo eodē nomine legentes fallunt. Fallit autem non nomine, sed re Parthenion, tam similis Chamemalo, ut pro eā sæpius ab impitis carpatur. Habet enim illi similem paulominus q; in cunctis florem. Differt magnitudine, quæ in Parthenio amplior undiq; est. Differt et figura, q; coloribus in utriusq; flore paribus Chamemali flos in medio tumet, & in altum erigitur: folia uero ad terrā inflexa descendunt: in Parthenio folia medio exequata per ambitum stant. Nobis ex his quæ diu obseruauimus, inclinatur animus, Chamemalo cōgenerem esse: & ut in plerisq; alijs sit, nota aliqua priuatim ab alijs dispesci, quæ in Parthenio hac uirosus odor est. Quemadmodum in Bomis oculo, quæ uox dicenda erit, sola magnitudo, qua a Parthenio hac illa distinguitur.

¶ De Bupthhalmo. CAP. CLVII.

BVphthalmon quidam Cachlam uocant, alij Balsamenam, Magi Hæmoran, alij Mercurij genituram, alij Aphthitis semen, aut Mnesitheum, Romani Cappacoraniā, Aphri Narat. Tenuēs emit tit cauliculos, mollesq; folia Fœniculi, luteum florem Anthemide maiorem, oculi similitudine. Vnde nomen traxit. Circa oppida nascitur, et in campestribus. Flores cum cærato triti, tumores duriciasq; discutiūt. Aiunt epotam post exitum a balneis, regio morbo correptis, colorem

M iij

A

παραθλινον

Pli. li. 22. ca. 17
lib. 21. cap. 30.

B

Βούφθαλμος

C tractu temporis reddere.

Pli. li. 25. ca. 3.

BARBARI COROLL.

Buphthalmos, siue Buphthalmon, siue ut Hippocrates Buanthemon, fruticosa caulibus, qui & manduntur decocti. Flores huius maiores multo, acrioresq; sentiuntur, q̃ Anthemidis. Differt a Butomo frutice palustri, Orchomenio lacu plurimo, caule inoffensissimo, peculiari quodā leuore, folio harūdinis angulari, fructu nigro, Mali amplitudine, sexu duplici. Mas fecundus, foemina uisilium ad nexus utili. Pars ab radice tenera manditur, puerorum cibo grata. Buphthalmon uero eandem esse cum Chrysanthemo uocata, puto, de qua sequenti libro Dioscorid. hæc ipsa repetit. Facitq; quod Alcman poeta, Calchan, siue Cachlan, hoc est, Buphthalmon, ita nominat, ut aureum torquem ex huius constare floribus ostendat, χρύσειον ἑρμῶν ἵππων ἴσθμιναν πετάλοισι κάχλαν. Nicolaus Damascenus, lacum sub Alpes esse scribit. Multorum stadiorum circuitu, ubi toto fere año flores suauissimi odoris & coloris prestantissimi per ambitum uisuntur, similes Buphthalmo. Nō uidetur hæc Buphthalmos esse, quam rustici Bouis oculū, & Cottulam cognomento, foetidam ab odore appellant, pratenfam herbam, q̃ eius candidi flores sunt, Buphthalmi uero lutei, ut Dioscorides & alij testantur: etiamsi cætera satis cum ea congruāt. Est & alia Buphthalmos, de qua in Cucumere syluestri diximus. Buphthalmon Dioscorides & Hæluron dici meminit. Ego & Hælurion uocari quandam stirpem lego apud Photionem: diuersa, nec ne sit, haud constat. Porro Hæluos animal est, quod nos Felem appellamus, uulgo, ut qdā interpretantur, Cattus: quod & Aegiluros quoq; dicitur a poetis. Inuenio & Chalcan uocari purpurā, & herbę genus, quo purpura tingit, apud Photionē grammaticum.

Quæ Solis oculū Parthenion uocari causa fecerat, per ambitū floris radiata folia, & in medio discus colore luteo, eadē similē illi Buphthalmon nominari fecit. Figura floris em̃ in utraq; paulo minus q̃ eadē: sola magnitudo discrimen facit. Eamq; ob causam, nomen hæc sibi a maiore maioris quadrupedis oculo inuenit, Bouisq; oculus dici uoluit: & si a magnitudi ne oculi simpliciter potius dictā forte aliquis non male credat, præsertim dicente hoc ipso simpliciter esse ὀφθαλμοειδῆ, quod tantum figura & specie oculi significat. Plinius tamen. . . uolumine, capite. s. his uerbis eam descripsit. Est & Buphthalmos similis boum oculis. Quem nos secuti, Bouis oculum interpretati simus.

D

γλυκύσιδος
πασιγία

De Pæonia. CAP. CLVIII.

Pæonia mas, siue Glycyfide, Græcis aliquibus Pentoboron dicitur, alijs Orobælion, quibusdam Orobax, alijs Hæmagogon, alijs Pefeden, alijs Monogeniō, alijs Meniō, alijs Pæoniō, alijs Panthice ratos, alijs Idei Dactyli, alijs Aglaōphotis, alijs Theodoniō, alijs Seleni on, Magis Selenogonō, alijs Phthisis, Romanis Casta. Caulis altitudine sesquipedis adolefcit, comitātibus multis stolonibus. Huius duo g̃na, Mas folia luglandis habet. In foemina uero Smyrni more diuiditur. Summo caule siliquas emittit ueluti græcas nuces. In quibus quum dehiscunt, multa granula rubra, acinis puniceorum similia, inueniuntur, & in medio nigra, quinq; aut sex, purpurea. Radix maris tenuis, digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba. Foeminae radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inherēt, ut in Hastula regia. Foeminis a partu non purgatis, sicca radix datur. Ciet menses nuci græcæ magnitudine pota. Sic uentris doloribus cum uino auxiliatur. Valet contra regium morbum, & renum ac uesicę dolores. Decocta in uino, aluum sistit. Rubra grana rubenteis menses sistunt, decem, uel duodecim pota in uino austero & nigro. Stomacho & erosionibus eius esse prodest. A pueris pota, initia calculorum eximunt.

Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, uulnæ strangulationibus, & matricis doloribus, quoddecim numero pota, in aqua multa, aut uino. Nascitur in altissimis montibus, & promontorijs.

VETUSTISSIMA inuenta Pæonia est, auctorisque nomen retinet. Theodorus apud nos Dulcissimam uocauit: quia Glycyfiden Græci quoque dicerent. Nascitur opacis, syluosisque montibus. Caule palmorum duum. Inuenio & digitorum quatuor, ab eodem Plinio descripta, cute Lauri subrutila, agnascens duobus, aut tribus, ferente in cacumine, uelut amygdalis quatuor aut quinque. folio nucis pinguiore, rotundioreque ac minore. Inhaerent & radicibus maris glandulae, sed plures quæ octo: quoniam non una radice nituntur. Fœminæ folia myrrham redolent, & densiora sunt. Radices, fructusque legi noctibus præcipiunt: quia Picus Martius interdum facere dicatur impetum in oculos: alioquin effodientibus radicem Pæoniæ, sedes procidit, si Theophrasto credimus. Confictum id ad uenditationem rei Plinius existimat. Hanc & Ephialtion uocabant antiqui, utpote contra suppressiones incuborum, faunorumque nocturnas ualentem. Seleucus Glycyfiden, pomi genus, specie fici tradit, quod mulieres maxime deuitent, infatuationis metu. Ita enim μετασμός interpretor. Glycyfida porro dicta est Pæonia, quæ acinos Mali punici similes habere uideatur. Nam Sidan, Malum punicum a Boëtis uocari, supra docuimus.

Pli. li. 27. ca. 10

VNum Pæoniæ genus tantum tradidit Theophrastus libro. 9. de plantarum historia, quo loco, nisi a Plinio ipsam uerbis redditum esset, quod ab eo traditur, non diceremus. Id huiusmodi est. ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα ἄσπερ ἐπίθετα καὶ πρὸς ὧν. ὅσον τῶν παιωνίων οἱ δὲ γλυκύσιδον καλοῦσι νύκτωρ κελύουσιν ὀρεῖν, ἵνα γὰρ ἡμέρας, καὶ ὁρῶν τις ὑπὸ δρυνοκαλάπην τὸ μὲν καρπὸν ἀποκλῶν, κινδυνεύει τοῖς ὀφθαλμοῖς. Quorum sensus sit, ut Plinius etiam reddidit (uerum adijciuntur hæc, & ex longinquo) Quemadmodum Pæoniam, quam Glycyfidem uocant, noctu effodi iubent: quoniam si per diem fodiatur, uideatur Picus auis, qui semen legit oculis periclitatur. Vidimus nos, renascentemque aliquot annis utramque Pæoniam obseruauimus: & ex his, quas habebant ambæ præcipuas & certiores notas, folia scilicet, caules, folliculos, & in folliculis semina, nihil scriptoris huius historiae aptius respondere uisum est.

B

De Lithospermo.

CAP. CLIX.

LITHOSPERMON alij Aegonychon uocant, alij Leontion, alij Leoninum lapidem, alij Gorgonion, alij Tantalitin, alij Diosporon, Romani Columbam, Daci Gonoletam, alij Heracliam. A seminis duricia nomen accepit. Folijs est Oliuæ longioribus, & latioribus. Iacent humi, quæ ab radice exiliunt. Ramulis furculosis, rectis, tenuibus, firmis, crassitudine iunci. In quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent. Folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, Erui magnitudine, duricia lapidea. Nascitur in asperis & æditis locis. Vim hanc habet, ut semine cum uino albo poto, calculus frangat, pellatque urinam.

λιθόσπερμον

LITHOSPERMON, herba quincuncialis, fere folijs duplo maioribus quæ Rutæ. Gerit iuxta folia singulas ueluti barbudas, & in earum cacuminibus, lapillos uelut aurificum arte, inter folia eius alternos, candore & rotunditate margaritarum: ipsi qua pediculis adhæreant, cauernulas habent, & intus semen. Nascitur & in Italia, sed laudatissimum in Creta; lacere, atque humi serpere auctores tradunt. Plinius uulsam, non hærentem uidisse meminit. Hanc a Theophrasto Diospyron, quasi Iouis tritum appellatam arbitror, ut in Ceraso communui. Lithospermon, & Aetonychon, nonnulli dixerunt. Est & alia Lithospermon, nihil a supradicta differens: nisi magnitudine: ut quæ non serpat, sed arbutu modo fruticet.

Pli. li. 27. ca. 11.

Theophrastus Diospyron inter segetes nascentem herbam, aut hanc, aut huic similem indicat, Fecit eadem soliditatis ratio, ut Herculeæ etiam diceretur: facilis inuictu herba: tamque certis

M. uij

D I O S C O R I D I S

C notis, ut nullibi legentes possit fallere. Nos sæpe uidimus, sed multo minore semine, q̃ Plinius tradiderit: qui libro. 27. capite. 10. magnitudine Ciceris semina eius describit. Quæ aut̃ nos uidimus, magnitudine grandioris Milij erant. Cætera eadem illi & naturæ sunt. Nec quicq̃ felicius in descriptione eius a Plinio dictum est, q̃ cum dixit: tantus est decor, ueluti artificum arte inter folia indicantibus margaritis. Illis enim duricia, læuore, rotunditateq̃ optime comparata fuerunt. Color tamen liuescens in his seminibus est: qui in margaritis candidus passim uidetur. Sed hæc terræ, cœliq̃ bonitas uariare facile potest.

De Phalaride.

CAP. CLX.

φάλαρις

Phalaris cauliculos emittit, quales Zea, e minutis, ac nullius usus radicibus, multos, duum palmorum, geniculis cinctos. Semen candidum, oblongum, Milij magnitudine. Tunditur, & in aqua, aut uirgino succus ad uesticæ cruciatus utilissime bibitur. Semen cochleari mensura potum, ad eadem efficax est.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 27. ca. 12.

Phalaris, caulem habet longum in summo flore, qui spicaceus a nobis uisus est, inclinat, semen simile Sefamæ.

EX M. VERG. COMM.

Ostenderunt nobis herbarij aliquādo uno tantū culmo magis q̃ caule, aut calamo, ex terra surgentē Phalarim. Verioremq̃ Plinij q̃ scriptoris huius historiā fecerunt: qui thyrsū habere tenuem, longū ceu calamū eam ait. Hic tamē numero multitudinis καυλία πολλά, quod est, coliculos multos illi tribuit. Cætera omnibus eadem erant. Erant & in ea quam uidimus folia alternis hinc & hinc per interualla toto caule disposita: & in summo ceruleus spicatus flos, sed raris in spica illa floribus.

D

ῥυθροδανόν

De Rubia.

CAP. CLXI.

ERythrodanū aliqui Teuthrion, alij Dracanon, alij Cinnabarim, Latini Rubiam, Etrusci Lappam minorem, Aegyptij Sophobi uocant. Radix rubra est, qua tinguntur lanæ. Vna sponte provenit. Altera feritur, ut in Thebana Galileæ, & Rauenna Italiæ. In Caria inter oleas, ut in aruis solo creditur. Hanc non sine quaestu ferunt. Namq̃ maximum ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules, & quadranguli, longi, Aparinæ non dissimiles, robustiores, & multo maiores. Folijs per interualla certa circum articulos stellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia uiride, mox rubrum, postea cum ematur uir nigrum. Radix tenuis, longa, rubra. Urinam ciet. Qua de causa regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsæ. Item Ischiadicis, & resolutis. Crassam, copiosamq̃ urinam pellit, nonnunq̃ & sanguinem. Bibentes tamen quotidie lauare oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare. Aduersus serpentium morsus, succum ex uino bibere prodest. Semen ex acetopotum, lienem absumit. Imposita radix trahit partus, menses, secundasq̃. Albæ uiriligini, illita ex aceto medetur.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 24. ca. 11.

ERythrodanum, & Ereuthodanum dicitur, folium Hederae, sed rotundius, serpit humi, ut gramen, locis umbris conspicienda, quinis per genicula caulium folijs. Laudatissima Italica, & maxime suburbana, & omnes pene prouinciæ scatent ea. Radice amara, & Anchusæ modo rubicunda, uelleribus tingendis, & pellibus perficiendis utili, præsertim Italica, ut Democrito placuisse dicunt: ob id a quibusdam appellata Byssos. Cæterum Byssos proprie Lini genus est, de quo Plinius. Honor inquit proximus Byssino, mulierum maxime deli-

cijs, circa Elin in Achaia genito, quaternis denarijs stipula eius permutata quondam, ut auri, Paulanias, Byssus inquit, non alia Græciæ parte nascitur, q̄ in Elide, tanta tenuitate, ut ne Iudaicæ quidem Byssò cedat: etiam si colore minus ruffet, q̄ Iudaica. De Byssò Iudaica pleni sunt sacrarum literarum codices.

EX M. VERG. COMM.
V Edigal rusticæ plebi non contemnendum, tota Ethruria, Florentinoq; præsertim agro ex non multo tempore Rubia est: noueruntq; eam pueri oēs per hyemē, quo tempore a rustico omni alio opere cessant, radices eius paruo ligone in sepibus eruscantes, inuentasq; & effossas tingendis lanis utiles uedentes. Radices eam lanariæ officinæ simpliciter in gente nostra uocant. Reliqui uero uulgus, q̄ asperitate sua tractata manibus picis modo hæreat, manus Piceantē noiant: nihilq; modo notius est, in sepibus, & ut passim uidere licet, umbrosis locis ubiq; nascentem. A rubore radices, quo lanæ & coria tinguntur, factum illi nomen est. Quemadmodum & a latinis ob eandem causam Rubiam dici ratiocinari facile est.

De Lonchitide. CAP. CLXII.
L Onchitis, quæ Cestron, aut Medusa alio nomine dicitur, latine Veneræ, aut Lanceolæ, folia habet latioris Porri, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, ueluti in terrā procumbentia, pauca in caule. In quo flores ceu galericuli hiantibus comicis personis similes, nigri, & uelut e rictu albam exerentes linguam, quæ ad labrum inferius semen promat, lanceæ simile, triangulum. Vnde sibi cognomen tum arrogauit. Radix Dauci. Nascitur in siccantibus & asperis. Radix ex uino pota urinam ciet.

BARBARI COROLL.
L Onchitis, non ut pleriq; existimauerunt, eadem est quæ Xiphion, & Phasganion. Qz q̄ semine cuspidaceo, radicibus prælongis.

EX M. VERG. COMM.
E Gregius & speciosus Lonchitidis huius flos est, & qualem hic describit in uerso pileolo similis, colore in purpura nigro: qui theatralis laruæ, & histrionice personæ rotunditate sua formam referat: ex cuius medio, quasi ex aperto & hiant ore, candido colore se profert, ueluti lingua. Ob quam causam aliqui Medusam, & florem, & ex eo plantā dixerunt, Gorgonis defecto capiti similem. Quæ specie in antiquis monumentis, monstri eius caput adhuc uidetur, q̄ maxime potest aperto ore linguam exerens. Cur autē Romani Veneræ dixerint, non satis certum nobis est: nisi forte folijs Acoro, quæ Veneræ dicitur, quadamtenus similis hæc sit. Quemadmodum quod nam lati seminis, aut fructus Porrum hic dicat: cui Lonchitidis folia a principio statim comparat. Nullum enim huiusmodi Porri genus in plantarum historia, aut medica materia auditur. Nisi forte capitatum ea uoce intellexisse oporteat.

De altera Lonchitide. CAP. CLXIII.
A ltera est Lonchitis, quam aliqui asperam Lonchitin, Latini Longinam, aut Calabrinam dicunt. Folia Scolopendrij emitit, sed asperiora, maioraq; ac multo magis diuisa. Vulneribus mirum in modum prodest. In eisq; inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienem absumit.

De Althæa. CAP. CLXIII.
A lthæa, quæ alij Althiocon, alij Ibiscū uocant, in syuestriū Maluarū gñe est, cui folia ut Cyclamino rotūda, lanugine canescunt. Flore rosaceo, bicubitali caule. Radice lenta, intus alba. Althæa appellat, q̄ inter primas sit utilis, et plurib. polleat remedijs. Decocta em̄ in uino, aut aqua mulsā, in potu efficax ē cōtra uulnera, parotidas, abscessus, māmārū

A

λογχίτις

Pli. li. 26. ca. 8
 lib. 25. cap. 11.
 B

τραχύτις
 λογχίτις

αλθαία

D I O S C O R I D I S

C inflamationes, attritus sedis, inflatiōes, neruorū rigores. Siquidē discutit, & excoquit, rumpit, et ad cicatricē perducit. Cocta, ut dictum est, adiecto fuillo adipe, aut anserino, terebinthinaue, ut malagmatis lentor fiat, facit ad uuluae inflamationes, preclusionesq; in pellis subdita. Decoctum eodem fungitur munere. Onera uuluae, reliquiasq; a partu extrahit. Decoctae succus ex uino potus, succurrit urinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis. Dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen, siccūq; tritum, uutiligines in sole perunctas emendat. Eodem cum oleo peruncti, a uenenatis non feriunt. Valet contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluiq; profluuium. In posca, aut uino decoctum bibitur, contra omnes uesperum, apum, similiumq; aculeatos ictus. Folia cum olei momento, moribus & igni ambustis illinuntur. Constat, aquam trita radice addita, sub diuo addensari.

B A R B A R I C O R O L L.
Medici Althæam uocādo, ut Theophrastus inquit, Maluam syluestrem intelligunt, ab excellentia effectus. A quibusdam Aristalthea dicitur, Anadendromalache a Galeno. Item E-biscus, siue Ibisus. Quod Plinius Althæam ab Ibisco separauit, in medicinae usu. Ibisus inquit, a Pastinaca gracilitate tantū distat: damnatus in cibis, & medicinae durat utilis: quā Græci *μαλάχην* inquit *ἀγρίαν* uocant, & aliqui Pistolochiam. Althææ folium Maluæ a Theophrasto redditur, sed grandius & pilosius, cauliculi molles, flos luteus, radix alba, neruosaq; semen Maluæ, gustus quoq; caulium, ut Maluæ.

E X M. V E R G. C O M M.
D Nihil Althæa græcis aliud est, q̄ si a medendo Medicam simpliciter dicas: quibus *ἄλθεα* in medicina pharmacum, remediumq; & *ἀλθαίνειν* uerbū mederi est. Nec aliter in Theriacis suis Nicander *ἀλθινα* aliquid sæpe appellat. Hanc Palladius in Orobri mense Hibiscum dici, his uerbis testat. Althæe, hoc est, Hibisci folia, &c. Vtutq; ea, ut uerbis eius utamur, ut ex molli forte uinum fiat. Theophrastus syluestrem esse Maluam libro. 9. de plantarum historia confirmat his uerbis. *ἡ δὲ ἢ οἱ πρὸ ἀλθαίων κύνειοι δὲ μαλάχην ἀγρίαν καλοῦσι*. Quod est, Et eam quam hi Althæam, illi uero syluestrem Maluam appellat. Galenus Anadendromalachen uocauit, quā si arboream, siue arborecentem Maluam. Plinius diuersis locis. 19. 20. & 21. uoluminibus, plura Maluarum genera describens, non satis certam earum historiā tradit. Nos Græcos, & hunc præsertim scriptorē secuti, præcipua duo Maluarū genera fecimus, alterū secundo, alterum tertio hoc uolumine tractatū. Non ignorantes, hæc ipsa a quibusdam iterum diuidi, & in utroq; genere satiuam, & sponte sua nascentē numerari. In priore illa hortensem, quā in cibis pro oleo uterentur, & locis incultis nascentē: ut tunc in Maluæ cōmentationibus nostris longius diximus. In posteriore hac syluestrem esse, quæ duabus illis undiq; procerior sit, altiusq; a terra erigatur, & in hortis consita arborecit, multoq; maiores flores, nec minore ambitu Rosarū profert. Verūtamen quæ artificio & opere humano meliorescunt, diuersi generis ob id censenda non sunt. Descripsit Althæan hanc Theophrastus eodem libro. Quodq; in nullo Maluæ flore, quod hactenus ipse uiderim, aut ab alijs audierim, luteum illi florem dedit. Nec nos scimus, quomodo naturæ, & alijs scriptoribus in Malua color ille respondere possit. Ostendit quoniam in omni Malua natura inter ruborem & purpuram splendentē florem. Hic etiā Rhodoides, quod est, Rosæ simile dicit esse, neq; ad formā magis, q̄ ad colorē referri id oportet. Quo fit, ut peritioribus dirimendā inter Theophrastū, scriptoresq; alios tam grauē litem relinquamus.

De Alcea. **C A P. C L X V.**
Alcea syluestrium Maluarum generi assignatur. Folia habet diuisa, Verbenacæ proxima, caules treis aut quatuor, cortice canabino uestitos. Florem Rosæ, paruum, radices albas, latas, quinq;

aut sex, cum plurimum cubitales. Quæ cum uino, aut aqua potæ, dy- **A**
fentericis, ruptisq; medentur.

B A R B A R I C O R O L L.

Alcea caulibus foliosis. Nascitur in pingui solo, nec sicco: quam & Peristereon cognomi-
nant, a similitudine foliorū, ut consilio. Ipsam quoq; Leonis caudam, qua multum pollet a-
nimal id Homero, Catullo, & Plinio testibus, appellant Græci Alceam. Differentia in eo, ut
quibusdam placet, q; herba diphthongum non habet in penultima. Dicitur, & Cercis cauda
eius. Qzq; & herba quædam Cercis est, e qua radij fiant textoribus, unde & nomen.

E X M. V E R G. C O M M.

Breuis in antiquis græcorū medicis Alceæ huius historia & medicina est. Nec Plinius ali-
ter a Dioscoride lib. 27. capite. 4. de ea agit. Nos etiā, quod illi adiciamus, non habemus. Illud
tantū tacuisse nolumus, in antiquissimis latinis codicibus coniunctā superiori hanc esse, unoq;
capite de utraq; agi. Quod fecisse congener earum natura uidetur.

¶ De sylvestri Cannabe. C A P. CLXVI.

Sylvestris Cannabis, quam aliqui Hydrastinam, Romani Termi-
snalem uocant, uirgas fert Althææ similes, minores, nigriores, &
asperiores, cubiti altitudinem æquantes. Folio satiuæ, nigriore & asperi-
ore, flore Lychnidis, subrubro semine, & radice Althææ. Decocta radix,
illitu inflammationes mulcet. Tumores discutit. Tosos articularū dissipa-
pat. Huius cortex, torquendis funibus accommodatus.

καλλιόκη δρυς

¶ De satiuæ Cannabe. C A P. CLXVII.

Satiuæ Cannabim aliqui Cānabion, alij Schinostrophon, alij Aste-
rion appellarunt, plantam magni in uita usus, ad robustissimos fu-
nes faciendos. Folijs mali, graui odore, caulibus procæris, inanibus, se-
mine rotundo. Quod largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea re-
cente, conuenienter aurium doloribus instillatur.

B

B A R B A R I C O R O L L.

Fvnes Cannabini præferuntur in sicco, ferulacei generis. Hæc herba optima Alabandi-
ca, plagarum usibus præcipue. Triā ibi eius discrimina. Improbatur cortici proximum, aut
medullæ. Laudatissimum est e medio, quod & Mesa uocant. Secunda commendatio Mi-
lase; nam quod ad proceritatem attinet Rosea, agri Sabini arborum altitudinem æquat. Se-
ritur a fauonio ubiq;. Quo densior, eo semen eius, cum est maturum, ab æquinoctio autu-
mni defringitur, & sole, aut uento, aut fumo siccat. Ipsa Cannabis, post uindemiam carpi-
tur, & lucubrationibus decorticata purgatur. Varro, Gellius, & Palladius, Cannabum, non
Cannabim appellant. Sanè Cannabus, græcè lignum illud gracile significat, in quod pileum
uicilibus, aut centonibus intexitur, ob id Samyrionē poetam fratris Cānabum uocabat, pro-
pter macilentiam, ut inquit Pollux.

Pli. li. 19. ca. 9.
lib. 20. cap. 25.

¶ De Anagyri. C A P. CLXVIII.

Anagyris, quam aliqui Acopon, alij Anagyron, alij A-
gnacopon uocant, frutex est arboris instar, grauis odore, folijs
Agni, uirgisq; flore oleris. Semen in corniculis non breuib; gignit,
subrotundum, firmū, uersicolori facie, simile renibus, quod durefcit per
messes. Tenera folia tumores illitu reprimunt. Si partus hæreat, & secun-
dæ, mensesq; morentur, drachmæ pondere bibuntur in passo. Sic & sus-
piriosis dantur, & cōtra capitis dolores in uino. Difficulter parientibus,
adalligantur, ita ut a partu statim auferantur. Radicis cortex con-

ἀνὰ γυρίον
ἀνὰ γυρίον

D I O S C O R I D I S

Coquendis, discutiendisq; adhibetur. Semen commanducatum, uomitiones uehementer ciet.

Pli. li. 27. ca. 4.

A NAGYRIS, odore tetro prouerbium peperit, contra eos, qui offutura sibi comouent. Dicitur & Anagyros. Hanc sunt, qui a Plauto Nauteam uocari putent in Asinaria, sed auctiorem non habent. Nauteam porro herbam grauem esse scribit Festus, qua coriarij utantur: a nauis nam, quasi nauseam.

E X M. V E R G. C O M M.
Foret Maio & Iunio mensibus grato inter alios frutices per syluas spectaculo Anagyris: multoq; flore, quem flauum ex longinquo ostendit, prætereuntium oculos facile in se conuertit: & si abesset ingratus odor, quo merito spretus, damnatusq; est, antiquorum coronas primus nobilitasset. Fruticosa stirps magis q; arbor est. Nos tamen uidimus tonsura, putationeq; coactam ad legitimam arboris altitudinem crescere: nullumq; florente ea lætius spectaculum, aut syluæ, aut agri, si forte consista in eis fuerit, ostendunt. Respondent naturæ omnia, quæ in historia a Dioscoride illi tribuuntur.

κίττα

De Cepæa. CAP. CLXIX.
Cepæa Portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in uino pota, urinæ stillicidio, & uescicæ scabie laborantibus, opitulatur. Maxime id præstat, si cum decoctione radicum Asparagi bibatur.

B A R B A R I C O R O L L.
Cepæa, quasi hortensianam uoces, radice nigriore q; Portulacæ inutili. Nasitur in littoribus arenosis, gustu amara, ut inquit Plinius, etiam si deprauata in eo habetur lectio.

E X M. V E R G. C O M M.
DHorrense olus Cepæam esse, uox ipsa, & Portulacæ similitudo indicauit: & si Plinius libro 26. capite. 7. in harenosis littoribus nasci tradat. Nullibi in græcis, præter q; in scriptore hoc de ea legisse memini. Non potest incognita aliter a nobis describi: capropter qualem in græcis inuenimus, eam legentibus tradimus: illud tantum monentes, scribere Plinium quæ ab hoc non dicuntur, nigriore radice q; Portulacæ esse, eaq; inutili: & præter id gustu amaram, simpliciterq; cum Asparagi radice uescicis plurimum prodesse: & præter Plinium, Paulum Aeginetam stillicidijs uescicæ utilem dicere: uerum non omnibus, sed his tantum quæ sunt, ut ille ait, καὶ ὑποφύσσει, id est, opplente urinæ iter obice aliquo.

ἄλμα
ἀλματώδης

De Alismate. CAP. CLXX.
Alisma, alij Alceam, alij Damassionion, alij Acyron, alij Lyron appellant. Folia ei Plantaginis, nisi angustiora essent, laciniosa, connexaq; in terram, caule simpliciter tenui, cubito altiore, capitibus Thyrsi. Flore tenui, candido, pallecente, radicibus tenuibus, ut Veratri nigri, acribus, odoratis, pinguibus. Aquosos amat tractus. Radix si drachma una, aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem maris num deuorarunt, aut a rubetis ranis demorsi sunt, aut opium hauserunt. Torminibus, atq; dysentericis, per se, aut cum pari modo Dauici, potui datur. Conuulsis & contra uitia uulvæ prodest. Hærbæ sistit aluum. Menstrua pellit. Tumores illita mitigat.

Pli. li. 27. ca. 101

B A R B A R I C O R O L L.
Alismatis, siue Damascenij huius folia magis laciniosa, q; Plantaginis uidentur. Alio qui similiter uenosa, radicibus densis. Alterum genus eiusdem in syluis nigrius, & maioribus folijs. Plinius hanc herbam uidetur quodam loco appellasse Caucalin: sed mendosam in eo lectionem monstrauimus.

Damafoniū Plinius. 26. uolumine, capite gnto Alisma appellat: & si corrupta illic ea uox sit. Idem. 25. capite. 9. eandem Alisma uocat: additq; Damafonion & Lyron uocari, eandem appellationem ceteris modo preponens, modo subiiciens, nec alijs notis q̄ Diosc. eam descripsit. Quod tñ hic *supra* dicitur, quæ uox thyrsi figurā tñ significat, ille capite thyrsi ait, duo breuius forte complexus q̄ exigeret sibi rei non satis nunc certè intellectus: & thyrsi formā in caule eius, & in sumo caule capitulū. Thyrsum autē hic intelligit uirgam potius q̄ hastā frōdibus uestitā: quæ in orgijs & cœtu Bacchi a comitibus eius gestaretur. Nos etiā quod a Diosc. torminibus & in testinorū torminibus cum pari Dauco prodesse Alisma dictum est, cum pari semine eius diximus ex eodem hoc scriptore, qui in Dauco semine tantū eius utitur contra tormina.

De Onobrychide. CAP. CLXXI.

Onobrychis, quam e Græcis aliqui Onobrochilon, alij Eschasmenem, alij Corion, alij Chamæpityn, Romani Opacam, alij Brichilatā, alij Loptā, alij locinalē, Daci Aniassexe appellāt. Folia habet lentis, lōgiora paulo, caulē dodrantalē. Florē purpureū, Radicē paruā. Nascitur in uliginosis. Hæba suapte ui, si trita illinat, tubercula dissipat. Cum uino pota, strangurias sanat. Illita ex oleo, sudores mouet.

BARBARI COROLL.

Onobrychis, radice gracili nascitur circa fontes.

Nihil in Onobrychidis historia Dioscoridi Plinius addidit, isdem notis & uerbis. 24. uolumine, cap. 16. eam describens. Nihil etiā in medicina Paulus Aegineta, amboq; ex hoc scriptore tñ eam tradiderunt. Neq; ex tam multis eius appellationibus, unam saltem cōmentarijs suis adiecerunt. Ex eo conijcere licet, nouas esse omnes, & ex similitudine adiectas illi pro tempore fuisse. Nec nos quod pro cōperto cōstituere de ea ualeamus, q̄c̄q; habemus. Herbarij q̄ aliqui nobiscū egerunt, uicinitate nominis decepti, cū Onochile, quæ ab asinorū labris dicta est, miscerent: quemadmodum in Anchusis quarto uolumine non multo post patebit. Si uocis rationē nouisse aliquis amet, nihil q̄ asini rudium Onobrychis significabit. Verum ut paulo ante diximus, nihil neq; ex hac, neq; ex alijs causis de re & nomine pro comperto nobis est.

De Hyperico. CAP. CLXXII.

Hypericum alij Androsæmon, alij Corion, alij Chamæpityn appellant, quoniam semen odore resinam imitatur. Surculaceo frutice, dodrantali, rubente. Folio Rutæ, flore albæ violæ simili, qui digitis tritus, sanguineū succū remittit. Qua ex causa Androsæmon cognominat. Subhirsuta siliqua, et tereti, hordei magnitudine, semine intus nigro, resinosi odoris. Gigni in cultis & asperis. Vrinam cit. Menstruā pellit appositū. Tertianis, quartanisq; cū uino potū liberat. Semen xxx. dieb. haustū, ischiadicis medet. Folia cū semine illita abusta sanāt.

BARBARI COROLL.

Hypericon, frutex est oleaceus et tenuis, acri odore, cubitali, nigro semine, cū hordeo maturo rescente, ut Plinius demonstrat. Caput hoc ad uerbū in syluestri Rutæ supius a Diosc. repetitur. Reuitati consulentes, monemus solum duo Hyperici genera facere Pliniū lib. 26. ca. 9. Primum hoc q̄d Corion uocari ait: & quartum in hoc ordine, quod mox a nobis tradet Corindici, ab eo traditum: contra ea quæ a scriptore hoc docentur: dicente palam Ascyron Hyperici genus esse, & Androsæmon ab Hyperico & Ascyro differre tantum. &c.

De Ascyro. CAP. CLXXIII.

Ascyrum, quod a quibusdam Ascyroides nominatur, Hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habens

A

ὄνυβρυχις

B

ὑπερικόν
ἀνδρυσάμων

Pli. li. 26. ca. 9.

VERG.

ἀσχυροειδής

N

D I O S C O R I D I S :

C ramos, rubētia folia, tenuia. Flores luteos, & fructum resinofum, Hyperico non abfimilem. Cuius attritu digiti fere cruentantur. Qua de causa Androsæmum uocauere. Vfus seminis ad ischiadicos. Potum in hydromelitis sextario, biliofa recrementa amplissime detrahit. Sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur. Illinitur et ambustis efficaciter.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 5. **A**scyron, & Ascyroides similia inter se sunt, ut inquit Plinius, sed Ascyron maiores habet ramos, Ascyroides uero ferulaceos, omninoq; rubentes. Semen utriq; in caliculis nigrum, pusillum. Comæ Ascyri trita, uelut cruentatæ apparent.

B A R B A R I C O R O L L.

Separat Plinius Ascyron ab Ascyroide, duo eiusdem plantæ genera faciens. 27. uolumine, capite quinto. Describitq; priuatim & ex proprijs utranq; notis. Hic tamen unum, quod bifaria uocetur Ascyron. s. & Ascyroides esse tradit. Nec alibi, quod hæcenus inuenerim, Ascyroides aliquod Dioscoridi est. Plinij tamen historia diuersitatis huius causam indicat. At enim ille. Ascyron & Ascyroides similia sunt inter se, sed Ascyros maiores habet ramos, qui Ascyroides uocantur, ferulaceos. &c. Similia inter se Plinius duo hæc ait esse, & sola magnitudine differre: quæ quoniam potest bonitate cœli terrq; fieri, a Dioscoride neglecta est. Vnumq; genus fecit, quod forte ante se herbarij alij duo fecerant: quos secutus Plinius, diuersam ab hoc uidetur Ascyri historiam tradidisse, quæ tamen una in utroq; est.

De Androsæmo. C A P. CLXXIII.

*Androsæmon
duos uides*

Androsæmon, siue ut alij appellauere Ascyron, aut Dionysiasdem, ab Hyperico, Ascyroq; differt: quod surculosum ac tenue sit. Rubentes rami, & folia Rutæ duplicia, aut triplicia. Quæ trita, uinoso succo manant. Complureis alas habet in cacumine, in uersus utrinq; digestas. In quibus flores pusilli, lutei, & in caliculis semen pauperis nigri, insigne lineis. Huius comæ trita, resinofum odorem reddunt. Semen drachmis duabus potum, biliofa excrementa pellit. Ischia dicis medetur, sed a purgatione aquam exsorbere oportet. Herba ambustis illita medetur. Vulneribus sanguinem cohibet.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 5. **A**ndrosæmon, non abfimile Hyperico est, cauliculis maioribus, densioribusq; ac magis rubentibus. Folia alba. Gignitur in uineis, fere medio autumno effoditur, suspenditurq; Galeus Androsæmon duplex inquit est: Ascyron, siue Ascyroides, de quo supra uidelicet locutus sumus. Alterum Dionysias priuatim appellatum ab aliquibus. Vtriq; par effectus.

De Cori. C A P. CLXXV.

Cori

Cori, quod aliqui Hypericon uocant, frutex est folio Ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior palmo, suauis, odoratus, acris. Potum semē menses trahit & urinas. Cōtra Phalangiorum morbus ex uino potum auxilio est. Rigoribus ex pipere, opisthotonicis ex oleo aptissime illinitur. Radix uino decocta, potaq; defectis, opem ferre creditur. Sed laborantem inter potandū q̄optime coōperiri licet. Si quidē corpus totū desudabit, ex qua re pristinā agilitatē recuperabit.

B A R B A R I C O R O L L.

Cori sub Tamarice nasci dicitur, folijs minus rubentibus, leniter aculeatum. Hippocrates Coren hanc uocauit, ut Galenus inquit, argumento seminis, q̄ Pupulæ similitudinem præsentat: quanq; sunt recentiores, qui Pupulam, siue Pupillam dicendo, herbam a Dioscoride si uiri appellatam significent.

LIBER TERTIVS.

313

EX M. VERG. COMM.

Vndiq; totoq; corpore rubentē Corin hanc nobis aliquot herbarij ostenderunt. Dico autem undiq; & toto corpore, folijs, ramulis, & florum doliolis. Hic tamen rubere tantum folia ait. Natura Corim rubentem totam fere ostendit, uerum inæqualiter, aliquaq; parte magis: aliquaq; uero minus. Ob quam causam credimus & hunc, & Plinium ex ruboris abundantia, rubere tantum eius folia dixisse.

A

De Aiuga. CAP. CLXXVI.

CRæcis Chamæpitys, alijs Pityforylis, alijs Orizelon, ijs qui Pontum incolunt Olocyron, alijs Bryonia syluestris, Athenis Ionia, Euboicis Sideritis, Magis Mineruæ sanguis, Latinis Aiuga, aut Cypripum, Dacis Dochela appellatur. Herba in terra repens, incurua, folijs semperuiui minoris, multo tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ramos densis. Odore Pinus, flore tenui, luteo, uel candido, radicibus Cichorij. Folia septem diebus in uino pota, regio morbo medentur. Et quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicos sanant. Dantur peculiariter urinæ difficultatibus, iocineris & renum uitij. Torminosus profunt. Ea apud Heracleam ponticam, perinde atq; antidoto contra aconitum utuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta. Trita in farinam, & cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit. Excæpta melle cum æris squamma & resina purgat. Apposita ex melle, uulua uitia extrahit. Mammarum duricias discutit. Vulnera glutinat. Vlcera quæ serpunt, cum melle illita cohibet.

χαμμήπιτυς

B

BARBARI COROLL.

Chamæpitys, & Aiuga, siue Abiga dicitur a latinis propter abortus. Inuenio et Ibigam uocari: quod nomen fere seruant hodieque Illyrici, nostrum uulgus Iuam. Est ubi appellatur, ut inquit Plinius, etiam Tus terræ, tria eius discrimina reddēdo. Vnum sesquipedalibus furculis, flore Pinus, & odore. Alterum breuius & incuruū. De tertio dicemus paulo post, sua mentione. Recentiores aliam Chamæpityn nouerunt, eiusdem (ut ipsi arbitrantur) effectus, folio Saluæ rimoso, angustiore tñ, & ad radicē maiore, flore subcādidō, ac luteo, e folliculis schæreg. i. cristæ gallinacæ similibus, sapore Pinus, in maritimis mōtibusq; nascentem, nigro semine: quæ non serpit. Chamæpityn Athenis, alijs Dionysiam, alijs Didoniam, alijs (qđ uerius existimo) Ioniā uocari scribunt, ut Apollodorus, & Athenæus. Item alijs Holocyron, ut Dioscorides, & q̄s mō nominauimus. Alijs Holocleron, ut Paulus. Credo librorum culpa uariatū fuisse in uocabulo: sed res constat, satis est. Nicander Ionida quandam herbam nominat, fortasse Chamæpityn significare uoluit, pumilam & humilem eam dicendo.

Pli. li. 24. ca. 6.

EX M. VERG. COMM.

Plinium imitati ante nos interpretes alijs, quocūq; loco nos Piceam in hoc capite diximus, ubiq; Pinum dixerunt. Ille enim, 24. uolumine, capite. 6. Chamæpityn describens, flore Pinus, et odore esse dixit. Idem non multo post Pityusam pariter describens, Frutex est similis Piceæ ait, eandem in duobus nominibus græcorum Pityn diuersa interpretatione ostendens. Per cuius uestigia ingressus Barbarus, eadem uarietate quam Pityn primo uolumine Piceam dixerat, hoc loco Pinum dixit. Nobis quod semel primo uolumine dictum probatumq; fuit, serua re hoc loco etiam placuit: poteruntq; cupientes ex nostra Piceæ commentatione causas, rationesq; nominum huiusmodi cognoscere. Quia Piceam olent folia eius, Chamæpitys dicta herba hæc est. Quæ etiam causa fuit, ut Tus terræ uocaretur: qm̄ totius Pinorum generis resina Tus olet: hæc autem Piceam. Triplex Chamæpityos huius genus est, diuersis inter se partibus alijs, sed eodem Piceæ odore: ob quam causam creuerunt per tempora tam multe eius appellationes, alijs plantis, alijs eas comparantibus herbarijs, & ex his, illisue notis eas describentibus.

N ij

D I O S C O R I D I S

C De altera Aiuga. CAP. CLXXVII.

Alterum est genus Aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, præcenuibus, coma præcedentis, flore candido, semine nigro. Hæc Pinum redolet. Tertia mas nominatur, paruula, folijs exilibus, albis, scabris, caule aspo, cādido, luteis florib. semine iuxta alas. Resipit hæc Pinū. Vim eandē obtinet, sed nō usq̃ adeo efficacem.

BARBARI COROLL.

DE Chamæpitye secunda dictum est in prima.

¶ Chamæpitys tertia folijs scabris, caule digitalis crassitudine aspicitur.

¶ Finis LIB. Tertij.

P E D A C I I

D I O S C O R I D I S

De Medicinali materia. LIB. Quartus;

IO. RVELLIO interprete.

D



Per superioribus libris, amāssime Ari, tradidimus de odoramentis, oleis, arboribus, unguētis, animabus, frumentis, oleribus, radicibus, succis, herbis, seminibusq̃. In hoc autem Quarto differemus de radicibus, & eis quæ restant hærbis.

κίτρον
ψυχότροφον

¶ De Betonica. CAP. I.

Cestron Psychotrophon uocitatur, quoniam frigidis locis inueniatur. Latini Betonicam appellant. Hærbæ est, caulem ferens tenuem, cubiti altitudine, aut maiore, quadratū, folia Quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicē maiora. In fumis caulibus, semē ueluti Satureiæ spicātū inest. Decerpta huius folia siccantur, plurimos ad usus. Radicibus nitiū ut Veratri tenuibus. Quæ ex hydromelite in potu, pituitosam uomitionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieribus uulū malo oportunis, & ad laxandos uteri strangulatus, drachmæ unius pōdere cū hydromelite. Tres in uini sextatio drachmæ, contra serpentū morsus edibunt. Hærbæ magna utilitate illatis a serpente uulneribus illiniū. Aduersus etiam uenena, drachma ex uino pota conuenit. Præsumpta ea, si uenenū hauriatur, nihil nocebit. Vrinam ciet. Aluum subducit. Medetur comitialibus, & insanis, pota ex aqua, & iocineris lienisq̃ uitijis, drachmæ pondere in aceto mulso. Concoctionē adiuuat, si q̃s ea fabæ magnitudine secundū cœnā cum melle cocto deuorari. Modo consimili acide ruçantibus ppinari.

Stomachicis eam manducare, & succū deuorare proderit, si postea dilu-
lutum uino sorbeat. Datur sanguinem excreantibus tribus obolis,
cum diluti uini, aut lactis cyatho. Ischiadicis, renum & uesicæ dolori-
bus ex aqua. Aquæ intercutem binis drachmis ex hydromelite. Regio
morbo laborantes recreat. Menses pellit, drachmæ pondere cum uino
pota. Alium purgant drachmæ quatuor potæ, in hydromelitis decem
cyathis. Facit cum melle ad tabem & purulentam excreationem. Folia
secca, tritaq; fictili uase reconduntur.

HERMOLAI BARBARI

Patricij Veneti, & Aquileiensi Patriarchæ Co-
sollariorum LIB. Quartus.



Cestron a Vetonibus inuentam in Hispania, Betonicam in Gallia nominari coe-
ptam putant. Alij Chironem, alij Gomistem, prophetæ Hieracæ, Thufcia Indi-
cem, alij Pendouiam, Syri Periponion, alij Sideritin, alij Theriopauon, alij *Θειον*, hoc est,
radicem diuinam, in Italia Serratulam uocauere. Caulem habet interrim cubitorū duum, a ra-
dice spargens folia fere Lapathi, ut Plinius inquit, serrata, semine purpureo, ut idem autor est,
seu stamine purpureo, ut Dioscorides, qui hoc dicit in altera mentione Betonicæ. Fit uinum ex
ea, & acetum medicis. Multum differt specie, non effectu alia Betonica, ut Paulo Aeginetæ pla-
cet, uniuersis ramulos habens Pulegij, tenuiores, & gustu satuos, in petrosis fere protueniens.

Pli. li. 25. ca. 3.



MARCELLI VERGILII

in Dioscoridem ANN Orationes abbreviatæ.

Vod forte desiderauerit aliquis, non relinquemus. A uarietate & copia remedio-
rum Cestron a græcis dictam fuisse, quimulta alia una hac appellatione indicaue-
runt. Telum primo, quod perseo bello inuentum fuerit. Opus inter punctum, acuius picum.
Veneris & foeminarum ornatum, & si priuatim Cestros hic dicatur. Libri præterea a uarietate
subiecti, ab aliquot græcis hoc titulo inscripti sunt. Sic etiam Plinius aliquando Ebur Cestru,
id est, picturatum dixit. Latini ab inuentoribus cognominata Vetonica semper uocauerunt.

B

De Britanica. CAP. II.

Britanica, aut Vetonica, folia habet syluestris Lapathi, sed ni-
griora, & densiora, gustu adstringentia. Radicem tenuem et bre-
uem. Caulem paruū emittit. Folijs exprimitur succus, qui igni aut sole
cogit. Vinū habet adstringentē. Priuatim depascentibus oris, et tonsilla-
rū ulcerib; cōmodatā. Valet etiā ad reliqua, quibus adstrictio est opus.

Βριτανικη
Βιττονικη

BARBARI COROLL.

Britanica, in insulis Oceani, aut in confini Britanniae Oceano reperta est, folia habens oblon-
ga, nigra, & radicem nigram, succusq; eius exprimitur & ex radice. Florem Vibones uocant:
qui collectus, anteq; tonitrua audiantur, & deuoratis, securos in totum reddebat milites Cæ-
sar germanici a morbis, quos medici Stomacacæ & Scelotyrbem dicebant. Siquidē in Ger-
mania trās Rhenum, castris ab eo promotis, maritimo tractu, fons erat aquæ dulcis solus, qua
pota, dentes intra biennium deciderent, compagesq; in genibus soluerentur: quibus incōmo-
dis in Arabia quoq; Romani legiones tentatas fuisse Augusti Cæsaris principatu, Helij Galli
ductu, Strabo refert. Sed quærunt nonnulli, quamobrem Vibones dicant huius herbae flores.
Diuinare non ausim. Ceterū Strabo autor est, apud Vibonem in Brutij repertū, coronis flo-
res necesse, in eum quoq; locum propter flores e Sicilia migrasse Proserpinā. Propinqua est &
Viboni Petilia: quæ nomen Petilio florī dedit in Lucanis autumnali, et circa uepres nascēti: tū
colore cōmendatur, q̄ est Rosæ syluestris: mirumq; in eo flore insecti cacumē, nec nisi intorto
folia nasci, paruo calice, ac uersicolore, luteum semen includente. Hunc dixi ab oppido Luca-
niæ uideri appellatum. Nisi q̄s a Petilio Romæ luco, itemq; Petilino altero existimet. Alioq;
Petilus, pro exili capitur Lucillio. De hac itaq; Britanica Dioscorides in præsentī loquitur. Est
& Cantabrica in Hispania, per eiusdem Augusti tempora a Cantabris inuenta, nascens ubiq;

Pli. li. 25. ca. 3.

Strabo lib. 6.
geographiæ.

N in

D I O S C O R I D I S

C caule iunceo, pedali: in quo sunt flosculi oblongi, uelut calathi, & in his semen per quod minutum.

EX M. VERG. COM.

Scelotybe malum, quo Plinius ait compages in genibus solui, Galenus in diffinitionibus suis his uerbis describit. Resolutionis genus Scelotybe est, qua recta totus ingreditur homo nequit, sed aliquando sinistrum latus in dextrum, aliquando dextrum in sinistrum circumfert, aliquando crus post se trahit, non aliter quam ualde accliuos locos ascendentes. ¶ Sequitur Britannicam in cunctis fere grecorum codicibus alterum Vettonicæ caput, superfluo & imprudenter huic scriptori adiectum. Id in antiquissimis, quos habemus Dioscoridis grecos latinisq; codices, nullibi legitur. Nec uerisimile est, post tractatam semel totam Vettonicam, intercedente alio capite, de eadem iterum agendum huic scriptori fuisse. Accedit his quod in plerisque alijs etiam diximus, nihil in hoc scriptore maiestate eius indignius, nec cui minus credere oporteat, quam ubi superfluum aliquod, & ad religionem nostram pertinens ab eo docetur. Poterunt legentes quod dicimus, ex his quæ alij interpretes reddiderunt, censere. Nobis non placuit religionem naturæ miscere, & quæ tam longo interuallo distant in scriptore hoc eadem facere. Vana hominum mortalitas hæc primum infert: mox imprudentia & salutis studium excipit: exceptaq; per manus diu feruntur. Nisi prudentior aliquis, quod sapientes præcipiunt, de genere in genus non transeundum esse alios monuerit.

De Vettonica. CAP. III.

ΒΥΤΤΟΝΙΚΗ

Vettonica nascitur in pratis, & montibus, locis mundis, & opacis, circa frutices. Animas hominum & corpora custodit, nocturnas ambulationes, & loca sancta. Grauibis somnis resistit. Ad omnem medendi usum commendata. Radicem habet rubram, odoratam, porracea folia, medio eorum puniceo, in recto calamo triangula, floribus in cacumine purpureis. Farina recentis uulneribus capitis indita, dolorem finit. Vulnere glutinat. Fracta ossa extrahit. Sed quotidie imponi debet, dum persanescant. Dolori capitis medetur, si iure decoctum perfundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix suffiatur.

BARBARI COROLL.

Caput hoc, non in omnibus codicibus inuenias. Illud mirum quibusdam, quod Plinius Betonicæ folia Rumici scribit similia: hoc Britannicæ Dioscorides assignat, cum Betonicæ quæna potius uisantur. Nec illud minus licet mirari, quam obrem mentioes duas Betonica meruerit. Nisi quod duo quoque genera Betonicæ demonstrata nobis a Dioscoride contenderit. Duas & Paulus Aegineta Betonicæ facies intelligit, effectu parili, ut prædiximus.

De Lyfimachia. CAP. IIII.

ΛΥΣΙΜΑΧΙΑ
ΛΥΤΡΟΝ

LYfimachia, quam aliqui Lytron appellant, caules emittit cubitales, altioresque, fruticosos, tenues, prodeuntibus geniculatum folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus, flore ruffo, aut aureo. Gignitur in aquosis & palustribus. Foliorum succus adstringente sua ui, sanguinis reiectionem supprimit. Dysentericis potui datur, aut infunditur. Mensium abundantiam sistit, in pello. Sanguinis profluvio subuenit, si nares ea herba obturentur. Vulnere cruorem cohibet. Acerrimum nidorem sufflata reddit. Qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 25. ca. 7.

LYfimachio, & LYfimachios, & LYfimachia uocatur. Inuenit hæc Lyfimachus. Folia eius uiridia, ramuli erecti, odore graui, flos purpureus, fruticosusque, ut Plinius uerbis utar. Vis huius herbe

tata, ut iumentis discordatibus iugo imposita, asperitate cohibeat. Patauñ demōstrata nobis est.

A

De Sanguinaria, seu Polygono.

CAP. V.

Polygonum Arrhen, aliqui Polygonatum appellant, alijs Cynochalam, alijs Heracliam, alijs Asphalton, alijs Chiliophyllon, alijs Clema, alijs Polycarpon, alijs Carcinethron, alijs Teuthalida, alijs Myrtope talon, alijs Cnopodion, alijs Zarietheam, alijs Pedalion, Aegyptij Telphin, aliqui Stemphin, Magi Genituram herōis, aliqui Vnguem muris, Latini Sanguinariam, aut Seminalem, Aphri Chulum. Ramos habet teneros & molles, frequentibus geniculis cinctos, qui per terram, ut gramen ter-
punt. Folia Rutæ, sed molliora, planioraq;. Semine sub omnibus folijs
turgescente. Vnde marem appellari uolunt. Flos ei candidus, aut puni-
ceus. Vis e poti succi est spissare, ac refrigerare. Prodest cruentæ excreati-
oni, cholerae, alui fluctionibus, & urinæ stillicidio. Vrinam aperte ciet.
Cum uino potus, contra serpentium morsus auxiliatur. Datur in febris
bus per horam ante significationes. Fœminarum profluuia impositu si-
stit. Idem succus purulentis auribus instillatur. Facit eximie ad genitaliū
ulcera, cum uino adiecto melle decoctus. Stomachi feruori, sanguinis re-
iectionibus, ulceribus quæ serpūt, ignibus sacris, collectionibus, tumori-
bus, & recentibus uulneribus folia illinuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Polygonon, & Caligonon appellatū uidetur a multitudine seminis, ppter ea Seminalis in latino dicit: q̄q; & Sanguinalis, & Sanguinaria uocat. Alij a densitate fruticis, alijs a frequentia geniculorū arbitrant. Quidā & Halmada noiant. Inueniunt, qui fœminā esse hanc contēdant, mare aut maiore, minusq; nigrū, & geniculis densiore. Herbarij nullā magis aridā, q̄ Polygo-
non seruāt. Dioscorides Polygonon quibusdā locis uocari tradit Pedaliū. Plautus quidē ita in
Gurgulione appellat odoratæ genus herbæ.
Tu Rosa, tu Crocus, & Casia es, tu Pedaliū.

Plin. li. 17. ca. 12.

B

Aut certe unguētū nomē est in ea fabula Pedalion. Forasse uero hō Pedaliū, sed Bdelliū in poe-
ta eo legeris. Polygonon Aetius & *ἰατρικόν*, hoc est, solis herbā dici meminit, uulgo Centi-
nodia, & Corrigiola. Proserpinacā in Plinio, sunt qui Polygonon accipiāt, dicēte uulgarē her-
bam esse Proserpinacā, eximj aduersus scorpiones remedijs; & lassitudinē, si linguæ subijciat: si
deuoret, uomitionē sequi salutarē, ut corrupte legat in Diosc. hoc loco, stopinacā pro Scorpi-
naca, siue Proserpinaca: quādo utrūq; nomē Polygono tributū uideas in eo libro, qui. L. Apu-
leij fuisse credit a multis. Illud mirari subit, q̄ Plinius eodē capi. Proserpinacā, & Polygonon,
quasi diuersas herbas demonstrat, & utrūq; ad anginas cōmendat. 17. uolumine.

E X M. V E R G. C O M M.

Sanguinariam Plinius Sanguinalem, Columella græcā Polygonon uocant: ille. 17. uo-
lumine capite. 12. hic libro. 7. capite. 10. Nec fuit Romanis scriptoribus alia nominis ratio; q̄ ex
ui & usu eius, qui sentientes sanguinē expuentibus, cruentisq; intestinorum torminibus eam
mederi, ex meliore hac potestate nomen illi fecerunt. Græci contra, a seminis copia, uel genicu-
lorum, quos habet frequentia, cognosci eam uoluerunt. Vtrūq; enim Polygoni uox signifi-
care potest. Siquidem genti illi gonos, genitura, & semen; gony uero genu, & diminutiuū fœ-
ma geniculus est.

De Sanguinaria Fœminā.

CAP. VI.

Sanguinaria Fœminā fruticat uno caule, arūdinī teneræ simili, den-
sis geniculis, & in se tubarum modo factis, tuberibus articulorum
eminulis, torulisq; cingentibus. Folijs Picæ. Radicis nullus usus. Na-

N iij

D I O S C O R I D I S

C scitur in riguis. Huic quoq; spissandi, refrigerandiq; natura, ad eadem ualens, sed inefficacior.

B A R B A R I C O R O L L.
Polygoni quatuor genera Plinius existimat, Marem, & Foeminam, Tertium Oreum, hoc est, montanum, quod & describit eadem forma, qua Dioscorides hic Foeminā. Quartū genus Polygonaton priuatim appellatur; de quo protinus indicandum nobis est.

E X M. V E R G. C O M. M.
Quotquot hactenus uidere Dioscoridis graecos codices licuit, in extrema capitis huius parte eodem intellectu, & iisdem uerbis ostendunt, foeminam Sanguinalem herbam in cunctis mascula minus efficacem, & ignauiozem esse. Plinius etiā eodem libro & capite, historiam, & medicinā eius tractās, inefficacius q̄ superiora (plura em̄ Polygoni genera ille fecerat) hoc genus esse ait. Solus Paulus Aegineta in. 6. Polygoni uires numerās, contra & his uerbis decreuit, τὸ δὲ ἄλλο τὸ ἄρρενος ἰσχυρότερον, quod est, Foemina aut̄ Mascula ualidior, & efficacior est. Quo fit, ut oporteat, quemadmodū & Plinius indicat, credere diuersas ex sexu Polygōni notas omnibus locis, & gentibus non fuisse easdem, sed uariatis appellationibus, quae graecis uerbi causa Mascula Sanguinalis erat, latinis Foemina esset: sicq; ediuerso, Plinii, cuius aetate uaga haec nomina, etiā erant uerba, hac in primo genere sunt. Qui plura genera Polygoni faciunt, hanc Marem intelligi uolunt. Idq; Dioscoridi cōuenit. Mox paulo post. Necnon inueniuntur, qui hanc Foeminā esse dicāt: quod Paulo Aegineta cōuenit, qui Foeminā potentiozem Mascula dicens, sexus notam hanc, ex aliorum indicatione tradidisse uideri debet. Eamq; ob causam, nihil in huiusmodi, nisi factō prius periculo, certū constitui modo potest: tam multis locis & gentibus res aliquando, nomina autem semper uariant.

Πολύγονον

De Polygonato. C A P. VII.
Polygonatum nascitur in montibus, frutice cubito altiore, folijs Lauri, latoribus, & lauioribus, sapore mali Coronei, aut Punici, cum quadam adstrictione. Flores per singulos foliorū exortus promit, candidos, folijs numerosiores, incepta a radice supputatione. Radicem habet albam, mollem, longam, crebro geniculatam, densam, graueolentem, digitum crassitudine æquantem. Quae uulneribus efficaciter illinitur. Quinetiam maculas in facie delet.

Pli. li. 27. ca. 12.

B A R B A R I C O R O L L.
Polygonaton Diosc. montanū Polygonon, syluestre Plinius intelligit, etiā si descriptio fortasse dissonat in plerisq; Arborēs inq; pene mō fruticat radice lignosa, stirpe Cedri rubicundo, ramis Sparti, binū palmorū, nigris, geniculorū ternis, quaternisq; articulis, odore quodā, siue gustu fastidioso: q̄ ne explicari quidē recte possit, ut Paulus Aegineta scribit, & eo prior Gale.

E X M. V E R G. C O M. M.
Inter Polygoni genera, quae a Plinio plura ex aliquorū historia numerantur, Polygonatos haec refert. Nobis tamē toto genere differre haec ab illa uidet̄. Iacet em̄ (quod præcipuū inter eas discriminē sit) & graminis modo per terrā spargitur Polygonus: Polygonatos autē cubitali, & fere semper proceriore caule erigit. Vidimus nos, quinto, & sexto deinceps foliorū ordine ad eam altitudinē surgentē: quae a radice statim exiguis interuallis, per caule usq; ad summū uirebant laurinis, ut hic ait, similia. Flores ipsi non uidimus. Iampridem em̄ Augusto mense defloruerat herba, quae nobis prolata est. Nulloq; magis indicio, q̄ radice Polygonatum se ostendebat: quae longitudine pedali, colore albescēte, frequentioribusq; q̄ in gramine geniculis turgēbat. Vtq; conicere licuit, nihil Polygono congenerē multis hanc fecit, q̄ geniculorum par similibusq; in utraq; frequentia. Verumtamen, ut paulo ante dictum a nobis est, exceptis his, diuersa in Polygonato, & alia a Polygono cetera nobis uisa sunt.

κλεματίς

De Clematide. C A P. VIII.
Clematis Graecis, alijs Phyleterion, ab alijs Daphnoides, ab alijs Smyrnoides, aut Polygonoides appellatur. Læto, pinguiq; solo

prouenit, iuncos spargens exiguos. Folia Lauri figura & colore, multo minora. Folia cum caulibus in uino pota, alui profluuiā, & dysenterias sedant. Subdita in pello, cum lacte & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus uulū medentur. Dolores dentium commanducata finit. Imposita serpentium moribus, iuuamentum prestat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opitulari. Gignitur solo inculto.

B A R B A R I C O R O L L.

Clematis hæc, siue Clematidis Aegyptia cognominatur, quoniam Aegyptus hanc maxime gignat, prælonga, tenuisq; in prouerbium usq; cessit, κληματις αινυμια, ita nominando eos, qui proceri & nigro sunt corpore: ut est apud Phalereum Demetrium.

Pli. li. 24. ca. 15.

De altera Clematide.

CAP. IX.

Est & altera Clematis, quam aliqui Epigetin, Aegyptij Phila-
crion, Romani Ambuxum uocitant. Viticulos emittit rubescen-
tes, lentos. Folium gustu admodum acre, ac exulcerans. Repit per
arbores, ut Smilax. Semen tritum, pituitam bilemque detrahit, in aqua,
aut hydromelite potum. Folia eius illita, lepras purgant. Cum Lepi-
dio conditur ad cibos.

B A R B A R I C O R O L L.

Clematis secunda, siue Clematidis, Smilaci, hoc est, Hederæ Ciliciæ similis effingit, genicula & ipsa, repensque per arbores. Hanc, aut non dissimilem (ut puto) Plinius est ubi Echiten, & Laginen uocari, & tenuem Scamoneam: quia pedales, foliosos, non dissimiles Scamoneæ ramus habeat, nisi quod minora, nigrioraque sunt folia. Inuenit in uineis, aruisque: parat cibis, ut olus cum oleo & sale. Sit hic frutex, qui Conuoluulus a nostris dicitur, cuius flos Lili rudioris figuram præbet, ob id & Liliastri quoque nomen habens: & uulgo etiam Ligustri (quod Ligustrum proprie cyprius est) æstimatur iudicent. Nam & folium ei pinnatum est, ut Scamoneæ, nec Smilaci dissimile. Volubilis maioris noie. Semen nigrit, triangulum, in folliculis acinorum specie, qui numero tres habent, in uinetis, aruisque. De hoc Plinius uerba subiicimus. Est inquit flos, non dissimilis Lilio, in herba quam Conuoluulum uocat, nascens per fruteta, nullo odore, nec crocis intus, candorem tantum referens, & ueluti rudimentum naturæ Liliæ facere condiscens. Inuenio qui Peridymenon uocent Conuoluulum, atque ita pictam in Græcis codicibus uidi. Sed uera Peridymenon alia est, ut post liquet. Habetur & Clematis tertia, Centunculus a nostris appellata, rostratis folijs, ad similitudinem capitis penularum, iacens in aruis. Dioscorides & Gnaphalion herbarum, Centunculum a latinis dici meminit: quod non habeo compertum, eadem sit, an diuersa Gnaphalion, a tertia Clematide, quandoquidem & medicinae congruunt: & apud nos utraque Centunculi nomen habet. Sciendum Galeno teste, Dioscoridem hoc loco de prima tantum Clematide locutum: quæ non simpliciter Clematidis, sed Clematidis Daphnoides, aut Myrsinoides, aut Polygomoides appellata esse uideatur. De secunda uero Clematide, quæ & absolute Clematidin uocari tradit, in quarti huius libri fine scriptum esse, non hic existimat. Addidere tamen librarij utroque loco eam, quod & in alijs herbis fecere. Pamphilus duas Clematides in unum confudit. A Galenoque ob id incessit iure. Idem uidetur & Plinius fecisse, medicinas aliquot prioris, secundæ tribuendo.

*

Pli. li. 27. ca. 12.
24. cap. 10.

Fuisse quondam plures Clematidas, Plinius manifeste. 24. uolumine capite. 15. indicat. Sed exceptis duabus his, non ueras fuisse Clematidas alias, sed sola uiticularum ratione hoc nomen uenisse, testes in græcis, hic scriptor primus, qui nullam aliam in medica materia stirpem hoc nomine describit: mox Paulus Aegineta lib. 6. his uerbis utraque describens. Clematis, quæ alij Daphnoides, alij Myrsinoides uocant, uiticulam habet longam crassitudine iunci, quem Oloschaenum dicunt: folium uero Lauri. &c. Altera autem quæ arboribus Smilacis Hederæ modo aduoluitur. &c. Fuerunt qui posteriorem hanc Conuoluulum crederent. Cuius flores Lilia candore, & amplitudine æmulantes, certare cum nobilissimo flore uoluisse uidentur: quos etiam Plinius aliquando dixit Rudimentum naturæ esse, Lilia facere condiscens, ubique & omnibus notissimos. Verum ex huius historia, in qua rubentes uiticulae illi assignantur, Conuoluulo conuenire non uidetur. Tacuisse præterea de floribus, qui tam egregia specie in Conuoluulo

V E R G.

D I O S C O R I D I S

C florent, aliam ab illo Clemarida esse arguit. Nobis inclinatur animus Smilaci congenerem Cle-
matidem hanc esse. Non tamen pro comperto hoc decernimus. Quod autem hic ait, uocari Epi-
getida, humilem terrestremque significat, facta a terra, quam Græci γῆν uocant, nomine: quasi
terraneam dicas, quoniam scilicet nisi alias scandat stirpes, per terram spargitur.

De Polemonia.

C A P. X.

Πολεμώνιον
Φιλετήριον

Polemoniam alij Phyleteriam, Cappadoces Chiliodynamin ap-
pellant. Ramis exilibus, in uersus utrinque digestis. Folijs paulo quæ
Rutæ maioribus, ac longioribus, Calaminthæ, aut Sanguinariæ proxi-
mis. Quibus in summis corymbi dependent, nigro semine. Radice cubi-
tali, albicante, radiculæ simili. Nascitur in montosis & asperis. Bibitur in
uino radix contra serpentes & dysenteriam. Et ex aqua aduersus urinæ
difficultatem & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto drachmæ ponde-
re lienosis. Eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt, eum qui radicem
gestauerit, a scorpione non terri, eumque si ictus sit, nihil molesti passu-
rum. Dentium dolorem mansa mitigat.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 25, ca. 6.

Polemonium, siue Polemonia, alij Phileteriam, a certamine regum inuentionis appellaue-
runt. Radice crassa, nigro semine. In Plinio & Melemoniu uocari herbam quandam inuenias,
uomituris utilem; tamen haud certis sum, ecquid corrupta sit in ea uocis lectio.

EX M. VERG. COMM.

Officiosa certe uoluntas non deest, urgetque in Polemonia hac, ut moneamus legētes. Quā
hic, & Plinius dixerūt in Cappadocia a multitudine uirum χιλιόδυνάμιν, quod est, mille uires
habentem uocari, in antiquissimis Græcorum & Latinorū scriptoris huius codicum, qui mihi
sunt, non Chiliodynamin, sed Chelidoniam manifeste legi. Non cōuellenda tamen ob id duo-
rum scriptorum tam certa auctoritas & fides. Ob eam causam & nos ex cōmuni lectione uo-
cem uertimus. Illud contra in dubio est, dissidentque Dioscorides & Plinius in radicis historia.
Hic ait πυχναίαν esse, quod est, cubitalem: Plinius, 25. uolumine capite, 6. Polemonia describens
ait, Cappadoces Chiliodynamin uocant, radice crassa: quasi non πυχναίαν, sed παχύν legerit.
Nos neque in græcis, neque in latinis aliter quæ cubitalem legimus. Plinius tamē uel sic forte per sua-
sus, uel uocis uicinitate decaptus, pro cubitali, crassam reddidit. Nisi forte, quod hic ait, Lanariæ
herbæ radici similem ad crassitudinē ille rettulit. Diximus id, quoniam non parui refert, in depre-
hendenda Polemonia, cubitalem, aut crassam radicem obseruasse.

De Alo.

C A P. XI.

Συμφυτον

Symphyton petraeum, id est Alus, nascitur in petris, ramis tenuibus,
paruis, Origano similibus, capitulis Thymi, furculosum totum, or-
doratum, gustu dulce, saluam ciens. Longa radice, subrussa, digitali crassi-
tudine. Decoctum in aqua mulsa, & potum, pulmonis uitia purgat. San-
guinem reijcientibus, & renum malis ex aqua datur. Ad dysenteriam, ru-
braque sceminarum profluvia in uino decoctum. Ad conuulsa uero & ru-
pta, ex aceto mulso bibitur. Quin & commandacatum sitim sedat. Fauci-
bus asperis subuenit. Vulnere recentia, enterocelasque conglutinat, & il-
litu cohibet. Carnes autem cum Symphyto decoctæ cōalescunt.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 27, ca. 6.

Symphyton Petraeum, nos Alum gallice uocamus, folijs paruis, ramis tribus, aut quatuor
a radice. Nascitur in petris, ideoque Petraeum cognominant. Symphyto autem Græci nomen
imponere, quoniam consolidet. Hanc Veneti Cotoneam appellant, ut inquit Plinius, Rosæ
radicis, alibi albæ, alibi nigrae.

Quæ est constipandi, consolidandiq; egregia utriq; Symphyto uis, nomen illi in græcis id fecit. In posterioribus autē latinis inconcinne quidem, sed aperta significatione Consolidam uocari eandem persuasit. Et quoniam duo saltem genera eius sunt. Alterum, de quo nunc agimus, quoniā in petris nascitur, Petræum antiquitas nominauit. Alterum uero simpliciter Symphyton, lactant tamē præter hæc nostræ ætatis herbarij plura alia Consolidæ genera se inuenisse, quæ medicis, & illis censenda relinquimus. Dioscoridem enim latinū facimus, non omnium aliorū dicta & decreta cōaceruamus: præsertim duo, & hæc tantū gñā Symphyti tractante etiā Paulo Aegineta, qui habere hoc Symphyton ait aliquid, qd incidat, ideoq; purget, quæ in pectore & pulmonibus purulēta concreuerūt: habere etiā aliquid qd adstringat, quæ ui sanguinis excreationibus medeatur: habere humiditatē, quæ sitim arceat: discutere præterea, constipareq; corpora: & ne longiores simus, ex contrarijs aliquibus uiribus constare.

De altero Symphyto.

CAP. XII.

Est & aliud Symphyton, quod aliqui Pecton, Romani Soldagi-
nem uocant. Id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, inanem, quasi fungosum: circa quem breui interuacante spacio, folia exeunt angusta, linguæ Bubulæ proxima, oblonga, hirsuta, caule secūdum angulos quosdam striato. Folijs tenuibus, ex alarum sinu prodeuntibus. In quibus flores lutei, rutaceis similes, & uerbasci semina emicant. Tam caulis q̃ folia, aspera lanugine horrent, tactuq; prurimum concitant. Radices demittuntur foris nigræ, intus candidæ, uiscosæ. Quarum est usus. Tritæ et potæ, cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt. Recentia uulnera illitæ conglutinant. Carnes quoq; si concoquantur, cogunt additæ. Inflammationibus, præsertim sedis, cum Sectionis folijs, utiliter illinuntur.

Hoc Galenus Symphyton mega, id est, magnum cognominat, nec gustu dulce, nec odoratum, ut superius. Herbarij recentiores tria Symphyti, seu Consolidæ genera constituunt, præter Petræum: quod ne cognoscunt quidem. Magnum, de quo hic agitur. Minus, sed radice intus & foris alba, fere bulbi effigie rotunda. Minimum, flore in spicam purpureo, ac folio quidem Origani, ut Petræum, sed in humidis genitum, radice lignosa, superuacua, nec odorata, nec dulci, nec saluam ciente: quæ sunt in Petræo omnia.

De Holosteio.

CAP. XIII.

Holosteon quadrantal is hærbula est, humi repens, folijs uiticulisq; Coronopo, aut Gramini proximis, gustu adstringentibus. Radice albâ, prætenui usq; in capillamentū speciem, longitudine quatuor digitorum. Nascitur in collibus terrenis. Usus eius ad rupta in uino posita. Nam & carnes coguntur, decoctionibus addita.

Holosteū sine duricia est herba, etiā si ab osse nomē habuit, per antistropheū uidelicet, hoc est, ex aduerso a Græcis appellata, sicut Fel dulce, folijs angustis. Nascit in collibus terrenis.

EX M. VERG. COMM.

Ex aduerso græcis Holosteon herba hæc dicta est. Toto corpore enim & undiq; osseam uox illa significat: cum tamē tenerior, & fragilior ea sit, longeq; ab ossium duricie discesserit. Quærendum in ea, quo nam modo trium, aut quatuor digitorum altitudine eam hic dicat a terra extolli: & an digitos per longitudinem continuatos, an ut in antiquorum palmo erant, per crassitudinē coniunctos, & sibi suppositos indicet? Nobis in posteriorē hanc partē inclinat animus. Nā quatuor digitorū per longitudinē mēsurâ, alijs poterat, et debuerat uocibus indicari.

D I O S C O R I D I S

C De Stoebe. CAP. XIII.

Stoebe, quam alij Tobion, Romani Stipam uocant. Vulgaris est noticiæ. Cuius semen & folia stringunt. Quapropter decoctum dyfentericis infunditur. Auribus quoq; purulentis instillatur. Illita folia, oculis ab ictu cruentis profunt. Erūpentis sanguinis impetus cohibent.

Pli. li. 21. ca. 15.
lib. 22. cap. 11.
Theoph. li. 1.
& 6. plant.
Strabo. li. 16.

B A R B A R I C O R O L L.

Stoeben Theophrastus & Plinius Phleon quoq; dici tradidere. Pollux Phlun, cuius lanugine mulieres ad lixiuū utantur. Molle inquit Theophrastus, & plantaceum est Phleon, colore subrubido. Meminit & Aristoteles, sed a Theodoro Flauis uertitur. Fœminā in eo accipi, quæ sit sterilis, & ad nexus utilis. Vnde Phœinas uestes in Herodoto q̄s legat & Pausania, quibus aues in Arabia Symphalides, ut uisco ceteræ capiant: cum alia materia nō resistat earū rostris. Nam et in Aethiopia Arabiq; aduersa nasci Phleon testis est Strabo, flumine præsertim, q̄d Cinnamo semina determinat. Orchomenio lacu numerosum id haberi: a quo & nomen Phleos: etenim Græci φλεών, p eo q̄d est fecundū esse capiunt. Hinc & Bacchū ueteres Phleona cognominabant, auctor Helianus. Partem huius herbæ teneram ab radice, pueris in cibo gratam esse. Radicem ipsam pecudum pabulo uelli copiosam, nec in profundum actam, folio & caule aculeatis. Stipam a latinis dici auctor est Dioscorides. Illud notauerim, si Stoebea idem sit q̄d Phleos, errare qui Stœbam pro ea herba capiunt, quæ uulgo Scabiosa dicitur, folio Erucae hirsuto: non tamen aculeis horrente, cerulei floris, ex qua & Scopæ fiunt. Sit autem Scabiosa, quæ ab Aetio Psora dicitur, cuius ustæ fumo arborum Erucae moriantur, non habeo commentum. Phorion lini genus tradit, Stypion uocatum. Alioquin Stypos inquit Picæ caudæ est, itemq; prædurum & solidum lignū quodecunq;. Interdum & humilis stipis ita dicitur potis. Est & Stybion & Stybe, de qua diximus in Hyppophæe. Nam Stion calculus est marinus Hippocrati. Festus linum impositum, Dorice stuppam dici meminit.

E X M. V E R G. C O M M.

Phleon duobus locis uocari a quibusdam Stœben hanc Plinius testatus est: primum. 21. uolumine capite. 15. his uerbis. Quædam in folio habent, & in caule, ut Phleos, quam aliqui Stœbem appellauere. Mox iterum uigesimo secundo uolumine capite undecimo. Stoebe, quam aliqui Phleon uocant. Videturq; nobis Theophrastum ubiq; appellare. Is enim inter aculeatas Phleon. 6. de plantarum historia numerat, & inter eas quæ folia secundum spinas proferunt: quales in palustribus Tribulus, & in arida Ononis est. Et Stœben libro primo de plantarū historia inter fruticosā, & quæ carnosum folium habent.

C De Volucro. CAP. XV.

αλυσισ

Græci Clymenon uocant, alij Calycanthemon, alij Peryclymenon, alij Helyophyes, nonnulli Hepatitin, alij Milacem, alij Anatolicon, alij Dyticon, alij Merginem, Latini Volucrum, aliqui Volucrum maius. Aegyptij Oxioni. Clymenion, quod & Agonon, id est, sterile nuncupant, caulem fert fabæ, quadratum, folia Plantaginis, foliculis supra caulem in sese inflexis, Iridi, & poliporum Cirris non absimilibus. Probatissimum est & montibus. E frutice toto cum radice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones in potu efficax est. Cœliacos, rubraq; fœminarum profluvia, refrigerando infrenat. Sanguinem naribus erumpentem supprimit. Trita folia, aut siliquæ recentibus uulneribus impositæ, ea ad cicatricem perducunt.

Pli. li. 27. ca. 12.
Theoph. li. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

Clymenos appellata a rege dicitur, describi aliter a nostris, q̄ a Græcis Plinius affirmat, hoc est, Hedere folijs ramosam, caule inani, articulis præcinctam, odore graui & semine Hederae, syluestribus montosisq; nascentem. Sterilescere pota ea etiam uiros, sextario eius in triginta dies diuiso, Theophrastus auctor est. Quod quidem Dioscorides Periclymeno uocata tri-

buit. Nam & descriptio nostrorum de Clymeno quā prætexui: Periclymeno fere conuenit.

EX M. VERG. COMM.

Regiae dignitatis herba Clymenos est, & ab inuentore rege sic appellata: non aliter quā & ple-
rūq; alia a Diosc. hactenus, & a Plinio diuersis locis ex antiquorum historia descripta fuerit.
Eam pluribus indicauerunt ueteres appellationibus: inter quas ex plantae ipsius natura, no-
tis, & antiquorum in ea obseruationibus factae aliquae sunt. Qualis Calycanthemos est. signifi-
cat enim, quae in Calyce floreat. Dixerunt autem in floribus antiqui Calyces, in uolucra illa qua
lia in Rosis sunt, quibus dehiscuntibus in sua folia se flores pandunt. In Clymeno autem hac ca-
lyces folliculos eos intelligebāt, de quibus hic paulopost egit: Peridymenos uero, confuso mi-
xtoq; ob similitudinem cum ea quae sequitur nomine.

De Periclymeno. CAP. XVI.

Periclymenon aliqui Aeginam, alij Cylmenon, alij Carpathon,
alij Splenion, alij Epetin, alij Axinam maiorem, nonnulli Cle-
matin, alij Myrcinen, alij Calycanthemō, Magi Polion Veneris, Ae-
gyptij Turcon, Romani Volucrum maius, Aphri Lanath appellant.
Simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum amplecten-
tia, subcandida, hederacea. Inter folia furculi exeunt, in quibus baccae,
Hederæ similes. Flos fabæ, candidus, aliquantum rotundus, et quasi in
folium procumbens, semen durum, & quod difficile euellatur. Radice
rotunda, crassa. Nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens se adminicu-
lis propter assidentibus. Semen eius postquam ematuruit collectum, &
in umbra siccatū, drachmæ pondere dat in uino quadragenis diebus,
ut lienem absumat, ac molestiā discutiat. Sed urinā ciet, statim a sexto
die cruentam. Orthopnoeæ, & singultui prodest. Partū accelerat. Folia
sunt eisdem uiribus prædita. Quæ tricenis septenis diebus epota, steri-
litate facere produntur. Perunctis ex oleo febrium rigores abigunt.

BARBARI COROLL.

DE Periclymeno dictum est in Clymeno. Nunc Caprifolium, & Matersylua dicitur uulgo:
quāq; Dioscorides Matersyluam pro Hedera capit, cui Periclymenon simile est.

De Tribulo. CAP. XVII.

Tribulus aliquibus Bucephalus, alijs Tauroceros, Romanis Tri-
bulus aquaticus dicitur. Tribuli genus unū terrestre, folijs ad
effigiem Portulacæ, tenuioribus uiticulis, in terra stratis, spinis secun-
dum folia rigidis, præduris. Iuxta amnes & domicilia nascitur. Est &
alterū genus aquis familiare, quod in fluminibus natū comā exerit, acule-
os cōdēs. Folijs latis & pediculo lōgo. Caule parte summa quā ima crassi-
ori. Capillamēta quædā indidem exorta spicant. Semen durū, ab altero
non abhorrens. Vterq; refrigerantis & inspissantis est naturæ. Ideo in-
flammationes omneis cataplasmate adiuuat. Ulcera in ore erumpentia,
putredines, gingiuas, tonsillasq; perfanat. Succus ex his colligit ad ocu-
lorū medicinas. Semen dum recens bibit, calculosis iuuamentū affert.
Drachma terrestri Tribuli pota, illitaue, ictos a uipera recreat. Contra
uenena cum uino aptissime bibitur. Decoctū eius sparsum, pulices nec-
cat. Thraces, qui ad Strymona amnem habitant, uirenti Tribulo eqs.

D I O S C O R I D I S

C faginant, & e dulci semine & esculento panem quo uestuntur faciūt.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 18. ca. 17
lib. 21. cap. 16.

Tribulus, siue Tribulum, in segetibus madidis & palustribus nascitur, non excedente quina fere cubita, gurgitum altitudine, ut in Strymone amne. Capillamenta in eo quædam inter se contraria, eo breuiora, quo propius ad radicem sunt, adeo, ut in ea quasi desinant, ac procumbat, a lateribus terna & quaterna germina: ut amplissimum sit quod minus ab radice distat, et reliqua pro suo cuiusque numero. Exit a parente soboles, omnino similis folio, fructuque, sed gracilior. Semē nigrum, prædurum: quo cadente, ipsum se propagat. Folium habet secundū spinā. In semine quoque gerit aculeus. Radicē eius alij annuā, alij diuturniorē esse putāt. Duo grana eius. Vni Cicerculæ folium: alteri aculeatū. Vere germinant, serius tū: cui in folio aculei: magisque hoc septa uillarum obliet. Semen habēs rotundius, et nigrū in filiqua: qd aliteri, hoc est, præcoci arenaceum & Sesamæ figura cernitur. Nihil Cicere infestius Tribulo est. Nascit & in hortis Tribulus. Dira res alibi, sed iuxta Nilum & Strymonē amnes, in cibos recipiūt. Panis ex eo fit prædulcis, & comprimens uentrem. Hippocrates genus Tribuli Parathalassion, hoc est, maritimum appellat, idem cum terrestri: quod & minus est aquatico. Ex aquatico sane panes fiunt: ob id & Ferrariensem Castaneam, Gallia padana Tribulum uocat.

De Sarxiphago. CAP. XVIII.

cap. 17. 18.

Sarxiphagon, aliqui Sarxiphragon, alij Empetron, Romani Saxifragiam uocāt. Frutex est surculosus, in petris & asperis locis nascens. Coctus in uino, mox potus, febricitantibus opitulatur. Stranguriæ prodest. Singultum sedat. Calculos uesicæ frangit, & urinam ciet.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 27. ca. 9.

Saxifragum, et Saxifraga latine dicitur, item Calcifraga (si modo hæc est) quam et Plinius et Dioscorides alio loco Empetron appellant, Paulus Sarxiphages. Empetrū inquit Plinius, fere in saxo nascitur. Recenti uires sunt. Verustate perdit eas. Lapillos qui sufferuefiant, una rumpi affirmant. Habetur & Saxifragi genus alterum, in Adianto nobis explicandum. Corrosi & ambusti sunt hac parte Græci codices, nec quale sit huius herbæ folium animaduerti ullo mō potest: et in ipso uerborum textu, spaciolum inane uacat. Porro ueterem in Dioscoride picturā huius herbæ uidi, non plus folijs, q̃ Cirris minutis, per ramos ex intervallo conditis, nec frequentibus: in cacumine surculorum flocci ceu arentes porius q̃ flosculi, subrubida radice, nō sine fibris. Romæ talis ostendit in maritimis, ac montosis tantum, non rubida radice, sed candida: flosculis quoque candidis. Recentioribus de hac herba parum conuenit. Alij Tritici foliorū figurā, alij marinæ Bati similem dixere, alij Tormentillæ uulgo dictæ. Est aut (ut uolunt) Tormētilia, Quinquifolio herbæ similis, nisi q̃ septem fere habet folia, nō quinq̃. Quarti herbā, quæ florē Caryophyllon uocatum ferat, de quo aliubi dictum est. Quinti Saxifragā eādem esse, aut proximam ei quæ Pimpinula, Pimpinella, & Bipēnula, & Sanguisorba ruri dicitur: qm̃ uulneribus infecta ferrū & spicula facile ac citra sensum doloris exigit. Folio paruo, orbiculato, & extremitatibus serrato: qd et mandi soleat, paratū oleo, sale, aceto, surculis ab eadē radice plurimis atque densis, rubentibus cū radice, ut ferunt. Quibusdam locis uermiculus eruit, q̃ curatus, sericis præcipue tingendis, Purpuram facit incomparabilem, cæteros colores splendore quodā & hilaritate superans. Inuentus, ut alia quoque multa casu, excrementis gallinaceorū, ita coloratis. Nam & usus Purpuræ, ut est apud Iuliu Pollucem, ab Hercule uidet institutus, cōspecto canis rostro, qui purpuram deuorasset, infecto. Igit Purpurissum, ex hoc uermiculo Carbasinū a præstanti amphitheatralium uelorum (ut arbitror) colore dicitur. Quidā Carmasinū appellat colorem, qm̃ uermiculus is, punica lingua Carmes appelletur, quemadmodū & Coccus. Potest & ab urbe Charmi, quæ Sardibus est, nomen accepisse coloris, quod lanas inficere Sardibus coepit sit, ut inquit Plinius. Nā Carbatinis in Aristotelis secūdo de animalibus uolumine legendum, non carbasinis est. Sunt aut Carbatinæ, quas Catullus Carpatinas crepidas uocauit, calciamenti genus e Caria translatus, quod hodieque uulgo sic uocatur, detractis utique posterioribus syllabis, & s, littera principio adiecta, ut assoler. Nam et Carpisculus calciamenti genus est, ut Flauius Vopiscus ait, in Aureliani Cæsaris uita. Quidam tamen Carbasa etiamnum uocāt boum coria: quæ Cæsar Alutas appellauit. nam, ut Suidas scribit, ubi defecissent calcei, Carbatinis utebantur, ex crudis boum tergoribus recens detractis, ut illud Virgilianum. Vestigia nuda sinistri,

Instituere pedis, crudus regit altera però.

De hoc uermiculo, nihil apud ueteres inuenias. Nam Sandix indica, de qua in Aureliani Celsa ris uita legit, preciosas Purpuras fecisse, aliud tincturę genus puto. Hieronymus i sacris literis, uermiculū, & uermiculatas uestes nominat: granū (ut opinor) Aquifolia significans; qđ autō re Plinio quibuscūq; locis uermiculi similitudine conspicitur. Hinc deriuatum arbitror, ut Cocci nea uestis, Scoletidata, hoc est, uermiculata uulgo diceret, siue quasi qđquiliata (etenim granū Cocci, etiam Quisquiliū uocatur Plinio) a Quisquilijs opinor. Sunt em̄ Quisquilię, ut Festus ait, quicqđ ex arboribus minutū cadit. De uermiculo purpureo, Democritus qđ meminit tincturis utili, sed e purpuris, ac murice, ut conijcio. Nam et de uermiculo Galatię, hoc est, iligno*meminit. Pampinulę similis est, foliō tantū minore, ac magis serrato & lentiusculo, quā nostri herbarij Eufragiā appellāt, minus fruticosa, flore luteolo, præcipue claritatis ad oīa uitia oculorū: ueteribus incomptam existimant: quemadmodum & illam, quæ Cartosilago dicitur a uulnerarijs. Nos Ceratophylacem uocandam putamus: quia partem oculorum Ceratoiden, hoc est, corneam defendat, salutiq; percussam restituat, folijs Seriphij, uel potius Roris marini, aut Lini quoq; capitulis arenatibus, cirris subluteis.

De Limonio. CAP. XIX.

Limonion aliquibus Potamogiton appellatur, alijs Neuroides, alijs Lonchitis, alijs Rapionion, Mysijs Mendruta, Syris Meuda, alijs Lycosemphyllon, alijs Heleborosmata, alijs Scyllion, Magis lupi Cor, Romanis Viartum nigrum, quibusdam Titinabulum terræ, Gallis Iumbarum, Dacis Dacioa. Folia habet Betæ, tenuiora & longiora, decem, sæpe plura, caulem tenuem, rectum, ut in Lilio æqualem, feminibus scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex uino acetabuli mensura potu, dysentericis coeliacisq; prodest. Rubra foeminarum profluuia sistit. Nascitur in pratis & palustribus.

BARBARI COROLL.

Limonium Beta est sylvestris, densioribus folijs. Aqua e radice cocta, maculas uestium, & membranarum eluit. Aliud genus est a Limonio Limania, ut in Scolymo notauimus. Limonium Aetius etiam Cynoglosson, hoc est, linguam canis uocari scribit.

EX M. VERG. COMM.

Sylvestrem Betam Plinius, qđ eius folio sit, uolumine. 20. capite. 8. Limoniam uocat. Numeratq; eam in Betarum censu non male, si palustrem potius, qđ sylvestrem a natalibus eius appellasset. Creditur idem a multis eandem hanc, quoniam in riguis & aquosis pratis nascitur, & ab eis nomen in græcis inuenit. 18. uolumine, cap. 6. pratensem herbam nominasse. Theophrastus in sexto de plantarum historia ad finem Limoniam gñe foeminino, inter Anemones genera descripsit sylvestrem, & inter ea quę tertium ordinem inter uernos flores antiqua ætate habuerūt. Nobis pro comperto non est, diuersum ne, an idem utriusq; genus sit. Hic enim floris Limonij huius non meminit. Neurodes Plinius uocari etiam Limonium ait; sed nulla ab alterutro dicta nominis eius causa est. Cur autem Potamogetona aliqui eam dicerent, in promptu causa est. Palustris enim planta, fluminibus uicina, qđ Potamogeton significat, merito dici potuit. Priuatim tñ eo nomine alia quondā indicata est, hoc ipso uolumine declaranda. Ab Elleboro nomē illi etiam factū in græcis est, & a latinis Veratrum nigrum: qm̄ folio simile illi est Limonium: qđ in Elleboro describitur Plantaginis, aut sylvestris Betæ. Quibus & hoc simillimū est, & eousq; æquale, ut palustris Beta Limonium dictum fuerit. Differunt in historia Limonij non leuiter scriptor hic, Pliniusq;. Hic decem, et pluribus aliquando folijs in caule uirere dicit; ille undecim sæpe caulium herbam esse testatur. Quod peritiores uideant.

De Lagopo. CAP. XX.

Lagopus hærbæ, quam aliqui Leporis cuminum appellant, si sit aluum in uino pota, aut in febris ex aqua. Eadem inguini adligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus.

D I O S C O R I D I S

BARBARI COROLL.

C Lagopus, quasi pes leporis dicat. Sane & similis est ei aspectu. Proinde haud probarim eorum sententiam, qui Caryophyllatam uulgo dictam rentur, in opacis montanis gigni solitam, non in segetibus, ut Lagopus. Hippocrates nominat & Lagopyron, quasi leporis triticum intelligas, furfuribus cum inaruit simillimam: folio paruo, quasi oleagineo, longiore tantu, cruentis uulneribus imponens. Hanc Galenus Leporariam inquit herbam esse.

EX M. VERG. COMM.

Discrepant grauissime in leporini Pedis herbae naralibus hic scriptor, & Plinius. Alter enim in segetibus, quae in latina manifestam ex Varrone significationem habent; alter in ratis natis nasci tradiderunt. Quae graecis sunt quadratae hortorum ad constitutionem olerum dispositae areae. Nos graecorum lectionem secuti, qualem inuenimus uocem uerimus. Barbarus ex Plinio in segetibus nasci tradidit, magno inter segetes & hortorum areas discrimine. Qualis autem haec nascatur, non erit difficile leporino Pedi similem Paniculam in ea obserualle.

De Medio. CAP. XXI.

Medion aliqui Medicam appellant, alij Triphyllon, alij Clemathion, nonnulli Olmon, quidam Trigonon, alij Cybellion, alij Polyphyllon, Romani Trifolium odoratum, Aegyptij Epaphon. Medion in faxis & opacis nascitur. Folia habet Iridis, caulē tricubitalem, & in eo florem grandē, purpureū, rotundū, semine Cnici minuto, radicē dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quae trita, in farinam, & ex melle decocta, rubros menses sceminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in uino potum menstrua pellit.

BARBARI COROLL.

DMedion. Exemplaria sunt in quibus folia ei non Seridis, sed Iridis reatantur: Plinius quoque Iridis satiuæ scripsit. Sed cum satiuæ adiecerit, non de Iride, quam nemo esset satiuam esse, quando, ut inquit Theophrastus, Iris cultum nullum desiderat, sed de Seride uidetur intellexisse: cuius constat duo esse genera, satiuum, & syluestre.

EX M. VERG. COMM.

Discrepant in similitudine foliorum eius ueteres graeci. Alij enim Iridi, alij Seridi, quae Cichorii genus est, secundo libro a nobis tractati, similia dicunt. Plinius quoque Iridis satiuæ dicens, scripsisse Seridis credi potest: quando satiuæ discrimen Seridi proprium sit: Iridis autem nescio an hactenus aliquando hic dixerit. Scimus quidem, syluestrem Iridem dici in plantarum censu, sed ea proprium habet Xyridis nomen, de qua mox dicetur. Nobis inclinatur animus, ut Seridis potius quam Iridis folio Medium esse opinemur.

De Epimedio. CAP. XXII.

Epimedium, ab alijs Erineos, ab alijs Tryas, a nonnullis Polyrrhizon, a Romanis Vindicta nominatur. Caulis est non magnus, Hederæ folijs, denis atque duodenis, neque florem, neque fructum ferens. Radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo. Nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, maenas increscere non sinunt. Radix conceptu adimit. Folia quinis drachmis, post menstruas purgationes quinq; diebus in uino pota, praestant mulieribus ne concipiant.

EX M. VERG. COMM.

Avet quae Medio in plāta hac addita graecorum prepositio ἐπι est. Significat enim Epimedio, quod Medio accesserit. Id autem est foliorum magnitudo, quae in Medio satiuæ Seridis sunt, in hoc Ficulneum folium uocat. Sunt enim in quibus non ἐπίδω per, i, sed ἐπιδω per, u, legi. Quod si recipiatur, tunc dictam intellexisse oportebit, a palustri planta, quam Thryon idem graeci dicunt.

De Gladiola. CAP. XXIII.

Xiphion, aliqui Anaetorion, alij Phasganon, alij Machæronion, alij Arion uocant, Romani Gladiolam, quidam Genitalem. Nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius uideretur, & gladij modo mucronatū, neruosumque. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant. Rotundo semine, radicibus geminis, una bulborum modo super alteram insidēte. Quarum inferior gracilis est, superna uberior. Nascitur in aruis. Pars superior radice cum thure illita, admisto uino, spicula & aculeos e corpore extrahit. Panos cum lilij farina & hydromelite discutit. Qua de re huiusmodi emplastris inferi solet. Menses imposita trahit. Superiore radice ex uino pota, Venere rem stimulari, & inferiore sumpta sterilefcere tradunt. Superiore quoque utiliter infantium enterocelis, cum aqua potui dari præcipiunt.

BARBARI COROLL.

Xiphion, a Theodoro dicitur Pugio. Floret uere, cum Viola nigra. Falso plerique arbitrantur Xiphion eandem esse, quæ & Lonchitis. Sed illa in siccancis, hæc in humidis nascitur. Sunt & alia discrimina, quæ notari possint uolentibus. Habet hæc & radicem ad nucis auellanae similitudinem fimbriatam, quæ effodi ante messes oportet, & in umbra sicari. Videtur hæc & Phasganon, & Machæronion, hoc est, Ensis uocari: radice, ut Theophrastus inquit, dulci, decocta, & comendata panificis, si trita farinæ admisceatur. Vnde Machæronij pastilli fortasse ortū habere, quos tertio Kalendas octobres uulgus elicit. Item rotunda, & sine cortice capillata fibris, ut Gethyum. Scolopendre in herbâ eam frequentes conueniunt. Est & compositionis cuiusdam in medicina uiridis nomen Machæronion, ad morbos articulares, & Ischiada. Habet & Xiphias piscis, quem Gladiolū interpretantur, duo, ut inquit Aristoteles habes rostra, sed dentibus carēs.

EX M. VERG COMM.

Hæc est Gladiolus illa, cultellato folio herba, cui a principio statim Iridis folia hic comparauit princeps in hoc foliorum genere, & quæ prima huiusmodi similitudinis notam ceteris dedit: ideoque tot gladiatorum appellationibus diuersis locis indicata. Florere hanc uere cum Oenāthe, nigra Viola, Helychryso, Limonia, Anemone, & Hyacintho Theoph. ait. Vocatque & ipse Xiphion, Plinius multis locis Gladiolum: quo tamen loco expresso de ea agit. 25. uolum. capite. 11. Xiphion, & Phasganon græcis nominibus eam appellat. Nec de folio eius aliud tradit, quam cum primum ex terra prodit gladij ostendere speciem. Hic ultra addidit, Iridi simile esse, breuius tamen & angustius *ἢ ἡ ἱρις ὡς μαχαιρίων*. In quo uidendum est, an in mucronem desinens dicendum sit, an decurrati mucronis: quales cultelli aliquando in incidendi tamen usum fabricantur. Vtrique enim *ἄκρον* significare ex diuersa propositionis eius ui potest: & quod *ἄκρον* ὄν, i. in acutum derafum est, & cui ex acumine suo ablatum aliquid fuerit: ut *ἄκρον* Thucydides ait, & in græcis multa alia inueniuntur. Pro duabus deinde radicibus eius reuocanda legentibus in hunc locum erunt, quæ in Testiculis duabus plantis superiore uolumine dicta a nobis fuerunt. Nec aliter in Gladiolo hac duas inueniri radices, quam in bulbosis plerisque alijs, in quibus præteritū anni bulbos & radix inferior semper est: genitaque ex se alia cedit ipsa, donec tertio, aut quarto anno tota pereat. Auellanis Plinius eas comparauit: hic naturæ notas magis secutus, bulbos paruos uocauit. Discrepant in natalibus eius Dioscorides & Plinius magnopere. Hic in aruis, ille in Pumis: alter in genere *ἀρουραιῶν*, quæ qualia sunt superiore libro dictum a nobis est, posuit: alter in aquosis & palustribus. Potest tamen uterque quod uerū sit dixisse: nam possunt arua humida esse. Diosc. præterea in aruis maxime nasci dicēs, nō negauit penitus posse etiā in aquosis nasci.

De Sparganio. CAP. XXIII.

Sparganion aliqui Xiphidion, alij Bolon uocant. Folia Gladiolæ, sed arciora & in terram magis procumbentia. In summo caule pi-

A

ἐπιφύων

Pli. li. 25. ca. 111

B

σπάργανιον

D I O S C O R I D I S

Culæ prominent, in quibus semen. Contra serpentis uenena radix cum uino datur.

E X M. V E R G. C O M M.

In decursu, & ueluti ad alia festinans Plinius, de Sparganio hac. 25. uolumine, capite. 9. egit: nihil ultra de ea testatus, q̄ aduersus serpentes bibi radicem eius quam Sparganion uocant, ex uino albo. Nec nos quod illi adijciamus aliud habemus, q̄ esse in græcis qui ἀπὸ τῶν σπαργανῶν dictam putent: q. f. folijs eius satis, & uilium modo lentis, pro fascijs his uterentur: quibus nutrices infantes suos ulnciunt, quas græci σπαργάνια dicunt: & σπαργανῶν uerbum, in infantium uinculis & fascijs his notissimum.

De syluestri Iride. C A P. XXV.

Evrip

XYris ab aliquibus Iris agria, ab alijs Cacos, a Romanis Gladiolus, aut Iris agrestis, a Dæcis Caprus dicitur. Folia habet Iridis, latiora, & in turbinem mucronata, quorū medio caulis erumpit, crassus, cubitalis, ex quo siliquæ triangulares depēdent. In quibus purpureus flos, in medio puniceus. Semen in folliculis simile fabis, rotundum, rubrum, acrc. Radix longa, geniculata, ruffa. Contra capitis uulnera, fractaq̄ efficax est. Aculeos & spicula omnia citra molestiam extrahit, adiecta floris aeris tertiā parte, & radices Centaurij, ac mellis quanta. Tumoribus & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicū dolores, strangurias & alui profluvia. Semen tribus obolis potum, urinam uehementius impellit, & cum aceto lienem absumit.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli, li. 21. ca. 20

D

XYris, & Xeris, aut XYrida, Galeno teste, dicitur. Scelus herbariorum quorundam aperit hoc loco Plinius, partem eius seruantium, & quarundam aliarum herbarum, & Plātaginis, & Iridis substituentiū, si parū mercedis tulisse arbitrantur: rursusq̄, ut plus operis acquirant, partem eā quā seruauere, eodē loco infodiūt. Credo inq̄, ut uitia, quæ sanauerint, faciāt rebellare.

E X M. V E R G. C O M M.

Posteriores de syluestri hac Iride docuerunt, quod nos nunq̄ non in agris æstate discedentes, in sepibus uidimus: cultellato ut hic ait, folio inter uepres & saxa nascentem herbā, multo foliorū cespite, acuminato mucrone, multo breuioribus q̄ Iridis, & ut hic ait latioribus: duob. tribusue, & aliq̄n quatuor caulibus, in q̄bus tument oblōga ueluti capitula: quæ suo tpe puniceo magis q̄ purpureo colore florēt: et cū defloruerūt, folliculos relinquētia lōgitudine digitali triquetros, in q̄bus tria, quatuorue semina ex oscillis suis pendent priuatim, nec aliē q̄ in Faba locis distincta: colore rubro cū maturuerūt: quæ nō sunt ipsa uere semina, sed latentium intra se seminum pericarpia & inuolucra: qualia licebit uolentibus quotannis obseruare. Saxosae sepes, & quasi macerias agrorū amat: luctaturq̄ inter saxa exiēs. Hos eius natales, & has plantæ notas nos obseruauimus: poteruntq̄ aliq̄ ex his facillime cætera deprehendere.

De Anchusa. C A P. XXVI.

Evrip

ANCHUSA aliqui Cantanchusam uocant, aliq̄ Libycam, aliq̄ Archibellion, aliq̄ Alcibiadion, aliq̄ Onophyllon, aliq̄ Porphyrida, aliq̄ Mydusam, aliq̄ Calycā. aliq̄ Noneā, Aphri Bunefath. Anchusa, quæ alio nomine Calyx, aut Onoclia appellatur, folia habet Lactucæ acuti folij similia, hirsuta, aspera, nigra, multa, quoquoersum humi sparsa, spinis horrida. Radici crassitudo digitalis. Quæ æstate prouenit, manus inficit sanguineo colore. Lato solo nascitur. Radix adstringit. Ad ambusta & uetera ulcera, ex oleo & egra efficax est.

Igni sacro cum polenta medetur. Leporis & uutiliginibus illinitur ex aceto. Partus extrahit, uuluæ indita. Eius decoctum renum uitijis, lieni & bile suffusis datur, & si febris sit, ex aqua mulsâ. Siftunt aluum folia in uino pota. Radice pigmentarij utuntur ad spissamenta.

B A R B A R I C O R O L L.

Anchusæ caulis, non ut aculeatarum multiserpens, sed stans. Funditur Papyri modo. Radix inficiendo ligno, cerisq; apta, præparans & lanas preciosis coloribus, Laodicensa maxime. Vt Democrito placet, liquari non potest in aqua ad medicinas: oleo resoluitur: idq; syncera experimentum est. Habetur & alia similis, Pseudanchusa, ob id appellata a quibusdam Enchusâ, aut Doris, & multis alijs nominibus, lanuginosior, & minus pinguis, tenuioribus folijs, & languidioribus, radice oleum non fundente, sed rubentem succum: & hoc ab Anchusâ discernitur. Anchusæ primum genus, Onoclea cognomen habet, & Chærospelethos in Paulo. Secundum Onochelos, siue Alcibiadios. Tertium pusilla, fereq; innominata. Quartum Lycopsos. Anchusam poetæ sunt, qui & Enchusam uocant: q̄q; Enchusa pro Pseudanchusâ potius, q̄ pro Anchusâ capitur a nonnullis, ut prædixi. Hippocrates Anchusam uidetur intellexisse, cum Schelida nominauit, ut Galeno placet.

Pli. li. 21. ca. 6.
Theoph. li. 9.
plant.

E X M. V E R G. C O M M.

Numerauit, coniunxitq; Anchusam Theophrastus libro octauo de plantarum historia Coronopodi, quam cornicis Pedem uocauimus: Chamæmalo: & plerisq; alijs, quæ ἐπιγυῖς ὀλλὰ ille uocat, id est, folia per terram spargentia: quod hic ait πρᾶσιπλάσµενᾱ τῇ γῇ, quod est, per terram sparsa. Nicander, quod & ab hoc dicitur, Lactucæ similia ostendit. Verficulus eius est, ἂν γὰρ ὅτ' ἀγγούσιος θριδακινιδία λάτο χαίτην. quod est, Lactucæ similia. Plinius inter aculeatas numerat, a cæteris in foliorum positura discrepans. Locus est. 21. uolumine capite. 16. Aculeatarum caules aliquarum per terram serpunt, ut eius quam Coronopon dicunt: & ex diuerso stans Anchusâ. Stantem Anchusam dicit, quam Theophrastus ἐπιγυῖς ὀλλων uocauit. Nec refert, q̄ Plinius caules dixerit, in caulibus enim folia. Omnes postremo sanguinei coloris habere radicem testantur, non toto quidem anno, sed æstate tantum, quo tempore colorem illum natura in ea decernit. Ex qua tēporis nota, quod passim in cunctis græcis legebatur, ἐν τῷ ἔριτι γεννωµένην, id est, æstate nascentem, ex antiquissimi codicis nostri fide γινωσκουµένην instaurationimus, & uertimus. Quod enim hic ait, eo pertinet, ut per æstatem tantum eo colore sit, tuncq; cognosci, & deprehendi tuto possit. Fuisse autem colorem ex Anchusæ huius radice in pretio & honore quondam, nihilq; non eo colorare ueteres consueuisse, græci latinisq; passim omnes testantur. Pliniusq; quo diximus loco, Inficiendo ligno, cerisq; radice apta. Nec multo post. 22. uolumine, capi. 20. Manus inficit sanguineo colore, lanasq; præparat preciosis coloribus. Hic ipse in rosaceo monuit unguentarios, ad bonitatem coloris Anchusam illi addere. Et ne longiores simus, nihil non Anchusæ radice sanguineo succo colorabatur. Eamq; ob causam iniectus mihi scrupulus est, quod in extremo capite legitur, ad unguentorum spissationem, non ad hoc, sed ad colorem potuisse quondam pertinere. Rara hæc in alijs plantis coloris nota: eamq; ob causam diligentius in hac eruscanda. Nobis hætenus uidere eam non licuit, & præter ab antiquis dicta, nihil oculati testes addere illi possumus: eadem in tribus alijs eius generibus fortuna etiam utentes. Audiuius tamen, in pascuis quæ ad Populoniæ amplissima sint, nasci herbam, quam gregibus suis noxiam pastores uident, omnibus nris notis ab eis descriptâ, præsertimq; sanguineo radicem succo: sed nihil pro comperto nobis aliud de ea est.

De alia Anchusâ.

CAP. XXVII.

Est & alia quam aliqui Alchibiadion, aut Onochiles appellarunt. Hæc a priore distat, q̄ minora habeat folia, sed simili modo aspera, ramulos exiles, florem purpureum, radices rubras, oblongas. Quæ melsibus sanguineum succum fundunt. In sabulosis nascitur. Vis ei folijsq; inest, quæ contra uirus cum reliquorum serpentium, tum maxime Viperarum auxiliatur, siue cibo, siue potu, siue alligatu. Nam si quisquā mandens in serpentis os inspuat, eum necabit.

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

C Anchusa Onochelos, alij Thexiam, & Archeuion, multi Enchryson: paruo frutice, radice præterq; messibus nigra: tunc em sanguinea est, uiresq; habet. Folijs tritis, odor Cucumeris.

De alia Anchusa.

C A P. XXVIII.

Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum Hyssopo & Cardamomo pota, lassas uentris tineas excutit.

E X M. V E R G. C O M M.

Quatuor fuere antiquis Anchusæ. Tres dictæ hæcenus: & quæ statim sequit cognomen Lycopsis: et si postremâ hanc priuatim aliqui, & per se docuerint. Omnes cõmunè aliquid, & in quo cõueniant habent, ideoq; cognomines: id autè maxime, rubes radice fucus est: alioquin in medicina uires diuersæ & inæquales illis sunt. Siquidem quæ Onoclea dicitur, prima in earũ censu, adstringente, & subamarâ habet radicem: ideoq; lienosis, & cū uring malo aliquo doloribus mederi dicta est. Eadem cū polenta, emplastri modo imposita, sacris ignibus accommodata credebatur. Eiusdem folia, q; minus q; radix refrigerat & siccant, cõtra fluores alui, q; diarrhiâ uocant, quondâ bibebant. Quæ uero Lycopsis dicta est, de qua mox agei, maiore adstringendi ui q; illa, sacris ignibus magis accommodata erat. Quæ Onochelos, siue Alcibiados dicit, maiore reliquis oibus in medendo ui uiperarũ morsibus in cibo, potuq; & alligata in usu erat. Quarta omniũ aliarũ breuior, sine nomine, maiore q; Alcibiados illa amaritudine pellendis uentris animalibus in usu fuit. Et hæc in antiquis græcorũ medicis Anchusarum omniũ decreta fuerunt, omnia ut uidetur ab hoc scriptore accepta.

De Lycopsi.

C A P. XXIX.

LY C O P S I S, quæ nonnullis Anchusa uocatur, longioribus q; Lactuca constat folijs, asperioribus, latioribusq; crassis, ad radicis caput recidentibus. Caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus, flore paruo, purpureo. Radice rubra & adstringente. Nasçitur in campestribus. Cum oleo radix illita uulneribus medetur, & cum farina hordeacea ignibus sacris. Sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

E X M. V E R G. C O M M.

Priuatim, seorsumq; a reliquis Anchusis Plinius de Lycopside hac uigesimo septimo uolumine, capite decimo egit. Nihil tamen illi tribuit, quod ab hoc scriptore acceptum non fuerit. Idem & Nicander in Theriacis suis fecit, post Anchusam Lycopsidem cum plerisq; alijs numerans. Antiquiores autè Græci Anchusæ congenerem fecerunt, secundamq; in eo censu numerabant, hic ultimâ docuit: licetq; Anchusam esse non dicat, sed ab aliquibus uocari, hifloriæ tamen ordo, & quæ illi tribuuntur notæ, Anchusis alijs congenerè merito faciunt.

De Echio.

C A P. XXX.

EChion aliqui Aridam, alij Alcibiadion, Romani Alcibiacum nominant. Folia habet prælonga, hirsuta, subalbida, Anchusæ proxima, minora tamen, subrubra, & pinguis, spinulis tenuibus horridula. Cauliculos exiles, numerosos, minutaq; utroq; latere folia, in uersus digesta, nigra, in summo caule minuscule. Flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti Viperarum similia insunt. Radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modo a serpentibus ex uino prodest, sed eos qui antea biberint feriri non patitur. Folia &

semen idem præstant mnnus. Lumborum dolores sedat. In uino aut A
forbitione sumpta, lac extrahit.

ECHIOS, etiam Dorias a Paulo uocatur. Plinius, Echios inquit, utriusq; generis Pulegio si-
milis est, coronata folijs: altera lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula sunt Viperæ. Qui-
dam Echion pro Personata inquit cõpere. Dioscorides hoc loco unum facit genus Echij, non
geminum. Sed Nicandrum uidetur sequutus esse Plinius, in theriacis dicentem, Echios duas
esse, contra bestiarum ætus utiles. Alteram humilem, folio Anchusæ spinis horrido, sed exili.
Alteram altiore, maiore folio, flore paucio, per ambitu purpureo, capitulis Viperæ, cacumine
aspero, atrifcoq; lanugine. Idem poëta paulo supra, quasi tertiam eiusdẽ nominis reddendo,
Echios inquit, cognomine Alcibios, herba est spinosa, coma sustinente flores, radice alta & exi-
li: quã ad serpentes, & injici uulneribus, & cõmanducari quoq; præcipit. Folia quoq; ipsa non
multo post, eiusdẽ Alcibij cõmendat, quantũ manu cõprehendi possit. Plinius. 27. uolumine.
Alcibios inquit herba, qualis esset, apud auctores non cõperi: sed radicẽ eius, & foliã trita, ad
serpentis morsu bibi & imponi iubent, folia quantũ manus capiat, trita cum uini meri cya-
this tribus, radicem drachmarũ trium pondere cum uini eadem mensura. Ideo autẽ qualis es-
set Alcibios apud auctores comperisse negat, quoniã præter Nicandri uerba illa, & pauca, &
alijs cõmunia quæ prætexui, non legitur qui descriperit. Alteram uero esse Alcibion Nican-
dro q̃ duas illas priores Echios, scilicet, ostenditur: & q̃ Echis hæc, non Echios ab ipso dicitur.
Et q̃ eandem herbam uno loco bis depingi opus non erat.

Pli. li. 29. ca. 6.

DVO Echij, siue Alcibij huius genera antiquiores fecerunt, præsertimq; Nicander utrunq;
his uerbis describens. *ἴδα δὲ ἄνα ἔχια πικρότατα, τὰς δὲ τὸ μέν ποιν ἀγχοῖσιν προποικύν ἀκανθὰν πικράδιον
παῖρον ἐπὶ τυτθόντι καὶ ἐν χροῖνι πυθμὶνα τίνι, ἡ δ' ἐν τριπύραλοις, καὶ ἐν καλὴναι θάλασσά ἐφ' ἡνία. ὀλίγω
δὲ πικρὴ πορφυρίσται ἐνδὲ βλάστῃ δ' ὅς ἔχ' ὅσφιδαν δ' ἰσχυρὴν καρπὸν.* Quorum sensus sit. Esse
duo Echia, habereq; alterum spinosa Anchusæ modo folia, uerum parua, et per terram sparsa.
Alterum maioribus folijs, & purpureo flore esse, aspero, lanuginosoq; caule, capitulis Vipe-
rarum figura, quod Plinius ait. Item altera, quæ lanugine distinguitur spinosa: cui & capitula
sunt Viperæ similia. Nicandri interpres ex Numenij antiquissimi scriptoris Theriacis, duo E-
chij genera itidem facit: uocariq; alterum, quod breuius est, Ocimoides: quoniã Ocimo simi-
lia habet folia: Alterũ uero spinoso folio, priuatim Echion. Quod primũ a Dioscoride descri-
ptum est: mox autẽ describetur alterũ, non sub Echij, sed Ocimoidis nomine.

OCymoides aliqui & hanc Echion uocant, alij Scorpiuron, alij
Sparganon, alij Althæam, alij Amaranthida, alij Probathæam,
alij Elaphion, alij Antiminon, alij Porphyriada, alij Agion, alij Nemeli-
on, alij Phileterion, alij Hyænopsolon, alij Thyrsutin, alij Themutin, alij
Misopathos, Latini Ocimastrum. Folia fert Ocimi, & ramos dodranta-
les, hirsutos, filiquas Hyofcyamo similes, semine ut Gith nigro prægan-
tes. Vim habet semen in uino potum, qua uiperarum, cæterarumq; ser-
pentium morsibus medeatur. Datur ischiadicis cũ melle, uino, myrrha,
& pipere. Radice nititur tenui & superuacua.

δουμορδία

DE Ocimoide, nonnihil in Ocimo dictum est.

QVO syluestris ad satium discrimine Menthastum, Apiastrumq; latini uetères dixerunt,
eadem naturæ, & nataliũ analogia Ocimastrum ab ipsdẽ dictum fuisse, uerisimile
est. Plinius tamẽ syluestre Ocimũ contẽtus dixisse, paucis medicinã & historiam eius absoluit.
Hic in maiore honore ueteribus fuisse Ocimastrũ, ex tam multis eius appellationibus indicat:
quarũ plures ex alicius partis ad alias herbas similitudine illi a gentibus per tempora accreue

D I O S C O R I D I S

C runt. Nec difficilius hoc tēpore quicq̃ est, q̃ earū multiplices huiuscemodi rationes inuenisse: præsertim non bene semper similia inter se cōparantibus imperitiis herbarijs, aut ex una, altera ue simili parte neglectis maioribus, & quæ magis ex re sint differentijs, medicā materiam alijs, atq̃ alijs appellantijs. Cur autē Echion Ocimoides diceretur, satis superiore capite dictū est. Cur autē Scorpium, Sparganium, Althæa, Amaranthis, & Philetæron, quæ omnes in scriptore hoc plantæ sunt, ex earū similitudine uidendū est. Probatae deinde, & Elaphios, ut conijcere licet, ouilla & ceruina herba dicta est: uel q̃ quadrupedes hæc libenter ea uescantur: uel q̃ natura docuerit, uel homines inuenerint, uenenatorū maleficia hoc remedio ab illis arcere. Porphyris mox a colore floris, quemadmodum & Augion ab eius splendore, Thyrsitis postremo ab hirsutis ramulis, quos thyrsorum figura profert.

¶ De Erinō.

C A P. XXXII.

E Rinon aliqui Hydreron, aliqui Ocymoides uocant. Nascitur apud fontes & fluuios, folijs Ocymi, sed minoribus, parte super na diuisis, quinis, senisue, dodrantalibus furculis, flore candido, semine nigro, & acerbo. Folia & caules lacteo succo turgent. Semen drachmis duabus, in quatuor mellis cyathis oblitum, oculorū fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & nitro instillatus, aurium dolores sedat.

B A R B A R I C O R O L.

E Rinus herba cognominis arbori Caprifico est, ob id a Plinio inter Ficos, Caprifiscosq̃ red dita, non naturæ, sed gentilitatis respectu. Lac eius dulce. Galenus hanc non Erinon, sed Echion uocare maluit. Vetus quoq̃ Dioscoridis sunt codices, in quibus non Erinos, sed Echion scriptum sit. Est & apud Hippocratem Echini herbæ mentio.

E X M. V E R G. C O M M.

D Secutus græcorum nomen Plinius, aquatici Ocimi huius historiam & medicinam inter Ficos libro. 23. capite octauo tractauit. Longeq̃ a congeneribus suis herbam inter arbores descripsit: contra scriptoris huius præcepta & leges, qui in totius operis proœmio grauiter damnauit, qui literarum ordinem sequentes, cognata a congeneribus suis diuellerent: manifesto argumento, in tractanda medica materia, indicibus librorum magis, q̃ totis commentarijs usum fuisse eum scriptorem. Posteriores rem magis, q̃ nomen secuti, inter Ocima de eo tractauerunt: neglectaq̃ lactei, & qualis in Fico est, liquoris una nota, ex qua Plinius Ficis id adnumerauit, ex alijs quæ multæ inter herbas describi herbam cogebant, aquaticum Ocimum, aut Ocimoides, quod Ocimo simile significat, appellauerunt. In quo habent grauissimum testem hunc scriptorem, qui inter congeneres herbas, & statim a uero Ocimoide eam tractauit. Nec si Græci a ficulnei lactis liquore eam appellauerant, ideo separanda a congeneribus suis erat. Illi enim non, quia Ficus, arborue sit, Erinon, id est, Caprificum eam uocauerunt, sed quoniam Caprificorum modo lac sectus eius caulis, & expressa folia stillant. Laudauit aquaticum Ocimum hoc contra uenenata in Theriacis suis Nicander, quod in scriptore hoc non legi, demiretur aliquis, præsertim testante id Plinio. Versiculus Nicandri est, *κλῆθοντ' ἐν ἀρκίσειν ἱρίον*. Quod est. Et uirentis ad radices montium Erinī. Tradidit Dioscles, a quo Plinius multa accipit, Ocimo simile esse: nasci prope flumina & fontes, & præter id apricis locis, & ad radices montium. Est illud etiam animaduertendum, credere nos quod in extremo capite est, finire aurium dolores instillatum succum, de lacteo liquore illo intelligendum esse. Is enim eius herbæ succus est. Nos tamen *χρὸν* inuenientes, ex instituta a principio in his nominibus a nobis lege, nihil detorsimus, incorruptam in hoc scriptore uocum, & eam dem semper significationem seruantes.

¶ De Gramine.

C A P. XXXIII.

A Grostin aliqui Aegicon, alijs Amaxitū, Aegyptij An uphi uocant, Latini Gramen, alijs Asphyllion, alijs Sanguinalem, alijs Vniolam, Hispani Apariam, Daci Cotiatam. Aphri lebal. Gramen geniculatis serpit ramulis, a quibus crebro radices spargit dulces, articulis

præcinctas. Folia dura, & ut harundinis parua lata, in exilitatem fastigi-
antur. Ea q̃ iumenta & boues pascunt. Trita radix illitu, uulnera conglu-
tinat. Decoctum eius in potu, torminibus medetur, & urinæ difficultati-
bus. Calculosa etiam uesicæ excrementa comminuit.

BARBARI COROLL.

Gramini ab internodijs ramorum, & cacuminibus radices nouæ pullulant. Sunt qui & a-
culeatum Gramen inuehant, trium generum, Dactyli cognomine. Vnum, cuius in cacumine
aculei sunt plurimum quini. Alterum Aizoo simile, Dactylon priuatim uocatum, quoniam
digitis medeatur. Tertium genus tenue. Nascitur in parietinis, aut regulis. Nulla herba gra-
tior iumentis Gramine, siue uiridis, siue in fœno siccata. Tunditur aspersa aqua. Radix adhuc
tenera mandendo est. Gramen Marti consecrauit antiquitas, q̃ ex humano cruore procreatū
crediderit. Qzq̃ & omnis herba Gramen abusione dicitur. Quidam Saturno dicant, q̃ ab eo
satum primo perhibent. Glaucum uero immortalitatem, huius herbæ cibo consecutū, Adhe-
næus ex Aeschionis poetæ uerbis existimat.

Pli. li. 24. c. 19.

EX M. VERG. COMM.

Vlgatissimū inter herbas Gramen est. A capris Aegicon, a iumentis Amaxitim antiqui-
tas nōiuit: q̃ capræ scilicet, & iugo, carpētisq̃ seruietia iumēta eo passim uestant. Sanguina
lem uero, q̃ humano cruore procreari ueteres falso crediderint. Angustijs urinæ opitulari hic
ait: cōuenitq̃ in eo antiquis medicinæ auctoribus, qui inter diuretica simpliciter id numerat:
ultra quod hic lapidosa etiam uesicæ excrementa frangere ait. Extrema tamen hæc pars in ali-
quibus græcis aliter legitur, ὀξύς, scilicet ὀξύς λίθου σπέρμα. quod est, facere Gramen ad urinæ an-
gustias, uesicæq̃ ulcera, & calculos frangere. Quæ omnia a Plinio. 24. uolumine capite deci-
monono, totidem, & h̃sdem uerbis reddita fuerunt.

De harundinaceo Gramine. CAP. XXXIII.

Est & harundinaceū Gramen, priore multo maius, q̃d iumenta ne-
care tradit, præsertim in Babylone. Idc̃ iuxta uias nascitur.

καλὴ καὶ γαστήρ
B

BARBARI COROLL.

Alamagrostis, a Plinio Gramen simpliciter uocatur. infestum camelis. Quidam Babylo-
num Gramen cognominant.

EX M. VERG. COMM.

Contraixit Plinius ad Camelos, quæ hic iumenta dixit, enecare Gramen in Babylonis regi-
one iuxta uias nascens. Nec facile est nobis modo ratiocinari, camelos ne ille dixerit, quia mul-
to hoc, & quasi solo ad uecturam iumento semper usa ea regio fuerit: an quia Gramini illi, &
animali huic ex naturæ antipathia discordia sit. Huic idem, aut simile uidetur esse, quod a Par-
naso Gramine statim hic ait: natum in Cilicia Gramen, in cibo sumptum boues exurere: fa-
cereq̃ id alter ex interpretibus ait impositum, alter uero in Sicilia: cum tamen antiqua & uera
lectio sit, ἡνελία, & βρωθία, id est, in Cilicia, & in cibo sumptum. Plinius longissime de omni
Gramine, quo diximus loco paulo ante longius egit: neq̃ ab hoc scriptore adeo diuersus, ut
de his ultra agere nos oporteat.

De Gramine Parnasi. CAP. XXXV.

Quod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat, folijs hederæ
ceis, flore odorato, candido, semine paruo, nō inutili. Radicibus
quinis aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, &
mirū in modū dulcibus. Succus si in uino cum melle pari, & myrrhæ di-
midio decoquat, adiciaturq̃ piperis & turis tertiar portiones, probatissi-
mum erit oculorū medicamentū. Id in area pixide recondit. Decoctū ra-
dicis, idem quod hæba præstat. Semen uehemētius urinā impellit. Al-
uum, uomitionesq̃ sistit. Natū in Sicilia Gramen, quod incolæ Cinnā
appellant, boues inflammat, si eo uirenti sæpe pascantur.

D I O S C O R I D I S

C B A R B A R I C O R O L L

C Gramen Parnaso monte, folium habet Hederæ, densius q̄ usquam fruticans, cum in reliquo orbe folia in exilitate fastigent. Succū huius excipiunt propter ubertatē, qui & dulcis est. Gramen Ciliciū, hoc est, Cinna, Sunt qui & Medon uocent: nec amburi eius recentis pastu boues, sed pinguescere contendant. Nato alterutris errore, q̄ alij *πικρὸς τοῦ βίου* legebāt, alij *πικρὸν*.

¶ De Siderite.

C A P. XXXVI.

Sideritin aliqui Heracleam uocant, Magi Genituram, aut sanguinem Titani, alij Scorpionis urinā, Pythagoras Parmiron, Andreas Xanthophanea, Osthanes Bocephthalmon, Aegyptij Sendionor, Romani Vertemnum, alij Soleastrum, Aphri Vdedonin. Folia habet Marrubij, sed longiora, fatis ad frondem quercus, aut saluæ accedentia, minoramen, & hirsuta. Caules ædit quadratos, palmum sæpe excedentes, non iniucundi gustus, aliquantumq̄ substringentis. In quibus per interstitia, orbiculatæ uertebrae, ut in Marrubio spectantur. Et semen in eis nigrum. Nascitur in petrosis. Illita folia, suapte ui, uulnera sine inflammationis periculo iungunt.

B A R B A R I C O R O L L

Pli. li. 22. ca. 17.

Sideritin primam, aliqui ueram Achilleum cognominant, alij Sideriten. Odoris foedi cum teritur, tradunt. Nostri Sideritin eam, quæ est latissimo folio, Scopam regiam appellant, medentem anginis suum peculiariter.

¶ De alia Siderite.

C A P. XXXVII.

D Alia Sideritis binum cubitorum, ramulis exilibus, folio Filicis, in ambitu utraq̄ parte diuiso, pediculo longo, p̄deuntibus e summo alarum sinu furculis, longis, tenuibus, capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, q̄ Betæ rotundius aliquanto, ædurius. Huius uis foliorumq̄ ad uulnera præcipua.

B A R B A R I C O R O L L

Sideritis secunda, ramulos habet triangulos.

E X M. V E R G. C O M M.

Ingenue fatemur, in tanta ueterum & iuniorū diuersitate, nihil habere nos de Siderite, quod pro comperto tradere ualeamus. Quæ Plinius multis locis nunc de toto Sideritidum genere, nunc priuatim in hac, aut illa tradiderit, facile est omnibus uidisse, & cum uiderint censere. Nolumus nos labori eorū parcere: neq̄ ingenij, iudicijq̄ sui gloriam illis auferre. Quod autē nos in melioribus græcis obseruauimus, tacendū non est. Duo esse illis præcipua Sideritidis genera: Heracleam, id est, priore illam: & Achilleam, quæ mox dicenda erit. Nec aliter Paulus Aegineta in. 6. tradidit. Eam Græci a ferro Sideritim dixerunt, quoniā glutinadis uulneribus apta, percipui in bello haberet usum: qd sæpe ab eo metallo in græcis scriptoribus indicat, ex eadem scilicet causa, ex qua quæ sequit Achillea militaris etiā dicta fuit. Dubitamus nos in priore Sideritide, quo loco hic ait, habere Marrubij folia, longiora tñ, ad Saluæ, aut Quercus. &c. abū dare earū notarum alterā: fuisseq̄ ex alio Sideritidis gñe ab imperitiore aliquo additā. Non em̄ possunt Querna Saluæ folijs in cōparatione alterius coniūgi: tam dissimilia inter se sunt.

¶ De alia Siderite.

C A P. XXXVIII.

Sideritin aliam esse tradunt, quam Crateuas Heracleam uocat, in mactarijs & uineis nascentē, folijs Coriani, a radice numerosis, dodrantalibus cauliculis, læuibus, teneris, in rubore candicantibus. Flore purpureo, paruo, gustanti amaro & uiscido. Huius ea uis est, ut quamuis recenti uulneri impolita, sanguinem supprimat.

Sideritis tertia, similis Achilleo est, mox prodendæ, sed candidioribus folijs, & pinguioribus, tenuioribus cauliculis.

ACHILLEA. **De Achillea.** CAP. XXXIX.
ACHILLEA. Aliqui Myriomorpho nominant, alij Chiliophyllon, alij Stratioticon, alij Heracleon, Latini supercilium Veneris, alij Acron syluaticum, alij Militarem, alij Millefolium, Aphri Asterchillos, & aliqui Achilleam Sideritin. Dodrãtales, aut maiores gerit scãpos, fusorum effigie, quasi minutulis folijs circumdatos, crebris in latere foliorum sectionibus, Coriandri similitudine, subfuluo colore, odore multo, non insuauis, medicato, & uiscido. Umbella in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurum æmulantibus. Prouenit læto solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur. Erumpentem sanguinem inhibet, & cruenta uulnæ profluuiã in uellere. Decocto quoq; insident sceminæ fluctione uulnæ laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

BARBARI COROLL.
Sideritis Achilleos dicitur, quoniam inuenit eam Achilles, discipulus Chironis, qua uulneribus mederetur, & Telephum sanauerit. Alij primum Aeruginẽ inuenisse tradunt utilissimam emplastris: ideoq; pingitur, ex cuspide decutens eã gladio in uulnus Telepho: Alij utroq; usum medicamento uolunt. Hanc nonnulli Panaces Heracleon appellauere. Nostri propriẽ Millefoliam, cubitali scapo ramosam: minutioribus q; Feniculi folijs, uestitam ab imo: Alij uerã Achilleon esse dicunt, scapo ceruleo, pedali, sine ramis, ex omni parte singulis folijs rotundis inter circumdatã. Alij primũ genus Sideritis Achilleo uerã, ut diximus, acceperunt. Ethruria folia uocat, herbã in pratis tenuem, a lateribus capillamenti mō foliosam, eximij usus ad uulnera. Boũ neruos abscessos uomere, solidari ea, rursumq; iungi, addita axungia, affirmant. Achilles, et Achillion uocatur quarra Sideritis, ut dictum est: et a latinis qbusdã Lumbus Veneris. Dioscorides Supercilium Veneris, non Lumbum dici uoluit, alterutro errore orto, q; Græci ὀφὺν lumbum, ὀφρύν supercilium appellant.

BATIS. **De Rubo.** CAP. XL.
BATIS. a Græcis, ab alijs Cynosbatos, ab alijs, Selinobition, ab alijs Syntrophos, a Magis Titani sanguis, ab alijs Ibis sanguis, a Romanis Rubus, ab alijs Scites, a quibusdam Morabaticana, a Dacis Manthia, Aegyptijs Hamoos, alijs Ametros appellatur. Rubus notitiæ uulgaris. Vim habet siccandi & adstringendi. Capillum tingit. Ramorum decoctum, potu aluum sistit, & sceminarum profluuiã. Præsteris morfui accommodatissimum. Gingiuas firmat. Oris uitij folia comanducata medentur. Cohibent ulcera quæ serpunt. Vlcerebus in capite manantibus, oculisq; procidentibus remedio sunt. Condylomatibus, & hæmorrhoidibus folia illinuntur. Cardiacis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. Caules cum folijs tunduntur, exprimiturq; succus, mox sole cogitur, singulari remedio contra omnia quæ modo dicta sunt. Mori in Rubo nascentis, q; optime maturi succus, ad oris medicamenta conuenit. Sistit aluus præmaturi cibo, necnon flore in uino potu.

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

CRubi multa genera, sed quæ magno separantur discrimine. Chamæbaton uocant humi-
lem Rubum, qui protinus quæ paulo accreuit, retro uergit in terram, atque ita radicitur, & Humi-
rulus a Theodoro dicitur. At Rubus inter arbores aquaticas statuitur. Rubi unum genus fert
mora, quæ & manduntur. Huius radicis spongiolæ, duricia lapidis trisuntur. Alterum rosas:
de quo in Cynosbato dictum est. Flos mori candidus, per menses colligitur. Locus Rubis con-
stitus, quem nos Senticetum & Dumetum uocamus, Græci Batiam, & Apobaton appellant.

E X M. V E R G. C O M M.

Commune græcis Batos Ruborum omnium nomen est: quo in toto hoc genere utentes, ad-
ditis notis aliquibus, species eius distinguunt. Chamæbaton uerbi causa, Cynosbaton, aut Idæu-
batum uocantes: quæ tria sunt uniuersi generis huius discrimina, Latini modo Rubum, ut Plini-
us, modo Sentem, ut Columella appellant, Idæum rubum, uel Sentem, Canisem, & sim-
pliciter sentem seu Rubum: quem autore Theophrasto libro. 3. de plantarum historia Chamæ-
baton, id est, humilem & terrestrem uocauimus. Verba eius quo diximus loco hæc sunt:
ἔτι δὲ καὶ τοῦ βάτος πλείω γένη. μέγιστον δὲ ἔχοντα διαφορὰν, ὅτι ὁ μὲν ὀρθοφύων καὶ ἄκρον ἔχων. ὁ δὲ
ἐπὶ τῷ γῆσι καὶ ὑδατί κατω ἔχων. καὶ ὅταν συνάπτῃ τῇ γῇ ῥιζοῦμενος παλιν ἐν δὲ καλοῦσι τινὲς χαμαίβατον.
ὁ δὲ κυνόςβατος ἢ καρπὸν ὑπὲρ ὅρου ἔχει, καὶ παραπλάσιον τῷ τῆς γῆς. ἔτι δὲ ἀνδρῶν καὶ θάμνον ματῶν
καὶ παρόμοιον ταῖς γῆσι, τὸ δὲ φύλλον ἀγνώστου. Quorum sensus est. Ruborum item plura genera.
Præcipuam uero habent differentiam, quæ alter recta & in altitudinem erigitur. Alter deorsum
& in terram uergit: & cum primum terram attigit, iterum radicitur. Vocantque hunc aliqui hu-
mitem, seu terrestrem Rubum. Qui uero Cynosbatos, id est, canis Senticis dicitur, fructu fert ru-
bentem, puniceæ cytino similem. Estque inter fruticem & arborem medius, puniceæ similis, folio
uiticis. Et hæc Theophrastus de duobus Rubi generibus: quorum alter primo uolumine a Dio-
scoride descriptus est, alter modo docei. Estque hic Chamæbatos, id est, humilis ille Rubus, Sen-
tis, uel Rubus a latinis simpliciter appellatus. Cuius mora extrema æstate maturescencia, aut
bus grato, & hominibus non inutili cibo in sepibus nigrescunt. Quæ inter Romanas Rubi ap-
pellationes in Dioscoride nunc leguntur; Vaticanaque dicuntur, augustiore unius Romani col-
lis: quæ ex reliqua Italia nominis nota.

De Idæo Rubo. C A P. XLI.

IDæus Rubus appellatus est, quoniam passim in Ida proteniat.
Est autem longe tenerior priore, ac minoribus spinis horrens. Quan-
tum & sine spinis inueniatur. Eadem præstat quæ supradictus. Cæterum
flos cum melle, oculorum collectionibus commodissime illinitur. Ignem
sacrum extinguit. Stomachicisque ex aqua bibendus datur.

B A R B A R I C O R O L L.

Rubus Idæus, in Ida, non alias nascitur, sub arborum umbra, rarioribus aculeis, & minus
aduncis.

E X M. V E R G. C O M M.

IDæus Rubus hic dictus est, quoniam in Ida, nec alibi copiosior nascitur, tenerior, paruis acu-
leis, & aliquando, ut hic ait, nullis. Tertium genus in superiore illa diuisione nostra faciens. A lo-
co græci appellauerunt, ob eam quam diximus causam.

De Helxine, id est, murali hæba. C A P. XLII.

Helxinen aliqui Elitim uocant, alij Canocersæam, alij Amelxinem,
alij Eufinen, nonnulli, Amorginen, alij Sucorachos, alij Pych-
uacos, alij Psychouacos, alij Melampelon, alij Cittampelon, alij Cissā-
methon, alij Anatetamenon, Romani uolutum Lapparon, Aegyptij
Apap, alij Parthenion, alij Sideritin, alij Heracleam, nonnulli Agriam,
quidam Clibodion, alij Polyonymon. Nascitur in sepibus, uinetis, mace-
rijis, et segetibus. Folia ei Mercurialis adsunt, hirsuta, cauliculi leniter ru-
bentes, & circa eos ueluti semina aspa, adherentia uestibus. Folia refrig-

gerandi spissandiq; naturam habent. Quæ ex causâ sanant illitu ignes A
 sacros, adusta, condylomata, incipientes panos, tumores, inflationesq;
 Succus eius cum cerusa, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt apu-
 sine illinitur. Imponiturq; podagris, cum hircino seuo, aut cærato cy-
 prino. Veterem tussim adiuuat, cyatho hausto. Tonsillis inflammatio-
 ne turgentibus, utilissime & gargarizatur, et illinitur. Succus in aurium
 dolore infusus, iuuamen præstat.

BARBARI COROLL.

Helxine duplex Dioscoridi, & omnino autoribus. Altera Partheniō, altera Cissanthemos
 ab Hederæ folijs uocata. Plinio item duplex, sed aliter. Altera de qua hic agitur Parthenij & Per-
 dicij, siue Perdicidis cognomine: qm̄ perdicēs hac præcipue uescantur. Folia tamē ei non Mer-
 curialis, ut Dioscorides, sed mixtæ similitudinis, Plātagini & Marrubio tribuit, cauliculis den-
 sis lanas infici, semina in capitibus lappaceis adhærescentia uestibus: a quo & Helxinem dictā
 uolunt. Hanc Aeliæ gentes, & Aegyptij edunt. Crassas, plurimasq; habet radices, ut ingit Plī-
 nius. Altera idem autor ingit, uerior est Helxine, cui radix foliosa, ex qua similis malo carduus
 seminis plenus extuberat. Seminalis Acanus a Theophrasto dictus, cuius inciso fumo uertice,
 lachryma erumpit iocundi saporis, Acanthica Mastiche uocata, proptereaq; adulterium ex ea
 fit, ut diximus. Germinat, atq; floret æstate folio, & caule, lanugines spinosas habens. Hæc Plī-
 nius. Nos hanc non Helxinem, sed Ixinem uocari credimus: ut in Chamæleonte candido di-
 ctum est: quanq; porro prior Helxine Perdicion, & Parthenion dicatur. Aliud tamen intelligo,
 Plinium secutus, Perdicion, quæ a nostris herba Vrceolaris uocatur, ab alijs Astericum, folio
 similis Ocimo, nigrior tantum, nascens in tegulis parietinisq;: ob id & Parietaria, et Muralium, B
 & Muralis uulgo dicta, & Vineago: & Parthenion, qm̄ a Minerua in somno contra præcipitia
 lapsusq; monstrata est Pericli Atheniensium principi, cū uernula ei charus ex altitudine cecidisset,
 Splachnoptes appellatus. Turtures, columbæ, gallinacii annum fastidium deducere di-
 euntur Helxina pasci, autor est Plinius. Triplex igitur inuenio Parthenium. Vnum folio Cori-
 andri, quæ Amarus a Galeno, Parthenium a Dioscoride nominat, uulgo Matricaria. Alterū
 folio Mercurialis, ut Dioscorides hoc loco, siue Plantaginis & Marrobij, ut Plinius, quæ dicūt
 Helxine, ac de ipsa hic agitur. Tertium folio Ocimi, quæ Parietaria, & Muralis uocetur: de qua
 mirum est Dioscoridem nihil præcipere, qd scia. Nisi qd eum dicat sub Helxine hanc qd accep-
 disse: qm̄ hirsutula sit, & adhæreat uestibus, nec a Mercurialis herbæ folijs omnino multū di-
 stet, præterq; qd Mercuriali serrata leuiter ea sunt, Parietariæ non sunt. Sunt qui & Mercurialem
 ipsam Parthenion quoq; dicant Helxinem, ut Dioscorides in Myosotide scriptum reliquit. Eti-
 am Alfine dicta est, quanq; corrupte in Theophrasto legitur Alfine, ubi Theodorus Volucrum
 interpretatur, arbores amplexu Hederæ modo strangulantes.

EX M. VERG. COMM.

Puribus, & inter eas aliquot plantis alijs cōmunibus Helxine appellationibus qndam in-
 dicata est. Testantur in græcis id Græcorū medici, qui Helxinem primo Perdicium, Partheniū,
 Sideritū, & Heradeam uocari aiunt. Mox & Cissampelum, Duobusq; capitibus de eiusdem
 nominis herba agentes, neq; easdem utriq; uires tribuentes, duas manifeste Helxines eodem
 nomine, sed diuersa natura constituisse uidentur. Præter eos Nicander etiam in Theriacis suis
 Parthenij primum, mox Helxines facta mentione, utranq; cōtra uenenata laudauit. *ἢ καὶ ἰδί-
 ῃν, τὴν αὐτὴν καλεῖται καλοῦσι.* Quo loco interpretis eius, Clybatim, Sideritū, Parthenium, & Perdi-
 cium, & omnibus his unam eandemq; plantam uocari ait: iterumq; *καὶ μὴν παρθέσιο.* &c. Ite-
 rumq; idem interpretis testatus est, Parthenium a quibusdam Helxinem, et Perdicium nomina-
 ri. In latinis Plinius lib. 22. capite. 17. his uerbis græcos secutus est. Helxinem aliqui Perdicium
 uocant: quoniam Perdicēs ea præcipue uescantur: alij Sideritū: nonnulli Parthenium. Non li-
 cet in tam concordī tot testium fide, tam multis appellationibus dictam fuisse quondam Hel-
 xinem, non fateri. Non ideo tamen credendum, unam duas esse plantas, notis & uiribus diuer-
 sas. Oportet enim in cognominibus unum esse quod primo, uere, & per se nomine illo indice-
 tur: tum ex similitudine ad id nomen alia admitti: quæ genus suum seruantia, in parem no-
 minis rāum societatem, cōmunionemq; adoptione illa ueniant. Esse autem duas Helxines, dis-
 similes naturæ inter se notæ ostendunt; & post naturam antiquiores græci, præsertimq; Paulus
 Pij

D I O S C O R I D I S

D Celsus etiam secundum medicinæ suæ librorum, Muralium herbarum nominans, hanc intellexisse cre-
ditur: quoniam parietes & muros natalem sibi locum fecerit. Ob quam causam a multis ali-
quor locis Parietaria nunc etiam dicitur. Hic etiam *ὑψηλοῖς καὶ τοῖς τοῖς*, idest, maceris & muris
nasci ait. Sunt hæcenus appellationes hæc priori huius Helxinæ proprie ex diuersis causis illi af-
signatæ: Sideritis uero, & Parthenion alijs plantis proprie, huic uero additæ, & ex similitudine
aliqua receptæ. Credimusq; nos, Helxinem ideo Sideritum dictam, quæ utatq; Marrubij folijs
At hic Mercurialis herba folio Helxinem describit: alij tamen, præsertimq; Plinius mixtæ si-
militudinis inter Plantaginem & Marrubium, Vtraq; folio aspero est. Sola enim asperitate uer-
stes tenaci nexu hæc retinet. Vtraq; etiam inter saxa nascitur. Cur autem Parthenios quondam
diceretur, nō satis modo nobis constat. Quæ hoc nomine dicta proprie fuerit, Antemidi con-
gener herba est, superiore uolumine inter Chamæmalum & Bouis oculum tractata. Ceteris,
quæ plures in medicæ materiæ disciplina sunt, addita, & ex similitudine recepta ea appellatio-
nem, non genus, manifeste indicat Paulus Aegineta: quæ cum de Helxine egisset, non multo post
proposita Parthenio, id tantum ait, *ὑψηλὴ ἐν τῷ ὄρει*. quod est, Dictum in Helxine: quasi per
se Parthenion nulla esset, sed ex multis una Helxines appellatio. Vulgo fere nota Muralis, Pae-
tariaq; hæc Helxine. Quemadmodum contra cognitu difficilis quæ Cissampelos primo: eam-
q; ob causam nominata est, quæ Hedera folio in uinctis nascitur: ex qua eius natura factæ aliæ il-
læ appellationes etiam sunt, Melampelon, & Cissanthemon. Omnes enim coniunctum sibi He-
dera nomen habent, natalis loci, & foliorum eius index. Obseruatur pluribus locis in scribere
hoc a nobis est, plantarū genera, non nomina appellationibus his ab eo numerari. Factūq; id
hoc loco credimus: quoniam sunt quæ in nominibus his utriusq; generi Helxines seorsum competant:
discreuisseq; eas ex his quæ hæcenus dicta sunt, non erit legentibus difficile. Adiciemus illud
etiam, quam hic Polyonymon, id est, multis nominis appellationem Helxines esse ait, ad pri-
orem illam pertinere. Ea enim est quæ tam multis nominibus indicatur.

ΕΛΚΤΙΝΑ

gentibus. Nascitur in fegetibus & cultis. Oculorum fluctionibus & in inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis & impositis. Eadē cocta sorbitionis usu dysenteriam sistit.

BARBARI COROLL.
Elatine, folio Cassia a Plinio describitur: cetera cum Dioscoride conueniunt. Corruptam in Plinio lectionem esse haud sum dubius, librarijs Cassiam pro Helxina substituentibus: quandoquidem Elatina modo uisitur, Helxinae similis, hoc est, folio Hederæ propinquo, non Cassia: cuius id oleaceum est: ut in Chamælea dicitur.

Pli. li. 27. ca. 9.

EX M. VERG. COMM.
Similis Helxinae Elatine est, non simpliciter, sed ei quam folio Hederæ Cissampelon uocari diximus: eamque ob causam ab Helxine statim tractata, Eam ueteres græcorum medici mediocriter adstringere, & refrigerare dixerunt.

De Eupatorio. CAP. XLIII.
Evporium, siue ut alijs placet Hepatorium, aut Hepatitis, fruticosa hærba est, unum efferens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum ampliorem. Folijs per interualla Quinquefolij, aut Cannabis similibus, quinquepartito, aut amplius diuisis, nigricantibus, per ambitum ferratis. Semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum spectans, quod siccatum uestibus inhæret. Contrita huius folia, & cum suillo adipe imposita, ulceribus quæ agrecicatricem trahunt, medentur. Hærba, aut semen in uino potum, dysenteria, iocineris uitij, & serpentium icibus liberat. Nec desunt qui aberrantes, Artemisiam hanc appellarint, cum tamen longe alia sit, uti exposuimus.

εὐπατόριον

BARBARI COROLL.
Evporium, & Eupatoria quoque dicitur. Regiam & hæc auctoritatem habet, folijs plumosissimo caule, flore candido, radice superuacua. Mauriani aliud Eupatorium demonstrat, micinis penitus diuersum figura, sed effectu par, scapo exiguo, fere cubitali, folio Centauri minoris, frutice odorato, sed flore magis, gluteus ei est, radice superuacua. Passim nascitur.

EX M. VERG. COMM.
Ferunt quondam, & adhuc sunt, magnæ inter autores & medicos litis Eupatorium, & Argemone. Nec persuaderi adhuc possunt aliqui, non esse Argemonem Eupatorium: ex tam multo tempore, tamque antiquæ fidei in medicina autoribus, ea multorum animis opinio infedit. Licetque hic iampridem in Anemone, & nunc in Eupatorio dixerit decipi plerisque, falsoque credere Argemonem Eupatorium esse: non desinunt tamen quotidie pro ea re uiolenter aliqui certare. Verba eius in Anemone sunt, qualia poterunt uolentes cum libuerit uidere: ea nunc etiam repetita ab eo sunt. Nosque illorum memores, necessario locum in extremo hoc capite emendauimus: & pro Artemisia, Argemonem uertimus. Quod enim hic ait, quosdam Artemisiam hanc uocasse deceptos, alia enim est ut præmonstrauimus, in Artemisia non legitur, at in Anemone manifeste id inuenitur. Sunt Diosco. in Anemone uerba hæc, *ἡνίοκ δὲ μὴ ἀνέμωνιοι ἀνέμωνιοι ἀνέμωνιοι τὴν λεγόμενὴν ἀργεμόνην, καὶ τὴν τοιαύτην μικρὰν. περὶ τῶν ἐν ταῖς μικραῖς ἰσχυρῶν ἀνέμωνιοι τὴν λεγόμενὴν ἀργεμόνην, καὶ τὴν τοιαύτην μικρὰν. περὶ τῶν ἐν ταῖς μικραῖς ἰσχυρῶν ἀνέμωνιοι τὴν λεγόμενὴν ἀργεμόνην, καὶ τὴν τοιαύτην μικρὰν.* Quorum sensus est, qui in Anemone redditus a nobis fuit: cui & hic responderet locus. Neque Artemisiam, sed Argemonem falso inquit Diosco. credere quosdam Eupatorium esse. Neglexerunt hoc alij interpretes, quod alioquin multifaciendum erat: ut quale uerum Eupatorium esset aliquando cognosceretur. Vidimus nos in maioris ciuitatis nostræ Nosocomij hortis natam plantam, quæ omnibus a Diosco. traditis notis, ueram Eupatorium se ostenderet: præsertimque semine in terram declinui, & postquam aruerat uestibus herente. Nihil in quotidiana multarum plantarum obseruatione certius antiquæ historiæ respondere aliqui mihi uisum est: fusculosum genus, singularis uirga, lignosa postquam aruit duricies, plumosa undique aspiditas, color liuens magis quam niger, & folia

P ij

D I O S C O R I D I S

C per interualla, sed contrarijs pediculis pendentia. Quod non penitus huic scriptori responde-
re uidebatur: comparatio tantum erat, qua Cannabis, aut Quinquifolij folijs ea comparaba-
tur. Cetera naturæ & Dioscoridi eadem omnia erant, Regiæ dignitatis herba Eupatorium eti-
am est, ab Eupatore rege inuenta. Et quoniam iecori præcipue medeatur, quod græci hepar
dicunt, ideo Hepatorium, & Hepatitis ab aliquibus dicta.

πεντάφυλλον

¶ De Quinquifolio. CAP. XLV.

Pentaphyllon aliqui Pentapetes, alij Pentatomon, alij Pentada-
ctylon, alij Pseudoselinum, alij Callipetalon, alij Xyloloton, nō
nulli Xylopetalon, alij Asphalton, alij Pentaccenon, alij Thymiatiin,
Aegyptij Orphitebœocen, alij Enotron, Magi Ibdidis unguem, alij Ibi-
dis pennam, alij Hermodactylon, Romani Quinquifolium, Galli Pen-
pedulam, Daci Propedulam appellant. Ramulos fert furculaceos, tenu-
es, palmi magnitudine, in quibus semen. Folia Menthæ, quina singulis
pediculis, raro plura, in ambitu serrata. Florem ex luteo pallefcentem,
interdum auri æmulum. Nascitur in riguis, & aquarijs ductibus. Sub
rubram habet radicem, oblongam, Veratro nigro crassiore. Plurimis
poller remedijs. Ius radicis decoctæ ad tertias, si in ore contineatur, den-
tium dolores sedat. Putrida oris ulcera, collutione sistit. Arteriæ scabriz
cias, gargarizatu lauigat. Contra alui profluuiâ, & dysenterias auxilia
tur. Item articulorum, coxendicum, & cruciatibus potum. Cocta in ace-
to & illita, serpentia ulcera cohibet. Strumas, tumores, duricias, absces-
sus, & distentiones discutit. Ignis sacros, reducias, condylomata, pso-
ra, & sanât. Teneræ radicis succus contra iocineris pulmone, & uicia
D prodest. Item aduersum uenena. Cum hydromente autem, uel diluto
uino, & piperis exiguo bibuntur folia, contra febriū circūitus. In quar-
tana quidem quaternum ramulorum, in tertiana uero ternum, in quoti-
diana unius. Tricena quoq; folia, tricenis pota diebus, comitialibus præ-
sunt. Foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrime rez-
gio morbo medetur. Illita cum melle, & sale, tam uulneribus q̃ fistulis
remedio sunt. Enterocelcis auxilium præstant. Quinquifolium sangui-
nis profluuiâ & potu & illitu sistit. Ad expiatiōes, castimonias, et san-
guinis eruptiones inciditur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 25. ca. 9.
Theo. lib. 9.
de planta. hi.

Pentaphyllon, & Pentapteron in Theophrasto, Theodorus Quinquifoliam, & Quinquen-
nam conuertit. Aetius hanc Hermubotanem, hoc est, Mercurij herbam uocari tradit. Aegyptij
etiam Dislyphi cognominant. Daci Drocula. Itali Psyllitum, Soloram, & Thebeotin: quan-
quam corrupta puto nomina. Nam & Therumbros, & Theonestron quoq; dictam inuenio.
Radice cum recens est, rubente, nigra: cum inarescit, quadrangula: folio uitis pusillo: auge-
tur, desinitque cum uite: caulibus tenuibus, crebris geniculis. Nomen a numero foliorum.
Quidam Græci Chamæzeleon, quasi fruticem terræ uocant. Commendari Quinquifolium
fraga terrestria gignendo, Plinius existimat. Ego id, qui uerum esse possit, non intelligo. Nam
herba ea quæ fraga gignit, Trifolia est, non Quinquifolia, flore candido, non luteo, in Rheti-
cis & Vindelicis alpiibus, etiamnum frequens secus uias. Hippocrates duo uidetur nouisse
Quinquifolia. Candidum, quod & herbaceum, & procerius est a terra. Nigrum, quod humi-
lius. Est & quæ Tormentilla uulgo dicitur Quinquifolio simillima, nisi q̃ septem, non quinq̃

habet folia. Potest a nobis Heptaphyllon uocari, hoc est, Septemfolia: ex cuius radice pasillos theriacos (si Dijs placet) officinae pro uiperarum carne subiiciunt: quoniam uiperæ modo, ut ipsi putant, nunquā uisuntur.

EX M. VERG. COMM.

Nouerunt rura omnia Quinquefoliū, soloq; hoc nomine maxime cognitum ubiq; in honore aliquo est. Theophrastus, 9. de plantarū historia non Pentaphyllon tantū uocari sua ætate dixit, uerum Pentapetes etiam, factū ab aliquibus illi nomine a pennis auium, ut credidit Gaza: ut autē nos opinamur, quia in quinque folia se pandit, & extendit. Fecit eadem etiā foliorū forma, ut Pentatomon, id est, in quinque partes diuisum diceretur. Sic Pentadactylon, qd ut in hominis manu quinque digiti sunt, sic in ea planta totidem foliorū diuisiones. Pseudoselinon dictum etiā, quod Apīū mentiatur, sitq; illi in foliorū sectionibus illis quadatenus simile. Quæ itidem illi a gentibus aliæ appellationes fuerunt, aliquā huiusmodi causam habuerunt. Quales Callipetalon, & Xylopetalon sunt, a foliorum specie & duricie factæ. Quemadmodū uerisimile est, in barbaris illis latere incognitā modo nobis, ex figura, aut uiribus eius rationē aliquam. De radice, folioq; eius libro, 9. de plantarū historia agens Theophrastus, addidit, nigrescere Quinquefolij radicem effosam, siccatamq;. Quod a Dioscoride ideo dictum non est, quoniam satis fore sibi hic scriptor credidit, si qualis ea esset cum foderetur, dixisset. Post id enim tempus medicis certo loco signatam, seruari relinquebat. Adiecit etiam Vitigineum Quinquefolij folium esse, non quantitate (pusillum enim est) sed colore & forma, & quasi naturā Vitis sequeretur, augeri simul, & tabescere cum ea, caules per terram spargi graciles, crebras, habentes, ut ille ait *κνίμυρος*, non crura, sed a cruris humani forma inter duos geniculos interualla, quæ *κνίμυρος* ille, qua diximus ratione uocat. Videndum illud etiam, quo modo hic Menthæ, ille Vitis folio Quinquefolium esse dicat. Nobis male inuicem comparari posse plantarum illarum folia inter se uidentur: quemadmodum & floris color in pallido albus, simul & auri flauo colore dici. Hoc tamen non adeo difficile, ut illud. Videmus enim aliquando in pallore hominis utrunq; colorem illum.

De Phœnice

CAP. XLVI.

Phœnicen aliqui Rhon, alij Anchinopa, alij Phœnicopteron, alij *Ρήστα*, alij Osthaleu, Aegyptij Athnon nominant. Folia habet hordei, *λεπτότερα* breuiora, & angustiora, spicam Lolio similem, ramos digitorum senum, radici aduolutos, septenas octonasue spicas. In aruis tectisq; recenter illitis nascitur. Harum uirū compos, ut in uino austero pota, alui profluuium, & emanantem uulua sanguinem sistat, urinae impetus infraenet. Sunt qui adalligatam in puniceo uellere, & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

BARBARI COROLL.

Phœnix a Plinio dicitur herba Phœnicea, inter fruges ab eo posita: quoniam a nostris Ordeum murinum uocetur.

Pli. li. 22. ca. 15.

EX M. VERG. COMM.

Herbæ nomē fecit color, q non dissimilis in ea maturis palmulis uidet. Eaq; ob cām Phœnicopteros, a punice coloris aue dicta etiā ab aliquibus fuit. Nascit hæc in regulis frequētior, q in aruis. Dico autē regulas nūc a tegēdo, oēm qua domus tegit, & hymbriis stillicidia deriuant materiam, sicut em hic, non *κνίμυρος* dixit: qua uoce Græci indicauerūt, quæcūq; familiā a coelesti aqua tuent, siue fideles regulæ, siue ex materia tabulæ, siue stramēta sint. Hordeū murinū Plinius uocari a latinis ait: q hordeaceo folio sit, & seminibus eius iter regulas mures uescant: hic Lolium murinū, a spicæ figura: utiq; idē, sed diuersa rōne. Quot ramuli, uel potius culmi illi sunt, tot etiā spicæ. Diximusq; nos, sedigiales culmos illos, lōgitudinē, nō crassitudinē eorū itelligētes.

De Idæa radice.

CAP. XLVII.

Idææ radici folia sunt ea, quæ Rusco. Adhærent his, ueluti exigui pampini, in quibus flos. Radix spissandi, cohibendiq; naturam habet, his conueniens, quibus adstrictione opus est. Pota citam aluum.

O iij

Idæa pampa

D I O S C O R I D I S

C mensescq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

I Dæa radix, acerbæ gustu, misceri solita luctantium in palestra pulueri, ad ea quæ repercutere tantum oporteat, ut Paulus Aegineta scribit.

R Adicem Diofcor. Pliniusq; herbâ Idæam uocat: alter a tota natura, alter a potiore eius parte, & quæ sola medicinæ inseruit, eam appellans. Peregrina Italiæ planta est, peregrinitatēq; suam natalis loci cognomine indicat. Rusco, de qua in extremo uolumine hoc agitur, omnes eam comparauerunt: cuspidatis ideo folijs herbam intelligere oportet, sed non tam solidis, rigentibusq; ramulis, ut Ruscus est: quando Helices secus folia habere hanc Dioscorides ait, Plinius uero eiusdem rei significatione pampinos.

G De Rhodia Radice. **CAP. XLVIII.**
Ignitur Rhodia Radix in Macedonia, Costo similis, leuior, inæquabilis. Quæ contrita Rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta fronti, & temporibus cum Nardo imponatur.

H Abetur & Radicis Cinthiæ mētio Hippocrati, fouendis feminarū locis. Inuenio & Rhodion uocari coloris genus Democrito, Italicū præferente in uellerū tinctura: fortasse id, quod nos uulgari nomine Rosaceum uocamus. Galenus Rhizam, hoc est, Radicem ab eo dici genus quoddam fati scribit, sine caule, sine flore, sine semine, tribus dūtaxat folijs, sed proceris, & in terra stratis, digitorum duorū magnitudine, similibus Anchusæ, radicē ipsam prætenue, purgandi uiribus, sed exiliter. Alia uidet herba, quæ uocat Oxysa Plinio, etiam si folia æqueterna habet: quippe quæ non purget, sed contra potius adstringat, & ad stomachū dissolutū, & Enterocleas in cibo detur. Proinde sunt, qui Oxyn putent esse, quam uulgo Tauram, & Triada, hoc est, Trinitatē, & Sphragida, hoc est, sigillum Solomonis appellauit, folio triplici, aut uno potius in terna disposito, radicē capillamētis multiplici, flore cū maculis quibusdam candidis ceruleo. Est & Ophrys Plinio herba denticulato oleri similis, folijs duobus, quæ capillū inquit denigrat. Est & Mamiras herbulæ cuiusdam radícula, ut Paulus notat, geniculis frequentibus nodosis, albugines, & cicatrices exterens, atq; comminuens.

R Osæ, quas Græci Rhoda nominant, non Rhodus insula radici huic nomē fecerunt. Quæ autem, & cuius plantæ radix ea sit, legisse me hætenus non memini. Nec integrū undiq; ea puthoc uidetur. Desyderatur enim in eo aliquid: præsertimq; quo loco hic ait, Imponitur cum Nardo tenuis, & mox fronti temporibusq; inspergitur. Duplex remediū ratio docetur: ut imponatur capiti scilicet, & inspergatur ea frons, temporaq;. Verum in utroq; desyderatur aliquid, quo scilicet addito liquore inspergenda sit fronti & temporibus. *in prope* enim participium, quo hic usus est, id exigit.

E De Equiseto. **CAP. XLIX.**
Equisetum Græci Hippurin, alij Trimachion, alij Anabasin, alij Cheredranon, alij Phædran, alij Itiandendron, alij Gis, alij Scoe-niostrophon uocant. Aegyptij Pherphram, Magi Saturni cibum, Romanij Equinalem, alij Equi salicem, aut Anabasion, alij Ephydron. In riguis & scrobibus nascitur. Cauliculi prodeūt inanes, geniculati, in se facti, rubescences, scabri, & iunceæ circa eos folia, crebra, exilia. In sublime Equisetum attollitur, uicinos arborum caudices scandens, obuolutumq; dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda. Radix lignosa, dura. Vis eius spissare. Quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit. Prodest dysentericis in uino potus. Vrinam cit. Sanguinolenta uulnēra glutinantur, tritis folijs & illitis. Tussim, orthopneam, ruptaq; ad-

iuuat. Folij in aqua potis, dissectiones uesicae & intestinorum, enterocelaque in unum coalescere, cogique feruntur.

HIPPURIS, Equisetū, & Equiselis dicitur a latinis, inuisa senescis, nascens in pratis. Est autē pilus terrae, Equinae setae similis, ut nostri tradunt. Graecorū aliqui Pinū folijs nigricantē, eodem nomine appellant. Hanc uero, quae hic describitur, folia habere pauca, tenuia, exigua, iuncea comas, semen rotundū, simile Coriandro. Nasci in arbutis maxime, auctor Plinius, hanc herbam Dioscorides a Romanis Salicē uocari tradit: de qua fortasse Verrius, homo doctus apud Festū intellexerit, cū diceret, uirgulti genus esse Salicē: non ridicule, ut idē Festus carpit, interpretatus: quod ea celeritate crescat, ut salire uideat: quā Graeci quique hanc & Iteam dendron, & Anabasin a Salicis quadā similitudine, & a scandēdi more uocitant. Alio loco Plinius, Ventoso tractu nascitur, inquit, scanditque arbores, et ppendentē ex ramis, folio nullo cirris numerosam, qui sunt lunci genitali, radice pallida. Nec mirū sit alicui, quod folia modo pauca, modo nulla tribuant. facit hoc & auctorū, quos secutus est, et locorū, atque temporū diuersitas. Hanc ipsam Caucū, siue Daucum uocari legas in alijs codicibus: uetusta tamen exemplaria id uocabulū non habent.

EX M. VERG. COMM.

Si uideat nascentē aliquis Equisetū herbam, exeuntēque ex terra aliquot diebus contēpletur, nuncque unde futura sit equina cauda in ea intelliget: tam breui, nudo, concretoque oritur asparago & scapo. Nullibi dissimiliore naturā finem, quā in hac planta a suo principio fecit. Oritur enim humani pollicis longitudine, crassitudineque in acutū fastigiata: mox procedente tempore pandit concretus ille scapus, pandensque se per interualla, & inter ea certis spacijs iuncea folia, & quasi capillamenta quaedā profert: quae dum augētur, undique ad terrā feruntur, eadē gracilitate qua in equina cauda pili sunt: quā non potest ostendere, nisi cum aut uiuens proha pendet ex alto, aut secta ad terrā inuerso cacumine descenditibus iuncea & capillatis folijs illis, totā equinae caudae imaginē reddit. Nota oibus planta, & qua nulla in fossis, prope aquas umbrosis locis frequētiōr nascitur. Anabasin ab ascendendo alij eā dixerunt: quā infirma alijs stirpibus libet hærere. Charadranon itidē, quod in fossarū faucibus, quos Graeci χαράδρας uocant, ortus & uita illi sit. Nec minus Ephedron ob eandē causā, nihil enim aliud, quā ἐν τῷ ἑφιδρόν .i. in aqua Ephedron significat. Vocauerūt aliqui etiā Schoenostrophon, quod iuncea eius folia illa non aliter, quā Cannabis, aut Linū in funes texunt. Graeci Salicem arborē, & Romani Salicē equinalē ob hanc ipsam causam uocauerūt. Plinius lib. 18. cap. 27. inimicā senescis & inutilem pratis dixit: mox lib. 26. cap. 14. iterum de ea agens, non cōuenire inter graecos, nec cum graecis latinis ait. Vulgaris tamē descripta a Dioscoride hoc loco herba est, oibus locis cognita & inuentu facillima.

De altero Equiseto.

CAP. L.

Alterum Equisetū, quod aliqui Equition, alij Chedran, alij Gy non appellant. Caulis est rectus, cubitalis, aut maior, inanis. Comis per interualla breuioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum acetum tritum, uulneribus remedio est. Eademque fungitur facultate.

Sciendum Hippurū uocari & piscem quendam, siue Hippurea: quem aliqui etiā Coryphaenem cognominant. Differt ab hoc, qui uocatur Hippus, ab Epicharmo dictus Ispidion, siue ut legunt aliqui, Lapidion.

Differt a priore Equiseto posterior haec sola comarum breuitate, candore & mollicie: quae maiores in hac, quā in illa notae sunt: ideoque facillimae utraque cognitionis: desiderat solū, cui aequalem hic caulem eius dicat, congeneris ne sibi antedictae, an alterius plantae alicuius. Incertum id est. *ἵππος* enim hic tantū ait, eamque ob causam uirij nota signatus locus a nobis est.

De Cocco, seu Infectorio.

CAP. LI.

Coccum quo infectores utuntur, frutex est furculosus, paruus, cui grana ceu lentes adhærent, quae electa congeruntur. Optimū gignitur in Galatia, et Armenia. Deinde Asia, & Cilicia. Vltimus ex omnibus Hispanicus. Vis huic spissandi. Vulneribus neruisque praecisis, con-

Pli. li. 26. ca. 15.

B

VERG.

κοκκος βαφειν

Cuenienter ex aceto illinitur. Nascitur quoque in Ciliciæ Quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & Coccum uocitant.

Pl. li. 9. ca. 41.

B A R B A R I C O R O L L.
Differt Coccus Baphica, hoc est, granū tinctoriū, a Cocco Gnidio, siue Grano Gnidio, ut aperitissime cōstabat Galenū, & utriusque notas cōtēplantibus. Magnitudo huic, id est, Gnidio Grano, piperis maior, uis ardens, rotundū, rubensque est colore Cocci. Frutex, qui hoc ferat, Thymælea, siue Chamælea dicitur. At qui tinctoriū granū gignit, aut priuatim Coccus dicitur, ut Dioscoridi placere uideo: aut Ilex est Aquifolia. Granū inquit hoc Plinius, rubens est, primūque ceu species frutices paruos Aquifoliæ Illicis. Quisquiliū uocant, Penfionē alteram, tributi pauperibus Hispaniæ donati. Est em Ilex gemina, ut Columellę placet. Minor, apibus quæ sita, & prolixior, ab oibus improbata mellificio. Omnes inquit Plinius, roboris dotes, Ilex solo prouocat Cocco. Granū hoc Galatiæ, aut circa Emeritā Lusitaniam in maxima laude inquit habebat. Gignitur & in Africa, & Pisidia. Pessimū in Sardinia. Est autē genus ex eo inquit in Africa fere, & Asia nascens, celerrime in uermiculū se mutans: quod ideo Scoletilon uocabant: improbantque Limaci paruæ similē: culici, ut Dioscorides affirmat, & Pausanias: qui fruticem hunc in Locride copiosum ad Ambrysom Rhamni amplitudine, præterea Lentisco similem, nigriore tantū, & molliore folio describit. Fructu Solani quēdam specie, sed Erui magnitudine, Colligendū præcipiunt antequam uermiculus is nascat. Galatæ, qui supra Phrygiā sunt, gentilitier Liyg uocant. Eum fruticē Iones & Græcia tota, Coccū. Anniculo itaque Granū, succus ad pigmēta languidus. Quadrimo euanidus. Ita nec recentī uires, nec senescenti. Colos inter Principales, Imperatoris tantū paludamētis dicatus: qualis in Rosa micat, & quo nihil aspectu gratius, & in purpuras Tyrias, Dibaphasque, aut Laconicas: etenim Tyrio primū tinctas, mox & Cocco tingere mos erat, aut contra, ut fieret Byssinū. Nam & tertio, & quarto, & quinto saturabantur. Vnde noīa illa uestiū, monocoros, dicoros, tricoros, tetracoros, pentacoros in uitis principū. Sit autē granum Tinctoriū, an Phœnicobalanus, atque Palmula, quod Hippocrates Phœnicon Coccon, quasi granū puniceum uocauit, æstimaturis relinquo. Illud quoque hoc loco referendū est, Coicina quædam legi apud Græcos rexta, quæ nostri ceu Coccina legentes, in Strabone rubra, conuerterunt. Ceterū Coicina dicuntur a Coice frutice in Aegypto textili: cuius mentio & apud Theophrastum est. Coix inquit, folio Harundinis angulari, ad nexus utilis, a quo & hircellæ genus Coix attice, ut inquit Pollux, quod dorice Cois dicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Coccum nasci in Illice Theophrastus lib. 3. de plantari hist. dixit, καὶ ἡ πρῶτος τὸν φοινικῶν κόκκον. Et Ilex puniceum Coccum. Quæ Plinius secutus lib. 24. cap. 4. Coccū Illicis ait. Idem tamē multo antea lib. 16. cap. 9. dixerat, Seruato Illicis genere, priuatimque ceu species frutices paruos Aquifoliæ Illicis. Ex quo genere hic fruticem paruū, surculosum dixit: qualem & nostra ætas in legendo Cocco, in Romanorū provincia quotidie uidet. Barbarus, quæ græcos codices secutus fuerit, quos nos etiā uidimus, in quibus non legeretur μικρὸς, eam reliquit partē. Nos ex alijs græcis, Plinijque historia admoniti, eam seruauimus uocem. Paruos em frutices ille ait, quæ hic μικρὸς ἢ μικρὸς φρυγανώδης dixit. Quod autē Dioscorides ait, hæere Coccū fruticibus his φοινί, id est, lenticulari modo, non ad formā Granī, sed hærendi modū referendum est. Nota modo, & uulgaris res, quæ etiā ex alijs nationibus laudetur. Quod postremo hic ait, in Cilicia nascentē in roboribus Coccum, minimis cochleis similē, ab incolis mulieribus ore auelli, aut excipi, parum certā & uerisimilem nobis habet historiā: neque intelligimus, in quē usum id fieri opus fuerit. Corruptum credimus esse locum, & pro illo τῶ σόμῃτι, quod ore significat, aliter quondam legi potuisse, pertinereque ad tempus, quo legendus Coccus esset.

7943100

De Tragio. C A P. L I I.

Tragium nascitur in Creta tantum insula, Lentisco simile, & semine, folio & ramis. Singulis tamen minoribus. Succus ei lacteus, gummi non dissimilis. Semen, folia, lachrymaque illitu spicula e corpore eiciunt. Omnia quoque corpori impacta, euocant. Pota stranguriæ medentur. Calculos uesicæ frangunt, Menses trahunt, Modus in sumptione

ne est, drachma una. Fama est, syluestres capras sagittis confossas, eius A
hærbæ pabulo spicula excutere.

B A R B A R I C O R O L L.

T Ragon alij similem Terebintho faciunt, alij Iunipero per omnia: succo lacteo, qui spissatur in gummi, nascentem non alibi, q̃ in maritimis Cretæ. Dicitur & Tragonis.

E X M. V E R G. C O M M.

P Eregriño Italiæ, gentibusq; alijs frutici nomen in Creta insula tantū caprinum pecus fecit, ob eam quam hic in extremo capite caussam reddidit. Plinius Terebintho primum lib. 17. capite. 21. mox Iunipero. 27. uolumine, ultimo capite similem fecit. Ex qua hominis diuersa eiusdem rei historia facile est conijcere, modo hos, modo illos delibasse eum auctores: ideoq; multis locis non esse earundem rerum eandem illi historiam. Idem liquorem eius lacteum esse, & in maritimis nasci dixit. Nos in peregrino, & ob id incognito frutice nihil habemus aliud, quod monere legentes ualeamus.

De alio Tragio.

CAP. LIII.

E St & aliud Tragium, quod Tragoceros aliqui uocant, alij Scorpi
on, alij Garganon, Romani Cornulacam, Daci Saliam, Aegyptij
Sober, Aphri Achceosim. Folia Scolopendrij habet, & radicem sylue
stris Rhaphani, tenuem, candidam. Quam crudam, uel coctam esse, dy
sentericis prodest. Folia autumnō, hyrci uirus olent: exinde sibi Tragij
nomen adoptauit. Prouenit in montibus, & præcipitijs.

B A R B A R I C O R O L L.

T Ragon hæc minor est priore, nec in Creta solum, ut illud, sed multis locis nascitur, ut B
Galenus inquit.

E X M. V E R G. C O M M.

P Riori posteriorem hanc Tragon cognominem tantū faciunt Galenus, Paulus Aegineta, Græcorumq; alij herbarij omnes, & medici: neq; immerito. Siquidem foliorum figura differt, quæ in hac Scolopendrij, in illa Lentisci sunt. Differt natalibus: q̃ illa natiuum sibi solum habet Cretam insulam, hæc ut Paulus Aegineta ait, *φύται πολλαχόθεν*, quod est, multis locis nascitur. Differt postremo uiribus: quæ in illa *ἰατρικαί*, id est, extrahendi sunt, in hac adstringentes: ideoq; fluidis affectionibus cunctis accommodata. Accedit his, q̃ hæc amariore sapore est, qui in illa non sentitur. Cur autem illi idem factum a gentibus nomen fuerit, hyrcinum foliorum uirus fuit. Hanc ipsam Dioscorides Tragocerota, id est, hyrcinū cornu dictā testatur. Facileq; est ex græca hac uoce, Romanā illam Cornulacā, quæcunq; ea est, factam fuisse. Scorpij deinde appellatio male ex Trago, quæ mox dicendā est, ad hanc translata fuit.

De Trago.

CAP. LIIII.

E St etiam hærbæ Tragos, quam aliqui Scorpion, aut Tragonon
uocant, maxime in maritimis nascens, palmum alta, aut ampli
or, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos acinis,
ruffis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum ad
stringente. Racemorum grana decem ex uino pota, coeliacis, & foemis
nis fluctione uulua laborantibus auxiliantur. Tunduntur a plæriscq; &
in pastillos digeruntur, quibus utuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

T Ragon Asia fert, ueprem ut Plinius dicit, sine folijs, racemis rubentibus, ad medicinæ dumtaxat usum. Hanc & in littoribus nostris gigni modo perhibent herbarij, Iunco marino si milem: a quo & Iuncum marinū multi uocant eam. Tragos alia est, quā nos Hyrculū uocauimus inter Nardos. Item alia Sitodes, hoc est, cerealis cognominata, inter frugesq; dicta.

E X M. V E R G. C O M M.

P Eregrina & hæc Italiæ planta est, si Plinio credimus, qui natale solū Asiam illi assignauit,

D I O S C O R I D I S

C duobus locis, eam describens. 13. uolumine, primū capite. 21. mox. 27. capite. 12. Quæ poterunt uolentes certius in eo uidere. In luncorum genere aliqui eam numerant, nec dissimilem marino luncō in aliquibus faciunt. Plinius Veprem uocat, sine folijs, ramis rubentibus, semipedem altam, fruticosam, racemis rubentibus, grano tritici, acuto cacumine, in maritimis nascentem. Quæ eadem fere huic scriptori historia est.

De luncō.

C A P. LV.

Ἰνκο

Oxyfchinos aliquibus Schinos læuis, alijs Oxypternos, alijs Solis superciliū, Romanis luncus marinus, aut Manualis dicitur. Duo eius genera. Vnū læuis nominati. Alterū acuti, qui in mucronem fastigia tur. Cuius etiā duo assignant genera. Vnū sterile. Reliquū fert semen nigrū, rotundū, & crassiore constat calamo, carnosioreq;. Tertius est luncus, qui uocatur Oloschinos, prioribus carnosior, asperiorq;, qui similem fructū in cacumine parit. Semen utriusq; tostum, ex diluto potum, si sit aluū, & rubra fœminarū profluuiā. Vrinam cit. Capitisq; dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia, tenera, conuenienter illinuntur aduersus phalangiorū morsus. Aethiopici lunci semine somnus allicitur. Sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 18.

Inco palustri, Græcos ad funes usos nomini credamus, quo herbā eam appellant, unde fū nambuli Schœnobata ab ijs dicantur. Qui nauigare in Indos Alexandri milites, luncos lapideos uidere per littora simillimos nostratibus. lunci uterū turgentem quodā cacuminis callo præferunt; mox coherētia quādā, uelut ova pariunt, pediculis circa spicateis, in quibus uascula rotunda, leuiterq; hifcentia, & in ijs semen nigrū cuspidis effigie, non dissimile Asterisco, dumtaxat exilius, radice longa: quæ crassior multo sit, q; maribus cognominatis. Caput huic Cepis, et Gethyo simile, in tegumētis modice rubentibus. luncus palustris, hoc est, Schœnos Helios, in multa gña concidit. Oxyfchœnos proprie is est, quæ marinum luncū uocamus. Sterilem masculū existimāt, fœcundū fœminam. Is qui semen nigrū habet, Melancranis appellatur, quasi luncus atriceps, Melancraena dictus Straboni. Vnde funditoribus Balearicis, Amenta, quod & Phileta meminit. Hic sine alijs generibus nascitur ex suo semine: sicut is quem marem noiamus, ex semetipso, cacumine in terrā defixo. Nam Oxyfchœnon, & Holoschœnon, eodē cespite, contēplatum se Theophrastus, & admiratū scribit. Omnīū radices singulis annis intermori tradunt, Holoschœnon Mariscū a magnitudine (ut puto) nostri uocant: quæ admodū & Mariscas ficus: auctore Festo, quæ Græci Busyca, hoc est, grandiores & fatuas ficos. Ob id & Sycomora esse quidā Mariscas uolunt. Hic & ad tegetes, ut Plinius inquit, & omnino uitalia utilissimus, quoniā mollis carnosusq; sit. Vfus omnīū ad nassas marinas, nexu elegantī, lucernarū lumina, p̄cipua medullæ amplitudine iuxta maritimas alpes tanta, ut inciso uentre, impleāt pene unciarū latitudinē: in Aegypto uero cribrorū longitudinē, non alias utiliorē: ob id cribrū significaturi, luncū effigiant, ut inquit Horus. Idem auctor, in Aegypto scribi luncis, nec aliter, affirmat. Videtur aut palustris luncus idē cum Scirpo esse, nec in fructū inquit Plinius, nec in uepriū cauliumue, neq; in herbarū alioque ullo q̄ suo gñe numerentur iure. Scirpi fragiles, palustresq;, ad regulū & tegetes, e qbus detractō cortice candelæ luminibus, & funeribus seruiūt. Firmior quibusdā in locis etiā rigor. Namq; ijs uelificant, non in Pado tantum nauē, uerū in mari piscator Africo, p̄pōstero more uela intra malos suspendēs. Et mapalia sua Mauri tegūt, p̄ximeq; æstimāt, hoc uideant esse, quo papyri usu. Ob id etiā sunt apud nos, qui Scirpos interpretentur, q̄s Græci Biblos, id est, papyros uocant. Sed fruticosi gñis sunt Papyri, enodes, & sine fronde Scirpi, leues, proceriq;, ut Festus ait: unde prouerbiū quoq; natum sit, Nodū in Scirpo quæri. Habent Græci & alterū ex lunci nomine prouerbiū ἡ χερὶν φεύγουσι ἢ μεμλτωμένον, hoc est, Fugit funiculū rubrica tinētū. Contra reos desidīæ, q; Athenis, qui nō in tēpore ad concionē uenissent, rubricato fune in foro cōprehensi notabant, & mulctabant. Huc uidetur alluisse in Penulo poëta Plautus, cum de scoris uilibus diceret, Vestras schœno delibutas, schœnicolas sordidas,

Quantum & rubricatas, hoc est, fūco litas intelligi uult eas. Est & in uerbo Schoenicola adagiū, *χίαν ἀντρώπιν*, & ut sint quales Græci *χινωτῶν* uocant, hoc est, spartū rodentes: qd itē de inerbibus & nugarijs, ut Varroni placet, & alienum laborem frustra consumētibus, uluipari solet. Notum est argumentum illius Oeni, de quo multa in castigatione Pliniana diximus. Scio qd dam intelligere, non Schoenū, id est, Spartum, sed Lentiscum, hoc est, Schinū, rodi ab segnibus: quia prouerbiū id contra eos dici scribant auctores, qui nimio se comendi studio superfluunt, ac dentibus extendis & fricandis incubant: qualis in Lentisco Mastiche uis redditur. Sed schoenotroges tamē in omnibus Græcis codicibus, non schinotroges legas. Sunt q Schoenotroges a Scilla dictos putent, quā & Aristophanes, & alij Schoenon quoq; appellant, & dentibus prodesse constat. Vnde Schoenida Venerem cognominatam Lycophronij sunt qui credant, q cibo eius accendatur libido: ut Schoenotroges, & Schoeniculas hinc quoq; dici meretricis autumare liceat. Vel forte Scenicolas ἀπὸ τῆς σκηνῆς, quasi tabernicolæ. Nam & Alicarias, & Prostitulas uocabant, q circa pistrinulas & stabula uersarentur, ut ait Festus. Scenicolas ab unguento aut pessimo uocatas, quod Græci Schem dicunt. Habetur & luncus Euripice uocatus, & Triquetus, & Odoratus, in suis quiq; mentiones adeundi.

Euripicem non desunt qui Tropicem appellent inter recentiores: quorum pleriq; ut eruditionis suæ periculum faciant, multis partibus rei latinæ officunt.

De Lichene. CAP. LVII.

Lichen, qui saxis est familiaris, aliquibus Bryon appellatur. Asperginosis petris adhæret, ut muscus. Qui illitus sanguinis profluuiā sistit. Inflammationes arcet. Impetigini medetur. Iuuat regio morbo correptos, cum melle illitus. Oris & linguæ defluções inhihet.

BARBARI COROLL.

Lichen, siue Lechen est Muscus, de quo hic. Itēq; herba alia nascens in petrosi: nomine utriq; inuento, quoniam contra lichenas, remedijs omnibus anteponuntur. Folium herbæ unum ad radicem latum, caule uno paruo, longis folijs dependentibus. Vtramq; recentiores herbarij Epaticam appellant. Appuli herbam, cuius unum ad radicem folium haberi diximus, Iecorariam, siue Ficellam cognominant, folio succi pleno, & crasso: ita nominatam, quia iocinoris fibræ similis aspicitur. Diuersa est eodem nomine apud nos, in littore passim nascens, & oliatorio foro, ieiuniorū tempore uenalis, hederaceo fere folio, flore purpureo, Lilijs pusilli effigie. Cōuoluit herba se quibus appropinquat. Solut aluum cocta, & cruda oleris modo accepta. Sunt & Lichenes sui equis calli, de quibus secundo libro dictum.

EX M. VERG. COMM.

Eodem nomine malum, & mali remedium græci appellauerunt. Lichen enim impetigo simul, & qui impetigines sanat, herbosus in petris herens Muscus ab eis uocatur: magno argumento, nullo magis præsidio contra eas usuros esse homines. Sciendum tamen, proprium habere genus hunc Muscum ab eo, quo muscantur in torrentibus lapides diuersum. Hic enim in aridis nascitur petris, crassior aquatico illo, & procerior, umbrōsis plerumq; locis, in saxosis rupibus herens. Vis illi est, ut ueteres græcorum medici decreuerunt, extergendo purgare, mēdiocriterq; siccare, & refrigerare. Iidem, quasi pro comperto illis non esset, de cōpescendis sanguinis eruptionibus, in scriptoris huius fidem id reiecerunt.

De Paronychia. CAP. LVIII.

Aronychia alijs Adocetos, alijs Neuras, alijs Phrynion, Romanis Bouinalis, exiguus frutex in petris nascens, Peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita Paronychij atq; duricij remedio est.

BARBARI COROLL.

Hanc, & Neurada cognominari docent auctores. Quid aut sit Neuras muliebribus malis quaesita Hippocrati, non liquet plane, *πρὸς μῦθον ὑστέρων νεύραν καὶ ἀλειψάν καὶ θμύρναν*. Nisi quis (quod & fere affirmo) non Neurin, sed Nerin, hoc est, Nardum montanum legat.

EX M. VERG. COMM.

Fecerunt & huic nomen abscessus, qui ad radices humani unguis sunt, Paronychiz a græ-

A

λεγχίον

B

Plin. 16, ca. 4.

παρωνυχία

D I O S C O R I D I S

Cis dicti. His em præfenti remedio herba est: eamq; ob causam honoris huius prægatiua, ab antiquioribus herbarijs & medicis ornata, nec alio nomine quondam in uetere medicina cognita est. Describunt, effigiantq; eam nostræ ætatis herbarij, petrosis locis nascentem, ut hic etiam ait, folijs latifoliæ Lauri: duobus, aut cum pluribus quatuor ramulis: inter quæ spicatus flos exit, crassitudine pollicis & longitudine, colore inter flauum & luteum.

De Chrysocome. CAP. LVIII.

χρυσοκομη

Chrysocome, alijs Chrysitis, alijs Chrysanthemon, nonnullis Amaranton, alijs Diospogon, Aphris Dubath, uel Buchumath, Romanis Iouis Barba appellatur. Palmi altitudine fruticat. Coma specie corymborum, Hyssopo simili. Radice hirsuta Veratri nigri modo, tenui, Cyperum æquante, gustu non iniucundo, ex austero dulci. In petrosis opacisq; nascitur. Radix excalfacit et adstringit. His conueniens, quos iecur, aut pulmonis inflammatio male habet. Contra purgationes uulua, decocta cum hydromelite assumitur.

BARBARI COROLL.

Chrysocome sine folijs, sine semine, solo scapo, comas habet, fulgore auri, unde nomen. Vocatur & Diosgenia, hoc est, Iouis barba.

EX M. VERG. COMM.

Quod hætenus in Plinio, latinisq; alijs legerim, nulla inter flores, herbasue Iouis Barbæ nomine planta numeratur. Inter arbores quidem. 16. uolumine, cap. 19. a Plinio his uerbis arbor describitur: Odor aquas, & quæ appellatur Iouis Barba: in opere topiario confilis, & in rotunditatem spissa. Inter flores autem in Violarum genere. 21. uolumine, cap. 10. & 11. Iouis flos apte ab eodem uocatur. Coronat folio tantum Iouis flos, Pauloq; post. Succedunt illis æstiuæ Lychnis, & Iouis flos, & alterum genus Lilij. & c. Quinetiam. 27. uolumine, ca. 4. idem Plinius aut eundem, aut alium in Violarum tamen genere florem Iouis Flammam uocat. Qualliter flos quem Iouis Flammam appellauimus in Violis. Dicimus autem alium, aut eundem eodem nomine significari a Plinio florem: quoniam Theophrasto diuersi flores sint *δύο ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ*, id est, Iouis Flos, & Flamma. Plinius autem sæpenumero huiusmodi miscet, & in tanta naturæ uarietate non semper illi respondet. Quæ hætenus dicta a nobis sunt, ut ostendatur, quod in Diosco. nunc legitur Iouis Barbam dici, a Romanis Chrysocomon, in antiqs non inueniri. Plinius em int̄ arbores manifeste Iouis Barbam numerat, seorsumq; a Iouis flore, & flamma Chrysocomen describit. Negat habere latinam appellationem. Quodq; magis animaduertendum sit, Iouis florem, flammamq; inter Violas censerī, & sine odore esse: quod & Theophrastus itidē testatus est. Cuius floris nota, omnibus figura est longe a corymbis diuersa, quibus hic & alijs omnes Chrysocomen florere dixerunt. In Violis em singuli flores singulis pediculis, & aliqui ramulis nituntur: in corymbis uero uno pediculo plures. Illi singulares, & plerumq; grandiores: In his acruis magis, & ueluti grumus florum q̄ flos aliquis est. Licetq; in utroq; genere discrimina hæc passim uidere. Ex his constituendum est proprium, & aliud a Violis genus habere Chrysocomen: quam Plinius Chrysitin uocari etiam ex eo ait, q̄ comantibus fulgore auri corymbis floret. Et hæc tantum plantæ huius legitimæ appellationes sunt, cæteræ falso, & ab imperitis illi accreuerunt. Qui enim potest Amarantos, aut Chrysanthemos dici flos, qui auri fulgore comantibus corymbis splendet? Cum Amaranthus spica uerius purpurea, q̄ flos sit, & Chrysanthemos alius undiq; a Chrysocome describatur, quemadmodū nō multo post a Dioscoride tradetur.

De Chrysogono. CAP. LIX.

χρυσογονον

Chrysogonon, aliqui Chrysospermon uocant, alijs Daspin, alijs Origanum, alijs Arcophthalmon, Romani Arilariam. Densè fruticat, quernis folijs, flore coronarij Verbasci. Radix ut Rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra, quæ trita cū aceto, atq; imposita, muris aranei moribus auxiliatur.

EX M. VERG. COMM.

QUale Chrysogonon hoc sit, & unde factum illi nomine sic appellet, nullibi legisse memini. Ceteri etiam graeci, praesertimque Paulus Aegineta, quo libro omnem numerat medicam materiam, Chrysogoni huius ad medicinam nullibi meminit. Plinio itidem nulla inter plantas Chrysogoni uox est: similem tamen Chrysocomae, & alij a colore auri appellatis nomen facit. Et ex quo hic ipse ait Chrysospermon a quibusdam etiam uocari, conijcere licet, non in flore, sed in semine auri colorem esse. Idem enim Chrysogonon, & Chrysospermon est, aurei scilicet seminis herba. Satis ex historia eius patet, qualis hic frutex sit, & qua notarum observatione deprehendi possit.

De Helichryso. CAP. LX.

HELichryson quidam Chrysanthemum, nonnulli & id Amaranton uocant, quo Lymphas coronant. Ramulum habet candidum, uirentem, rectum, firmum. Folia intercedentibus spatijs angusta, Abrotano similia, comam aureae lucis, in orbem, umbella rotunda, ueluti siccis corymbis dependentibus, radice tenui. Nascitur in asperis, & torrentium alueis. Contra serpentium ictus, coxendicum dolores, urinae stillicidia, ruptaque, coma e uino pota opitulatur. Ciet menses. Sanguinem concretum uentris ac uesicae absumit, pota cum mulso folia. Ieiunis, trium obolorum pondere, sistit destillationes, data in uino albo diluta. Vestibus inseritur ut eas ab erodentium iniurijs tueatur.

BARBARI COROLL.

Helichryfos, & Heliochryfos a Theodoro Aurelia uocatur, ad solis repercussum, comandibus in orbem folijs fulgore auri, a quo nomen. Alij a uirgine Ephesia, quae hoc flore prima coronauerit Dianam, Coronari eo & Deos Ptolomaeus rex Aegypti diligentissime curauit. Vestes odore commendat non ineleganti. Existimationem & gloriam parere coronatis flore credit, si unguento se perfundant ex auro, quod Apyron, hoc est, ignem non expertum uocatur. Floret fere cum Viola nigra uere. Flos auri modo fulget, radix summo terrae corio innixa folio candido, caule tenui & duro, non ut Theodorus inquit, semine, qui carpon, non caulon in Theophrasto legerit. G A L E NUS hanc Amaranthi nomine significat, nec aliter uocauit, ob id corymbos eius nunquam marcescere, Plinius scriptum reliquit. Philostratus ex Amarantho coronari sepulturas quoque solitas affirmat, idque Thessalos instituisse primos ad tumulum Achillis.

EX M. VERG. COMM.

Helichrysum Plinius in historia pluribus locis, in medicina lib. 21. ca. 25. Heliochrysum eandem aurei floris plantam appellat. Habetque utriusque uocis certam primum ex natura causam, tum ex graecis scriptoribus, Poetas, Theophrastumque autores: quorum illi Helichrysum, hic uero semper Heliochrysum in plantarum historia nominat. Diuersitatis huius causa est: quod quid Helichrysum uocant, a quosis & palustribus locis, quae graeci *ἡλιος* dicunt, nascentem florem indicant: qui uero Heliochrysum, quoniam *ἡλιος* Sol graecis est, ad solis repercussum aurea luce fulgentem significant. Quae illi natura est, non aliter quam multis alijs, quae accedente Solis luce, colores suos uariant, et eos qui non sint habere uidentur. Quod hic significauit, dicens *χρυσόφαν*, id est, quae aureo colore & luce se ostendant. Sunt tamen qui utroque modo enunciatum hunc florem a palustribus locis dictum fuisse uelint: neque *ἡλιόχρυον*, in qua uoce Sol est, uerum *ἡλιόχρυον*, in qua palustres loci audiuntur, scribendum esse. Quibus literis in Theophrasto scripta etiam nunc ea uox plerumque inuenitur. Sed nos in melioribus obseruauimus, a Sole id nomen factum. Acceditque naturae causa, quae illi est, ut Plinius ait, ad Solis repercussum aurea luce fulgere: quodque hic ait *χρυσόφαν*, id est, aureo colore uideri. Cuius euentus non nisi in Sole causa est. Chrysanthemon eundem hic uocari a quibusdam ait ab eodem auri colore, sed ex alio flore: de quo mox dicitur accepta appellatione. Quod sola nominis, & coloris similitudo fecit. Ad didit praeterea, Amaranthum ab aliquibus Helichrysum etiam dici: non quia spicatus flos sit, qualis est qui proprie Amaranthus dicitur, de quo in Chrysocome dictum paulo ante est, sed ab eadem longioris sine detrimento uitae natura. Quae enim proprie Amaranthus a graecis nominata est, spica, ut praemissauimus, uerius quam flos est, colore purpureo, sine odore, Augusto men-

se protitens, in autumnum durans: & qui, quod mirum sit, postq̃ defecere cuncti flores, mar-
defactus aqua reuiuiscit. Ideoq̃ antiquis hibernas faciebat coronas. Summa tamen eius natu-
ra in nomine est, ἀπό τοῦ μὴ μαρῆναι, id est, q̃a nō marcescit a græcis appellati. Ex qua natu-
ui, hic etiam ob similitudinem aliquam Helichrysum uocari ait, quia scilicet corymbi eius nun-
quam marcescunt: eamq̃ ob causam Deorum simulachra ad longioris temporis ornatum hoc
flore antiquitas coronabat: quod cunctis gentibus adeo tunc cōmune erat, ut hic inter notas
eius dixerit esse Helichrysum, quo Deorum imagines in templis coronantur. Galenus Ama-
ranthi nomine, ob eam quam diximus causam, semper hunc uocauit: quemadmodum & spi-
cam illam purpuream: ideoq̃ diligentius ex uiribus & usu in medicina discernendus in eo uter-
q̃ hic flos erit. Florere Helichrysum Theophrastus uere ait, una cum Viola nigra. Estq̃ locus
ad extremum sextum eius de plantarū historia uolumen. Idē longius lib. 9. de eodem egit. Quē
item a Plinio quoq̃ reddita lib. 21. cap. 11. fuerunt. Et quorum sit sensus. Gratiam, & uitā glori-
am sibi etiam acquirit, qui Helichrysi flore coronatus, unguento ex auro quod ignem non sen-
ferit se insperget. Habet autem Helichrysus florem auri colore, candidum folium, coliculum te-
nuem & durū, radicem in superficie terræ, eandemq̃ gracilem. Vtuntur ea cōtra morsus ue-
nenatorum in uino. Vtuntur & ad ambusta, cinerem eius melle excipientes.

De Chrysanthemo.

CAP. LXI.

χρυσάνθεμον

Chrysanthemum, aut Chalcas, aliqui Chalchitin uocāt, alij Chal-
canthum, alij Chalcanthemon, alij Buphthalmō, Romani Acan-
than, Ethrusci Garuleum, Aphri Churseten. Hærbæ est tenera, frutico-
sa, leues proferens caules, & multifida folia, flores supra modum splen-
dentes, luteos, orbem oculi imitantes, unde nomen traxit. Propter op-
pida nascitur. Cuius caules oleris uice manduntur. Flores cum cærato
triti, scætomata discutere produntur. Regio morbo correptis, colorem
breui reddit, si sequente longo balnei usu, post exitum ebibatur.

BARBARI COROLL.

Chrysanthemum, nec forma, nec uiribus a Buphthalmo superius indicata differt: uerba tan-
tum mutata sunt, eodem manente sensu: ut ne Dioscoridis quidem caput suspiceretur aliqui. Il-
lud nota uero, a Dioscoride quidem uocari hanc etiam Chalchitin, sed an sit eadem quæ Plinio
Chalceton in uineis nascens, & iocineri trita imponi iussa, nescio.

EX M. VERG. COMM.

Nos aliquando cogitauimus, quasi nulla esset Chrysanthemum, aut si sit, eandē Buphthal-
mo esse, nullam capitis huius habere rationē: & q̃d nullū in se esset, nullū in labore hoc nostro
etiam fore. Sed in contrariā traxere partē Chrysanthemum primū nomē, q̃d a Buphthalmo aliud
Diosc. & Plinio est. Mox quē in Chrysanthemo alia a Buphthalmo sunt: habere, s. caules eius le-
uiores, folia incisuris diuisa, nō ut illa Fœniculi figura, & capillata. Postremo, olerū mō in cibos
admitti: quod Buphthalmo neq̃ a scriptore hoc, neq̃ ab alijs tribuit: et q̃d in medicina relinque-
dū nō est, Buphthalmi folijs cū cæra sanari duricies tumoresq̃, Chrysanthemo aut priuatim Ste-
atomata. Accessit his etiā, q̃ nobis est, pbatissimē & antiquissimē fidei græcus Diosc. multa to-
to hoc capite diuersa habet. Quā em̃ ceteri codices a Romanis Acanthā uocari Chrysanthemū
ostēdunt, ille Calthā habet. Et quæ illi πολυχιδὴ φύλλα, hic προχιδὴ. Quodq̃ in floribus pictura pas-
sim legit̃, καὶ ὀφθαλμὸν κυκλοτερεῖν, in eo non est. Sic etiam in medicina & remedijs, q̃ soli flores sel-
te suffusus mederi dicunt̃, in eo folia & flores legunt̃. Tantaq̃ est uarietas, tantaq̃ ex uarietate sua
spicio oritur, ut esse Chrysanthemum a Bouis oculo aliā credamus: et quæ ex Bouis oculo illi ac-
creuerint, ab imperitis & ex similitudine diuersas plantas miscentibus, accreuisse. Variant em̃
in sermonis ductu, rerumq̃ serie scriptoris huius exemplaria: & quo antiquiora sunt, eo certio-
rem coniecturam faciunt, fuisse q̃ndam per se, & adhuc esse, Chrysanthemum a Bouis oculo di-
uersam. Accedit his Plin ius etiam uicesimo sexto uolumine, capite octauo, Chrysanthemum
priuatim nominans: perisse sequē huic capiti quæ propria Chrysanthemum erant: successisseque il-
lis ex Bouis oculo, quæ eius propria erant, facile crediderit aliquis. P L I N I U S e-
nim Chrysanthemo ad uesticæ uitia utitur, quorum nulla in hoc capite inter alia Chrysanthe-
mi remedia ratio habita est. Qualia obseruari a nobis hæc potuerunt, talia etiam docentur.
Cupimus tamen cuncta a nobis hoc capite dicta, suspiciones, coniecturasq̃, nō decreta haberi.

Nec enim alio consilio dicta longius a nobis fuerunt, quæ ut labore hoc nostro, quicumque is est, ad ueritatis eruscationem ceteri facilius proficiant. Qui illud etiam meminere, credere nos curas Chrysanthemo adiectas appellationes, a uoce illa Chalca incipientes, alterutram habere rationem & causam. Aut enim ob luteum medijs floris colorem, a simili & concolori æris metallo, quod greci chalcon dicunt, factæ fuerunt: Aut, quod nos magis probamus, quoniam Buphthalmo pariter, & eadem Chrysanthemos Chacta a quibusdam credita & dicta fuerit, ex eo nomine cæteræ illæ omnes Chrysanthemi appellationes, corruptæ tamen fluxerunt.

De Agerato. CAP. LXII.

Ageraton fruticosa hærbæ est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, Origano non dissimilis. Umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, Helichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniam diutissime flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti feruens. Huius ustæ nidor urinam cit, & uulvæ duricias emollit.

EX M. VERG. COMM.

In latinis sub hoc nomine nulla, quæ nota nobis sit, plantæ huius historia est. Greci uires discutienti habere eam tradiderunt: & præter id, leniter inflammationes arcere.

De Verbenacæ. CAP. LXIII.

Verbenacam rectam, Greci Peristereona uocant, alij Trigoniō, alij Bunion, alij Hierobotanē, alij Philtrodoten, Aegyptij Pem sempe, Magi Iunonis Lachrymam, nonnulli Mustellæ sanguinem, alij Sanguinem Mercurij, Romani Cristam gallinaceam, alij Pheriam, alij Trixalidem, alij Exuperam, aliqui Hærbam sanguinalem. Nasctur in aquosis. Nomen ex eo duxisse uidetur, quod columbæ circa hanc perç li benter nersari soleant. Palmi altitudine, & interdum amplius adolescit. Folia e caule prodeunt incisa, & subalbida. Ea singulari ramo, radiceq; sola constare sæpius inuenitur. Folia cum suillo adipe recenti, aut rosa ceo imposita, uuluarum dolores finire putatur. Ignem sacrum illita ex aceto reprimunt. Putrida ulcera cohibent. Vulnera glutinant. Vetera q; ex melle, ad cicatricem perducunt.

BARBARI COROLL.

Peristereon a Grecis uocata, quod columbæ in ea mansit. Item Peristerium, unde Columba ris uocatur. Itæ Lucinia, & Lustrago, & Militaria. Sunt qui Petonomo a uolucris pastu noient, & a coloru uarietate Panchromon, a nostris Verbenæ, & Verbenacæ, siue (ut arbitror) corrupte Verminacæ dicitur. Item Ferraria, non feria, etiam si Dioscorides ita noiasse uideatur: quandoquidem secundum huius herbe genus ab ipsomet Dioscoride Sideritis appellatur. Hac & Iouis mensa uerebatur. Verbenam porro & sagmina, Romani, hoc est, gramen ex loco sacro, præsertim ex arce Capitoli, cum sua terra euulsam, in publicis remedijs, & in sacris legationibus, cum ad hostem clarigatumq; mitterentur, ferebant: coronatis ita scialibus & patre patrato, uel fœdera facturis, uel bella indicturis. Sed omnes quoq; frondes sacratas, purasq; per abusionem Verbenas uocabant. Dioscorides duo facit genera, rectum, & supinum. Plinius maræ, & fœminam. Mari caules reddendo plures & tenues, itemq; cubitales & angulosos: demum quæ cumq; Dioscorides supine, nisi quæ rariora mari folia quæ fœminæ adijcit. Quidam non distinguunt, sed unum omnino genus tradunt. Vtræq; fortunæ galli, & præcunt responsa. Hac perunctos, Magi putant impetrare quæ uelint, amicitias conciliare. Colligi circa canis ortum debere: ita, ut ne luna, aut sol cõspiciat, fauis ante & melle terræ ad piamentu datis: circũscriptam ferro effodi, sinistra manu, & in sublime tolli. Sicari in umbra separatim folia, caulem, & radicem. Vtriusq; genus in planis aquosis nascitur. Diuisuræ folioru utriusq; similes quidem omnino quernis, sed maiores. Rectum erui præcipitur, sole arietis signum meante. Non quidē ad omnia, sed ad me

Q.ij

D I O S C O R I D I S

C dicamentum illud, quod propterea Criogenes pastillæ dicitur.

EX M. VERG COMM.

Pli. li. 22. ca. 2

N villa in toto herbarum censur Romanæ nobilitatis plus habet q̃ Verbenacæ. Vna enim hac domus purgabat, lustrabatur familia, & Iouis mensa ad sacrificium & epulas uerebatur. Vna autoribus Romani imperij, conditoribusq̃ inensum quiddam dedit. Non aliunde sagnina in remedijs publicis, & in sacris legationibus Verbenæ, q̃ ex hac genti illi fuere: qua coronati ad hostes clarigatiq̃ mitterent: ideoq̃ sacra Herba uulgo dicta, & cognita: Romani Verbenacæ, q̃ sola & p se uerbenas faceret, dixerunt, Gentij iura, & publicæ utilitatis causâ secuti. Græci, quibus nulli feciales erant, nec idem in legatis ritus, naturam contemplati, Peristereonâ nominauerunt, a columbis, ut hic ait, facto nomine: q̃ hæc auis libenter inter eam uersetur.

typ. Botani

De supina Verbenacæ. CAP. LXIII.

D Vpinam Verbenacam aliqui sacram Hærbam appellant, alij Eriogenion, alij Chamælycon, alij Sideritin, quidam Curitin, alij Persephonion, alij Iouis colum, alij Dichromon, alij Callesin, alij Hipparifon, nonnulli demetriada, Aegyptij Penphtheuphtham, Pythagoras Erylsiceptron, Romani Cincinallæ. Ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex interuallis folia Quercus, sed minora angustioraq̃, eisdem diuisuris in ambitu, colore aliquatenus cæsius. Radix longa, tenuis. Flores purpurei, graciles. Folia cum radice in uino pota, illitaue, aduersus serpentes pollent. Eadem drachmæ pondere cum turis obolis tribus, in uini ueteris hemina, quadragenis diebus ieiuno ore, contra regium morbum bibuntur. Veteres tumores, & inflammationes mitigant. Sordida ulcera purgant. Tota in uino decocta tonsillarum crustas abrumpit. Oris nomas gargarisatu cohibet. Aiunt, si aqua spargatur triclinium, qua maduerit, lætiores conuictus fieri. Datur potandum in tertianis febribus, tertium a terra geniculum, cum folijs circumdantibus, quartanis quartum. Sacram uocant hærbam, quoniam multum ad amuleta, expiationesq̃ commendetur.

B A R B A R I C O R O L L.

P eristereon hyptios, hoc est, supina, frequentior est q̃ superior. Latissimus est quorundæ error, existimantium Verbenam & Peristereon priorem esse: quam olitores Sclaream modo uocant: de qua ueteres nihil dixisse (quod sciam) uehementer miror. Folium ei Betæ lanuginosum, serratumq̃ in modum cristæ: flos spicaceus, & ceruleo purpureus, odorata tota, & uulgaris. Nisi quis hanc Alektorolophon, id est, cristam gallinaceam interpretetur. Alektorolophos inquit Plinius, folia habet similia cristæ gallinacæ: plura, caulem tenuem, et semen nigrum in siliquis. Mutat colorem, sed ex nigra albicare incipit, & intumescit, ac exit. Vtilis tussicibus & oculorum caligini. Solidum semen conijcitur in oculum, nec turbat, sed in se caliginem contrahit. Hæc Plinius. Hoc quidem ipsum facere uidetur semen eius, quam uocant herbarij Sclaream. Folio cristæ simili, ac nigro semine: uerum non in siliquis, sed in folliculis, siue capitulis post florem. Nisi quis siliquas in Plinio pro uasculis quibuscunq̃ accipiat.

EX M. VERG COMM.

S uperiorem Verbenacam græci, q̃ recto caule riget, Rectam: hanc q̃ deiectis in terram ramulis quasi iacet, Supinam uocauerunt. Nec solum inter eas hoc discrimen obseruatum ab illis est, sed, ut ex utriusq̃ historia licet cognoscere, plura alia sunt quibus inter se disconueniant: præsertimq̃ numerus, & longitudo ramulorum. Quod idem ambabus est, & quod cognomines eas fecit, foliorum figura, & in folijs pares incisuræ sunt. Vidimus nos, quæ nunc recta Verbenacam dicunt, multo maiore altitudine q̃ dodrantali: contraq̃ Supinâ longe breuioribusq̃ cubitalibus uirgis: & in utraq̃: q̃d in scriptore hoc nō legit, quadragulis ramulis: Rectâ itidem singulari caule, sed non singulari radice: nisi hic unam eius radicē forte dixerit, quæ crassior a-

lijs est: cæteras uero fibras & capillamenta magis q̄ radices esse uoluerit. In utrâq̄ autē quod paulo ante diximus, eadem serrata, & quernis similia folia sunt. Visæq̄ nobis plantæ hæ sunt magis ad Plinij, q̄ ad scriptoris huius picturam accedere.

De Astragalo.

CAP. LXV.

Astragalum aliqui Chamæscen, alij Catalen, alij Onyca uocant, Romani Pinum triuiam, aut Ficum terre, aliqui Glandulam, alij Thium, alij Nonariam. Astragalus paruus in terra frutex, folijs & ramis lupino similis, flore purpureo, paruo, radice rotunda, Rhaphani modo grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, ueluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. Nascitur in uentosis, opacis, & in uallibus. Eo Memphis Arcadiæ scatet. Aluum sistit radix in uino pota. Vrinam mouet. Vetusis ulceribus, sicca efficaciter inspargitur. Sanguinem supprimit. Aegre propter duriciam tunditur.

ἀστράγαλος

BARBARI COROLL.

Astragalus aliter a Plinio describitur, folio longo, incisuris multis, obliquis circa radicem, caules terni, aut quaterni, foliorū pleni, flores Hyacinthi, radices uilloas, implicatas, rubentes, præduræ. Nascitur in petrosis, & Arcadiæ Peneo, siue ut Galenus & Paulus, Pheneo. Colligitur exitu autumnii, cum folia amiserit. Siccatur in umbra.

Pli. li. 26. ca. 9.

EX M. VERG. COM M.

Ex Arcadia, si forte adhuc nomine hoc illic cognoscitur, Astragalus repetenda, Italiæ em aut nulla, aut tam rara modo est, ut a nullo cognoscatur. Nomen illi, ut uidetur, radix fecit rotunda, durâq̄: & ob id animalium talo similis. Id enim Astragalus græcis est: a quo quibus pueri quondam luderent, non cubi, tesserae dicti sunt, sed tali: quibus Ganymedem & Cupidinē Apollonius finxit in cælo colludentes; & Plinius Astragalizontas Polydetti opus appellauit, in quo si Apollonij carmen lib. 3, in Medæ amoribus diligenter aliquis, ludicq̄ genus obserua uerit, uictoriæ præmium potius q̄ fortunæ & ludi instrumentum Astragalos esse intelliget. Locutus in eo poeta uidendus his, qui in antiquitatis cognitione diligentiores haberi uolunt. Cur autē Astragalum hanc Chamæscen Græci, Latini uero Ficum terre dixerint, in Chamæscye certius intelligitur. Radicis enim similitudo, cognomines, diuersas alioquin plantas, fecit. Viderunt præterea ab eadem rotunda crassitudine Romani Glandulam, manifesta rei indicatione. Nasci eam nos in Phæneo Arcadiæ, non in Memphi diximus: quoniam nulla est Memphis Arcadiæ. Et Plinius in Phæneo provincie eius oppido nasci testatur: & præter Plinium uetustissimi & optimi græcorum codices in Phæneo adhuc habent.

B

De Hyacintho.

CAP. LXVI.

HYacinthum aliqui Heloniam, alij Porphyranthes, Romani Vascinum, alij Vlcinū uocant. Folia habet Bulbi, dodrantalem caulem, minimo digito tenuiorem, hærbaceum, comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruant, radicem bulbaceam. Quæ ut creditur, pueris cum uino albo illita, pubertatem coërcet, & non patitur erumpere. Sistit aluum. Pota urinam impellit. Phalangiorum morsibus auxiliatur. Semen adstringentius est, theriacis expetitur. Regium morbum emendat, cum uino potum.

ὑάκινθος

BARBARI COROLL.

HYacinthi, cū Viola nigra erupunt uete, sed ante Rosam, ut fere oia, quæ in coronas a moribus petunt. Exeunt & cū Gladiolo, sed eximie in Gallia, ubi & Hysginū eo tingit. Nā colos in ueste Hyacinthinus, nō ex hoc tantū Hyacintho, ut fere credit, sed e Viola, q̄ syluestris Hyacinthus quoq̄ dicit, traxisse nomē uidet, Plinio utitur: "Alii q̄ in eo Ianthinū malit, q̄ Hyacinthū legere, ut Martialis, Coccina famosa donas, & Ianthina mox".

Pli. li. 21. ca. 17.

D I O S C O R I D I S

C De quo in castigatione Pliniana diximus. Hyacinthi & albi & ferruginei, hoc est, cerulei uisum tur. Nam & lapis frutici cognominis ceruleo nitore fulget, ut Solinus inquit, ut qui colorē ece li dixerunt Hyacinthinū, de ceruleo uideant accēpisse. Porro tam syluestres, q̄ urbani plurimū durant. Comitatur florē hunc duplex fabula, luctum praeferēs eius, quē Apollo dilexerit, aut ex Aiācis cruore editum: ita discurrentibus uenis, ut græcarū literarum figura ea legatur inscri pta. Paulānias florem qui natus sit extincto Aiāce apud Salamina, credi refert editum primo, nec Hyacinthū, sed literis Hyacintho similem uideri ex cādido rubentē, ac Lilio minorē. Idem auctōr Cosmofandalon dici florem apud Hermionenses Trōezenijs confines, quem ipse Hyacinthū uidetur interpretari. Eo flore coronatos festa, quæ Chthonia uocāt, agere. De Cosmo sandalis & Cratinus & Clearchus. Palladius Hyacinthum, & Irim, & Gladiolum a similitudi ne foliorum uocari dicit. Qui Seruium grāmaticum accusant, q̄ Hyacinthum esse dixerit, quē Virgilius Vacinium in carmine uocari, Dioscoridem accusant, affirmantem Hyacinthum a Romanis Vacinium appellari. Plinius quoq; Vacinia inquit, aucupijs Italia ferūtur, Gallia uero etiā purpurea tingendis seruorū uestibus. Item alibi. Transalpina Gallia herbis Tyrium atq; Conchylū tingit, omnesq; alios colores. Item alibi. Mire inquit Hyacinthus in Gallia pro uenit: quo ibi pro Cocco Hysginū tingitur. Est autē Hysginus color, a quo Græci uestes Hys ginobaphes appellant, hoc dictas colore. Quo fit, ut recte senserit grāmaticus hac parte, Vacinium Maroni pro Hyacintho acceptum fuisse. Nec obstat, q̄ nigra dicat poëta: quando pur puream quoq; Violam, est ubi auctores nigram uocare soleant.

E X M. V E R G. C O M M.

Palladius primo sui operis uolumine, capite. 17. Hyacinthum cum Iride his uerbis miscuit. Hyacinthum, qui Iris, uel Gladiolus foliorum similitudine dicitur. Obijciat forte mihi hoc lo co aliquis, non esse multum Palladio tribuendum, nec posteriori scriptori, & qui degenerante iam declinūq; latini sermonis candore scripserit, contra antiquiorum dicta fidem habendam. Multa enim in eo sunt, præter multa etiam contra Romanorum uocum proprietatem, digni tatemq; Fatemur id nos, concedimusq;. Non tamen adeo negligendus scriptor, nec tam lon go interuallo ab antiquitatis candore illo distans, ut non uestigia saltem in eo, & coniecturæ a liquæ super sint, quibus deprehendi antiqua ueritas possit: accedentibus præsertim meliori, & antiquiorum scriptorum testimonijs aliquibus, & rerum necessitatibus. Cogitādum illud etiam in nominum mutationibus, quæ quotidie a gentibus sunt, sic plarūq; priora nouis ce dere, ut aliquæ semper super sint in nouitate uetustatis reliquæ: aut mutationis saltem causæ in illis intelligantur. Neq; ut inquit Hesiodus, penitus uanam perire famā illam, quam, ut ipse ait, multæ famigerant gentes. Isq; ego sum, qui non facile persuadeam, quæ de Iride & Hyacin tho dicta a Palladio eo loco sunt, temere penitus dicta existimari debeant: sed ut in huiusce modi sit, mutata penitus nominis potius, q̄ rei æstimatione, quod fuerat commune Iridi & al teri flori, Hyacinthi nomen aliquando, quo tempore ille scribebat, ad solam Irim contractum fuisse. Vtorq; ad hanc rem huiusmodi coniecturis, Columellæ primum auctoritate: qui eo quo diximus libro & capite de Apium passionibus agens, & quibus floribus præcipue gau deant, & generosum mel conficiant, inter cætera Hyacinthum numerauit: addiditq; coele stis numinis: quæ duæ uoces in graui scriptore non aliam ut credimus habent rationem, q̄ ut Hyacinthum, quem ille Apibus circa aluearia conferi iubebat, ab alio, uulgarisq; Hyacintho, & inuili Apibus, ea honoris nota distingueret: appellasseq; Hyacinthum coelestis numinis, quem Palladius dixerat, Hyacinthus qui Iris & Gladiolus dicitur. Neq; immerito male uel Irim Hyacinthum coelestis numinis dixisse credi potest: quando Iris coeleste numen est lunonis nuncia, & inter coelestia phænomena ex admiratione hominum diuinitatis particeps. Nec ali ud, iudicio nostro, intellexisse ea nota Columella uidetur, q̄ non esse simpliciter Hyacinthum circa aluearia conferendum: sed Hyacinthum coelestis numinis, id est, is qui a coelestis numi nis nomine etiam indicatur. Ratiocinariq; (si sic intelligendus Columella sit) oportet, cōmu ne Hyacinthi quondam nomen, & Iridi & Hyacintho priuatim dicto fuisse. Nec tantum duo bus his floribus, sed figura Iridi similibus, licet colore diuerso plarisq; alijs. Quod ex eodem Columella in carmine suo manifeste cognoscitur, cū ait. Nec non uel nivosos, uel ceruleos Hyacinthos. Quo colore flores Hyacinthi nomine indicari proprie non possunt. Siquidem pur pureo flore Hyacinthus, non candido, aut ceruleo est. Credimusq; nos, in Hyacinthis quon dam euenisse quod in Violis: in quibus quemadmodū in Iasine primo uolumine restati sum us, figura, florisq; forma, non color genus faceret. Sed hoc latius pater, q̄ res nostra mo do exigit.

*Seruius.
Vacinia sunt in
la, quas purpu
ri uolueris esse
manifestum est.
Pomponius Sabinius.
Vacinium arbor est, quæ
in Italia ad antiqua se
ritur: in Gallia uero
ad tingendas uestes. Flo
res enim purpureos
habet. Vacinia uero
Maroni uocari nigra,
interpretantur. Siquidem
ea uoluerit, quæ in purpu
ream ibi uoluerit
tinctus nigram po
tuit. Sicut uoluerit, quæ
uoluerit, idem quod
Hyacinthus.*

De Papauere erratico.

CAP. LXVII.

Papauer erraticum, quod Rhceam uocant, nonnulli Oxytonon, Romani Papaueralem, Aegyptij Nanti, uere quidem in aruis cum hordeo nascitur, flore protinus deciduo, unde & nomen apud Graecos accipit. Folia Erucæ, aut Origano, aut Cichorio, aut Thymo similia spectantur, sed longiora, diuisa, scabra, lunceus ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos syluestris Fremij, puniceus, interdum albus, oblongum caput, sed q̄ Fremij minus: semen rufum, radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinque aut sex, in uini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis, quibus somnus accersuolus est. Semina acetabuli mensura ex aqua mulsa pota, aluum leniter emolliunt. Ad idem præstandum mellitis rebus, & dulciarijs ammiscetur. Folia cum calycibus illita, inflammationes sanant. Eorundem fortu & perfusione, somnus allicitur.

BARBARI COROLL.

Papauer Rhceas, hoc est, erraticum, capite, ut Theophrastus inquit, unguis potlicaris amplitudine, Legitur uiridiusculum ante messem ordeï. Hoc & satius ascribitur: q̄q̄ inter syluestria & satua melius fortasse, quasi medium constituas, quoniam sponte quidem, sed in aruis nascitur. Admonendi tamen sumus, Rhceadis cognomento non hoc tantum Papaueris genus uenire solitum, sed & alia duo syluestria, ut mox liquebit: hoc quoniam flores eius breui decidunt, illa quoniam fluat ex ipsis, conuulserato scapo succus lacteus, Opion appellatus.

EX M. VERG. COMM.

Comparatur in scriptore hoc inuicem Papauer erraticum hoc, & Anemone, de qua secundo uolumine à Dioscoride, & à nobis actum longius est. Et ut in similibus sit, quorum reciprocae notæ sunt, Papaueri huic eadem dicta & credita Anemone est, Anemoneq̄ contra Papauer hoc. Illa agreste nigrumq̄ Papauer, & Meconium uocari dicta est, hoc manifeste syluestri Anemone simile dicitur. Præsentem nec negligenda dubitatione, quales duo hi flores sint, quibus locis inueniendi, quibusq̄ nominibus priuatim indicandi, & quod tota hæc res modo exigit, quodnam Papauer hoc erraticum sit. Diximus in Anemonibus cōmentationibus nostris longius, quæ tunc pro illa dici potuerunt. Inter quæ præcipuum illud fuit, non uideri nobis, priuatim Anemonibus uoce, rubrum Papauer (sic enim modo erraticum hoc appellamus) indicari posse: quoniam quæ de Anemone in antiquorum cōmentarijs legeretur, rubro Papaueri non omnia competere: ideoq̄ credere nos, aliam ab illo Anemonem esse. Vsq̄ post multa alia ad eam rem sumus capitibus huius, & in eo erratici Papaueris historia & descriptione. Quæ tota eius esse floris manifeste cognoscitur, qui ruffo colore, & aliquando candido, paucissimis folijs, sed his amplioribus, quocunq̄ pulsu & iniuria deciduis, in triticea & hordeacea segete, Maio præsertim mense floret. Nihil enim naturæ exemplari illi in hoc scriptore deest, qui multa breuitate complexus omnia est: deciduum protinus florem, uernos ortus, natalem locum, arua & segetes, & quæ alia illi ab eadem natura accepta adscribuntur. Quodq̄ animaduertat aliquis, sponte sua nasci: cum plerumq̄ Papauer omne satiuum sit. Quod solum asserri contra possit: crediq̄ utilius, aliquod Papaueris hoc genus esse illud est quod hic ait. Quo tempore etiam colligitur, cuius laboris & operæ nulla est in erratico hoc nostra ætate ratio & usus. Sed non est ex usu hominum ratio in natura accipienda. Mutatur enim quotidie quæ homines agunt, placuitq̄ quondam quod nunc in nullo honore est: rursusq̄ multa in honore modo sunt, quæ futuris seculis, aut nulla, aut inutilia habebuntur. Præterea si seruandum semen eius ad medicinam & dulciaria fuerat, tunc legi oportebat cum maturuisset. Meminisse illud etiam necesse erit, cum ab Anemone diuersum Papauer hoc ostendere aliquis cogitabit, in toto Papauerum genere florem in purpureo candidum esse, abundareq̄ in eo candorem, in hoc autem rufum, aut album colorem totum esse: in hoc oblongum caput describi, breuiusq̄, & minus q̄ in Anemone. Quod si recipiendum est, manifeste indicat, Papauer hoc in aruis, & in segetibus nascens illud esse. Nullum enim inter Papauera omnia minore capitulo est. Quod intelligens Theophrastus, ma-

A

ΜΗΚΡΟΝ ΠΟΙΔΟ

Pli. lib. 19. c. 25.
19. cap. 8. 20.
cap. 19.

B

eris, & croco. Somnum accersit, subditum sedi pro Balatio. Optimū ha-
 betur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferū, quod facile
 aqua diluitur, læue, candidum, neq; asperum, neq; grumosum, quod in-
 ter colandum non ut cæra cōeat, & in sole diffundatur. Dein ad motū lu-
 cernis non atra luceat flamma, extinctum deniq; odoris uim conseruet.
 Sed Opion glaucio, gummi, aut syluestris lactucæ succo, adulterant. Ve-
 rum glaucio fucatum in dilutione croci colorem reddit: lactucaceo succo
 fictum exiliter spirat, & asperius spectatur. Gūmi uitiatum, splendescit,
 & infirmū est. Nec desunt qui eo dementiæ deuenerint, ut adipem ei ad-
 miscerent. Fictili nouo torretur, ad oculorum medicamenta, dum mollis
 us, atq; rufius appareat. Diagoras, ut Erasistratus author est, usum eius
 damnauit, oculorū lippitudinibus, & aurium uitij infundī uetans: quo-
 niam uisus aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit Andreas, illi-
 tos eo, protinus excæcari, si non adulteraretur. Mnesidemus usum dum-
 taxat olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum somnum conueni-
 ret: alioqui nobis, ut noxiū interdicit. Quæ cōmenticia esse, experimen-
 to deprehenduntur. Siquidem effectus uiriū huiusce medicamenti, fident-
 faciunt. Quare non alienum fuerit scriptis mandare, quo nam modo is
 excipiat succus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & prælo expri-
 munt, terentesq; in mortario, digerunt in pastillos. Id Meconium uoca-
 tur multum Opio ignauius. Porro Opij faciendi ratio hæc est. Cum ros
 in eo exaruerit, cultro circumdante asterisco, ne penitus adigatur, ex ob-
 liquo in rectum summam cutem incidere oportet, lachrymam exeun-
 tem, digito in concham abstergere. Nec multo post redire, ut concreta
 inueniatur. Etenim quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in uetere
 pile teri debet, & in pastillos cogi. Cum tamen inciditur, retrocedendum
 est, ne uestibus succus deradatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Satiū omne magis rotundat capita: id syluestri longū, ac pusillum, ad effectus oēs ualenti-
 us. Optimū in siccis, & ubi raro pluit. Papaueris satiū tria fecere gēa. Candidum, cuius semen
 tostum in secunda mensa, cū melle tragematis loco edebatur. Hoc, & panis rustici crustas, ouo
 affuso cōmendabat. Alterum nigrum, cuius scapo inciso lac exprimitur. Tertium Rheas, de
 quo diximus: q̄q; nisi maturuisset, edomitum existimari nullo modo posset. Galenus & Dio-
 scorides Papaueris genera sex enumerant, Rheada, Ceratitin, Aphrodes, Satiuum, siue Thy-
 lacin, & duo alia syluestria. Capite sessili unum: oblongo alterum: quæ & Rheadas uocant
 aliqui: propterea q̄ e duobus ijs quæsitum lac, scapo inciso fluat.

Differt Meconium ab Opio, si proprie loquaris, sicut apud nos succus a lacte, qd & sapor,
 & lachryma quoq; dicitur. Succus & Meconion uocat, qui decocto, uel crudo Papauere, ut in
 cæteris exprimit. Lac uero & Opion, quod caule inciso manat e Papauere nigro, ut Diag-
 ras suadet, cum turgescit, ut lollas cum deslorescit. Incidit subent sub capite & calicet nec in alio
 genere ipsum inciditur caput. Humor hic, & herbæ cuiusq; lana excipitur: aut si exiguus est,
 ungue pollicis, aut lactucis, & postero die magis, quod inaruit passilli siccantur in umbra. Ac-
 cenditur syncerū difficiliter, et crebro extinguit. In aqua innatat nebula. Aestiuo sole sudat, et se
 diluit, donec simile recenti succo fiat. Confectum in posca cōit. Mnesides optime seruari putat,
 Hyoscyami semine adiecto. Alij in Faba. Adulterat hoc Alexandrie. Thebanū Opium celebra-
 ri ad multa uideo: p̄sertim in collyrijs duobus, q̄ Lynceus, & Proteus, ab Aegineta Paulo co-

D I O S C O R I D I S

C gnominatur. Sicut Hermolaus & Antoninus, ab Aetio, in quæ non Opiū modo, sed Acacia quoq; poscit ad repercussum. Achaicū quoq; Asianūq; Opiū auctores Græci noiant.

μακρόν κερκίτιον

P De corniculato Papauere. CAP. LXIX.
Papauer, Ceratidem, id est, Corniculatum, aliqui Paralion, alij syluestre Papauer, alij Thalassion, Romani Fabulum marinum, Aphri Sisimacam uocant. Folia habet candida, hirsuta, Verbasco similia, in ambitu syluestrium Papauerum more serrata, caule non dissimili, flore luteo, calyculo Fœnogræci, in corniculorum modum inflexo. Unde nomen mutuatur. Semine Papaueris, pusillo, nigroq; radice per summa cespitum nigra, crassa. Nascitur in maritimis & asperis. Radici ea uis inest, ut in aqua decocta ad dimidias, coxendicum & iocineris affectus, potu sanet. Prodest his, qui crassa quædam, aspera, aut araneosa cum lotio reddunt. Alium leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulla posito. Crustas emarginant, illita ex oleo folia, floresq; Argema ac nubeculas iumentorum perunctas, abstergunt. Sunt qui Glaucium, hoc Papaueris genere facitari existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione. Qui hoc Papauer hauserit, non alia accidit, q̃ qui Opium ebiberit. Cui eisdem succurritur auxilijs. Semen æstate dum siccum est, colligitur. Decoctum radicis bibitur cum uino, sanatq; dysenteriam.

D EX M. VERG. COMM.
Papauer ceratidis, siue ceraticon, hoc est, cornicularium, syluestre est, cubitali altitudine, folio Verbasci nigri, minus atro. Radice breui & corticosa. Tempestiuum messibus. folia huic minora & tenuiora, q̃ cæteris syluestribus. Nascitur & nitroso loco, & Glaucion a quibusdam appellatur, haud proprie.

V EX M. VERG. COMM.
Nus satis Theophrastus est, ut cornicularis Papaueris huius historiam, & tot nominum eius in græcis rationem intelligamus: qui, 9. de plantarum historia inter agrestia numeratum his uerbis descripsit. ταύτην τὸ φύλλον ὡς φλόμον τὴν μαλαίνον ἥπλον δὲ μέλαν. τοῦ δὲ κελεύ τοῦ ἔλας ὡς παχέον. ἥσα δὲ βράχεια καὶ ἐπιπλάσιος ὁ δὲ καρπὸς καμπύλος. ὡσπερ τὰν κερκίτων. συλλήγεται δὲ πρὸς πυροτεμνίαν. δύναται δὲ καθαίρειν πλὴν κοιλίαν. τὸ δὲ φύλλον ἄγριμα πρόβατον ἀφαιρῇ. φύται δὲ παρὰ τὰς θαλάσσιαν ὅν ἂν ἢ πετρώδη χωρία. Quorū summa & sensus est. Huius foliū nigro Verbasco simile, minus tamen nigrum. Caulis altitudo cubitalis est. Radix breuis, & in summa terra hærens. Fructus inflexus, siliquis, quas Græci Ceratia uocant, similis. Carpitur per messem. Aliū purgat, Pecoris albugines foliū exterit. Nascitur ad mare petrosis locis. Ex his dubitauerit merito, quæsieritq; aliquis, ceratide ne hoc Papauer a cornuū figura simpliciter, ut hic ait Græci nominauerint. An ut in Theophrasto auditur, a ceratijs, quas latini siliquas græcas dixerūt, de quibus primo uolumine actū a nobis est, quæ & ipsæ inflexæ sūnt, & cornuū figura per longitudinem incuruātur? Multifacienda scriptoris huius auctoritas, aliorūq; omnium, qui eum secuti, corniculis fructū eius comparauerūt. Non spernendus etiā Theophrastus grauis auctor, & in disciplina plantarū cunctis alijs merito antefendus. Nobis in Theophrasti sententiā inclināt animus. Etsi nullū in re discrimen sit: nec si cornibus, aut ceratijs cōparauerit Papaueris huius fructū aliquis, diuersam rem ostēderit. Ambo em̃, cornuū scilicet, & ceratia in longitudinē producta inflectūtur: nec siliquæ illæ aliunde, q̃ a cornibus ceratia a græcis dictæ sunt. Ex eodem Theophrasto nouerit aliquis, etiā agreste Papauer hoc recte dici, cōmuni tamē agrestibus alijs appellatione. In eorum em̃ censu est. Nec minus quoniā ad mare nascitur Paralion: Id enim ea uox significat. Quā naturæ, nataliūq; eius notā secuti Latini, Fabiolū marinum uocauerunt: quoniā ad mare nasceretur, fabaccisq; siliquis in longitudine similia uascula sua ferret. Habere hoc Dioscorides ait folia λευκά, id est, candida. Barbarus quasi qui non λευκά, id est, candida, sed μακρά, id est, tenuia legeret, folia habere tenuia id dixit. Nescimus nos, an ex fuorū codicum

lectione sic uerterit: an potius a Plinio in ea re monitus, candorem ad tenuitatem transtulerit. Verba Plinij sunt. 20. uolumine, capite. 18. Folia minora, tenuioraq; q̄ ceteris syluestribus. Nos communem omnium quorū uidimus græcorum codicum fidem secuti, candido colore folia eius esse diximus. Indicare id Theophrastum opinati, cum ait, folio esse hoc Papauer Verbasci nigri, sed minus illo nigro. Sentimus quidem leui argumento hoc niti. In ambigua tamē re, monuisse omnia inuile non fuerit.

De spumeo Papauere. CAP. LXX.

Alterum Papaueris genus, Aphrodes, id est, Spumeū uocatur, ab alijs Heraclium, caule dodrantali, folijs admodū paruis, Radiculæ similibus, fructu inter ea candido. Nami herbula alba est, & spumea tota. Radice in summo cespite. Legitur æstate semen, cum integre adoleuit, deciditq; exiccatum. Datum acetabuli mensura in aqua mulsa, uomitione expurgat. Priuatim huiusmodi purgatio, comitialib. pdest.

BARBARI COROLL.

Papauer hoc Heracleon, siue Aphrodes, hoc est, Herculeum, & Spumosum dicitur: cuius folia herbæ Radiculæ, quam Græci Struthion uocant, similia sunt Dioscoridi, Theophrasto, q̄ ut multi censent. Et quoniam Struthion etiam passerē significat, Plinius hac parte, folijs inquit, si procul intuearis, speciem passerum representantibus. Verba porro Theophrasti hæc sunt. Papauer, inquit Heracleon φύλλον ἔχει διον σπέρμα, & τὰ λινὰ λευκαίνουσιν. hoc est, folium habet quale struthos, quo lina candefaciunt. Plinius hæc non de Radicula, ut dixi, quæ latis demum lauantis aptissima est, curans eas, & conferens candore molliciaq; ut tradit ipse Plinius. 19. libro, sed de passeribus intelligit. Ex ipso autem Papauere lina inquit splendorem trahunt. Quia tū Plinio contradicere non prius audeo, q̄ si possum, contempler oculis, passerum, an Radiculæ speciem Papauer illud præbeat, uerbum Græcum posuimus in latino: ut liberum esset exquiraturis arbitrium. Semen huic spumeum, Aestate tunditur in pila. Utilissimum hoc, medicamentum nobili, quod Diacodion, & Asteriacen uocant, Etenim capita Papaueris, & Codias, & Asteriscos Græci appellant. Quin & humanum caput Pœtæ interim Codian uocant, ut inquit Pollux. Fit autem huius Papaueris, aut cuiusq; syluestris capitibus. 126. in aque celestis sextarijs tribus, biduo maceratis, in eademq; decoctis. Deinde siccat, iterumq; cum melle coctis, ad dimidias partes uapore tenui, Addidere postea drachmas senas croci, hypocistidis, turis, acaciæ, & passii cretici sextarium. Aetius Papauer hoc (ut arbitror) intelligit, cum Mecaphroditon commendat, herbam contra uiperas in potu præbens, fortasse quia uomitionibus probetur.

EX M. VERG. COMM.

Heraclium uocari Papauer hoc tantum Theophrastus eodem libro testatus est. Nec nos scimus, ab Hercule ne sic uocatum fuerit, an ex tam multis quæ toto orbe aliquando fuerunt urbes Heraclia aliqua, ad quam frequens, aut speciosum Papauer hoc nasceretur, nomen illi fecerit. Plures alij a candore & raritate spumæ, quas habet notas, Spumeum nominauerunt. Theophrasti historia de eo hæc est. ἡ τῆρα δὲ μῦκων ἡράκλεια καλεῖται, τὸ μὲν φύλλον ἔχουσα διονσπέρμιον & τὰ ὀστέα λευκαίνουσι, ἔστι δὲ λευκὴν ἐπιπλάσιον, τὸν δὲ καρπὸν λευκόν, καθαίρει ἀνὰ ταύτην ἢ σῖζα, χρῶνται δὲ τινες πρὸς τοῦτο ἐπιπλάσιον ἐν μελιράτῳ. Quod est. Aliud etiam Papauer Heraclium uocatur, folium habens Struthio, id est, Lanariæ herbæ, qua lintea dealbantur, similem: Radicem candidam in superficie terræ. Fructum itidem candidum. Purgat per superna radix eius. Utuntur ea alij ad comitiales in mulsa aqua. Quæ non ideo dicta a nobis sunt, ut quæ parū feliciter Plinius ex Theophrasto in hoc Papauere reddidit, redargueremus: iam pridem enim a Leoniceo, & ab alijs deprehensum id est, sed ut concordem antiquorum duorum scriptorum in hac planta historiam & medicinam ostenderemus: simulq; moneremus, quæ mutata ex communi lectione a nobis fuerūt, autore Theophrasto mutata fuisse: nec illud etiam relinqueremus, accedere nos eorum iudicio, qui Plinium in descriptione Papaueris huius redarguunt, nec posse a quoq; in tam manifesta re satis defendi.

De Hypocōo. CAP. LXXI.

Hypocōon, aliq Hypopheō uocat. Nascit in segetibus aruiscq; folijs Rutæ, exilibus ramis, Natura eadē quæ Papaueris succo.

D I O S C O R I D I S

EX M. VERG COMM.

C DE Hypecō sunt inter latinos Plinio omnia eadem. Nasci in segetibus enim ait Rutæ folijs, & eandem Papaueris succo naturam illi esse.

H De Apollinari, & Hyoscyamo. CAP. LXXII.
 Hyoscyamon, alij Pythonion, aliqui Dioscyamō uocant, alij Adamanta, alij Adamenon, alij Hypnoticon, alij Emmanes, alij Atomon, nonnulli Dithiambrion, Magi, Pythagoras, & Oftanes, Zoroastres Tiphomon, alij Raponticam, Romani Apollinarem, Aegyptij Saphtho, Ethrusci Sabulum, Galli Billinuntiam, Daci Dieli am. Frutex est caules emitens crassos, folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta. Flores e latere caulis ordine prodeunt, tanq̃ puniceorum Cytini, scutulis septi seminum plenis, ut Papaueris. Tres eius differentiae. Vna semine nigro, floribus pene purpureis, similaceis folijs, cytinis pediculis, & spinosis. Alterius sement subflauum, ut Irionis. Flores lutei, folia & filiquae simplices. Ambo insaniam gignunt, & soporem. Ideo in communi usu damnantur. Tertium genus, ut quod minutissimum esset, medici recipere, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris, seminibus, in maritimis rudibusq̃ nascens. In cuius deficientis uicem, rufum usurpari oportet. Niger ut deterrimus, improbatur. Recenti semine, cataplasmatibus folijsq̃ tussis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, usus ad annum usq̃ prorogatur. Nam facile corruptionem sentit. Extrahitur etiam separatim ex sicco semine, in aqua calida tuso, et obtrito. Succo autem liquamentū praestantius, & magis dolores finit. Contusa herba, addita trimestri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liquamentum primum, & quod a sicco semine exemptum est, collyrijs quae doloris sensum auferunt, commodissime inferi solent. Contra acutas, calidasq̃ fluctiones, dolores aurium, atq̃ uuluae mala profunt. Cum farina autem, aut polenta, oculorum, pedum, caeterarumq̃ partium inflammationes placant. Semen eadem praebet. Tussi, distillationibus, oculorum fluctioni, & doloribus, efficax. Contra mensium abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem, oboli pondere cum Papaueris semine & aqua mulsa bibitur. Podagris subuenit, testibus inflatis, matrisq̃ tumentibus a partu, tritum ex uino illinitur. Alijs quoq̃ cataplasmatibus, quae doloris leuamentum praestant, ammisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta, utilissime imponuntur. Recentia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinuntur. Cum uino ter quaterne pota, sanant algidas febres, quas Hepialos uocant. Cocta olerum modo folia, si acetabuli mensura manduntur, mercurio insaniam gignunt. Idem efficere tradunt, si colo ulcus sentiente infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

BARBARIOROLL.

A Alter Dioscorides (ut Galenus inquit) Hyoscyamon apud Hippocratem uidetur interpre-

ratus, id quod ille *κνύμης κνύμων*, hoc est, fabæ semen appellauit. Hyoscyamon uero Græci ut **A** dentur appellasse, hoc est, fabam suillam, propterea, quod, ut Hælianus ait, pastu eius herbæ, resoluuntur & conuellantur apri. Sed remediū nouere. Aquas enim statim adeūt, et caneros uenant, atque ita protinus saluti restituuntur.

EX M. VERG. COMM.

Hæc est Hyoscyamos illa, contra cuius maleficium hic ipse scriptor pluribus remedijs. 6. uolumine pugnabit. In qua non male damnauerit aliquis naturam, quæ humanæ menti noxi- am, & in furorem homines agentem herbam, tam sagaci artificio, contra coeli iniurias omnes munierit & ornauerit. Nec minus etiam demirabitur gentes, quæ tam multis, tamque honestis appellationibus, optabilem ignaris & admirabilem fecerint plantā, quæ alioquin ob eam quā diximus causam, ableganda ultra Sauromatas fuerat & glaciale Oceanum: ut aliosis locis illic nascens, ante maturum semen tota aliquando periret. Nisi forte contra uota hæc nostra in- tulerit aliquis, tam grauem noxam non minore bono eam rependere: optandamque in orbe no- stro plantam, quæ tam efficaci remedio contra dolores, quibus tota aliquando perit uita homi- nis, pugnet. Nec quia menti noceat, ideo doloris lenimenta quæ habet, abijcienda. Parum sapi- enter enim, quia malo coniunctum sit bonum, ex altero utrunque damnatur: cum liceat disfra- ctis in diuersa contrarijs malo prudenter carere, bono autem feliciter uti. Quod in Apollinari herba, præsertim faciendum. Quam Græci Hyoscyamon, id est, suum Fabam ideo uocauerunt, quod ut in historia sua retulit Helianus, pastu eius conuellantur fues, præsentis mortis periculo, ni- si copiosa aqua statim se foris & intus proluerint. Alij, ut fit, in desiderio salutis, & suauiore uo- luptatis sensu, cum ope eius a dolore ad indolentiam quasi diuino quodam beneficio restituti fuissent, non ultra Hyoscyamum a suis, sed a Ioue Dyoscyamum, id est, Iouis Fabam dixe- runt. Vbi eadem nominis ratione illi etiam sunt, qui a medicinæ autore deo Apolline, Apolli- narem herbam, & Phythonion eam dixerunt. Phœbeum enim & illud a Pythone nomen est. **B** Fuerunt contra, quæ a maleficio eius Emmanes, id est, in insaniam & furorem agentem eam nomi- nauerint: & a somno quem facit Hipnoricon. Somnificum enim ea uox significat.

De Psyllio.

CAP. LXXIII.

Psyllion aliqui Cataphysin, alij Cynocephalion, alij Chrystalion, alij Cynomyam, alij Psyllerin, alij Sicelioticon, Siculi Comidijn, Romani hærbam Pulicarem, aut Silbacium. Aphri Vargugum appella-
lant. Folijs Coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus, sarmento-
sa in totum hærbula, ramis dodrantalibus. Coma a medio caule exor-
ritur, duobus tribusue conuolutis in cacumine capitulis, semine duro,
nigro, pulicum simili. Vnde & nomen. In aruis et incultis nascitur. Vis
ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens. Articuli-
lorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, uulsis, illitum auxili-
atur. Imponitur in dolore capitis, cum Rosaceo, aqua, aut aceto. Ente-
rocelis infantium, & prominenti umbilico, illitum ex aceto, medetur.
Teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, ubi con-
creuit aqua, illinitur. Siquidem uehementer refrigerat, & in ferpentem
aquam deicctum, calorem reprimat. Contra ignes sacros efficax est. Fa-
ma est, si uirens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cū
adipe tusum, sordida ulcera, & quæ cacœthe uocantur, expurgat. Suc-
cus uermiculosis auribus, aut fluctione laborantibus, ex melle prodest.

BARBARI COROLL.

Psyllium, radice tenui, superuacua, sarmentosum, fabæ granis in cacuminibus, flores cani-
no capiti, ut Plinius non dissimiles, ob id Cynocephalion uocatur, & Cynoides. Corrigendū
enim locum in Plinio putamus, ubi non floribus, sed folijs canino capiti similibus describi-

Pli. li. 26. ca. 10
& s.

Cur. Alioquin in exemplaribus manu scriptis, floribus, non folijs. Semen in baccis effigie pulicis; unde nomen. Prouenit in uitarijs. Mendosum & illa quoque parte Plinium existimo, cum dicit, Psyllibus lacteum succum esse, qui densatus in gummi, & sumptus cum melle, uomitiones faciat, praefertimque bilem trahat. Quid enim sint Psylles, non comperi.

E X M. V E R G. C O M M.

Reuocanda in hunc locum quae superiore uolumine de Conyza constituta fuerunt. Caten dumque legentibus, quoniam duae Pulicares herbae in hoc opere nobis sunt, ne difficili utriusque intellectu, earum simul nomina misceantur. Illa enim Conyza Pulicaris, haec simpliciter Pulicaris dici tunc iussa est. Cur autem diuersas eodem indicauerimus nomine, non leuis fecit causa. Non poterat huic ex graeci nominis ratione nota haec deesse. Graeci enim a Psyllis, quae pulices in ea gente sunt, Psyllion, id est, Pulicarem uocauerunt. Non poterat graeca uox etiam aliter uerti. In illa cogebat omnium haecenus scriptorum consensus, qui Pulicarem eam in commentarijs suis passim uocauerant, a pulicibus pariter indicare. Accedebat deinde his, quod utraque causam aliquam cur sic uocari posset ostendebat. Illa, quod haerentes sibi pulices enecat. Haec, quod semine, ut Plinius ait, puliceo est: & si uerum sit quod hic ait, uiridem in domum illatam pulicis generationem prohibere. Descripsit hanc Pulicarem Plinius lib. 25. cap. 9. Pluresque & ille ex adiectis his appellationibus numerauit, Crystalion, Sicelicon, Cynomyam, & Cynoides. Quarum aliqua non satis certam modo causam habent; aliquid a uiribus notisque eius factae sunt. Qualis Crystalion est, qua indicantur qui ea usi sunt crassescendi densandique uim quam ea habet. Crystallum enim glaciem graeci uocant: quae in lapidis duriciem coacta, densataque frigore aqua est. Illi simile aliquid Pulicaris huius herbae liquor habet, ut ex eius in scriptore hoc historia, & ex Plinio patet. Retulit idem Plinius, folijs cantno capiti (modo integer locus ille sit) non dissimilibus esse: contra quod hic, qui Cornicis pedi herbae comparauit. Quo fit, ut uirtutum in Plinio suspicemur. Nec tamen habemus unde Cynocephalum, & Cynomyiam, in quibus uocibus ex causa ne aliquid est, dictam fuisse significemus. Sicelicam deinde a Sicilia uocatam, cognoscere facile est. Sarmetiosam, quam hic *χερνιδίον* Plinius esse dixit. Nos Feni modo foliosam furculosamque potius diximus: longo intervallo distare latinorum sarmenta, a graecorum *χέρπρον* scientes: quae uoce illi significant omnes quae ad Fenum in pratis nascuntur herbas. In uiribus eius etiam non parum uariant antiqui scriptores. Hic mollire, adstringere & refrigerare eam dixit. Plinius illi ad refrigerandum & discutiendum ingentem uim assignauit. **P A V L V S A E-**gineta in secundo ordine refrigerare, & praeter id medias habere, in siccando & humando uires testatus est. Quae quoniam non sunt omnibus eadem, signare legentibus placuit. Quem admodum, & quo loco corruptae, nec bene respondentis lectionis notam adiecinus, legentes monemus: uideri nobis, quod & Plinius indicat, praecipit a scriptore hoc, contra capitis dolores ex aceto, aquaue, aut rosaceo fronti temporibusque imponi semen. Mox in alijs affectionibus, intestinorum ramcibus uerbi causa, aut procidentibus umbilicis habendum in duabus aquae hemiuis tritum idem semen: & cum aquam, ueluti in gelu & glaciem densauerit, quod ut eius fore intelligendum est, tunc concreto seminis eius diluto illo antedicta uirtuta inungere. Sed parum certus in scriptore hoc sensus hic est. Cui etiam in antiquioribus & melioribus graecis deest quod ultimum in hoc capite, & ab eo loco legitur, Eadem in feruentem aquam dimissa. &c.

D De Hortensi Solano. **C A P. LXXIII.**

Hortensium, seu urbanum Strychnon, Romani Solanum uocant, alij Cacabulum, Aegyptij Allelo, Galli Scubulum, Aphri Astrismunim. Frutex cibus idoneus, exilis, pusillus, multis concauis alis, folio nigro, maiore quod Ocimi, & latiore, fructu rotundo, uiridi, qui post maturitatem nigricat, aut fuluescit. Haerba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi. Quare folia ulceribus quae serpunt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline polentae illinunt. Aegilopia, capitibusque dolores, trita & imposita sanant. Aestuanti stomacho auxiliantur. Parotidas, cum sale detrita illitu discutiunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, atque ulcera quae serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spiritu.

ma, ad agilopas cum pane, infantium adustioni, quam Syriāsin uocāt, **A**
cum rosaceo perfusus proficit. In colyrijs, aque uel oui uicem exhibet,
contra acutas fluxiones, suffusionesq;. Aurium dolori instillatus pro-
dest. Mensium abundantia sistit, in uellere subditus. Succus fuluo gal-
linarum in domibus oberuantium fimo subactus, & linteo appositus,
agilopijs praesentaneo est remedio.

BARBARI COROLL.

Strychnon, siue ut Galenus Trychnon, satium, quod & melan, hoc est, nigrum cognomi-
nant, a nostris Solanum dicitur, familiare cibis, in Aegypto maxime. Nihil mali corporibus ef-
se praedicat Xenocrates, cui hoc salutare non sit. Flos huic est candidus, acini, siue pomae poti-
us herbaceae, & quadamtenus aculeata, in quibus semen. Hoc Romae uidimus in horto orato-
ris Galli.

Pli. li. 21. ca. 31

EX M. VERG COMM.

Vesicarias in Theophrasti plantis Gaza Strychnos duas appellauit: sopores alteram, furo-
res facientem alteram: quae huic scriptori in quatuor eius generibus postremae sunt. Videturq;
ex Plinio uolumine. 21. cap. 11. comune id nomen omnibus fecisse: cum tamē Plinius secundū
eius genus tantum cognomento Halicacabum, Vesicariam uocet: causamq; afferat, q; uesicę
& calculis prosit: in qua ui subscribentem sibi habet hunc scriptorem, qui *δυσήκων* ait Strych-
non eum esse. Verumtamen dubitari facile potest, an alia nominis eius causa quondam fuerit,
qualis in eo mox a nobis dicitur. Vesicarias, ut praemonstratum est, Strychnos omnes ille di-
xit. Celsus contra, ultimo secundi libri capite, cum numeraret quae reprimunt simul & refrige-
rant, post multa his uerbis Solanum Strychnum uocauit. Sifer, apiū, solanum, quam Strych-
num graeci uocant, hanc intelligens, cui & a Dioscoride praecipua in refrigerando uis assigna-
tur. Nosq; latinae rei antiquum autorem secuti, Solanum, non uesicariam Strychnum horten-
sem, siue satium diximus, quae nigris folijs & in extrema maturitate nigro semine ab hoc &
ab alijs describitur, pingui cultorq; solo proueniens: cuius nostra aetate nullus in cibis usus est:
& si hic hortense, satium, edendo esse & in cibo innocens dicat. Quibus conficere aliquis me-
rito possit, fuisse quondam in sanitate aliquem eius usum. Solani huius, q. de plantarum histo-
ria Theophrastus duo tantū facit genera, *πνόςλη καὶ μακρόν*, id est, quod soporem, & quod fu-
rorem gignit. Suntq; de utroq; multa ab eo dicta, quae suis locis ex eius historia a nobis repeten-
tur. Ceteri omnes, autore ut nos credimus Dioscoride, quatuor Strychnos deinceps numera-
uerunt, Satium, hortensemq; hunc, & cibarium: quem omnes nigrum a colore fructus uo-
cauerunt. Mox Halicacabum cognomento, quem priuatim nos Vesicariam a Plinio uocari
credimus, rubente fructu, uuae acini figura. Tertium somnificum, quem fruticosum describūt.
Postremo insaniam facientem: diuersis in medicina etiam uiribus, quae ab hoc scriptore statim
patebunt. Obseruauimusq; nos, ad refrigerandum plerūq; usum Solani fuisse, & ex tam mul-
tis eius generibus Hortense ad eum usum maxime probasse antiquos. Ceteris enim maleficijs
periculum magis q; remedium inest. Facilis cognitu herba, nuncq; deceptura incautos, si quas
habent totius generis discretas folijs, fructu, coloreq; notas diligentius obseruauerint. Virtus
hortensis huius Solani succo Paulus Aegineta in primo ad refrigerandos in infantibus capitis
ardores, quos Graeci Syriāsim uocauerunt.

B

De Vesicaria. CAP. LXXXV.

Est & aliud Solanum, quod peculiari nomine Halicacabō, id est,
Vesicariam, aut Physalida uocant, folijs antedicto latioribus. Cu-
ius caules posteaq; adoleuerunt, humi prosteruntur, folliculis orbicu-
latis, fuluo intus acino, uesiculis simili, rotundo, leui. Quo coronarij u-
tuntur, & corollas faciunt. Vim usumq; hortensij Solani habet. Ve-
rum cibis nequaq; expetitur. Regium morbum purgat, semine potio.
Et urinam pellit. Ex utraq; herba succus extrahitur, qui siccatus in um-
bra reconditur, ad eadem ualens.

στυχων ελκιδε
βου

R iij

D I O S C O R I D I S

C B A R B A R I C O R O L L.

Strychnon Halicacabon folijs Ocimi describitur a Plinio, commendatum quidem & hoc ab alijs, licet hortense præferatur. Radicem Halicacabi bibunt, qui sunt uaticinandi callentes, qui furere ad confirmandam superstitionem aspici se uolunt. Aspidum naturæ in tæsum aduersa hæc herba est, ut radice propius admota, soporentur.

E X M. V E R G. C O M M.

Coronaria, quod hic, & Plinius testantur Vesicaria hæc quondam herba fuit. Damnantur tamen ambo eius in cibis usum, nec ad coronas amasse ueteres aliud in ea uidentur, q̃ uellicas, folliculosq̃ illos qui per ambitum capitis ex coronis pendentes, grato spectaculo ruberent, turbinati, grandæq̃, & Iliaci fistri, ex quo crepitacula pendeant, imaginē reddentes. Nascitur Vesicaria hæc multa in uineis, in Italia herba uerius q̃ frutex: p̃fertq̃ Veslicas illas Septēbri mense colore primū uiridi, mox paulatim rubescēte, turbinatas ut Plinius ait: semen Ciceris magnitudine intra se claudentes, rubro colore, nec nisi extremo Autumno maturefcens: in nullo nostra ætate honore, aut usu. Vesicariāq̃ nos credimus a uellicis his potius, q̃ quia prosit uellicæ. Et si Plinius id testē dictū fuisse, in τὸν φασὶν, etenim ex uellicis folliculisq̃ his factum illi nomē est. Nec aliæ herbæ inuentibus uidebitur: tam similes animalium uellicis folliculi illi sunt.

De Solano somnifero. C A P. LXXVI.

σπύχων ὀπινύτιον

Spellant, alij Strychnon, alij Manicon, alij Dorycnion, alij Calliada, Romani Apollinarem minorem, alij Vlticanam hærbam, aut Opfaginem, Daci Cycolidē, Pœni Cacabum. Fruticam multis ramis, densis, lignosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, Cotoneæq̃ mali similitū, plenis, flore grandi, rubro, fructu in folliculis crocato, radice longa, subrubro cortice uestita. Nascitur in faxis non procul a mari. Radicis cortex, in uino drachmæ pondere potus, somnificam uim habet, Opio mitiorem. Semen uehementer urinam cit. Corymbi duodecim, hydropicis dantur. Si quid numero adijciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis inferitur, & medicamentis quæ doloris leuamentum præbent. Decoctus in uino, si in ore contineatur, dētium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

The. li. 7. ca. 14

B A R B A R I C O R O L L.

Strychnon Hypnoticon, id est, soporiferum, ab alijs Morion, ab alijs Moly appellatum, Coronarijs in Aegypto expetitur, inuitante similitudine florum Hederæ. Velocius hoc ad mortem q̃ Opium. Inuenio & Strychnen, & Eubepaton, & Callion uocatam: nosiri Vesicariam, a folliculis, uel quia uellicæ prosit & calculis. Theodorus omnes Strychnos Vesicarias appellat. Radix huius sanguinis modo rubra Theophrasto candida, cum inarescit. Semen coactis folia mali Coronei, Lactucæ caprinæ: sed hirsuta, magno cespice, in rupibus sepulchretisq̃ nascitur. Genus hoc Dioscorides libro primo Alicacabū uocauit. Eademq̃ ad uerbū fere scripsit, quæ nunc in soporifero leguntur. Sed Alicacabus tamen uera est, quæ proximo capite superius descripta est, ut Galenus inquit. Laudat hoc a loco* ad fruendū, & Tamarisio.

σπύχων ὀπινύτιον

De Manico Solano. C A P. LXXVII.

Strychnon, siue Solanum Manicon, aliqui Persion, alij Thryon appellauere, alij Andron, alij Pentadryon, alij Enoron, quidam Orthogyon. Huic folium Erucæ simile, maius aliquanto, satis ad spinam, quam pæderota uocant, accedens. Caules a radice eximios emittit, decem aut duodecim ulnarum altitudine adolefcentes, caput in

acumine Oliua maius, & latius, & ut Platani pillula, hirsutius. Flo- **A**
rem nigrum. Postq̃ eo exiit, racemus exit rotundus, niger, denis,
aut duodenis acinis constans, similibus Hederae corymbis, ut uuæ mol-
libus. Radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. Gignitur in mon-
tibus uento perflatis, maritimis foueis, & uagis. Radix drachmae uni-
us pondere pota ex uino, facit species uanas, imaginesq̃ non iniucun-
das obuersari. Sed duplicatus hic modus, ad treis usq̃ dies, mentis alie-
nationem affert. Triplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsã copio-
sius pota, & uomitione reiecta.

B A R B A R I C O R O L L.

Strychnon Manicon, insanoia herba: quã & Doryon, siue potius Dorycnion uocat. at: quã
cuspides in plijs eo tingerent, passim nascente. Alij Perisson appellabant. foliũ Erucae matuscu-
lum, capite Gethyi maiore pilosioresq̃, ut Theophrastus scribit, qui hoc edant uideri sibi pul-
cherrimos affirmas. Hoc & coronarij placebat. Erythron dicebãt, & Neurita qui nequiter oc-
cultabãt, ut inquit Plinius. Frutex est furculosus uerius q̃ herba, ut Plinius tradit: folliculis ma-
gnis, latisq̃, ac turbinatis, grandi intus acino: qui maturefcit Nouembri mense.

De Dorycnio.

CAP. LXXVIII.

Dorycnion Crateuas Halicacabon, aut Caleam uocat. Frutex **Disorycnion**
Oleae nuper prodeunti similis. Nascitur in petris non procul a
mari, ramis cubito minoribus, folijs Oleae similibus colore, minuscu-
lis, firmioribus, præter modum scabris, flore candido, siliquis in cacu-
mine ceu Ciceris, densis, rotundis, quinis intus, aut senis seminibus, **Bl**
exigui Erui magnitudine, læuib, firmis, uersicoloribus. Radix ad
digiti crassitudinem & cubiti longitudinem adolescit. Id somniferum es-
se constat. Copiosius haustum mortem adfert. Nec defuere, qui dice-
rent, semen in amatoria expeti.

B A R B A R I C O R O L L.

Dorycnion, siue Dorychnidiõ, tam per, c, q̃ per, ch, etiã pro Strychno Manico acceptũ
quibusdã ueteribus inuenio. Dioscorides & Galenus, uidentur aliud ab eo genus existimasse.
Dicitum fortasse ita, q̃ cuspides telorũ inficere mos esset illo, ut in Manico Strychno diximus.
Dorycnio gustus lactis est, & contracto emanat.

De Mandragora.

CAP. LXXIX.

Mandragorã aliqui Circeum, aliq̃ Xeranthos, aliqui Antimnion, **mandragorã**
aut Antimion, aliq̃ Bombochylon, nonnulli Minon, Aegyptij
Apemum, Pythagoras Anthropomorphon, aliq̃ Aloeten, aliq̃ Thrida-
ciam, aliq̃ Cammaron, Zoroastres Diamonon, aut Archinen, Magi He-
mionos, aliqui Gonogeonas, Romani Caninũ malum, aliq̃ Terrestre ma-
lum, quidam Antimelon, nonnulli Dirceam, aliq̃ Circeam uocant, quo-
niam uideatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera. Niger,
quæ foemina existimatur, Thridacias appellatur, angustioribus folijs, ac
minoribus q̃ Lactuca, graueolentibus, in terra sparsis. Mala gerit luteis
ouorum similia, pallida, odorata: in quibus semen ueluti pyrorum.
Radicibus inhæret binis, ternisue, inter se conuolutis, nigris foris, in-
R. iij

D I O S C O R I D I S

C tus albis, carnofis, ingētibus. Verum is Mandragoras caule uiduus est. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis Norion uocitatus. Huius folia magna, alba, lata, læuia ut Betæ. Mala q̄ alterius duplo maiora, colore in crocum inclinante, iucunde cum grauitate quadam olentia. Horum pomorum cibo, aliquantum opihones foporantur. Radix alterius similis, maior, & candidior, orbata caule. Succus fit e cortice recentis radicis tuso, & prælis subiecto, qui terendo coactus, fictili reconditur. Malis quoq̄ succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad usum suspenditur. Aliqui radices in uino ad tertias coquunt, & defæcatum ius feruant. Cyathosq̄ uno utuntur, in peruigilijs, & doloribus, & ante sectiones, ulationesq̄, ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus, ut Veratrum, per uomitiones bilem atram, pituitamq̄ extrahit. Verum potu largiore, uita adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, pellis quoq̄ emollientibus, ammiscetur. Semioboli pondere inditus, menses & parus expellit. Subditus pro Balano, somnificus est. Radix ebur emolliore fertur, quæ senis horis cum eo decocta sit, & ad accipiendam quam effingere optaueris formam, ipsum facile præstat. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus, quas ulcera citarunt, cum polenta illinuntur. Duricias omneis, suppuraciones, strumas, & tubercula discutunt. Stigmata sine exulceratione desunt, si quinis senisue diebus sensim perfricentur. Folia seruantur in murijs, eosdem ad usus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium icibus ex melle aut oleo medetur. Strumas atq̄ tubercula, cum aqua dissipat. Articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem uinum e cortice radicis ad hunc modum. Ternæ minæ in uini dulcis metretam coniunguntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui secari, aut amburi debent, ut ante dictum est. Siquidem nullo tunc afficiuntur dolore. Sed ueterno quodam pressu, torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur. Item expressus ex eis succus. Nimio tamen odore percussi, obmutescunt. Semen malorum potum uulvas purgat, appositumq̄ cum sulphure ignem non experto. Rubra fceminarum profluuia sistit. Scarificatis multiphariam radicibus, erumpens lachryma, cauo uase recipitur. Est autem lachryma lacteo succo efficacior. Sed non ubiq̄, ut experientia docet, radices lacteum succum delachrymant. Alium tradunt esse Mandragoram nomine Morion, in opacis iuxta specus enatum, folijs albi Mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, in orbem circum radicem. Quæ mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemq̄ crassius dine æquat. Tradunt eam in pane, ossa, obsoniue drachmæ pondere deuoratam, non memoriam modo, sed usum quoq̄ rationis interciperet.

Obdormiscit enim homo, eo fere quo comederit habitu, sensus impos-
ternis quaternisue ex quo data est horis. Hac medici utuntur, cum scin-
dendi, urendiq; necessitas adest. Antidotum esse uolunt radicem cum
Manico Solano potam.

B A R B A R I C O R O L L.

MAndragoræ fructus niger, sapore quodā uini, effigie oui: non ut Theodorus putat, race-
mi *βασυλιδιος*, aut *βερβόδιος*, pro eo quod erat *ωουδίου* in Theophrasto legens. Fœminæ folia
hirsuta, radices carnosæ, teneræ, cubitales fere. Mala hæc fert Auellana nūcū magnitudine.
Mas Arsen, & Hypoplomon quoq; dictus, folio latiore, ut Lapathi satiuæ. Cauent effossuri
contrariū uentū, tribus circulis ante gladio circūscribentes, ad occasumq; spectantes. Succus
non ubiq; inueniē, sed ubi potest. Circa uindemias quærit. Odor grauis eius, sed radice & ma-
li grauior. Succū excipiunt deciso caulis cacumine. Adeo caulē habere non dubitant, etiam si
Dioscorides id negat. Hic & hirsutus fœminæ tribuit. Foliorū succus Roscidorū pestis est, ut
ingit Plinius. Mandragorā conclamati frigoris uenenū esse, nemo non scit. Inuenio herbæ no-
men Andraclon, a similitudine uirili dictæ. An eadē hæc sit cum Mandragora, nō legi. Sed est
cur esse sentiā: quippe cum & Anthropomorphon dicat. Nisi quis Andraclon, quia frangat, &
occidat hominē, dictam putarit: cuiusmodi uim multæ habent herbæ. Nam & annus uitæ. 63.
ut est apud Marernū, Andracles uideē appellatus: quia duplici rōne climatericus sit, & maxie
frāgat hoīes. Alioq; ab hoīs effigie Andricelon potius, q̃ Andraclon dici potuisset. In quo &
illud notandū, Andricelon apud Græcos, ut Aristoteles, & Iulius pollux testant, coloris genus
est, quē nos Purpurissum dicimus: atq; ita placuisse, Theodoro quoq; nostro liquet.

De Morio Mandragora nihil habeo qd addi possit, quæ a Dioscoride notant. Sed quo
nā mala Terrestria & Canina Mandragoræ fructus appellantur, in mentē subeunt quæ uulgo
Melenzana uocamus, hoc est, ut ipse puto, Mala insana: de quibus nihil ueteribus scriptum
fuisse, iam desino mirari, q̃ multa huiusmodi repio. Sicut hercle multa quondā fuere, quæ mo-
do uel ignorant, uel certe non habent. Mala ergo insana e frutice uulgari sunt, passim nascēte,
ut melones, & cucurbitæ. Pari quoq; cultu, folijs prope ficulneis, flore oblongo, specioso, can-
dido. Manditur uulgo pomū ex oleo, sale, pipere, Fungorū modo coctum.

E X M. V E R G. C O M M.

Qui Mandragoram quotidie circūferunt Agyrtæ, iactantq; tanto periculo effodi huma-
na forma, ignaræ plebi eam ostendentes, ex uno (ut nos credimus) Pythagoræ no-
mine, eius Anthropomorphos mēdaci sui occasione arripuerunt. Neq; enim uox illa aliud, q̃
humanæ formæ plantā significat. Accessit & Pythagoræ Columella, qui ex eadem ueluti no-
minū supersticiosa ostentatione, in carmine suo cecinit. Quāuis semihominis uesano gramine
facta, Mandragoræ pariat flores, mœstamq; Cicutam. &c. Non desuerunt illis etiam in iactan-
da cū foditur Mandragoras religione, Theophrastus in Græcis, in Latinis uero Plinius. Quos
non puduit, in tanta rerum grauitate quas scribebant, ne quid cōtra cōmunem sensum dixisse
uiderentur, populares, & sine ratione ritus huiusmodi posteris tradere. Quæ autem Theo-
phrastus pro Mandragoræ fossura docuit, huiusmodi sunt. *περιγράφει δὲ καὶ τὸν μανδραγόραν
ὡς τριῶν εἰρήν, ἡμεῖς δὲ πρὸς ἑστέραν βλέποντες. τὸν δὲ ἑτερον κύβω περιγράφεται καὶ λέγεται ὡς πλεῖστα
πρὶ ἀποδοξίων.* Quorum sensus sit. Circumscribunt & Mandragoram gladio ter: secantq; ad
occasum spectantes, lubent & alium saltatē tripudio circumagi: multaq; de Veneris usu &
re dicere. Plinius lib. 25. cap. 11. pleraq; eadem Theophrasto, & his non dissimilia quædam. Ca-
uent fossuri contrariū uentum, & tribus circulis ante gladio circūscribunt: postea fodiūt, ad oc-
casum spectantes. His auctoribus, & quasi per manus translata huiusmodi superstitione, uerū
mile est, uanis periculorū, religionisq; & humanæ formæ mēdacijs celebrari nūc etiā Mandra-
gorā. Cum tū id potius quærendū fuerit, cur a sapiente illo Samio honestiore hominis nomi-
ne indicata fuerit. Neq; em uerū simile est, quia bina radice, & hominis crura imitante nitatur,
plerūq; in terra sic dictam ab eo fuisse: trinis em aliquādo haeret, multaq; aliæ stirpes huiusce-
modi bifida radice diuisione uidetur. Abstrusiorē ex religione, cuius ubiq; magnus ille auctor
erat, causam habuisse id nomē oportet. Nos illud ignoramus, relinquiturq; inueniendū peri-
toribus & docendū: neq; hoc tantū, sed tam multas appellationes alias, quibus Mandragora
antiquitas indicauit, Quæ em inter eas notiores sunt Circeon, & Thridacias, ab hoc ipso scri-

Pli. li. 25. ca. 11.
Theoph. li. 9.
cap. 9. 13.

B

D I O S C O R I D I S

Cptore declarata, & per se satis patet. Sunt toto hoc capite aliqua per se, & quoniam non sunt nobis cum alijs eadē, legentibus aduertenda. Quale est, qd hic ait, poma Mandragoræ ouorū uitellis similia esse, a Plinio Auellanæ nucis similitudine describi, non leui inter utraq; formā, colorēq; diuersitate. Theophrastus, s. de plantarū historia, nisi uicū in lectione eius sit, qd suspicamur, contra utrūq; uidet de pomi huius colore, & magnitudine tradidisse. Verba eius sunt. ἴδιον δὲ ὁ καρπὸς τοῦ μανδραγόρου. τὰ μάλιστα καὶ φαγώδης καὶ οἰνώδης ὡς τὰ χυμῶ. Quod est. Priuatim uero Mandragoræ fructus, quia niger, acinosusq; & sapore uinosus est. Colore nigrū, acino uis equalē, & uinoso sapore pomū Mandragoræ Theophrastus describit: Hic autē ouorum uitellis, qui orbiculati sunt, cōparat: & ὥρχα, id est, pallida dicit: quā descriptionē natura magis confirmat. Discrepant non leuiter etiā hīdem auctores: q; hic utrūq; Mandragorā caule carere ait, Theophrastus contra eodem loco cum Ferulam descripsisset, subiecit. τὰν δὲ ἁλλὰν τὰ μὴ ὁμοίωτον τοῦτο τὸν κανὼν ἔχει καθάπερ ὁ μανδραγόρας καὶ τὸ κώνιον. Quorū uerborū sensus est. In reliquis aliā quidem similiorem huic caulem ferunt, qualis Mandragoras est, & Cicuta. Plinius etiā quo diximus loco idem testatur dicens. Succus sit & e malis, & e caule deciso cacumine. Palāq; ambo hi caulem Mandragoræ tribuunt, quē Dioscorides penitus aufert. Non ausim ego inter tam graues auctores tertius ueluti arbiter censere. Sensus id faciet: poteruntq; uolentes uel a peritis audire, uel ipsi totam Mandragoræ naturā obseruare.

De Aconito.

CAP. LXXX.

ἀκόνιτον

AConitum aliqui Pardalianches, alijs Cammoron, alijs Thelyphonon, alijs Myocitonon, alijs Therophonon uocant. Folia habet Cyclamini, aut Cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta, caulem palmo altum. Radix scorpionis caudam æmulatur, & alabastris modo splendet. Torpescit, ut fama est, scorpiones admota radice, stupentque. Qui rursus Hellebori contactu excitantur. Oculorū medicamentis leuandi doloribus gratia adijcitur. Enecat pantheras, fues, lupos, & feras omnes, in carnibus obiectum.

B A R B A R I C O R O L L.

Theoph. li. 9.

cap. 16.

Pli. li. 27. ca. 2.

AConiti primū genus Pardalianches, & Thelyphonon, siue potius Theriphonon cognominatur. Cæterū Theophrastus simpliciter, & sine Aconiti mentione Thelyphonon, & Scorpion, a radice similitudine uocauit, geniculatū tradens, graminis modo, locis umbrosis, & cætera quæ hic a Dioscoride tradunt. Hoc solum genus a Plinio demonstratū est, hirsuta leuiter eius folia prodendo. Vocatur & Myocitonos: quoniam & longinquo mures odore necat. Inuenio & Myephonon uocari genus herbar, quā & Sciada quidā noiant; nec quæ sit ea docent, præterq; q; Phantias in lib. de stirpibus, hæc habet uerba. Pileari forma sunt, semen Anisi, Feni culi, Coriandri, Caucalidis, Cicutæ, Pastinacæ, Sciadis, quā & Myephonon uocat. Plinius & Theophrastus, Myophonon, cui neruosus est cauliculus. Aconitū porro Theophrastus in Creta, & Zacyntho nasci maxie putant: de Lycoctono (ut arbitror) locutus. Sed optimū in Pontot circa Heracliam, ubi monstrat Hercules ad inferos aditus, quasi ex spumis cerberis canis ortum. Hoc a Thelyphono, ut testatus modo sum, disferre arbitror. Constat enim folio sylvestris Intubū: q; Aconiti non Seridis (id enim significat Intubū) sed Iridis sylvestris accipit. Radice nō nucis, ut Theodorus transulit, sed Gamaris marini specie: quoniam Caryas pro Caridas, uel Carabidas legisset. In quo notandum, Carabos, qui & Grapsæi sunt, interim pro locustis, interim pro Gamaris a ueteribus acceptos: ut Athenæus auctor est. Carides uero Squillæ sunt, quas Lybdenā putauit. Aconito sane breuis herba, nec superfluens, sed ut Frumeto. Semen ei tamen in spica non est. Nascitur ubiq; nec tantū in cauitibns nudis, quas Aconas uocant, unde Aconitū nōnulli uolunt appellatū. Alij quia in petrosis parte plurima nascenti, nullus iuxta puluis esset. Alij a pago, siue oppidulo, siue portu Periadynorū ad Heraclia ita noiato. Alij quoniam uis eadē in mortē esset, q; cotibus ad acie ferri decutiendā, statimq; admota uelocitas sentiretur. Fructū eius & foliū nihil nocere prædicat. Vm mortiferā in radice haberi. Ad erodendā uti ea medicos: pparari uero posse, ut tollat biennio, aīo, mēlibus sex, tribus, duobus, uno (rōne etiā ptiōribus occulta) miserius perire, q; potō eo diutius uitā extrahant. Differri, celerariq; sumētū

bus exitū, prout sero, aut ocus collectū fuerit. Debellari pestē eam nō alia radice, ut quidā ex promptere, sed aut utino, aut melle successu raro. Alioq̃n reperto in uisceribus ueneno, ceu pari inueto, nō perimit, sed colluctat cum eo tantū. Ita duo uenena cōmoriunt, ut anial superfit. O-mniū porro uenenorū ocysimū esse Aconitū, ut tactis quoq̃ genitalibus foeminini sexus ani-maliū, eodem die mortē inferat, quo modo interēptas a Calphurnio bestias dormiētes uxores M. Caelius obiecit. Fugitiuos eo in uinculis uti solitos, desponso animo Aconitū seruanti-bus, instituta capitis poena. Quod autē sit herbæ genus Acontias uocatū, non reperi. Etenū ut Athenæus inquit, grāmaticorū mos est, poētas, & auctores alios enarrantiū, cum qd huiusmo-di occurrerit, quasi cōtinuendo præterire, nihil aliud testantes, q̃ aut lapidis, aut animalis, aut floris genus esse. Quo fit, ut parū fidei grāmaticis in hac eruditiois parte semper habuerim. Aconitū inuenisse prima dicitur Hecate, uenenorū insigni crudelitate foemina, quæ Persam pa-trem, Solis filium, perinde crudelissimū, ueneno sustulit, auctor Diodorus. Proptereaq̃ Oui-dius in Metamorphosi cum herbā dixit Hecateida, uidetur Aconitum accapisse.

BARBARI COROLL.

Contra Grāmaticorum omnium decreta, Poëtarumq̃ fidem, quorum illi rationem nomi-nis secuti, ἀπὸ τῶν ἀκονίων, id est, a cautibus, in quibus nascitur Aconitum, dici passim testan-tur, hi, præsertimq̃ Naso in Transformationibus suis eecinerunt, Quæ quia nascuntur dura, uiuacia caute, Agrestes Aconita uocant. Theophrastus, s. de plantarum historia ubiq̃ nasci Aconitum testatus est: neq̃ a cautibus, quas Græci Acōnas uocant, nomen illi factum fuisse, sed ab Aconis Periandynorum pago, qui ad Heracliam Ponti est, Aconitum uocari. Amare quidem, & nasci plerūq̃ in petrosis, non tamen a petris nomen inuenisse. Verba eius sunt, quo diximus loco. *φύεται δὲ πανταχὺ καὶ οὐκ ἐν ταῖς ἀκόναις μόνον ἀπ' ὧν ἔχουσιν τὸ πρῶτον ὄνομα, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς περὶ ἀνδρῶν, καὶ ἐν τοῖς περὶ θηρίων, καὶ ἐν τοῖς περὶ φυτῶν τόποις.* Quorum sensus ille est, quæ paulo ante diximus. Duo hic scriptor Aconiti genera eodem nomine tradit. Theophrastus tamen eodem de plantarum historia uolumine, alterum hoc quod modo docetur simpliciter nomine Thelyphoni tradidit. In his, ut uidetur Theophrasto, & huic, omnia fere eadē sunt. Discrepant tantū, q̃ hic Aconitū, ille Thelyphonō primo uocat nomine: neuter tamē manifestā nominis eius aliquā indicat causam. Quo fit, ut suspicari aliquis possit, in utroq̃ corruptā esse hanc uocem: nec Thelyphonon, quod est foeminas, sed Theriophonon, quod est, bestias enecās, quas multas in capitis sine hic numerat, legendum esse locum. Nisi quod Theophrastus ait, plantæ huius radicem genitalibus omnium quadrupedum inditam, eadem die eas enecare, de foemi-narum genitalibus intelligendum tantū sit. In quā partem inclināt animus nobis: dicente Plinio lib. 27. capite. 2. tactis quoq̃ genitalibus foeminini sexus animalium, eodem die inferre mor-tem. Quod magis adhuc miretur aliquis, sciens neq̃ in altero Aconito huiusmodi aliquid restari Theophrastum, Plinius quo diximus loco, tractata simul utriusq̃ rei historia, unū tan-tum uidetur Aconiti genus fecisse; eiusq̃ appellationes aliquot palam indicasse: Pardalian-chesq̃ ab enecandis Pantheris uocari ostendisse, cum ait, Tangunt carnes Aconito, necantq̃ gustatu earum Pantheras: nisi hoc fieret, repleturas illos sitis; ob id quidam Pardalianches uocauere. Thelyphonon etiam, ut diximus, quoniam foeminini sexus animalia enecet, Myo-ctonon aliq̃, ab enecandis muribus, quoniam e longinquo mures odore enecet. Cammaron, a radicis flexura, quam Carydi, id est, marinæ Squillæ similem habet, quam in historia eius hic scorpionis caudæ similem fecit, & Alabastrorum modo splendere ait.

De altero Aconito.

CAP. LXXXI.

Est & alterum Aconitum, quod aliqui Cynoctonon, aliq̃ Lycopctonon appellant, aliq̃ Cyamon leucon, Romani Colomestrum. Huius genera sunt tria. Vnum, quo utuntur uenatores: alia duo in u-sum suum uertere medici. E quibus tertium, quod Ponticū nominatur, magna ex parte in Italia montibus Iustinis exilit: a priore distans, quoniam folia faciat effigie Platani, crebriore diuisura, longiora, & multo nigriora. Caulē Filicis, læuem stylum, cubitali altitudine, aut ampliorē. Semen in siliquis oblongis recondit. Radices in modum Squillæ piscis scirrorum nigrescunt. Quibus ad uenationem luporum utuntur,

C Infertæ siquidem crudis carnibus, & deuorata, lupos enecant.

Pli. li. 27. ca. 3.

H Vius Aconiti neq; formam, neq; medicinas Dioscorides exequitur. Librariorū (utarbitror) culpa fuit: tria capita scribentium, cum duo tantum Aconiti summa genera dicantur, Galeno teste, Pardalianches, & Lycoctonon.

De Lycoctono, cuius species treis haberi constat, in primo Aconiti genere disserui, Theophrastum & Plinium secutus. Lycoctonos dicta est, quia lupos enecat. Habent & nostri rustici ad eundem usum Lupariam uocant, folio uitis, multas habente diuisuras, & maculas candidas, flore oblongo, luteo. Aetius, Aconitum inquit sunt, qui Aconistomon, & Irin syluestre, & Pharmaciaden uocent, radícula fere graminis.

E X M. V E R G. C O M M.

Vale Thelyphonon Aconitum descripsit Theophrastus, satis superiore capite dictum a nobis fuit, superest modo alterum hoc. Quod quale in scriptore hoc sit, parū nobis constat. Dicimus autē quale, integrum ne, an corruptū & decurtatum. Demiramur enim nihil quod ad hominis salutem, aut maleficium pertineat in eo tradi: præsertim docente multa Theophrasto de maleficio eius & remedijs, & præter Theophrastum Paulo Aegineta easdem priores uires illi decernente: priuatimq; lupos enecare, quemadmodum illud Pantheras: ideoq; Lycoctonon hoc, ut illud Pardalianches seorsum uocari: & præter hos Plinio libro. 27. capi. 1. unum tantū genus utriusq; nominibus indicat, multoq; aliter q̃ Theophrastus, qui. 9. de plantarum historia alterū hoc Aconitum his uerbis descripsit. Nascitur ut ferunt Aconitum in Creta, Zacynthoq;. Plurimū autem & optimū in Heraclia Ponti. Folium habet Intibi, quod uocant Cichoriū, figura. Radicem figura coloreq; maris Squillæ similem: & in hac lætalem uim efficit. Contraq; foliorū & feminis nullas ad mortē uires esse. Herba autē semen est non furculosæ materiæ. Breuis tamē herba ipsa, nec quicq; egregium habens, tritico similis, non tamen semen illi in spica maturescit. Non uescitur Aconito ouis, nec aliud quidpiā animal. Adiecit his alia quædam scriptor idem, quæ uolentes relinquimus: ne ultra q̃ opus sit legentes remoremur.

D

Monemus tamē, in cognoscendis illis non fore inutile eorum laborem. Nobis em̄ satis est, pro Aconiti historia breuiter hæc signasse: ut quod paulo ante diximus, cunctis certius fieret, non cōuenire penitus in Aconitorū historia Græcos, Latinosq; antiquos scriptores. Qui tamē omnes, excepto Plinio, duo eius gēa fecerūt. Alterū quod Pardalianches a Theophrasto, Thelyphonon priuatim dictū est. Alterū, quod Lycoctonon: illud ab enecandis Pantheris, hoc a lupis. Et hæc auctore Paulo Aegineta cognomina utriusq; & notæ quondā fuerūt. Siquidem ait. ἀκόνιτον τὸ μὲν παρδαλίου καὶ σκύλλης καὶ δολιχόρου ἀνέματος ἐστίν· ὅθεν μὲν αὐτὸ ἐν τῇ μέλει τῶν ἐπὶ τῶν σαρκῶν ἀποκλίνων χριστὸν αὐτῷ, τὸ δὲ δολιχόρον τῆς αὐτῆς ἐν τῇ προτέρῳ ἀνέματος ἰδέως τοῦ δόκου, ἀνεστὶν ὡς ἐν τῇ παρδαλίῳ. Quod est. Et Aconitū quidem cognomēto Pardalianches excedentē, & lætalem uim habet. Eamq; ob causam intus cauendum est. Foris tamen in carnibus, quas exedi oporteat, uti licet. Quod uero a lupis Lycoctonon dicitur, easdē priores uires habens, priuatim lupos, ut illud pantheras enecat. Et hæc pro altero Aconito hoc ex Theophrasto & alijs inuenta, & obseruata hætenus a nobis fuerunt.

¶ De Cicuta.

C A P. LXXXII.

κότυβη

C Onion aliquibus Aegynos, alijs Ethusa, alijs Apolegusa, alijs Dolia, alijs Amaurosis, alijs Paralysis, nonnullis Aphron, Quibusdam Creidion, alijs Coeten, alijs Catechomenion, alijs Abioton, alijs Abscudes, alijs Ageomoron, alijs Timoron, alijs Polyanodinos, alijs Dardanis, alijs Catapsyxis, Ostani Babathy, Aegyptijs Apemphi, Romanis Cicuta appellatur. Caulem adit geniculatum, ut Foeniculi grandē, in cacumine ramosum, folia Ferulæ, angustiora, graui odoratu. Vmbellæ in summo prodeunt, flores quoq; albicantes, & semen Aniso candidius. Radice non alta, concaua. Cicutæ lætale uenenū inest, suaq; uire frigatoria necat. Remedio est uini meraculi potus. Succus exprimitur contulis cacuminibus, priusq; semina & comæ siccescant, qui sole densa

tur in pastillos. Præcipuus ad medendi rationem usus est aridi. Misce
tur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia temperantur. Ignēs sacros, &
ulcera quæ serpunt, illitu restinguit. Hærbā cum coma trita, & testibus
circumlita, libidinum imaginationes in somno compescit. Sed genita-
le resoluit. Lac puerperarum mammarum apposita, extinguit. In uirginita-
te mammas cōercet, & increfcere non patitur. Pueris præstat, ut eo-
rum testiculū cibum non sentientes, intabescant. Efficacissima uis Cræ-
ticæ, Megarensi, mox Atticæ, & in Chio & Cilicia nascenti.

B A R B A R I C O R O L L.

Cicutā Græce Coniōn, inuisa & hæc, publica Atheniensium pœna. Semen habet noxium.
Caulis eius uiridis; & urit plerumq; ut in Platanis. Leuis hic est, & geniculatus, ut Harundo,
nigricans, altior sæpe, binis cubitis. Hinc & spacium, quod est inter cannarū, ut Seruius exi-
stimat, genicula, Cicutā uocari à Marone. Folia Coriandri tenuiora. Semen Aniso crassius. Ra-
dice nullius usus, ut Plinio uidetur. Semini & folijs refrigeratoria uis. Quæ si enecat, incipiunt
extrema corporis algere. In uino potā, irremediabilis existimatur. Succus exprimitur folijs, flo-
ribusq; Tunc em̄ maxime tempestiuus est, & melior. Semine trito expressus, & sole densatus,
nocentior q̄ semen ipsum, ut in Thapsia: cum in reliquis contra sit, necat enim sanguinem ex-
pissando. Hæc altera uis est, & ideo sic necatorum maculæ in corporibus apparent. Ad dissol-
uenda medicamenta utuntur illo pro aqua. Fuerit autem Cicutā herba, cuius gustatu exerci-
tus M. Antonij cum fame laboraret, pene sit extinctus in Parthia, non traditur: alioquin reme-
dium, ut Plutarchus ait, in uino tantum erat. Plinius quoq; Maxima inquit Cicutæ uis terræ
Parthorum. Mox Laconicæ, Creticæ, Asiaticæ. In Græcia uero Megaricæ, deinde Atticæ. Thra-
syas, & discipulus eius Alexias, & hanc, & cætera uenena temperabant, ita, ut sine aliqua offen-
sione, aut tæbe tollerent, in quantum uis tempus dilata morte. In Cicutā præcipiebant, ut e Su-
sis, aut prægelidis opacisq; locis ad hunc usum reponeretur. Chij, ut Theophrastus scribit, non
tereabant eam, ut ceteri cum tegmine, sed hoc detractō, tulam & tenui cribro emissam, ex aqua
propinabant. In Ceo insula mos fuit, ut sexagenarij senes, conuocatis necessarijs, solenni sacri-
ficio Cicutam epulati, & coronati biberent. Strabo autor, ut fere in Theophrasto non Chios,
sed Cios legendum putem. Cui consuetudini se Valerius quoq; maximus secundo libro, in-
terfuisse tradit, in eius insulæ oppido Iulide. Cicutam sunt qui etiam Ephemerōn, a celeritate
interitus uocant, ut Phorion autor est. Recentiores Cicutæ duo faciunt summa genera. Aqua-
ticæ, frigentis naturæ. Terrestris, calidæ. Terrestris duo item genera. Maius, et Minus. Sed quo-
niam autorem nullum proferunt idoneum, uereor ne (ut fere solent) hallucinati fuerint. Alio-
quin Cicutæ similem diximus esse Myrrhin herbam, ob id Cicutariam a nostris appellatam, ca-
lentis ingenij. Nam uerba illa Plinij, Caulis inquit Cicutæ uiridis, & urit plerumq;, ut in Plata-
nis, quia sensum nullum commodiorem habent, correximus ex Theophrasto ad hunc modum.
Caulis Cicutæ uiridis, e Suis plerumq; Athenas perlatus. Quancq; Cicutæ uis est & illa (si Cel-
so credimus libro quinto) exedendi corpora: ut sorte seminibus & folijs frigida sit potestas, cau-
li feruida. Illud uero minus tolerabile, q̄ Mauritanij, uel eorum interpretes, illud Rutæ genus
syluestris, quod Dioscorides & Plinius Armala uocari scribunt, ipsi pro Cicutā capiunt. Sunt
qui (quod Galenus ait tertio libro *κραιβων*) Cicutam Sturno cibum, homini uenenum esse, cō-
uerterint, Hyoscyamum esse Turdo cibum, homini uenenum: quo nihil esse potest fœdius, im-
peritius, absurdius.

E X. M. V E R G. C O M M.

Auxerunt Cicutæ famam Athenienses, succo eius ad mortem in publicis & capitalibus iu-
dicij utentes. Alioquin indigna erat herba, quæ in omnium poetarum carminibus & sapienti-
um cōmentarijs inueniretur. Vulgaris, ubiq; fere nascens, & homini præcipue noxia. Sed hæc
est omnium fortuna rerum, ut aliquando ex usu gentium honorem, & quam possunt gratiam
inuenierint. Factum id tunc in Cicutā est, quæ neglecta modo & incognita multis iacet. Muta-
tæq; leges, & pœnarum in sceleribus rationes, pecori herbam relinqui cōegerunt, quæ quondā
malo hominis fato nascebatur. Et ut testatus Theophrastus est, in quotidianos usus ex Suis
frigidissimiq; alijs locis maiore diligentia reperebatur. Non erimus ob eam causam nos in e-
ius historia longiores. Quod enim satis sit, ab herbarijs omnibus cognoscitur, Fœniculi caule,

C follo Ferulae, alijsq; a Dioscoride descriptis notis.

De Taxo. CAP. LXXXIII.

Smilax a Graecis, Taxus a Latinis appellatur. Arbor Abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura. In Italia & Narbonensi Gallia Hispaniae cotermina nascens. Auiculae quae Italicae Taxi baccas deuorant, denigrantur, & qui ederint easdem homines, alii profluuiis corripuntur. Narbone tam praesentis est ueneni, ut si qui dormiant sub ea, aut in eius umbra subsideant, laedantur, & saepe numero moriantur. Quare de Taxo haec traduntur, ut ab ea caueamus.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 16. ca. 11.

Smilax, siue Taxus, est ubi a Theophrasto & Dioscoride Milos appellata sit, folio aeterno, extremitatibus & lateribus sinuato, ut Quercus & Paliuri, & omnino llicis, molliore tantum profundioreq;. Differt & materia ab llice, q; soluta & tenera in operibus est Taxo, praesertim in Arcadia: ubi & nigra est ac punicea. Flauet in Ida, tam similis Cedro, ut imponat mercantibus, praesertim medulla. Germen ei maxime serotinum. Floret paulo ante solstitium. Fructificata uergiliarum obitu. Facillime augetur, procera, similis Abieti, minus excelsa, sed alijs eribrioribus. Folium quoq;, ut scribit Plinius, Abietis, sed pinguius, ac minus uirens. Strigosa, tristis & dira: nullo succo, baccifera. Radices ei graciles, per summa cespitum breues. Circa Idam rara. In Macedonia et Arcadia frequentior. Rotundo fructu, et paulo ampliore q; Faba, colore ruffo, tactu molli, ueterinis locifera, non item ruminantibus. Sunt qui eum quoq; mandant suauis cibo, & innocentem praedicent. Umbrosissimis locis prouenit. Fumus ex eo mures perimit. Mari fructus, ut Plinio uidetur, noxijs, locale quippe. Baccis, in Hispania praecipue, uenenum inest. Vasa etiam uiatoria ex ea uinis in Gallia facta, compertum est mortifera fuisse. Sunt qui Taxica hinc appellata putent, quae nunc Toxica uocantur, quibus sagittae tingunt in Arcadia, ueneni uel praesentissimi. Repertum innoxiam fieri, si in ipsam arborem clauus arcus adigatur. Conglutinamenta, siue subscudes, ex ea serinijs & subfellijs parantur. Nunc et arcus, & scorpiones. Nec Taxus uulgo, sed literae prioris immutatione, Naxus, & Naxius quoq; dicitur: quod nomen & Dioscoridi fuisse cognitum uideo, ubi uenena libro sexto numerat, eodem loco, non Taxum, sed Toxum a Romanis dici credidit. Nec Thymalon, ut hic, sed Thymilon scribendum: quod & Actius quoq; sequitur. Paulus Thymion. Galenus Taxum etiam dicit. Caeton inquit, Paulus Caeton spinae genus esse, quam Dioscorides libro sexto uocauit Axon, cuius pappi recentes, in cibo sumpti strangulant, in quibusdam exemplaribus Ixia nominati. Verisimile est hanc esse Caeton, de qua Theophrastus & Plinius loquuntur. Caetos inquit, Siciliae tantum nascitur suae proprietatis, cuius in terra serpunt caules e radice, lato folio, & spinoso, quos uocant Caetos, nec cibo desquamatos fastidiunt, gustu amariuscule. Sed & seruari sale uescendo sunt. Vnum caulem rectum habent: qui Pternix dicitur, eiusdem suauitatis, sed uetustatis impatientem. Semen ei lanuginis, quam Pappion uocat: quo detracto & cortice, teneritas cerebro Palmae similis relinquitur. Vocant Scalam, siue ut Plinius Ascalia. Alii Plinius, Sunt inquit & ceduae Palmarum quoq; syluae, quae minantes, rursus ab radice succifae, dulcis medulla earum in cacumine, quod Acrum appellant, exemptaq; uiuunt, quod non aliae. Vocantur autem Chamæripes etiam a Theophrasto, folio latiore ac molli, ad utilia utilissimo, copiosae in Creta, sed magis in Sicilia. Nunc uulgo Siculum Romanumq; Ciphilio nem, mercatu eius frequenti nominat. Aliqui Palmidium ab quadam Palma spadicum similitudine, ut ex quibus scopae fiant, Margyllion Hispaniae modo appellant credo, quia bacculas rubentes, margaritis similes ferant, Dumulos uocatas, quibus filo inmissis, feminae supplicationes precesq; suas numerant. Plinius quodam loco, Margarides inquit Palmae breues, candidae, rotundae, acinis q; balanis similliores: quare & nomina inquit a margaritis acceperunt. Diuersum tamen genus hoc ab Hispano illo fecerim, q; in meridiano tantum orbe Margarides nascunt, et quidem una tantum eius arbore in Chora, ut idem Plinius affirmat. Iam hoc quod dixi Palmidium uocari, non Siciliae modo peculiare, sed Aegypto, & Hispaniae. In Italia quoq; nasci perhibent, non procul Terracina. Mirum quod traditur in Aegypto, ipsis etiam Palmarum quae runda innascenti truncis, sed minoris operis ad mandendum. In orbe reliquo duorum generum, sed eodem cespite proueniunt, mas & femina, Sexum distinguunt semine, quod Pappion, ut dicit

mus appellant. Fallit hoc imprudentes, opertum cortice multiplici, tunicis ferrugineis interuefientibus. Cortex Folij modo in latum ex angusto panditur, & armatur aculeis. Ideoq; latū & spinosum a Theoph. dictum est. Ex huius crassitudine in Aegypto charta mō tingitur uilis, ad contegendas inuoluendaq; segestriū usumerces. Ex tunicis quas intercursare diximus, in eadē provincia, funes, rudenteq; neſuntur. Caulis ipse cēduus quotannis, alioquin adolescit crassitudine in tantum, ut arboris iustæ truncum æquet ambitū.

EX. M. VERG. COMM.

Cecinīt quondam Maro primus idem, maximusq; Bucolici carminis latinus autor, Iuniperi toleresse grauis cantāibus umbra: monuitq; pastore, s' sub spinosam, densioriq; umbræ arborem uocandas homini non esse musas. Mox pro Apibus præcepit, Et tua Cyrneas fugiant examina Taxos: nullibi equa malefici dispensatione. Si quidem Taxos fugisse potius q̃ Iuniperos homines oportebat: si ut hic, & alij tradiderūt, lætalis homini earum umbra est. Plinius, 26. uolumine, cap. 11. de ea ait. Et esse in Arcadia tam præsentis uenenī, ut si qui dormiant sub ea, cibū ue capiant, moriantur. Et præter Plinium Plutarchus sui Symposij tertio cōmentario, quo capite querit, Si in conuiuio florum coronis utendum sit, ἰσοροῦσι γὰρ ὅτι καὶ σικὰ σμύλακος ἀποκτείνει τοὺς ἑγκαταδραβήτας ὅταν ὄργα μάλιστα πρὸς τὴν ἀνθρώπων. Quod est. Ferunt enim & Smylacis umbram, in ea dormientes perimere, quo tempore præsertim ad nouos flores tūget. Contraxitq; umbræ eius noxam ad id tempus maxime Plutarchus, quod ab re nō est, ob eam quam ille tradidit causam, dicens ueluti telis, sagittisq; aliquibus uulnerari cerebrum halitu florum per nares attracto: qui cum in hac arbore semper lætalis sit, in noua florum productione, ob acriorē maioremq; eius copiam magis nocet. Descripsit Plinius quo diximus loco arborem longius: Barbarus etiam in Corollario suo, ex græcis latinisq; scriptoribus omnem eius historiam collegit: & præter eos uulgaris, notaq; cunctis nunc etiam arbor est. Quæ una tantum mutata litera p Taxo, Naxus nobis uocata. Durissimæ materiæ arbōr, & ob id in fabrica expetita, ad ea quæ diuturniora futura sunt. Balistæ, arcusq; nunc etiam ex ea fiunt. Sed quondam in frequentiore eius teli usu, & ipsa in maiore usu fuit. Fluores alui baccas eius uescientibus fieri, hic scriptor ait: ex eademq; causa Maronē nos credimus monuisse, fugiendā Apibus esse arborem: ne cita aluo, cui malo obnoxia sunt, perirent. Quia enim ui homini nocet, eadē illis nocere credendū est.

De Apocynō.

CAP. LXXXIII.

APocynōn aliqui Cynanchon appellant, alij Pardalianches, alij Cynomoron, alij Cynocramben, alij Cynoctionon, alij Phaleō, alij Cynanchen, alij Oligorō, alij Hippomanes, alij Onistū, alij Ophioscorodon, alij Cynaricam, alij Elaphoscorodon, Magi Paralyfin, Romani Brassicam rusticam, aut caninam. Frutex est paruis uiticulis confans, male olentibus, fractu fere inuictis, folio Hederae, molliore tamē, & per extremum acutiore, uiscoso, graui odore. Id luteo succo tūget. Siliquæ ceu Fabarum, digiti longitudine protenduntur, semine intus albo, duro, paruo. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, uulpes, & pantheras enecant in cibo data, & p̃tinus eorū coxas resoluūt.

B A R B A R I COROLL.

APocynōn, semine acuto, diuiso, lanuginoso, graui odore, uirgis minus longis q̃ Hedera: Quadrupedes necat, si uescantur, omnes. Est & uenenum hominibus. Dicitur & Cynocrambe a Galeno, ab aliquibus Hippomanes. Quanc̃ & uirus defluens ab equarū inguinibus quo tempore amoris infania feruntur, Hippomanes appellant. Apud Hesiodum certe Hippomanes herba est, quam edentes equi, aguntur in furorem. Dicitur & Capparis Hippomanes. Est & saltationis genus apud Comicos Apocinon, sed scriptura distinguitur.

EX. M. VERG. COMM.

Inutilis medicinæ huic scriptori Canina Brassica est. Posteriores tamen greci calidam, sine sic candi ui eam descriperunt. Eamq; ob causam emplastri modo impositam, discutiendi uim habere. Plinius præterea li. 24. capite. 11. Suspiriosos, pleureticos, & omnes lateris dolores ex aqua semen eius sanare testatus est. Quo loco isdem notis, & paulominus q̃ isdē huc scriptori uerbis eam effigiauit. Canes, & omnes quadrupedes necare in cibo datam Diosc. pariter testatus:

S ij

A

B

ἀπόκυνον

Pli. li. 24. ca. 11

D I O S C O R I D I S

C Quæ nominis frutici huic præcipua causa est. Pluresq; ex appellationibus eius non aliunde q̃ ex eo usu causam habent. Dico autem, ex eo usu: quoniam sæpe fita uenatoribus, & alijs quibus syluas, aut alienas domos ingredientibus adlatrari in eodem sit, ut cum odisse canes in coeperint, ueneno aliquo cibo eos intercipient: quale Apocynon hoc est: quod Paulus Aegineta in. 2. ait ideo Cynocramben, id est, caninam Braslicam, et Cynomoron, id est, canum mortem uocari, q̃ eos celerrime enecet; eadem q̃ ui maleficium & letalis homini sit. Quod pariter indicat Apocyni uox: nihil aliud grecis significans, q̃ qd abesse canes facit. Quæadmodum Cynagos, qd canes angit & stragulat: & Cynoctono, qd canes enecat. Quæ oēs eiusdē rei indices uoces, eadē hñt causa. In ceteris nō tā facilis nob, intellectus ē, ob eāq; cām pitioribus relinquunt.

De Nerio, seu Rhododendro. CAP. LXXXV.
NERIO N aliqui Rhododaphnē, alij Rhododendro, alij Spongiō, alij Hæmostarin, Romani Rhododendro, Lucani Iemanen, Aegyptij Scympham, Pœni Rhododaphnem appellaue-
 re. Frutex est uulgaris noticiæ, longioribus q̃ Amygdala folijs, asperioribusq; flore in Rosam conformato, fructu Nuci græcæ simili, corniculato, qui patefactus quandā floccorum speciem ostendit, Hyacinthi pappos representantē. Radice longa, acuta, lignosa, gustati salia. Nascitur in amœnis, maritimis, amnibusq;. Flores & folia mulis, asinis & quadrupedum plurimis uenena sunt, hominum uero contra serpentium morsus præsidia. E uino pota, eo magis Ruta addita, imbecillæ etiam animantes, ut pecus & capræ, si aquam bibant in qua folia ea maderuerint, moriuntur.

BARBARI COROLL.
NERION Sabina quoq; herba dicitur. Sempiternum fronde, caulibus fruticosum. Mel infanum e Ponto contrahitur, Rhododendri flore, quo scatent syluæ. Hoc nomen quidem apud nos inuenit latinum, ut Plinius irradit. Galenus hanc intelligit, quoniam Rododaphnen nominat, aut Nerion, duobus eam locis prodens. Photion Rhodoniam quoq; dici meminit. Quodam tamen Rhodoniam interpretatos inquit fuisse uitem, flauas uuas ferentem. Dioscorides Rhododaphnen a quibusdam uocari Spongon scribit. Aetius Spongitem herbam dicendo, proidentia sedis uitem, quid intelligat haud scio.

EX M. VERG. COMM.
Fecerunt grecis Rhododaphnē Rosæ flos, & Lauri folium, quæ fruticis huius præcipue notæ sunt. Fecit idem Rosæ flos & arbor eidem genti Rhododendro. Sic enim fruticem hunc etiam uocant. Pliniusq; hac sæpius q̃ illa pluribus locis uoce usus est. Nec refert q̃ hic Amygdalæ folijs folia eius comparauerit. Lauro em & Amygdalæ non dissimilis magnopere foliorum figura est: longa eiusdem fere latitudinis & in cuspidem acuminata. In ceteris eius appellationibus parum certa nobis ratio est: ideoq; indescriptæ relinquuntur.

De Fungis. CAP. LXXXVI.
FVNGORUM differentia duplex. Aut enim manduntur, aut perniciosæ sunt. Multis de causis ueneni gignuntur. Si enim clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcior adfuerit: aut si iuxta serpentis cauernam, arbore sue, quæ pariunt noxios fructus, erumpat. Continent nescio quod strigmentum, concretamque pituitam, terraque eruti q̃ celerrime computrescunt, atque marcore uitiantur. Sed qui ueneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent. Larcius tamen sumpti, nocent, & ægrius concocti strangulant, aut choleram morbum citant. Remedio est nitri potus, aut lixiuium cum acida.

muria, aut feruefactæ Satureiæ, aut Origani iusculum. Debellantur eti- **A**
am gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle mul-
to. Corpus alunt, sed ægre dissoluuntur, cum magna ex parte integri
psi, cum recrementis alui reſciantur.

BARBARI COROLL.

Fungi cortice, medulla, neruo, uena carent, pediculo admodum æquali: quan- **B**
quæ qui ex his Pezicæ a græcis uocantur, nec pediculum, nec radicem habent. Fungos græci Mycetas uocant:
nec distinguunt. Quanquæ Paulus etiam Boletos cognouit, Bolitas appellando: quibus & prin-
cipatum inter Fungos dedit, sicut secundum locum his qui Amanitæ nominantur. Sunt & Egi-
ritæ, sed industriæ fermento in ipsis Populi nigrae truncis diluto aqua, protinus coalescentes.
Quorundam facile noscuntur uenenæ, diluto rubore, rancido aspectu, liuido intus colore, ri-
mosa striâ, pallide per ambitum labros. Non sunt hæc in quibusdam, siccis & Nistri similes, ue-
luti guttas in uertice albas ex tunica sua gerunt. Voluam em terra ob hoc prius gignit. Ipsum po-
stea in uolua, ceu in ouo est luteum, nec tunicæ minor gratia in cibo infantis Boleti. Rumpi-
tur hæc primo nascente, mox erescere in pediculo corpus absumit, raroque unquam gemini ex uno
pede. Origo prima elimo, & acrescente succo madentis terræ, aut radicis ferme glandiferæ. Ini-
tio spuma lentior: dein corpus membranæ simile: mox partus, ut diximus. Deprehendisse per-
nicias, nisi agrestes possunt, atque qui colligunt. Caligaris clauus, & rubigo ferri, aut calybs ue-
nenatos faciunt. Boletis ortus occasusque includitur septem diebus. Fungorum lentior natura,
& numerosa græia, nec nisi ex arborum fere pituita. Tutissimi qui rubent, callo minus diluto quam
Boletis rubore. Mox candidi, uelut apice flaminis, insignibus pediculis. Tertiū genus suillis ac
comodatū uenenis. Quidam discere arborum generibus, Fico, Ferula, & gumiferis. Non ite Fa-
go aut Robore, aut Cupressu. Omniū colos liuidus. Sed his aberit argumētū uenenū, quod simili-
res arbori Fico fuerint. Noxi erunt Fungi, qui in coquendo duriores fiunt. Innocentiores, qui ni-
tro addito coquantur, si utique percoquantur. Imbribus proueniunt omnia hæc. Siccant penden-
tes suilli lunco transfixi, quales a Bithynia ueniunt, Succineis nouaculis, & argenteo apparatu
Fungos ipsæ suis manibus delicias coquebant. Græci hos Deorum cibo nasci dicunt, ut Tran-
glus in Nerone meminit. Porphyrius, non cibum, sed filios Deorum Fungos & tubera uocabant,
quia puenire uiderent sine semine. Nata forte diuersitas, quod uerbum *θεοτρόφος*, & est qui alit, & est qui
alitur significat, accentu modo comente. Porro Deorum & cibus & alumni ideo uideri possunt,
quoniam & eos quorum pater ignotus est, filios terræ dicimus: quod quidem & Cicero in quadam ad
Atticum epistola confirmat de Lica. Recentiores alia quoque nomina, uel genera dedere. Oua-
tos, ab oui similitudine. Spongiolos, a spōgia. Digitellos, a digitis. Porriginosos, a porrigine.
Pezicas, quasi sessiles & pediculis carētes. Laciniæ priuatim dicuntur e castanea, magnitudine
spectabiles, ut singuli sufficiant. Innocentissimi sunt e rubis & carduis uere nati, rotunditate duli-
si, quos inde Prunulos, & Spinulos appellant, & Cardeolos. Oritur & e saxo. i. lapide Lyncurio, si
ue Lynego, uulgaris uoce dicto Fungus, admirabili natura. Præciditur hic in esum, & alius sub-
nascitur anno toto. Pediculi pars relicta duratur in silicem, atque ita semper crescit lapis, restibili forem
ditate: nec credidimus, antequam domi natos ita menducaremus. Nouum et hoc uita sibi comperit
in uicem multa perdit: quanquæ est ubi Plinius hoc innuat, ut in castigatione Pliniana. 20. secundi
libri diximus. Sunt & igniarij quidam Fungi, & quibus strigilsum uice tostrina utitur.

EX M. VERG. COMM.

De tota Fungorum natura, quos tantopere ad cibos & ganeam mortalitas expetit, breui-
sime & uno carmine decreuit Flaccus, cum in Sermonibus suis cecinit. Præteribus optima Fun-
gis natura est: alijs male creditur. O sapientem poetam, qui dum ganeam, multosque eius sapo-
res didicisse uideri uult, humanæ uitæ tam utiliter consuluerit. Græcorum medici etiam, exce-
ptis Boletis, & quos Paulus Aegineta suorum, ut nos credimus, temperorum nomine Ama-
nitas uocat, omnes una sententia damnauerunt, frigidos, pituitosos, & crassioris humoris in
cibo constituentes. Plinius tamen. 22. uolumine eiusdem numeri capite, proximoque illi longio-
re historia, bonitatis eorum, uitæque, & totam naturam profecus est. Quæ poterunt uolentes cer-
tius in eo cognoscere. Fuerunt medicorum & sapientiorum de Fungorum natura & ui decreta
quæ paulo ante dicta sunt. Poetæ tamen Boletos præcipue laudarunt. Et inter antiquos medi-
cos Paulus Aegineta primo uolumine de Fungis, Boletisque sic dicens. *οι δὲ μακρὸς συχρότεροι*
καὶ φλεγματώδεις καὶ κακοὶ χυμοὶ τούτων δὲ πάντων οἱ μὲν βωλῖται ἀβλαβέστεροι καὶ ἀπονομάζονται ἰατρικῆς

D I O S C O R I D I S

Cοι δὲ ἀμύνεται διυτίσας ἴσι τὰς ὥρας. τῶν δὲ ἄλλων μυκήτων ἀπὶ χιτῶναι δὲ, πολλοὶ γὰρ ἔξ αὐτῶν θανάσιμοι. καὶ αὐτοὶ δὲ ἐν βολύται ἀνιθόττοι ἰσθιόμενοι κινδύνον παραίτιοι πολλὰς γίνονται. Quorum sensus est. Fungi uero frigidi, pituitosi, & mali succi sunt. Omnium minus nocentes Boleti sunt. Ad summum elixi. Qui uero Amanitę dicunt, secundum post Boletos ordinem habent. A ceteris abstineendum est. Plures enim eorum mortiferi sunt. Quinetiam Boleti ipsi si minus elixi comedantur, periculi, mortisque causa habent. Et hec per Fungorum maleficio, tutoque usu satis sunt. In quibus uidentur, sint ne Pauli Aeginetę Amanitę, Flacci pratenses. Boletos enim credimus nos a pō τοῦ βόλου, i. a bolo dictos fuisse.

De Colchico. CAP. LXXXVII.

κόλχικόν

Colchico aliqui Ephemerum, Romani agrestem Bulbum uocant. Autumni exitu florem addit Croci, candicantem, ab eo tempore folia Bulbi, sed pinguiora, caulē palmo altū, ferentē ruffum semē, radicem foris e nigra ruffescentē, quę delibrata, cādida et mollis spectat. Lacteo succo madet, atque gustatu dulcis inueniunt. Bulbus mediā habet rimā, fissurāque, qua flos erupit. Plurimum in Messenia, et Colchis nascitur. Ea comesta, Fungorum more, strangulando enecat. Hęc autē depinximus, ne a quocunque imprudenter pro Bulbo deuoret. Miram enim incautis uoluptatē affert. Remedia sunt eadem quę Fungis. Bubulum etiam lac potum auxiliatur. Itaque cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 29. ca. 10
& li. 25. ca. 11

Colchicon, & Ephemerum, de quo mox prodetur, Hermodactyli genera a neotericis uocantur. Galenus & Paulus Ephemerum duplex faciunt, Dioscoridem sequuti. Vnum delibutorij ueneni uis, de quo hic. Alterum quod Irim syluestrem cognominant, de quo proxime dicemus. Colchicon sane haberi modo passim prædicant, Ephemerum nesciri. Hermodactyli porro, ex quibus pilule ad podagras tantopere commendantur, ab Aetio & Paulo, Quinquæfolium sit, an Ephemerum, parū mihi constat. Alioquin recentiores per Ephemerum accipiunt. Dioscorides Quinquæfolium Hermodactylum quicquid dicit, & morbis articularibus, et coxę dicit conuenire, prædit, Ephemerum minoribus.

EX M. VERG. COMM.

Misceri in antiquis scriptoribus inuicem Colchicon, et Ephemerum aliqui crediderunt, Nicandrum in Alexipharmacis suis dicentem audientes. ἢν δὲ τὸ μὲν δὲ καλὸν κόλχικόν ἐχθρὸν πῦρ. καὶ τοὺς ποτὸν δίδεται ἐφήμερον. Quod est, Si uero Colchidis Medea infestum ignem poculum illud hauserit Ephemerum. Mox Plinium inter uenena Colchicum, & inter medicas herbas Ephemerum numerantem. Quinetiam hunc ipsum hoc loco priuatim de utroque agentem, & inuicem utrunque Colchicon et Ephemerum uocantem. Post hos Paulum Aeginetam, Ephemerum in quo inter uenena constituentem: mox iterum in. 6. Ephemerum his uerbis describentem. ἐφήμερον δὲ δηλητήριον ἄλλ' ὅτι ἐπὶ ἁγρία καλεῖται. Quod est. Ephemerum non quod noxium & letale, sed quod agrestem Irim uocant. Et ne longiores simus, in cunctis graecis modo uenenū, modo utilem dentibus & tumoribus herbam Ephemerum inuenientes, praesenti & periculosa semper dubitatione. Nisi cognouerit aliquis duo quoddam Ephemerum genera fuisse: alterum quod Colchicon a natali solo diceret, flore albicante, crocinio simili: radice bulbi, sed pinguiore: caule dodrantali, notisque alijs quæ a scriptore hoc in historia eius numerantur. Quod Colchicon Plinius simpliciter nominauit lib. 29. cap. 10. & Paulus Aegineta in quinto Ephemerum: cuius uerba sunt. τοῖς δὲ ἐφήμερον λαβοῦσι ὁ ἴδιος καλεῖται κόλχικόν διὰ τὸ ἐν κόλχιδι φέρεσθαι. Quorum sensus est. His autem qui Ephemerum hauserint, quid quidam quia in Colchide nascitur Colchico uocant. Quodque hic idem scriptor in sexto inter uenena, non Colchico, sed Ephemerum uocabat, quo loco cum hic plantam descripsisset, maleficio eius & ueneni notas remediaque: certius illic docet. Alterum quod simpliciter Ephemerum dicitur innocens, & ut paulo ante nos diximus, dentibus & tumoribus utile. Cuius meminit Plinius lib. 25. cap. 11. his uerbis. Ephemerum folia habet Lilij, sed minora, caulem parem, &c. Quod hic ipse scriptor mox describet. Et ut rem totam absoluamus: quod Paulus Aegineta in. 6. descripsit, habereque ait percipiendi discutiendiue uires, esseque Ephemerum duo: & qualia nos diximus uenenū alterū, innocens alterū, satis idem Paulus Aegineta indicat: qui de innocente hoc agere incipiens ait, ἐφήμερον δὲ τὸ δηλητήριον. Quod est. Ephemerum, non quod noxiū & letale, &c. Manifesto ex ea propositione, diuisioneque argumento, duplex eius genus

esse, alterum qđ ueneni, & alterū quod remedij rationem habet. Factum ideo est, dum in anti-
quis græcis uaga appellatione utrūq; Ephemeron dicitur, ne sine causa crediderint aliqui, mi-
seri inuicem Colchici, & Ephemerī appellationes. Verumtamen quantum similitudo aliqua
nominis cōmunionem in illis fecit, tantū natura uiribus ea discreuit: eamq; ob causam in ue-
terum scriptorum lectione obseruanda diligentius ea uox erit, ut noxium ab utili, & uenenum
a medica materia secerui possit. In quo non parū proderit, de quo agatur, & quomodo obser-
uasse. Fuerunt qui maleficum illud Ephemerū dictum putauerint, q̄ hausto eo, una tantū die
superfites sint, qui id hauserunt: & a similitudine eius, deinde alterum illud. Nos tamen pro-
fiteri non audemus, utrius similitudo alteri nomen fecerit.

De Ephemero.

CAP. LXXXVIII.

Ephemeron aliqui syluestrem Irin appellant. Folia habet Liliij, sed tenuiora, caulem parem, florem candidum, amarum, semen mol-
le, radicem unam, digitali crassitudine, longā, adstringentem, odoratam.
Nascitur in syluis & opacis. Huius radix dentibus præcipua, si decoctio
colluantur. Folia in uino cocta, discutiunt tumores, & tubercula, quæ
nihil adhuc humidi contraxerunt.

BARBARICOROLL.

Ephemeron folijs Liliij, minoribus, semine superuacuo: dictum ita, quod intra diem iuga-
let, ut Theophrastus putat. Sed illud alterū genus est, & Colchicon proprie crediderim, folio
Ellebori. Radicula omnibus nota. Seruorū in desperatione confugiū. Hoc ipsum Colchicon,
& Plinius Ephemerī appellatione intelligit, quotiens medicinas contra Ephemerū impactum
cōmemorat, Ephemero radix longa, non ut Colchico rotunda. Quidam Ephemerī uocabu-
lo delibutorij ueneni compositionem quandam capiunt, ut Aetius testatur.

EX M. VERG. COMM.

Satis in Colchico superiore capite de Ephemero hoc dictum a nobis fuit. Querendum mo-
do superioribus relinquimus, sint ne quos medici & herbarij nunc Hermodactylos uocant, E-
phemeron hoc, an Colchicon, illud paulo ante descriptum. Nihil enim modo superest, q̄ mo-
nere legentes, dicere Barbarum, habere Ephemeron hoc florem ceruleum, quē nos candidum,
ex cōmuni, eademq; omnium quotquot uidimus codicum lectione. Plinium ut uidetur in floribus
eius colore, potius q̄ Dioscoridem, quē uertebat, secutus ille est. Sunt em̄ in historia Ephemerī
huius Plinij hæc uerba. Ephemeron folia habet Liliij, sed minora: caulem parem, florem cerule-
um. At hic ἀνὰ λευκὸν αἶψ, quæ uoces nisi ad candidū colorem trahi non possunt. Signasse hoc
etiā placuit, ut quibus auctoribus qđ diuersum sit uterq; nostrū uerterit, legentes sciant.

De Alsine.

CAP. LXXXIX.

Alsinen aliqui Anthyllion, alij Myortochon, alij Myrtosplenon,
Romani Muris auriculam, Poeni Labatholabat, nonnulli Myos-
ota uocant, quoniam muscutorum aures folia imitantur. Lucis, opacisq;
gaudet, unde Alsine dicta est. Hæc erat eadem quæ Helxine, nisi folijs mi-
nor, minusq; hirsuta esset. Cum teritur, odorem Cucumis reddit. Vim
refrigerandi adstringendiq; obtinet. Oculorum inflammationibus cum
polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur. Quin & emēdat
omnia quæ Helxine, id est, Muralis hærbæ.

De palustri Lente.

CAP. XC.

Lens palustris, quam agriam aliqui, alij Epipteron, Romani Vi-
peralem uocant. Inuenitur in aqua non fluente, muscus Lentici-
læ similis, refrigeratoriæ naturæ. Propter quod conuenienter collectioni
bus, igni sacro, & podagris illinitur per se, & cum polenta. Glutinat &
prociuentia puerorum interanea.

D I O S C O R I D I S

C L B A R B A R I C O R O L L

Lens palustris, Phacos Epirelmaton a Græcis uocat, sine radice, sine folijs, etiam si id qd in ea fructificat, simile folio conspicitur, minus habili humore, q̃ ut in eo solum conflare possit. Quidam genus aliud, non quidem in aqua nascens, sed in uliginosis dilutisq̃, maius eo tradunt, carens folio, Agriam Phaceam, hoc est, syluaticam Lentem uocantes.

E X M. V E R G. C O M M.

Quemadmodum in cognomine legumine secundo libro illud describens Dioscorides *καὶ ὁ ἐπὶ τῶν τιμμάτων*, id est, Lens quæ comeditur dixerat, ut ab hac, & ab Elclisphaco eam separaret: eadem ratione de palustri hac docens, *φακὸς ἐπὶ τῶν τιμμάτων*, quod est, Lens quæ in lacustribus inuenitur, dixit, Cognomines enim, sed natura diuersæ, separari discrimine aliquo debuerat. Id acceptum est in illa ab usu, in hac a natalibus. Secutiq̃ posteriores omnes hunc scriptorem, in discriminibus his sunt. Muscum, non herbam hic dicit inueniri, in aquis non fluitantibus. Vnaq̃ uoce illa satis naturam eius indicauit. Fluitat enim in summa aqua Lentis figura, a cuius similitudine nomen inuenit.

De Semperuiuo, seu Sedo magno. C A P. XCI.

αἰζῶν

Aizoon maius, aliqui Aithales, alij Ambrosion, alij Chrysispermon, alij Zoöphthalmon, alij Buböphthalmon, alij Stergethron, alij Aeonion, alij Aichryson, alij Olochryson, nonnulli Chrysanthemion, alij Protogonon, alij Boron, alij Notion. Magi Paronychiam, alij Chrystin, Romani Ceriam cuspiam, aut Iouis caulem nominant, alij Lepetes, alij Sedum maius, Aegyptij Pamphanes. Semperuiuum ideo nominatur, quoniam perpetuo folia uireant, cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, uirescentes, Characiæ Titimali modo insecti, folia carnosa, longitudine pollicari, in cacumine linguæ similia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem: ita ut ambitu effigiem imitentur oculi. Nascitur in montibus, & testaceis. Supra domicilia etiam feritur. Eius uis refrigerare, & adstringere. Medentur igni sacro, nomis, ulceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti, in doloribus cum polenta, aut rosaceo perfunditur. Datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, aluiq̃ profluuiâ. Teretes tineas potus in uino excutit. Subditus in uellere, mulierum abundantiam sistit. Succus oculorum lippitudinibus, sanguinis uicio conceptis inungitur.

Pli. li. 25. ca. 17.
lib. 28. cap. 17.
lib. 26. ca. 3. u.

C L B A R B A R I C O R O L L

Aizoon maius, aliqui Iouis caulem, siue oculum, alij Digitellum, alij Spegeton, siue Hypogefon, quod in subgrundis fere nascitur. Aliqui Amerimnon a sollicitudinis depulso. Sūt qui Trithalles a terno flore. Sunt qui Aethalles, ab æternitate. Sunt qui Erothales, & Eroginneton, a uerno tempore, aut quoniam amatorijs conueniat. Latini & Sedum maius. Alij Sadum. Opilius Aurelius Sefuium. Nonnulli Semperuiuum. Vulgus Auricularem. Huic crassitudo caulis plus q̃ pollicaris: folia carnosa, larga, succo, leuia, oblonga. Sedum herbam fuisse putant eam, quæ Glauco immortalitatem dederit, Marino Deo. Fuit & alter Glauco in fabulis, qui Dracone medico monstrante, contactu herbæ, cuius non redditur nomen, reuixerit sub Minœ.

E X M. V E R G. C O M M.

Viret ubiq̃ Sedum in tegulis, nec alibi nūc facile inuenitur, inuasitq̃ iam pridem aliquibus locis plebis animos indigna cœlo opinio, non percuti fulmine domum, in cuius tegulis uireat Sedum, frigoreq̃ suo plātam cœlestibus illis ignibus aduersari. Quod minus miretur aliquis, memor, ob eam causam Laurea semper contra easdem iniurias munisse caput Romanos Cæ-

fares. Sed ignaui, nihilq; timēdi ignes illi erunt, si tam exiguae plantae frigore mortalis fiet flammam illarum fulgor. Non tanta coelestibus infirmitas est: nec contra Iouis tela, quibus poëta ut Deum ad poenam finxerunt, tam facile praesidium mortalibus est. Inuenit natalem locum sibi Sedum, in quo procul ab alijs plantis caelo propinquior, & foli, cuius radios non timeret, copioso succo ipse abundans, eodemq; frigidissimo terrae humore ad uitam non indigeret. Non aliter q̃ qui in meliore fortuna sibi ipsis, ut Lucretius cecinit, ualere & uiuere possunt, nec aliorum ope ad uitam indigent, & ab aliorum iniurijs per se tuti, iocundo animi sensu, pereuntes ubiq; alios contemplantur: non quia iactari quēq; sit dulce uidere, sed quibus ipse malis careas, quia cernere suaue est. Quae Sedi fortuna semper fuit: uiuensq; ipsum in tegulis, aeterna uita pereuntes quotannis tota terra nunc aestu, nunc frigore, nunc alijs caeli & naturae iniurijs plantas alias spectat. Ob quam causam in tanto nominum ambitu ueteribus fuit: praesertimq; graecis, qui non contenti a uitae aeternitate Aizoon, & Aeonion uocasse, tot alijs similibus appellationibus id ornauerunt.

De minore Semperuiuo.

CAP. XCII.

A Izoon paruū, alijs Petrophyes appellant, alijs Brotion, alijs Theorotion, alijs Crobysson, alijs Chimerinen, alijs Cerauniam, Romani Vitalem, alijs Semperuiuum, Aegyptij Eriycetam. In petris, parietinis, & macerijs, necnon scrobibus opacis nascitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebro foliatis, exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mucronatis, caule a medio emicante, palmū alto, umbellam haeridosq; flores & tenues gerente. Folia eisdem cum priore uiribus praedita sunt. Semperuiuum quod tenui constat folio, aliqui Aizoon paruū, alijs Petrophyes, alijs Aizoon syluestre, Romani Semperuiuum minus appellant. Tertium uidetur Semperuiui genus, quam aliqui Andrachnen agriam, aut Telephon uocauerunt, Romani Illecebram, pusillis crassioribusq; folijs, hirsutis, Portulacae proximis. Vis ei excafactoria, acris, exulcerans. Illita cum axungia strumas discutit.

BARBARI COROLL.

A Izoon minus, Herideis, & Heristhales, & Chrysothales uocatur, a quibusdam Treles, siue Trichales, quia ter floreat. Hoc in muris, parietinisq; nascitur & tegulis. Fructicosum a radice, & sursum usq; ad cacumen: folijs angustis, succosis: radice inutili. Vermicularis uulgo dicitur. Sunt qui Iessitin, ut Plinius, aut Hyssitin, aut Isoteos, tribus enim modis scriptum inuenitur, forteq; Gessitin melius. Quando & maius quoq; Aizoon Hypogessum dici ostendimus, hoc est, Subgrundiarium.

Tertium genus Aizoi Andrachne agria, hoc est, syluestris Portulaca dicitur: de qua etiam superius iisdem uerbis a Dioscoride scriptum est.

De Veneris Vmbilico.

CAP. XCIII.

C Otyledon aliquibus Cymbalion, alijs Scytalion, alijs Cepos Aphrodites, alijs terrae Vmbilicus, alijs Stoechis, alijs Stergethron, Latinis Vmbilicus Veneris dicitur. Folio est in acetabuli formā tornato, ineuidēter concauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest, radice Oliuae modo rotūda. Succus cum uino circumlitus, instillatus ue, asperam carnis excrecentiā, constringentē os uuluae, reprimat. Inflammationibus, sacris ingnibus, strumis, pnionibus illitu auxiliat. Stomachi ardorē refrigerat. Folia cū radice comesta, calculos frangunt: urinā cient:

ΚΟΤΥΛΑΝΘΩ

D I O S C O R I D I S

C Hydropicis ex melle dantur. Hærbæ utuntur ad amatoria.

Pli. li. 25. ca. 17. **BARBARI COROLL.**

Cotyledon paruula herba, cauliculo tenero, folijs pinguibus. Nascitur in maritimis, petiolisq; uiridis. Non est hæc, ut quidam rentur ea, quæ uulgo Cimbalaris appellatur. Enam si Cymbalion a Dioscoride uocetur. Est autē Cimbalaris herba, foliotenus anguloso, hederaceo, flore paruo, purpureo, in muris terræ nascens. Quam quidem nonnulli genus alterū Capni dictæ faciunt, ut in Capno testati sumus.

EX M. VERG. COMM.

Rara, & nescio an in toto plantarū censu, similis inuenienda alia, orbicularis, & concaua foliorum in Vmbilico Veneris figura, nomē illi in græcis Cotyledonis, in latinis uero Vmbilici fecit. Licetq; Plinius græca uoce Cotyledona semper uocet, res ipsa tamen, & Apulcius in cōmentariolo illo de herbis, uerisimilem, temporibusq; illis congruā eam appellationē indicat. Persuademurq; facile nos, & his, & alijs indicijs, fuisse græcæ Cotyledonis Romanā appellationē Veneris Vmbilici: quales in plerisq; alijs ea gens habuit Capillum Veneris, Supercilium Veneris, & plerasq; alias. Libenter em ab ea Dea, quæ totius generationis symbolū in gentiū religione quondā habuit, & quæ leporibus & blanditijs uitæ præfecta esset, ad naturæ partes, quæ grata, aut utili aliqua specie nascerentur, nominū auspicia ueteres Romani sumptunt. Ex qua obseruatione, uidentes in græcorum Cotyledone circumacta in orbem folia, leni in concauitatē descensu, humani Vmbilici formā describere, Vmbilicū primò: mox ut rei maiestatem aliquā adderent, Veneris Vmbilicum uocarunt. In orbem enim circumagitur, & in concauitatem descendit hominis umbilicus. Eadem, sed non tam honesta ratio fuit in Vmbilico terræ. Adiecit hic etiam *κῆπον ἀφροδίτης*, id est, Veneris hortū dicti Cotyledona. Idq; Apulcius ille etiā testatus est. Significat autē *κῆπος* græcis in cōmuni significationis æstimatione hortum: eamq; ob causam nos Veneris hortū uertimus. Oborta tamē suspicio nobis est, posse *κῆπος* hoc loco non hortū indicare, sed tonsuræ, & ornatus capitis, capilliq; antiquā in Persiderationē, qua forte Venus a pictoribus fingeretur: & quoniā circumageretur in ea ante frontē in orbem capillus, ideo aliqui non ab Vmbilico, quæ pars in homine, præsertimq; scemina saluo pudore ostendi non potest, sed a capite honestiore & aperta cunctis parte appellare maluerint. Hoc em nos magis probamus, q̃ si ea uoce significari etiā moneamus mulierū *τὸ ῥιζοειδὲς*, i. p. ut bem, quod græcorum grāmatici docent. Fuisse autē græcis *κῆπος* tonsuræ genus, in eius gentis scriptoribus notissimū est. Suspicio tamē coniecturæq; non decretū hoc sit. Eadem causa fuit, cur Cymbalion a cymbalorū consimili forma etiā diceretur. Concaua em pariter & rotunda cymbala sunt. Contra autē Scytalion non satis certā habet rōnem: nec nobis rōcinari facile est, quomodo Scytale, quæ longior erat, ad rotunditatē per similitudinē transferri potuerit.

D **De altero Veneris Vmbilico. CAP. XCIII.**
Est & alterum genus eiusdem, Cymbalion aliqui uocant, pinguibus folijs, latioribus, ligularum modo densis, circa radicem ambitum oculi describentibus, ut in maiore Semperuiuo, adstringentis gustus, cauliculo tenui, in quo flores & semina Hyperici, radice maiuscula. Facit eadem quæ Semperuiuum.

BARBARI COROLL.
Cotyledon secunda, caule longiore, sed pergracili, gustus asperrimi. Huius usu Hippocrates in cibo scemininū sexum concepi, sicut priore masculinum prodidit.

EX M. VERG. COMM.
Non est quod in altera Acerabulo hac legentes moneamus. Satis enim per se patet historia eius, a Plinio iisdem uerbis tradita. In medicina autem & remedijs eadem illi omnia quæ maiori Sedo hic tribuit, & ex eo repetenda sunt.

De Vrtica. CAP. XCV.
Acalyphen aliqui Cniden, alijs Adicen, Latini Vrticam, Aegyptij Selepsion, Daci Dyn appellant. Acalyphen etiam alteram aliqui Cnipphen, Romani Vrticā mollem uocant. Duo eius genera.

Syluestris asperior, latioribus, nigrioribusq; folijs, semine Lini, sed minore. Altera non æque aspera, minuto semine. Folia utriusq; illita, canis moribus addito sale medentur. Gangrænas, carcinomata, sordida ulcera, & quæ cacoëthe uocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant. Lienosis cum cerato imponuntur. Faciunt ad profluuium narium cum succo trita, et naribus indita. Menses ciunt, eadem recentia detrita cum Myrrha, & imposita. Procidentes uulvas, contactu resiliere cogunt. Semen potu ex passio, Venerem stimulat. Vuluam aperit. Cum melle delinctum, orthopnoeæ, & lateris & pulmonum inflammationibus prodest. Thoracem expurgat. Erodentibus medicamentis amiscetur. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt, Vrinam mouent. Inflationes discutiant. Decocta cum prifana, uitia pectoris extrahunt. Mulierum menses euocant, cum myrrhæ modico pota. Inflammatione turgentem uuam, gargarisatus succus reprimat.

V **B A R B A R I C O R O L L.**
 Rtica, ex oibus aculeatis generibus notissima est. Acetabulis in flore purpuream lanuginem fundentibus. Sæpe altior binis cubitis. Mitior Fœmina est. Inter syluestres, quæ dicitur Cania acrior, caule quoq; mordaci, fimbriatis folijs: quæ uero etiã odorem mittit Herculeana uocatur. Semen omnibus copiosum, nigrum. Mirum, sine uillis spinarum, aculeis lanuginem ipsam noxiam, & tactu tantum leui, pruritus, pustulasq; adusto similes existere. Notum est remedium olei. Sed mordacitas non protinus cum ipsa herba gignitur, nec nisi folibus roborata. Incipiens quidem ipsa nasci uere, non ingrato, multis etiam religioso in cibo est, ad pellendos totius anni morbos. Syluestrium quoq; radix omnem carnem teneriorem facit simul cocta. Quæ uero ex ijs mitissima, & folijs non mordentibus, Lamium, siue Aconium uocatur, a quibusdam Vrtica iners, & mortua. Album hæc habet in medio folio, sacris ignibus utile. Quidam e nostris discreuere genera temporibus, autumnale appellando, & reliquis ad eandem rationem. Celebrat & marinam cognomine Plinius ad uesciæ uitia. Condit laudes Vrticæ Phantias physicus, utilissimam cibis coctam, in ueteratq; professus. Si quadrupes factum non admittat, Vrtica naturalia earum fricanda monstrant. In Oeta monte, steriliu, nec iniri se patientium caprarum ubera terentes ea, lac eliciunt. Ex Vrtica in Aegypto fit oleum. Semen colligi messibus oportet. Alexandrinum maxime laudatur ad omnia. Vrticam Hippocrates Nida uidetur appellasse, cum alij Cnida uocent. Est ubi Clidam legas corrupte, ut censeo: nisi aliud genus sit, Grana inquit Clidæ sexaginta, clyster uuluis iniiciantur, quas bilis infestauerit.

V **E X M. V E R G. C O M M.**
 Rtica nihil in censu olerum inuisius nascitur, igneo pruritu urens: & inde factum nomine. Vesciebantur nihilominus ea antiqui. Suntq; eius in cibo usus, testes antiqui in latinis poetarum: quibus iocundum erat Ocimo se & Vrtica recreare. Vbiq; & omnibus tam nota herba est, ut nihil monere in ea opus sit. Præterq; a Græcis Cnidem, ab eorum uerbo κνίδω dictam fuisse. Significat id cum dolore pungi, uexariq; Vocauit Acalyphas etiam Aristoteles in mari Vrticas tactu eadem in urendo ui. Medetur ea multis in humano corpore morbis, plurimisque scater remedijs. Eamq; ob causam non minus ad medicinam, q; ad cibos medicis & olitoribus curanda.

G **De Galiopsi. C A P. XCVI.**
 GALIOPSIS, aut ut alijs Galeobdolon, uel Gallephos, Aegyptijs Aetopi, Latinis Vrtica labeo dicitur. Frutex in totum caulem & folia habet Vrticæ, lauiora, & quæ grauem odorem trita reddant. Flore purpureo, tenui. Nascit circa sepes, edificia, ac semitas, ubiq; Folia, caules, semen, succusq; duricias & carcinomata dissipant. Strumas,

Pli. li. 21. ca. 151

B

72210-410

D E F O S C O R I D I S

Cpanos, & parotidas discutunt. Oportet bis in die tepidū ex aceto catapla-
smā imponere, & eius decoctio fouere. Ad putrescentia, gangranas, &
nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

Lege Plin. lib.
27. cap. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

E X M. V E R G. C O M M.

TOram Galioffis huius medicinam & historiam iisdem huic scriptori uerbis prosecutus
uolumine, capite. 9. Plinius est. Discrepant solum, q̄ Plinius Galeobdolon uocari ait,
quam hic Galeobdolon dicit: & nihilominus lactis, candorisue in ea nihil est, quod Pliniana
illa uox significare uidetur. Ignoramus & illud etiam, quod hic Vrticam Labeonem a Ro-
manis dici testatur.

De Galio.

C A P. XCVII.

γάλιον

Galion, siue ut alijs Galacion, aut Galerion, nomen ex eo tra-
xit, q̄ in contrahendo lacte, coaguli uicem impleat. Ramulū, fo-
liumq̄ habet Aparinæ simillimū, rectum: florem in cacumine luteum, te-
nuem, odoratū. Flos igni ambustis illinitur. Sanguinis profluuiā sistit.
Cærato rosaceo Galion ammiscetur, insolatū usq̄ dum albescat. Lassitu-
dines reficit. Radix Venerem concitat. Nascitur in palustribus.

E X M. V E R G. C O M M.

Lacteo, non luteo flore Galion hanc posteriores aliqui tradiderunt: testati nomen illi lactis
candorem, qui in flore sit, nō in coagulando lacte uim eius, ut hic ait, fecisse. Describuntq̄ eam
binis folijs, per interualla toto caule usq̄ ad summū uestitam, Lauro similibus. Verum tamen
scriptori huic, græcisq̄ alijs in historia eius magis credendū: præsertim his uerbis docente eam
in sexto sui operis Paulo Aegineta. γάλιον ὀνόμασθαι ἔδην ἀπὸ τοῦ γάλα πηγύνειν, παραπλάσιον δὲ τὸν
ἀπαρίνη. ξηραντικὸν τὸ καὶ ὑπόδριμν. τὸ δὲ ἄνθος αὐτοῦ πρὸς ἀιμορραγίαν ἐρυθροῦ καὶ πρὸς πυρίκνυτα. Quo-
rum sensus est. Aui coagulandi lactis dictum Galion est Aparinæ simile. Siccandi uim, medio-
eremq̄ acrimoniā habet. Flore eius ad ambusta, & sanguinis ex naribus eruptiones utun-
tur. Et hoc solum est, quod pro Galio hac dici a nobis possit. Poterit ex notis suis cognosci,
& a pastribus sicubi pro coagulo lactis ea utantur.

De Senetione.

C A P. XCVIII.

ῥίγιστον

ERigeron a Græcis uocatur, a Latinis Hærbulum, aut Senetio,
alias Erechites. Cauliculo est cubitali, subrubro, folijs continuz
is, diuisura Eruch, sed minoribus multo, luteis floribus, qui celeriter disse-
ci, uanescūt in pappos. Nomen uero sibi uendicauit, quoniam flores ca-
pillorū ritu uere canescant. Radice superuacua. Nascitur maxime in ma-
cerijs, & circum oppida. Folia cum floribus refrigerāt. Quare illita cum
uini modico, uel per sese, testium & sedis inflammationes sanant. Quin
& ex manna thuris medentur, cum reliquis uulneribus, tum ijs quæ ner-
ui accæperunt. Illiti cum aceto pappi, idem munus præstant. Verum rez-
centes epoti, strangulant. Totus caulis si coctus in passo potui detur, sto-
machi dolores a bili contractos, persanat

B A R B A R I C O R O L L.

Theoph. li. 9.
plant.

ERigeron, a nostris fere Triflaginis specie describitur, & cum mollicia nasci fertur in tegu-
lis, murisq̄, cauliculis subrubentibus, lanugine qualis est spinæ, inter diuisuras capitis exeu-
te. Ob id Galli Xuscum, Callimachus Acanthiden, alijs Pappum uocant. Nec deinde Græcis
de ea constare Plinius affirmat, alios Eruce folijs, alios Roboris, sed minoribus multo dixisse.
Item radice alios superuacua, alios neruis uili, alios potu strangulante. Nec desuere qui aliter

genus facerent, nec quale esset demonstrarent; dantes contra serpentes bibendā, edendam uero comitialibus. Aggredimur medicinas, quia notae defunt. Nicander uidet aut hanc intellexisse, cum Geraon pogona dixit, nam & nos Senecionem uocamus, aut Tragopogoni simile herbulam, quae uulgo Barba senis dicitur, aut Chrysocomen, quam & Iouis barbani appellamus. Quamq; & Arbor quaedam est quae Iouis barba dicitur, in opere topiario consillis, & in rotunditatem spissa argenteo folio, aquas odit, ut Plinius describit, nec adijcit plura.

EX M. VERG. COMM.

Romani Senecionem eam uocauerunt, facilem inuentu & cognitu herbam, qua urbani, et in agro agentes passim in acetarijs utuntur. Nasci eam hic ait ad radices parietum, & in eorum rimis, iuncturisq;. Verumtamen in cultis locis, et aruis copiosa etiam inuenitur. Theophrastus de plantarum historia, inter *κρημνίσκη* eam numerauit. Sed uidendum in eo, Cichoriodes ne ille plantas eodem modo semper & ubiq; appellet. Et an satiuo Intybo, aut erratico similes ea nota significet. Si Senecionis in scriptore hoc historia expendatur, in qua exigua & longe ex-rucae minora eius folia describuntur, erratico Intybo similia intellexisse oportebit. Sin contra Cichoriodes Theophrasto erit, quod longo & lato folio, & ob id satiuo Intybo simile, alia comparationis & similitudinis rationem in eo inuenisse opus erit: aut in alterutro diuersam suspicari plantam. Quale non multo post in hoc capite etiam erat. Quo loco scilicet passim, & in cunctis fere legebatur, *ἐν ὅλῳ οἶνω*, id est, in exiguo uino. Non enim sic legendum erat, sed in dulci uino. Quod uetustiores, & meliores graeci habebant.

De Thaliastro. CAP. XCIX.

Thaliastron folia Coriandri habet, pinguiora paulo, caulem Rutae, in quo folia. Quae trita, illitu antiqua ulcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maxime in campestribus.

BARBARI COROLL.

Thaliastron, cauliculum habet crassitudine Papaueris: ut inquit Plinius. Rutae ut Galenus: cubiti, ut Dioscorides, librarijs similitudine uocabulorum deceptis, Nos Rutae, Galenum secuti uerimus.

EX M. VERG. COMM.

Sunt Plinio & huic de Thaliastro, exceptis paucis, eadem omnia. Hic Rutae coliculū, ille Papaueris habere ait. Ille ulceribus cum melle, hic simpliciter concisa eius folia mederi dixit. Hic contra diutina ulcera, ille ulcera simpliciter sanari eo praecepit. Paulus Aegineta de eo tantum ait, Siccandi sine erosione uim habet Thaliastrum. Diutina enim ulcera ad cicatricem perducit.

De marino Bryo. CAP. C.

Marinum Bryon, aliqui Balaryin, alij Iranen uocant. Nascitur in scopulis testaceisq; haud procul a mari, gracile, capillaceū, caulis expers. Praecipua ei spissandi uis, & collectiones cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus sit.

BARBARI COROLL.

Bryon Thalassion cognominatur, ut a Bryo differat in arboribus nascente: marina herba haec, sed in terra tantum nascitur & scopulis: folio herbido ac lato, nec Lactucae dissimili, rugo fiore tantum, uelut contracta, sine caule: sed ab ima radice principio alio atq; alio, plusculis exentibus folijs.

EX M. VERG. COMM.

Non facile persuadeor, esse Bryon hoc loco a Dioscoride tractatum, idem a Plinio libro tricesimo secundo, quāto capite descripto. Hic enim capillatum esse hoc suum dicit, ille Lactucae folijs, quae grandia & latiora sunt suum describit. Quae itidem alia in historia huius traduntur. Omnia Musco magis q̄ herbae congruunt. Capillata species, gracilitas, natales in saxis & piscium testis. Ob quam causam nobis Muscum uertere potius, q̄ herbam intelligere placuit. Caetera utrisq; eadem sunt, ideoq; a nobis ulterius non tractata.

T

A

θαλιτρον

B

βρυον θαλασσιον

Pli. li. 32. ca. 5.

C De Fuco marino. CAP. CI.

φύκος θαλάσσιον

EFuci marini generibus, quoddam latum. Et alterum sublongius, & rubens. Tertium candidum, nascens in Creta, floridum ualde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia uim habent refrigeratorium, non podagræ modo, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatis efficaciter utilem. Verum ijs uti humidis conuenit, priusq; exarescant. Nicander puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc Fuco quidam putant mulieres suum colorem mentiri. Cum tamen sit radice cula eiusdem nominis, qua sese fucant.

Pli. li. 13. ca. 27

BARBARI COROLL.

Phycos non habet alia lingua nomen: ut Plinio uidetur. Etiam si Fucus inde apud nos dictus esse uideatur: quoniam Alga inquit herba sit potius, hic autem frutex: quancq; est ubi maris Algam uocet & Fucus marinum Lactuce similem: qui conchilijs substernitur. Genus ei triplex. Vnum folio lato, uiridi, ob id Prasson uocatum, ab aliquibus Zoster: radice foris pilosa, intus squamatum compacta, prælonga, & crassa, ut Cepis, & Gethyo. Alterum simile Foeniculo: nec uiride, sed pallidum, sine caule: rigens tantum, atq; stans: & eo Copten a duricia uocatum. In testis fractis, saxisq; nascitur terra, ut mari tamē alluatur. Nam superius inuadit haud procul littore. Extra Herculis columnas magnitudine mirabili. Latitudo quæ manu cōprehēdi nequeat. Fertur hoc, fluctu extrinsecus in nostrum mare, Prasson ut diximus uocatum: quæ pari fronde sit. Annuū esse traditur. Vtrumq; præcipiti uerno enasci, per æstatem uigere, autumno flaccescere, emori hyeme. Tertium graminis simile est, radice longa, obliqua, geniculata: caule harūdinis, longe minus q̄ cetera. Alij breuius tria grāa folio distinguunt. Primum lato. Secundū longo, quod & rubens sit. Vltimū crispo: quod & Pelagion, & Cretense nominatur: quæ spongiarū uiridiores ex alto id petant. Circa Cretā in petris copiosissimū & præstantissimum: quo & tēnias, & lanas, & uestes inficiant, prouocante purpuras, quæ diu recens tinctura est: ita colorē alligās, ut elui postea nō possit: ob id & Pseudoconchylion a Democrito uocatur, & flos, siue Coccus marinus, & a Strabone in Arabico sinu Minū, hoc est, ut Nicander uisit, Bryō, Muscūq;. Laudatissimum a parte aglonis, quemadmodū & spōgia. Phycos autē marinū, siue Thalassion cognominatur, ut a phyco, id est, fuco metallico distet. Refrigeratis apud Galenum est nature metallicū, & Cerussæ proximū uiribus, etiam tenuitate penetrandi uincens: de quo nihil Diosco. In Aristotele de animalibus, Littoralem herbam, hoc est, quæ litus oleat, uidetur intellexisse Theodorus, cum uertit Lintum, id quod ille ῥέσινα uocat. Fieri tamē potest, ut litus ipsum, & odor eius in eo uocabulo accipiendus sit.

EX M. VERG. COMM.

Vocauit hoc Plinius plerumq; Phycō, aliquando tamen maris Algam. Ideoq; nos utroq; nomine caput hoc inscripsimus, & si autor ille dixerit libro. 13. quo diximus capite, non habere Phycos alia lingua nomen, quoniam Alga herba sit, ille autem frutex. Nos tamen & Plinij, qui Algam maris aliquando uocauit, & aliorum auctoritatem secuti, non ueris sumus Algam etiam nominare. Quod deinde hic ait, Nicandrum contra uenenata Puniceo uti, sic in eo poeta se habet. ἡνὲν ἡς, πορνίσαν δὴ καταβάλλας φύκος.

ποταμογέτων

C De Potamogetone. CAP. CII.

Potamogeton alias Stachyites, apud Aegyptios Etheuchis, Latine Fatalis dicitur, folium Betæ simile, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat. Folium pruriginibus utile. Et contra ueterum ulcerum nomas. Nomen ex eo inditum est, quod palustribus & aquosis enascatur.

BARBARI COROLL.

Potamogeton Castor hanc aliter nouerat, renui folio, uelut equinis fetis, thyrsi leui & longo, in aquosis nascentem: cuius radix strumas tollebat. Potamogeton aduersatur crocodilis. Itaq; secum habent eam, qui uenantur eos.

EX M. VERG. COMM.

Congrua, et in antiquissimis Græcis a nobis inuenta Potamogetonis appellatio, Betæ foliū etiam est. Nos etiam Fontinalem emendauimus, qd in omnibus fantalis legebatur. Naturā em herbæ oēs hæ uoces sequunt. Quemadmodū & Stachytis, quasi spicata, ob caulē quem ex se mittit, floribus & semine spicatum. Græci aut Potamogetona a fluminū uicinitate prope quæ nascit appellauerunt. Vbiq; in aquosis nascitur Betæ foliū hoc, oleris eius egregia similitudine, in cuius folijs maculæ quædam ueluti puncta intercurrunt colore inter puniceū & luteum.

De Stratiote. CAP. CIII.

Stratiotes in aquis nascens, aliquibus fluuiatilis Stratiotes nuncupatur, Aegyptijs Tibus, Magis Aeluri sanguis. Aquis supernatat, & sine radice uiuit. Vnde cognomentum traxit. Hærbæ Semperuiuo similis, ni maiora haberet folia. Quæ refrigerant. Sanguinem qui defluit a renibus, pota sistunt. Vulnera quæ inflammationem minantur, intus mescere non sinunt. Ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

BARBARICOROLL.

Stratiotes geminus est. Aquaticus: de quo hic agitur. Et Terrestris, Millefolij cognomine, de quo statim post dicitur. Est autem Stratiotes aquaticus, herba Militaris, in Aegypto tantum nata inundatione Nili. Diuersam ab hac Militarem aliā existimo, quam alij eandem quæ & Lactoris, aliqui similem dicunt. Est autem Lactoris nota uulgo, ut inquit Plinius, plena lactis: qd degustatum, uomitiōes concitat. Hæc & Lactaria, & Anabula nunc dicit, Oleæ folio, sed mino re: flore luteo. Sed an una aliqua sit hæc ex his quæ Tithymali nominant, cōsiderandū relinquo.

EX M. VERG. COMM.

In Aegypto & Nili inundatione nasci tantū Stratiotem hanc, testati omnes alij sunt. Hic, qd non ab re miretur aliquis, in homine qui diu illic fuisset in aquosis, simpliciter prouenire. Nul- lus etiam, quod hætenus legerim, causam nominis reddidit, aut ratione aliqua indicauit. Nec quomodo a castris & militia ad herbam id nomen transierit, docere nos audemus. Stratiotes enim græcis miles est. Obseruauimus tamen in antiquis græcorum lexicis, non eadem militi pe- nitus uoce eam scribi, sed in quinta græcorum nominū declinatione & foeminino genere Strati- otida. Quod licet multifaciendum non sit, in re tamen quæ legentes suspendere posset, non pe- nitus inutilem hanc etiam fore diligentiam credimus. Descripsit Stratiotem hanc Plinius libro 24. capite. 3. hsdem fere huic scriptori uerbis. Variant tantum, q sanguinis ex renibus fluentis remedio eius ille masculum tus addit. Verba eius sunt. Sanguinem quoq; qui defluit a reni- bus, pota cum ture masculo, mirifice sanat. Quod negligendū in scriptore hoc non est, præfer- tim congrua turis ad hanc rem ui: & quod uerisimile est, Pliniū cætera omnia eadem huic scri- ptori docentem, ex eodem fonte etiam illud hausisse. Nec rarum difficileq; est, scriptoribus a librarijs aliquid aliquando perijisse, & Dioscoridi posse id hac parte deesse.

De Stratiote Chiliophyllo. CAP. CIIII.

Stratiotes Chiliophyllos, exiguus frutex, palmi altitudine, aut am- plius assurgit. Folijs auicularum pennas imitantibus, breui admo- dum dissectoq; foliorum exortu. Folia syluestre Cuminum simulant, præsertim breuitate, atq; scabricia, breuiora paulo, densiore umbella, & pleniore. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modū Anethi, flores paruos, candidos. Nascitur in asperis agris, præcipue cir- ca semitas. Eximij usus ad ulcera uetera, recentiaq; profluentem san- guinem, & fistulas.

EX M. VERG. COMM.

Ostendunt pro Millefolia Stratiote ætatis nostræ herbarij coliculus breuiibus & exiguis folijs undiq; uestitum. Respondentq; historiæ huius omnia, exceptis umbellis illis, quas hic di- cit Anethi modo in fumo eius esse. Quas em nos uidimus, flores magis longiusculis pediculis

Tij

Cependentes q̄ umbellæ sunt: pediculosq; illos credimus nos esse quæ hic *ναρπία*. i. festucas uocat, & quibus umbellæ sustineri ait: sed singuli potius flores q̄ in umbellam plures congeiti sunt. Certe ut diximus, histori huius egregie respondēt. Nulla est, quod meminim modo, Stratonēs Millefolia hæc Plinio, neq; hoc nomine descriptam in eo nos inuenimus. Græci tñ omnes utriq; hoc genus constituerunt, isdemq; huic scriptori notis discreuerunt, Stratiotem aquaticam, & terrestrem: Millefoliā. s. hanc, frigidamq; & humidam priorem illam, posteriorem uero hanc præter humorem & frigus habentem aliquid quod adstringat, describentes.

De Verbasco. CAP. CV.

Phlomon Græci, Latini Verbasco uocant. Differentiam duplicem habet, nigrum, & album: in quo mas, & foemina intelligitur. Foeminae igitur folia sunt Brassicæ, pilosiora multo, & latiora, candida, caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus, flores albi, aut ex luteo pallescentes, semen nigrum, radix longa, acerba, crassitudine digitati. Nascitur in campestribus. Verbasco qui mas appellatur, oblongius, albis folijs & angustioribus, tenui caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latioreq; constaret folio. Syluestre folia fert Saluaria, altas uirgas, & lignosas, & circa eas ramulos quales Marrubium, flores luteos, auri amulos. Sunt & Phlomidēs duæ hirsutæ, rotundis folijs, humiles. Tertia Lychnitis appellatur, ab alijs autem Thryallis, folijs ternis, aut quaternis, uel paulo pluribus, crassis, pinguibuscq; apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum adstringit: quare quod magnitudine ludicrum talum æquet, in alui profluuiio conueniēter ex uino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiquæ tussi auxilium datur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbasco, cui flos aureus, capillos tingit. Et quocumq; abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata ulcerata, ex uino & melle illinuntur. Cum aceto quoq; uulneribus medentur. Contra scorpionum ictus auxilio est. Syluestris folia, ambustis igni sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius quam foeminam dicimus, aridos ficos omnino non putrescere.

BARBARI COROLL.

Verbasco, siue Phlomos, siue ut Galenus Plomos, etiam in niue nasci posse creditur. In albo aliqui Marem, in nigro Foeminam uolunt intelligi. Caulis Verbasco erectus, Semen inuile. Tertium porro genus non nisi in syluis inuenitur, cui herba quæ Romæ Blattaria dicitur, rã est similis, ut sæpe fallat pro ea capta. Est autem Blattaria folijs minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo: hinc forte natum, ut Dioscorides Verbasco syluestri Blattas contrahi prodiderit. Medicinæ huius capitis sequenti mentione collocantur.

Phlomidēs, distingui genera hæc pene superuacuum est, cum sint eiusdem effectus omnia. Thryallida uero & Lychnitis ex argumento appellant: quoniam ad lucernas conueniunt: proinde ipsa luminū ellychnia Græci, & Phlomos, & Thryallidas quoq; uocant: ut inquit Pollux.

VERG.

Vale Verbasco omne sit, & quibus notis toreius gñā cognosci possint, satis ex historia Dioscoridis patet. Plinius etiam lib. 25. ca. 9. nō minus in cognoscendis his præsidij legentibus asseret. Paucis em̄ mutatis, eadē ambobus oia sunt. Paulus Aegineta etiā post hos multiplex Verbasco esse testatus, & inter ea quam græci *θρυαλλίδα*. i. Thryallim uocant, utriuscq; decreta uidetur confirmasse. Longius ob eam causam de Verbasco nō agemus, præsertim uulgarī & nota omnibus herba: & in cuius genere quæ foemina dicitur, flore candido, aut pallescente, semine nigro, radice longa, & ut hic ait *σπογγία* est.

De Aethiopide. CAP. CVI.

Aethiopis folia habet Verbasco similia, perq̃ hirsuta, densaq̃ in orbem circa radicem inam redacta: caulem quadrangulum, scabrum, similem Apiastro, aut Arctio, multis concatum alis: semen Erui magnitudine, geminum, in uno conceptaculo: radices numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ siccæ nigrescunt duranturq̃ ut cornua possint uideri. Plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Mesenia. Auxiliatur purulētis excreationibus, Ischiadicis, pleuritidis, arteriæ scabricijs, decocta radix & pota. Quin & cum melle, eclegma tis uicem præbet.

B A R B A R I C O R O L L.

Aethiopis, caulem habet concatum, semen candidū, radices plenas, molles. Quæ ex Aethiopia uenit, eximia est, illico proficiens. Colliguntur radices autumnō, siccatur in Sole aliquot diebus, ne situm sentiat.

E X M. V E R G. C O M M.

In Aethiopia probatissimam nasci Aethiopidem hanc, testati alij sunt. Neq̃ abre forsan, qm̃ consueuerint homines multa simili ratione indicare. Hic tñ non magis in Aethiopia q̃ alibi nā sci tradit. Ex eo non male aliq̃ suspicabitur a colore, qui in radicibus eius cum aruerunt uidet, uocari sic potuisse. Sunt enim nigri Aethiopes: quales hic eius radices esse dixit. Hoc nos tantū conijcimus, illud autem testantur ex ueteribus aliquot. Eamq̃ ob causam nos magis illud probamus: quoniam non est par pondus suspicionis & testimonij. Egit de ea Plinius. 27. uolumine, capite tertio, isdemq̃ omnibus notis indicata ab eo est. Videndum in eo tamen, sit ne hæc illi eadem quam. 26. uolumine, ca. 4. inter magicas uanitates Aethiopida parit uocat: monetq̃ polliceri & iactare magos, cōiecta Aethiopide herba, amnes & stagna siccare. Addidimus nos locis in qbus ea nascit, Mesene, s. & Ida, eorū locorū regiōes: ut certius historia eius oīs pateret. Plures em Idæ mōtes sūt, & Plinius ad Idā Trōadis cōtraxit, Mesene aut antiquissima Arcadiæ ciuitas est, lubrico nomine ad Messanā Siciliæ, ideoq̃ certiore indicatione signata a nobis.

Pli. li. 27. ca. 3.
& li. 26. ca. 4.

De Arctio. CAP. CVII.

Arction alij potius Arcturon uocant. Similis est Verbasco folijs, nisi quod hirsutiora & rotundiora sunt, caule longo, molli, semine Cumini, paruō, radice tenera, alba, dulciq̃. Decocta cum semine radix in uino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum. Ambusta, pernionesq̃ fouentur eodem. Bibitur aduersus cōxendicum dolores, & stranguriam e uino.

B A R B A R I C O R O L L.

Arction nascitur in perosis. Ab Vrso nōmen obtinet: aliud omnino q̃ quæ uulgo Brachia uisina dicitur, ueteribus omisā, etiam si Ebisci modo suppuratoriū uinū habet, folijs tā diuersis, ut singula eorum multa esse uideantur, radice glutinosa, multiplici, subalbida.

E X M. V E R G. C O M M.

Animaduertit, docuitq̃ iam pridem Nicolaus leonicenus, miscere Pliniū uicinitate nominis, ut creditur deceptum, Arction, quam mō uertimus, cum Arctio, quæ uertēda mox erit, Perfonatamq̃ appellare: cum tamen Arcij, non Arctij propria sit Perfonatæ appellatio. Nouis seq̃ id ex scriptoris huius historia facillime omnes possunt. Diuersæ enim plantæ sunt, diuersis notis & uiribus descriptæ. Ideoq̃ græcorum medici & herbarij omnes priuatim, seorsumq̃ utramq̃ descripserunt: & alteram folio Cucurbitæ, alteram Verbasco similem fecerunt.

Pli. li. 27. ca. 4.

De Perfonata. CAP. CVIII.

Arction alij Profopida, alij Profopion, alij Aparinen. Latini Perfonatam, aut Lappam appellant. Folia habet maiora etiā Cū

Pli. li. 27. ca. 4.

D I O S C O R I D I S

Curbitis, & hirsutiora, nigriora, & crassiora, caulem albicantem, quanq̃ & interdū uidua caule reperiatur, radice intus candida, foris nigra. Hęc drachmæ unius pondere pota, cum pineis nucibus, purulenta & cruenta extussientibus auxiliatur. Trita dolores in artubus, astrictius uinis illitu sedat. Folia utiliter antiquis ulceribus illinuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 25. ca. 9.

Arcion, siue Prosopites, Personatam quidem in latino sonat, sed pro Petasite tamen capitur a Plinio dicente, Folio Personatę nullum est latius, grandes lappas ferentis: quas non in Arcio, sed in Petasite cernimus. Petasiten interpretor, quam uulgo Bardanam, & Lappam maiorē uocant: Arcion, quę Vngula caballina dicitur. Plinius differentiam in nomine tenuem constituit, Petasiten Personatam, Arcion Persollatam appellādo: Persollatam inquit, quam nemo ignorat, Gręci Arcion uocant: folia habet maiora etiam Cucurbitis, & hirsutiora, nigrioraq̃ & crassiora, radicem albam & grandem. Quę omnia fere cum Dioscoridis Arcio conueniunt. Nominatur & Persoluta, siue Persolyron a Plinio herbę genus Aegyptiæ, in hortis feri coronamēntis solitum duobus generibus, mas, & fœmina: inliberi subdita ea, Venerem uirorū maxime prodendo. Illud cōmonuerim, maiora esse Personatę, hoc est, Petasitę ac Bardanę, q̃ Persollatę, hoc est, Arcij & Vngulę caballinę folia: radicem Personatę candidam, digitali crassitudine, fastidiendi odoris, Persollatę brachiali, & odoratam, flore in spica purpureo. Galenus & hanc, & superiorem eodem Arcij nomine appellat. Quod autem Personata sit, quam Lucius Columella Personam uocari scribit, ne dubitem, facit, quod utilem pecori, quod Vipera morderit, scarificationi superpositam commemorat: quod & Plinius probat, & propterea a nonnullis Echion, quasi Viperariam tradit appellari.

E X M. V E R G. C O M M.

Personata hac utebantur quondam ad personas tota Græcia & Italia gentes omnes, quatiens in Theatris, alijsue locis, qui cognosci a populo nollent, egisse quidpiam uolebant: facili, sed non toto anno ad eam rem ex incultis & pinguibus locis apparatu. Extrema siquidem hęc me, quo tempore nunc expletis totius anni uoluptatibus, ludis & epulis, a ieiunio & cinere, aliam uitam, & alios mores Christiani auspicantur, amissis per gelicidia folijs nullus potest hic eius usus esse. Maio, Iunioq̃ mensibus frequentem fuisse palilibus & floralibus uerisimile est: tribus decerptis folijs, quorum uno frontem, duobus alijs utrinq̃ malas uestirent, relictis inter eorum spacia liberis uidendi, spirandi, loquendiq̃ meatibus. Est enim foliorum Personatę tanta amplitudo, ut longe maius quā humana facies est, tribus uestiri spacium possit. Neq̃ immerito hic Cucurbitarum folijs comparauit. Figura enim illis respondet, & si pinguiore loco nascantur, magnitudine etiam superant. Causaq̃ hęc est, cur gręci etiam ab eodem personarū usu Prosopida, & Prosopion uocauerint. Neq̃ enim uoces illę aliud q̃ personam indicant. Fuerūt præterea, ut in hoc scriptore legitur, qui in gręcis Aparinen, in latinis uero Lappam uocauerint: quoniam illi congener est. Nascitur ubiq̃ Personata: & quoniam desierunt uti ea ad personas, ob eam quam diximus causam Christiani, nec alios habet in sanitate usus, parum hoc nomine nunc cognoscitur.

De Petasite. CAP. CIX.

metastis

PETASITES PEDICVLVS cubito maior, crassitudine pollicis, a quo prægrande folium, galeri modo amplum, ceu Fungus dependet. Contra phagedęnas, & ulcera quę cacœthe uocant, efficaciter illinuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Petasites, dicta uidetur a Petaso, pileum significante apud Gręcos: unde Petasati, hoc est, pileati. Apud Catullum enim ita Castor & Pollux dicuntur. Nec aliud in Mercurio Petasus est q̃ galerus: quanq̃ Lactantius grammaticus, & alas & talaria cōtineri credidit in ea uoce, quasi petasum pro pinna capiant: cum legendum sit non petasum, sed petalon quocunq̃ loco pinna significatur. Ita enim Gręci etiam frondem uocant, ut est apud Iulium Pollucem. Multo s deceptus corruptus in Plinio locus. Alcamenes inquit Phidias discipulus, æreum petasum fecit: qui uocatur Encrinomenos. Alijs petalon, alijs petasum legentibus: cū legendū sit, pentathlos:

quæ nostri Quinquentione uocant, ut est apud Festum: quod & codices manu scripti, & primis impressi formis habent. Quod genus & Myronis, & aliorum operibus ascribitur: ut eodem capite Plinius indicauit. Petasiones porro dicimus, quas Græci Pernas, & nostri Pernas uocant, ut Athenæus inquit. De Petasite multa proxime diximus, credentes hanc latine Personatiam uocari, & Græce a quibusdam Echion, ut ait Plinius: nisi quis non Echion, sed Arcion scribi, propter similitudinem cum Arcio, contenderit: cui non contradico ipse.

EX M. VERG. COMM.

GRæca uox Petasus est, Mercurij, & Augusti Cæsaris usu in antiquis scriptoribus celebrata. Vterque enim Petasatus describitur. Sed alter, dum caelo precipitem se mittit, aui similis: Alter, dum per diem in sole est, radiosque eius munito capite Petaso hoc toto anno uitat. Est enim Petasus Galerius, cuius forma inter Græciæ ruinas in Mercurij imaginibus adhuc uidetur, ex Homeri & Maronis uersibus descriptis, antiquitatis studiosis nota. Ornauit eadem uox herbam: uocanturque Græci Petasiten, quasi Galeritam herbam, in qua solum pediculo superpositum non aliter in medio, quam in Fungis passim uidetur hæret.

De Epipactide. CAP. CX.

EPIPACTIS ab alijs Elleborine, aut Borion uocatur. Parua hærbæ, fruticosa, exiguis folijs. Iocineris uitij utilis, & contra uenena pota.

ἐπιπᾶκτις

BARBARI COROLL.

EPipactis, siue quod idem est, Elleborina inter frutices Asiæ, Græciæque a Plinio reponitur.

EX M. VERG. COMM.

Peregrina Italiæ, auctore Plinio Epipactis est: qui inter Græciæ & Asiæ frutices eam, ut uolumine, capite, 20. numerauit. Non satis ut cognosci nostra ætate possit, nec cur Elleborinen uocauerit eam antiquitas descripta. Si nomen ipsum tantum expendatur, non ab re fuerit Elleboro similem, aut congenerem credere. Si contra Theophrastum aliquis audiat libro. 9. de plantarum historia, pro candido Veratro de ea sic tradentem. *μισγεται δὲ πρὸς αὐτὸν ὅσον. ὅπως δὲ καὶ ἐν τῷ τῆς Ἰλλυβρινῶς αἰσῖμα. ταῦτα δὲ ἐν ποδρίον.* Quorum sensus est. Miscetur autem in Ellebori poculo, ut uomitiones adiuuet Elleborines semen. Herbula autem hæc est. Si quis inquit hæc dicentem Theophrastum audiat, suspicari poterit, non tam quia Elleboro congener sit Elleborinem dici, sed quod Ellebori uim augeat, coniunctaque illi faciliores uomitiones faciat. Vtraque enim ex Theophrasto colligi causâ potest.

Pli. li. 17. ca. 20.
Theoph. li. 9.

B

De Capno, seu Fumaria. CAP. CXI.

CApnon, aliqui Corydalion, aut Corion uocant, alij syluestre Corydalion, alij Capnon in hordeis, alij Capniten, alij Marmariten, alij Capnogorgion, alij Chelidonion micron, alij Peristerion, alij Cantharida, alij Chalcocri, Romani Fumariam, Aegyptij Tucin. Fruticosa hærbula est, prætenera, Coriandri similis, folijs candidioribus, undique numerosis, cineracei coloris, flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis, delachrymationemque. Vnde nomen traxit. Illitus cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata hærbæ, biliosam urinam trahit.

καπνός

BARBARI COROLL.

CApnos, siue Capnion, hoc est, Fumus, duplex. Alia hic descripta nascens in hortis, & segetibus hordeaceis: alia & nomine & effectu similis, quas pedes Gallinaceos uocant. In parietibus & sepibus genita, ramis tenuissimis sparsisque, flore purpureo, ut inquit Plinius: quâ nonnulli modo Cimbalem uulgo dictam, nescio quæ recte interpretantur, folio Hederæ prætenui: ut in Coryledone comunuimus. Hanc autem Capnon, quæ nascitur in sepibus Chelidoniâ Phragmitem uocare moris est Actio, ad exinanitiones partium in iocinore curuatur utilem dictam: ut puto, quoniâ succo discutit caliginem, ut Chelidoniâ: & ob id in medicamenta oculorum additur: ut in Collyrium Mareiani, eam Chelidoniâ Capnitida cognominantis. Quod si eadem probetur esse cum Cymbalari, ut quidam conijciunt, etiam illa similitudo confluet, quod

Pli. li. 25. ca. 17.

T iij

C folium Hederae habuerit, quale Chelidonio minori contigit. Propterea considerari cupio, nunquid non similis, sed eadem omnino sit Capnos haec, cum Chelidonio minore. Multa certe paria comperio. Ceterum ex eo quod Capnon Plinius a nostris Pedes gallinaceos uocari scribit, magnus plerisque inuasit error, existimantes Capnon a Dioscoride monstratum non aliud genus esse, quam quae uulgo Sanguinaria, & galli Crus dicitur. Pudenda & poenitenda inscitia: nisi frons attrita multis esset. Quandoquidem ea quae galli Crus uocatur, Gramini est, tam similis, ut ab eo forte non admodum seiungi possit: nisi quod folio minore cernitur, & fibris potius radicem nititur. Id autem quod in utroque summo frutice Trifarini, gallinacei Pedis imitationem habet, candidius in hac quam in Gramine conspicitur.

E X M. V E R G. C O M M.
Fumariae herbae notissima res Fumus nomen quondam fecit: haud sane, quia trisliniorum parietibus eorumque cameris inducta, nigredine noceat: aut quia, ut poeta cecinit, suspensam exploret duretque ad fabricam materiam, sed quoniam uis illi contra hominis oculos lachrymosa sit, qualis in Fumo est: ob quam cauillam Flaccus lachrymosum in carmine suo Fumum appellauit: & Aristophanis seruus, in scenam redisse se dicebat, Fumo coactum, nec potuisse domi cum ceteris esse, *ὅτι ἴδαντο τὰ βέλτερά τ' αὐτοῦ*, quod est, quoniam eroderet palpebras eius & oculos. Quod maximum a Fumo huic parti redium est: cui potens idem Fumariae herbae succus a Fumo indicata in graecis fuit. Nec tantum Capnon aequali Fumo appellatione eam uocauerunt, sed Capnitim etiam, id est, Fumariam dixerunt. Quemadmodum a similitudine Coriandrum, quae uox in scriptore hoc multifariam creuit. Alijs simpliciter Coriandrum, alijs agreste Coriandrum, alijs diminutiua forma Coriandron uocantibus, Nascitur hic in segete hordeacea ait. Plinius tamen adiecit, & hortis: nec male, quoniam frequentior in hortis, quam in segetibus inueniatur.

De Loto urbana.

CAP. CXII.

D Lotum urbanam, alijs Triphyllon, alijs Libyon, alijs Tripodion, alijs Tribolion uocant. Nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, ceterasque caligines discutit.

B A R B A R I C O R O L L.

Lotus satiuus, non nisi post annum ex semine suo nascitur. Est & Lotus syluestris. Itemque Lotus Aegyptia, herbae omnes: de quibus paulo post agendum nobis erit. Nam de Loto arbore iam diximus. Quae sint in Columellae horto Lota Phrygiae, luminibus gemmantibus, haud scio reddere. Apud Hesperijs Aethiopas nasci tradit herbam Lotum uocatam Artemidorus, quae uescentes, quilibet siticulofo & squalenti tractu sitim arceant: ob id & Lotophagi Aethiopes, ut inquit Strabo, nominati sunt.

Strabo. lib. 3.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus primo uolumine de arbore, quam ueteres Romani Celtum uocabant, Lotum a graecis dictam: ex cuius materia fistulae quondam fiebant. Dicendum de herbis hoc loco, quarum prima satiuus Lotus est, in hortis quondam uiuens, & in delitijs habita: quoniam ampliore longiorisque uitae folio in hortis tota aestate uireret. Plinius foliato caule eam tradidit, & antiquiores poetae inter herbas Deorum uoluptati nascentes numerauerunt. Quae omnia hic uariatione tantum indicauit, in paradisis & hortis nasci dicens. Qui deprehendisse eam se iactant, humilem ostendunt herbam, in pratis nascentem, numerofo folio, Trifolio paulo minus quam undique simili. Discrepat, quod in Trifolio longiora, minora, & acuminatiora folia sunt: in Loto tria quidem numero, sed longe maiora: nec in acutum ut in illo desinentia, uerum paulo minus quam in orbem circumacta. Quae si satiuus Lotus sit, uulgaris, & cognitu facilis herba est. Fecit trium foliorum eius numerus, ut Trifolium & Tripodium diceretur.

De syluestri Loto.

CAP. CXIII.

Syluestris Lotus, quam aliqui Libyon, alijs Triphyllon, Romani Trifolium minus appellant. Plurimum in Libya gignitur, caule cubitali, & saepe maiore, alis multis, folijs Trifolij pratensis, semine Foenigraci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi & leniter adstringens.

Auctor Aegyptus

diobinet. Vitia cutis in facie, maculasq; cum melle peruncta expurgat. **A**
 Trita per sese, aut cum Maluæ semine, in uino aut passo bibitur aptissima
 me contra dolores, qui uescam male habent.

B A R B A R I C O R O L L.
 Lotus syluestris inter aculeatas (ut puto) constituitur, caule foliato, ut Crepis ab ra-
 dice: Quæ sit Crepis nondum comperi. Crepulam certe dici quæ sit Acanthos topiaria,
 Dioscorides affirmat.

Pli. li. 31. ca. 16.

E X O M. V E R G. C O M M.
 Similior communi Trifolio Lotus hæc q̄ antedicta est, facilis inuentu inter nos etiam her-
 ba: & si hic plurimam nasci in Libya testetur, ideoq; Libycam a quibusdam dictam. Longo
 enim & acuminato folio, quali Trifolium passim uidetur hæc est. Ideoq; a Romanis, ut in Dio-
 scoride legitur, Trifolium minus appellata. In qua uoce uitium esse oportet. Quoniam non po-
 test nostrati Trifolio respondere duorum cubitorum altitudo, & minus uocari. Nouimus em̄
 omnes Trifolium: ratiocinariq; facillimum est, falso minus Trifolio nostro dici aliquid quod
 bicubitale sit. Vetusiores Dioscoridis latini codices non minus, sed uirus habent. Quæ uox
 certum non habet intellectum: nec nos augurari aliquid in ea re uoluimus: ob eam causam
 quale in alijs erat, tale relictum a nobis etiam est. Folia Loto huic Dioscorides ait simpliciter
 pratensi Trifolio similia esse: non ut Barbarus uertit, Loti trifoliæ. Non animaduertit ille,
 quis in uerborum cursus in Dioscoride esset. Neq; enim pratense Trifolium Loto ille uocat,
 sed Loti huius folia pratensi Trifolio similia esse testatur.

De Cytiso. **C A P. CXIII.**
Cytisus, quem aliqui Telinen, alij Lotum magnū, alij Triphyl-
 lon, Romani Trifolium maius appellant. Frutex est albus in to-
 tum, ut Rhamnus, ramos spargens cubito longiores, folia Fœnigræci, **B**
 aut Loti trifoliæ, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita, Eru-
 cam olent, gustataq; Cicer sapiunt. Folia refrigerant. Tumores inter ini-
 tia discutiunt, si cum pane trita illinantur. Decoctum potu urinam ciet.
 Nonnulli quod apes alliciat, prope alucaria serunt.

B A R B A R I C O R O L L.
 Cytisus, siue Cytisum, Hederae modo uincit & strangular sata. Contra Cytiso pestis Ali-
 mon. Densa Cytiso medulla, Ebumq; prouocans. Non ex alio pabulo lactis maior copia,
 aut meliori: in commodum tamen tantisper dum floret, ut inquit Aristoteles, quoniam sit u-
 rentius. Perq; modica eius herba quadrupedes pinguescunt: ita, ut iumeta etiam ordeum sper-
 nant, nec aliud minoris impendi est. Vel mediocri solo prouenit. Seritur semine & caule. Per-
 scitur triennio. Florere desinit uerno æquinoctio, cum & metitur. Aspectu, si quis breuiter
 exprimere uelit similitudinem, angustioris Trifolij. Frutex hic in Cymo insula inuentus, in-
 de translatus est in omnes Cycladas, mox in urbes Græcas, magno casei prouentu: ut mirum
 sit, rarum esse in Italia: æstus, alioris, grandinum, niuisq; omnis demum iniuriæ sine no-
 xa patiens. Intactum quoq; hostibus, propter nullam gratiam ligni, ab Antinomacho Athe-
 nienfi magnis laudibus extollitur. Apium examina Cytiso eliciuntur: quamq; Democritus
 & Aristomachus eas prædicent, nunquam de flore Cytisi pabulum contingere. Columella
 Cytisum, & Zeas, & Carnicin, & Trifarum uocari scribit. Et esse geminam: hoc est, sati-
 uam, & alteram suæ sponis.

Pli. li. 19. ca. 24.

E X M. V E R G. C O M M.
Quod tacendum huic scriptori non fuerat, lactis copia est, quā in homine facere Cytisum
 testati omnes sunt. Columella ultimo septimi libri capite, his uerbis ad copiam la-
 ctis Cytisum laudat. Mulieres quidem, si lactis inopia premuntur, Cytisum, in qua macerari
 oportet: & cū tota nocte permaduerit, postero die expressi succi ternas seminas permisceri mo-
 dico uino, atq; ita potandū dare. Sic & ipsæ ualebunt, & pueri abundantia lactis confirmabun-
 tur, Plinius itidem lib. 17, cap. 24, de Cytiso hæc ait, Quin & nutricibus in defectu lactis aridū,

D I O S C O R I D I S

C atq; in aqua decoctum potui cum uino dari iubent, & firmiores, celsioresq; infantes fore. Paulus Aegineta etiam comā Cytisi iubet præcordijs prægnantium, contra uomitiones ex uetere uino imponi. Nec minus q̃ Malua discutientis & tepidæ naturæ esse. Notissimus quondā frutex hic omnibus agris conlitus, & quo maioribus, eo citius eum comprehendētibus. Nunc quod sciam, nullibi in Italia est: aut si sit cognitus, sine honore iacet. Prima eum mortalibus ostendit Cytinus ex Cycladibus una: & ex ea omnem peragravit Græciam & Italiam, ubiq; carus & in honore habitus. Post quod tempus in antiquum & natale sibi solum reuersus, non paruum antiqua amanūbus desyderium sui reliquit.

E St & in Aegypto Lotus, quæ aquis prouenit, plana irrigantibus, caule Fabæ, flore paruo, candido, Lilio simili: quem trahunt occidente sole comprimi, occludique, ad ortum autem aperiri. Adduntq; caput ipsum uespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale Papaueris, maximum, & intus grana ceu Milij, quæ Aegyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem Lotos hæc habet, mali Cotonei similitudine, quæ cruda coctaq; manditur. Decoctaq; lutei oui speciem exhibet.

L OTUS herba Aegypto uernacula est, Caule fabaceo & petasato: folijs densa congerie stipatis, breuioribus tantū, gracilioribusq; florēs ei similes, ut Theophrastus inquit, Lilio: ut Dioscorides, hordeo. Librariorū in alterutro culpa, Crinon, pro Crithe, cōtrarie scribentū. Copiosi ij & in se farcti, comprimētes se ad occasum solis, aperientesq; ad ortū per uices, donec perficiantur capita, & flos ipse decidat. Fructus in capite Papaueris incisuris, omniq; alio modo, nisi quod crebriora intus grana, Radicem Corlion uocant, operā nigro cortice, qualis & castaneas tegit: interius candidū corpus: quod decoctū cibo gratius est q̃ crudū, siue aqua, siue pruna. Nec aliūde magis q̃ purgamētis eius sues crassescunt. Illud sciendū, auctore Theophrasto, genera huius plura inueniri, distincta flore, fructu, caule, folio, ut nomē fere tantū cōmune habeant, ratio naturæ tota dissentiat. Loton qui arborem putant tantū esse, de qua uolumine primo diximus, uel Homero coarguitur, qui inter herbas subnascentes, Deorū uoluptati Loton primā nominauerit. Est & Lotometra, quæ fit ex Loto fata: ex cuius semine, simillimo Porri, atq; Milio, panibus in Aegypto pastoralibus maxima aqua, lacteue subactis, negatur quicq; esse salubrius, aut leuius, dum caleant. Refrigeratus maiore negotio concoquitur, fitq; ponderosus. Eos qui uiuāt pane illo, nec Dysenteria, nec Tenasmo, nec alijs in uentre morbis infestari prædicant. Incolæ & capita ipsa Loti acruata putrefaciūt: mox separant a putaminibus, lauando, & siccata tundunt: eoq; pane utuntur. In Euphrate scapus & flos usq; in medias noctes a uespera mergitur, ut ne dimissa quidē manu cōprehendi possit. Vertitur deinde, paulatimq; subrigitur, dehiscēte flore ad solis ortū, ut plane a terra absit alte. Hanc Loton in coronas uenire diximus in Myrto: propterea Cratinus eam Stephanonia uocauit: & si Attici omnia folia cea Stephanomata solent appellare. Antinōias uero dicta ab Antinoo: qui e Bithynia fuisse dicitur, per diui Adriani fere tempora, qui & memoriā uiri coluit. In Aegypto, ab eius nomine uocata, delubris etiā in honorem eius dicatis, apud maritimos in Arcadia, quod crimen inde Bithyniam habuisse crederetur. Ut illud tamen quod diximus aliubi, sciamus, Lotum non quæ ceruleum, sed quæ similem Rosæ florem edat, inuentu rarum, Antinōium proprie uocatum, in assentatiōem Adriani principis, poëta Alexandrino: qui finxisset e leonis cruore, quæ Adrianus crassantem in Libya necasset, editum, & Antinoion dicendum, alimentis annuis ex musæo constitutis. Huius rei partim Athenæum, partim Pausaniam auctores habeo. Diminutua in Paulo forma, Lotarium rubens legi ad psoras utile. Nisi quis non de Loto Aegyptia, sed de syluestri porius accipiat. Pastillus est, siue orbiculus apud eundem Paulum Dialotarium uocatus, ad genitalium, sedisq; uitia.

L O T U S. E X M. V E R G. C O M M. Ongissime Plinius lib. 15. capite. 7. & 8. supra decimū de Loto egit: nihil tamē non a Theophrasto antea dictū retulit. Cuius longior etiā q̃ Plinij de Aegyp̃tia hac Loto historia est. Mul-

ta tamē reliquit, quæ nouisse pro Dioscoride necessariū sit. Eamq; ob causam, nos quæ a Theophrasto dicunt, isdem uerbis repetemus, non græcis (longius em̄ id esset) sed qualia in decursu uertere licebit. Ea huiusmodi sunt. Quæ uero Lotus in Aegypto appellatur, plurima in campis nascit, cum inundata fuerit regio. In ea caulū natura eadem quæ Fabæ Aegyptiæ similiter & foliorū: quæ ille Petasos, quasi galeros uocat: uerū tamen minora ea, & tenuiora sunt. Nascitur Lotus Aegyptia Fabæ Aegyptiæ similiter. Candidū habet florē. Cuius folia sunt angusta, longitudine liliorū folijs similia. Nascit numerosus, densus, & sibi inuicem conferctus flos ille: cumq; sol occidit, claudit, simulq; uasculū sub aqua condit; mox oriente sole aperitur, & supra aquā emergit: agitq; id, donec uasculum perficiatur, & flos defluxerit. Vasculi magnitudo est quāta maximi Papaueris, & eiusdem Papaueris modō incisuris intus diuisum. Verū in Loto crebrius semē est, Milio simile. Ferunt in Euphrate hoc amplius uasculū, & flores uespere usq; in medias noctes mergi, descēdereq; altius. Neq; em̄ demissa manu inueniri potest. Cum uero illucescit, rursus surgit, subgrituitq; & ad exortū solis supra aquā apparet, ac florē patefacit: patefactoq; etiamnum exurgit, ut plane absit ab aqua. Coācervant in unū uascula hæc Aegyptij, putrefaciūtq; tum putrefactis, cortice in flumine lauantes, semē auferunt: siccātūq; & totum in panē pinunt: eoq; utunt cibo. Corfion uocat Loti radicē hanc: ea rotunda est, magnitudine Coronei mali, cortice nigro, foris uestita quasi in castanea nuce est: intus candida: quæ tosta elixaq; uicellis ouorū similis sapore est, gustu suauis. Estur eadē & cruda. Et hæc Theophrastus. 4. de plantarū historia pro Aegypto Loto. Ex quibus intelligent facile omnes, male in Dioscoride legi, simile hordeo esse: nec sic, sed Liliū uertendū fuisse, cui manifeste Theophrastus eum comparat. Et Plinius ait. Flos qui cādidus est. &c. quo colore Lilia sunt. Accedit his, quod parū uerisimile est, tam grandis plantæ, & quæ uasculū, id est, papaueraceum uasculum fert, flores hordeaceis similes esse: qui nulli fere sunt. Barbarus in Corollario suo suspicatus id est: & nihilominus in Dioscoride suspiciōem illam penitus neglexit. Facilis & lubricus in græcis lapsus fuit, a crithe, quod hordeum, ad crinon, quod Liliū significat.

De Millefolio.

CAP. CXVI.

MYriophyllon, alij Melphyllon, alij Stratioticon, alij Achillion. Latini Millefolium uocant, aliqui Supercilium Veneris, Galli Beliocandas. Caulis est tener, indiuiduus, unica nixus radice, plurimis folijs, Fœniculo similibus. Vnde nomen accēpit. Caulis flauescit, prædensus, ac ueluti ex industria delimatus. Nascitur in palustribus. Vulnera recentia ab inflammatione uindictat: si uel uiride, uel siccum ex aceto oblinatur. Præcipitatis cum aqua & sale datur.

MYriophyllon, q̄q; fere Millefoliam significat, alia tamen uidetur esse ab ea, quæ inter Siderites, Achilleon, & Millefolia cognominatur: itemq; ab ea quam in Ethuria Millefoliam uocari diximus: & ab ea quæ Militaris. Alioqui Græci hanc Myriophyllon, illas uero Chilio phyllon appellare consueuerunt.

EX M. V E R G. C O M M.

Millefolium Plinius græcam Myriophyllon uocat: haud sane, quia in græcā uocē certā eius numeri uis & significatio sit, sed q̄ aptius non poterat in latinis nomen fingi: nec referebat, in re incerta mille potius q̄ decem milia, infinita uel folia illi tribuisse: quod mutato tantum accentu in græcis *μύρια* significant. Quemadmodum nec male penitus dixerit aliquis, mille, pluribusue, aut infinitis pilis constare hominis supercilium. Ex cuius similitudine Veneris supercilium hæc ipsa etiam uocata a plerisq; fuit: quoniam scilicet quemadmodum minui, densiq; pilū eam hominis partem uestiunt: sic Millefolij huius coliculos, minuta densaq; uestiunt folia. Quæ licet hic Fœniculo comparauerit, non tamen eadem longitudine sunt. Huius enim breuia admodum, Fœniculi uero longiora, & quasi capillata. Quod comparatur, copia & exilitas eorum tantum est. Eadem ratio Stratioten, & Achilleam uocari fecit. Breuib; enim & numerosis illæ etiam folijs describuntur, & sunt. De Stratiote non multo ante dictum in hoc ipso scriptore a nobis fuit: & de Achillea longe prius, repetendaq; legentibus ex illis comparatio ad hanc est.

A

B

μυριόφυλλον

Pli. li. 24. ca. 169

C De Myrrhide. CAP. CXVII.

MYrrhis, quam alij Myrrham, alij Conilen uocant, simillima est Cicutæ, caule folijsq. Radix ei oblonga, mollis, rotunda, cibo non insuauis. Quæ pota in uino, phalangiorum morsibus auxiliatur. Cit mēstrua & partus. Subuenit & phthilicis cocta in sorbitione. Aiunt quoq. eandem bis die, terue potam ex uino, in pestilentia salutare esse, & ne morbi contagia sentiantur, obfcare.

BARBARI COROLL.
MYrrhis, & Myrrha, siue Murrha, ut ego arbitror a nostris appellata, nonnulli Smyrin. Florem habet Cicutæ: cui & cætero simillima est, minor tantum & exilior. Hanc sunt qui Chærephyllon, siue Chærefolium modo nominatam, & in hortis passim nascentem intelligant. Plinius Chærefolium aliud uidetur genus accepisse: cum inquit, seri æquinoctio autumni Chærefolium: quod Pæderota Græci uocant, acerrimum sapore, igneiq. affectus, ac saluberrimum corpori. Quæ uerba hæc postrema de Sinapi dicta uideri possunt, de quo statim auctoridem loquitur. Columella horto suo, breue Chærephyllon appellat. Myrrhis proprie Cicutaria latine dicitur, ut in Geranio testati sumus. Inuenio & Mylam genus herbæ, cuius radix paruo bulbo similis dicatur, cōtrahendi effectū uuluis apposita cum farina Lolij. Miror hanc in Dioscoride nusq. legi, cum tamen & Hippocrates id prodar, & Galenus medicinas eius a Dioscoride accepisse fateatur. Aetius radicem syluestris Lapathi, Mylen appellatam prodit, utilem decocto in mobilitate, & dolore dentium.

EX M. VERG. COMM.
DERISIMILE est a Myrrhæ odore Myrrhida, & Myrrham dictā fuisse quondā quā modo tractamus herbā. Nullus tamē, quod hæcenus inuenerim, aperte id testatus in græcis aut latinis est. Odonata tamē radice ab hoc, & a cunctis alijs describitur. Potuitq. illi ab ea nota nomē hoc factū fuisse. Cicutæ similem oēs tradiderūt, Eamq. ob causam crediderūt aliqui Cicutariā nūc eam dici. Purgare eam *ἡμυνα καὶ λόχια* Dioscorides ait: quæ uoces tā notas in græcis, & in commentationibus his nostris significationes habent, ut longius dixisse de eis nō oporteat. Quod tantū monemus illud est: factū fuisse, dum alter ex interpretibus Plinij nimis q. in scriptore hoc opus erat amat, & sequit, pro græcorū lochijs, partus uerterit. Plinij uerba sunt. Cit mēstrua, & partus cū uino: cum tñ lochia nihil ad partū pertineant: modo partus, qd in cōmuni significatione æstimatiōe habet significet. Sintq. Lochia secundarij, & deinceps a puerperio feminarij purgationes: quæadmodū, ni fallimur, in Aristolochia diximus. Idē supiore cap. de Millefolio caulē eius indiuiduū uocauit, quē ille *μυροφυῖν*, non qui diuidi nequeat, sed qui singularis nō numero fusus a radice surgit. Hæc nos leuia quidē, sed interpreti non contēnenda signamus.

De Myagro. CAP. CXVIII.
MYagron aliqui Melampyron uocant. Herba est surculacea, folijs Rubiæ, pallidis, tripedanea. Semen oleosum, collo simile. Quod contusum igni torrent, peruncusq. uirgis ad lucernarum lumina utunt. Hoc pingui, scabricias corporis lauiuari, atq. expoliri constat.

BARBARI COROLL.
MYagros, siue Melampyros, herba ferulacea, ex cuius semine oleum etiam fit. Paulus Aegineta præter hanc genus aliud facit herbæ, quam Myaron appellat, & Melampycon: eiusdem per omnia cum Myagro naturæ. Vt libriorū fortasse culpa euenerit, Myaron, pro Myagro, & Melampycon, pro Melampyro scribentium.

EX M. VERG. COMM.
SI Melampyro eadem Myagros est, quod Græci omnes testantur, binominē herbam facientes, in triticea segete nasci, auctore Theophrasto constituendū est, qui, s. de plantarum historia, uolumine Sicilia Melampyrū priuatim assignat: & contra q. in Avena & Lolio fit innocentē, & Tritico nihil officientem describit: nec uox aliud indicat, q. nigri coloris Triticum. Quemadmodum forte Myagros, quod mures uenatur & perimit in illo niger, in plarisq. seminibus color rem certam facit. In hoc rarus euentus, præterq. ex historia constitui non potest. Quæ no-

bis nulla est: nec nos nisi ex uocis significatione rei coniecturam hanc facimus.

OEnagra, siue Oenothera, aut Onuris. Frutex est arboris instar, prægrandis, amygdalino folio, Lilio non dissimili, flore roseo, magno, radice candida, pusilla, cum siccata est uinum olente. Nasctur in montibus. Aqua in qua radix maduerit, in potu data, feras mitigat, & cicures facit. Illitu quoq; tetra ulcera mulcet.

BARBARI COROLL.

OEnagran, & Oenagron, & Oenotherā, & Oenotheram, & Onuthurida, & Oenotheridē uocamus, aliqui Oenear. Sic hæc & quæ dicitur Oenutta, qua corui & canes inebriantur, ut Hesiodus inquit, non affirmarim.

EX M. VERG. COMM.

Discrepant non leuiter in radice Oenagræ historia Theophrastus & Diosc. Candidā hic, ille rubentem tradit. In reliquis eadem ambobus omnia. Et Theophrasto huiusmodi sunt. Radix Oenotheræ mitiores & hilariores mores facit in uino pota. Habetq; folium Amygdalæ simile, uerum tamen latius. Florem rubentem ceu Rosam. Ipse grandis, ut inter frutices est. Radix illi grandis & rubens, quæ siccata uinum olet. Amat mōtana loca. Ex his multa in impressis scriptoris huius codicibus emendare licuit. Primumq; non γλυκύτερα, id est, dulciora eius folia, sed πλατύτερα, id est, latiora legi oportere: Mox in radice non μικράν, id est, paruum, uerū μακράν, id est, longam. Nomen illi ab euctu factum. Quodq; Theophrastus ait, mitiores & hilariores mores facere, eodum pertinet quo hic ait, potu diluto eius leniri ferocientium omnium animalium feritatem. Nomenq; id significat, siquidem οἰνάγρα, & οἰνόθηρα, siue οἰνόθηριον ex eadem ui capiendi, tenendi & domandi uoces sunt. Significatq; οἰνάγρα quemadmodum & podagra, aliaq; huiusmodi, quæ uino capiat, uenetur & domet. ἀγρίων enim in uenatione capere est: nec minus etiam θηρίων, a quibus uerbis græci transferentes multa huiusmodi finxerunt. Et inter cætera οἰνάγραν hanc, & οἰνόθηραν. Egit de ea Theophrastus cum numeraret quæ diuersis locis uina, aut uinosa alterutram hominis partem, corpus. s. aut animum mouent. Videturq; Theophrastus non tantum ad mulcendam brutorum feritatem uinū illi esse ostendere, uerum inter homines etiam uelut inducta non ebrietate, sed quam græci οἰνωρῖν uocant, tristitiæ ex uino remissione, usum eius quondam fuisse. Hic tamen ad ferocientia tantum animalia contraxit. Neq; ab re, quando in iuuenecorum domitura Columella præcepit eorum tergora tractare, & respergere mero: quo familiares bubulco fiant. Idemq; a mellarijs etiam in apibus seruari. Rationem ex natura uini colligere facile est. Theophrastus etiam quo diximus loco, eā breuiter reddidit. Non male in ferocia & tristitia hominis, sine ebrietate & poculorum sumptu radice Oenagræ huius uteremur, si quemadmodum inuentu, sic cognitu etiam facilis esset.

De Crifio. CAP. CXX.

Crifion aliqui Buglossum magnum uocant, Romani Spinam mollem. Caulis est tener, duorum cubitorum, triangulo similis, anguli spinosi, per interualla molles, folia Buglossi similia, maiora, subcandida, modice hirsuta, partibus extremis aculeata: cacumen caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula purpurea, quæ soluuntur in lanugines. Radicem huius loco laboranti adalligatam, dolores uariis cum sedare, Andreas scripsit.

BARBARI COROLL.

Crifion potius, q̄ ut quidam legunt Crifion, a uaricibus dicta est, quibus utilis existimatur. Ita enim Varices ab Hippocrate dicuntur, quas Aristoteles Ιξίās uocauit. Huic herbæ similis est quæ Hircina lingua uulgo dicitur, sed caule tamen rotundo, non anguloso ut Crifion. Nec dissimilis huic uidetur quam Porraginem, siue Borraginem olitores nostri uocant, flore intermixto purpureo, Crifion iuterim ceruleo: quæ si Crifion non est, mirum quam obrem sit indicta ueteribus, quæ sit & uulgarissima, & cibo grauissima: nisi quis Buglossæ generibus contribuat.

A

οἰνάγρα

B

αγρίων

Pli. li. 27. ca. 8.

C

De Asteris

De Astere, seu Inguinali.

CAP. CXXI.

Aster ab aliquibus Bobonion appellatur, ab alijs Astericos, a-
lijs Asterion, quibusdam Hyophthalmion. Romanis Inguina-
lis, Dacis Rathibis. Cauliculus lignosus, florem in cacumine habens
purpureum, lutumue, & in ambitu diuisum Anthemidis modò capi-
tulum, pusilla in eo circa caulem folia, stellæ modò radiata, oblonga,
hirsuta. Feruenti stomacho, oculorum inflammationibus, procidua se-
di, ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradunt purpureum florem, si ex a-
qua bibatur, anginis, et pueris comitiale malum sentientibus opitulari.
Inguinum inflammationi recentem illinire conuenit. Si aridus flos si-
nistra dolentis manu decerpatur, & inguinibus adligetur, dolore libe-
rat. Stellares huius radij noctu splendent: quapropter qui ignari antea
non uiderunt, esse inane simulacrum arbitrantur. Medijs faxis & aspe-
ris exit. Inuenitur autem ab opilionibus. Crateuas Rhizotomus hæc de
ea refert, si uiridis cum axungia uetere tundatur, contra rabioforū mor-
sus, turgentia guttura proderit. Suffitu quoq; serpentes fugat.

BARBARI COROLL.

D

Aster Atticus, siue Inguinaria, folijs oblongis duobus, aut tribus, passim in uepribus na-
scens, ut Plinius scribit, Argemonion a quibusdam uocari dicens. De hac Galenus bis uidetur
scripsisse medicinas, uno loco Astera Atticon uocans, altero Bubonion. Qualis autem Pausa-
niæ sit herba, quæ in Mycenensi agro ad Iunonis fanum Asterion uocatur, a flumine terram il-
lam rigante, quia in ripis nascitur, cuius folia Iunoni sacra in coronas sibi necunt accolæ, non
comperi. Est & alius Aster, nunc uulgo Stella dictus, folio fere Vitis, seu Maluæ potius erra-
ticæ, ad radicem maiore, pluribus, sed minoribus diuisuris: florem fert in modum stellæ, in lu-
teo uiridem, pusillum, & herbæ suæ similem. Ad herniam puerorum, & uulnera commen-
dant hanc. Eius decoctum quæ uirgines uideri uolunt, insident. Veteribus dicta Indicta sit,
haud scio.

EX M. VERG. COMM.

Tanta, tamq; presens contra inguinæ, eorumq; dolores uis Inguinalis herbe est, ut adalliga-
ta solum in eo malo, medicinam faciat. Idq; grauissimi Grecorum medici testati sunt, Galenus,
Paulus Aegineta, Plinius etiam, & hic ipse, cui non minus curæ fuit hæc inuenire q; docere.
Sit ergo illi Asteris nomen, a foliorum in floribus figura, & situ: sint & Asteriscos, & Asterio.
In cunctis enim stellæ uis & significatio est, quam græci astera uocant. Solaq; hæc nōminis hu-
ius causa habeatur. Non quia noctu & in tenebris stellarum modo fulgeat, ut posteriores græ-
ci etiam crediderunt: quorum aliqui inutiliter in extrema capitis huius coronæ addiderunt,
quæ in alijs interpretibus leguntur ab eo principio. Nascitur autem media inter petras. &c.
Omnia enim ex eo loco, usq; ad reliquum caput, ex hac opinione illi accreuerunt. Nos ea re-
iucemodi aliquid non relicturns, nec Paulus Aegineta, nec Serapion, nec antiqua huius scri-
ptoris interpretatio ostendunt. Acceditq; his omnibus, ut cum superstitiosum aliquid, aut qd
ad religionem nostram pertineat, in hoc scriptore legitur, persuaderi non possumus, eius esse:
ut sæpe alias testati sumus. Aster itaq; id est, stella, ob eam quam prius diximus causam dicta
herba Inguinalis est. Adiecerunt illi, ab Atheniensium agro notam ueteres græci, q; illic ob so-
li tenuitatem frequentior, aut melior forte nasceretur. Bubonios eadem ab hsdem græcis de-
inde dicta est, quoniam Inguinibus, quæ bubonas illi appellant, tam presentī remedio mede-
tur, ut adalligata tātum medicinam in eo malo homini faciat. Hyophthalmos postremo, quasi
suis oculis: q; totus eius flos animalis illius oculum referre uideatur. In quo animaduertendū
est, quod hic ait, habere Inguinalem herbam purpureum & luteum florem, ad diuersas floris
partes referendum esse. Sunt enim in eo purpurei coloris folia. Quod uero medium inter ea so-
lia capitulū est, Chamæmalī mō lutescit. Et hæc pro nominum & floriū historia satis sint.

De Isopyro. CAP. CXXII.

A

Isopyron aliqui Phasiolon ob similitudinem uocant, quoniam folium, quod est Aniso simile, in pampinos torquet. Capitula sunt in summo caule, tenuia, plena seminis, Melanthij gustum imitantis. Contra tussim, & cætera pectoris uitia, semen ex aqua mulsa bibitur. Hepaticis & sanguinem excreantibus utile.

BARBARI COROLL.

Isopyron, & Phasiolos, & Phasilon quoque dicitur. Alia uidetur herba esse quam Theophrastus Ision uocat. Theodorus more suo, Aequum. Duplici fastigio, nigrum, & candidum. Flos, fructusque illis pro ratione discriminis, niger, aut candidus: quancumque & medio inquit colore fructus quandoque cernuntur, & flores in purpuram inclinantes, uirgis & folio tenuioribus atque leuioribus. In Aetio Ision dici herbam quandam uideo, cuius cibo pituita detrahitur: nec satis animaduertio an eadem sit cum Isio. Alexander quoque in problematis, si locus memoria non exciderit, Ision herbam inter olera dinumerat.

Pli. li. 27. ca. 11.

EX M. VERG. COMM.

Qui Isopyron hanc deprehendisse nostra ætate uideri uolunt, herbam a radice statim folio sam ostendunt, & ex medio surgentem colicolum: in quo antequam in ultimū cacumen definat, quod florem & sub eo plenum seminis uasculum sustinet, utrinque uolutæ duæ se spargunt phasolorum cirris & clauiculis similes: quas hic *Ision*, ut in uitibus uocat: folijs quadamtenus rubentibus, contrarioribusque Plantaginis, sed eadem latitudine, & in aliquibus maiore. Quo fit, ne credamus Isopyron scriptoris huius eam esse: si Dioscoridi, Plinio, graecisque alijs credendum est, qui omnes Anisi folio eam describunt. In cæteris non dissimilis species diligentiam eorum probat. Nobis in neutram partem inclinat animus, & quale a graecis traditur, Isopyron tale reddidit a nobis etiam est.

B

De Viola purpurea. CAP. CXXIII.

Violam purpuream, aliqui Dasypodion, alij Priapcion, alij Ion syluestre, alij Cybelion, Romani Violam purpuream uocant. Folium habet Hedera minus, tenuius, ac nigrius, nec multo dissimile. Cauliculus a radice prodit, in quo flosculus suauiter olens, purpureus. Opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se, & ex polenta illinuntur aptissime stomacho æstuanti, & oculorum inflammationibus, sedique procidenti. Aiunt quod purpureum est in flore, anginis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.

BARBARI COROLL.

Violam, Graeci Ion pro flore, Violarium Ioniam, pro frutice appellant. Nicandee in georgicis Ion uocatam credit Violam, quia nymphae quædam Ionæ, florem eum Ioui primum dedere muneris. Nascitur uitis modo e supernis: quasi e puppi dicas, non prora, ut Ruta, Sisymbrium, Serpillum: eoque omnes Phrygana, hoc est, surculi siue cremia Violæ dicuntur: excepta nigra: quæ hoc capite describitur. Viret hæc perpetuo, & ut quidam ferunt, si certo genere colatur, anno toto. Serit plantis ut olus. Vere floret, post Leucoion, & ante Flammæam. Cui Ion Graeci dicunt, nigræ, seu purpureæ fere intelligunt. Humilis hæc, & latiore folio, statim ab radice multa carnositate exiit, sine ramis: ob id uulgo loripedem Violam uocamus. Hæc nomine a cæteris distinguunt, solæ la appellatæ Graecis: ut ab his Ianthina uestis, et Violacea diceretur. Alia Violarum genera in Leucoio reddidimus. Violas sarranas, a colore, cum purpureis easdem esse apud Colu-mellam arbitror. Purpureas, Vaccinia et Hyacinthum dici, Seruius grammaticus existimat. Dioscorides quoque Hyacinthum latine Vaccinium appellari scribit. Admonendi sunt qui hæc legunt, purpureas Violas duorum generum haberi. Alias inter Loripedes siue sessiles, de quibus hic agitur: alias inter Leucoia, odoratasque omnes esse. Sed & candidarum quoque gemina hæc discrimina cernuntur. Aliæ Loripedes: aliæ Leucoia. Leucoia intelligo, quas Mauritania Cheiri appellat: Loripedes, quæ uulgo Claudæ nominantur, & Maurice Senephigi.

V ij

C Quæ ferrugineos Hyacinthos, & nigra Vaccinia uocari a latinorum poetis fecit nigricans purpura: uel, ut aptius loquamur, in nigro purpureus color: eadem Theophrasto, grecorumque alijs scriptoribus causa fuit, ut Viola, quæ nunc tractanda a nobis est, nigra dicere tur: tam frequenter, receptoque passim in ea coloris discrimine huiuscemodi, ut multis locis Theophrasti in plantarum historia nihil certius intelligatur: ubique *μύλαν* *ἴον* dicenti Violam, quæ nigricante purpura, ad murorum radices, hortorum marginibus, & sepibus florens prima, aut cum primis aduentum Veris mortalibus nunciat: nota uulgo, & ubique inuentu facilis: quæ toto anno uireat, & flores tenui quidem, sed longiore coliculo altius a terra inter folia erigat. Quæ hic merito Hedera comparauit: quoniam proxime ad eam figuram accedunt. Muraria Violam a latinis uocari in Dioscoride legitur. Nescimus tamen quæ ueritas ea uox sit: sed quæcumque ea est, naturæ eius respondet: quoniam ut diximus, ad murorum radices, umbrosis locis frequens & speciosa nascitur. Eadem causa fuit, cur syluestris Viola itidem diceretur: quoniam in locis non cultis nascitur: nec uiolaria in hortis ut cæteræ illi cognomines habet. Potuit quidam etiâ religione aliqua, & numinis gratia commendari: ideoque Cybelios Viola ab antiquissima dea Cybele dicta, laudem potius quæ nomē id intuenisse. Sed nobis nulla est eius nominis certa ratio, aut coniectura. Quemadmodum & reliquæ aliæ penitus ignotæ. Nisi Priapeios non dissimili ratione, quæ Cybelios ab antiquo ruris & hortorum numine dicta fuerit. Descripsit eam Theophrastus libro sexto de plantarum historia, dixitque: *προσπύλλον καὶ κυφύλλον ἴνι καὶ ὅτι πικρὸν καὶ διυγνύνειν δύσλόν φέρειν τὸ ἔνθος τὰν τροπῶν τῶν θρασυτέρων*. Quod est. Exire & uiuere folia eius in radicis capite tantum, perpetuamque uirere fronde. Id enim uoces illæ duæ significant. Facileque est uidere foliosum Violæ huius cespitem, nullis caulibus, aut ramulis a terra surgentem, quod cæteræ habent Violæ: nec æstu anni arescere, aut hyeme, quod aliæ patiuntur, sed post amissos flores, uirgentibus folijs medicinæ toto anno etiam inferuire. Adiecit præterea, testari quosdam, posse hanc Violam continere toto anno florere, si aliqua ratione curetur: quam tamen ille non retulit, nec quibus locis id excogitauerint homines. Adiecit eodem libro idem scriptor, differe hanc a reliquis Violis in reliqua natura, præcipue autem *ὅτι πλατύφυλλος καὶ ὑγυόφυλλος καὶ σαρλόφυλλος ἴνι*, quæ scilicet latiore folio quæ reliquæ Violæ sit: intelligitque reliquas Violas Leucoia ab omnibus appellatas: eodemque folio sit *ὑγυώ*, id est, terrestri, quod a terra non surgat: & præter id carnosum & pingui. Quæ omnia longius forte dicta aliquibus uidebuntur. Sed nos rerum certitudini consulentes, obscuriores breuitate nolumus fieri. Quo consilio, in Violæ huius signando colore, a principio statim usi sumus: & contra aliorum interpretum additiones, nigram, non purpuream Violam proposuimus. Ne si purpuream diceremus, miscerentur diuersi coloris congeneres flores. Sunt enim in Leuciorum genere purpureæ Violæ, quas Columella Sarranas ab eadem purpura, & Sarrano ostro appellat, in censu earum & ordine quæ furculose sunt: in parietibusque & hortis nascuntur, aliter quæ hæc dispositis in flore folijs, & plures uno pediculo pendentes: quæ proprie & uerius Purpureæ uocantur. In illis enim uera est purpura, quemadmodum in his in nigro purpureus magis color quæ purpura. Et hæc pro notissimi floris historia satis sint. Quibus adijciemus, mutasse nos titulum capitis huius, & de nigra Viola inscripssisse: quoniam res id exigebat: & in melioribus grecis, aut nulla coloris nota addita fuerat, simpliciterque de Viola caput inscribatur: aut *ἴον μύλαν* in aliquibus legebatur.

De Cacalia. CAP. CXXIII.

C A C Alia quæ Leontice uocatur, folia fert magna, alba. E quibus medius caulis emicat, rectus, albus, florem ferens Robori, aut Oleæ similem. Radix in uino madefacta ut tragacantha, delinctu, aut manducatu per se iussibus, scabricijs arteriæ medetur. Grana quæ post excussum florem innascuntur, trita, & cum cærato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

Pli. li. 25, ca. 9.

BARBARI COROLL.

Cacaliam putant esse, cuius semen a Plinio margaritis minutis simile reddatur: dependens inter folia grandia, in montibus fere nascentem. Hanc Galenus Cancanon uocauit. Differt ab hac Acacalis, item Caucalis: de quibus ante dictum est. Paulus Cacaliam, non Cancanum, sed Cancano similem esse tradit.

Cacaliam descripsit Plinius, 25. uolumine, cap. 9. Leonticemq; uocari & ipse ait. Minutis margaritis simile habere semen, inter folia grandia pendens: nataleq; illi plerumq; montes esse: nec ultra in historia eius quicq; tradidit. Nos uero descriptum ab eo florem fuisse optabamus: ut quod in antiquis grecis hoc capite uariat, certius constitueretur. In cunctis enim, uno excepto, q; nobis uetustissimus & probatissimus codex Diosco. est, legitur. *ἄθος ἔχων ῥοκκός ἀπὸ ἡ δακία*. Quod si uerbum de uerbo fiat significat, florem habens quercui, aut oleæ similem. Eamq; lectionem secuti cæteri interpretes, Querno, aut Roboris flori simile fecerunt. Nos musco, aut oleæ uertimus, ueterum & meliorum codicum fidem secuti: in quibus ut nos credimus, antiqua & uerior lectio est. *λευκὸν ἄθος ἔχων ῥοκκός ἀπὸ ἡ δακία*. Quod est ut nos diximus, flore candido, musco, aut oleæ simili. Sumusq; ad hanc interpretationem, præter grecorum fidem, latinorum etiam, antiquissimis monumentis usi: inter quæ longobardis literis scriptus Diosco. nobis est, in quo manifeste Bryon similis legitur. Est autem grecis Bryon, qui in torrentibus, aut arboribus conrescit muscus. Cui in comparatione respondent oleagini flores, qui passim a cunctis muscoli dicuntur. Quæ ratio etiam nos monuit, muscum magis q; quercum, aut robur hoc loco uertere. Nihil enim muscoso Oleæ flori simile habent querni, aut robustei flores. At contra bene ad terij floris similitudinem alternantur muscus, & oleagini flores.

De Bunio Napi genere. CAP. CXXV.

BVnion aliqui Aton, alij Acunen, alij Anemosphoron uocant. Magi Paradacry, Aegyptij Ersonen, Romani Scopam regiam, Aphri Zigar, nonnulli Thepso. Caulem ædit quadrangulum, digiti longitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatent: folia proxime radicem Apio similia, longe tenuiora, coriandrinis proxima: flores Anethi: semen odoratum, Hyoscyamo minus. Vrinam ciet, Excalfacit. Secundas euocat. Lienî, uesicæ, renibus utile. Tam humidi, q; sicci, expressiq; succi caulib, folijs, radicibusq; usus inualuit ex aqua mulsa.

EX M. VERG. COMM.

Alterum, & primum in diuisione Naporum genus Bunion hoc facit: describiturq; a cunctis nisdem huic scriptori notis & uiribus. Non tamen in sanitatis usu receptum a gentibus, ut alterum & secundum illud est. Quod sceminino genere Buniada greci uocant, secundo uolumine a Rapis statim, quasi eiusdem illis generis, ab hoc scriptore tractatum. Vtriq; radix crassior, sed contra q; in Rapis acuminata longitudinis: huic etiam exilior q; Buniadis, & minor. Egit de eo Plinius lib. 20. cap. 4. cum de reliquo Naporum genere ageret: Nomen ambobus factum aliqui tradiderunt *ἄπο τῶν βουνίων*. Vocant autem greci inter alia Bunos, tumentia, & quæ in amplitudinem creuerunt: quæ Naporum radicis forma est. Cur autem in Diosco. legatur, Scopam regiam Bunion a Romanis dici, ignotum nobis est. nihil enim habet planta hæc quod scopis congruat: non furculosam naturam, non usum, non folia, non aliud quidpiam quod scoparum rationem indicet aliquam. Ignoræ aliæ appellationes etiam. Sola Arétion ex similitudine facta est: quam nos Pauli Aeginetæ autoritate instaurauimus. Non legitur in Barbari æditione hoc caput. Nec nos scimus, relictum ne a librarijs imprudenter in exscribendo fuerit: an potius quia de Napis secundo uolumine actum fuerat, ratus abundare, uolens ipse & prudens id reliquerit. Siquidem in Corollario etiam nihil actum de Bunio ab eodẽ est. Verumtamen autoribus grecis omnibus recipiendum, & cum cæteris uertendum fuerat. Qui enim de Pseudobunio agi mox poterat, nisi de uero Bunio actum prius fuisset? Verè enim alicuius oportet falsam & mentientem in plantis esse. Calido temperamento Bunion esse, Paulus Aegineta decreuit: ideoq; urinam, & menses ciete.

De Pseudobunio. CAP. CXXVI.

Pseudobunion palmi altitudine fruticat, in Creta, folia, ramulosq; Napi ferens, acri gustu. Tormina, atq; stranguriam, laterumq; dolores sanant quaterni rami eius poti in aqua. Illi quoq; cum sa-

D I O S C O R I D I S

Cle & uino, tepentes, anginam discutunt.

E X M. V E R G. C O M M.

QUale Pseudobunion sit, præter Dioscoridem, Plinium, cunctosq; alios, qui omnes Na-
po similem tradiderunt, nomen ipsum etiam indicat. Neq; enim mentiri ueram Bu-
nion, nec fallere carpentes posset, nisi similis illi esset: eaq; similitudine fallens, falsum & men-
dax Bunion a græcis dictum est. Monere aliud legentes in eo non oportet. Peregrina enim Ita-
liæ herba, & ex Creta repetenda est.

De Chamæcisso. C A P. CXXVII.

CHamæcissos, alio nomine Chamæleuce, alio Cissos acarpos, aut
terræ Corona, aut Selinitis, Latine Hædera pluuiatica dicitur.
Folio est Hæderæ, tenuiore, longiusculo, ramulis quinis senisue, dodran-
talibus, foliosis, flore Violæ albæ similis, candidiore, ac tenuiore, gustu
supra modum amaro, radice tenui, candida, inutili. Nascitur in culis. Bi-
bunt conuenientissime ischiadici folia, tribus obolis in aqua cyathis tri-
bus, tricenis, quadragenisue diebus. Eodem pota modo senis aut septe-
nis diebus regium morbum purgant.

B A R B A R I C O R O L L.

CHamæcisson uocant Hæderam, non attollentem se a terra. Spicata est Tritici modo hæc, et
Cissos Epigeos, id est, Hædera terrestris appellatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Similem tantum, non congenerem Hæderæ Chamæcisson sua appellatione græci fecerunt:
licetq; terrestræ, & humi serpente Hæderæ ea uox significet, non tamen Hæderam intelligere o-
porteret, sed herbam cultis locis nascentem, hederaceis folijs, neq; his tota figura. Fastigiantur em
in longitudinem: quod in Hædera non fit. Spargit per terram ramulos hæc suos, non plures qn
q; aut sex: quemadmodum omnes tradiderunt. Nullos fert corymbos: ideoq; sterilis Hædera a
plerisq; dicta quondam fuit. Eadem terræ Corona quondam uocabatur: quoniam ramulos su-
os per eam spargens, folioso ueluti ferto terram coronare uidetur. Eam ob floris colorem Plini-
us ait Violam albam existimari posse, cum floret. Cæteri lutei coloris florem illi assignant. Nec
male forsitan: quando Leucoiorum uox, quibus flores eius hic comparat, nō album magis qm
reliquos eius floris colores indicat. Eamq; ob causam nos, seruata græcorum uoce, uertimus,
Violis quas Leucoia dicunt, similes eius flores esse.

De Chamæleuce. C A P. CXXVIII.

CHamæleuce lumborum doloribus propicia est, hæbra uirens,
incuruis folijs, furculisq; flore rosaceo.

B A R B A R I C O R O L L.

CHamæpeuce, non Chamæleuce, ut fere habent codices, legendum arbitror: quoniam Cha-
mæleuce Populago sit, & Bechion, Chamæpeuce uero Laricis folio similis ostenditur: unde nō
men quasi Larix pumila.

E X M. V E R G. C O M M.

Nulli inueniuntur in græcis antiqui scriptoris huius concordēs in hoc capite codices, duo
saltem: tam male & infelicitè actū cum illis etiam in bonis artibus, ex multo tempore est. Sed
Chamæleucem alius tractandam in hoc capite proponit: alius pro ea Chamæpeucem habet.
In alijs nullum est hoc caput: in quibusdam cum Buglosso, quæ sequitur, & in extrema eius par-
te Chamæleuce miscetur. Et præter id, alij breuissime rem, longius alij absolunt: tam consti-
tuto intellectu, & rei inconstantia, ut quid reddendum nobis esset diu dubitauerimus. Accessit
tandem anxij animo Plinius, monuitq; librō ut cetero quarto, capite, in ancipiti Chamæ-
peucem potius legendum esse: qm quod hic ait πέντε πρόσθεν ἰσχυράτα ἐν ἰσχυρίσιν πινόμενα, il-
le dixerit, lumborū & spinæ doloribus propicia est, eodem rei sensu & uerborum ductu. Veri-
simileq; est, ex his quæ Plinius eadem Dioscoridi reddidit, Chamæpeucem legisse, & hanc fuisse
eius ætate capitis huius sectionem. Chamæleuces enim aliæ uirgines, & alia remedia sunt. De-
scripsitq; idem Plinius eodem loco Chamæpeucem Laricis folijs. Suspendit animo nos tan-

tum Paulus Aegineta libro sexto nullibi tractata Chamæpeuce, Chamæleucem describens: eamq; in tertio ordine calefacere, in primo autem siccare dicens: quo fit, ne pro comperto confuturare aliquid audeamus. Multis em̄, iisdemq; magnis indicij, & auctoribus pugnat: nosq; in tanta uarietate id elegimus, quod latini scriptoris, saltem deficientibus, græcis auctoritate se tueretur. Id certe non tacebimus, uideri nobis non esse integrum Dioscoridis hoc caput. Quale etiam est quod statim sequitur, Buglossum.

De Buglossio, seu Lingua bubula. CAP. CXXIX.
Buglossum Magi Aelurigonon, Osthanes Tranochi, Aegyptij Besor, Romani Linguam bubulam, alij Libanium, Poeni Anasaph uocant. Nascitur in campestribus & uaporosis. Iulio mense colligitur. Aiunt eam quæ treis thyrsos emittit, cum semine & radice tritam, potamq; , contra tertianos rigores prodesse, quæ quatuor ad quaternos. Ea in uino decoquitur. Hærbam abscessibus utilem esse uolunt. Verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitans linguas. Quod in uinum deiectum, animi uoluptates auget.

BARBARI COROLL.
Buglosson, & Buglossos, & Buglossa dicitur. Cato Linguam bubulam appellat: uti em̄ in fitionibus obregendo cortice, ne imber in librum permanet.

Pli. li. 25. ca. 3.

EX M. VERG. COMM.
Diximus non multo ante in Cirso, quid alij de ea & Buglossio hac nostra ætate sensissent: diximus etiam, quid nobis in ea re magis placeret, & quibus coniecturis mutata inuicem duarum herbarum nomina crederemus. Polliciti præterea sumus, in Buglossio hac addituros esse aliqua. Quæ nulla modo alia sunt, q̄ propensiores continue in eam partem fieri, ut credamus, quam ueteres Buglosson dixerunt, nostræ ætatis Borriginem esse. Vtimurq; ad eam rem hac etiam coniectura: q̄ M. Cato. 40. capite operis sui de re rustica, insitione arborum docens, cum instituisset quatenus, & quomodo furculos inseruissē & circumligasse oporteat, addidit, Insuper Lingua bubula obregito si pluat, ne aqua in librum permanet: eam Linguam insuper librum alligato, ne cadat, &c. Verisimileq; est, in operiendo truncæ & insitæ stirpis rotunda sectione, rotundiore potius q̄ longiore folio uti præcepisse. At Borriginis tale est. Eius uero quæ nunc Buglossus habetur, longa folia sunt: ideoq; operienda rotundæ stirpi minus apta. Scimus quidem, non posse, nec debere rem certâ docentes, tã incertis & ambiguis uestigijs niti: potuissēq; antiquos instiores illa etiã uti: quoniã satis esset insitâ stirpem quocunq; operimēto a pluuia defendere: & quod primū inferenti se obtulisset, luto, palea, alijsq; huiuscemodi uis. Non tamē negligendū, qualecunq; id fuerit, ignotæ rei uestigiū. Nec nos alio consilio id reuulimus, q̄ ut haberent legentes, hanc etiã eruscandæ ueritatis ausam: scirentq; , antiquæ Buglossi, quā Cato, oēsq; alij a boum Linguis, quas imitat, bubulam Linguam dixerunt, hunc etiam fuisse in rustica re usum. In urbana autē præcipuū, quod in scriptore hoc postremū est, deiecta in uinum Buglossi folia, uoluptates animi, & læticiam augere: neq; ultra hunc usum Buglossio aliud faciendum ab antiquis scriptoribus tribui. Plinius. 25. uolumine, capite. 9. sic de ea egit. Iungitur huic Buglossos boum Linguae similis: cui præcipuum, q̄ in uinum deiecta, animi uoluptates auget, & uocatur Euphrosion. Mox. 16. capite. 12. Buglossio inarescente, si quis medullam e caule eximat: dicatq; ad quem liberandum febre id faciat, & alliget ei septem folia ante accessionem, aiunt a febre liberari. Quod amuleri potius q̄ medicinae rationem habet. Paulus itidem Aegineta in sexto, de Buglossio hæc tantum monet. *Βούλωσον ὑπὸντι καὶ θερμὸν ἐν τῇ κράνῃ. ὅθεν τοῖς εἰνοῖς ἐκκαλλώδην ὑπορούνην ποτὶν λήγεται.* Quod est. Humidum calidumq; temperamento Buglossum est. Eamq; ob causam uisio iniectum, læticiam animi facere dicitur. Nec ultra hæc quicquam de Buglossio tradidit. **GALENVS** etiam nihil dictis ab alijs aliud addidit, quàm tussibus & faucium asperitatibus utilem esse. Nullusque non ex antiquis, læticiæ & uoluptatis spem in Buglossi usu legentibus proponit: quod in Borragine nunc passim fertur. Verisimileq; est, quali per manus traditam seu opinionem, seu famam ad nos peruenisse, & adhuc seruari. Non utimur ad hanc rem populari, omnino sensu, & iudicio plebis: non tamē negligimus penitus. Quodq; nos magis urget, Cirsi historia est, in

V iij

DIOSCORIDIS

C qua flores *ἀκροκόρυφοι*, id est, in summo purpurei describuntur: qui color proprius floris eius est quā Buglossum nūc passim uocant. Vrgent longiora folia quæ in Borragine decurtatæ rotunditatis sunt. At dicit aliquis: boum Linguis similior nostræ ætatis Buglossus q̄ Borrage est. Non negamus id. Verumtamen illud etiam monemus, nescire modo nos quæ fuerit antiquis Græcis comparationis huius ratio: & quid nam boum Linguae illi comparauerint: uerbi causa asperitatem, latitudinem, colorem, longitudinemue. Pro nostræ ætatis Buglosso longitudo præcipue & color est: pro Borragine contra tam multa hætenus numerata indicia, quæ diligentius cæteri etiam excutient. Nos enim pro deprehendenda ueritate, cogitanda alijs hæc tantū proponimus. Nec laboramus pro re (cunctis em̄ nota est) sed pro medicæ materiæ antiquis nominibus & historia: quæ a posterioribus græcis toto hoc capite male habita est. Cre- dimusq; nos, ex obseruatis hætenus, non esse Dioscoridis quæ a principio capitis longius le- gunt, usq; ad, Verbasco similia habere folia, &c. Quæcunq; em̄ a Serapione, antiqua scriptoris huius interpretatione, & aliquot græcis Buglosso huic tribuunt, nulla alia sunt, q̄ Verbasco si- milia habere folia. Folio in terrâ deciduo esse: eodemq; aspero, & uigriore boum Linguae simi- litiq; in uinū coniectum, læticiā augere credi. Cætera nulla in antiquioribus græcorū codici- bus & latinis scriptoribus sunt. Et Plinius, quæ nunc in scriptore hoc legunt, dandam esse scilicet Buglossum hanc quæ tres caules protulerit, ad tertianas: quæ uero quatuor, ad quartanas, non Buglosso, sed Cynoglosso tribuit. Verba eius sunt lib. 25. capite. 8. Lungitur & Cynoglos- sos caninas imitans linguas: aiuntq; quæ tres thyrsos feminis emittat, eius radicem potam ex aqua ad tertianas prodesse: quæ quatuor, ad quartanas. Accedit his etiā carpendi Buglossum hanc Iulio mense præceptum: quæ hic scriptor Romana uoce *ἰούλιον* uocat: quod in græcis an- tiquis scriptoribus nunq; aut raro inuenitur. Dico autē antiquos, nondum penitus oblitterata græcorū re: quoniā post Cæsares Romanos, latinis mensū appellationibus potius, q̄ græcis, suadente id fortuna eius gentis & maiestate, usi oēs sunt. Quodq; coniunctū huic est, non con- fuisse Dioscori, tempore notas ex mensibus accipere, sed ex anni tempestatibus: uerbi causa, solstitijs, uere, autūno, hyemeq; & æstate. Scimus medicinæ hæc nihil, aut parū conferre. Sed nos herbariā tractamus: conamurq; in hoc scriptore, minus corruptā saltem latinis eam redde- re: quoniā integram in tanta posteriori incuria & imperitia impossibile est. Effugerat pene nos quod ad Buglossum & Boraginem, earumq; notas adhuc pertinet. Id huiusmodi est, Cirsij Buglosso hic similia esse folia dixit, mediocriter hirsuta, longioraq; & albescencia, in extremi- tatibus aculeata: Buglosso autem *φύλλον χαμαιπυτίς, τραχύτι καὶ μιλάντιρον*, quod est, folium in terram deciduum, asperumq; & nigrius. Conferatur nūc cum naturæ exemplaribus utriusq; historia, carptasq; ex horto Buglossum & Borraginem diligentius contemplemur. Mihi sane prior illa Cirsij historia nostræ ætatis Buglosso respondere, posterior autem Borragini undiq; uidetur. Sunt enim Buglosso folia longiora q̄ Borraginis. Albicant illa, hæc contra nigricant. Illa surgūt, & per se stant in altum nitentia: Borraginis in terra iacent. Estq; illi proprium quod hic ait *χαμαιπυτίς*, id est, humi stratum folium.

De Cynoglosso.

CAP. CXXX.

κινόγλωσσον

Cynoglosson, alijs Phyton, alijs Caballation, alijs Splinēion, alijs Scolymon, Romani Linguam canis, aut caninam appellant. Fo- lia latifolia Plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa. Caule uacat, & humi sternitur. Prouenit in sabuletis. Folia cum suillo adipe ueteri, me- dentur morsibus canum, alopecijs, & ambustis. Emollit aluū, decoctum hærbæ ex uino potum.

BARBARI COROLL.

Cynoglosson, topiarijs operibus gratissima est: dicta, quia caninas imitetur linguas folio. Est ei similis alia, & quæ ferat lappas minutas.

EX M. VERG. COMM.

Canis Linguam herbam nouit Etrusca omnis rustica plebs. Vtitur enim ad ulcera, & mi- nora uulnera. Ostenditq; eam sine caule, & paulo minus q̄ cunctis isdem huic scriptori notis. Nascitur plerunq; inter uites, uiuereq; tota hyeme. Nos eam sæpe uidimus folioso cespite, ra- dice pollicis humani crassitudine, albicante colore, & supercurrente asperitate: quam credi-

mus nominis & comparationis ad caninam linguam caussam fuisse. Est enim canis qualis pſa-
risq; alijs animalibus, Scobinae modo asperior lingua.

De Phyteumate. CAP. CXXXI.

Phyteuma folia habet Radiculæ, copiosum semen, perforatum, ra-
dicem paruam, per summa terræ nitentē. Quam ad amatoria con-
uenire nonnulli scriptum reliquerunt.

Phyteuma negat se descripturū Plinius, quasi superuacua, & ad amatoria tantū utilem.

De Leontopodio. CAP. CXXXII.

Leontopodion aliqui Zöonychon uocant, alij Aetonychon, alij
Cemos, alij Damnamenē, alij Idiophyton, nonnulli Phytobasilā,
alij Croffion, alij Croffophthoon, Magi Sanguinē Crocodili, alij Cro-
comerion, Aegyptij Daphnōenen, Romani Minerciū, alij Palladiū, alij
Flāmulam. Digitalis est hærubula, folia ferens angusta, longitudine ternū
quaternūue digitorū, hirsuta. Quæ iuxta radicē spissiore flocco canescūt.
Capitula in summo caule, quasi dissecta, flores nigri: semen usq; adeo spissa
lanugine inuolutum est, ut sæpe fallat. Radice parua cohæret. Quam tra-
dunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

Leontopodion, si amatorijs tantū nascitur, diuersum uidetur a Leontopodio, de quo Pli-
nius ita scribit, ut ab eo aluum fisti, bilem purgari prædicet, semine lymphatica fieri somnia,
campestri & gracili solo nasci, Litheoron & Coripetron ab aliquibus uocari: nisi de hac loqui-
tus intelligatur, cum dixit, Silebitur a nobis & Cemos: cum sit usus eius inquit ad amatoria
dumtaxat. Quandoquidem Leontopodion & Cemos uocari Dioscorides hoc loco testis. Ce-
mos autem uidetur appellata, ex floribus siue calycis figura: quoniam Pyxidectula Athenis ita no-
minabatur, per quam suffragia in subiectum uasculum, quod Caddiscum uocabant, demitti
consueuerant: quod & Venerijs hodieq; seruatur. Pollux auctor. Leontopodion hanc, & in
uerustissimo Dioscoride appictam uidimus: simillimam herbæ quam uulgus ex nostra con-
suetudine Calendulam appellat, ut eadem omnino esse uideatur: Leonis habere nomen uerissi-
mè est, & illam quam ita carmini suo Columella inseruit,
Et hiantis fœua Leonis

Ora feri.

Et alibi.

Oscitat & Leo.

Nec præterea quid de ipsa prodam, habeo.

EX M. V E R G. C O M M.

Esc Leontopodio eandem Camon, de qua Plinius. 27. uolumine, capi. 9. negauit se quicq;
scripturum, quoniam ad amatoria tantū usus eius esset, pro comperto nobis est. Vidimusq; nos
antiquissimos & optimos græcorum codices, in quibus non Leontopodion, sed Camos capi-
tis huius titulus est. Habemus & uetustissimū longobardis literis scriptum latinum Dioscori,
in quo pariter non Leontopodion, sed Camos est: isdemq; omnibus hoc capite alijs, sola in
græcis & latinis tituli capitis, & plantæ appellationis diuersitas est. Magno argumēto, non dis-
ferre Leontopodion a Camo, nisi sola appellatione. Profuit plantæ huic binominē esse. Peri-
isset enim tota, nisi amissio altero nomine superfuisset alterum quod indicaretur. Infamis amorū
ueneficij ea quondā fuit. Credimusq; nos, Camon dictam, quasi frænum. Est enim *καμὸς* græ-
cis inter cætera reticulatum, aut ex utrinus textum fræni genus. De quo quōtidie in Plal-
mo auditur: In camo & fræno maxillas eorum constringet: quo quemadmodū uinciuntur iu-
mentoz; ora, sic in amore amantiū animi retinerētur: eoq; nomine magis q̃ Leontopodij nota
ab his qui pro religione, bonisq; moribus amorū ueneficia hæc odissent, exagitata, appellatio-
nem eam in posterioribus amisit. Seruata tamē illi a diligentioribus altera est, auctusq; nomi-

A

Phyteuma

Leontopodion

Pli. li. 27. ca. 9.
lib. 26. cap. 9.
15. 13.

B

Cum eius numerus. Sed cuncta nostra ætate parum certam habent rationem. Nec cur Mineruium, & Palladiū a Romanis dici Leontopodion in Dioscoride legat, dicere nos audemus.

Hippoglosson aliqui, & id Antirrhinon, alij Anarrhinon, nonnulli Lychnida agriam uocant. Frutex est folia habens Rusci figura, & spinosam comam, & in summo ceu linguas e folijs exeuntes, Capitis dolorem coram ex comis imposita minuit. Malagmatis radix succusq; ammiscetur.

Hypoglosson, & Hypoglossa, dicitur, acinos fert rubētes Rusci modo. Vidimus & hanc. Corollæ genus Hypoglottidas uocari diximus in Myrto, aut ex hacherbā, aut e Lauro Alexandrina, quam & Hippoglottida appellabant. Hippoglossis dicitur & morbus linguæ Hippocrati: quoties tumore obduruit, ita ut salua deuorari nequeat.

Rusci, quæ sylvestris Myrtus est, folia habere Hippoglosson omnes testantur. Ea non adeo grandia sunt, & præter id in cuspidem acuminata desinūt: eamq; ob causam, siue magnitudinem, siue equorū linguæ figurā in ea uoce intelligas, nulla in folijs ratio eius erit. Nec si etiā, ut in Plinio adhuc legitur, græcam præpositionē hippo, coniunctā linguæ, a græcis fuisse credideris, scriptori huius historię respondebit. *ἵπ' ἄκρον* enim, id est, in summo linguas exire hic ait, *παρὰ τοῖς φύλλοις*, id est, secus & secundum folia. Quæ hic intelligit in caule suprema: qui desinens non folia profert, sed conferet lanuginis potius q̃ foliosæ comæ in latitudine se aperiens inuolucrū: non aliter q̃ in spicatis aliquibus seminibus & floribus fit. Differt tamē a Spica: q̃ rotundæ quatuorue plerūq; angulis Spicæ furgunt: in hac q̃d ultimū in caule exit, in latitudine se explicat. Et quoniā humanam linguā imitatur, ideo factō a græcis nomine, Hippoglosson, quasi grandis lingua dicta est. Et hæc nobis origo noīs & causā est. Quæ licet historię Plinij diuersa forte aliquibus uideat (ille em̃ ait. Et in hīs ceu linguas folio paruo exeunte de folijs) meminerint tamen oēs, sequi nos græcos scriptores, p̃cipueq; hunc: & in uertēdis uocibus eius quā debemus fidem illi præstare, qui *ἵπ' ἄκρον παρὰ τοῖς φύλλοις* prodire linguas ex Hippoglossō dicens, q̃d est, in summo & secundū folia, nō ex folijs, sed ex summo caule, qua parte desinūt folia exire ea dixit. Id enim *ἵπ' ἄκρον* aperte significat. Cæteræ appellationes ex similitudine aliqua, uerū importune illi accreuerunt: ideoq; non tractandæ a nobis.

Antirrhinon, alij Anarrhinon, nonnulli Lychnida agriam appellat, hærbam caule & folijs Anagallidi similem, flore albæ Violæ, purpureo. Ideoq; sylvestris Anagallis nominata est, semine uituli narium. Tradunt perunctos ea, cum Cyprino oleo, aut Lilino, uenustiores fieri: nec ullo medicamento lædi posse, si quis appensum gestet.

Anarrhinon, & Anarrhinon, & Antirrhizon, siue Anarrhizon. Similem Lappæ tradunt. Quidam Lino, ut arbitror corrupta lectione, pro Aparina. Radice nulla, siue minima, flore Hyacinthi, Plinio. Galenus hanc & Bucranion, hoc est, bubulum, aut uitulinum Caput dici meminit.

Plures in græcis Anarrhinon, q̃ Antirrhinon uocant, a uitulorū naribus, quarū figura semen est, factō nomine herbam: quæ folio paulo minus q̃ hederaceo tota figura est: flore qualis Viola purpurei coloris, ut nostræ ætatis herbarij ostendunt: qui deprehendisse nobis eam uident. Multifaciendū, & in honore habendū Anarrhinō hoc erit: si quod hic, Pliniusq; & ante eos Theophrastus testati sunt, ad gratiā & uenustatē homini proficiat. De eo Theophrastus libro. 9. de plantarū historia his uerbis egit. *ἑν κλειαν γάρφαριν αὐτὴ ποτὶν τὸ ἀντίρρινον καλούμενον. τοῦτο δὲ οὐκ ἐστὶν ἀπαριν. ἥσα δὲ οὐχ ὑπὲρ οὐδὲ καρπὸς ὥσπερ μόχου ἵνα ἔχει τὸν δ' ἀπὸ τοῦτον ἀλιφώδην ἰνδολεῖν.* Quorū sit sensus, Gloriā enim ferunt continue Antirrhinon facere. Aparine simile id

est. Radicem non habet, Semen vituli naribus simile: & qui eo unguntur, ad gloriam proficere. Quae oia ipsam fere uerbis a Plinio reddita sunt. 25. uolumine, capi. 9. Discrepant tamen Theophrastus & Dioscorides aliquatenus. Ille πρὸς ὑψηλὴν καὶ ὑψηλὴν facere Antirrhinon dixit, i. ad gloriam & honorem: hic ἐπὶ χαρῶν fieri eo perunctos, qd ad gratiam tantum pertinet. Plinius uenustiores fieri dicens, Dioscoridē potius q̄ Theophrastum secutus hac parte est. Comparauit Plinius etiam Anarrhini flores Hyacintho, non purpureis Leucois: magnitudinē eorum seruato colore indicans. Sunt enim Violis illis minores: ideoq̄ Hyacintho similiore.

De Catanance.

CAP. CXXXV.

Catanance aliquibus Dānamete, alijs Dionysias, alijs Thyrsion, alijs Demos, alijs Cemos, alijs Crotion, Magis Archaras, alijs Arcopus, Romanis hærba Filicula, alijs Datisca, Dacis Caropithla dicitur. Ex eo genere una folia Coronopi habet longa, radicem lunci modo prætenue, capitula sena, septenaue, in quibus Erui semen inest. Arescens in terrā flectitur, & se contrahit ad speciem unguis milui exanimati. Altera mali paruae magnitudinē explet, radice exigua, colore, figura & magnitudinē Oliuæ: folijs mollibus, diuisis, humi prostratis. Semen ut cicer in ramis dependet, multis foraminibus pertusum. Vtramq̄ narrant in amatoria expeti. Thessalicæ mulieres his uti traduntur.

Catanance, Thessala est herba. Huius secunda specie ab herbarijs nostris inuenitur Bistoria nomine.

De Tripolio.

CAP. CXXXVI.

Tripolion aliqui Psychen, alijs Merida, alijs Potamogitona, alijs Stachyten, Romani Callium marem nominant. In marinis nascitur locis, quæ allidit unda, recedensq̄ dimittit, neq̄ in mari, neq̄ in secco. Folio Glasti latiore, arido: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, ut tradunt, flores colorem ter in die mutant. Mane candidi, meridie purpurei, sero punicei conspiciuntur. Radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drachmis duabus in uino pota, aquam, urināq̄ per aluum extrahit. In medicamenta digeritur, quæ uenena arcent.

Tripolium, ab aliquibus eadem existimatur quæ Polium, errore manifesto, ut ex earū descriptionibus apertissime cognosci potest. Radix crassa Tripolio.

EX M. VERG. COMM.

Animaaduertit multo ante nos Nicolaus Leoniceus (cuius diligentia, iudicium & ingenium nunq̄ satis a quoq̄ laudabitur) uicinitate nominis decipit Plinium, Tripolium quod nunc tractamus, cum Polio iam pridem dicto miscuisse: & quæ alterius erant, alteri tribuisse. Quod nos modo relinquimus, dictis ab eo id tantum adijcētes, non solum miscuisse ea Plinium, uerum in Theophrasti plantis Gazæ eiusdem lapsus causam & auctorem fuisse. Qui in eo Tripoliū legens, plus latino scriptori, quod miretur aliquis, q̄ græco græcus homo detulit. Quodq̄ in Theophrasto erat Tripoliū, Polii uertit. Theophrasti. 9. de plantarū historia uolumine ad finē, uerba hæc sunt. καὶ ὡς δὲ φασὶν τὸ τριπόλιον καὶ ἡριόδιον καὶ μουσαῖον εἶναι πᾶν πράγμα συνδεδεμένον χρῆσται μὴ εἶναι. &c. Ille autē uertit. Adde Polii, quod Hesiodo & Musæo auctoribus, ad oem rem feriā, magniq̄ faciendā perutile prædicat. Esseq̄ Tripoliū, non Polii in Theophrasto legendū, multa indicat: p̄sertimq̄ qd p̄cedit de Periap̄tis, & Alexipharmacis. i. amuletis ab eo dictū. Poterat utriq̄ qd dicimus multa ostendere: qd scriptor hic, f. & quod Theophrastus testatū sunt: sed oim euidentissime nōmē. Neq̄ em Tripoliū uox aliud, q̄ quod ter uersat, mutaturq̄ significat. Quæ rara, & miraculū insit in eo uis est. Fueratq̄ hoc magis in Theophrasto & alijs optandū, q̄ quod ille ait, ἀλλὰ τὰ ὑψηλότερα καὶ ἀπὸ πηγῶν, τὰ, τὴν περιήλυν καὶ ὅλας τὰν ἀλυσί-

D I O S C O R I D I S

C Θεωροῦντες λιγυρὸν τοῦ τριπόλιος καὶ τοῦ οὐκίτου καὶ ὅς τις φασὶ τὸ τριπόλιον καὶ τὸ οὐκίτον καὶ μόνον εἶναι πᾶν πρᾶγμα ἀποδιδόναι χρῆσιν ὡς οὐκίτον. Διὸ καὶ ἐνέχουσιν ἀπὸ νύκτας σκηνὴν περὶ αὐτοῦ. &c. Quorum sensus est. Illa autē minus credibilia, & fatui hominis erunt, quæ de amuletis, & quæ ueneficis aduersantur, tam corporibus, q̄ domibus alligata & appolita. Quemadmodum auctoribus Hesiodo & Musæo, dicunt Tripolium ad omnia quæ digna studio sunt, utile esse. Eamq; ob causam, noctu erecto prope tabernaculo, effodiunt. Et hæc Theophrastus quo diximus loco. Coloris autē mutationem, cuius causam docuisse decebat, ad eas referri causas, ut credimus oportet, quæ ab eodem de conuersione foliorum, claudentibusq; se & dehiscētibus floribus quibusdam referuntur. Quorum omnium una in sole causa est: ab eoq; credendum, fieri in Tripolio tertiam per diem coloris mutationem. Quo enim plus, minusue humoris impetu solis ex flore exsuctum fuerit, eo obscuriore, dilutioreue colore fieri credendum est: mixtionibus enim, exceptis primis, cæteri colores constant.

ἀδίατρον

De Adianto.

C A P. CXXXVII.

Adianton, alij Polytrichon, alij Callitrichon, alij Trichomanes, alij Hebenotrichon, alij Argion, alij Corion enygron, Aegyptij Epier, Romani Cincinalem, alij terræ Capillum, alij Supercilium terræ, Daci Phithophthethela uocāt. Pusilla gerit folia, similia Coriandri, serrata. Cauliculi quibus exoriuntur, nigro colore nitent, pretenues, palmum alti, folijs filicis, admodū exilibus, radice superuacua. Neq; caulem, neq; fructum, neq; florem profert. Decoctum hærbæ potū prodest, spirandi difficultati, suspiriosis, lienī, & felle suffusus, & urine difficili. Calculos frangit. Aluum sistit. Serpentū morsibus auxilio est. Contra stomachi fluctus ones in uino bibitur. Secundas ciet & menstrua. Sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentū morsus crudū illinitur. Alopecias densat. Strumas discutit, furfures in facie, & manantia capitis ulcera ex lixiuio emendat. Desucentes capillos continet, cum ladano & myrrino, & fusino, aut hyssopo, uinoq;. Decoctum eius cum lixiuio & uino infusum, idem præstat. Coturnices, & Gallinaceos pugnatiores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia utilitatis pecorum. In speluncis, umbrosis, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

Theoph. li. 7.
de plār. ca. 13.

Adianton, Capillus Veneris a Theodoro dicitur, frutex topiarius. Aestate uiret, bruma non marcescit. Nomen ei ab euentu, q̄ folium eius persusum mersumq; aqua, simile tamen sic eo uideatur. Radice tam parua, ut possit nulla existimari. Locis opacis prouenit. Perdices in bellum armantur, huius herbæ cibo. Callitrichon, & Polytrichon a capillo dicitur, quem tingit, crispum, densumq; faciens. Dicitur & Saxifragum: non tam quia nascitur in saxis, q̄ calculos mire frangit: sed nigrum magis: quod & breuius est: & Trichomanes priuatim appellatur: de quo statim indicabitur. Adianton candidum est, & maius nigro, & Polytrichon proprie cognominatur, & ab Hippocrate Calliphyton. Etiam si est ubi Calliphylon scribatur. Folia utriusq; Filicis inferiora, aspera, ac fusca sunt, contrario inter se posita frequentia. Umbrosas petras, specus, & manantia saxa diligit.

E X M. V E R G. C O M M.

Coronat interiores puteorū parietes, & fontū margines Adiantum: & quasi fidens, quas tamē odit & respuit, pronus quærit aquas. Non aliter q̄ qui opes sedulus continue quærit, & inuētis miser abstinet. Miraculū in eo Plinius id facit: quasi non multa alia passim uideantur, quæ naturali corporū dissociatione, misceri simul quacunq; etiā illata ui nequeunt. Ex eo nominis illi causa est, quā duobus uersiculis in Theriacis suis Nicander tradidit. Ea est huiusmodi, ἀχαλὸς ἐπ' ἀδίατρον ἐν οὐκ ὁμῆσει παύειτο, ἀπὸ δὲ πίπτουσα νετὶσ πτάλοισιν ἰσχύει. Quod est, Purumq; Adiantum, in quo nec descendente imbre, minimū e caelo cadens stillicidium folijs

insidet. Docuit idem Theophrastus .s. de plantarum historia. τὸ τε ἐπὶ τοῦ ἀδiantοῦ συμβαῖνον ἐνδὲ γὰρ ὑφαίνεται τὸ φύλλον βρεχόμενον, ἐνδὲ ἰπιδυλον ἰσὶ, διὰ τὸ τὴν ὅτιαν μὴ ἐπιμένειν ὅθεν καὶ ἡ προσηγορία. Quorum sensus est. Et quod in Adianto accidit. Neq; enim madet folium eius aqua cōspersum, neq; humoris aliquid in eo uestigium remanet. Vnde & nomen illi factum est. Plinius etiam. 22. uolumine, ca. 21. Aliud Adianto miraculum. Aestate uiret, Bruma non marcescit, Aquas respuit persusum; mersumq; sicco simile est: tanta dissociatio deprehendit; unde & nomen a Græcis. Omnium græcorum, latinorumq; eadem in nominis origine ratio & sententia est. Vox ipsa etiam indicat. Neq; enim Adiantum aliud est, q̄ quod ὀν διανταται, id est, non madescit. Testatus idem Plinius est Polytrichon, & Callitrichon Adiantum dici: sed diuersa ratione. Polytrichon quidem, quia capilli defluuia explet. Callitrichon autem, quia eos tingit, & speciosiores reddit: utrunq; enim effectum habet. Theophrastus nihil ultra, q̄ χρῆσιμα ἵνα ἀμφότερα πρὸς ἡφυσὴν κερὰς τριχῶν ἐν ἰακίω τριβόμενα. Quod est. Vtilia ambo genera eius esse ad explendum capillo caput ex oleo inuncta. Sequitur appellationes has Trichomanes, quæ secundo generi, de quo mox agendum erit, priuatum competit. Succedit illi etiam quæ in cunctis græcis pariter legitur, Ebenotrichon: ex qua nos credimus in latinis factum nomen, quod in cōmuni usu est Capillus Veneris. Id in antiquioribus inuentum hæcenus a me nō est. Dico autem antiquiores, Theophrastum, hunc ipsum, Plinium, & his æquales alios. Ideoq; oborta suspicio est, ex corrupta uoce illa Ebenotrichon, Veneris Capillum factam fuisse. Bē enim syllabam, græci, uepronunciant. Facilisq; potuit lapsus esse ab audito Euenotricho, in Veneris trichas, id est, capillum. Suspicionem tamen hanc, non decretum uolumus esse. Alioquin ex Ebena, quæ nigro colore est, factum id nomen fuit: & ad Adianti Trichomanisq; nigros colículos translātū. Neq; enim aliud Ebenotrichon q̄ Ebeni capillum, id est, nigrum, & quali colore Ebenus est, significat. Cæteræ Adianti appellationes quæ in Diosco. leguntur, satis certam habent causam & originem: ideoq; a nobis relinquuntur. Sed non relinquenda quæ Theophrastus eodem libro retulit. γινώσκ' αὐτοῦ δύο, τὸ ἰσὲν λευκόν, τὸ δὲ μέλαν. χρῆσιμα δ' ἀμφότερα πρὸς ἡφυσὴν κερὰς τριχῶν ἐν ἰακίω τριβόμενα. οὐνοῦται δὲ μάστιγα πρὸς τὰ ὑπερλά, ὅς δὲ οἰονταί τινος, καὶ πρὸς τραγούριαν τὸ τριχομανίαν πειρῶν, ἔχουν δὲ τὸν κανλὸν ὅθεν τὸ ἀδιάντω, τὸ μέλαν. φύλλα δὲ μικρά, φέδρα καὶ πυκνά καὶ πυκνότερα κατ' ἀντικρὺ ἀλλήλων, ἴσα δὲ ὅχι ὑπὲρ, χωρία δὲ φύλλ' οὐκ ἐκτρά. Quorum summa hæc est. Genera autem eius duo. Alterum quidem candidum, alterum nigrum. Vtrunq; tamē explendis in capite capillis utilem quem usum ex oleo conficitur. Nascuntur aquosis locis, & ut opinantur multi, facit ad uesticæ stillicidia quod Trichomanes uocatur: habetq; caulem nigro Adianto similem: folia parua, densaq; contrarijs inter se pediculis pendentia. Radix illi nulla est: amarq; umbrosa loca. Et hæc pro Adianto & Trichomane Theophrastus: quæ a Plinio ipsdem fere uerbis reddita sunt quo diximus loco, longe diuersa ab his quæ Diosco. tradit: qui Adiantum Coriandri folio describit: neq; in eo candidum aliquod genus numerat, sed nigris coliculis & hoc & Trichomanes describit. Sed nec Theophrastus etiam in qua parte candidum id genus sit, retulit. Verumtamen ut obseruasse licuit, & ex his quæ Theophrastus indicat, totius generis nomen Adiantum est. Idq; statim diuiditur in candidum, & nigrum. Vocaueruntq; candidum, quod comparatum alteri albicantibus folijs sit. Quod enim ad colículos pertinet, totum genus nigros habet: in candido tamen argentibus se coliculis continue minus nigrescunt, defluuntq; in summo colore uiridi. Sed certius discrimen in folijs est, quæ in nigro minora, pennata, & Filicis modo disposita sunt: in candido qualia in Coriandro, incertis interuallis prodeuntia, et in extremitatibus incisuris diuisa. Longius itidem candidum nigro est. Hancq; rationem secutus Plinius ait. Duo genera eius, candidius, & nigrum breuiusq;. Id quod breuius est, Polytrichon, aliqui Trichomanes uocant. Quæ tota est huius scriptoris historia: qui primo candidum hoc Adianti appellatione, mox nigrum Trichomanis indicat. Non est difficile utrūq; inuenisse. Sed quoniam frequentius illud nascitur, habetq; easdem huic uires, ideo notius & in frequentiore usu: idq; tantum Veneris capillum nunc uocant. Facillime in Diosco. omnia intelligit, qui oculus testis, fide sensus ad ea utetur. Neq; enim dubitare poterit, qualia in Adianto Coriandri folia dicantur: & quomō ἐπ' ἄκρον ἰχθυοειδῆ, quæ alij interpretes serrata & cacuminibus diuisa dixerunt. Cum tamen impares foliorum incisuræ sint, & aliter se habeant q̄ in serratis: neq; in cacuminibus tantum, sed undiq; per extremitates diuidantur. Credimusq; nos, qd in Adianti folijs legit, Filici similia abundare, & ex altero genere ad historiā huius translātū esse: ideoq; uirij nota eo loco adiecta est. Nihil enim Filicis folio Adiantum hoc simile habet: neq; si tota folia, aut earum segmenta inuicem compares. Fuerat ob eam causam animus, duas resue illas uoces tanq̄ inutiles relinquere: sed in cunctis græcis latinisq; inuentas seruauimus.

C presertim dicere Plinio, Vtrique ramuli nigro colore nitet folijs Filicis. Verumtamen, ut paulo ante praemonstrauimus, non possunt simul Coriandro & Filici eiusdem plantae folia comparari. Suspiciari sumus, & adhuc suspicamur, non esse integrā primā huius capitis partem: perijisset uoces aliquas, quae certiorē totius Adianti historiam facerent: & quae nunc tam incerta leguntur, reliquias illius esse: quae truncata intellectum miscerent, coguntque legentes incertis animis inter Adiantum & Trichomanes esse. Sed qualē nos diximus paulo ante, ut credimus, utriusque historia est. Adianti appellatione in toto hoc genere antiqua medicina uisa semper est: & quod generis ea uox est, & quod omnis Adianti eadem uires ad omnia sunt. Paulusque Aegineta cum de Adianto egisset, de Trichomane nihil tradidit, praefatus, in Adianto dictum de eo fuisse.

τριχομανίς
ἀδιάντων

T De Fidicula seu Trichomane. CAP. CXXXVIII.
Trichomanes aliqui Pterion, alij Opteron, Romani Capillarem, alij Pinulam, alij Fidiculam, nonnulli & eam Adianton appellant. Nascitur eisdem in locis quibus Adianton, Filici simile, sed exilius, folijs Lenticulae, tenuibus, in ordinem utrinque digestis, aduersis in se, ramulis acerbis, fusco colore splendentibus. Eadem quae & Adianton praestare posse, constat.

T RICHOMANES Adianti genus alterum, Calytrichi cognomine, breuius & nigrius, tenuissimis iuncis, radice minima, gustatu feruens. Primum uero genus Adiantum Polytrichon uocatum iuncos albos habet, & folia plura, maioraque: frutice quoque maior est, ut praediximus.

S VSPICARI ex Trichomanis historia facile diligentioribus erit, quod paulo ante dicebamus, credere nos in Adianto uitium esse, relictasque a librarijs uoces, membrumue aliquod, quo ille Theophrasti exemplo totum Adiantum diuideret, Trichomanesque hoc non illud Filici similia habere folia diceret. Huius enim, non illius iudice sensu similitudo ea est: ideoque Pterion, quasi Filiculam a quibusdam dici Dioscorides ait. Pterion enim graeci Filicem uocant: cui folia similia, pariterque in ramulis nascentia hoc genus habet. Eupteron alij itidem dixerunt: quoniam pennarum folium eius sit, nec aliter quam in alis auium pennae folia deinceps in eo sint. Eas omnes uoces imitati Romani, Capillarem, quae Trichomani responderet, Pinulam, quae Eupterio: Filiculam, quae Pterio responderet dixerunt. Graeci hoc genus a ui sua Trichomanes uocauerunt, quod rara cute fluentem capillum explet, & subnasci facit. μανέν enim ea gens rarum uocat.

ξανθίων
φασγάνων

X De Xanthio, & Lappa. CAP. CXXXIX.
Xanthion aliqui Phasganon, alij Antithesion, alij Chascanon, alij Choeradolethron, alij & hanc Aparinam nominant. Latini Lappam. Nascitur laeto & pingui solo, & lacubus exiccatis, caule cubitali, anguloso, pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis. Folia Atriplicis habet infecta, Nasturtium odore imitantia, fructum grandis Oliuae modo rotundum, & ut Platani pilula spinosum, qui contactu uestibus adhaerescit. Is ante collectus quam perfecte siccescat, tunditur, & ficili uase reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput nitro ante perfrictum illinatur. Alij in uino tundunt, & ita afferunt. Semen aptissime tumoribus imponitur.

X ANTHION, & Phasganion uocatur a Galeno & Paulo, Phasganon a Dioscoride, Philanthropos ab Aetio, nunc Lappa inuersa, & minor a nostris. Non uidetur quibusdam Xanthion ab Aparina superius descripta differre. Sed cur obsecro Dioscorides & Galenus & ceteri diuersas habuere duobus locis seorsum de ijs prodentes? Quid quod in omnibus graecis exemplaribus, Aparina ex interuallo stellata pingitur quasi Rubia: Xanthium multo aliter ostenditur folio Atriplicis, uel ut quidam scribunt, etiam Solani.

EX M. VERG. COMM.

Plura Lapparum genera, folio, semine & natali solo diuersa: obseruatumq; a nobis est, quæ cumq; hamatis uncis, aculeatisq; & uestium tenacibus seminibus plantæ sunt, in græcis & latinis eodem aliquando nomine indicari: in illis Aparines, in nostris Lappæ. Quæ ueluti generis uox omnibus his est. Inter eas & Xanthion hæc est, numeratis ab hoc scriptore notis satis cognoscenda: sic dicta a græcis ὅτι ξανθὸν τρίχας ποιεῖ, id est, flauum capillum facit. Habet & alias appellatiões, sed nobis parum certas, & ob id alijs relictas. Circa rusticas domos, pingui ut hic ait, sed frequentius humido solo nascitur. Idq; est quod hic ait, arescētibus paludibus. Paludes enim appellat loca etiam, in quibus per hyemem aqua fuerit, æstate uero aruerint. Omnium autem notarum quæ Xanthio huic a Diosco. tribuuntur, nulla certior fructu eius est. Dico autem fructum Lappam, in qua semen est: quem figura grandis Oliuæ, & aculeatū hic describens, facillimam eius deprehensionem fecit. Sed nihil frequentius præmonstratis nascitur locis.

De Avena. CAP. CXL.

Aegilops aliquibus Sitospelos, alijs Siphon, alijs Bromos, Romanis Avena dicitur. Hærbula folia Tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina, ternaue, rubra, quibus aristæ quasi capillaceæ exeunt. Illita cum farina hærbæ ægilopijs medetur. Duriciās discuit. Succus farinæ ammixtus, siccatur, & eorundem gratia reponitur.

BARBARI COROLL.

Aegilops necat hordeum: in quo maxime nasci amat. Festucago a Gaza dicitur. Plinius Auenam græcam uocauit. Hæc non nisi post annum, ex semine suo gignitur. Vere pilosum ei folium ut Lolio, non tamen ut illi pingue. Immitis aspectu, solum emaciat. Radice, culmoq; multiplici, melius in culto erumpit. Remedium, ut arua biennium quiescant: tum plane luxuriantem admissum pecus obrerat & consumat.

EX M. VERG. COMM.

Equi uoca in græcis ad Auenam cunctis notam & ubiq; nascentem frugem, & eam quam modo tractamus herbam Aegylops appellatio, latinis aliquot, ut uidetur, præsertimq; Plinio & posterioribus græcis, miscendi causa fuit, quæ alioquin separanda, & in diuerso genere constitutenda fuerant. Idq; non leui periculo usus, & turpi rerum incertitudine factum est. Qui enim poterit pro Avena fruge modo cognosci, quæ hoc capite a Diosco. describitur Aegylops, duobus, tribusue seminibus in summo rubentibus, & inter ea exeuntibus aristarum modo capillis, quæ secundo uolumine ab hoc ipso scriptore Bromos dicta descriptaq; est: pendentibus in summo paruulis ueluti locustis, duplici cruore diuaticatis, in quibus semen: quæ tota Auenæ frugis pictura, & præfens imago est? Qui etiam poterit idem utriusq; usus esse: cum huius ad oculorum fistulas, quas Aegylopos dicunt, præcipuus usus tradatur: illius ad pulres, quæ tussientibus inferuiant? Qui etiam poterit non imperitus medicæ materiæ haberi Paulus Aegineta, antiquus & medicinæ grauis autor, seorsum de utraq; agens? Bromonq; similem Hordeo uiribus tradens, Aegylopē uero discutiendi uim habere: Pluraq; alia, quæ longius repetenda modo non sunt. Satis enim est, ut diuersæ sint, & constituantur plantæ Aegylops, & Bromos historia, & autoritate eius scriptoris intellexisse. Quemadmodum in hoc ipso uidere facillimum est: qui inter fruges Auenam describens, Bromon eam uocauit: inter herbas autem Aegylopa hoc loco numerans, diuersam ab Avena herbam, non frugem descripsit. Qualis autem Avena inter fruges sit, facile est secundo uolumine uolentibus cognoscere: qualis autem Aegylops, hoc loco cognoscenda erit: in cuius descriptione nihil est quod ad Auenam frugem pertineat. At Theophrasto Aegylops multis locis nulla alia q̃ Avena est: & quæ ab eo illi traduntur, frugis, non herbæ competere uidentur. Nolumus nunc nos in ambigua re tanq; de cōperta agere. Quæ enim de Aegylope ab eo octauo de historia & quinto de causis plantarum dicuntur, huiusmodi sunt, ἀλλ' ἴδον τοῦτο τοῦ βολεῖν λέγεται, τὸ μὴ ἀπὸ πάντων βλαστάνειν ἅμα τῶν σπέρματων, ἀλλὰ τὸ τοῦ ὕδατος ἀνταίτιον, τοῦ δὲ ὕδατος καθάπερ τὸν ἀγρίωπα φασὶ καὶ τὸν λυτὸν. Quorum sensus est. Sed proprium hoc Bulbi est, non nasci simul ex toris seminibus, sed alteram eius partem eodem, alteram sequenti anno: qualem Aegylopem dicunt, & Lotum. Quod Plinius. 21. uolumine, capite. 17. reddidit. Mirum, Loton herbam & Aegylopa non nisi post annum e semine suo nasci: qd

X ij

A

ἀγρίωπα

The. li. 8. ca. 10
Pli. li. 21. ca. 27

B

Virgilinus Auenam
sterilem uocat,
uolentem in se
gignere.folio 112 = libro 1^o Plin.
de Dioscoridis, capi.
17. 107.

C aliqui, rusticaque præsertim plebs Auenæ frugis proprium credunt esse. Idem Theophrastus quoque de plantarum caulis, cum ageret de pestibus & iniurijs frugum, ait, *ἡ ἀρουρα δὲ συγγενῆται καὶ ἡ ἀρουρα ἀρουρῶν ἐστὶν ἀρουρὰ καὶ ἡ ἀρουρὰ ἐν πυρρίσ καὶ κριθαῖς*. Quod est. Et quæcumque singulis feminibus conuascuntur, ueluti Lolium & Aegylops in triticea & hordeacea segete. Qui locus a Plinio etiam libro decimo octauo, capite decimo septimo his uerbis redditus est. Triticum simili modo æra, & hordeum festuca, quæ uocatur Aegylops. Quam feliciter autem ab eo uersum id fuerit, poterunt uolentes collatis Theophrasti græcis uocibus cum latinis eius uidere. Nos illud monemus, festucam, non frugem Aegylopa a Plinio nunc Auenam dici: quæ nihilominus paulo ante Auenam ab eodem dicta fuerat. Videturque uagus in græcorum Aegylope, nunc frugem, nunc herbam describere. Suspicietur merito aliquis etiam Aegylopa frugem Auenam esse, Galenum primo de alimentis dicentem audiens: in triticea & hordeacea fruge cum impedimento aliquo infelicitate egerit, in Lolium alterum, alterum in Aegyloperem sæpe mutari: quod passim in re rustica & agrorum disciplina iactatur. His, multisque alijs ueterum scriptorum decretis & autoritatibus facile receptum est, Aegylopa inter fruges Auenam indicare. Nec nos in re, quæ iam pridem tantopere inoleuit, contra niti decreuimus: & si non desint quibus probare id liceret. Sed quod pro Dioscoridis Auenæ & Aegylope dicimus, huiusmodi est, Auenam frugem Bromon illi esse: traditumque de ea iam pridem secundo nolumine fuisse. Aegyloperem uero herbam omnibus facile cognoscendam esse, si in naturæ contemplatione diligentiores fuerimus: & quas hic illi tribuit feminis in summo coliculo, numeri & coloris notas obseruauerimus. Cubitali fere altitudine coliculus ex folijs, quæ in summa radice sunt, exit Aegylops: primumque florem in candido rubentem profert: mox cum defloruit, capillamenta potius quam aristas molles, prociadum mittit inter grana seminis prodeuntes, duo triaue ut hic ait, sed frequentius tria cum maturescunt rubetia: maiorum locustarum corneis oculis similia semina illa sunt: nec minus nitent: quoque in punicis grana contactu herent, eodem & in capitulo Aegylopis semina illa. Nascitur macro terreni genere, frequentissima in uineis. Inuenitur tamen & in triticea hordeaceaque segete: quæ causa etiam fuit, ut eodem nomine & hæc, & Auenam indicatæ fuerint. Inuenitur tamen & in triticea hordeaceaque segete: quæ causa etiam fuit, ut eodem nomine & hæc, & Auenam indicatæ fuerint. Plinius post ea quæ alijs locis dixerat, & ex Theophrasto uerterat uicesimo quinto uolumine, capite. ii. ex hoc scriptore totam his uerbis descripsit. Et Aegylopos sanar eodem nomine herba, quæ in hordeo nascitur tritici folio, semine contrito cum farina permixta, imposita: uel succo. Exprimatur hic e caulibus folijsque prægnantibus, dempta spica, & in trimestri farina digeritur in pastillos. Et hæc de Aegylope obseruata a nobis in græcis & latinis sunt. Relinquimus autem cogitandum legentibus, an satis ad constituendam inter fruges Aegyloperem Auenamque existimandam Theophrasti de ea historia sit. Quod enim ad Plinium pertinet, manifeste deprehenditur, frugem in Theophrasto Aegyloperem existimasse: in Dioscorido autem herbam paulo ante a nobis descriptam. Non esse autem Dioscorido Aegylopa Auenam, historia eius apertissime indicat. Quæ enim in summo eius duo triaue grana rubetia, & inter grana illa exeuntes ueluti aristas habet, neque sunt in Auenam, neque esse possunt. At in Dioscorido legitur, Bromon dici, & a Romanis Auenam. Impitiorum additameta illa sunt, ab his huic scriptori adiecta, quæ alteram illam Aegylopis significationem cum hac miscuerint, & ubique eandem esse crediderint: propterea, quod hic ait Tritici folio esse Aegyloperem, & Theophrastus ea tradiderit quæ paulo ante longius dicta a nobis fuerunt.

De Bromo Auenæ genere. CAP. CXLI.

Bromos

Bromos hæra quæ aliqui Siphonion, alij Acrospelon uocant, Auenæ similis est, exiccatoriâ uim habens. Decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, et iuri colato par modus mellis adijci, rursus incoquitur, dum liquidi mellis crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam ulcerum efficax est. Alij tritam Aloen addunt, & eo modo utuntur. Cum uicis rosis cocta in uino, grauem oris halitum emendat.

BARBARI COROLL.

Bromos & hæc Auenam est, syluestri fere habitu ut Aegylops. Nascitur inter uicia segetis, spicam ferens. Radice copiosa & multiplici, culmo sparsa. De hac & inter fruges, leguminaque secundo libro diximus.

EX. M. VERG. COMM.

Si descripta hoc capite Bromos herba in frugū genere Avena est, ut in Diosc. legitur bis, nec suo loco actum ab eo de ea fuerit: quod in scriptore hoc absurdum, & historia medicinae eius indignum, si in herbarum genere equiuoca frugi est, non dissimulabo, ignorare me eam palam fateri. Barbarus in Corollario suo syluestris fere habitus hanc esse dixit, multoque ante inter fruges secundo uolumine dixerat: illic de grano & semine, hic autem de herba tradi: discrimenque obseruasse in prima eius nominis syllaba ait: quoniam nūc per, o, nunc per, u, scriberetur. Nos in ignota re, fidem penes autorem uolumus esse. Non tamen tacebimus, non legi hoc caput in antiquioribus & melioribus græcis. Nec qui nobis est uetustissimus latinus Diosc. hoc habet. Obseruauimusque nos, eiusdem fidei, concordemque in cunctis & hunc & illos esse magno argumento, nulla quondam in Diosc. fuisse quæ hoc capite leguntur. Nō uerebimur & illud addere, si diligentius capitis huius phrasis expendatur, ab ingenio & usu uocum Diosc. longissime abesse uidebitur. Quinetiam Paulus Aegineta omnem ex hoc scriptore medicam materiam percurrens, unam tantum Bromon, & eam frugē numerauit. Ob quæ inclinatur animus nobis, ut credamus adulterinum esse hoc caput, & a posteriore aliquo huic scriptori additum. Scio fore, ut audacior multis in censura hac uidear: & contra aliorum omnium placita, & codicum fidem petulantius de his censere: sed nihil timere nos persuadet studiū huius nostri fides, & conscientia: quæ sine aliorum criminatōne, & rerum iactura, suspicionibus saltem (quoniam forte alia ratione non potest) prodesse conatur.

De Glauce. CAP. CXLII.

Glaux Cytiso & Lenticulæ folijs similis, quæ superne uirent, æ uersaq; candidiora spectantur. Ramuli a terra exiliunt quini seniue, tenues, ab radice dodrantem alti. Flores ceu Violæ albæ purpurei exeunt. Nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale & oleo in forbitione, ad reuocandam extincti lactis ubertatem.

BARBARI COROLL.

Glaux olim Eugalacton ex facto uocabatur. Rami serpunt in terram. Est a quibus non Glaux, sed Glax, & Galax, ut a lacte nominata pronuncientur. Hac descriptione inuenitur herba in nostris littoribus, ad Medocacum omnino similis: nisi quod florem habet aureum, non purpureum.

Pli. li. 27. ca. 9.

EX. M. VERG. COMM.

Eugalacton, a copia lactis quam facit, uocasse ueteres græcos Glaucem hanc testatur Plinius est, isdem, aut parum diuersis notis eam. 37. uolumine, capite. 9. describens. Nec alia figura nostræ ætatis herbarij eam ostendunt. Relictum in historia eius id tantum ab hoc scriptore est, quod folia in ramulis deinceps disposita sunt bina: contrarijs pediculis, & exiguis interuallis penata. Legebatur in hoc capite corrupte *κλόνια δι' ἀπὸ γῆς*. &c. Quod est, ut ceteri interpretes uerterunt, Ramuli a terra. Id nos ueterum græcorum fide adiuti, & rei necessitate admoniti, in γῆς, quod est, per terram, mutauimus. Fecimusque id primum autorem Plinio, qui ait. Rami in terram serpunt: sed multo magis, quod inconcinnum erat, bis idem dixisse: primum a terra, mox a radice ramos exire. Satis enim alterum est: nec differt dixisse a terra, & a radice aliquid surgere.

De Polygala. CAP. CXLIII.

Polygala palmi altitudinem petit. Folijs Lenticulæ, gustu adstricto, quæ pota lactis abundantiam facit.

EX. M. VERG. COMM.

Polygalon, & Polygala dicitur. In caule summo folia, ut diximus, Lenticule, gustu astricto.

EX. M. VERG. COMM.

Quam habet solam potestatem Polygalon herba, ipsum statim indicat nomen, in quo sola est multi lactis significatio. Breuissime & hanc Plinius eodem libro, sed capite duodecimo descripsit. Breuis herba ea est, singulari caule: in qua bina folia deinceps figura Lentis, uerum maiora, paruis interuallis prodeunt. In summo ueluti spicatum foliosum cacumen est.

X. iij

C

¶ De Oſyri.

CAP. CXLIII.

Oſyris

OSyris frutex eſt niger, lentus, ramulos ferens tenues, & in his folia quaterna, quina ſenaue, ceu Lini, nigra in initio, dein colore mutato rubefcentia. Decoctum eius potum iuuat arquatos.

BARBARI COROLL.

OSyris, & Oſyrias, ramulos habet nigros, & folia item nigra Plinio. Semen quoq; primo nigrum, poſt rubefcens, cognita mulieribus Smegmate, quod a Galeno, & Paulo, & Aetio Corema, ſiue a pupulis, Corema dici putant.

EX M. VERG. COMM.

Laxandi iecur in medicina uires habere Oſyrim, ueteres graecorum medici teſtati ſolū ſunt: in reliquo uitae uſu mulieribus cognitam herbam dixerunt, quae ad exterendam leuigandamq; cutem ea utebatur. Nominis cauſam & originem nos ignoramus. Nec ſcimus unde ex Aegypto, in qua gente priuatim Oſyris, non contemnendum tunc numen, colebatur, ad herbam tranſierit. Oſtendunt hanc etiam herbarij, modo uera Oſyris ea ſit: intelligiturq; facile quae hinc ait, folia a principio nigra, mutato deinde colore rubere maturitate, & quaſi ſiccitate eum contrahere colorem: quoniam ſuperiora continue nigro colore uiuent, inferiora autem quaſi in more defitura rubente colore illo uidentur.

¶ De aſpera Smilace.

CAP. CXLV

Oſyris

Smilax aſpera ab alijs Epatitis, alijs Lycanthemon, alijs Cynofbaton, alijs Aniceton, alijs Heliophyton, alijs Anatolicon, alijs Dyſicon, alijs Helide, Aegyptijs Lyſte, Romanis Mergina, Etrurſcis Rardia appellatur. Folia habet Periclimeni, ſarmenra tenuia, multa, Rubi modo, aut Paliuri aculeata. Arboreſcandit, ſe conuoluens eis. Fert

Dracemos exiles, qui maturi rubefcunt, guſtumq; leniter mordent. Naſcitur in paluſtribus et aſperis, radice dura craſſaq;. Folia, et acini & ante & poſt epoti, uenenorum antidota ſunt. Tradunt, ſi infantibus nuſper in lucem æditis, quid ex his tritum propinetur, nulla poſtmodum uenena nocitura.

BARBARI COROLL.

Theo. lib. 3.
de planta. hi.
cap. 16.

Smilax trachea, hoc eſt, aſpera, Milax a Galeno dicta, ut a Smilace p Taxo differat. Ergo Smilax Hederæ genus eſt, Cilicia cognomine, importata em ex ea terra eſt in Graecia, folio in acumẽ piſſato qdẽ, ſed & in angulũ depiſſo, nec tñ anguloſo, hederaceo, paruo, & ubi pediculo adalligat fere madido, mediũ callũ ſpinæ mō tenuẽ habente: ſtaminaq; non porrecta ex eo, ut in cæteris folijs, ſed circa eũ cōacta in orbẽ, ab annexu pediculi, ex q̃ & ſtulus quidã gracilis, & cōuolutus pampini mō emittit, flore candido, Liliũ olente, fructu Solani, aut Melothri, aut etiamnũ Labruſcæ, racemis ut Hederæ pendentibus, aut Vuæ potiũ. qm̃ ab eodẽ limite pediculi acinorũ exeant: acinis colos ruber, cōplexis nucleos binos, maioribus ternos, minimis ſingulos. Nigri ſunt nuclei, atq; duri. Peculiare habent racemũ, q̃ latera caulũ ſepiũt, q̃q; unus omnĩũ grã diſſimus propendet ſumũ caule: ut in Rhamno, atq; Rubo. Flore huius coronariũ utunt, quanq̃ ſylueſtri, ut & ſpinæ acutæ. Haecenus Theophrasti de Smilace ſententia. Plinius, Folia ingit Smilacis & Hederæ in coronamentũ ſe dedere. Smilacẽ hãc, & Autophorõ, & aſperam cognominari uideo penes eũ. Coronã ex ea factã impari foliorum numero capitis doloribus mederi. Quidã ingit duo gñã Smilacis dixere. Alterum imortalitati proximũ, in conuallibus opacis ſcandentem arboreſ, comantibus acinorum corymbis, contra uenenata omnia efficaciffimis. Huius lignum ad aures ſeuũ ſonũ reddere. Alterũ genus culta amare, & in his gigni, nullius effectus, ut mox dicitur. Inſauſta Smilax omnibus ſacris, & coronis, qm̃ ſit lugubris: uirgine eius nominis, ppter amorẽ iuuenis Croci, mutata in hunc fruticem. Id uulguſ ignoras, plerũq; feſta ſua polluit, Hederã exiſtimando, ſicut in pœtis, aut Libero patre, aut Sileno, q̃ oino neſcit gbus coronet. E Smilace Codicilli quoq; ſũt, Plurima hæc in iſſis Tẽpe uiuet, ſaxa opicã cõſpicio nitorẽ, oculos tenẽs, ut Helianus ingit. Quãq; de Smilace quẽ Dolichos ſit, uideri poſſet.

est Helianus dixisse. Est autē Dolichos, quam Plinius Siliquam sylvestrem uocauit, id quod tribus Auctoris eius locis inter se collatis, autumo. Vnus est libro eius. 18. Siliqua inquit omnis dira adhærendo. Alius. 17. & circa inquit. Tempe Thessalica, quæ Polypodion uocatur, & quæ Dolichos. Tertius libro. 11. Circa Thessalica inquit Tempe mirū Siliqua sylvestris amplecti radicibus fontem eum dicitur, semper florens purpura. Virruuius tamen hanc, quæ circa Thessalica Tempe nascitur, non herbam, sed arborem intelligit. In Thessalia inquit fons est profluens, ex quo nec pecus ullum gustat, nec beluas: genus ullum propius accedit, ad quem fontem proxime est arbor, florens purpureo colore.

EX M. VERG. COMM.

TRACTATA in Croco fabulosa Smilacis historia a nobis est. Fueruntque tunc ex antiquis alijs scriptoribus repetita, quæ in Plinij & Nasonis lectione nouisse pro Smilace hac oēs oporteret. Eo labore nunc, & ut poeta ait, falce leuati, nec habentes quod illi aliud adiciamus, omnia enim ex Theophrasto, & Plinio Barbarus in Corollario suo coaceruauit, breuioribus in cōmentatione eius erimus. Præsertim nascente ubique inter stirpes, & in sepibus Smilace, cunctisque ob eam causam noto sarmentoso frutice. Cuius flos candidus est, & egregie odoratus. Quæ duæ eius notæ in Dioscoride non leguntur, in deprehendendo stirpe non minus tot alijs ab eo numeratis necessariae: quæ aut forte in hoc scriptore perierunt, aut in uulgari stirpe neglectæ ab eo fuerunt. Nihil pro cognoscenda Smilace certius Theophrasti historia est, quam multis toto opere locis, sed longissime ad finem tertij de planta, hysto. uoluminis tractauit.

De leui Smilace.

CAP. CXLVI.

LEUIS Smilacis folia Hederæ similitudinem habent, molliora, læuora, tenuiora. Huius sarmenta nullis horrent spinis. Conuoluitur arboribus ut prior. Fructum parit Lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac Smilace quadam topiariorum arte tentoria contra æstus molestiam faciuntur. Folia per autumnū decidua. Semine cum Doricnio poto, ternis singulorum obolis, uaria & tumultuosa in somnis obseruari traduntur.

BARBARI COROLL.

SMILAX, siue Milax lia, hoc est, leuis. Diuersa est ab ea, ut præmonui, quæ Smilax Cepea, hoc est, hortensiana dicitur: de qua & alio loco demonstratum est. Leuem Plinius amare culta, & in his gigni scribit: sed nullius effectus esse. Galenus similes eam uires habere prædicat, quas aspera.

EX M. VERG. COMM.

QUATUOR in scriptore hoc, & in reliquis græcis Smilacis genera numerantur. Verum duo hæc primo, per se, & uere Smilaces dicunt. Quæ enim secundo uolumine a Dioscoride tradita & hortensis dicta ab eo & ab alijs est, ex eadem ui uestiendi sepes murosque, & ut hic ait, sepnas faciendi, in censum & nomē harū uenit. Licetque hederaceo folio illa etiā describatur, fructu tamē & semine penitus diuerso est. Hæc enim Lupinis, illa Fœnogræco comparat. Præterea in censu medicæ materiæ, quæ a Paulo Aegineta sexto sui operis uolumine tractat, quatuor eodē nomine Smilaces numerantur. Aspera hæc, & sine aculeis altera: quas Galeni exemplo Milaces, non Smilaces & ipse uocat: quemadmodū in Croco nos etiā diximus. Tertiā hortensem illā, cuius fructus lobia, id est, siliquas uocari, & hic, & ille ait. Quartā postremo Taxū arborem: quā aliqui per, y, discriminis causa scribi uoluerūt. De qua dictū a nobis hoc ipso uolumine fuit: totaque Smilacis omnium in antiquis græcis historia hæc est. Nec contra codicū omnium fidem, ueterūque medicorū auctoritatē nouare aliquid nos audemus. Non tamē credimus, legentibus fore inutile, monere eos, dubitasse nos, & adhuc animo pendere: hortensem illā, lenemque & sine aculeis eandē hanc esse, & pro una duas in hoc scriptore legi. Vtimurque ad hanc dubitationē his coniecturis. Vtraque hederaceo folio describit. Illa graciles caules & clauiculas, quibus propinquis fruticibus se implicet: hæc uiticulas eiusdē rei significatione habere dicit. Illa multo incrementō auget, eousque, ut scænas & tabernacula faciat: idē & hæc facere tradit. Illa semen habet *δυσόνορον*, id est, in somniosum: hæc *δυσόνορον πολλὰ καὶ τὰ παραχρῆσιν*, id est, multa & tumultuosa in somnia facere dicit. His nos coniecturis & observationibus mōniti, dubitauimus eandē esse, & pro una duas numerari. Sed tūc apud nos merito est ueterū medicorū auctoritas.

D I O S C O R I D I S

Cuteos sequi potius q̄ solus importune sapere uoluerim: prefertim uocante Plinio aliquot locis hortensem illā græcorum exēplo Siliquā. Dico autē græcor: exemplo, quoniam illi discernentes eam ab alijs, Smilacē quidem proponūt: sed statim addūt, cuius fructus Siliqua uocat. Veni-
milleq̄ est, hortensem illā in Smilacū nomen, ut diximus, sola similitudine transisse. Et hæc pro Smilace omni satis dicta hactenus sint: meminerintq̄ legentes, quā nos modo tractamus, fre-
quentiorem esse, & in usu coronarū quondam ob floris speciem & odorem fuisse.

De Rusco.

C A P. CXVII.

Myrtus arbor cret.
his de plantis, qui
baccas habet odor,
feras, ex quibz vi-
num conficitur,
quod Myrtiles d.
SYLVESTRIS Myrtus aliquibus, Græcis Myrtacanta, alijs Hieromyrton, alijs Oxymyr sine, alijs Myacantha, alijs Agonon, alijs Scincos, alijs Mintha, alijs Catangelos, alijs Anangelos, alijs Acaron, alijs Ocneron, alijs Cnicem, alijs Lychene alijs Chamæpitys, alijs Chamæmyrte, Beotis Gyrenia, Magis Herculis genitura, Latinis Ruscum appellatur. Foliū fert Myrti, latius, in formā lanceæ mucronatū. Baccæ per maturitatem rubescunt, rotundæ, a medio folio dependentes, ossico intus nucleo. Cubitales ramuli ab radice exeunt, uutiliū modo len-
ti, fractu contumaces, foliosi. Radice Graminis simili, acerbæ, & subamar-
ra. Folia & baccæ in uino potæ, urinā cient. Menses pellūt. Vesicæ calcul-
los frangūt. Stillicidio urinæ medentur. Dolores capitis sanant, & regiū
morbum. In asperis & præcipitibus locis enascitur. Decoctum radices in
uino potū, eisdem præbet effectus. Cauliculi recentes asparagorū uice,
in cibo sumuntur. Amari autem sunt, sed urinam mouent.

D

Pli. li. 23. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L

MYRTUS sylvestris, differt a satua, baccis rubentibus, breuitateq̄, ideo & Chamæmyr sine uocatur. Eadem & Oxymyr sine, atq̄ Ruscus, siue Bruscus uulgo: sed corrupte. Inter herbas sponte nascentes, idoneas cibo numerat, & ex qua sunt rursi scopæ. Ruscum inquit Verrius apud Festū, amplius paulo herba est, exilius uirgulto, fructibus non dissimile lunco. Huius colore mulieres uti solitas, Cato meminit. Hanc & Acoron idē Plinius, sed Dioscorides Acaron uocari scribit. Scio fructū huius Cubebas Maurice uocatas credi: quod q̄ uerum sit, diligenter animaduerti cupio, p̄sertim ab ijs dissentiens qui hoc affirmant. Galenus certe id quod Cube-
bas medici appellant, ipse Carpesiū uocauit, duorū generum. Ponticum, & Laertium, a mon-
tibus Pamphylia: ubi frequens est ita dictū. Inueniri hoc & in Sida copiosum tradit: oppidū
id est Pamphylia. Naturam, & effectum ei reddit, quales ipsi Phu: gustum quoq̄ simile, tenui
oris etiānum, hoc est, subtilioris substantia: propterea & plus uirium in eo esse purgandis, &
exterendis intestinis, quæ sint occlusa: non tamē par uirtute penetrandi Casia, nedum Cinna-
momo, etiam si Quinto inquit ita uidebatur. Vrinam cit, & renes calculis laborantes liberat:
quo argumento Mauri sylvestris Myrti baccas Carpesium, & Cubebas esse putauerunt: præci-
puè, cum nec Dioscorides Carpesium, nec Galenus Myrtum sylvestrem usquā nominent. Est
autē odoratum semen Carpesiū, hoc est, Cubeba. Ferent sylvestris Myrti baccæ, dum recētes
sunt: ossica in ijs duricia. In Carpesio nihil tale. Superuacui existimo, in re confessa quidem, sed
a nobis primū comperta, longiorē moram ducere. Illud in transcurso dixerim. Carpesium si
ore contineatur, claram uocem facere pronunciantibus: ob id Bernardus Iustinianus, homo in
primis doctus, & eloquens, nunq̄ sine hoc semine concionabatur. Sed & illam dorem prædi-
cant: maiore in coitu uoluptatē sentiri ab ijs, qui habeant id in ore: quasi non satis sit in ea titilla
tione mens cōmota, nisi doceamur, quemadmodū nos Venus adminiculatio, & uiolentior
transuersos auferat. Paulus, & Carpesiam uocauit quādoq̄. Nam Opocarpasum, hoc est, lac
& Carpatho, siue Carpatho, ut Dioscorides appellat, siue Carpatha, interim, & Carpesia, ut Pau-
lus, ex eodem sit genere, an diuersum non constat. Illud certum est, inter delibutoria uenena
poni eum succum, libro huius operis supremo. Est & Carpasium lini genus: quod ut Paulus
ait, solum ex omnibus igni non corripitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Ruscum nouisse omnibus facile erit, tam certas in scriptore hoc eius notas ruri inter sepes

Carpesium duo
rum generum.
Semina.
Veneri Myrti conserua-
ta, vel quod hoc ar-
bor gaudet. Huius & u-
nos e mari de peracta,
vel quod est Medicorum
indicant libri, hoc arbor
apta est mulierum ut
usitatis plurimis.

& rupes obseruantibus. Potuit cuspidatus magis q̄ spinosus frutex in usu medicinæ aliquo & fanitatis quondam, ut hic ait, fuisse. Nunc in nullo honore est. Aliquibus locis tamē scopæ ad purganda pauimēta ex eo fiunt. Pueri etiā rubentes baccas ex folijs eius decerpentes, ceu corallijs per ludū se illis ornāt. Rustica postremo plebs in carnario suspendit: tuerurq; eo a murū in iurijs pernas, & casei sui fiscellas, neq; em̄ acuminata in cuspidē foliorū eius cacumina, penetrare animalia illa audent. Quā ob causam Myacanthā. i. Murinā spinam dictā fuisse etiā credimus. Myrtus quare dicta sit Myacantha. Ethruria certe modo non aliunde factō noīe appellat. Theophrastus etiam præter hæc lib. 3. de plantarum historia κερταμύρτινον, id est, cuspidatam Myrtum uocauit.

De Lauro Alexandrina. CAP. CXLVIII.

Laurus Alexandrina, quā aliqui Idæam, alij Danaën, alij Hypoglotton, alij Zaliam, alij Stephanen, alij Daphnon, alij Samothracicen, alij Metirion, alij Hypoglossion uocant. Folio est maiore quam Rusci, molliore, & candidiore, semine inter folia rubro, Ciceris magnitudinē. Ramos spargit in terra, dodrantes, interdum longiores. Radice syluestri Myrto simili, molliore, odorata. Inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in uino dulci. Et stillicidio urinæ auxiliatur. Sed sanguinem extrahit.

BARBARI COROLL.

Laurus Alexandrina, Carpophyllos quocq; dicitur, quoniam super dorsum folij fructificat. Propria nascitur circa Idam: unde cognomen Idææ. Plurima & circa Heracleam Ponti. Frutex topiarij, & coronarij est operis.

EX M. VERG. COMM.

Habet Laurus Alexandrina integrę quantitatis folio supernatum a superiore parte paulo supra longitudinis dimidium minus aliud folium, quod ueluti monstrum aliquod in eo super nascitur & uiuit, eiusdem excępta magnitudine per totum figuræ. Neq; ab re hic utruncq; hoc folium Rusci folijs comparauit: acuminata enim sunt: solaq; ut hic ait, magnitudine, mollicieq; & candore differunt. Habet præterea Alexandrina Laurus hæc aliud, quod Rusco simile sit. ἐπιφύλλοκαρπος enim ut Theophrastus ait, id est, in folijs contra aliarum stirpium naturā fructum fert. Quod hic breuius indicauit, dicens, καρπὸς δὲ ἐν μέσσοις. &c. Nosq; uertimus, fructum fert in medijs folijs. In quo animaduertendum est, fructum ferre Alexandrinam hanc Laurum, in medio quidem folio, quemadmodum & Ruscus: non tamen simpliciter ut ille, sed in geniculo alterius eius folij, quod nos maiori folio supernasci diximus. Illic enim hæret fructus: eamq; ob causam potuit hic scripor ἐν μέσσοις dicens, non media folia, sed inter folia medium nasci fructum testari. Quemadmodum Theophrastus libro primo de plantarum historia his uerbis indicauit. καὶ ἔστι καρποφόρα μεταξὺ περιελθόντα τὸν καρπὸν, ὥσπερ ἡ ἀλεξανδρινὰ Λάφνη. Quod est. Sunt & folia quædam fructum ferentia, & inter se fructum amplexa, qualis Alexandrina Laurus est. Inter se fructum amplexa ait, paucis quod dicimus manifeste indicans. Esse autem Alexandrinam Laurum ἐπιφύλλοκαρπον, id est, in folijs ferre fructum, pluribus locis testatur Theophrastus idem: præsertimq; tertio de plantarum historia uolumine. Idæa Laurus etiā dicta hæc, ab Ida monte est, quo loco speciosior & copiosior forte nascitur. Stephanon idem, id est, coronam, q̄ pro Lauro ad coronas forte uterentur. Crediturq; nos, Alexandrinam Laurum dictam, q̄ Alexander uictor ea usus fuerit: & si Plinius Daphnoidi id tribuat. Scienidum illud etiā, inueniri aliquādo in ea simplicia folia, quæ superna sci alterū illud folium fructus causa. Hypoglotton, & Hypoglossidion uocari a quibusdā eandem hic ait. Idē monuit & Plinius. Factūq; id nomen a lingua est: nec aliud significat, q̄ quod sub lingua habetur, aut huiusmodi quodpiam. In quo non facile persuaferit mihi aliquis, a similitudine humanæ linguæ dictam fuisse. Acuminatō enim mucrone folia eius sunt: a qua figura longe humana lingua abest. Quo fit ut credamus, potuisse quondam sic dici, quoniam ad siccandam linguæ nimiam humiditatem in pueris forte uterentur. Est enim illi acri-

A
ut in Italia.

Myrtus quare dicta sit Myacantha.

Λάφνη ἀλεξανδρινή
Δροσά
ιδέα
δανάη
ἐπιφύλλοκαρπος

B

Laurus quare dicta sit Alexan-
drina.

D I O S C O R I D I S

C monia, & calefaciendi uis. Id tamen in antiquis hæcenus inuentum a nobis non est. Verum tamen scimus, Insuæres, aliasq; gentes aliquas in balbutientibus pueris uti ea: iuberiq; sublingua habere, mares duplex eius folium & foecūdum, simplex uero & sterile illud foeminas. Verum tamen ut diximus, in græcis nullum eius usus habemus auctorem.

De Daphnoide.

CAP. CXLIX.

Daphnoide

Daphnoides Alypo simile, flos ut Nymphææ, cuius medium nuci Cypressi non dissimile, in quo semen. Aliqui Chamædaphnen, alij Peplion, alij Eupetalon uocant. Cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus, multis inde sursum uersus foliosis. Cortex supra modum uiscosus ramos uestit. Folia Lauri, graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur. Flores candidi, bacca cum ematuruit, magna, radix inutilis. Nascitur in montosis. Pituitas extrahit folium recens, uel aridum in potu. Menses ciet & uomitus. Caput inanit commanducatum. Sternutamenta mouet. Bacca quindecim potæ aluum resoluunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 24. ca. 15.

Daphnoides & ipsa Laurus est syluestris, baccis e nigro ruffis, sed alij eam Pelasgon. Alij Cephalon, siue Stephanon Alexandri uocant. Herbarij nostri Laureolam, & hanc & sequentem. Folia huius crassiora Plinio q̃ Laurus, graciliora Dioscoridi. Nec illud præteribo, Dioscoridis mihi uerba non uideri, quibus dicitur, Alypo simile hanc herbam esse floribus Nymphææ. Inuenio & qui Alypoides hanc uocent.

E X M. V E R G. C O M M.

Non Laurum, sed Lauri formâ & spem: neq; eam toto corpore, uerū in folijs & fructu tantum habentē herbam Græci Daphnoides dixerunt. Plinius præter nomina quæ in Dioscoride leguntur, Stephanon, id est, coronâ Alexandri uocari etiâ dixit. Nostræ ætatis peritiores herbarij, hanc priuatim Laureolam uocant: ostenduntq; Laurinis folijs surgentē a terra, furculosum fruticem, cōferētis, coacervatisq; sub folijs seminibus, quæ laurinarum baccarum figura sunt, nigris ut hic etiâ ait, in maturitate. Florem uidere non licuit. Eamq; ob causam nihil pro comperto de eo testamur: sed respondentibus naturæ cæteris notis, uerisimile est, respondensuros etiâ & flores. In quibus damnauimus nos, & explosimus quod a capitis principio statim legabatur, Alypo simile Daphnoides, & florem Nymphææ habere: & quod sequit, in medio floribus esse cono simile quiddā, in quo semen: quoniā non responderent Daphnoidis historiae, & nulli bi in antiquissimis græcis & latinis ea legerent: & paulo post de flore eius legitimo loco ageretur. Nasci multum Daphnoides hoc Theophrastus in Arcadia testatus est. Numeraturq; ab eo inter ea quæ præcipuam purgandi uim habent. Quod hic etiâ indicat, monens per aluū pituitas ducere, uomitiones ciere, mensesq; & commanducatum pituitas oris purgare: quin etiam sternutamenta facere: quæ omnia eiusdem potestatis sunt.

De Chamædaphne.

CAP. CL.

Chamædaphne

Chamædaphnen aliqui & hanc Alexandrinam appellarunt, alij Daphniten, alij Hydragogon, Romani Laureolam, alij Laetagnem, Galli Vsubim. Virgas emittit cubitales singulari ramulo constantes, rectas, tenues, læues, folia Lauri similitudine, læuiora multo, ac uiridiora, semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illinuntur capitis doloribus trita folia. Stomachi ardores mulcent. Ad sedanda tormina cum uino bibuntur. Potus cum uino succus, menses & urinam ciet. Idem facit pello appositus.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 27.

Chamædaphne folio tenui, eadē quibusdā & Vincaperuinca est, herba Topiaria, semper uiuens, in modū linæ folijs geniculatim circūdata, ueteribus inopiā florū supplere solita, cuius

& comedunt asparagi. Porro mihi alia uidetur esse Vincaperuincia, q̄ Chamædaphne: q̄ Vincaperuincia non attollitur, sed serpit, ac se in modum lineæ, ut prædixi, porrigit, flore in purpurâ ceruleo: Chamædaphne affurgit in cubitalem altitudinē, ut Dioscorides, & Plinius confirmat. Potest tamen etiā Chamædaphne dici Vincaperuincia, id q̄d & Plinio placet. Sed ut testatum sit tamē, aliud, nō idem oīno genus esse. Alioquin & medicinae quoq̄ nōnihil uariant. Hydropicis, & auribus, & aluinis prodesse Vincaperuincia dicitur, Chamædaphne capitis doloribus, urinæ, mensibus ciendis, ardoribus stomachi, torminibus.

HVmilis & terrestris Laurus Chamædaphne est, sola foliorū similitudine græcorū adoptione in nomē Lauri & honorē adscita: topiaria herba, si Plinio credimus, & a latinis herbæ eius ætate Vincaperuincia appellata. Quæ si ea est quam Ethruria nunc Vincam herbā uocat, qua defunctæ uirgines in gente nostra ad sepulturam coronatæ efferuntur: & qua familiæ apud nos aliquæ, gentili iure suo, primū ingredientem urbem Archiepiscopum coronatæ, ad portā excipiunt, stipantq̄, & per urbem comitantur, cognitu facillima est: in hortis passim nascens, tenuissimis uiticulis potius per terram serpens q̄ uirgis, ut Dioscorides ait, a terra se extollens: folijsq̄ oleaginis magis q̄ laurinis similibus. Verum a Dioscoridis Chamædaphnes historia longe ea differt, ob eas quas paulo ante numerauimus, & plerasq̄ alias notas, quas uolentibus obseruasse facillimū erit. Meminit Theophrastus Chamædaphnes ad extremū tertij de plantarum historia uolumen: sed tam breuiter, ut nihil possit ab eo aliud intelligi, q̄ ferre Chamædaphnem fructum folijs adnatum: quod a nostræ ætatis Vincæ longissime abest. Ea etiam in nullo ciborū usu modo est, quod ueteres græcorū medici in Chamædaphne fuisse quondam testantur. Siquidem Paulus Aegineta in sexto de ea agens ait, & καὶ ἡδίστην. Quod est: Hæc etiā comeditur. Præterea libro primo quo capite docet de omniū olerum asparagis, cum longius de pluribus egisset, subiecit, παραπλησίως δὲ καὶ ὁ τῆς χαμαὶ δάφνης ἀσπαράγος, id est, Nutrit similiter etiam & Chamædaphnes asparagus. His nos indicijs, auctoribusq̄ persuademur, non esse Chamædaphnem Ethruriæ Vincam herbā. Et nihilominus quæ a Plinio Vincaperuincia, uolumine, capite undecimo describit, nostræ gentis Vincæ satis respondet. Siquidem Vincaperuincam ait semper uirere in modum lineæ, folijs geniculatim circumdatam, topiariam herbam, & inopiam florum aliquando supplere. Quæ omnia nostræ huic competit: in Chamædaphne autem inueniri nequeunt. Quærendum itaq̄, qualis Chamædaphne sit, folio Lauri, cubitalibus uirgis, fructu rotundo rubenteq̄, & folijs adnato, cuius asparagus in ciborum usu esse possit.

A

VERG.

B

De albo Veratro.

CAP. CLI.

Elleborum album aliqui Ascida uocant, alij Atomon, alij Pignato xarin, Magi sanguinem Herculis, alij Polyidos, alij Anaphylton, Aegyptij Somphiam, alij Oure, Latini Veratrum album, Galli Laginum, aliqui Anepsa. Fert folia Plantaginis, aut Betæ syluestris similia, sed breuiora, & nigriora, rubescentia, caulem cauum, quadrantalem, tunicis conuolutum cum arescere cœpit. Radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblongo capite exeuntibus, Caparum modo fibratis. Nascitur in montibus & asperis. Radices messibus colligendæ. Optimū habetur candidum, friabile, carnosum, modice extentū, nec tamen lunci modo mucronatum, quod frangēdo puluerem emittit, & tenuem habet medullā, gustu non admodū feruens, neq̄ saluā subinde ciens. Huiusce modi aut strangulat. Primatū Cyrenaicum tenet, Galaticū aut & Capadocicum, candidiora, & puluere quodam obsita, celerius strangulatus mouent. Vomitione autem uarios extrahit humores. Collyrijs ammiscetur, quæ caliginem oculorum discutiunt. Partus impositum necat. Menses pellit. Sternutamenta excitat. Mures interficit, cum melle & polenta subactū. Absumit carnes, si coquat una. Datur per se ieiunis, & cum Sea

ἐλλέβορος

D I O S C O R I D I S

C sama, aut pisanæ succo, aut halicæ, aut lentis cremore, cum aqua mulsâ, aut pulte, aut quauis alia forbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Preparatio corporum, ac uictus ratio diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius potione scriptitarunt, tum maxime a Philonide Siculo Ennensi, cui nunc assentimur. Quippe longum nimis esset in hac præsertim ædificatione, de materia, simul medicam uiuendi rationem exponere. Dant nonnulli in pulte, aut halicæ forbitione, aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim Veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus nulla strangulationis suspicio imminet, si nulla ualerudo corpus infirmat. Si quidem dum hæc ita contingunt, deiection nihil periculi minatur, quod non intempestiue medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones con- citant subditæ ex eo balani, cum aceto.

B A R B A R I C O R O L L.

Theoph. li. 9.
cap. 10. 11.

Pli. li. 25. ca. 5.

D

Ellebori candidum, hoc est, Veratrum, frigidis gaudet. In Anticyra commodissime purgari fructu eius, quod Sesamæ habet similitudinem, Theophrastus tradidit. Sed hoc Sesamoides uocatur. Coruicibus semen Ellebori gratissimum, scribit Aristoteles: quæ ob causam antiqui eas damna uere mensis, nunc quaeruntur. Nigrum a candido radice tantum differre arbitrantur plerique. Alij etiam folijs, quæ candidum continuo radici annexa, et humi sparsa habeat, caule ferulaceo, breuioreque: quæ Albuci. Plurimum nascitur in Oeta monte, & optimum uno eius loco circa Pyram. Secundus locus Pontico. Tertius Heleatico: quod in uitis gigni ferunt. Quartus Parnasio, quod adulterant Etolico, ex uicino. Sunt qui & Massileoticum inter hæc laudent. Album cum succidit, caput aggrauat. Ideoque celeriter effodi præcipiunt, & Allium præsumi, & uinum forberi: quod Dioscorides & in nigro seruat. Leguntur autem tenuissimæ radices, breuesque: ac uelut decurtatæ etiam hæc. Nam summa, quæ est crassissima, Cepis similis, canibus tantum purgandis idonea est. Veteres radicem, corticemque carnosissimum eligebant: quo tenuior eximeret medulla. hanc humidis spongijs operatam, turgescentemque, in longitudinem fidebant, deinde fila in umbra siccabant, ijs utentes: nunc ramulos a radice sua grauissimi corticis ita dantes. Incidit forficulis Elleborum, & cribratur. Cortex remanet. Hoc submoto, medulla cadit. Album optimum, & quod celerime mouet sternutamenta. Sed multo terribilius quæ nigrum. Durare uim utriusque triginta annis putant. Necantur albo mellea trito, & cum lacte sparsa. Galli sagittas in uenatu tingunt Elleboro, circuncisisque uulneribus tenerem sentiri carnem prædicant. Herophilus, Elleborum fortissimo duci æquabat. Concitatissimum in uis oibus, ipsum imprimis exire. Ideo errauisse antiquos, parcius id præbendo, cum celerius erumperet, quod largius daretur. Reddi post quatuor fere horas incipit, totum opus septenis absoluitur. Nigrum equi, boues, fuesque cauent, cum impune candido uescantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Quibus hæcenus nihil auditum de Veratro fuerit, pigeatque Plinium & Theophrastum legisse, paratus cunctis Barbarus erit, collectis, & in Corollarium suum reuocatis, omnibus antiquorum de Veratro observationibus & dictis. Esti tam nota medicinarum res modo sit, ut nulla noua commentatione indigeat. Rarum ubique nascitur Veratrum: aliquot locis tamen abundat: nec difficile cognitum est: discrimen coloris in radice præsertim.

ἐλλέβορος μέλας

De Veratro nigro. C A P. CLII.

Elleborum nigrum, aliqui Melampodion uocant, alij Ecstomon, alij Polyrhysion, alij Protion, alij Melanorrhizon, alij Cyranion, Magi Zomarition, Aegyptij Isæam, alij Elaphine, alij Cemeleg, Latini Veratrum nigrum, alij Saraca, Daci prodiorna. Appellatur Melampodion, quoniam caprarum pastor nomine Melampus, furces in se Procti filias, primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei uiridia, Platani similia, minora, folijs Sphondylii proxima, subaspera, pluribus diuisuris incisa:

caulis asper, flores purpurei, racematim coherentes, semen Cnici, quod **A** in Anticyra Sesamoides uocant. Quo deiectiones moluntur. Radicibus coheret nigris, tenuibus, a capitulo Capæ simili confibratis. Quarum est usus. In collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Optimū est quod ex quibusdā petitur terris, ut ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensq; Cuiusmodi est Elicone, Parnaso, & Aetolia natum. Attamen Eliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat uentrem. Detrahit bilem, pituitasq; datum per se, aut cum scamonīa, & tribus obolis, siue drachma salis. Decoquitur cum lentē & iusculis, quæ purgationis causa sumptantur. Prodest morbis comitialibus, melancholicis, insanientibus, articularijs doloribus & resolutis. Menses inditum trahit. Partus necat. Purgat fistulas impositum, & tertio die detractum. Item cōtra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibiq; in alterum, aut etiam tertium diem esse finitur. Scabiem sanat, illitum cum thure, aut cęra & pice, & cedrino oleo. Vitiliginibus, lepris, impetiginibus ex aceto medetur. Dentium dolorem collutione mitigat. Erodentibus medicamentis commiscetur. Hydropicorum uentri utilissime imponitur, factum ex eo farina hordeacea, & uino cataplasma. Confitum proxime radices uitium, uinum purgandi facultate donat. Huius resparfu domos expiari arbitratur. Quare inter fodiendum stantes, Apollinem, Aesculapiumq; precantur: ac uitant Aquilę uolatus. Aduolare enim non sine periculo tradunt. Namq; si auis effossionem Ellebori conspexerit, moriturum qui succidit, augurium est. Celeriter effodiatur oportet. Quoniam odore caput aggrauat. Quapropter ad id arcendum fossuri, Allium presumere, & uinum bibere consueuerunt. Nulli ita noxæ opportuni reddunt. Veratri albi mō emedullat.

BARBARI COROLL.

Elleborum nigrum sunt qui Ectomon Melampodion uocent. Hippocrates certe haud aliter fere q̃ Ectomon appellat Veratrum ipsum, præcipueq; nigrum. Porro Melampodion idcirco dicitur, quia Melampodem inuentorem habeat: quem alij diuinationis peritum, alij pastorem fuisse tradunt: & furens Proeti filias Elegē, & Celænen dato caprarum lacte, quas Elleboro purgatas animaduertisset, sanasse in Arcadia, prope fontē Clitorium. Caulis ei similis cādidō. Folia, ut Theophrastus quodam loco tradit, etiam Laurinis similia. Vbiq; prouenit. Religiōse hoc colligitur. Nam & gladio circumscribit, & ad ortū spectat q̃ eruit, præcat, ut id liceat sibi concedentibus Dijs facere. Veratū & nigrū, & candidū ex Anticyra cōmendant scriptores, & poetæ. Anticyra uero hæc in Locride, siue Phocide sita est, ut scribunt Pausanias & Strabo, Nam & aliubi legit Anticyra, hoc est sinu Maliaco, & prope montem Oetam: ubi Elleborū quidem præstantissimum, sed in Phocidis Anticyra melius paratur admistione, ut inq̃t Strabo, Sesamoidis, de quo statim dicemus. Propterea in Phocidis Anticyram, non in Oetam Elleborum poturi secedebant.

EX M. VERG. COMM.

Quæ in extremo capite fabulosa, & ad augendam rei admirationem potius q̃ medicinarum historiae Veratri necessaria a Diosc. referuntur, omnia ex Theophrasti, de plantarum historia uolumine, paucis mutatis reposita sunt. Et si ab eo in ista, id est, adiecta, & ob id falsa uideri omnia hæc dicantur. Longiores in opere hoc nostro, præsertimq; in re nota er-

Pli. li. 25. ca. 6.
The. li. 9. ca. 10
& u.

Strabo. lib. 9.

D I O S C O R I D I S

C mus, si ex eo scriptore cōmentationibus his nostris addere ea uoluerimus. Satis sit græcarum literarum peritis locum in Theophrasto signasse: ignaris uero Plinium lib. 25. capite quinto au-
dire, eadem illa omnia h̄sdem fere uerbis narrantem. Quæ licet plura, nec penitus eadem huic
scriptori uideantur, non ideo tamen ex uarietate uitium suspicari oportebit, Aliter em̄ hic her-
bariam, q̄ illi fabulosam historiam docet.

σάμωιδος
S De Sefamoide magno. CAP. CLIII.
Sefamoides magnum, aliqui Sefamiten, alij Sefamin, alij Lycoscyta-
lion, alij Anticyricon appellant, quoniam in Anticyra albo Vera-
tro in purgationibus misceatur. Simile est Senetionii, aut Rutæ, longo
folio, flore candido, radice gracili, ignaua, gustu amaro, cætera Sefamæ
simile. Ventrem purgat. Datur tritum ad bilis pituitæque deiectione-
nes, quātum tribus digitis capitur, addito Veratri albi sesquiobolo ex
aqua mulsa.

Pli. li. 22. ca. 25
B A R B A R I C O R O L L.
Sefamoides maius, a similitudine nomen accipit. Hoc nascitur in Anticyra, nec alibi, quod
inuenerim. Hoc & Elleborum a Theophrasto dicitur: ut in candido notauimus.

E X. M V E R G. C O M M.
Sefamoidi quemadmodum uox, & præter uocem hic ipse scriptor, Pliniusq; testatur, nome-
Sefami similitudo fecit. Neq; enim Sefamoides aliud, q̄ quod Sefami speciem & figurā habet
significat. Pliniusq; Sefamoides a similitudine nomen accepisse ait: & hic *σάμωιδος* ὁμοιον τῷ σάμωι,
id est, semen Sefamo simile habere. Duorum generum præter Diosc. autore eodem Plinio, & in
græcis Paulo Aegineta, planta hæc est. Siquidem Plinius cum primum descripsisset genus li-
bro. 22. cap. 25. subiecit statim. Est etiamnum aliud Sefamoides. & c. Paulus uero Aegineta co-
lore candido alterum indicans, suas illi uires assignauit: mox alterum maius appellans Vera-
trum passim uocari ait. Nec dubitandum, tam certa ueterum scriptorum testimonia sunt, duo
Sefamoides esse. Vtq; hoc constat, sic contra parum certum est, sint ne eorū in colore, an in ma-
gnitudine discrimina. Antiquissimi græcorum codices, quos uidere licuit, colore discernunt;
uocantq; prius hoc *μύλαν*, id est, nigrum, posterius *λευκόν*, id est, cādidum. Qui uero passim cir-
cumferuntur, a magnitudine & breuitate notas & discrimina eorum ostendunt, *μύλα καὶ μικρόν*,
id est, magnum & paruum appellantes. Paulus Aegineta alterum *λευκόν*, id est, candidum: alter
um *μύλα* id est, grande & maius uocat. Contrariorum tamen ratio exigebat, ut si candido colo-
re alterum signaretur, nigro alterum e diuerso indicaretur: quemadmodum in quantitate factū
in alijs codicibus est: in quibus grande primū, mox breue Sefamoides describitur. Pendemus
q; nos in ea re animo: tam facilis & lubricus lapsus in græcis est, unius tantum literæ mutatiōe
ex nigro ad magnum: et ediuerso, *μύλαν* nigrum, *μύλα* grande græcis significat. Receproq; in pri-
mo Sefamoide semel huiusmodi uitio, facilis in secundo error fuit. Potuitq; hoc & in Dio-
sco. & in Paulo Aegineta pariter fieri. Egre enim persuademur, proposito candido, non reddē-
dum illi fuisse nigrum. Et si recipienda a colore discrimina hæc fuerint, rationari tunc oportet
bit, qua parte colores illi in alterutro Sefamoide inueniendi sint. Quod difficillimum erit. Ob
eam causam inclināt animus nōhis in alteram partem: probamusq; ex magnitudine magis q̄
ex colore in Sefamoide sumi discrimina. Duplicem enim colorem illum, Veratri exemplo tri-
butum Sefamoidi fuisse ex eo opinamur: quod quemadmodum duplex Veratrum est, candi-
dū. f. & nigrū, pmiscueq; Sefamoides Veratrū, & Veratrū Sefamoides, ob eā quā mox dice-
mus causam, quondam diceretur: sic etiam ab imperitis rei, creditū fuerit, candidum & nigrū
oportere Sefamoides dici: Non quatenus diuersa a Veratro herba Sefamoides est, sed quod
illi ob promiscuum ex usu nomen eadem esse credebatur. Fuisseq; usum Sefamoidis in purga-
tionibus Veratro coniunctum, indicant fere omnes. Hic primum dicens. *ὅτι αὐτὴ ἐν ἀντικύρῳ ἔχεται*
πρὸς καλοῦσι διὰ τὸ μίγνυσθαι ἐν ταῖς καθάρσεσι τοῦ λευκοῦ ἑλλεβορίου. Quod est. Qui autem Anticyram in-
colunt, Elleborum Sefamoides, q̄ in purgationibus candido Elleboro misceatur, appellāt. Idē
testatus & Plinius est li. 25. cap. 6. In Anticyra insula tutissime fumitur: qm̄ ut diximus, Sefamoi-
des admiscet. Testatus & Strabo. 9. suæ geographicæ uolumine, in descriptione Thessaliæ, pri-
uatimq; Anticyræ, quo loco sic de Elleboro agit. Postea Anticyra, quo nomine & alia est ad si-
num latens Maleacum & Oetam montem, Illhic mitem Elleborum nasci ferunt, Hic autē opti-

me preparatur. Quo circa frequentes huc aduenæ confluunt, purgationis & curationis gratia. A
Etenim in Laconica pharmacum nasci quoddam Sesamoides semini per se simile, cui permixtum
preparant ceterum Elleborum. Paulus Aegineta tamen certior eius rei causam in. 6. attulit. Cuius uerba
hec sunt. *σισαμοειδὲς τὸ μῆλα ὕψος καὶ ῥοτίνης ἰλλέβορος ὀνόμασι διὰ τὸ ὁμοίως ἰλλέβορῳ καθάριον αὐτοῦ
τὸ αἰσιναι.* Qd est. Sesamoides maius, qd palam Elleborus nominat: qia semen eius pariter Ellebo-
ro purgat. Ex his ratiocinari facile est, diuersam a Veratro Sesamoides herbam esse: & quia
misceretur illi in purgationibus, aut easdem habet vires, Elleborum creditam a multis fuisse:
ideoq; nigri & candidi, utriusq; Veratri modo discrimina ab imperitis inuenisse: sui generis ta-
men herbam, & quia Sesamo simili semine sit, Sesamoides appellatam.

De Sesamoide paruo. CAP. CLIIII.

S Sesamoides paruum, aliqui Coronion, alij Sesamon syluestre uo-
cant. Cauliculi ei sunt dodrantales, folia Coronopi, minora, hirsu-
tiora, & in cauliculorum cacumine capitula florum pene purpureorum,
medio eorum albo. Semen Sesame fuluum, amarum, radix tenuis. De-
trahit bilem, pituitasq; semē ex aqua mulsā potum dimidio acetabulo.
Illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

ARBARI COROLL.

S Sesamoides minus, folio minore q; Sesami. Nascitur in glareosis. Hoc & Sesamoides candi-
dum, a Galeno dicitur.

EX M. VERG. COMM.

SVperest pro Sesamoide dicendum quod superiore capite imprudenter relictum a nobis est.
Nasci Sesamoides in Anticyra. Ideoq; ut hic, & Plinius dixerunt Anticyricon uocari. Quæ eti-
am causa fuit, ut in rei æstimatione misceretur ab imperitis Veratrum, & Sesamoides: qm id-
em natale solum haberent. In quo uidendum diligentius erit, quoniam duæ Anticyræ quon-
dam fuerunt: altera Phocidis urbs, altera in Maleaco sinu insula, utrobi Sesamoides hoc nasca-
tur. Ex antiquis enim scriptoribus plures ad purgationes Veratro faciendas insulam magis lau-
dauerunt in Maleaco sinu, q; in Phocide urbem. Alj in Phocidis Anticyra tutius sumi Veratrum
dixerunt: quoniam Sesamoides hoc illi admisceretur: manifesto argumento, in hac, non illa An-
ticyra nasci Sesamoides. Animaduertendum & illud, miscere Plinium utriusq; Sesamoidis histo-
riam & medicinam: & quæ alterius sunt, alteri tribuere. Quod nominis similitudo, & æquiuo-
ca eorum appellatio uiderur fecisse. Locus est. 22. uolumine, capite. 25. In cuius rei indicatione lo-
cus in eo scriptore corruptus adhuc est, granum Sesamæ dari dicens in uino dulci, ad detractio-
nes quantum trinis digitis capiatur. Sesamoidis enim, non Sesamæ legendum autore Dioscori
de illic est: a quo cuncta illa Plinius accepta latinis reddidit. Poterunt uolentes utriusq; scripto-
ris dicta inter se conferre.

De syluestri Cucumere. CAP. CLV.

S YLVESTRE M Cucumin, alij Elateriō uocant, *σίκυς ἄγριον*
alij Grynion, alij Balin, alij Syncrisin, alij Bubalion, alij Scorpion,
alij Pherombron, alij Peucedanon, alij Notion, Romani Ancetum, alij
Agrestem, Poeni Cusimezar. Fructu solo distat a satiuo Cucumere, lo-
ge minorem pariens fructum, oblongis glandibus non dissimilem. Fo-
lia atque farnerta satiuū refert, radice candida, magna. Nascitur in sa-
buletis, & prope domicilia, frutice in totum amaro. Instillatus folio-
rum succus, aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, ueterem tu-
morem discutit. Imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit.
Ischadicis infunditur. Podagras discutit, decocta ex aceto & illita. Eius
decocto dētes in dolore colluuntur. Aridæ farina impetiginem, lepras,
& uirilgines abstergit. Nigris cicatricibus colorem reddit. Et in facie
Y ij

D I O S C O R I D I S

C maculas expurgat. Radicis succus sesquiboli pondere, & item cortex acetabuli quarta parte, bilem pituitamq; deijciunt, præsertim in hydro-
pici. Deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet. Radicis seli-
bra, præsertim in uini Libyci hemina conteritur, danturq; ex eo terni
cyathi triduo, dum tumor abunde deprimi cernatur.

B A R B A R I C O R O L L.

DE Cucumere syluestri, siue anguino, & erratico dictū in satiuo est. Illud hoc loco memine-
rimus, Balidem a quibusdam uocari, ut inquit Dioscorides, anguinum Cucumerem. Ego Ba-
lin, & Balidem lego dici florem quendam, & alio nomine Ballithum: qui mortuos uitæ restitu-
at: ut & de Arione fabulantur. Photionem habeo grammaticum, qui hoc affirmet post Pliniū,
demonstratam a dracone, qui ea herba catulum sibi occisum reddidit saluti. Cucumerem syl-
uestrem Bubaliō quoq; dici, autores sunt Dioscorides, & Hippocrates. Est ubi Caprificum ita
dici legas: errore nato, q; Caprificus agria, Hyce appelletur. Syluestris uero Cucumis Agrioli-
cys. Alius q; flos habetur, Bellis nomine, pratensis, & candidus, & quadatenus rubēs, aduer-
sus strumas efficax: ut Plinio uidet. Sit autē Bellis idē, q; & Bellius, siue Bellio, & ipse flos praten-
sis, quem Plinius quinquagenis qnis barbulis pastillicantibus Coronatum scribit, animaduertē
dū puro. Quanc; em luteus uidet a Plinio describi Bellio, uolumine primo, & 20. Bellis uero cā-
didus sexto & uigesimo, non tñ ita in omnibus Plinianis codicibus luteū eū esse legimus. Qui-
dā luteū ei semen, nō ipsum florē audiūt; & Paralyfin uulgo dictā interpretant; q; & primus ueris
flos, & Margarita cognominatur: & hyeme q;q; tota nascit, ex occidente, ut qdā existimant, in
Italiā conuectus. Quinquagenas tñ ei ternas, non gnas barbulas inuenio. Laudat ad paralyfin,
a quo & nomen: itēq; ad podagras, & Ischiada. Paralyfi uocatæ florem habet simile, pauciori-
bus tñ barbulis. Flos, qui qm a lōgiquo conspicuus est, Paradelos uulgo dicitur: folio em nō

D admodū diuerso: nisi q; ferratū est huic, non Paralyfi. Sunt q; Bupthalmō, & Bouis oculū ap-
pellent, nam q; Antipatrē uulgo dictū renē eū esse, ligdo fallunt: cū sit Antipater furculosus, &
flore luteo, quasi Cunilaginis minore. Folia Roris marini latiora, minusq; longa; Christophori
anā, & Oculū Consulis nōnulli uocant. Huius illa pprietas, q; flores post nascentes altius tol-
lunt, q; prius nati. De cuius rei argumento uideri posset aliquibus, hanc herbā esse quam Plinius
Impiā uocari tradit. Herba inqt Impia uocatur incana, Roris marini aspectu, thyrsi mō uestita, et
capitata. Inde alij ramuli assurgunt, sua capitula gerētes. Ob id Impiā appellauere: qm liberi su-
pra parentem extollant. Alij potius ita appellatā, q; nullū animal eā attingat, existimauere. Hec
inquit inter duos lapides trita seruet, p̄cipuo aduersus anginas succo. Nec tentari unq; eo mor-
bo qui gustauerint: itaque & suis dari. Quæque medicamentū id noluerint haurire, eo mor-
bo interire. Sunt qui & in auiū nidis inferi aliquid ex ea putent: atq; ita non strangulari pullos
auidiū deuant. Hæc Plinius. Cæterū quanc; similitudo in ea proprietate sit, multa sunt in
ter utrāq; discrimina. Primum, q; Impia, incana est herba: Antipater non est. Alterum, q; trita
non seruet. Tertium, q; nec capitula, nec thyrsos gerit, sed flores dumtaxat.

De Elaterio. CAP. CLVI.

E Fructu huiusce Cucumeris, sit medicamentum quod Elaterium
uocatur, ad hunc modum. Decerpti Cucumeres, qui tacti protī-
nus exiliunt, seruantur nocte una. Postridie imposito supra craterem ra-
riore cribro, utrisq; manibus præhensi, sigillatim supino cultro sursum
uersus aciem habente finduntur, atq; per cribrum humor in subiectū
uas exprimitur. Simulq; carnosum quod hæsit cribro, quo facilius ex-
cidat eliditur, quod ita pressum est, residere finitur, atq; in uicinam pel-
uim demittitur. Coaceruata autem in cribro segmina, dulci aqua per-
funduntur, & denuo pressa, abijciūt. Humor in pelui agitur, & lin-
teo opertus, soli exponitur. Dumq; steterit, tota supernatans aqua, cum
humore concreto effunditur. Hoc uero identidem fieri solet, donec ex-

istens aqua liqueſcat: qua ſtillatim exhausta ſedimentum mortario ſuſcipitur, & conterendo cogitur in paſtillos. Sunt qui ad hauriendam ptinus ſucci abundantiam, cribratos cineres humi inſpargāt, & mediū cauātes, triplicatum linteū obtendant, per qđ Elateriū cum ſua humiditate diffundūt, ſiccātūq; in pila ut dictū eſt, cōterūt. Aliq; p̄ dulci aqua marinam perfundētes, ita eluūt. Alij in nouiſſima lotiōe, muſſam aquā reſpergunt. Elateriū optimū eſſe conſtat lęue, nō pōderoſum, cū cādore leniter humectū, guſtu amariffimum, quodq; lucernarū luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum tamen, ſcabrumq; ſi turbidum ſpectetur, atq; erui cinerisq; plenum ſit, graue & uitioſum eſſe ſolet. Nec deſunt qui Cucumis ſucco amyllum immiſceant, ut candorem ipſum & leuitatem imitentur. A bimatu ad decennium deiectionibus utile eſt. Integer modus obolus eſt, minimus ſemiobolus, pueris chalci duo. Si quidem copioſius, periculum adfert. Bilem ac pituitam alterutra parte extrahit. Optima ſuſpirioſis eſt purgatio. Quod ſi in animo ſit deiectionem moliri, adiectionis ſalis duplo, & ſtibij, quod colorare ſufficiat, ex aqua erui magnitudine catapotia dato: poſtea cyathus unus aquæ tepidæ ſorbeat. Ad citandas tamen uomitiones, aqua diluens Elaterium, ſubiectas linguæ partes penitiſſime pinna oblinito. Quod ſi quiſq; diffi-

A

B

ficilius euomat, oleo, aut unguento irino reſoluito. Somnum inhibeto. Porro his qui eximie uacuantur, continue uinum & oleum dari conuenit. Etenim uomendo reſtituuntur. Quod ſi uomitiones non finiuntur, aqua frigida, polenta, poſca, poma, & quæ ſtomachum denſando corroborant, offerenda ſunt. Ciet Elaterium menſes. Partus enecat in peſſo ſubditum. Morbo regio medetur, cum lacte naribus inſuſum. Diurnis capitis doloribus liberat. Efficax anginarum unguentum eſt, cum uetere oleo, melle, aut felle taurino.

BARBARI COROLL.

Elaterium, Theodorus Agitatorium conuertit. Nullum medicamentum longiore æuo durat. Ducentum enim aņos uim eius pollere Theophrastus aſſerit. Melius, quo uetustius uſq; ad quinquageſimum. Lucernas adhibuit extinguit, hoc enim ueri probatio eſt: ſi prius q̄ reſtinguat, ſcintillare ſuſum, ac deorſum cogat. Pallidum preſtantius, ac leuiter amarum. Huius cauſa maturius ſecatur. Alioquin ſemen exilit, oculorum etiam periculo. Harūdine ueteres incidebant. Tradūt hoc ſucco tactis radicibus uidum, non attingi uuas ab auibus. Ad hunc ſuccum Cucumis Anguinus autumnō carpitur.

Pli. li. 10. ca. 16.

De Satiuo Cucumere. CAP. CLVII.

Satiui Cucumeris trita radix, & drachmæ unius pondere pota in Hydromelite, uomitus ciet. Si quis facile ſecundum cœnam uomere uelit, binis obolis ſit contentus.

De Staphide agria. CAP. CLVIII.

Staphida agriam, alij Triphyllon, alij Steſion, alij Aſtaphida, alij Phthiroſtonon, alij Phthirion, alij Apanthropon, alij Polyides, alij Pſeudopathes, alij Arſenoten, Aegyptij Ibeſæeden, Romani hærbā

ſapiſ agria.

Y iij

D I O S C O R I D I S

C Pediculariam uocant. Folia habet Labruscæ, diuisa, et cauliculos rectos, molles, nigrosq;. Fert florem Glaſti, & folliculos uirides, ſimiles Ciceri, & in his nucleum triangulum, ſcabrum, ex nigro ſubfulueſcentem, intus album, guſtu acrem. Grana quina denaue, ſi trita in aqua muſſa detur, craſſum humorem per uomitum purgant. Sed qui hauſerunt, ambulare debent. Prudenter tamen attendere oportet, & aquam muſſam potui dare. Quoniam pericula ſtrangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo illita, phthiriali prodeſt. Item prurigini et pſoris. Cit plurimā pituitā cōmanducata. Decocta in aceto, dentiū dolori coluto ore ſubuenit. Rheumatifmum gingiuarū ſiſtit. Vlcerā oris manantia, cum melle ſanat. Vrentibus malagmatis imponitur.

Pli. li. 23. ca. 2.

B A R B A R I C O R O L L.

Staphis, ſiue Aſtaphis agria hæc eſt, quæ Pituitaria quoq; dicitur. Cornelius Celfus uuam Taminiam intelligit falſo. Matureſcit enim ſemen huius cum uindemia, nigreſcitq; cum Taminia acini rubelcant, & in apricis naſcatur: & Ampelos agria ſit, non Staphis agria. Hæc nō niſi i opacis. Paulus Galenū ſecutus, duplex genus facit Staphidis, Satiūū, et Sylueſtre: ut Satiūū ſit, quā nos Vuam paſſam uocamus, qnto uolumine reddendā. Aſtaphin, qui Artice loquuntur, Oſtaphin uocabant: ſicut Ominthā pro Mintha, ſiue Mētha: & Oſiacū p Aſtaco. Eſt aut Aſtacus is, quem nos Gamarum quoq; dicimus. Porro eſt locus in Aetio ubi legas, Stephanida agriā mendocſe, ut ſuſpicor, pro Staphide agria: qm ad uitia, pſoraſq; capitis cōmendat eā. Niſi quis Stephanida putet eſſe, quam a noſtris Coroneolam uocari diximus, hoc eſt, Cynobaton: utiq; ſi & hæc, ut Rubi manantibus in capite præſidio eſſe poteſt.

VERG. D

Quam græci agrian Staphida, ſylueſtre paſſam Vuā ſua uoce intelligētes dixerūt, Romani Taminā uuā, Pedicularē herbā, Pituitariāq; uocauerūt. Eſt Plinius contra Celfum aliā a græcoꝝ Staphidagria Taminiam latinoꝝ uuā eſſe teſtatur his fuerit. Eſt ſane græcis Staphis, & ut Athenieſes dicere cōſueuerāt Aſtaphis paſſa Vuā. Ex cuius ſimilitudine hæc ſylueſtri tñ habitu ab ea diſcretā eſt. Vocatūq; latini Pituitariā, Pedicularēq; ex uirib. quas habet. Feruore em ſuo cōmanducata multā pituitā trahit: & erūpentibus e corpore pediculis, ex oleo inūcta aduerſat. Quinetiā, ut Plinius ait, in aceto decocta, etiā ueſtes eo tedio liberat. Facilis cognita herba, tā certis notis a Dioſ. deſcribit: parūq; a græca uoce deſlexa appellatiōe, græcis noſtra adhuc eā indicat. Folia habet plerūq; ſeptē, aliqñ tñ pluribus, nōnunq; etiā pauciorib. incifuris diuiſa. Vtebant ea ueteres græcoꝝ medici in alia in his q Venerē exercere nō ualerēt, ex adipe, cui uuā huius admixtū ſemē fuiſſet, genitālia inungi iubētes. Vtebant & in purgādo capite, cōmanducandā dantes: eaq; ratiōe pituitas eius partis poſ trahentes. efficaciffimē em acrimoniæ eſt. Plinius, quēadmodū pmonſtrauiſmus, falſo Taminā uuā. 2. uolum. ca. 1. his uerbis uocari ait. Aſtaphis agria, ſiue Staphis, quā aliq uuā Taminā uocāt falſo. Sūt em genus habet. &c. Idē. 16. ca. 14. Taminie uuę uires deſcribēs, quę Staphidagrie ſūt palā illi tribuit. Verba eius ſūt. Itē Phthiriali, qua Sylla dictātor cōſumptus eſt. Naſcunt q; in ſanguine ipſo hominis animalia, exefura corpus. Reſiſtū uuę Taminie ſucco, aut Veratri cū oleo perūctis corporibus. Taminia qdem in aceto decocta, etiā ueſtes eo tedio liberat: quę oīa ex ui Staphidagrie huius dicta ſunt: qua pediculos enecantē, & Pedicularē dici in Dioſ. legiſ. Monere legentes hoc tñ uolui- mus, ut inueniſſe & ipſi conent, an de eadē uitā Taminia a Plinio duob. locis diuerſe traditū fuerit. Cur aut Staphida potius. i. paſſam Vuā, q Staphylē. i. ſimpliciē uuā ueteres græci dixerint, folliculorū figura fecit: qui rugoſam uuam magis q integros uuarum acinos referunt. Ob quā cauſam & Plinius ait, folliculos magis q acinos eam ferre.

De Thapſia. C A P. CLIX.

Thapſia

Thapſia aliqui Hypopion uocant, aliꝝ Pancranon, aliꝝ Scammion, aliꝝ Thelyterin, Romani Ferulaginem, aliꝝ Ferulam ſylueſtrem, Pcenī Boeden. Nomen ideo accipit, quod in Thapſo eiꝛdē nominis inſula, primū inuenta ſit. Tota uero natura Ferulæ ſimilis eſt,

graciliore caule, folijs Foeniculi, umbella Anethi in cacumine a singulis
 furculis erumpente, flore luteo. Semen quale Ferulae, latum, sed aliquan-
 to minus, radix nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro uestita.
 Lactis extrahendi ratio hæc est. Facto in ambitu scrobe, cortices incidun-
 tur, aut radix in fornicis speciem excavata, cooperitur quo merus succus
 confluat. Oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum ex-
 trahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallum ex-
 pressus, fictili crasso insolatur. Aliqui folium una terunt. Sed inualidior
 huiusmodi succus. Hoc autem interest. Quoniam qui ab radice mana-
 uit grauius olet, & humidus permanet. E folijs autem extractus exiccatur,
 atque teredinum iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus
 uento, cum dies apricus est, & a flatu filet. Quoniam ob uaporis acrimo-
 niam facies uehementer intumescit, nudaque corpora inuadunt pustulae.
 Ob id prius liquido carato, & adstringente, nudas partes illinunt, & ita
 muniti accedunt. Tam cortex radicis, quam succus, purgandi uim habent.
 Lacteus succus in aqua malsa potus, utrinque bilem extrahit. Radicis mo-
 dus quaterni oboli, cum tribus seminibus Anethi drachmis, succi terni obo-
 li, lactis obolus unus. Quod eo amplius assumitur, periculosum est. Hu-
 iusmodi purgatio conuenit suspiriosis, & diuturnis laterum doloribus,
 reiectionibusque. Datur in cibis, aut obsonio, quibus difficile sit uomere.
 Tam radix, quam succus, omnium maxime quæ pares cum eis uires adepta sunt,
 uim habent transconcretiuam, ubi ex imo aliquid euocandum est, aut mea-
 tum laxitas alio transferenda est. Unde succus illitione, & radix recens
 affricu, alopecias explent. Radix, succusque cum æquis cærae thurisque por-
 tionibus, sugillata liuoresque tollunt. Sed non plus binis horis dimittan-
 tur. Locus deinde aqua maris calida foueatur. Vitia cutis in facie emenda-
 dat, cum melle illitus. Lepras tollit. Tubercula discutit, perunctus cum
 sulphure. Succus in diuturnis pulmonum, laterum, pedum, articularumque
 uoletudinibus utiliter illinitur. Valet ad integendam colic glandem, his
 qui natura, non circuncisione curti sunt. Tumorem enim excitat, qui pin-
 guum fotu emollitus, in pene iacturam refarcit.

T **B A R B A R I C O R O L L.**
 Thapsiae liquor expressus, efficacior quam semen. In Africa uehementissima hæc est. Semen
 Ferulae, Thapsiam aliqui uolebant esse falso. Suum enim genus est inani caule, nec excedente
 baculi longitudinem. Thapsia ob humoris abundantiam opus suum, ut Galenus auctor est,
 sero perficit. Facile corrumpitur. In Theocrito poeta Thapsos legitur, genus herbae, tingendis
 lanis utile: qua & capillus flauescat. Hanc & Xylon Scythicon, hoc est, lignum Scythicum, a
 Sappho dici putant, uulgo Chrysoxylon. Diuersum porro, an idem sit Thapsos quod Tha-
 psia, iudicandum relinquo. In Aristotelis tertio Rhetorico. Hypopion, sunt e Graecis, qui pro
 Thapsia, uel alia herba capiant rubente. Nos pro sugillatione uertimus.

Pli. ll. 19, ca. 9.

C **E X M. V E R G. C O M M.**
 Cognomines diuersis locis Thapsi urbes, insulae, Chersonesique aliquot Thapsiae huius quæ
 modo tractamus ab earum aliqua primo quondam sic appellatae, diuersos natales & diuersas bo-
 nitates laudis fecisse uidentur. Nicander in Theriacis suis ex Sicilia Thapsiam in primis contra
 Y iij

venata laudavit. vñ d' ἀντιοχία τὸν ὄνον ἀκτινία λίαν θριναρὶν καὶ ρίαν ἰλίου γυαλῖα ἐὰν μίαν.
&c. Quod est, Nunc age, composita te malorum remedia docebo. Trinacriam fumito Thapsi
radicem, quæ corpori medetur, &c. Plinius contra, 13. uolumine, capite. 22. Thapsiam in Afri-
ca uehementius esse ait. Hic scriptor, quæ plures alii secuti sunt, in Thapso insula primū in-
uentā fuisse ait: nec bonitatis, maiorisq; in ea efficaciat discriminā aliqua numerauit. Ex eo fit,
ut credamus primā Thapsiæ inuentiōem Thapso, quæ una ex Sporadibus insulis est, debere: &
in ea herbario Crataeā, qui primos illic plantauit, & eius uires obseruasse dictus est: potiusq;
alios ex alijs locis ea potius laudare, q̃ natale solum Africam, Siciliamue, aut alia loca illi as-
signare. Hanc ueteres Græci Hypopion uocant: incipit (nisi uitium in Theophrasto sit
& rei, & nominis significatione. Pro qua intelligendum est, significare græcis Hypopion, cui in
ultima syllaba, i, non, y, fit, sanguinis exiitū fūctūue, aut iniuria aliqua alia, in quampiam cor-
poris partem concursum, integrāq; cutem in eo loco cessantem, & q̃ extra uenas sit, quasi mor-
tuum. Audiatq; Hypopii huius uoce, nihil aliud Græci intelligunt, q̃ cessante sanguine nigre-
scentem cutem. Nec dubium est huius mederi Thapsiam: & ab eo remedio nomen id factum illi
esse. Si quidem hic ait, ὑπόπια τὴ ἔρι καὶ πηλώματα. Quod est, Hypopia & liuores delet. Et Plini-
us rem augens, eodem libro & capite ait, Nero Cæsar claritatē ei dedit initio Imperij, nocturnū
suis grassationibus uerberatā faciem illens sibi cum thure cæraq; & sequenti die contra famā
cutem syncerā circumferens. Solus Theophrastus libro, 5. de plantarū historia aliter Hypopia
quibus ea medetur intellexisse creditur. Verba eius sunt: ἡ δὲ τῶ θαλάσσι ἰμετικὴ. ἰὰν δὲ τὰ κατὰ
τὴν καθαίρει καὶ ὄν καὶ κάτω, δύναιται δὲ καὶ τὰ πηλώματα ἐξαίρειν, ὑπόπια δὲ ποιεῖ, ἀλλὰ ἰλυνκα. Quo-
rum sensus est, Thapsiæ aut uomitoria uis est. Quod si quis eam retinuerit, per inferna pariter
& superna purgat. Facit & Hypopia, uerūtamen candida. Ex his (nisi uitium in eo scriptore sit)
maculas quæ in cute albicāt, Hypopia intellexisse oportet. Neq; em significare aliud potest, q̃d
dicitur, Facit & Hypopia, uerūtamen cādida. Estq; hoc q̃d paulo ante diximus incipit, id est, ad
utraq; partem significatione Hypopion uocant Thapsiā potuisse. Et si recipiendū in Theophra-
sto id est, ad aliā Thapsiæ naturā referenda res erit, ad pallorē scilicet a quo Thapsinus color in
Phocione a Plutarcho dictus est. Et a Theocrito in Pharmaceutria, καὶ μὲν χρώς καὶ ὀφθαλμοὶ ἰνύ-
τοι πολλοὶ θαλάσσι. Quod est, Et corpus meū Thapso simile factū est: nulla alia q̃ palloris signifi-
catione, qui color Thapsia fiebat. Confueueratq; ueteres, ad excusandā ualitudinem corporisq;
imporbos, non aliter, nec alio euctū q̃ cymino Thapsia se inungere. Ponitq; Theophrastus Hy-
popia candida pallores Thapsia factos indicare. Quod legitibus significasse satis fit. Et si scia-
mus Theocritū interpretes, & alios græcorū scriptores Thapson Chrysoxylon, id est, aurei co-
loris lignū, non herbā hanc interpretari solitos. Scāmōniū uocari ab aliquibus Thapsiam in Dio-
scoride legit. Verūtamen non potuit ad Thapsiam Scāmōniū, nisi ex pari in purgandō ut trahi,
Romani ex totius plantæ similitudine, quoniā ut Plinius ait, Thapsia sine dubio Ferula est, Fe-
rulinæ & syluestris Ferulæ eam uocauerit. Fœniculi folia habere eā Theophrastus dixit: uerū
tū latiora: cœule ferulaceū, radicē candidā, liquorē eius efficaciorē esse, per superna pariter & in-
ferna purgare. Seminis nullū esse usum. Nascitq; Thapsiam alibi quidē, sed in Attica. Non uesci
ea indigenas pecudes: peregrinas aut uesci ea quē, sed aut perire, aut diarrhīa texari. Barbarus
in colligēdo Thapsiæ liquore, quorundā codicū, quos & nos uidimus, fidē secutus, q̃d in Dio-
scoride passim & uerius legit, ἀναρρίψας τὰν συλλέγειν ὅπῃ uerit, succidit eam & tollunt: καὶ ut
in illis legit, id est, radicē, non ὅπῃ, id est, liquorē interpretatus. Nobis cōmunis lectio uerior &
aprior uisa est: quoniā nulla est ad colligendū liquorem succidendā & auferendē radicis neces-
sitas. Præterea non semel tantū, sed sæpius uerisimile est colligi posse liquorē eum: & si colligen-
dus est, ex uiuente adhuc in radice sua planta colligendū esse. Idem q̃d erat supra dicitur, si scum uer-
rit, a quo & fiscella dicta est. Nec male quidē: nisi Fisci uox nostra ætate ad alterius rei aestima-
tionē trāslata penitus iam pridē esset. Monemus id, ne quis discrepare nos putet. Nulla em rei,
sola uocis inter nos differentia est. Quodq; organū illi ait exprimens id radicis Thapsiæ succū,
scriptoris huius uoces secutus, prælum, torcularue in ea uoce intellexisse oportet.

Spartion aliqui Lygon, alij Lobon appellant. Frutex est longas ferrens uirgas, sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus uites uiniciuntur, semen lenticulæ in folliculis phasiolorum modo nascens, florem ut albæ Violæ, luteum. Purgant per superna Ellebori uice, citra pericu-

lum flores & semina, quinis obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tufis extractus succus, ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clystere. Strigmenta autem elicit cruenta.

BARBARI COROLL.

Spartum, siue Spartion Genistā nostri uocāt: fortasse quia genu modo flexilis ad nexus sit, uel quia genibus medeatur dolentibus, multiplici tunicarū cortice, sponte nascens, & quā feri nequeat: propriē aridi soli iuncus, & terrā uiciū: quia nihil ibi feri, aut nasci possit, noxiū animalibus, prāterq; cacuminū teneritate. In Hispania Spartum & pro fune ipso capitur: ut Merinthus, Merindusq; a poetis. Sint duo Sparti gēa: Vnum quod Genistam uocamus, Alterū quod in Hispania, & Africa funibus nascit, leucea, siue lygea potius dictū ab Athenæo, dubitauit ante nos & Plinius. Dioscorides certe cum Sparton dixit, Genistā uidetur intelligere: cuius florē in coronas addebant, Apibus gratissimū. Semen quoq; ipsum, Græci Sparton eodem nomine appellant. Asia e Genista facit lina piscatoria, egregie durantiā, frutice madefacto decem diebus: hac & uites alligat, ut Galenus inquit. Sparti quidē usus, multis post Homerū seculis institutus uidetur: quoniam cum Sparta dissoluta dixit, significauerit potius, lata. In agro Thebano copiosa: ut Varroni, Plinio, & Gellio quoq; placer. Nec ante Pœnorū arma, quæ primum Hispaniæ intulerūt, & cū fuitiles fierent naues: uel Loro, ut in Liburnia: uel Canabo, & Struppa, ut in Græcia, non Sparto futas esse constat. Serilla certe, nauigiū est histricū ac liburnicū, a conferendo nomē habens: quia Lino Spartoq; stipas, ut Pacuuius cum dixit, Sparteis futa serillibus,

funiculos intellexerit, qui Sparto cōserant, auctor Pompeius Festus. Idē Napuras, funiculos ex stramētis uocari tradit. In Africa exigui, & inuile gignit. Carthaginēsis Hispaniæ citerioris portio nō tota, sed quatenus parit, mōtes quoq; Sparto operit. Hinc strata rusticis eorū. Hinc ignes facesq;. Hinc calceamina, & pastore uestis. Ad reliqs usus laboriose uellit in hyemē uiu. Facillimē tamē ab Idibus Māis in Iunias. Hoc maturitatis tēpus. Ager unde colligit, minus triginta passū in latitudine patet, a litore Carthaginis notæ, minusq; in longitudine. Longius em uelū prohibent impendia. Ideo Spartū aliter etiā diuulsum, natura interpolatur, rursusq; libeat uctutū, nouo miscet. Sparto nihil fere uilius nauū armamētis, machinis ædificatiōrū, alijsq; desiderijs uitæ: inuictū in aquis, & mari: sicut in secco, fuitis e Canabe.

EX M. VERG. COMM.

Vlgarem Genistam passim & incultis locis nascentē, cuiusq; in re rustica ad nexus quotidianus usus est, nō Hispaniæ Spartum descripsisse hoc capite Dioscorides uidetur. Quas em Sparto huic breues, sine folijs uirgas, & natiuo lentore infragiles, quā in ligandis uineis usus sit, phaselorū figuras siliquas, & in his lenticulæ semen, luteumq; leucoiorū colore florem scriptor hic tribuit, integrā Genistarū quas diximus, & iconiam imaginē ostendunt. Nec nos in re alioquin ex scriptoris huius descriptiōe satis certa suspicari, miscereue aliquid audemus. Et si sciamus, a Plinio. 19. uolumine, capite. 2. Spartum aliter descriptum: & medicinā remediāq; omnia, quæ hoc capite a Dioscoride docentur, Sparto, non Genistæ, cui debebantur. 24. uolumine, capite nono ab eodem tributa fuisse. Res enim nos sequimur, & quæ in antiquis scriptoribus uagæ aut ambigua sunt, ad certam, quatenus licet, significationem contrahere conamur. Credimusq; ex his quæ in græcis latinisq; diu obseruauimus, monere tuto legentes posse, duo fuisse græcis Sparti genera: quæ ramen alicuius notæ adiectione distinguerētur. Quod em in Dioscoride nunc forma diminutiua legitur, nouū discrimen est: ideōq; a nobis non seruatiū. Alterum quod in Hispania nasceretur. 19. uolumine, capite. 2. a Plinio descriptū: alterum quod Genistæ appellatione a cunctis latinis censei. Indicantq; qd dicimus hic ipse primū scriptor: qui intelligēs alterū esse Sparton, nullius (quod hactenus iuenerim) in medicina usus, ut certius cognosceretur, ait, quo uites ligant: eandemq; rationē secutus in. 6. Paulus Aegineta, eandem & ipse adiecit discriminis notam, dicens, ἀσπράς ὁ τὰς ἀμνίδους ἀλωει, quod est, Spartus, quo uites uinciunt: nulla addendæ eius notæ necessitate, nisi alterum esset, quod æquiuoca appellatione fallere audientes posset. Estq; ex communi omnium usu adiecta discriminis nota illa. Neq; enim Hispaniæ Sparto uti omnes possunt: at Sparto quo uites ligantur, uti omnes possunt. Vbiq; em nascuntur Genistæ, & eundem inter ruris utilia ubiq; usum habent.

Pli. li. 24. ca. 9.
lib. 19. cap. 21

B

D I O S C O R I D I S

C Quod Plinius in Hispanienſis Sparti hiſtoria nuſquā teſtatuſ eſt. Quodq; illi præcipuū ab eo tribuitur, ad funeſ pertinet. Totāq; habet Hiſpaniæ Spartuſ, ne longioreſ ſimul, diuerſam penitus a Geniſta hiſtoriam. Eſſeq; Sparton Geniſtam præter hætenuſ dicta indicat etiā Theophræſtuſ primo de plantarū hiſtoria, Linuſpartum inter Polylopa numeranſ.

De Silybo.

CAP. CLXI.

σίλυβος

Silybum lata ſpina eſt, folia ferenſ Chamæleonis albi. Hæc recens cum ſale oleoq; cocta eſt. Radicis ſuccuſ drachmæ pondere potuſ uomitioneſ ciet.

BARBARI COROLL.

Silybon, aut Silyboſ ſpinofa, perinde, ut albuſ Chamæleon, cui eſt ſimiliſ, ne in Cilicia quidem, aut Syria, aut Phœnice ubi naſcitur, coquere tantuſ eſt: ita opoſa eiꝯ culina tradiſ. In medicina nulluſ Plinio uſuſ habet.

EX M. VERG. COMM.

Negauit Pliniuſ Silybi huiꝯ eſſe aliquē in medicina uſuſ: maiore tū q̃ hic apparatuſ ad eiꝯ boſ coqui indicauit. Siq̃dem cū oleo & ſale elixā comedi Dioſ. ait: ille uero ne in Cilicia quidem, aut Syria, aut Phœnice ubi naſcitur, coquere tantuſ eſt: ita opoſa eiꝯ culina tradiſ. Ex quibꝯ rōcinari illud facile eſt, peregrinā Italiæ herbā Silybum eſſe, & diligentiore cura et opera coqui ſolita. Qui deſcripſerunt eam poſterioreſ, latiſſimiſ foliſ, & in foliſ per extremitateſ latiſ ſpinuſ eam tradunt. Noſ in peregrino frutice, quod aliud moneamus, non habemuſ.

De Vomitorio Bulbo.

CAP. CLXII.

βάλανος μυρ-
φικῆ

Bulbus, quem Vomitorium uocant, folia habet lentiora & multo longiora cibario Bulbo, radicem conſimilem, cortice nigro ueſtitā. Vomitiōeſ concitat, ſi per ſe comedaſ, aut eiꝯ decoctū ebibatur.

De unguentaria Glande.

CAP. CLXIII.

DGlans unguentaria, fructuſ eſt arboriſ Myricæ ſimiliſ, magnitudi-
Gdine Auellanae nucis, cuiꝯ nucleuſ græcarum nucum more tri-
tuſ, humoreſ reddit, quo ad precioſa unguenta pro oleo utuntur. Naſci-
tur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido Iudææ. Præferi ple-
nā, recens, candida, quæ facile delibretur. Ea drachmæ pondere pota-
nem abſumit. Cum Erui farina, & aqua mulſa, podagriciſ illiniſ. Pſoraſ
lepraſq; decocta in aceto, uiligineſ & nigraſ cicatriceſ cum nitro emen-
dat. Et cum lotio lentigineſ, uaroſ & papulaſ in facie, & cutiſ uitia tollit.
Vomitioneſ mouet. Aluū cum hydromelite reſoluit. Stomacho aduerſa
tur. Oleū quod ea exprimitur, aluū potu ciet. Cortex eiꝯ magiſ adſtrin-
git. Verum tuſæ & expreſſæ recrementuſ abſtergentibuſ medicamentuſ
adijcitur, quæ aduerſuſ prurigineſ, & ſcabriciaſ idonea ſunt.

BARBARI COROLL.

Pli. li. ii. ca. 22.

BAlanuſ Myrēſfica, ſiue ut Pliniuſ, et Aetiuſ appellat, Myrobalanoſ, hoc eſt, Glanſ ungue-
taria, ex arbore ſit cui foliū, ut inquit Pliniuſ, Heliotropij: ut Theophræſtuſ (niſi librariuſ cor-
rupit) Myrri: ut Dioſcorideſ, Myricæ, diſtaxat oblongiuſ. Arbor grandis, incorruptaq; ſed
contorta. Unguentarij corticem glandiſ eiꝯ premūt, odoris gratia. Medici nucleuſ tundunt,
aſuſa paulatim calida aqua, etiamſi Theophræſtuſ inuiliſ eſſe dixit. Galenuſ unguentariuſ uſuſ
ſcribit, expreſſæ carniſ ſucco, medicis quoq; utilem eſſe, carnē eiꝯ pro uomitorio ſumentibuſ
aſſirmāſ. Glanſ ea magnitudine, & aſpectu Cappari, aut nuci potiuſ Auellanae ſimiliſ. Lignū
robuſtū, uſu præcipue nauali, in Arabia naſcens. Syriaca diciſ, & eſt candida. Contra in The-
baide nigra. Præferi illa bonitate olei, quod exprimiſ, ſed copia Thebaica, Inter hæc Troglody

tica utilissima est. Sunt qui Aethiopiam his praepōnāt, glandem nigrā, nec pinguem, nucleoque gracili, sed liquore, qui exprimitur, odoratiore: nascentem in campestribus. Aegyptiam, cuius & Hippocrates ipse meminit, pinguiorem esse, & crassiori cortice rubentem, & quā in palustribus nascatur, breuiorē, siccioremque. Ediuerso Arabicam uiridem, ac tenuiorem: & quoniam sit montana, densiorem. Longe autē optimā Petram, ex oppido quod uocant Petram. Plinius, & alij nigro cortice, nucleo candido. Differt a glande unguetaria: quae nux Odorata, siue Muscata uulgo dicitur, incognita ueteribus (ut existimo) de qua in Macher.

E X M. V E R G. C O M M.

CAppari magnitudine figurae unguentaria hanc glandem comparauit Theophrastus, 4. de plantarū historia uolumine: utique ea unguentarios, & ipse testatus est. Eamque ob causam Plinius libro. 12. capite. 22. Myrobalanon uocauit, eadem eiusdem rei significatione cum scriptore hoc: qui Myrepsicen Balanon eam inscripsit, quod scilicet unguentis tantū inferuiat. Diximus primo uolumine de Palmulis agentes, quod ad Balanos graecamque Balanorū uocem pertineret, ideoque relinquendū hoc loco quod dictum semel est, ne totiens idem repetat. Quod pro re ipsa etiā dicendum fuerat, a Barbaro undique collectū in Corollario eius expositū omnibus est. Iisdem enim uerbis, ut erat in cunctis diligēs, ex Theophrasto, Plinioque omnia de unguentaria hac glande reddidit: signauitque diligenter, in quibus antiqui scriptores illi in eius historia discrepēt. Nobis monuisse tantū superest, augere uareque aliquo opus esse, ut intelligamus, quo nā modo unguetaria haec Glans a priore libro, qui proprius illi inter unguenta aut aromata locus erat, in quartū, & ad uulgares herbas transierit: quod conijcere hactenus nobis non licuit.

De Narcisso.

CAP. CLXIII.

Narcissum, aliqui Narcissū Anydron, alij Autogenes, alij Bulbon emeticon, alij Lirion, Romani Bulbum morbitariū. Sunt & qui ut Lilium, Lirium appellarint. Folia porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora, caulis uacuuus & sine folijs supra dodrantem attolitur. Flos albus in medio, intus croceus, in quibusdam purpureus, radix intus alba, rotunda, bulbosa, semen uelut in tunica, nigrum, longum. Probatissimum nascitur in montibus, suauis odore. Cetera porrum imitatur, atque haeraceum uirus olet. Radix cocta siue estur, siue bibitur, uomitoria est. Ambustis igni prodest cum exiguo melle trita. Praecisos neruos illitu glutinat. Luxatis maleolis, diuturnisque articulorum doloribus, trita ex melle & imposta subuenit. Vitia cutis in facie, uirilignesque cum semine urticae & aceto emaculat. Cum eruo & melle ulcerum fordes expurgat. Abscessus rumpit concoctioni repugnantes. Infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina & melle.

B A R B A R I C O R O L L.

Narcisso, foliū Albuci, terrae proximū, sed latius, ut Lilio pingue, frequens, angustū caule sine folijs herbageo. Flos in cacumine, post Arcturū, & circa æquinoctiū, ac uere, item post Liliū, & Violam, Flāmeam uocatā, membrana inclusus ceu uasculo, ampliusculus, nigricans, oblongus: qui defluens, sponte germinet: praesertimque defixus in terrā, manu seritur & radice ampla, rotunda, carnosa. Caulis, & cum eo flos erūpit, ut in Croco, antequā folium: quod non antequā reflorescat, cernit. Caulis cum flore suo emoritur. Radix Bulbo assimilis, nisi quod non est squamata. Narcissus ter florendo, tria saeculorum tempora demonstrat. In coronamenta flore ueniens, a narce, hoc est, torpore dictus, quoniam caput grauet, non ut fabulae a puero. Plinius duo genera constituit. Vnum flore candido, calice purpureo. Alteri cetera eadem tribuit, sed calicem herbageum. Omnes inquit serotini, post arcturum enim florent, ac per æquinoctium autumni. Duo haec inquit genera medici praecipiunt, quasi & alia sint, quae non recipiant, hoc est (ut arbitror) genus illud quod uere, aut aestate nascitur: ut ex Theophrasto dici legimus, non de flore ipso, quae candidum esse cōuenit, intelligi, sed de semine: quod & membrana contegi, & nigrū, ac praelongū esse constat, quo in terrā cadente, propagat se, atque serit Narcissum, Eumachus cyrenaeus in Rhī

A

vāpni dno

B

Theoph. li. 3.

*Narcissum Amaranthi
filium, & genus tri-
thi, ex Iosula Sibiria
interfectum scribitur ab
Eupo eius amatore:
ex cuius sanguine na-
ta fuit herba, quae flo-
res egiuit empyren no-
minat. Floribus pluri-
cipi ferunt primum
coronatas Eriunyas
& parvas: quare poetae
conferunt tale quidam
ma sanationis tribui
re. p.*

Czotomico, etiā Crotalon & Acacalida Narcissum uocari tradidit. Nā Crotos in Hippocrate, ad ulcera uetera, & uulnera recentia pbata, qd aliud sit q̄ Narcissus, nō uideo. Nisi quis Crotū pro Crotone, hoc est, Cici capiat in eo. Iulius Pollux auctor est, Theophrasti morē fuisse, Liriū pro Narcisso dicere. Homerū uero Lirij appellatione complecti, florū omne genus. Narcissum ab adolescente suimet amore capto, & in eum florē conuerso, natū in Boētia Thespientes gariunt, fontē Donaca monstrātes, ubi se specularē puer stultissimus: qui umbrā suam a senesceret distinguere. Coarguit hanc fabulā uetustissimus poēta Pamphilus, qui Proserpinā multis annis antequā Narcissus esset, captam a Plutone cecinit, carpentem Narcissos.

EX M. VERG. COM M.

Lilio congenerē Narcissum antiquiores oēs faciunt, a Lilio statim continuata historia de eo agens. Omniūq̄ certissime Theophrastus lib. 6. de plantarū historia his uerbis inter cetera de eo ait. Lirion. Sunt em̄ qui hoc, & qui illo noīe appellent. Manifesto argumēto, congenerē, aut si milem saltem Lilio Narcissum esse. Ex quo Lirion, qua uoce Lilia ueteres appellauerūt, & iple quondā dici poterat: & si ex antiquis grācis testati aliquot fuerint, Lirion priuatim Narcissum indicare. Quemadmodū Crinon solū Lilium. Addiderūt quidam, etiā ab Homero flores oēs una Lirij appellatione indicari. Quod & Aristophanes in Comœdia etiā seruasse creditur. Sed quemadmodū nos in scriptore hoc, & in alijs obseruauimus, naga haec noīa, similitudo, & pe ne eadē natura fecit. Vocariq̄ solitū Lilium a grācis Lirion, manifeste hic scriptor ostendit, cū ait. Quidam etiā quemadmodū Lilium Liriū Narcissum uocat. Videnturq̄ Latini una tantū mutata litera, & ut balbutientes solent pueri, pro, r, l, pronūciasse: sicq̄ ex grācorū Lirio suū Li liū fecisse: eodē modo quo lepidissimus grācorū comicus in Equitibus suis blefa lingua in con cione loquentē Alcibiadem finxit, ὁλῶς βίωλος κεφαλὴν κόλασος ἔχει. Cum tñ in eo qd̄ intelligi uo lebat, ubi, l, litera audir̄ intelligenda, r, erat, ὁρῶς βίωρος κεφαλὴν κόρακος ἔχει. Sed ut rem nostrā agamus, p̄ cōpto sit, congenerē Lilio, aut illi penitus simile Narcissum esse: & quonā dolores & torpidas capitis grauitates faciat, a narce, q̄ uoce grāci torporē indicant, nō a fabuloso pu ero, ut poēta finxerit, Narcissum grācis dictū fuisse. Testes in eo noīe rōnis eius sunt. Plinius 21. uolumine, capi. 19. & Symposij sui. 3. cōmentario, capi. 1. Plutarchus. Cuius obiter de Nar- cisso uerba haec sunt. καὶ τὸν νάρκισσον ὡς ἀμειλύνοντα τὰ νύκτα, καὶ βαρύνοντα ἱμνοῦντα νεμεσίου. διὸ καὶ σοφοὶ αὐτὸν ἀρχαῖον μῦθον θέναι τούτῳ τῶν χυθίων στεφάνωμα προσέθενται. Quod est. Et Nar- cissum appellauerunt, quasi neruos heberantē, & torpidas facientē grauitates. Quapropter & Sophodes magnoꝝ Deorum, id est, subterraneorū coronamentū eum uocauit: q̄ scilicet de- functi & morte torpidi, torpido flore merito coronarent. Anydron uocasse quosdam Narcis- sum etiā in Dioscoride legitur: idq̄ nos factū illi nomē credimus, q̄ longe ab aquis in monta- nis floret. Quod etiā illi adiectū est Autogenes, quā uox a seipso genitū, uel per se nascens signi- ficat rationē eam habet, quā Theophrastus his uerbis indicauit. οὗτος δ' ἐκ πίπλων ποτὶ βλάστην αὐτόματον, de flore & semine dicta ea sunt, significantq̄. Hic autē decidens sponte sua germinat & nascit. Et si idem scriptor statim testetur, colligi semen eius, seriq̄ opere humano, nec minus etiā, ut in ceteris Bulbis plantari radicem. Vocari a quibusdam etiā Vomitorium Bulbum in Dioscoride audimus: haud sane, quia idem Vomitorio Bulbo sit, qui. 2. uolumine descriptus est, sed quia Bulbosq̄ radices, simulq̄ Vomitorium ut ille est: quē in antiqua medicina habet p̄cipuū usum. Serebat quondā in hortis ad coronamēta Narcissus: nūc montanis locis, in q̄bus nascit, quærendus est, non difficilis inuētū, si diligentius quærat. Totam em̄ excepta caulis ali- tudine, & calathi ambitu, quæ duo minora, q̄ in Lilio sunt, Liliorū speciem referte cum testati oēs sunt. Et præter id serotinus flos (post arcturū enim Augusto mense, & ad Autumni æqui- noctiū floret) inter Lilia floresq̄ alios, qui fere oēs tunc defecerūt, latere nō potest. Habet & ali- as in scriptore hoc notas, q̄bus deprehendi possit: Folia porracea: quæ Plinius in radice esse illi ait, minora tñ & angustiora: Concauū caulem, & sine folijs dodrantali altitudine: Postremoq̄ florem candidū, in medio croceū: & quod alteri eius generi competat, necesse est, in aliquibus purpureū. In qua descriptione, nisi in cunctis grācis, q̄s hactenus uidere licuit, uisū sit, ratio ci- nari oportet, duplicem esse Narcissum. Quod Plinius sane manifeste indicat duobus locis. Pri- mum. 21. uolumine, capite. 7. in Liliorū historia, dicens. Narcissum uocant, huius alterū genus candido flore, calice purpureo. Mox eiusdem libri, capite. 19. Narcissi duo genera in usu medi- cæ recipiunt. Vnū purpureo flore: & alterū herbaceum. Non leui, ut uidetur in docendis his ua- rietate. Siquidē in priore illa descriptione, alterū Narcissum flore candido, & calice purpureo: in posteriore alterum purpureo flore, alterum uero herbaceum esse dixit. Theophrastus quod

hactenus in eo obseruauerim, cum sapius Narcissi meminerit, nulla huiusmodi generum diuisione usus est: semperq; tanq; unus Narcissus sit de eo docet, nunc folia, nunc florendi tēpus, nunc caulem describens: a quo credimus Plinium alterum genus herbaceum uocasse. Si quidem in eius historia inter cætera auditur, τὸν δὲ καυλὸν ἀφ' ὧν ποδὶς δὲ. Quod est. Caulem quidem sine folijs, uerumtamen herbaceum. Ex quo potuit Plinius non a flore herbaceum alterum id genus appellare. Non ideo tamen non recipiendum duplicem Narcissum esse. Hoc enim a Dioscoride Plinioq; & ab alijs traditur. Sed quæ eorum discrimina in flore docentur, non satis & in scriptore hoc & in Plinio certa sunt. Cætera quidem, ut ex Theophrasto patet, eandem habent historiae ueritatem. Ille enim. s. de plantarum historia Narcissum his uerbis descripsit. Narcissus uero, aut Lirium (sunt enim qui hoc, & qui illo nomine appellant) folium Asphodeli figura terre proximum habet: latius tamen q; Asphodeli, & quasi liliaceum. Caulem nudum q; dem folijs, uerumtamen herbaceum: in summo cuius flos est. Semen ueluti in uasculo membrana quadam clausum, grande, nigrum, & figura oblongum. Id decidens sponte sua germinat. Verumtamen id colligentes, etiam in terra depangunt. Serunt & radicem, quā rotundam, carnosam & grandem habet. Serotinus flos est. Post arcturum enim & circa æquinoctium floret. Idem eodem libro in foliorum disciplina ait, Narcissum angusto, numeroso, & pingui folio esse. Nec multo post de caulibus plantarū agens ait. Mirabile aut in cunctis quod in Scylla & Narcisso accidit. In alijs enim & quæ a principio cōserunt, et per se regerminant, uere folia primum prodeunt, dein caulibus: in his autem, id est, Scylla & Narcisso caulis precedit, & in Narcisso flor tantum caulis. Post quæ cum longius descripsisset Scyllæ caulis & floris ortum, subiicit. Cū autem caulis hic consenserit, tunc post aliquot dies folia prodeunt. Similiterq; & in Narcisso sit, πλὴν οὐτὲ καυλὸν ἔσπον ἔχει παρὰ τὸν τοῦ ἄνθος ὥσπερ ἡ ποδὶς. οὐτε καρπὸν φανερόν ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ἄνθος ἅμα τῷ καυλῷ καταφ' ὅντι καὶ ὅταν ἀνακθῇ τότε τὰ φύλλα ἀνατίλλει, id est, Verumtamen nullū aliū caulem præterq; floris causa prolatum, ut præmonstrauimus, Narcissus habet. Manifestum itidem non habet semen. Flos autem ipse una cum caule arescit, & cum aruerit, tunc folia emergunt. Præterea florere prius Scyllā, postea uero Narcissum, idem paulo post testatur scriptor. Nosq; tam multa ex eo collegimus, ut facilius & certius deprehendi possit tanti nominis in antiquorum coronamentis flos. Quæ enim Plinius diuersis locis de eo tradidit, ex Theophrasto quidem deflexa sunt: sed tanta breuitate ab eo tractata, ut obscuriora legentibus aliquando sint: & ut respondere sibi inuicem Theophrastus & Diosc. uideantur. Cuncta enim de folijs, caulibus, & semine ambobus eadem sunt. Floris color, & coloris discrimen in Theophrasto tantum desideratur: idq; obseruasse & discernisse legentes oportet: præsertimq; quod hic croceū & purpureum in medio describit: quod Plinius florem appellat, non satis certo intellectu, totum ne florem sic uocet, an quæ crocata in eo sunt & purpurea, ut hic manifeste docet. Potest enim utraq; pars flos dici: quemadmodum in Viola nigra de duplicis floris ex disciplina Theophrasti floribus diximus. Nos in Apenninis montibus his nostris, frequentem uidimus florem Augusto & Septembri mensibus florentē, figura Lili, dodrātali altitudine: folijs qualia in Narcisso hoc describuntur: singulari caule, hīdemq; alijs omnibus, excepto colore, qui nec cādīdus, nec purpureus ut Plinius docet sit, sed inter candidum & luteum colorem nullius, aut exigui odoris. Vidimus & in mitioribus collibus natum, sed non tam speciosum, & magis albicantem: diuq; credidimus Narcissum eum esse: neq; ab opinione ea longius adhuc discedimus. Inclinat enim animus, potuisse antiquis uagum Narcissi nomen esse: & ut in plantarum disciplina sæpe alias testati sumus, congeneribus, similibusq; multis cōmunem eam appellationem fuisse. Tantūq; abest, ut constituamus luteo colore Narcissum esse: ut inueniendum hunc florem legentibus relinquamus, q; candido colore sit, croceis intus staminibus, & in aliquibus purpureis: quod unū in colore eius a Diosc. discrimen tradit. Nobis enim hactenus uidere non licuit candidos Liliorum figura flores, capillamentis, aut staminibus intus purpureis. Relinquimus etiam peritioribus cogitandum, probauerit ne hic scriptor Narcissum simpliciter montanis locis nascētem, ut a satiuo & hortensi secerneret: an desiderari ultra aliqd possit, quale scilicet Plinius ait probatissimum nasci in Lyciæ montibus: in quam partem propensiores trahimur. Superlatiuum enim illud κάλλιστον, certiores sibi nescio quomodo natales locos exigere uidetur: & præpositiuus ille articulus eodem sensu rem etiam indicare credi potest. Suspicio tamen hæc sit, non decreui. Qualis etiā est in uerbo παρὰ τὴν, quod statim sequitur, significet ne uirescere, & herbaceo colore esse: an potius a Porro uerbum factum fuerit, significetq; Porri odore sentiri. Quod tamen nullibi inuentum in antiquis a nobis est. Quæ omnia diligentius obseruanda & constituenda alijs relinquuntur.

ἵπποφαίς

Hippophæes, alij Hippophyes, alij Hippophanes, alij Hippion, alij Echinion, alij Pelecinō, Romani Lappaginē uocāt, quo fullones uestes interpolant. In sabulosis maritimisq; nascitur, sureulaceo frutice, denso & largo, folijs Oleę longioribus, mollioribusq; inter quæ candicantes spinæ emicant, siccæ, angulosæ, interstitio quodam distantes. Flores Hederæ corymbis similes, racematim cohærent, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes. Radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti, ex qua perinde ac Thapsia succus eximitur: qui cum Erui farina subactus siccatur, & ad usum reconditur. Pituitas, bilēq; detrahit oboli pondere cum mulso & quatuor obolis Erui farinae. Frutex cum radicibus siccatus tunditur, & cum aquæ mulsæ dimidia hemina tritus datur. Radice liquamentum depromitur, uti in Thapsia. Huius in purgationibus modus est drachma.

B A R B A R I C O R O L L.

Hippophæes, siue Hippophyes, & Hippopheon Hippocrati. Galenus hanc & Gnaphon, & Stybon, & Styben quoq; dici putat. Nomen uidetur accepisse, quoniam forte accommodata sit equorum naturæ: quemadmodum & ea, quæ Hippophæston uocatur, post hanc dicenda. Sunt enim unius fere generis, in binas diuisi species. Vtrūq; nostri Lappaginē (ut arbitror) appellauere. Similis inq; Plinius Anagallidi Lappago uidetur, nisi esset ramosior, pluribus folijs, graui odore. Quæ talis est, Mollugo dicitur, quæ uero asperioribus folijs, Asperugo. Neruoq; quædā causis utilem Hippophæston Diosco. affirmat. Plinius Lappaginē, quæ dicatur Mollugo. Vnde colligunt nonnulli eandem esse Hippophæston, & Molluginem.

D

E X M. V E R G. C O M M.

Sciendum primo est, spinosum fruticem esse Hippophæes: neq; a Diosco. tantum hoc habitum describi, uerum a Theophrasto, Plinioq; etiam: quorum alter spinis albis esse dixit, alter *ἵπποφαίς* *ἵπποφαίς* descripsit, id est, nullas habere in folijs, sed ut hic ait, inter folia spinas: quales ab eodem plures aliæ numerantur. Idq; in eius historia tam manifeste patet, ut nihil de spinis dubitandum sit. Mox ope spinarum quas habet, ad usum uestium translatus a ueteribus fuisse: nec aliud significare Diosco. cum ait, *ἵπποφαίς τὰ ἱμάτια*, id est, ut nos uertimus, quo uestes uellicando poliant. Id enim est *ἱπποφαίς*, & ut Athenienses dicere consueuerant *ἱπποφαίς*, id est, *καταφαίς*, quod uellicando expolire significat. Quæ autem uestium expolitio hæc spinis facta esset, facillimam habet coniecturam: eandem, scilicet aut illi similem, quam carduis, aut hamis ferreis ætas nostra in nouis & obsoletis uestibus querit, iacentem, aut longo usu atritum pilum erigens: & si in textura flocci, festucae uel, aut alterius coloris aliquid inhesterit, ope spinarum illarum extrahēs. Eamq; ob causam Galenus Hippophæes hoc Gnaphon etiam uocat: Græcorumq; grammatici eam exponentes uocem, dicunt *ἵπποφαίς ἐκένθη*, *ἵπποφαίς* *ἵπποφαίς* τὰ ἱμάτια, id est, Gnaphæ spinę sunt, quibus expoliuntur uestes: quasi non sola hæc spina eum quondam haberet usum, sed plures honoris eius prærogatiua gauderent. Sic etiam *ἱπποφαίς* *ἵπποφαίς* dixerunt, id est, quæ uellicantur. Galenus tamen, ut diximus, priuatim Hippophæes hoc Gnaphō appellauit. Quæ causa etiam fuit, ut quemadmodum in Diosco. nunc legitur, Romani Lappaginē id dicerent. Nec aliud significasse nobis Plinius uidetur, cum ait lib. 27. cap. 10. Hippophæston nascitur in spinis, ex quibus sunt æneæ fulloniæ. Aeneas enim, ut credimus, uocauit ad eundem usum æneum instrumentum aliquod hamatum, forficulatumue: quod primo ex ære factum, nomen in spinis postea seruauerit: auditoq; ænearum nomine, instrumentum, additis deinde fullonis materia & usus intelligeretur. Credimus fore, ut uideantur aliquibus nostra hæc duriora, præsertim cum fulloniam, & fullones receperint iam pridem in latine re omnes, per his quæ uestes purgant, & loturas, aut infectione candorem illis, aliumue aliquem colorem acquirunt. Quod nos non negamus: neq; his quæ nos, per Hippophæe hōe dicimus aduersantur, quæ illi de fullonibus dicunt. Potest enim utrumq; ab hōe tractari: nec repugnat, posse eum qui uestes lauat, aut in

friciat, eadem qua diximus ratione expolire. Nos enim antiquæ uocis rationem & ueterum autoritatem secuti, quales *κναφίς* quondam fuerint, & quæ uerbi *κναφίς* significatio sit, demonstrauimus: quæ nulla alia est q̃, ut græce loquamur, τοῦ ἀποφύειν καὶ ἀποφάινειν, id est, deradendo expolire uellicareq̃: & si id patiuntur grammatici, expilare. Nasci fruticem hunc Plinius ait fabulosis, maritimisq̃ locis, scriptorem hunc secutus. Theophrastus fabuloso quidem, sed tenui folio: q̃ p̃ter ea quæ paulo ante ab eo accepta diximus, querendas cognoscendasq̃ facile notas has illi tribuit, μονόφυλλον δὲ ἱπποφαῖον ἐπίγειον καὶ χαμαίκανλον, βλαστάνει δὲ καὶ ἀνθὶ τοῦ θέρους καὶ διαμένει τὸ φύλλον χλωρόν ἄχρι πλειάδος. χαίρει ὑδαμμοῖς καὶ λεπτόλοις χωρίοις. λέγεται δὲ ὅτι ἐν τοῖς ἱσχυαῖμοις οὐδέποτε φύσθαι καὶ ταῦτα πρὶ τὰ ἄσπερ καὶ ἐν ἐνάλιαις τόποις φασκίνη. Quorum sensus est. Singularem adice nititur in terra Hippophæes: terrestre est, & caules per terram spargit: per æstatē germinat & floreret: permanetq̃ uiridi folio usq̃ ad pleiadem autumnū. Sabulosum & tenue solum amat: diciturq̃ locis cultis nasci nolle, cum tamen circa oppida & apricis locis nascatur. Hæ Hippophæis notæ a Theophrasto numerantur: quæ ideo a nobis repetitæ sunt, ut pluribus ueluti testibus deprehendi latens fructus possit, & cuius non satis certa nominis origo est. Plinius cōpositum ab equo nomen opinatus, ait. Debent (de Hippophæe & Hippophæsto sermo illi est) accommodatæ esse equorū naturæ, neq̃ ex alijs causis nomen accepisse. Quippe quædam animalium remedijs nascuntur, locupleti diuinitate ad gerenda remedia. &c. Quod si recipiatur, poterunt eandem cætera quæ pariter composita in græcis fuerint habere rationem.

De Hippophæsto. CAP. CLXVI.

Hippophæston, id quod aliqui Hippophæes appellant, nascitur eisdem locis quibus Hippophæes, estq̃ spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore, inanibus tantum capitulis, folijs paruis, spinosis, radículas habens albas, molles, crassas. Succus radice et folijs exprimitur, & exiccatur. Datus cui uoles tribus obolis in aqua mullâ, aquam pituitasq̃ detrahit. Priuatim comitialibus morbis, neruorum uitijs, & orthopnœæ conuenit huiuscemodi purgatio.

BARBARICOROLL.

Hippophæston, hæc uidetur quam Plinius Hippophyes, Theophrastum sequutus appellauit, tributam ei proprietatem scribendo, q̃ fructum spinosum habeat. Nascitur in spinis, ex quibus fiunt enææ, ut idem inquit, fulloniæ, capitulis inanibus, folijs multis herbacei coloris, radiculis candidis, quarum succus exprimitur æstatē. Idem Plinius sextodecimo uolumine, hanc non Hippophyes, sed plane, ut Dioscorides, Hippophæston nominat, inter herbas quæ fructicibus alijs circumuoluunt sese: quod notatur inquit, & in spina fullonia Hippophæsto, caliculis inanibus, folijs paruis, radice alba, cuius succus ad detractiōes in comitiali morbo uti lissimus habetur. Qui locus in Plinio, deprauate legebatur antequam nos, ita ut ne intelligi quidem posset a peritis. Paulus nō Hippophæston per, i, sed Hypophæstō p, y, scribendum putauit.

Miscuerunt in græcis & in latinis aliq̃, quod p̃monstratū mō est Hippophæes, & q̃d nunc tractamus Hippophæston, nominis similitudine decepti. Persuasissetq̃ id eis uident̃ hīdē amborum natales, & in artibus usus. Vtraq̃ em̃ fullonia spina, eadēq̃ in morbis utriusq̃ plura remedia sunt. Verūtū seorsum a peritiōibus actū de utraq̃ est. Neq̃ em̃ oīa penitus eadē utriq̃ in historia & medicina sunt. Quinetiā Paulus Aegin. li. 6. cū de Hippophæe primū egisset, non multo post de Hippophæsto agit. Nec ut Hippophæes cōposito a uoce hippo nomie scribit, sed a p̃positione ὑπὸ Hypophæstō. Quā rationē secutus etiā lib. 27. ca. 8, Plinius est: quāuis antea lib. 22. cap. 12. & hanc, & Hippophæes dixisset, debere equorū naturæ accommodatās esse. Nos ut illius, sic etiā huius nominis rationē ignoramus. Oportet tñ & hanc aculeatā intelligere: ex q̃ hic ait, & hanc fulloniæ spinæ genus esse. Ratiocinariq̃ facile erit, ut superiore capite p̃monstrauimus, omnes q̃bus possent uestes qua ratione diximus expoliri, cōsueuisse ueteres *κναφίς*, & *κναφικὰς ἀκάνθας*, id est, fullonias spinas appellare: & ex earum censu hanc etiā esse, quæ non difficilis inuentu erit, tam certis notis ab hoc scriptore describitur.

De Ricino. CAP. CLXVII.

Cici, aut Croton aliqui Sefamon syluestre uocant, alijs Sefeli Cyp̃rion, alijs Crotona. Aegyptij Sistanma, aliqui Trixin, Magi

A

ἱπποφαῖον
ἱπποφαῖς

B

Pli. li. 27. ca. 8.
lib. 22. cap. 12.

VERG.

κίσι
κρότον
σίσταμον ἄγρον

Z ij

D I O S C O R I D I S

C Sanguinem febris, Latini Ricinum, alij Lupam. Id nomen accepit, a Ricini animalis similitudine. Arbor prouenit parua: Ficus altitudine, folio Platani, maiore, lauiore & nigriore, ramis caudicibusq; cauis in arundinis morem. Semine in uuis asperis, quod corticibus exutum, Ricinū animal representat: ex quo oleum nomine Ricinum exprimitur, cibis foedum, lucernis emplastrisq; utile. Grana triginta numero purgata, potu pituitas, bilem, aquamq; per aluum extrahunt. Vomitiones mouet. Sed iniucūda admodum est, & molesta purgatio. Siquidem stomachū uehementer subuertit. Tusa & imposita, uitia cutis in facie, uarosq; expurgat. Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum tumoresq; leniunt. Turgentes mamas cohibent. Eadem ex aceto illita, ignes sacros restingunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 23. ca. 5.
lib. 15. ca. 7.

Cici ab ea differt quae Cucia Plinio, & Cuciphoron a Theophrasto dicit. Cucia folio & caudice in Aegypto Palmae similis; quando & eius folijs utuntur ad textilia. Differt, q; Palma indiuidua est, Aetha cum adolefcit, in brachia ramorum spargitur: quae pari modo & ipsa finduntur, uirgis breuibus, neq; multis. Pomo rotunditas, quae manum impleat, colos fuluus, commendabili succo, ex austero & dulci, nec congesto ut Palmitulae, sed discreto; lignum intus grandis, firmeq; duricie: ex quo stragulares annulos detornant, ut Theophrastus inquit: aut uelares, ut Plinius. In eo nucleus dulcis dum recens est. Siccatus durefcit ad infinitum, ut mandi non possit, nisi pluribus diebus aqua maceratus. Materies non ut Palmae rara, neruosa, uiuens: sed spissa, carnosa, grauis, dura, crispioris elegantie. Et ob id in magno honore Persis, uisusq; ad lectipedes. Haec a Theophrasto & Persica textilis uocari. Thebaica praefectura copiosam, si q; arbitrant, coniecturam potius, q; rationem sequunt. At Cici arbor, quam Herodotus Sillocypriū uocauit, Ricinus a nostris dicitur, ut ipsum quoq; animal, canibus praecipue infestum, qd & Cynoraista graece dicit, & Croton: quanq; Theodorus Crotonas rediūos couertit, non ricinos. Feni ni etiam nū hodie, ut ex Didymo zenotele accepimus, q nobis a secretis est, & Anagnosfes, uer naculo uocabulo Rhaistas canum uocant. Dicunt & Cynomygea quibusdā. Sed & ouibus molestos esse Ricinos testis est Cato. Vulgus ipsū eos graeco nomine appellat Cica, Galenus Cica dicit uult etiam bestiolas quae frumentū corrodūt, quartū coetus Cion dicitur. Is uernis etiam Ciss uocatur: ut infra quoq; diximus. Hippocrates hanc arborē uidetur intellexisse, cū Crotoni deos radicem in medicinas quasdam adhiberi commonet. Aliqui non solum Cici, sed Ciceam quoq; nominant. Ab hac arbore confecta iurium uocabula, Ciceclendrum, & Cecimandrum, in Plautina fabula, si dixerim, diuinare potius q; docere uidear.

Herod. i Eut.
libro. 2.

E X M. V E R G. C O M M.

Copiosus in Aegypto quondam nasci Ricinus hic dicebatur. Idq; uerisimile est: quoniam luminum necessitas, sine quibus uitae nullus est per tenebras usus, faciendis lucernarum funiculis, & oleo aptum deficiente alio omni, oprabilem genti illi fruticem fecerat. Etsi Plinius lib. 15. cap. 5. testetur Elychnia qdem ex eo fieri claritatis praecipue, ex oleo tamen ppter nimiam pinguitudinem lumen obscurum. Nec aliud hic idem scriptor primo uolumine significauit, dicens Aegyptios multum indigere, & copiose uti Ricinino oleo. Cogebatur enim quod comicus ait, si non possent quod uellent, id uelle quod possent. Plinius. 15. uolumine, capite. 7. altitudine Oleae in Aegypto & Hispania prouenire ait, caule ferulaceo, folio uitium, semine uuarum gracillium pallidarumq; quas hic βότρυς τρωχίς dixit, id est, racemos asperos. Theophrastus duobus locis, primo de historia, mox secundo de causis plantarum nihil aequè in eo admiratus est, q; ut ille ait, foliorum τενομότητα καὶ μεταχηματισμὸν, id est, inaequalitatem, siue dissimilitudinē & uersationem. Numerauitq; primum inter ea quorum folia diuersis temporibus diuersa figura uidentur: uerbi causa, a principio rotunda, mox cum creuerint angulosa, aut ediuerso: qualia ostendunt Hedera, Populus alba, & Ricinus hic. Suntq; de eo scriptoris eius haec uerba. τὰ δὲ φύλλα τῶν μὲν ἄλλων δένδρων ὅμοια πάντων ἀντὰ ἑαυτοῖς. τῆς δὲ λίνκου καὶ τοῦ καλονόμενου κρότωνος ἀνόμοια, καὶ ἰστροχίμωνα, τὰ μὲν γὰρ νύα περιφερὲς τὰ δὲ πελαϊότερα γωνιώδη. καὶ ἵς τοῦ ἢ μεταστροφῆς πάντων, Rursusq; ὁ δὲ τὰ φύλλον μεταχηματισμὸς καὶ ἰστρον κοῖνός. ἱπὶ καὶ τὰ τοῦ κρότωνος π-

ῥιζὴν φυτόν τὴν ἀρχὴν ὑπερὸν ἀπογονίῳ τῆς καθ' ἑαυτὴν ἀναστροφῆς. Quorum sensus est. Aliarum uero omnium arborum folia ipsa sibi ipsis similia sunt: Populi uero albæ, Hederae, & eius quæ uocant Ricinum dissimilia, & alterius figuræ. Noua enim & a principio circinata: adultiore deinde angulosa. Et omnium mutatio talis est. &c. Rursus. Foliorum uero transformatio & alijs cõmunis est: quoniam eius qui Ricinus nominatur, a principio nascentia folia circinata sunt: tẽpore deinde angulosa fiunt: quasi dearticulenter. Quarta rationem ex Theophrasto a cæteris relictam addere placuit: ut hæc nota etiam deprehendi Ricinus possit. Etsi uulgaris iam pridem hic frutex sit, feraturq; passim in hortis ad spectaculum, Neq; enim ætate hæc nostrâ aliũ, quem sciamus in medicina, aut reliquâ uita usum habet. Vocatq; Ethruria Phaselum Romanum. Diximus de eo etiam in Ricinino oleo: eamq; ob causam non erimus in descriptione eius longiores. Id tẽm testamur, uera esse quæ hic ait, Vomitiones eiectiones, & per inferna laboriosa purgatione purgare. Seimus enim pueros aliquando deuoratis incaute seminibus eius aliquot, integrum eum sua nocte diem paulominus q̃ ad mortem eo cibo periclitatos.

T De Tithymalorum generibus. CAP. CLXVIII.

Tithymali genera septem, quorum masculus Characias appellatur, ab aliquibus Cometes, aut Amygdaloides, uel Cobios. Alter Myrthites, qui fœmina existimatur, eũq; Myrsynitem, aut Carty itẽ uocant. Tertius Paralys, quem Tithymalida appellarunt. Alius Helioscopius. Quintus Cyparyssias. Sextus Dædrodes. Septimus Platyphyllos dicitur.

T Ithymalum, & Tithymalus penultima producta, Meconion a quibusdam uocatur. Nostri Lactucam appellant caprinam, marinamq;. Aliqui Lactariam, quia & Græci Galactida nunc cupare soleant. Lacte Tithymali inscripto corpore, cum inaruerit, si cinis inspergatur, narrant apparere literas: & ita quidam adulteras alloqui maluerunt, q̃ codicillis. Vfus iam & in castra, & obseffas urbes transit.

Pli. li. 26. ca. 10
lib. 20. ca. 19. et
26. cap. 8.

C De Characia appellato. CAP. CLXIX.

Characiæ caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri. Lacteo succo, atq; acri madent. Folijs Oleæ circum ramos, angustioribus & longioribus, radice dura, lignosa. Pendet in cacuminibus caulium coma iunci, & calyculati folliculi, aliquantum caui. In quibus semen continetur. Nascentur in asperis & montibus. Succus aluum purgat. Trahit pituitam bilemq; binis obolis in posca sumptis. Et cum aqua mulsâ nomitiones mouet. Appetente uindemiæ tempore, succus congestis ramulis, mox decisis, & uase reclusis excipitur. Aliqui ad iiciunt farinam Erui, & in pastillos digerunt, qui Erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos ternas, quaternasue guttas instillant, ut cū his inarescant. Quas ad usus recondunt. Per se etiã tusus in pila, & in pastillos cõactus reponitur. Porro cum extrahitur lac, neq; quo uentus aspiret stare quenq; neq; manus oculis admouere conuenit, sed ante eius collectionem, corpus, præsertim, faciem, collum, scrotumq; genitalis, adipe, aut oleo cum uino perungere. Fauces autem exasperat. Quapropter catapocia, cæra, aut decocto melle oblini par est, & hoc modo dari. Binas tamen, ternasue ficos, purgationis gratia sumplisse satis est. Recens lac ex oleo, peruncios in sole capillos euellit, Renascentesq; flauos

Characias

Z iij

D I O S C O R I D I S

C & exiles efficit. Deniq; omnes destruit. Dentium cauernis inclusum, leuat dolores. Sed cæra dentes oblinendi, ne suo delapsu, fauces & linguam uitiet. Tollit illitu impetigines, formicantes uerrucas, pensiles, & quæ Thymi florem representant. Valet aduersus pterygia, carbunculos, phagedænas ulceru, gangrænas, fistulasq;. Legitur semen autumnò, & siccatum sole leuiter tunditur, feruefactumq; loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen & folia lactei succi effectum præbent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui cõdiant admisto cum lacte lepidio, & castæo confuso. Radix drachmæ pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore.

B A R B A R I C O R O L L.

Characias ramos habet digitali crassitudine quinq; aut sex. Semen legitur autumnò cum coma, succus incipiente pomorum lanugine. Tam feruentis hoc naturæ, ut per se extra corpori impositum, pustulas ignium modo faciat, & pro caustico in usu sit. Nasceitur & in maritimis. Alia omnino est Characias, quam uulgaris sermo Charanciam appellat: quoniã septi modo, in hortis fenestrisq; per cancellos, opere topiario digeritur. De qua ne uerbū quidem apud ueteres habitum inuenio, Balsaminam Ligures Padani uocant, Hierosolymitanum pomū Ecthuria, folio uitis minore, pampinis item uitū, turbinato utrinq; fructu, uisēda cute, carnosa, ac tubere, q; grandi bacca, aut folliculo puniceus, maturo colore, sanguineo quoq; succo. Inanitas confraeto. Semina intus aliquot lenticulæ figura continet rubentia, ex quibus oleum exprimitur, ad uulnera præcipuum.

De Fœmina. C A P. CLXX.

Fœmina quam Myrsiniten, aut Caryiten uocarunt, similis suapte natura Daphnoidi. Folijs Myrti, sed maioribus, in cacumine acutis, & pungentibus. Ramulos ab radice mittit dodrantes. Fructū fert post annum nuci similem, mordaci gustu. Nasceitur in asperis. Succus, radix, semen, folia, consimilem antedicto sortiuntur facultatem. Sed ad citandas uomitiones inualidior est.

B A R B A R I C O R O L L.

Ithymalus Myrsinites, a Theodoro Myrtaria cõuertitur, mollioribus folijs q; Myrti. Colliguntur comæ huius hordeo crassescente. Fructus demecitur cum messium maturitate. Hic nō pariter maturefcit, sed pars sequenti anno, & nux uocatur. Inde cognomen dedere Græci Caryitin. Est ubi Theophrastus Clematiam, hoc est, Sarmenulam uocat, folijs humisparfam, palmi longitudine. Nisi quis corruptum locum putet, legendumq; non Clematiam, sed Carytiam censeat.

De Paralio. C A P. CLXXI.

Alliud Tithymali genus dicitur Paralios, quem Tithymalida, aut Mechona aliqui appellauere. Nasceitur in maritimis, ramis rubentibus, palmum altis, quinis, senisue a radice exeuntibus. Folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in uersus quosdam digestis, capite in cacumine orbiculato. In quo semen ut Eruum, uario colore emicat. Flos albus. Frutex totus cū radice lacteo succo turget. Similes ad usus recodit.

B A R B A R I C O R O L L.

Ithymalus Paralios, a Theophrasto Cocco appellatur, folio rotundo, semine candido, quo uua incipiente stringitur.

De Helioscopio.

CAP. CLXXII.

Aliud genus Helioscopius dicitur, folijs Portulacæ, rotundioribus, ramulis prodeuntibus a radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis, capite Anethi, semine in capitulis incluso. Helioscopij nomen accipit, quoniam comas cum sole circumagat. Circa oppida nascitur, potissimum in ruderibus. Colligitur succus, semenque ut aliorum. Eadem quæ superioribus tiores, non tamen usqueadeo ualidæ.

BARBARI COROLL.

Tithymalum Helioscopium, semine albo, columbis gratissimo: quod colligitur nigrescente uua. Nomen accipit, quoniam capita cum sole circumagat.

De Cyparyssia.

CAP. CLXXIII.

CYPARYSSIAS in caulem exit dodrantalem, uel maiorem, subrubrum, ex quo folia Piceæ similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora. Et in totum nascentem Piceam æmulatur. Vnde nomen traxit. Candido succo madet. Cui eadem uis quæ superioribus.

BARBARI COROLL.

Tithymalus Cyparyssias, caule gemino, aut triplici. Nascitur in campestribus.

De Petræo Tithymalo.

CAP. CLXXIII.

GENVS TITHYMALI in petris nascens, Dendroides cognominant, in cacumine largam spargens comam, succo lacteo prægnans, cauliculis rubentibus, folijs Myrti tenuioris, fructu Characiæ. Eiusdem effectus cuius superiores, similique modo reconditur.

BARBARI COROLL.

Tithymalus Dendroides, aliqui Leptophyllon cognominant, maxime cauliculis rubentibus, & semine copiosissimum.

De Platyphyllis.

CAP. CLXXV.

PLATYPHYLLOS Verbasco similis est. Radix, succus & folia per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tufus & aqua insparfus. Reliqua Tithymalorum genera, quæ supra scribuntur, eadem efficiunt.

BARBARI COROLL.

Tithymalum Platyphyllon alij Corymbiten, alij Amygdaliten a similitudine appellant: nec ullius longiora sunt folia.

EX M. VERG. COMM.

Satis uno uersiculo, & in eo una tantum uoce in Theriacis suis monuit Nicander, quod commune Tithymalis omnibus esset, & unde potuerint posteriores latini nomen illis apre & feliciter facere. Is autem est. *σάμψυλον κνίσον τε καὶ ὑγλαρίαν θυμάλιδας*. Id est. Sampsucum, Cytisumque, & copioso lacte plenas Tithymalidas. γλῶσσο enim eius gentis poetæ lac aliquando appellant. Eamque rationem secuti ueteres Romani, Lactariam herbam communi appellatione, ob commune omnibus lac, uniuersum hoc genus uocauerunt. Mox, ut plerumque in his fit, qui parum didicerunt, quantopere undique communia esse oporteat quibus constituendum genus aliquod est, uidentes aliqui non aliter quam ex Lactuca secta Tithymalis lac fluere, Lactucam uocare incæperunt: cum tamen nullius Tithymali folium ad eius similitudinem accedat. Licetque

Z iij

C Lactuca a lacte, quod secto eius caule defluit, nomen inuenierit, non ideo tamen hac una in re tantum illi similes plantæ aliæ eodem illi nomine indicandæ fuerant, Nullus enim audita Lactuca, non foliorum eius similitudinem quæret: quæ inueniri in Tithymalo aliqua non poterit. Nec refert, addiderit ne illi quispiam ex re aliqua discrimen, caprinamq; , aut marinā uocauerit. Semper enim audito Lactucæ nomine, similem folijs illi herbam aliquis cogitabit. Idq; sentiens Celsus libro. 5. capite. 7. cum Lactucam marinā appellasset, adiecit statim, quæ Tithymalos a Græcis nominatur. Intelligebat enim q; latè pateret Lactucæ nomen, & quatenus fallere quærentes Tithymalum id nomen posset. Multa enim ad mare nascuntur: nec si Lactuca etiam uocari Tithymalus possit, totum genus ea uox indicabit. Quæ enim a Græcis Paralios nominatur, sola ad mare nascitur, & sola uerè marina dici potest. Ceteræ enim montibus, campestribus locis, inter rudera, & circa oppida nascuntur. Verisimileq; est, fuisse id nomen tantum in usu his, qui aut nullam aliā Tithymalum apud se nascentem haberent: aut medicorum, qui ea tantum ad remedia uterentur. Eadem, aut non dissimilis in caprinæ Lactucæ nominatio est. Vescuntur enim capræ, non Tithymalis his tantum, uerum infinitis pene alijs: nec facile erat ex eius animalis cibo tam multiplicem herbam deprehendere. Eamq; ob causam nos, auctore Plinio, multoq; magis suadente id ratione, ne Tithymalis aliæ misceretur plantæ, ex toralijs eius appellationibus Lactariam herbam elegimus: quæ tam multis eius generibus inseruiret, & communem omnibus haberet ex communi omnibus lacte indicationem. Et hæc pro Lactariæ herbæ appellatione satis dicta hæcenus sint. Quibus adderem, doceremq; longius, quæ priuatim per singulas species fecerit illi nomina antiquitas: nisi qua licuit breuitate obiter interpres ea docuisssem, Vallaremq; primum eius genus uocari dixissem, non aliter q; & Harundinis genus quoddam Characiam, Plinius etiam uocauit: q; ual-lis septisq; muniendis idonea sit: qua similitudine Lactariæ herbæ primum hoc genus Characiam hic etiam uocari ait, altitudine ut hic inquit, supra cubitum: ut pleriq; autem alijs, bicubitali, & crassitudine digitali: quæ tota quantitas erigendis uallis satis est. In cæteris ex historia eorum per se ratio nominis pater. Nec nos aliud habemus quod ad eā rem certius afferre ualeamus. Eamq; ob causam relictis huiusmodi, ex Theophrasto monerimus, Lactariæ herbæ tria tantū genera ab eo describi. Eam scilicet, quæ prima ab hoc numeratur Characiam, siue marem: Myrsinitem mox, aut forminam: postremamq; Paralium, quæ tertia Dioscoridi. Cuius descriptionis quoniam multa erit pro scriptoris huius historia utilitas, nō pigebit longius isdem uerbis ex eo omnia repetere. Quæ huiusmodi sunt. Tithymalorum autem maritimus qui Cocos uocatur, circi nata habet folia. Caulem, totamq; plantā altitudine fere drantali. Semen candidum. Demetitur cum primū incaperit uua maturitate nigrescere. Daturq; siccatum semen & tritum tertia fere acetabuli parte. Qui deinde mas Tithymalus dicitur, oleaginum habet foliū: tota est planta bicubitalis: lac ex eo in uindemia colligunt, & cū id cura uerint, utuntur. Purgat aut magis per inferna. Qui etiā Myrsites uocatur Tithymalus, colore candido, foliū habet Myrto simile, sed in summo aculeatū. Spargit hic per terrā uiticulas longidine fere dodrantales, quæ annuū fructum alternant: aliæ scilicet nunc, aliæ uero sequenti anno ab eadem radice exeuntes. Montana amat loco Tithymalus hic. Vocaturq; fructus eius caryon, id est, nux. Demetitur cum ad plenā crassitudinem horde in spica maturuerint. Cumq; siccauerint, purgauerintq; semē eius, aqua lauant, Siccatumq; rursus dant bibendum, addiis nigri papaueris partibus duabus, ita ut sit totū unius acetabuli pondus. Purgat autem per inferna pituitam. Si uero nucem ipsam dederint tritam, in uino dulci bibendam, aut in frizo Sefamo comedendam dant. Hæc sunt quæ Theophrastus de tribus Tithymalorū generibus quod diximus loco docuit, longius ideo a nobis repetita, ut ex eius historia, tantiq; auctoris testimonio pleriq; in Dioscoride certius cognosci possint: collatisq; simul duorum scriptorum decretis, uideant legentes, si qua aliter ab alijs reddita a nobis fuerunt, auctore Theophrasto, & antiquorum græcorum ope reddita fuisse. Quale est, quod in secundo genere forminam Myrsitem, & Caryitem diximus Laureolæ, quam Daphnoides uocant, gustu similem esse, colore albicante. Qui color, quoniam in impresso, alijsq; aliquot non legitur, relictus ab alijs est: & quod ad Daphnoides pertinebat, non plene expressum. Legitur enim in antiquissimis, τὰ δαφνοειδῆ τῇ γίνεσι καὶ τῷ ὄντι λευκὰ. Quod est: ut nos uertimus: Laureolæ, quam Daphnoides uocant, gustu similis, colore albicante. Fecimusq; id confidentius Theophrasto adiuuante, qui in Tithymali huius historia ait, ὁ δὲ μυρτίτης καλούμενος τὸν θυμάλιος λευκός. Quod est, Qui autem Myrsites dicitur, candidus Tithymalus. Declarat idem Theophrastus etiam quid in Dioscoride, & in secundo Tithymali genere est. τὸν δὲ καρπὸν ὀρεῖ παρ' ἑαυτὸν,

Quod alter ex nouissimis interpretibus uertit, Fructum fert alternis annis similem nuci. Alter, Fructum fert post annum nuci similem. Nos autem annuū fructum inuicem alternantes. Manifeste enim id docet Theophrastus. Cuius in ea re uerba sunt, κλημάτια δ' ἀφίσσιν ἐπὶ γῆν ὡς σπέρματι. ταῦτα δ' οὐχ ἀμαφίσσιν τὸν καρπὸν ἀλλ' παρ' ἑτοῦ ταῦ μὲν γῆν τὰ δὲ ἕως νύκτα. Quibus nihil certius audiri potest. Viticulas autem per terram spargit dodrantali fere longitudine. Hæ autem non simul ferunt fructum, sed annua temporum uicissitudine, aliæ quidem nunc, aliæ uero sequenti anno. Sentiens enim Theophrastus non satis intelligi illud παρ' ἑτοῦ, ut certiores faceret, addidit: alias quidem nunc ferre, alias sequenti anno. Idemq; est Dioscoridi παρ' ἑτοῦ, quod Theophrasto παρ' ἑτοῦ. Græcæ præpositionis uis id facit, qua carentes latini, non possunt una uoce id exprimere. Plinius ex Theophrasto locum interpretatus libro uigesimo sexto, capite octauo, ait. Fructus non pariter maturescit, sed pars anno sequente. Cum tamen Theophrasti uerba ea sint, quæ nos proposuimus: neq; ex communi uocum illarum æstimatione, ut nobis uidetur, locus ille intelligi poterit. Idem etiam Paralion, id est, maritimum Tithymalum Coccon uocari ait. Quod forte ex Dioscoride perijt. Est autem græcis Coccus non simpliciter omne granum, sed quod rotundum est: etsi non semper in laudatis scriptoribus ea ratio seruetur. Pertinet ea appellatio ad capituli, aut seminis in Tithymalo hoc figuram, quam in altero Dioscoride περιφερῆ, id est, circumatam, in altero δὲ ὀρεῖ, id est, Erui figura & magnitudine ostendit. Sunt alia etiam quæ Theophrasto & huius scriptori non penitus eadem sint, & quæ in medicina aliter doceantur. Ea cognitu legentibus facilia erunt. Tria ut uidetur Tithymali genera tantum Theophrastus cognouit. Ea q; sunt, quæ prima a Dioscoride numerantur. Cætera nec illi, neq; herbarijs antiquis in hoc censu fuerunt. Siquidem Crateias, & Mison antiquissimi herbarij, quemadmodum Nicandri interpretes testatur, primū genus masculum dixerunt: appellariq; Cobium, fruticem exiguum, rubentibus uirgis. Secundum Myrthinem. Et tertium Tithymalida, qui Paralios est. Cætera enim solo lacte, quo abundant, a posterioribus in censum Tithymalorum recepta fuerunt. Paulus Aegineta scriptorem hunc secutus, totidem illi genera numerauit. Discreuitq; quibus uiribus, & qua natura communiter priuatimq; singula sunt. Quæ omnia quoniam non erit inutile audisse, ex eo ipsdem uerbis tradentur. Quæ huiusmodi sunt. Prædominantem alijs uiribus acrimoniā habent Lactariæ herbæ omnes. Inest eis etiam ualida amaritudo. Primas habet partes lac: tum semen: mox folia. Particeps & radix earum qualitatū. Eamq; ob causam in aceto elixa, exesorum dentium dolores sedat. Lac uero cauis eorum inditur. Quod si os tetigerit, q̄primum urendo exulcerat: ideoq; cæra id antea inuoluunt. Secundi enim ordinis in calefaciendo est, quem causticum esse dicunt. Eadem ratione defluunt lacte Tithymalorum inuncti capilli: sed quoniam ahelementius est, oleo miscetur. Et si sæpius radices capillorum aliquis inunxerit, exustæ penitus pereunt, glabrumq; relinquunt locum. Eadem potestate pterygia, formicas, uerrucas, & thymos tollunt. Quinetiam scabies, impetigines, carbunculantia, phagedenica, & cancræscen tia sanant. Omnium Tithymalorum efficacissimas maximasq; habet uires: qui Characias, id est, Vallaris dicitur: quem etiam marem uocant. Foemina iidem: qui & Myrsinites uocatur. Quinetiam in petris nascens & arborecens. Post hos qui Verbasco similis est, Cyparissias, & maritimus. Postremus omnium Solisequus est. Proportionem his omnibus respondet eorū cinis, & lixiuius cinis. Hæc sunt antiquorum medicorum de omni Tithymalo decreta.

De Pityusa.

CAP. CLXXVI.

PITYUSA aliqui Clema, alij Crambion, alij Paralion, alij Canopicon uocant. Hanc specie a Cyparissia differre constat, etsi Tithymalorum generi assignetur. Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus, folijs Piceæ, acutis, exilibus, flore paruo, purpureo, semine instar Lenticulæ, lato, radice crassa, candida, succo referta. Quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachmis duabus data in aqua mulsa. Item seminis drachma. Succum cum farina subacti cochlearium, in catapotio datur. Modus foliorum drachmæ tres.

πύθουσα
κράμσιον

D I O S C O R I D I S

C **E X M. V E R G. C O M M.**
 Inter arbores libro. 24. capite. 6. Pityusa meminit Plinius, & a Picea statim breuissime quam ille credidit satis fore omnē eius historiam & medicinā profectus est: nulla alia q̄ nominis occasione fretus. Neq̄ enim Pityi, quā Piceam uocauimus, congener Pityusa est. Frutex siquidē hęc, illa uero arbor, totoq̄ gñe inter se diuersa. Ille tñ ne cognata a congeneribus suis separare uideret, cognomines potius q̄ congeneres plantas simul & continuata historia descripsit. Hic eōtra, naturā magis q̄ noīa secutus, Lactarijs alijs herbis eam statim subiecit: quoniā parem laetis ubertatē, & simile in purgando uim haber, nec tanti folia eius Piceae similia fecit, ut reliquā naturā negligeret. Quod em̄ Pityusa Piceae simile habet, foliū tantū est: cætera Lactariae herbae similiorem & congenerē faciunt. Ideoq̄ ait a quibusdā inter Tithymalog: species & hanc numerari: foliaq̄ specie a Cyparissia Lactaria herba differre. Animaduertit hoc ante nos etiā Nicolaus Leoniceus, longiusq̄ de rota hac re in cōmentariolo suo egit. Eam uocari a quibusdā hic Clema ait, id est, uiticulam & sarmentū: quoniā forte quos habet caules, aliarū modo quæ uiticulas habent, per terram spargit. Paralium uero, quoniā Tithymalo ob lactis copiam similis sit. Quod deinde cæteri interpretes in radice dixerunt uocari eam Turpet, adiectū Dioscoridi a posterioribus fuit. Id enim in nullis ueteribus græcis aut latinis legitur: nec legi etiam debet, quādo barbara ea uox est, & a posterioribus medicis quæcunq̄ ea sit sic appellata. Ob quas causas, nos libenter & merito ex hoc scriptore eam eiecimus.

De Lathyri. CAP. CLXXVII.
L **A T H Y R I S**, quam aliqui Tithymalum appellant, eamq̄ Tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudi-
 ne, & digitali crassitudine, inanem. Gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & læuiora. Quæ autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, Aristolochiæ.
D aut oblongæ Hederæ figura. In cacumine fructum summis surculis gerit, triplici conceptaculo insignem, rotundum, ceu Capparin, in quo grana intercurrentibus membranis distincta continentur. Eruiis citiōra, rotunda, quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis usus. Totus frutex lacteo succo turget, uti Tithymalus. Grana sex, aut septem in catapotio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata, aluum purgant. Sed aqua frigida postea forbenda. Trahunt autem bilem, pituitam & aquas. Succus Tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. In gallinaceo iure, aut oleribus folia decoquuntur ad eōdem effectus.

Pli. li. 27. ca. 11.
L **A B A R B A R I C O R O L L.**
 Lathyris, folia habet multa Lactuæ similia, tenuiora, ut Plinius tradit, germinibus crebris. semina Piperis magnitudine, facilia purgati.

E X M. V E R G. C O M M.
Demonstratam paulo ante Pityusam, & quā modo tractamus Lathyrim ob eandem Lactis notā, & purgandi uim, Paulus Aegineta in. 6. Tithymalis alijs adnumerauit. Suntq̄ de Pityusa eius hęc uerba. Et hanc aliqui Tithymali speciem dicunt: quoniā simile lac habet, & utile purgat, de Lathyri autē quæ sequitur. Priuatim hanc quidam Tithymalū uocant: quoniā pariter illi lac eius purgat: etsi in Lathyri præcipuā purgandi uim semen habet. In qua descriptione animaduertendū in primis illud est: quod dicitur, priuatim quosdam Lathyrim Tithymalum uocare, eo pertinere, quasi non Lathyris, sed certiore Tithymali nomine ab illis indicetur. Credimusq̄ nos ex hac descriptione, posteriorumq̄ temporū usu, Cataputiam minorem a nostræ ætatis medicis Lathyrim appellatam fuisse. Nihil de Lathyri hac, quod hactenus in eo inuenerim, Theophrastus. Masculino tamen genere Lathyron inter legumina libro octauo de plantarum historia numerauit. Veritq̄ Gaza, Cicerculam: quæ nihil ad Lathyrim hanc pertinet. Plinius uigefimo septimo uolumine, capite undecimo, Lathyrim diuersa penitus ab

hōc scriptore historia tradidit: præsertimq; in folijs, quæ hic Amygdalæ, ille Lactucæ similia fecit: magno ut uidetur figuræ discrimine inter Lactucæ, & Amygdalæ folia. Sunt præter hæc & alia, quæ poterunt uolentes inuicem conferre, Nobis satis sit locum signasse.

¶ De Peplo.

CAP. CLXXIX.

Peplos, quem aliqui Sycen, alij Mecona Aphrodem uocant, fruticulus est lactei succi plenus, folijs Rutæ, paulo latioribus, rotunda coma, dodrantali, humi respersa, semine sub folijs rotundo, minore q̃ candidi Papaueris. Pluribus scatet auxilijs. Vnicam radicem habet, superuacuam, ex qua fruticat. Nascitur inter uites, & in hortis. Colligitur messibus. Siccatur in umbra, & continue uersatur. Fructus tufus, & feruefactus reconditur. Bilis ac pituita detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis cyatho potio. Obsonijs inspersa conturbat aluum. Muria conditur.

BARBARI COROLL.

Peplos, ex una tenui radice fruticat. Hanc & Meconion, & Meconitū ab Hippocrate uocari, Galenus auctor.

Pli. li. 27. ca. 13.

EX M. VERG. COMM.

Meconion, Meconitūq; id est, Papauer, aut Papaueraceam herbam uocasse Peplon hanc Hippocratem, testis est Galenus. Idem & Dioscorides testatur, spumeum Papauer ab aliquibus dici affirmans: postq; hos omnes Plinius libro. 27. capite. 12. Quod non aliunde, q̃ ex seminis similitudine factum est: quod omnes albi Papaueris esse dixerunt. Paulus Aegineta præter id habere Peplon lac etiam ait, Tithymalorumq; modo purgare. Omnes iidem Sycen uocari dixerunt. Quæ uox græcis Ficum significat: & quoniam lacte arbor ea abundet, ideo Lactariæ herbæ comunicasse suum potuit nomen. Plinius quo diximus loco iisdem notis descriptam facile cognoscendam diligentioribus reliquit.

¶ De Peplidæ.

CAP. CLXXX.

Pepulis, quæ aliqui syluestrem Portulacæm uocant, Hippocrates Peplion, in maritimis nascitur, largo frutice, candidi succi pleno, folijs satiuæ Portulacæ, rotundis, inferne rubentibus, semine sub folijs rotundo, uti in Peplo, feruente gustu, radice singulari, superuacua, tenui. Colligi & reponi solet. Datur uti Peplos, & conditur. Easdem habet uires.

BARBARI COROLL.

Portulacæ syluestres uocari herbas tris inuenio. Vnam quæ sit Aizoi species. Alteram cognomine Telephion. Tertiā Peplin, siue Peplion; de qua præsens mentio. Quid aut sit Diplion Aetio, qui ad auctore id refert Aretæum, haud scio. Terendū cum aqua inquit in angina morbo Diplum, & subiecto linamento, imponendum pectori, quoties præuocatio timetur. Sunt apud Græcos, inter quos Isaciū, qui Peplium; pro Senna modo appellata intelligant. Ego diuersum puto genus: cum Senna siliquas, & in ijs semē ferat, Peplis nō ferat. Alia est & Sennicula, siue Sanicula uocata, trāsalpina herba, folio Vitis, aut Apij rubentibus, in fine sectionū maculis quibusdam, surculis quoq; rubris ad radicē: quæ multis ei fibris subest, capitulis in summo frutice pusillis subnigrisq;: huius succū uulneratis in potum cōmendant.

EX M. VERG. COMM.

Neutrō gñe, sed eadē diminutiua forma Galenus Peplion Peplidā hanc uocat, & ad ducendam pituitā & bilem semē eius cōmendat: auctoreq; Hippocrate, dissiciendis inflationibus uti scem prædicauit. Paulus Aegineta a decretis scriptoris huius non discedens, feruidi saporis semen habere Peplidā hanc ait, Peplōq; pariter purgare. Quā ob causam eandē Peplo esse aliqui crediderūt, folijs in declinatione nois discrimen esse. Verūtamen certis discriminibus duæ inter se plantæ differūt: præsertimq; foliorū, quæ in altera Rutæ, in altera Portulacæ sunt. Ex quo

C factum est, ut tertium genus sylvestris Portulacæ hæc credita fuerit. Et sane similis illi paulo minus quæ tota figura est: adeo, ut facile pro Portulacâ fallere legentes possit.

De Chamæsyce.

CAP. CLXXXI.

C Chamæsyce aliqui Syce, alij spumofum Papauer uocitant. Ramos emittit quaternū digitorum, teretes, succosos, in terram deiectos, folia Lentis, parua, Peplum plane referētia, tenuia, quæ a terra non attolluntur, semine sub folijs rotundo, ut in Peplo. Neque caulem, neque florem promit. Radice firmatur tenui, superuacanea. Rami ex uino triti uulua dolores sedant, in pefso appofiti. Tollūt tumores, ac uerrucas omnium generū illiti. Decoctorū cibo, alius refoluitur. Succus fimili effectu prodest. Illitus contra fcorpionis iclum auxiliatur. Aduerfus caligines oculorum utilis, & hebetudines, incipientes fuffufiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squallidis petrosiscque nascitur.

BARBARI COROLL.

C Chamæsyce, pumila Ficus est, quali terræ Ficum significans.

EX M. VERG. COMM.

Quæ a Lactarijs herbis deinceps a fcriptore hoc numeratæ, tractatæque sunt Pityufa, Lathyris, Peplos, & Peplis, uno, quæ cætera defint, lactis liquore, quæ fecit oēs defillant, facile congeneres, nulla intercedente herba, fruticeue alio, coniunctâ merito descriptione in eo habuerunt. Nec aliunde humilis, iacensque in terra terrestris Ficus hæc, quæ tota Chamæsyces græcis significatio est, in ordinem & numerū illarum uenit: soloque lacte, quod Ficus simile habet, honestiorem quæ decebat ab arbore appellationem inuenit. Neque enim ramos, folia, fructusue ficulneos habet. Quod Fico comune habet, lac tantū est. Quæ ob causam parū proprie pumilâ Ficum, quod aliqui fecerunt, eam aliquis dixerit. Aliud enim est pumilam Platanū, & Cerasum dicere coactæ breuitatis arbores: & aliud quas Græci Chamæsyce, Chamæciffon, & alia huiuscemodi. Illæ siquidem suū genus feruantes, sola breuitate ab alijs differunt: hæc similitudine aliqua tantū, & alicuius solum partis in alio genere constitutæ, deficiente omni alio nomine, ab arbore, plantaue alia, cui in ea parte fimiles sunt, id impetrarūt. Quod facillime in Chamæsyce hacprehendit: quæ ramulos suos per terrā spargit, & folia Lentis habet parua, ut hic ait, tenuiaque, & in terra iacētia: quæ longissime a Fico arbore absunt: nec relinquit, unde sic uocari debuerit, quæ lactis liquor, quo multis oculorum uitijs & morbis medetur.

De Scammonia.

CAP. CLXXXII.

Scammonia aliquibus Scambonia radix, alijs Colophoniam, alijs Dactylion, Romanis Colophonium, Magis Apopleumonios, Aegyptijs Sanilum dicitur. Ramos ab una radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant, folijs Helxinæ, aut hederaceis, mollioribus tamen, densis, & triangulis. Flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excauatur: quo fit ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos subiectis Iuglandium folijs, profundunt succum, siccatumque extrahunt. Laudatur autem Scammonium læue, nitidum, rarum, & colore quæ simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ contermina deportatur. Nec attendere

solum par est, si linguae tactu albescat. Hoc enim euenit adulterato, qđ A
admixto fit Tithymali lacte. Sed longe magis antea narratis. Item si nō
uehementer linguam exurat. Id quod misti Tithymali argumentū est.
Natione autem Syriacum, & Iudaicum deterrima habentur, grauiā, dē
sa, Erui farina, & Tithymalo uitiata. Succus drachmā unius, aut qua-
ternum obolorum pondere haustus, ex aqua pura, uel mulsā, per infer-
na bilem & pituitam extrahit. Ad resoluendam aluum binos obolos
cum Sesama, alioque semine, sumpsisse satis est. Dantur efficacioris pur-
gationis causa, succi quaterni oboli cum duobus Veratri nigri, & Alo-
es drachma una. Fiunt purgatorii sales drachmis uiginti succi Scamō-
niā, in senos salis cyathos adiectis. Horum modus proportionē uiri-
um. Integer quidem tria cochlearia, medius duo, minimus unum. Radi-
cis drachma una, aut altera purgat, cum ijs quā retulimus. Nonnulli
decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum hordeacea farina
teritur, cataplasmate ischiadicis utili. Partus enecat, succus uulua in la-
na subditus. Tubercula discutit cum melle, aut oleo illitus. Decocto in B
aceto perunxat leprae abiguntur. Diuturni capitis dolores ex aceto &
rosaceo perfunduntur.

BARBARI COROLL.

Scamonia, siue ut Cicero, & Plinius quandoq; appellant Scammonium: quāq; Scammonii p
succo eius quoq; capitur. Frigida amar loca, pingui tamen & arido solo nascens. Lachrymā e
radice sua fundit, folijs albis, pinguibus, radice nauseosa. Circa canis ortum succus excipitur.
Adulterant Tithymali marini succo, maxime in Iudaea: quod etiam strangulat sumptum. Vis
bimo, nec ante, nec postea. Laudatur natione Colophonium, Mysium, Priennense, specie autē
nitidū, cito liquefens, uirus redolens, somniosum, linguae tactu lactescēs, & cū diluit albescēs.

EX. M. VERG. COM. M.

Erimus ueterum & iuniorum exemplo in Scamoniā & Scammonij cōmentatione breuiores.
Quotidiani enim in medicina usus res est: nullusq; non audito alterius nomine, intelligit qđ ad
purgationes praesentem, & maximam uim habet: noueruntq; omnes quem uendunt officinā,
concretum ex radice herbae liquorem. Quē multis quidem locis prouenit. Probatissima autem
transmarinis regionibus, praesertimq; Asia, & toto Colophonio agro. Ex qua regione factum
illi aliquando fuisse nomen hic a gentibus testatur. Quē dum probatissimum Scammonii quē
runt, & ex Colophone Asiae id petunt, paulatim fecerunt, ut quā bonitatis nota erat, in nomē
& appellationem transferret. Verum tamen facile id nomen perijt: seruato ubiq; quod primum
eraptius illi fuerat a principio factum: quod nos credimus rationem a fossura habere: quā hic
ad excipiendum liquorem fieri docet. *σκᾶμμον* enim graecis fodere est. Vocauitq; gens illa for-
minio genere Scammoniam herbam: masculino autem, aut neutro, exceptum ex secta radi-
ce eius *σκόμω*, aut *σκόμω*, id est, liquorem. Fecitq; usus, qui plerumq; liquoris eius est, ut miscerē-
tur quondam, & adhuc misceantur in appellationibus simul, liquor, & planta. Probatores tā-
en graeci neutro genere semper Scammonium liquorem uocauerunt. Sic Plutarchus in commen-
tario, quo docet quibus notis facernendus ab amico adulator sit, cum moneret, non esse in ca-
lamitate & infortunio castigandum hominem: quoniam non aliter reiecturus tunc praecipua
illa esset, qđ si aegroto assidens medicus diceret, ob praeteriti temporis uoluptates, nimiam uene-
rem, lōgiore coenas, & quotidianam ebrietatem omnia illi ea mala adesse. Fieri enim, ut respō-
deat dolens, iratusq; *παραινέσεις ταί μοι κατόριον καὶ σκαμμώνιον, οὐ δὲ νευθεῖς καὶ φιλοσοφίαι*. Quod
est. Preparatur mihi Cassiorum & Scammonium, tu autem mones & philosopharis. Pronulit
q; genere neutro Scammonium, *σκόμω*, id est, collectum & seruatum in medicinā usum radicis
Scammoniae liquorem intelligens. Descripsit lōgiore historia Plinius Scammonium & Scam-
moniam lib. 26. ca. 8. Hortamurq; nos bonarum literarum studiosos, omnia eius scriptoris di-

Pl. li. 26. ca. 8

D I O S C O R I D I S

Cetera, singulasque voces cum Dioscoride confetre. Neque enim erit ad utramque partem negligendum operæ precium. Siquidem intelligent in radicis descriptione, quam hic ait βαρυσσμον, quæ uox græcis graueolentem simpliciter significat, ab eo nausiosam dici; & quam hic ἐπὶ πλεονασμῷ, id est, liquore abundantem, madidam: multaque alia quæ Barbarus Plinium imitatus, ab aliquibus forte longius a scriptoris huius sensu discessisse uidebitur: madidam enim & ille uertit. Nos quoque niam post tot secula sentimus mutatam in multis uocibus antiquam significationis æstimationem, aut si ea adhuc seruetur, apertiore tamen docendi rationem in eundem in his esse, uertimus graueolentem, & multo liquore abundantem: iisdem uocum uestigijs huic scriptori per plantas eius ingredientibus.

De Chamelæa. CAP. CLXXXII.

Chamelæam aliqui Pyros agnen, alij Heracleon, alij Bdelyram, alij Coccon gnidion, Romani Citocacium, nonnulli Oleagine, quidam Oleastellum uocant. Surculosa fruticat, ramis dodrantalibus. Folia Oleæ similitudinem habent, tenuiora & amara, quæ gustata linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahit pituitam bilemque, folijs præsertim in catapotio deuoratis. Namque duæ Absinthij partes, adiecta Chamelææ una, hydromelite excipiuntur, & in catapocia coguntur. Ea autem in uentre non liquefcunt. Siquidem quot fuere deuorata, regerunt. Folijs cum melle tritis sordida ulcera & crustosa repurgant.

BARBARICOROLL.

Pli. li. 15. ca. 7

De Chamelæa.

Chamelæa, frutex est petrosus. Sunt ei (ut quidam habent codices) mora odorata Plinio. Quidam folia ei amara & odorata scribunt. Simillimum huic oleum inest, ut Oleastro: cuius & baccas quoque similes habet, ob id a quibusdam Oleastellum, & Olea cilibraca uocatur, autore Columella, Sirapam inde condidit foliam scribente. Sunt qui succum in Gallia, aut Italia nascentis, eundem esse cum Euphorbio putauerint. Sed hic multum infra illum est. Ex hac & granum Cocci plerique falso nasci existimauere. Nostri & hanc, & Thymelæam præcipue Casia uidentur appellasse. Theophrastus Cneoron: Igino id apud nos Casia interpretate. Cuius duo genera feruntur. Candidæ, cui folium cutis modo quadamtenus oleagineum. Nigræ carnosum, Tamarici similius, siue ut in Theophrasto quidam (quos probo) legunt, Myrto. Candida magis humi se spargit, & odorata est, Nigra sine odore. Radix ambabus alta, prægrandis, rami copiosi, crassi, surculosi, ab terra protinus aut paulo supra emicant, admodum lenti, ut quibus ad uinciendo pumco utant. Venere in coronamenta folio. Post Aequinoctium autumni germinant, atque florem mittunt, qui diutius eis est. Hæc tota de Cneoro siue Casia Theophrasti sententia est. Dioscorid. Cestron, & Cneoron uocari Thymelæam prodit. At ego non Cestron, sed Cnestro legendum arbitror, Hippocratis, & Galeni, & codicum uetustiorum fretus autoritate. Hoc ipso nomine Cultellus appellatur quo casei scabunt: quamque & Tyrogneffis, & Cobelis quæ is dicitur Poluci. Liparonis herbæ meminit Aetius, & Alexandria sic uocante: quam aliqui Cnestron inquit nominant, ad ulcera capitis manantia uehementer utilis. Nec indicatis auctor, qualis ea sit: utrumne a Thymelæa, siue Cneoro diuersam, an eandem putarit. Recentiores, ut plerique omnia, Chamelæam, & Thymelæam cum Daphnoide turpiter confundunt.

EX M. VERG. COMM.

Non ausim ego dicere, quod fecisse uidentur aliqui, pro comperto mihi esse, græcorum Chamelæam capite hoc a Dioscor. tractatam, Columellæ Cilibracam oleam esse, quam. 15. uolumine, capite. 48. scriptor ille, propter similitudinem Oleastellum a quibusdam uocari ait. Quæ enim numerantur ab eo illic ad Sirapæ confectioem Oliuarum genera, ex arboribus, non fruticibus legi præcipiuntur, posæ, liciniæ, & culminiæ, omnes in Oliuarum censu inter primas laudatæ: quibus uerisimile est, connumerari debuisse eam quæ egregiæ bonitatis pariter esset: præsertim dicente eodem Columella. Verumtamen habetur præcipua in hos usus olea Cilibraca: quam quidam propter similitudinem Oleastellum uocant. Ratiocinari enim ex his oportet, meliorem præbentemque Cilibracæ oleam præmonstratis illis esse: quod parum uerisimile est in Bacca. Oliuæque illa quæ sola similitudine, non quæ cõgener oleis sit, in censum earum uenerit. Nec obstat dicere Columellæ, propter similitudinem Oleastellum uocari. Potest enim ad totius arboris formam id re

ferri. At Plinius. 17. uolumine cap. 7. oleum ex Chamelæa fieri testat, expressio ex oleastris simillimum. Scimus id quidem; & nisi aliud doceatur, ex oliuis oleum etiam exprimi, oportereque si exprimendum ex Chamelæa oleum sit, oliuas baccasue in ea intelligi: quod tamen hic in Chamelææ historia non testatur; & si Plinius aperte id dicat, non constitutum ob eam causam Cilibracam Columellæ oleam; etsi Oleastellum uocari a quibusdam ille dicat Dioscoridis Chamelæam omnino esse. Siquidem oportet ad conficiendam Sirapam (sic enim ab eo appellatur, oliuarum cōditurū antiquum genus) meliores probatioresque oliuas eligi: quæ si in Chamelæa sint, quemadmodum ex Plinio ratiocinari licet, immaturas, asperasque, & quales in Oleastris sunt intelligere oportet. Non enim Olea Chamelæa est, sed a foliorū similitudine furculosus, & dodrantalis frutex sic appellatus. Eamque ob causam, si baccas, aut oliuas fert, quales diximus esse, eas uerisimile est. Patetque id ex eodem Plinio quo diximus loco, dicente post descriptum ex oleastro oleum, Simillimū huic est ex Chamelæa frutice, folijs Oleastri, baccisque, frutice saxoso, nō altiore palmo. Quæ tota descriptio longe a scriptoris huius historia diuersa est. His nos rationibus usi, quod in Dioscoridis legitur, aliqui uero Citocatū Chamelæam uocant, nō mutauimus; & si ea uox nihil modo nobis significet: sed qualis in cunctis grecis est, seruata a nobis fuit. Barbarus literarum prima uestigia secutus, Cilibracum ex Columella interpretatus est. Neque aliam ob causam longius dicta hæc a nobis sunt, quæ ut diuersitatis huius, & seruata a nobis cōmunis lectionis ratio omnibus pateret. Heraciam mox, id est, Herculeam uocari etiam Chamelæam in Dioscoridis legitur. Credimusque nos factum id nomen ex antiqua fabula fuisse, quam ex Pindaro in Oleastro primo uolumine retulimus: quod scilicet Hercules ex Scythia coronatus Oleastro in Græciam redierit; & quoniam similis Chamelææ Oleaster sit, & Oleastro Chamelæa, ideo similitudine decepti aliqui, non Oleastrum, sed Chamelæam Herculeam uocauerint fruticem & coronam. Reliquimus etiam contra aliorū interpretum rationem quod inter has appellationes auditur, *ἡ δὲ χαμλαία μέλαινα*. Quod est, aliqui autem Chamelæam nigram. Error enim id eorum est, qui græcarum uocum similitudine decepti, Chamelæonem cum Chamelæa miscuerunt. Neque enim nigredo Chamelææ competit. Qui colore nigro a candido discernitur, Chamelæon est. Et quoniam nihil in Chamelæa id causæ haberet, inutiles eas uoces expunximus. Errasse autem in duabus his plantis non græci tantum, sed latini, & hi quidem inter medicos probatissimi Auicenna, & Serapion uidentur. Qui Mezereon, quæ Chamelæa hæc barbaris est describentes, multa quæ Chamelæoni debentur illi tribuerunt; & ediuerso. Poteruntque uolentes id certius in Chamelæone, & Mezereon posteriorum scriptorum uidere. Sunt Chamelææ huius appellationes aliæ, uerum tamen improprie, & ex alijs plantis importune ad hanc relatae. Quemadmodum in Tymelæa quæ mox sequitur patebit. Ea enim proprie Pyrosachne, & Cnidium granum uocatur, si Plinio & antiquis grecis credendum est.

De Tymelæa. CAP. CLXXXIII.

Tymelæam alij Ghamelæam, alij Pyros agnen, alij Cestron aut Cneoron uocant. Ex qua Granum cnidium, quod est Thymelææ fructus, colligitur. Hoc Syri Apollinū, alij Linum appellant. Quoniam satiuū Lini frutex suapte natura similitudinē referat. Virgas edit perpulchras, tenues, tripedaneas, folijs Chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, uiscosiss, gummosisque si mordeantur: flore candido, fructu Myrti in modum rotundo, qui inter initia uiret, & tandem rubescit, pulpa fructus dura, foris nigra, intus alba, quæ per inferna bilem, pituitam, aquasque detrahit, si uiginti granorum pars interna bibatur. Verum fauces adurit. Itaque cum farina, aut polenta, aut in uuæ acino dari debet, aut melle cocto obducta deuorari. Qui ægre defudant, trito semine cū nitro & aceto inunguntur. Folia quæ peculiariter Cneorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & neruos eximere cōuenit. Illiū

A a ij

θυμλαία
χαμλαία

Cacetabuli modo cum diluta potione, aquam extrahit. Mediocris purgat, addita Lente cocta, aut contritis oleribus. Thymelææ farina uuæ acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta, Partus imposita necat. Nascitur in montibus & asperis. Hallucinatur qui Coccon Cnidium fructum esse Chamelææ existimant. Falluntur enim quadam foliorum similitudine.

Pli. li. 19. ca. 21

B A R B A R I C O R O L L.

DE Thymelæa, granum, siue Coccum Cnidium enasci constat, Myrti magnitudine, colore & specie foris, autore Dioscoride, non farris, ut in Plinianis codicibus deprauate legitur. De Thymelæa nonnihil & superiore protinus mentione diximus.

E X M. V E R G. C O M M I.

Antiquæ, & antiquorum scriptorum autoritate receptæ appellationes omnes, Thymelææ scriptori adiectæ sunt. Quandoquidem Plinius, 13. uolumine, capite, 21. his uerbis de Thymelæa egit. Fruticem uero Thymelæam alij Chamæleam, alij Pyrosachnen, alij Cnestren, alij Cneoron. Qui uocum & nominum numerus idem huic scriptori est. Theophrastus itidem primo de plantarum historia de foliorum diuersitate agens, Cneoron Thymelæam uocauit. Eius uerba hæc sunt. τὰ δὲ ὅντων σκευήματα τῶν δὲ ὅντων σκευήματα ἔχοντες τὸ πολλὸν ὅντων κνέστρεος μυρτὴν μάλιστα τῶν δὲ φρυγανικῶν κνέστρεος σείβη, τῶν δὲ ποσειδῶν αἰσῶν. &c. Quod est. Carnosi folij quædam etiā: & id quidem, quoniam carnosum id habent qualis Cupressus, Myrice, & Malus est. In furculo fo itidem genere Cneoros & Stæbe, & in herbaceo Sedum. Quæ ex scriptore illo repetita: & cōmentationibus his nostris addita sunt: ut qualis Thymelæa hæc sit certius adhuc cognoscat. Surculosi generis herba, & carnosii folij: quæ in Diosc. consicienda magis, q̃ manifeste intelligenda sunt. Siquidem uirgas in ea dixit, & Lino comparauit, & folia pinguis gumosaq; descripsit. Quod totum Plinius ex Theophrasto acceptum eodem loco retulit, simile Oleastro Thymelæam faciens: folijs angustioribus, gumosis li mordeantur, Myrti magnitudine. &c. In quo laudandus etiam Theophrastus, qui folium Thymelææ describens, Cneoron eā uocauit: quæ si sciret & ipse quod Diosc. testatur, folia tantum ea uoce censeret. In. 9. deinde remedia & uires eius tractaturus, Cnidium granum uocauit, easdemq; huic scriptori uires illi assignauit. ὁ δὲ κνίδιος κόκκος στρογγύλον ἑνὸν τῇ χρεὶ μῖσιν δὲ τοῦ πιπίρωσ ἰσχυρότερον δὲ περὶ τῇ θερμότητι, ἀπὸ καὶ ὅταν διδιδάσκειν κατὰ ποτὸν, διδιδάσκειν γὰρ πρὸς κοιλίαν λίσιν ἐν ἔρῳ ἢ σίετι περιπλάττοντες, καὶ γὰρ ἀλλὰ τὴν φάρμακον. Quod est. Cnidium uero granum rotundum, coloreq; rubens, semen fert Pipe re maius, multoq; ad calefaciendum Pipere ualidius. Quam ob causam cum dant (datur autē ad soluendam aluum) in pane, aut adipe inuolutum dant: alioquin fauces urit. Et hæc nominū diuersitas in Theophrasti Thymelæa est. Quibus addiderunt alij alia: uocaruntq; aliqui Pyrosachnem, ab urendi uī quam habet. Pyrenim græci ignem uocāt. Nec aliud Pyrosachne, compositum ex igne & tenui stipula nomen indicat, q̃ quod egregie urit. Chamelæa eadem dicta fuit, quoniam ut Plinius ait, Oleastro similis sit: ut hic scriptor autem, quoniam Chamelææ, quæ superiore capite præmonstrata est, folia similia habet: quod totum eodem redit. Quod enim simili simile est, eandem similitudinis causam & principium habere oportet. Cnestro postremo eandem hanc Thymelæam uocarunt probatissimi græcorum scriptores Hippocrates, Galenus, & pleriq; alij. Nobis tamē ignota uocis eius origo & causa. Comparauit eam Diosc. λίνω σάπρω: neq; aliud uoces illæ in cōmuni significationis æstimatione significant q̃ satium Linum. Quærendum tam & eruscandum diligentius opinamur, Lino nesciūuo simpliciter, an furculoso frutici, quem Sparton omnes uocant, & hic eodem hoc libro descripsit, similem Thymelæam dixerit. Nobis in hanc partem inclinat animus: & si aliorum interpretum modo & nos satium Linum uerterimus. Genistæ em̃ similitior, q̃ Lino ex historia, descriptioneq; eius uideri potest. Vniuersæ plantæ nomen factum uidetur ab Olea cui similis est, & a Thyma herba cuius habet flores. Paulus Aegineta præter ea quæ nunc in Diosc. leguntur, radicē eius contra sanguinis p̃fluuiā cōmendauit, uiribus, saporeq; acerbis: eiq; malo prodesse potā & foris impositam.

De Sabuco.

C A P. CLXXXIII.

Acten aliqui Dendron arctu, alij Hemeron, Latini Sabucum, Galli Scobiem, Daci Sebam uocant. Ex eo genere quædam in

arborem assurgit, furculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candidi-
cantes, proceros. Folia luglandis terna, quaternauc, ex interuallis circa
ramos exeūt, grauiā odore, minutim in ambitu secta, & in ramulorum
cacuminibus cauliculisq; circinatae umbellae, quae florem candidum pa-
riunt, mox fructum Terebintho similem, in nigredine subpurpureū,
acinosum, succo madentem, uinosumq;.

BARBARI COROLL.

SAbucum medulla carere aiunt nonnulli. Theophrastus Carnosam ei adiungit. Fruticosa
uirgis arbor: quae anniculae, donec folia deciderint in longitudinem crescant. In sena maxime
cubita: post id tempus in crassitudinem fundantur. Lignum fungosum, & cum inaruit leuissi-
mum: medulla molli: quae tota uirgulis eximitur baculorum usu. Siccatum durat, inoffensum
q; aquis redditur, etiam decorticatum, quod ei sponte arido contingit. Caudici crassitudo ga-
lex. Cortex leuis, tenuis, spissus: quem uocant Canopum, cuius a Graecis in Iuliani Oxyme-
lite fit mentio. Radices tellure summa, nec multas, nec grades agit. Folium minus, quod quide
pars est maioris, molle oblongumq; habet, ut laurus latifolia, maiusculum tamen, latiusculumq;
subtus & situ medio rotundius, exacutum, serratumq;. Folium uero maius, qd ex illis minori-
bus quasi coalescit, pediculo uno crasso & neruoso geritur, ceu ramulus, folijs utrinq; genicu-
latim & ordine iugatis, uno in uerticibus relicto singulari. Subruffa haec, & fungosa, & de sin-
gulis petiolis uniuersa collabuntur. Sunt & in ramis nouellis internodia, sed quasi rudia, intar-
ticulataq;. Flos candidus, ex flosculis minutis, faui speie congestus, e pediculi fissura, graui o-
dore, quanq; Lilij. Fructus quoq; racematim pediculo unico dependet, Actio uocatus, qui
cum ematurus, nigrescat. Immaturus color uuae acidae, paulo maior q; Eruum, humore lento.
Manus capillumq; inficit. Grana intus sesamacea, non ingrata turdis, sturnisq;. Locis potissi-
mum opacis, & iuxta aquas gignitur. Differt a ferulaceo genere, q; plus ligni ac succi habet, q; **B**
Ferula. E Sabuco magis canoram buccinam tubamq; credit pastor, ibi caesa ubi gallorum can-
tum frutex ille non exaudiat. Dictam puto arborem, a Sambuca musico instrumento, quod
alii Peetida uocant, alij Magadin: ut in arundine notauimus. Sambuca porro, ab autore uide-
tur appellata: cui nomen Sambyx fuerit. Vtiam tamen ea primam omnium Sibyllā perhibent.
Arbor utiq; ipsa non Sambucus, sed Sabucus dicenda est: si Serenio Quinro credimus.

Pli. li. 16. ca. 19
26. 40.
lib. 14. cap. 5.

De Ebulo.

CAP. CLXXXV.

ALTERVM genus Chamæactæ uocatur, alijs Helio-
factæ, alijs Agria actæ, alijs Euboica, Romanis Ebulum, Gallis
Ducone, Dacis Oliua. Ebulum longe humilius est, magisq; haerbaceo
generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato, folijs Amygdalæ,
ex interuallo longioribus, geniculatim distributis in uersus, graueolen-
tibus, in ambitu serratis, muscario Sabuci flore, & acino eiusdem. Radi-
ce nitē lōga, crassitudine digitali. Eadē utriusq; uis & usus, refrigerās, et
exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia, olerum mo-
re coquuntur ad pituitam bilemque detrahendam. Caules teneri in pa-
tinis cocti, eadem efficiunt. Radix in uino decocta & in cibis data, hy-
dropicos adiuuat. Prodest uiperarum moribus, eodem pota modo.
Vulvas emollit insidentium decocto. Laxat earum spiracula, & uitia
corrigit. Acini in uino poti eodem funguntur munere. Denigrant ca-
pillis illiti. Folia si prætenera ac mollia ex polenta illinantur, inflam-
mationem mitigant. Ambustis, & canis moribus illitu profunt. Vlce-
ra quae dehiscunt in fistulam, agglutinant. Iis qui podagra tentatur, cu

χαμαίαντη

Aa iij

D I O S C O R I D I S

C seuo hircino profunt illita folia.

Pli. li. 25. ca. 10
lib. 26. cap. 3.

BARBARI COROLL.

EBuli, siue Chamæactes, hoc est, Sabuci pumila foliorum decocto, mulsæ necantur. nam & colibuli macerantur aqua, ut ea sparsa culices abigantur. Baccas, flores ue Ebuli, aut Sabuci uidetur intellexisse Plautus cum dixit in Captiuis, Laridum, Atq; Ebebulas foueri foculis feruentibus. Nisi quis herbulas in eo uersu lectitare malit: aut qd' propius est uero, epulas. Ouidius, Epulisq; foci miscere calentes.

Aut hanc, aut ualde similem esse puto, quam Plinius Actæan uocauit uigesimo septimo uolumine. Actæa inquit, graui foliorum odore, caulibus Anisi geniculatis, semine nigro ut Hedera baccis mollibus. Nascitur in opacis, & asperis, & aquosis, datur acetabulo pleno, interioribus fœminarum morbis. Pro eo quod Dioscorides in caulibus umbellæ, & capitula Chamæacten habere scribit, Plinius caules Anisi reddit ei: quancq; non caulibus Anisi, sed asperis in plerisque legitur codicibus. Sed exemplaria quædam uetusta legunt Anisi, non asperis.

πικυόκομον

De Pycnocomo. CAP. CLXXXVI.

PYCNOCOMON constat Erucæ folijs, acrioribus, scabris, & crassis, caule quadrangulo, flore Ocimi, semine Marrubij, radice nigra, rotunda, lutei coloris, exigui Mali figura, terram redolente. Inuenitur in saxosis locis. Semen graui somnia & tumultuosa facit, drachmæ instar potum. Tumores discutit, illitum cum polenta. Spicula, adactosq; corpori aculeos extrahit. Folia illitu tubercula, panosq; discutunt. Radix eius in aqua mulsæ duum drachmarum pondere, aluum et bilem extrahit.

Pli. li. 26. ca. 3.

BARBARI COROLL.

EX M. VERG. COMM.

Sunt Plinio, & scriptori huic nostro de Pycnocomo omnia eadem: tantumq; non isdē uerbis cuncta latinus scriptor ex græco genti suæ reddidit. Locus est. 26. uoluminis. 3. capite. A foliorum confecta densitate nomen illi fecerunt græci. Neq; enim aliud Pycnocomon indicat, q̃ quod densa & confecta coma est. Herbarum autem comæ folia sunt, quæ hic a Plinio relicta aspera constituit. Ille enim crassiora tantum & aciora q̃ Erucæ sint dixit. Non indicauit etiam Plinius, quale semen Pycnocomi sit: non dico autem quale uiribus, sed figura & specie. Dederauimusq; nos id magnopere, hoc agentes, ut uariam in græcis lectionem teste & autore cotutius eligeremus. Sunt enim in quibus Marrubij, in quibus Porri seminibus comparetur Pycnocomi semen, una id discrimen faciente litera. Carteri interpretes communem secuti lectionē, Marrubio simile fecerunt: nos probatioris & uetustioris græcos, & quæ habemus egregiæ antiquitatis latinum Dioscoridem secuti, Porro comparauimus: uolumus tamen incertæ nobis rei fidem penes naturam esse. Discrepant in radicis colore Plinius & Dioscorides, ille lutei coloris tantum: hic nigrum primum, mox λευκὴν, id est, pallidam, quod idem luteo colori est, descripsit. Suspiciari multa in uarietate hac licet: aut deesse Plinio, aut abundare huic nigrum colorem, aut foris nigram, intus uero lutei coloris intelligi oportere, Pliniumq; alterum colorem tantum indicasse: quod suspiciari ab re forte non fuerit. Nigram tantum tradit quem antiquissimū habemus latinus Dioσκο. Quotquot autem græcos uidimus, omnes nigrum & luteum colorem illi assignat. Eamq; ob causam inclināt animus nobis, ut credamus diuersos colores illos, ad diuersas referri oportere partes. Legentibus tamen hoc liberum sit, donec, ut in semine paulo ante diximus, natura & res cognita, tam multas difficultates extricauerint. Animaduertendum illud etiam in uiribus & potestate radicis, dicere Plinium exinanire eam aluum, bilem, & pituitiam: hunc autem & reliquos græcorum medicos, bilem tantum: & inter eos præsertim Paulū Aeginetam, qui Pycnocomi radicem, semen, & folia discutiendi & extrahendi uim habere ait: & semē, quia ualidius sit, infixæ corpori etiam extrahere. ἡ δὲ ῥίζη καὶ τὸ σπέρμα καὶ τὰ φύλλα καθάρματα. Quod est, Radicem uero flauam purgare bilem, Id Barbarus extenuare dixit, non satis apto ad eam uim uerbo, ut nouisse omnes facile possunt.

A De Apio, seu Radice syluestri. CAP. CLXXXVII. **A**
 Apion nonnulli Ischiada, alij Camæbalanam agriam, alij Linozo
 stin, Latini Radicem syluestrem, Pœni Thorphathsadæ appella-
 lant. Iuncos duos, siue tres spargit, rubros, tenues. Qui a terra parum at-
 tolluntur. Folijs Rutæ, oblongioribus tamen, & angustioribus, hæba-
 ceis, semine paruo, radice Hastulæ regię, in formam Pyri turbinata, succi
 fœcūda. Intus habet succum candidum. Extra, corticēs nigros. Superior
 pars eius uomitione bilem pituitasq; extrahit. Inferior per aluum, Tota
 utrinq; purgationes mouet. Succum si libet eximere, tusa radix in fictili
 mergitur, & agitata aqua quod supernatat pinna selectū, exiccatur. Pur-
 gat utraq; parte is succus sesquibolo potus.

D E A P I O H E R B A. **B A R B A R I C O R O L L.**
 DE Apio herba, cognomento Ischas, quæ Raphani syluestris genus est, uolumine secun-
 do locuti sumus. Vbi omnia hæc ad uerbū fere uidentur esse repetita, Plinius Oposcillam uo-
 tauit (ut arbitror) corrupte, pro Apios Ischas.

H A E C E S T A P I O S I L L A S O L O N O M I N E, s e d a b i m p e r i t i s f a c t o, n o t i s s i m æ c u n c t i s R a p h a n o c o n-
 g e n e r e x i s t i m a t a. D e q u a l o n g i u s s e c u n d o u o l u m i n e i n R h a p h a n o e g i m u s: p o l l i c i t i q; s u m u s,
 i t e r u m h o c l o c o d e e a d i c e n d u m n o b i s e s s e: h a u d s a n e q u i a s u p e r f u e r i n t t u n c a l i q u a, q u i b u s
 n u n c d i c t i s s e c e m e n d a h æ c a b i l l a e s s e t, s e d q; i n u e n i e n d a h o c l o c o, u e l u t i e x a l i e n a p o s s e s s i o n e,
 o b e a s q u a s t u n c l o n g i u s p e r c u r r i m u s c a u s s a s, e s s i e n d a e x i l l o e r a t, t r a c t a n d a q; c u m c æ t e r i s,
 q u æ e f f i c a c i o r e m i n p u r g a n d o u i m h a b e n t. Q u a l e s m u l t æ d e s c r i p t æ h o c l i b r o h a c t e n u s, & d e
 s c r i b e n d æ a d h u c p l a n t æ s u n t, s y l u e s t r e s o m n e s, i n m o n t i b u s & i n c u l t i s l o c i s n a s c e t e s: n o n q u a-
 l i s s a t i u a i n h o r t i s, a u t s y l u e s t r i s i n c a m p i s R h a p h a n u s n a s c i t u r: q u æ n i h i l h u i c s i m i l e æ q u a l e-
 u e, a u t i d e m h a b e t, n o n r a m u l o s, n o n f o l i a, n o n s e m e n, n e c r a d i c e m e t i a m. S i q u i d e m i n R h a-
 p h a n i s l o n g i o r e s, i n A p i o h a c r o t u n d i o r e s & p y r i s i m i l e s r a d i c e s s u n t. Q u i n e t i a m p r æ t e r t o-
 t a m s p e c i e m o b s t a t c o l o r, q u i i n n u l l a R h a p h a n o f o r i s, u t i n A p i o h a c n i g e r c o n s p i c i t u r. S u n t
 a l i æ p l u r e s e t i a m d i u e r s i t a t i s n o t æ, q u a s b r e u i t a t i c o n s u l e n t e s e x p e n d e n d a s l e g e n t i b u s r e l i n-
 q u i m u s. A p i o n a r a d i c i s f o r m a G r æ c i h e r b æ a p p e l l a u e r u n t. E s t a u t g r æ c i s A p i o n i n p o m o r g e n e-
 r e P y r u m. E t q u o n i ā p y r i f o r m a r a d i x e i u s s i t, c o n t r a c t i o r t a m e n r o t u n d i o r q; i d e o n o m e n
 h o c i l l i e a g e n s f e c i t. A n t i q u u m s a n e, & q u o, s c r i b e n t e T h e o p h r a s t o p l a n t a r u m h i s t o r i a m, G r æ-
 c i a p a s s i m u t e b a t u r. N e q; h o c t a n t u m, u e r u m e o e t i a m q u o d s e c u n d o l o c o i n h o c s c r i p t o r e i l l i
 a d d i c i t u r. V e r b a e i u s n o n o d e p l a n t a r u m h i s t o r i a u o l u m i n e h æ c s u n t. τὸ δὲ τῆς ἀντὶς ῥίζης τὰ
 ῥῖζα ἂν τὰ δὲ κατὰ καθάριον θαυμασιώτερον διὸν τῆς τι θαλάσσης καὶ τῆς ἰχθύος, ἐστὶ ἄπιον καλοῦσι. Q u o d
 e s t. P u r g a r e a u t i n e a d e m r a d i c e a l i a s p a r t e s p e r s u p e r n a, a l i a s p e r i n f e r n a, m a g i s m i r a b i l e: q u a-
 l e s T h a p s i æ s u n t & I s c h i a d i s, q u æ A p i o n a l i q u i a p p e l l a n t. T e s t i s, u t u i d e t u r, u t r i u s q; a p p e l l a-
 t i o n i s T h e o p h r a s t u s e s t. V t q; a l t e r i u s a p p e l l a t i o n i s A p i j, s c i l i c e t m a n i f e s t a e s t e x f o r m a r a d i c i s
 r a t i o, s i c i g n o r a n o b i s a l t e r i u s: n e c q u æ o b c a u s a m a c o x e n d i c e, c o x e n d i c i s u e d o l o r e, n i s i h o c
 l o c o I s c h i a s a l i u d s i g n i f i c e t, n o m e n i d i n u e n e r i t r a t i o c i n a r i l i c e t. E s t q u i d e m o m n i b u s i n p r o m-
 p t u, f a c i l i s i n q; r a t i o c i n a r i, q u i a p u r g e t, & p u r g a n d o d o l o r e s c o x e n d i c i s l e u e t, s i c f o r t e a p p e l-
 l a t a f u i s s e: s e d n i m i s c o m u n e i d e s t: n e q; h i c, a u t T h e o p h r a s t u s q u i c q; p r o c o x e n d i c i s d o l o r e p a-
 l a m i l l i t r i b u e r u n t. Q u o f i t, u t n o s & s i i n c o m u n i g r æ c o r g o m n i u l e c t i o n e n i h i l m u t a r e a u s i s i m-
 u s, c r e d a m u s n o n I s c h i a d a, q u æ u o x c o x e n d i c e m & e i u s d o l o r e s, s e d I s c h a d a, q u æ C a r i c a m
 s i g n i f i c a t, n o n a b s u r d e p e n i t u s e x i s t i m a s s e q u o s d a m d i c i A p i o n h a n c o p o r t e r e. S i m i l i s e n i m,
 & t u r b i n a t a f i g u r a n o n a l i t e r q; P y r u m C a r i c a e s t. I n T h e o p h r a s t o q u i d e m I s c h a s p a s s i m l e g i-
 t u r, n o n I s c h i a s. Q u o f i t, n e d e m t r e m u r, q u i i n e o C a r i c a m u e r t e r u n t. Q u e m a d m o d u m
 n o n c o n s t i t u i m u s, s c r i p t o r i s h u i u s c o d i c i b u s m a g i s, q u æ m T h e o p h r a s t i c r e d e n d u m e s s e:
 P l i n i u s n e c P y r o, n e c C a r i c æ r a d i c e m e i u s c o m p a r a u i t, s e d C e p æ: a m p l i o r e m t a m e n q; C e p a
 s i t, e a m d e s c r i b e n s. L e g i t u r p a u l o p o s t i n s c r i p t o r e h o c, C h a m æ b a l a n o n d i c i e t i a A p i o n h a n c.
 E a u o x t e r r e s t r e m s i g n i f i c a t g l a d e m, q u a s i l a t e n t e m & o b r u t a m t e r r a g l a n d i s f o r m a r a d i c e m:
 o p o r t e t q; n o n g l a n d i s s i m p l i c i t e r i n t e l l i g e r e, s e d u t G r æ c i B a l a n o r g c o m u n i a p p e l l a t i o n e l o a

Aa iij

Ciores fructus indicant. Cur deinde agrestis, aut montana Raphanus dicta eadem fuerit, satis secundo volumine in Raphano, & hoc loco dictum a nobis est. Radicem eius, ut fere in cunctis graecis legitur, Spondylion herbae hic comparauit. Respondetq; id naturae, quoniam & haec, & Spondylion tertio volumine tractata, Raphani radice describitur: oportetq; inuicem similia esse, quae alteri pariter similia sunt. Vidimus tamen nos, in quibus non radix Spondylion similis legitur, sed Asphodelo, & his quidem probatissimis, & antiquae fidei, quod ab re penitus non est. Siquidem Asphodeli bulbosae radices illae, non penitus dissimile huic speciem habent. Secuti tamen communem lectionem & nos sumus, ob eam praesertim causam, quod hic in Spondylion radicem eius Raphano comparauit: & haec ob eandem causam syluestris, & montana Raphanus a multis credita & dicta est.

κολοκυνθίς

De Colocynthide. CAP. CLXXXVIII.
Colocynthis aliquibus Colocyntha agos, alijs Sicya picta, alijs Alexadrina Colocyntha, Zoroastri Tymbra, Ostani Autogenes, Romanis Cucurbita syluatica, Dacis Tustrata dicitur. Sarmenta foliaq; satiuae Cucurbitae emittit, per terram repentia, diuisa: fructum in speciem mediocris pilae conglomeratum, uehementer amarum, quem legere oportet, cum ceperit in luteum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam uim habet, si quatuor oboli melle cocto Myrrha & Nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Arefactae pilae teruntur, & infusae clysteribus prosunt, neruorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli uitij, ut quae bilem, pituitam & strimenta, interdum etiam cruorem eliciant. Fœtus admota enecant. Dentium dolorem tollunt, si una repurgentur, & luto oblita cum aceto & nitro inferuescat, hocq; iure decocti dentes colluantur. Si aqua mulsa, aut passum incoquatur, & sub diuo refrefcat, potu crassum humorem & strigmēta alui detrahet. Stomacho supra modum aduersatur. Subdita ex ea balano, alui excrementa efficiuntur. Viserenti succo utilissime ischiadici perfricantur.

Pli. li. 20. ca. 3.

BARBARI COROLL.
Colocynthis, Cucurbita est syluestris, plena ipsa, nec inanis, ut Somphos, minor q; satiuæ. Primo herbacea, mox pallida, quæ & utilior est, quando eius sunt medicinae. Hippocrates syluestrem Cucurbitam Sicyonem, & quæ fundo careat, & specie globosa & uniformi sit. Sicyan *ατματόν*, hoc est, insectilem appellat: interiorē uero partem eius, spongiam.

EX M. V. E. R. G. C. O. M. M.
Cucurbitulam Graecorū exēplo non male aliquis Colocynthida inter latinorū dixisset. Cur enim, si licuit diminutō a Colocyntha, quæ illis Cucurbita est, nomine, syluestrem & amaram hanc Colocynthida dicere: nō liceat & nobis a latinorū Cucurbita, Cucurbitulā facere, æqualemq; illis æstimatione & uocis compositione, rei passim notæ appellationem ad medicinā afferre? Nos sane in eam partē trahebamur. Fuitq; diu nobis animus, Cucurbitulam huic capiti titulum facere: sed reuocauit nos ab eo consilio, recepta iam pridem a medicis oibus, & officinis graeca uox: multoq; magis, ne æqui uoca appellatione miscerentur simul planta haec, & quas latini scriptores omnes ad aliū medicinæ usum transfulerunt, Cucurbitulas eas uocantes, quæ spiritus, & praefocatae flammæ ui corporibus nostris impactæ in superiorē partem & extimā cutē sanguinē, & q̄ alia opus fuerint, trahūt. Eaq; ob eā seruata graeca appellatiōe, de Colocynthide, q̄ syluestris Cucurbita est, caput inscripsimus. Alioq; Colocynthis parua Cucurbita est. Fecerūtq; eā Cucurbitis alijs congenerē Viticulæ folia & fructus: ideoq; tā multas ab eadē Cucurbita appellationes alias inuenit. Credimusq; nos, qd in Diosco. legitur, *ὅτι δὲ καλεῖται ἀργός*, quæ uoces nihil significāt aliud q̄ caprae Cucurbitam, & a cunctis ex eo caprina Cucurbita reddita est, potuisse qndā legi *ὅτι δὲ καλεῖται ἀργός*, qd est, syluestris Cucurbita. Nolumus nūc querere, uescant ne ea caprae, an nō: amaritudinēq; eius in cibo sentiāt: & an qd ho-

mini nocet, possit alijs animalibus nō nocere. Quotidianum enim id est. Fitq; pāssim quod Lucretius cecinit, ut non sit idem nobis & brutis multarū rerum sensus. Quippe videre licet, pinguescere sæpe Cicuta barbigeras pecudes, homini quæ est acre uenenum. Verum quod suspi-
cari hoc nos coegit, plantę genus est, quæ ab omnibus in syluestriū censu numeratur: omnesq; Colocynthida describentes, siluestrem Cucurbitam uocant. Et omniū maxime Plinius lib. 20. capite. 3. Quod a scriptore sioc relinquendū fuisse uerisimile non est. Monere id uoluimus, & si non multifaciendum forte aliquibus uideatur. Fecit amaritudo, quę Colocynthidi maxima est, & omnibus tam manifesta, ut qui plantam, & rem ignorat, solo Colocynthidis audito nō-
mine, amaritudinem intelligant, ut amara Cucurbita a quibusdam etiam diceretur. Quemad-
modum quoniā copiosa in Aegypto nascitur, cuius rei testes etiam sacre hebræorum literę sunt, Alexandrina Cucurbita. Et hæc pro Colocynthidis appellatiōibus dicta hætenus sint.

De Epithymo. CAP. CLXXXIX.

Epithymum Romani Inuolucrum uocant. Flos est e Thymo du-
riore, Satureię similis. Capitula habet tenuia & leuia, & in eis fi-
bras, quasi capillamenta. Potum cum melle detrahīt pituitam, bilemque
atram per inferna. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, acetabu-
li mensura, ad quattuor drachmas, cum melle, sale & aceti exiguo. Plu-
rimum in Cappadocia & Pamphylia gignitur.

BARBARI COROLL.

Epithymum, flos est Thymi, sed non omnis. Differentia, q; hic herbaceus, alterius Thymi
candidus. Aliqui cum Hippopheon uocant. Quidam aliter Epithymum tradunt, sine radice
nasci tenui, similitudine Pallioli rubens.

EX M. VERG. COMM.

Quod in Italia nascens nostre ætatis herbarij Epithymon ostendunt, id nobis uidet quod
Plinius, 26. uolumine capite. 8. de Epithymo agens aliter ab illo & his uerbis descri-
psit. Quidam aliter Epithymū tradūt, sine radice nasci, tenui, similitudine Pallioli rubens. &c.
Tenuissimis quasi capillamentis in glomerem conuolutis, & his rubentibus Epithymon hoc
uidetur: Floribus minimis, candidisq; Thymo similibus: nullis ut ille ait radicibus: eaq; for-
ma, ut lanæ, suppæue glomerem uidere te credas. Quam ob causam, non male crediderit ali-
quis, potuisse hoc genus a posterioribus Inuolucrum dici. Quod enim ab hoc describitur, &
copiosum in Cappadocia & Pamphylia nasci traditur: diuersum, ut ex historia eius patet, et ali-
ud a nostrate hoc est: simile tamen, aut coniunctum Thymo aliquid habere nomen indicat
aut alterum forte Thymi genus esse a Theophrasto & Plinio descriptum, nigro colore: quod
tertio uolumine inter appellationes Thymi numeratum ab hoc scriptore est. Theophrastus
quidem palam id docet quinto de plantarum historia dicens, καὶ θυμὸν τὸ μὲν λευκόν, τὸ δὲ μέλαν.
Quod est, Et Thymon candidum alterum, alterum nigrum. Et Plinius, 21. capite. 10. Tori-
dem & Thymi species, candidum, ac nigricans. Neq; hic aliud indicat, dicens Epithymum
Thymi esse florem durioris & Thymbre similis, quasi alterum sit Thymi genus, mollis, nec
Thymbre simile. Quocunq; autem modo se habet, si non alterum Thymi genus sit, coniun-
ctum Thymo aliquid esse oportet. Id em ea uox significat, quod in Thymo est scilicet. Et Pau-
lus Aegineta lib. 6. de eo agens, ait in tertio ordine siccare, calefacereq; Epithymum, & Thy-
mo efficacius esse. Quod ductu & conceptu uocum quod diximus ratiocinari facile est. Nihil
autem in eam partem magis nos trahit, q; nominis ratio, qua ut diximus, quod in Thymo sit,
nascaturue, intelligi oportet. Vtut eo idem Paulus, ut hic ait, in melancholicorum purgatio-
ne: nec minus etiam in ducenda simpliciter aluo. In quem usum bibi in uino iubet.

De Alypo.

CAP. CXC.

Alypon furculosa herba est, subrubra, latis ramulis, tenuibus fo-
lijs, flore molli, copioso, radice Betæ, tenui, referta acri succo, se-
mine Epithymi. Gignitur in maritimis. Hac pleraq; Libyæ loca sca-
tent. Semen atram bilem deiecit, si mensura Epithymo pari cum sale
& aceto sumatur. Verum interanea leniter exulcerat.

A

ἐπίθυμος

Pli. li. 26. ca. 9.
li. 21. ca. 10.

B

ἀλυπον

D I O S C O R I D I S

C A P. B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 4.

Alypon, & Alypea, & ut Paulo placet, Alympias, cauliculus est molli capite, non absimilis Betæ: ut inquit Plinius, acre gustatu ac lentum, mordensq; uehementer & accendens. Caput, id est, radicem eius, Betæ similem intelligo, non folia: quippe quæ minuta ei sint: ut Dioscorides affirmat. Deprauata in Plinij uigesimo septimo libro Aliphon, pro Alyppo legebatur, anteq; ipsi locum indicaremus.

E X M. V E R G. C O M M.

Semel tantum, & id etiam breuissime Alypi. 27. uolumine capite. 4. meminit Plinius. Nihil etiam Paulus Aegineta dictis decretisq; scriptoris huius addidit. Vtinamq; omnes nō multo breuius & incertius, q̄ hic de eo tradidissent. Verba em Plinij sunt. Alypon cauliculus est, molli capite, nō dissimilis betæ: acre gustu, ac lentum: mordensq; uehementer & accendens. Aluum soluit in aqua mulsa, addito sale modico. Minima portio duar; drachmarum, media quatuor, maxima sex, ea purgatione quibus datur e gallinaceo. Horum nihil, aut unum, alterumue in Diosc. legitur: cætera aut ab alijs accepta, aut aliter cognita Plinio fuerunt. Paulus Aegineta iisdem uerbis Dioscoridi subscripsit, Alypi dicens semen per inferna nigrā purgare bilem, pari Epithymo mensura sumptum, additis aceto & sale. Veruntamen leuiter intestina exulcerare. Quæ tota est in scriptore hoc Alypi medicina. Qui deprehendisse nostra ætate Alypon se credunt, furculosam, ut hic ait, herbam: sed non ultra duos, tresue furculos in ea ostendunt: in quibus per interualla bina sunt folia rubentia, & in summo lutei floris umbella. Quæ posset Alypon credi, nisi radix quæ in scriptore hoc gracilis & quantitate betæ traditur, in ea longe crassior inueniretur. Potuicilli a ui sua nomen fieri: & quoniam nigram bilem purget, qua purgata animi tristitia in melancholicis pellitur, eaq; pulsa adest statim lætitia humani animi naturalis habitus, sic dici. Est enim græcis Alypon, quod tristitia, doloreq; caret, aut liberat.

De Empetro, seu Calcifraga. C A P. CXCI.

Εμπετρον

D

EMPETRON aliqui Phacoides uocant. Nascitur in montibus & maritimis, falso gustu. Sed quo propius terreno fuerit, amarior sentitur. Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 9.

Empetron hoc Phacoides a Dioscoride, Prasoides a Galeno & Paulo cognominatur. Fere in saxo nascitur. Recenti uires sunt, uetustate perdit eas. Lapillos qui sufferuclant, una rumpi affirmat, quod & in Saxifraga quoq; diximus ex Plinij sententia, ut qui nihil differre ab ea iudicari: quandoquidē medicinas, quas seorsum in utraq; mentione Dioscorides enumerat, ipse uniuersas Empetro huic assignat. Aut igitur ita sentiendū est: aut Plinium errasse confitendum. Paulus certe Dioscoridem secutus, mentiones duas habet, quasi duorum generum. Galenus unam, Empetron Actius etiam Epipetron, uocari solitum affirmat.

E X M. V E R G. C O M M.

Nasci in petris Empetron satis indicat nomē. Epipetron eadē significatione ex antiquioribus aliqui etiā uocauerunt. Nec solū, quia Lentis figurā & spēm refert Phacoides, sed Marrubio similē Prasoides etiā. Plinius Saxifragā a latinis uocari ait: miscetq; cum ea quæ priuatim & seorsum a Dioscoride Saxifraga hoc ipso uolumine descripta est. Ex quo iterū suspicari cogimur, quod in Saxifraga dictum hoc ipso uolumine a nobis est, non esse illud in hoc scriptore eo nomine recipiendū: aut si sit, quod uerisimile tamē non est, uariantibus historia & medicina, bis de eadem actum fuisse non multo ante sub titulo Saxifragæ: quæ latina, & iterū nunc sub Empetri, quæ tota græca uox est. Paulus quidem Aegineta, qui totum in. 6. suæ medicinæ Dioscoridem multa breuitate exscripsisse uidetur, Empetri manifeste meminit: Saxifragæ autem nusquā: quod non relinquendū ab eo fuerat, si tunc in Dioscoride Saxifraga legeretur, aut ipse pro diuersa eam recepisset. Crederemus nos, etiam eadem Saxifragam & Empetron esse, nisi diuersa penitus utriusq; historia & medicina esset. Ob eam causam peritioribus hoc relinquimus, certius de Saxifraga inuenturis, quod recipiendū, constituendumq; sit.

De Clematide. CAP. CXCI.

Clematidem aliqui Epigetin, Aegyptij Philacuon, Romani Ambuxum nominant. Viticulis constat subrubris, folio uehementer acri gustu, & exulcerante. Vicinis inuoluitur arboribus ut Smilax. Tritum semen, & ex aqua, aut hydromelite potū, bilem pituitamq; detrahit. Illita folia lepras eximunt. Cum lepidio conditur ad esum.

De Labrusca. CAP. CXCI.

Labrusca sarmenta Vitis modo praelonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, folijs hortensij Solani, longioribus ac latioribus, muscoso flore, & capillaceo, fructu exiguis uuis simili, post maturitatē rubente. Rotunda est acinorum facies. Feruefacta radix in aqua, & in cyathis duobus uini aqua marina diluti pota, humorem alui ciet. Ideo hydropicis datur. Vuæ eius, uitia cutis in facie, & maculas omnes expurgant. Enascentes ramuli cibi gratia condiuntur.

BARBARI COROLL.

Ampelos agria, hoc est, Vitis syluestris, cæditur horis omnibus, sed præcipue autumno. Ra dice acri, ut Theophrastus scribit, folio spisso, candicante, geniculata, rimoso cortice, uuis rubentibus Cocci modo, ut Plinius. 23. uolumine. Hæc & pro Amuleto, cuius sit proprie uua Taminia. Radix & acini, coria perficiunt, gelidissimaq; eorum est natura. Ut errauerit Theodorus, qui uerba illa in Theophrasto φιλοῦσι τὰ καρπὸν τὰ δέρματα interpretus ita sit, Fructu defoliant arbores: cum legere debuerit, non dendra, hoc est, arbores, sed derma, hoc est, corium: nec defoliant, sed depiant & subigunt. Pars acinorum æstu moritur, priusq; reliqua: qui & solstitiales dicuntur. Vniuersi nunq; mātūrescunt: & si prius q̃ tota uua maturescat, detur cibo. Generi gallinaceo fastidium gignit uuas appetendi. Flos huius in racemis candidus dependet Solani per initia, post diuiditur in uitis fere imaginem, sed oblongam. Est ei similis, sed in salictis nascens, ad eisdem usus quæ Salicastrum uocatur, contra hominum & quadrupedū scabiem, Plinius. 27. ita descripsit. Folio duro, cineracei coloris, uiticulis callofis, rubentibus qualiter flos quem Iouis flammam appellamus in Violis, ferens semen punici mali simi le in acinis, ad eisdem effectus. Propterea e recentioribus fuere, qui hanc & flammulam, & Iouis quoq; flammam uocarunt. Est & Labrusca uitis syluestris una species, Oenanthen ferens, duorum generum, albi & nigri, ut Dioscorides post docebit: Neu quemq; decipiat Pliniana lectio, Labrusca inquit Oenanthen fert satis dictam, quæ a Græcis Ampelos agria appellatur, spissis & candicantibus folijs, geniculata, rimoso cortice, fert uuas rubentes, cocci modo, & reliqua. His uerbis Plinius. 23. uolumine duos frutices, non unum designat, Labruscam, & quæ Ampelos agria uocatur.

EX M. VERG. COMM.

Non est syluestris hæc Vitis quam Romani Labruscam dixerunt. Illa enim sola confitionis priuatione à reliquo uitium genere differt: hæc uiticularū, & racemosi fructus, quæ fert, similitudine inter Vites numeratur. Eamq; ob causam, duobus locis ab hoc scriptore, hoc scilicet, & a quinti uoluminis principio statim de syluestri Vite agitur. Hæc inter herbas, illa inter Vites: hæc folio hortensij Solani describitur, illa uitigineo folio intelligēda est. Et nihilominus, quod raro in ea gente fit, utriusq; idem nomen auditur: & utraq; Ampelos agria uocatur. Fuitq; hæc Plinio causa, nominum magis aliquando q̃ rerum rationē sequenti: ut bis diuersis locis de eadem syluestri hac Vite importune ageret. Primum. 23. uolumine capite. 2. inter Vites. Mox iterum. 27. capite. 7. inter herbas. Poterunt uolentes certius in eo quod dicimus cognoscere, legentesq; palam deprehendere, paulo minus q̃ totam duobus locis eiusdem plantæ historiam & medicinam esse. Quæ enim folia. 23. uolumine candicantia ab eo dicuntur. 27. deinde cineracei coloris uocantur: nullo discrimine inter candicans, & quod cineracei coloris sit. Quodq; priore illo loco in medicina decernitur, Radix decocta in aqua, & in uini Cōi cyathis duobus, humorem alui ciet, ideo hydropicis datur: in posteriore pariter docetur, Radix eius decocta in aquæ cyathis ternis, additis uini Cōi cyathis duobus, aluum soluit leniter: &

A

κλματτιδε

ἀμπιλον ἀγρία

Pli. li. 23. ca. 2

lib. 27. ca. 7.

B

C deo hydropicis datur. Quæ ex multis monstrasse satis fit: ne dubitent qui in Pliniana lectio-
ne occupantur, quales in eo sylvestres duæ Vites sint. Vna tamen tantum est, & inutiliter iterū
ab eo repetita, neq; apte inter Vites tractata: quoniam herba sit, & in herbarum censu seruan-
da fuerit. Nominis ut diximus ratio magis, q̄ rei misceri in eo hæc fecit. Theophrastus, 9. de
plantarum historia breuiter, & his uerbis de radice agrestis Vitis egit. *θρυμάντιον δὲ καὶ
τὸ ἀμπέλον τὸν ἀγρίον ἢ βίβα, διὸ καὶ ἡ φράσιν χρῆσιμον καὶ ἰσχυρίδας ἀπέχον. τὸ δὲ νερπὸν φέρονται
τὰ δένδρατα, τινεται δὲ πᾶσαν ὥραν ὁ πῶρος δὲ μέλισσα.* Quod est. Calefacit, acrisq; est, & sylvestris
Vitis radix. Eamq; ob causam depilando est, & cutis aspredines exte-rit. Fructu depilantur co-
ria. Ceditur quocunq; tempore, sed autūno præcipue. Dictum a nobis hoc etiā est, quoniā &
a Theophrasto inter herbas Peucedanū, Daucum, Dracunculūq; non inter arbores sylvestris
hæc Vitis numeratur: multoq; magis ob diuersitatē remedij ex ea contra cutis asperitates: qd
hic in fructu & acinis, Theophrastus in radice cōstituit. Videndū tamē, an sylvestris hæc Theo-
phrastū Vitis ea sit, de qua nunc agimus: an quæ statim ab hac tractanda erit: ex quo depilare
fructū eius dicit: quod a Dioscoride albæ Viti, quæ mox dicitur, tribuitur. Sit ergo inter her-
bas sylvestris Vitis, inter arbores autem Labrusca, suisq; notis utraq; quærēbus se ostendat:
illa, ut passim omnes nouerūt: hæc, ut a Dioscoride & alijs traditur, satui Solani folio a prin-
cipio, paulatim deinde in uiti- ginei figuram transeunte: uiticulis longis, & quales in Vite sunt
lignosis, asperis, rimosi corticis, acinis paruis, rotundis, in maturitate rubescēbus: quibus ob
seruatis notis, non erit difficile inter fructeta eam, et in sepibus inuenire. Et si non adeo frequens
nascatur. Nos qualem hic descripsit aliquando uidimus.

ἀμπέλος λευκή

V **De Vite alba.** **C A P. CXIII.**

V I T E M A L B A M. aliqui Bryoniam, alij Ophio-staphylon,
alij Chelidonium, aut Melothron, aut Psilothron, aut Arche-
zostin, aut Agrostin, aut Cedrostin appellant. Folijs sarmentis, pam-
pinisq; satiuam Vitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia. Ea quos
D prope se nacta sit frutices, suis clauiculis complectitur. Fructus rubens
in uua dependet, quo coria pilis spoliantur. Ex ea asparagi, qui pri-
ma germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum & urinam cient. Fo-
lia, fructus, radix, acrem uim fortiuntur. Itaq; ulcerum phagedanis,
gangranis, chironijs, putrentium tibi- arum tedio, efficaciter ex sale illi-
nuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat. Viti- a cutis in facie,
uarosq; lentigines, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta chia,
& scenogræco. Eodem effectū prodest decocta in oleo, usquedum li-
quescat. Sugillata tollit. Reduuias committit. Inflammationes disci-
tit illita ex uino. Suppurationes rumpit. Medicamento apte immisce-
tur, quod carnem exest. Infracta ossa extrahit, trita & imposita. Da-
tur comitialibus in potu, drachmæ pondere cotidie anno toto. Prodest
attonitis & uertigine laborantibus, consimiliter assumpta. Contra ui-
perarum ictus pota drachmis duabus auxiliatur. Partus necat. Mentem
interdum suburbat. Cit urinam pota. Eclegma ex ea fit cum melle, diffi-
cile spirantibus, strangulatu oppressis, tussientibus, uulsis, ruptis, & la-
terum doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto triginta diebus con-
sumit. Illini- ad eadem cum fico. Ad muliebres infessus decoquit. Siqui-
dem uulvas purgat, sed abortū facit. Succus e radice uere exprimi-
trahit pituitā cū aqua mulsa potus. Ad psoras & lepras semē efficaciter illi-
ni- . Lacūs abundantia facit succus eius, si cū tritico decoctio forbeat.

AMPelos leuce, hoc est, Vitis alba, quæ & Bryonia & Bryonias a Columella, & Madon ab aliquibus uocatur, Echerlosis ab Hippocrate, Melothron (ut putatur) a Theophrasto, in coronas folio admissa. Quidam Psilothrum dicunt: quia pelles confici huius acinis, quemadmodum & Labruscæ possint. Huius sarmenta, longis & exilibus internodijs geniculata scandunt. Folia palmipinosa, ad magnitudinem Hederæ diuiduntur, ut Vitium. Radix alba, grâdis, Raphano similis. Semen in uua, raris acinis dependet, succo rubente, postea crocino. Succus radicis colligi debet ante maturitatem seminis.

A

Pli. li. 23. ca. 21.

QUOD poterat a legētibz in scriptoris huius Bryonia desiderari, quos scilicet natales habere, & quibus locis inuenienda sit, Columella Romanus scriptor in carmine suo expleuit dicens. Quæq; tuas audax imitatur Nyssæ uites, Nec metuit sentes: nam uepribus improba surgens Achradas, indomitasq; Bryonias alligat ulmos. Bacchi uicibus similem, & in sepibus spinas, & aculeatos frutices alligantem describens: quæ tota fere est candida in hoc scriptore Bryoniæ historia. Monuit illud obiter etiam Romanus ille auctor, consueuisse ueteres ob quotidianum & multiplicem eius ad uitæ remedia usum, syluestrem alioquin stirpem in hortis conferre: ne egerentur incultis locis, & inter sepes quaerere, quod non in morbis tantum utile esset, sed in sanitatis usu simplex, & sale seruatum etiam placeret. Quod hic primum indicat, dicens comedi e terra primum prodeunt Bryoniæ asparagos. Mox etiam in primo Paulus Aegineta de omnibus asparagis agens. Et inter latinos Columella lib. 13. capite. 7. multarum herbarum cum floribus & coliculis suis condituram docens. Quæ omnia a posterioribus neglecta, dubium nobis modo utriusq; Bryoniæ nomen & historiam faciunt. Cum tamen nihil ubiq; notius, & medicina etiā nostri temporis, barbaris uocibus in his utens, cognita re, Bryoniam non satis cognoscit. Laudauit magnopere Bryoniæ asparagos quo diximus loco Paulus Aegineta his uerbis. καὶ οἱ ἀπὸ τῆς βρυονίας ἀσπαραγοὶ ὑπομαχοὶ μὲν καὶ διουρητικοὶ ἐλγὸν τῶν φερίων ἀπὸ τῆς ἀπὸ τῶν λαχανῶν. Egerat eo loco is scriptor de his, qui nunc priuatim asparagi dicuntur: mox ea subiecit. Et Bryoniæ asparagi stomacho quidem accommodati sunt, & urinam ciēt: parum tamen nutriunt: & si cum concoquantur, olerum asparagis in nutriendo efficaciores sint. Quod totum ad sanitatis usum pertinet. Nam in medicina præter has aliæ ab eodem in sexto uires utriusq; Bryoniæ assignantur. Omnes tamen ex hoc scriptore acceptæ, in quibus minus efficacem candida nigram, de qua mox dicitur, tradit. Nec aliud in remediis usu discrimē inter eas tradidit. Quibus autē notis & partibus inter se differant, facile erit ex scriptoris huius historia cognoscere: præsertimq; ex foliorum figura, & fructus colore. Sunt enim in alba satiuæ uitæ similia folia, pilosiora tamen: in nigra hederæ, priuatimq; Similaci: fructus in utraq; quidem acinosus, sed in candida πύρρος rufus scilicet, in nigra ante maturitatem uiridis, cum maturuit niger. Habet nigra etiā radicis certas notas ab hoc scriptore traditas, quibus facillime discerni ab alia possit. Non erit, ut diximus, difficile in sepibus, & inter fruteta quærentibus utramq; Bryoniam deprehendere: ubiq; enim nascuntur: & cum deprehenderit aliquis, si uoluerit antiquorum exemplo earū asparagis in sanitate uti poterit: sin minus, medicinæ seruare. Numerauit Plinius. 23. uolumine capite. 2. Bryoniæ albæ easdem huic scriptori appellationes Ophiothaphylem, Melothrum, Psilothrum, Archezostim, Cedrostim, & Nadon. Verum ultima hæc Dios. nulla est: nisi quæ in eo Chelidion legitur, Nadon legi debuerit: aut ediuerso legi in Plinio oporteat. Omnium huiusmodi nulla satis certa origo est: præterq; Psilothrum, quæ a depilandis corijs, quem usum habent acini eius, facta est. Ex quo potuit etiam & Melothron fieri. Siquidē græci μέλθρα dixerunt βάρματα & καλλωπίσματα, id est, colorum infectiones & concinnationes. Quod corijs forte ex Bryoniæ albæ fructu accederet. Sed in hoc scriptore per, ω, Melothron, in illis per, ε, scribitur. Potuit etiam Ophiothaphyle dici, quasi anguina uua. Id enim ea uox græcis indicat. In sepibus enim uirgineo folio, & acinoso fructu nascitur: in quibus & angues plerumq; latent: quasi crediderint aliqui, ut ex satiuis uitibus uuæ homini debentur, sic anguibz natura illas eo loco seruauerit.

B

N De Vite nigra. CAP. CXCv.

Nigra Vitis quam aliqui nigrā Bryoniam uocant, alij Ghironion ampelon, alij Bucranion, Romani Oblameniam, alij Britanum, alij Betisalcam, Daci Priadelam, alij Pegrinam, Aphri Lauothen.

ἀμπέλος μέλαινα

Bb

D I O S C O R I D I S

C Folia fert Hedere, sed maiora, simlaccis, pxima, caules etiam cognatos. Capreolis suis arbores quasi adminicula cōprehēdit. Fructus racemati coherēt, qui inter principia uirēt, & post maturitatē nigrescunt. Radix foris nigra, intus buxco colore nitet. Caules qui primo germinū partu erumpunt, in olera recipiuntur. Menses pellunt. Vrinās cient. Lienem absumunt. Vertiginosis, comitialibus, neruorum resolutione tentatis profunt. Radix eadē quæ Vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum uino exulceratis iumentorum ceruicibus commodissime illi nuntur. Luxatis itidem imponuntur.

BARBARI COROLL.

Ampelos melena, id est, Vitis nigra, quam proprie Bryoniam uocant, alij Gynecanthen, aut Aproniam, similem priori, præterq̃ colore, ut Plinius existimat. Sunt & in folio discrimina, ut Dioscorides, & ipsa quoq̃ res demonstrat. Huius semen nigrum, Asparago simile. In fructis, & arundinetis maxime nascitur. Aijunt, si quis in uilla eam extruxerit, fugere accipitres, tutasq̃ fieri aues uillaticas. Hanc etiam Tannum, siue Tamum quidam uocari putant; & uulgo Tamarum. Q. Columella,

Lubrica iam Lapatos, iam Tami sponte uirescunt.

Sunt qui Thamnum quoq̃ scribant, non Tamum, aut Tanum.

EX M. VERG. COMM.

R Arior inuentu, ideoq̃ cognitu difficilior nigra q̃ alba Bryonia est: inuenta tamen, totam ueterum scriptorum historiam confirmat. Sunt illi per interualla cum folijs dispositi racemi: & qui non ultra octo, decemue acinos ostendunt: multo minore q̃ in puniceis magnitudine: & colore ante & post maturitatem quo ab hoc describuntur. Quos tamen hic caules uocat, nos potius uiticulas dixerimus: earum enim speciem magis q̃ caulium habent. Maturescūt acini eius extrema æstate: & ubi minus calet, umbrosiq̃ locis autumnino. Nascitur & hæc, ut in alba diximus, in sepibus, & inter fruteta, propinquas stirpes ascendens, & alligans. Minor hæc q̃ alba est, nec tam late ut illa uiticulas suas spargit. Pares utriusq̃ uires antiqui omnes esse tradiderūt: ideoq̃ sine discrimine uti alterutra iusserunt. Licetq̃ id in Paulo Aegineta cognoscere: qui contra nigras cicatrices, utriusq̃ ope his uerbis utitur, οὐδὲν μεταίνας ἀπὲρ βρυονίας γίνεσθαι καὶ μὴ λαίνασθαι ἐφ' ὅσον ἐν λαίῳ ἀγρῷ χυλῶσας τὸ λαίον ἐπιτιθίσθαι. Quod est. Nigras cicatrices delet Bryoniae radice alba & nigra in oleo decocta. &c. De eius appellationibus non est quod dicamus, præterq̃ Chironiam uitem uocari potuisse: aut q̃ Chiron medicinae & herbarum in Thessalia peritissimus, ulceribus iumentorum & hominum ex ea primus remedium inuenierit: aut q̃ Chironijs ulceribus ea ueteres mederentur. Quod autem in scriptore hoc legitur, uua Taminiam dici a Romanis, falsum est. Alia enim a Bryonia Taminia uua est: quemadmodum Latini antiquiores omnes docuerunt.

De Filice CAP. CXCVI.

PTerin Græcorum alij Pterineon, alij Dacidonon, alij Anasphoron, alij Blechnon, alij Polyrhizon uocant. Magi Hermubain, Romani Filicam, alij Laculem, alij Filifanariam, Aegyptij Asini sanguinem. Folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex uno pediculo, cubitali longitudine exeunt, multifida & lateribus pinnata, subgravi odore, radice per summa cespitum nigra, oblonga, multis capillamentis fibrata, subadstringente gustu. Nascitur in montibus & saxosis. Radix latas tineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsā. Melius si cum Scamoniae, aut Veratri nigri totidem obolis detur. Sed qui sumunt, astia prægustare debent. Laborantes lienis incremento recreat. Radix & potu & illitu prodest ijs qui arundinibus cæsi sunt. Probatur maxime,

quæ in arundinetis proueniat & locis Pulegio scatentibus.

BARBARI COROLL.

PTeris, hoc est, Filix, marcescit fimo infecto, & ob id pecoris incubitu: quod & in Medica herba nonnulli tradunt. Nullus Filici incisæ succus. Radici gustus est dulci astringens. Vna hæc est, & ex ea Filices exeunt, bina etiam cubita excedentes longitudine, hanc marem existimant. A Filicibus Filecta, ut a Caricibus Carecta dicimus. Est autem Carex e qua molliissime texuntur cathedræ. Folio fere arundinis, uliginoso, & palustri solo plurima. Seruius Caricem describit acutam, & durissimam, Sparto similem. A Filice Felicones dictos existimant; quos ueteres pro malis & inutilibus accipiebant. Dicebantur & Felicati calices a Filice.

EX M. VERG. COMM.

Inuisam Maro in Georgicis suis, contra in Buccolicis ἀπαλὴν, id est, mollem, & ex eo amabilem Theopritus Filicem, dari rerum omnium peritiâ poetæ duo dixerunt. Neuter tamen simpliciter, sed alter aratri & frumentario agro, alter pastoribus & pecori: eadem fortuna qua tota fere natura est, quæ benigna semper & utilis, quod alijs importune abstulit, aut in quo nocuit alijs liberaliter dedit & profuit. Sterilitatis, aut parû foecundi ad fruges agri, indicium Filix est: & præter id obliquis & longis radicibus terram amplexa, bubulcos & boues longioris laboris tedio arantes remoratur. Contra, in montibus, incultisq; locis nascens, grata pecori & pastoribus quaesita: his cubilia & tomenta per hyemē sicca præbens, illi utroq; tempore cibos. Inutilis homini & infelix, nisi eiusdem naturæ benignitatis malorum remedijs & medicinæ ipsa etiam se miscuisset: nataq; in nobis uentris animalia enecaret, & perimeret. Quod nō tantum hic docet, sed multo certius Theophrastus ad extremū nonum de plantarū historia uolumen. Cuius de Filicis potestate & ui uerba hæc sunt. ἡ δὲ τῆς πτίριδος ρίζα μόνον τῷ χυλῷ γλυκύστροφος ἐστιν· ἀλλὰ καὶ πλεονέκτην ἐκβάλλει. σπέρμα δὲ οὐκ ἔχει οὐδὲ ὄπλον. πίνεσθαι δὲ ὁράειν μετοπώραν φασίν. Quod est, Radix uero Filicis sola, sapore dulci simul & acervo est. Latos lumbricos pellit. Non semen, non liquorē habet. Ferunt tempestiuā autumnō secari. Pluribus in scriptore hoc appellationibus Filix indicatur: pluresq; earum ab alis auium, quarum speciem in ramulis disposita eius folia referunt, factæ a gentibus fuerunt. Pennatus enim & pennatis folijs frutex Filix est. Quæ quoniam numerosa & confercta in pilosis ramulis eius sunt, ideo etiam a quibusdam Dasyclonos dicta est, δασύς enim hirsutum, pilosum, & asperum græcis significat. Quod deinde in eodē scriptore hoc passim, & in cunctis græcis legitur, uocari a quibusdam Filicē βλάχων, id est, ut nos uertimus, Blachnon, parum certam nobis habet rationem. Nec scimus, an ex Pulegio, quod βλίχωνα ueteres aliqui nominauerunt, ad Filicem male & importune deflexa appellatio ea fuerit. Siquidē nihil Pulegio & Filici simile, comuneue est. Nec legisse meminimus, gustatam pecori primū Filicem, quod Pulegio omnes tribuerunt. Balatū in toto grege excitare: ideoq; sic uocatam fuisse. Et nihilominus, ut paulo ante testati sumus, quotquot uidimus græcorum codices, Blachnon uocari Filicem indicant. Solus Nicander in Theriacis suis, nisi alia Filicis in eo ea uox sit, aut male in eo id legatur, aliter appellationem hanc protulit. Versiculus eius est. ἐν δὲ πολλὰς χιτῶνας βλάχων περιβάλλει χάρτην. Blethrum ille, nō Blachnon Filicem in multa folia diuisam uocauit. Quicq; interpretatus est eum græcus scriptor, Blethrum ait Filicē dici, quæ etiam Blachnon nominetur. Ex quo si recipiendum sit hominis testimonium, colligere oportebit, utroq; modo & Blachnon, & Blethrū Filicem quondam dictam fuisse. Eamq; ob causam nos nihil mutant, Blachnon uocari eam a quibusdam uertimus. Folia hic sine caule Filicem merito, & ex re uocauit. Sunt enim sibi folia non minuta illa, quæ numerosa & pene infinita totis ramulis disposita sunt, sed quæ uno pediculo cubitali, ut hic ait, longitudine a terra statim, aut ex stipite eius exeunt in plura & minora alia illa foliola diuisa. Nullos habet caules Filix. Si quid enim in ea supra terram extollitur, pediculi foliorum, non caulis rationem habet: quoniam negato illi semine, merito caulem natura etiam negauit. Propter semen enim plerumq; caulis est. Sterilem, & sine semine omnes Filicem dixerunt. Falsumq; est quod iactant aliqui, una solstitiali nocte florere Filicem: eademq; hora cum defloruit, maturum in terram semē cadere: ideoq; nisi aliquis tunc adfuerit, nec uideri florem, nec colligi semen posse. Quæ omnia Agyrtarum cōmenta sunt, humanæ ignorantie ad quæstum tam impudenter illudentium. Neq; hoc mendaciū genere contenti, ne quid fraudi corū & sceleri deesset, religionem etiam cōmentis suis addiderunt. Natali nocte eius, quo (ut sacræ Christianorū literæ testantur) inter natos mulierum maior alius non surrexit, cuncta illa fieri & obseruari præcipientes. Nec sentiunt, quo dierum numero natalis ea nox, & solstitialis illa nunc inter se distent.

Bb ij

A

Phi. li. 27. ca. 9.

B

D I O S C O R I D I S

C Sterilis, ut rem nostram agamus, priuataq; semine Filix est. Quodq; a natura sibi ea non inuenit, homini etiam inuider. Siquidem quod in scriptore hoc non legitur, ueteres græcorum medici & herbarij, posse Filicem dixerunt uiuentes in utero animantium foetus enecare, et eneas pellere. Quod ab hac statim dicenda Thelypteridi a Dioscoride tribuitur. Cuius & Filicis pares paulominus q; omnino uires sunt.

De Filice foemina. CAP. CXC VII.

Θελυπτέρη

Thelypterin, aliqui Nymphæam Pterin nominant, Romani Linguam ceruinam, folijs Filicis, furculosis & quæ non singulari ut illa pediculo fulciantur, radicibus longis, pluribus, latis, quæ ex nigro in luteum flauescunt. Aliquæ etiamnum rubræ inueniuntur. Pelunt lata interaneorum animalia, cum melle eclegmate sumpto. Potæ cum uino drachmis tribus teretes tineas efficiunt. Daræ foeminis sterilitatem faciunt, & prægnantibus abortum, si supergrediantur. Farina humidis ulceribus, & cicatrici repugnantibus inspargitur. lumentorū ceruicibus medetur. Folia recentia in oleribus cocta manduntur, ut uērem emolliant.

BARBARI COROLL.

Thelypterin alterum Filicis genus, foeminam appellant. Folijs hæc brauior, mollior, densior, canaliculata. Vtriusq; radicibus sues pinguescunt: quæ sunt eis longæ, obliquæ, nigrae, præcipue cum inaruer. Siccant eas sole, Virgilij occidentibus effossas. Nascuntur ubiq; sed maxime frigido solo. Vtriusq; lateribus pinnata; unde Græci nomen imposuere. His cimices necantur. Serpentem non recipiunt. Vfus radicis in trimatu tantum, nec ultra, nec citra, Laudant in utroq; sexu Macedonicam; deinde Cassiopieam.

EX M. VERG. COMM.

COpiosior, & pluribus locis Filix q; Thelypteris nascitur: ideoq; rustice & urbanae plebi notior: & quatenus homini inutilis planta, in minore honore est. Alioquin eosdē natales, easdēq; uires utraq; habet: specie etiam adeo similes, ut imperitos inuicem sæpe fallant. Quod aut maxime simile habent, pinnata folia sunt, eodem ordine & magnitudine in utraq; disposita. Quod contra discrepat inter eas, ramuli, & ramulorum color est: qui fruticosi in hac ab uno principio ex terra oriuntur, & quo colore radices hic esse ait, in nigro ruffo, & aliquando rubente uidentur. Discrepat & illud, q; Filix ubiq; fere nascitur, & contumax agricolæ repugnat, post confitos etiam agros regerminans: Hæc locis incultis, frigidis, umbrosis, & humentibus semper inuenitur. Quā ob causam Nymphæa Pteris, id est, Nymphæa Filix dicta est: q; nymphas, s. id est solitudines, nemora, & aquas amet. Foeminā Filicem græci eam nominauerunt, non sexus diuersitate aliqua, sed ut ea ratione qualia in plantis & medica materia pleraq; alia sunt, a priore illa discernent. Plinius, & græcorum herbarij alij, & medici simul, continuatq; historia de utraq; egerunt: hic tamen seorsum. Eumq; nos secuti, duobus capitibus, duas descripsimus plantas. Alioquin non male forsan coniunxisset eas aliquis: tanta inter eas similitudo, & tam commune genus, paresq; uires sunt. Legebantur in hoc capite contra q; oporteret duo. Alterum Barbarus ex Plinio emendauit, in radicum historia, s. in qua male in græcis legitur πλατῆαι, quæ uox latitudinem significat: cum tamen nulla sit radicibus his latitudo. Vnius literæ uirium & lapsus id fecit. πλατῆαι enim, id est, obliquæ, legi oportet. Plinius de his agens ait. Radices utriq; longæ in obliquum, nigrae, &c. Alterum ambo interpretes ex eodem Plinio emendari posse non animaduenerunt. Est autem ad ultimum capite, quo loco hic ait, καὶ ἔγνωσεν διακρίν. &c. quarum uocum sensus quidem est, ut illi crediderūt, Et si prægnans supergrediatur, &c. Verum non διακρίν, quod supergredi significat, sed λαβῆν, quod est, sumat, legi oportebat. Sic qui uetustissimus & probatissime fidei apud nos est græcus Diosc. habet. Sic ratio etiam ostendit: & Plinius confirmat dicens, Neutra danda foeminis: quoniam grauidis abortum, cæteris sterilitatem facit. Plinio etiam antiquior Theophrastus lib. 9. de plantarum historia de Thelypteride hac his uerbis docuit, ἡ δὲ θελυπτέρη χρησίμη πρὸς τὰς ἰσχυρὰς τὰς τι πλατῆαις καὶ τὰς λεπταῖς. πρὸς μὲν τὰς πλατῆαις ἀποδιδόναι μὲν τι, πρὸς δὲ τὰς λεπτάς ἐν οἷον γλυκὺ, καὶ ἄλλοις τῶν διδόντων. γυναικὶ δὲ ἰδὼν πλατῆαις ἰσχυροῖς ἐκβάλλειν φασὶν, ἰδὼν δὲ μὴ, τὸ ὅλον ἀπὸ τῆς γίνεσθαι. Quorum sensus est, Vtilis autem contra

lumbricos uentris Thelypteris, & latos, & graciles. Contra latos quidem cum melle, cōtra grāciles aut in uino dulci cum polenta. Quinetiam si mulieri detur, prāgnanti quidem abortū, simpliciter autem foeminis sterilitatem facere dicitur. Et hāc Theophrastus eadē cunctis alijs. Oēs, ut uidet, cibo potuue Thelypteridis sterilescere foeminas, grauidas uero abortū facere affirmāt. Nullus aut, si grauida Filicem hanc supgrediat, fieri abortum testatur. Eamq; ob causam, torrefitiū concordī fide & autoritate, aliter q̄ ceteri locum, & ut legitur intrepide uertimus.

De Filicula. C A P. C X C V I I I.

Polypodion aliqui Scolopendrion, alij Pterin, alij Polyrhizon, Latini Filiculam uocant. Nascitur in muscosis petris, & uetustis arborum caudicibus, praesertim Quercuum, palmi altitudine, Filici similis, subhirsuta, non tenui perinde diuisura. Radix pilosa, in qua continentur cirri, ceu poliporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus haerbaei, austeri aliquantum, & gustu subdulcis. Purgandi uim habet. Coquitur cum gallina, aut piscibus, aut Beta, aut Malua, ad aluum soluendam. Aridae farina aquae mulsae insparsa, detrahit bilem & pituita. Trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus digitorum fissuras.

Polypodion, nostri, ut Theodorus putat, Filiculam appellant, in Plinio ita legens. Ego Filiculam dicendum arbitror, cum ex Dioscoride, tum ex Filicis similitudine: tum ex Catone, qui Feliculam uocauit, ad deiciendam aluum praebere iubens eam. Eodem modo & Columella nominauit. Vnde uinum Polypodites quoq; ad eundem usum fit, praecipuum in Phoenice oppido eius Byblos: ut inquit Aetius. Post imbres semper emicat haec herba, fleret, & semen non fert.

EX M. VERG. COMM.
Folia Romanis Filiculā, Graecis pilosae cauernosaeq; acetabulorum modo radices Polypodion fecerunt: exiguum herbam, ideoq; diminuto nomine ab utraq; gente appellatam. Folia enim (quod hic Theophrastus, Plinius, latiniq; & graeci fere omnes testantur) Filici similia habet: radices autem pilosas, minimi digiti crassitudine. Sed quod marinis Polypis cognominem plantam fecit, per longitudinem certis interuallis dispositi concaui tumores, eadem specie et naturae usu quo in polypis acetabula uidentur, fuerunt. Neq; enim a multitudine pedū, quos nullo habet ut polypum, Polypodium graeci herbam nominauerunt, sed quoniam polypo, quae diximus nota similis est, sic quondam uocata fuit: nulla alia q̄ exigui polypi significatione. Diminutum siquidem a polypo nomen Polypodium est. Facile intelligit quod dicimus, qui oculatus testis radicis eius fuerit. Videbit enim qualem nos diximus crassitudine, & uillositate radicem: mox in ea apertos & concauos tumores quosdam, quibus nititur & haeret: non aliter q̄ in mari polypi acetabulis suis haerent, sugunt, & quae coeperunt tenent. Qualia autem Acetabula sint, & unde ad multas naturae partes id nomen transierit, in Acetabulo herba, & alibi longius diximus. Idque est quod Plinius uicelimo sexto uolumine ait. Radix crassitudine digiti minimi, acetabulis cauernosa, ceu poliporum cirri. Felici descriptione usus, rei quam antea Theophrastus, & hic scriptor isdem fere uerbis tradiderant. Theophrasti uerba libro nono de plantarum historia sunt, quo loco de radicum diuersitate agit, haec. ἡ δὲ τοῦ πολυπόδιου διαστὰς καὶ ἴχνησκα κοτυληδὼνας, ὡσαύτῃ αἱ τοῦ ποδὶ ποδὶος πικτάναι, καθάρει δὲ καὶ τὰς φύλλον ἴχνη ὁμοίον τῇ πτερίδι τῇ μεγάλῃ καὶ φύται ἐν τοῖς πέτραις. Quorsensus est. Pilosa aut Polypodij radix, acetabula habens, qualia polyporū cirri habent: purgat per inferna. Foliū maiori Filici simile habet, & in petris nascitur. Hic non tam manifeste rem descripsit: sed cum dixisset habere Polypodij radicem cirros polypo similes, cogitanda legentibus reliquit acetabula: quae necessario eos sequuntur, & sine quibus in polypis cirri esse nō possunt. Alioquin differunt a Cirris Acetabula. Illi enim tota polyporum flagella sunt: haec autem in flagellis & cirris his cauernosae concauitates, quibus id animal nititur, apprehendit, & apprehensa exsugit. Et haec tota Polypodij nominis ratio in graecis, & causa fuit. Romani, quae certius & in aperto magis erant folia contemplati, Filiculam uocauerunt. Testaturq; id Plinius, eodem loco dicens. Detrahit bilem Polypodium, quam nostri Filiculam uocant, Similis enim Filici est, Sed multo certius ante eum, M. Cato operis sui

Bb iij

A

πολυπόδιον

Pl. li. 16. ca. 8.
& 12.

B

D I O S C O R I D I S

C de rusticis capite centesimo quinquagesimo octavo, qui cum familiam rusticam doceret, quo modo aluum deijcere oporteat, plura simul coqui iubebat; frustum de perna Brassicae, & betae, cum radice sua coliculos: tum Filiculæ paulum, Polypodium hanc intelligens: cui, restantibus id cunctis alijs, egregia in purgando vis est. Polyrhizon, id est, multiradicem uocari hic etiam ait, ut paulo ante diximus, a copia radicum: quod nomen accreuisse nos illi credimus ex pilositate eius. Nasci in petris tantum Theophrastus ait, Omnes alijs tamen ultra petras in arborum, præsertimque quercuum truncis provenire etiam tradiderunt. Probantque officina, ex quercu magis, quæ ex petris, aut alijs arboribus. Plinius sub arboribus uetustis nasci ait, Cæteri uero in, non sub arboribus. Addidit ille tamen uetustatem necessariam Polypodij natalibus. Inter corticis enim rimas nascitur, quas uetustiores tamen arbores amisso iuuentutis humore & leuore ducit.

dryopteris

De Dryopteri. **C A P. CXCIX.**
DRYOPTERIN aliqui Pterion, alijs Nymphæam Pterin nominant. Nascitur in ueterum roborum musco, Filici similis, multo minore foliorum incisura, radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem uergentibus. Psilothrum est cum radicibus trita. Illinitur enim primum usque dum sudorem euocet: mox sudor abluatur, & recens imponitur.

Pli. li. 27. ca. 9.

BARBARI COROLLA
DRYOPTERIS, folio subdulci diuersa huic, sed similis est, Dryophonon a Plinio uocata, cauliculis tenuibus, cubitalibus, circumdatis utrinque folijs, Pollicari amplitudine: qualibus Oxy-myrsine, sed candidioribus, mollioribusque, flore candido Sabuci. Edunt cauliculos eius decoctos: semine uero pro Pipere utuntur.

EX M. VERG. COMM.
QVERNA Filix Dryopteris est: id enim græcis ea uox significat. Eamque ob causam ex Filice pleraque illi nomina accreuerunt. Polypodio similis eousque Dryopteris est, ut sæpe carpentes fallat. Filici enim similis ut illud, & in uetustis quercubus pariter nascitur. Quod discrepat, radix est, & in natalibus muscosæ arborum illarum partes. Sapor in utraque idem, sed ad medicinam uires diuersæ. Breuissime de ea antiquiores omnes egerunt. Nosque eos secuti, nihil ultra de ea monebimus, quæ oportere in carpendo diligentiores herbarios esse: ne si legentes similitudo fefellerit, nullas Polypodij uires esse utentibus credendum relinquat.

dryas

De Cnico. **C A P. CC.**
CNICUS folijs constat oblongis, asperis spinosis, caule sesquipeda-
li, capitulo magnitudine grandis oliuæ, flore Croci, semine can-
dido, aliqui ruffo, longo, anguloso. Huius flore in obsonijs utuntur.
Seminis tursi succus adiectis amygdalis, nitro, aneto, & melle decocto,
cogitur in placentulas, quæ aluum emolliunt. Hæc in frusta quatuor
finduntur, quæ nucis Iuglandis magnitudinem impleant. E quibus
ante cenam duo uel tria sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est.
Cnici candidi sextarius, amygdalorum tostorum & delibatorum cyath-
i tres, anesi sextarius unus, aphronitri drachma una, cum carnibus tri-
ginta caricarum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendæ
alui facultate donat.

Pli. li. 21. ca. 15.

BARBARI COROLLA
CNECOS, a Theodoro Cartamum sermone tulgi dicitur. Multis caulibus, ramisque spar-
git. Desyluestri diximus in Atrastylide. In Cneco peculiare illud a Theophrasto redditur: quæ
syluestre tenerius, leuius, & semine copiosius habetur: Satiuum durius, spinosius. Cnicon Ita-
licum ignotam, ut Plinius scribit, Aegyptus maxime celebrat, oleo, non cibo gratam. Hoc faciunt

ex femine eius, quo & pſitaci nunc aluntur. Cnecos melius q̃ Cnicos dicitur. Nam & Cnacon, a seminis colore Theocritus pro candido, siue flauo usurpar. Democritus, & omnino chymici florem Cnici Echumenion appellant. Iidem Elydrion herbam nominant; nec quæ sit ea docent, præterq̃, q̃ lutei sit coloris. Inuenio tamen in Opisthographis medicinalibus quibusdam, pro Chelidonio minore acceptam Elydrion.

EX M. VERG. COMM.

Agyptiam ubiq̃ in historia sua, & Italia ignotam Plinius Cnicon suam facit: conficiq̃ in ea gente ex eius semine oleum. Theophrastus, alijsq̃ omnes, non magis in Aegypto q̃ Græcia & alijs locis nasci decreuisse uidentur: simpliciter de ea agentes, nullumq̃ huiusmodi discrimen in ea indicantes. Eorum nos, priuatimq̃ scriptoris huius historiam secuti, quam nouerūt rura omnia aculeatam herbam intelligimus. Cuius flore ad coloranda obſonia, pro croco rustica plebs passim nūc etiam utitur, Crocumq̃ sarracenum totus Etruscus ager uocat. Congruunt enim omnes illi quæ a scriptore hoc notæ illi tribuuntur. Foliorum modica longitudo, incisio, asperitas, aculei, cubitalis caulis, & in eo capitulum: flos itidem Croco similis: pistremumq̃ omnium candidum, oblongum, & angulosum semen: eamq̃ ob causam uulgarem, & quotidiani pro Croco usus herbam intelligimus: quam diligentius etiam rura ob eā utilitatem serere consueuerunt. Nolumus, ut factū ab alijs est, quomodo ab agresti fuso Cnicos differat docere, & an congener illi, diuersaue sit. Ex Theophrasto enim libro. 6. de plantarum historia nouisse huiusmodi aliquid forte diligentior quispiam poterit. Qui duo genera Cnici constituit, syluestre, & satium, in altero potuit hanc, in altero illam numerare. Locus in eo nobis non satis integer uidetur. Eamq̃ ob causam nihil ultra ex eo constituimus.

Mercuriali.

CAP. CGI.

Linozostin marem, e Græcis aliqui Parthenion, alijs Argyron, alijs Aritrillin, alijs Chrysitin, Aegyptijs Aphlopho, aliqui Hermu botanion, Latini Mercurialem masculam, alijs Tesculatam. Aphri Afumes uocant. Folijs constat Ocimi minoribus, Helxinæ cognatis, ramulis duplici geniculorum nodo cinctis, alarum cauis multis: fructu in femina copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari e foliorum sinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis una coherentibus. Frutice dodrantali, aut maiore. Vtraq̃ in oleribus manditur, ad aluum ciendam. Cocta in aqua, epoto iure, bilem aquamq̃ detrahit. Constat ut mares gignantur, hunc facere, ut foeminae illam, si a purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueantur.

BARBARI COROLL.

Linozostis, siue Parthenion a Mercurio inuentus est. Ideo apud Græcos Hermupooan, & Hermubotanen multi uocant. Caule utriusq̃ generis cubitali interdum, sed ramoſo in cacumine, geniculis densis. Semen in geniculis dependens. Foeminae solum & candidum, mari iuxta genicula stans, breue, rarius, contortū. Folia Ocimo angustiora, sed maribus nigriora, foeminis uero candidiora. Radix superuacua, prætenuis. Nascitur in campeſtribus cultis.

EX M. VERG. COMM.

Com mendat se statim diuino noīe Mercurialis herba, uulgaris alioquin, uinetisq̃ & campis fere omnibus nascentis: aliquibus locis tam copiosa & efficax, ut sapore suo uina etiā inficiat, & bibentibus ingrata reddat. Vna, præcipuaq̃ illi in deſcienda aluo naturæ uis est, & a cunctis in medicinæ usu recepta. Numerauit, quo diximus in Polypodio capite. M. Cato & hanc inter ea quæ familiā rusticam ad deſciendam aluū docebat, monens non multū ex ea accipiendū esse. Quæ uis quoniā cōmunis illi cum pluribus alijs est, non uidetur diuino nōmine ornare eam debuisse. Credimusq̃ nos, quod in extremo capite ex aliorū fide a Dioscoride, & a Plinio. 25. uolumine, capite. 5. traditum est, diuini eius nominis causam illi fuisse. Id enim magis Deum hominibus ostendisse decuit, rarum, incognitū, multisq̃ omnibus seculis optatum: qui aut dum ægre ferunt, plures sibi nasci filias: uxorūq̃ suarū in eo sexu foecunditatē calamitosam sibi fore aduertunt; aut dum nominis sui memoriā, generis subsidium, hæredes fa-

Bb iij

A

A

Nyg(ostis)

B

Pli. li. 25. ca. 38.

D I O S C O R I D I S

C milia, & Reipub. ciues post se quotidianis uictimis & precibus reliquisse optant. Qua ratione alia prestare id sibi possent, a Deo cognouerunt. Factumq; ex eo est, ut Græci ἰμνοῦ πόναν, id est, Mercurij herbam, latini Mercurialem uocauerint: notam uulgo, ut diximus, & quæ ob nimiam soluendi uim, quam habet, pro maledicto in gente nostra etiam nunc sit.

C ^{αυγία} **Y**nia, aut Cynocrambe, aliquibus Linozostis, Aphris Armas, alijs Asumellabon dicitur. Cauliculum binum palmorum altitudine emittit, mollem, subalbidum, folia Mercuriali, aut Hederæ similia, certis interstitijs subalbida. Semen folijs adhæret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota aluum cient. Oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam, & bilem, aquamq; detrahit.

C ^{ΒΑΡΒΑΡΙ} **Y**nia non est ea, quam Theodorus Canariam interpretatus est, ut in Culice docuimus. ^{ΕΧ Μ. V E R G. C O M M.}

Q ualis canina hæc Brassica sit, non satis nobis constat. Si nomen solum expendatur, eadem Apocyno, quæ non multo ante hoc ipso uolumine tractata est, uidebitur. Si uires, & quæ posse traditur, Mercurialis esse merito creditur: præsertim iisdem penitus uerbis in hoc scriptore tractata. Quæ enim de ea feruntur, semen eam secus folia habere exiguum, rotundumq; potam præterea, aluum soluere: & olerum modo coctam, bilem & aquas corporis trahere: omnia paulo ante dictæ Mercurialis herbæ sunt. Quod autem nos maxime suspensum non legitur hoc caput. Nec Plinius (quod hætenus deprehenderim) aut Theophrastus de ea alicubi agentes. Inclinat ideo animus nobis, adulterinū scriptoris huius esse hoc caput, & alterius Mercurialis herbæ traditam ab aliquo sub hoc titulo historiam esse. Censebunt de ea peritiores. Nos enim quod ignoramus fateri pudebit.

D ^{ἡλιότροπον τὸ μέγα} **H** ^{ΒΑΡΒΑ} **E**liotropium magnum aliqui Scorpiuron uocant, alijs Heliotropon, alijs Dialion, alijs Heliopon, alijs Scorpioctonon, alijs Selsamon agrion, alijs Scorpij uran. Flos ei est effigie scorpionis caudæ. Vnde Scorpiuro ei nomen. Et quoniam folia cum sole circumagat, Heliotropion dicitur. Folia Ocimi habet, hirsutiora & candidiora, & maiora. Ramuli a radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis concaui: flos in cacumine candidus, aut subfuluus. Incuruatur ut scorpionis cauda. Radix tenuis est, & inutilis. Nascitur in asperis. Decocta ex aqua fasciculo manus plenæ, pituitā, bilēq; per aluū extrahit. Contra scorpionū ictus & potu & illitu prodest. Ad alligat, ut conceptū adiuuet. Aiunt per horā unam ante accessiones, seminis grana quatuor, quar tanas finire, tria uero, tertianas. Illitum semen formicantes uerrucas, pensilesq; & thymi florem representantes, & epynictidas exiccat. Folia infantium destillationibus, quas syrialeis uocāt, podagris, luxatisq; utilissime illiuntur. Menses cient. Partus trita & imposita pellunt.

B A R B A. **H** **E**liotropium a Cornelio Celso Solaris herba dicitur, æterno folio. Particulatim ut Ocimum floret: ideoq; perçædiu. Incipiens ab imo per solstitiū circūagitur se cum sole, ut nomē indicat, ut ortum eius mane spectet, et eius iter ad occasum usq; persequatur. Sed & nubilo die. Noctū uelut syderis desiderio contrahit ceruleum, ut Plinius ait, florem: album, subruffumq; ut Dioscorides. Genera eius duo, Maius Heliotrophon cognominatum. Et minus. Quæ utrunq; semipedalem altitudinem non excedit, Semen in folliculis mellibus colligitur, Nasci-

tur nō nisi in pingui solo, cultoque maxime. Colos Heliotropij, unus est e tribus fastigijs, in que conchilium diuisere ueteres; nostri Verrucariam appellauere: ut ualentem contra uerrucas. Si terram furculo huius circumscribat aliquis, negant scorpionem egredi. Imposita uero herba, aut inde omnino respersum, protinus mori. Formicas certe agri efficacissime necari Heliotropio monstratum est, opilatis herba earum foraminibus. Succum huius excipiunt æstate hora sexta, miscenque cum uino, ut sit firmior. Multa Magi de ea, sicut de cognomine quoque gemma polliceantur. Sed hæc propositi nostri haud sunt.

EX M. VERG. COMM.

Varro rerum rusticarum primo uolumine capite. 46. Heliotropium describens, sic uocari ait, quod solis ortum mane spectat, & eius iter ita sequitur ad occasum, ut semper cum spectet. In Malua ex Theophrasto omnium huiusmodi causa reddita a nobis fuit. Scorpium mox, & Scorpium cauda a floribus, uel ut nos certius dici credimus, seminis inflexione, quæ Scorpionum caudæ, ut hic ait, speciem refert, dictum Heliotropium fuit. Scorpium non autem, a uiribus quas contra Scorpionum ictus efficacissimas habet: & quia scorpiones enecet, ideo Scorpium dictum etiam est. In reliquis non tam certa ratio est, ut doceri a nobis possint. Solarem latini priuatimque Celsus uocauerunt, græcorum imitatione, qui a sole eam indicauerunt. Fuerunt præterea qui Verrucariam uocauerint, quoniam tam multis Verrucarum generibus, quæ ab hoc numerantur, medetur. Numerauit Heliotropium Theophrastus inter ea quæ particulam florent: ab inferiore parte sumpto principio, mox inter ea quæ perpetuo folio sunt. Ex quibus tam multis notis, facile erit multi nominis quondam & usus herbam & florem deprehendere. Vtebantur enim Solari hac uerba passim ueteres græcorum medici in his naturæ uitij & morbis, quibus mederi scriptor hic eam testatur: quæ nec numero pauca, nec periculo leuia, negligenda sunt.

De Heliotropio paruo. CAP. CCCIII.

Heliotropion paruum, quod & aliqui Scorpium uocant, nascitur in palustribus iuxta lacus, folijs antedicto proximis, rotundioribus, semine acrochordonum uerrucarum modo, pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota, adiectio nitro, hyssopo, nasturtio & aqua, latas tineas teretisque excutit. Pensiles uerrucas, quæ acrochordones uocantur, cum sale illita tollit.

BARBARI COROLL.

Heliotropium minus, Tricoccum priuatim appellatur. Vbiq; prouenit, folijs non solum minoribus, sed etiam in terram uergentibus. Semen & huic effigie scorpionis caudæ: de quo & Scorpium ei nomen est.

EX M. VERG. COMM.

Duo esse Heliotropia, maius scilicet & minus, quo diximus in maiore loco Varro testatur. Verba eius sunt. Nec minus admirandum quod sit in floribus quos uocant Heliotropia. Idem & Paulus Aegineta lib. 6. confirmat, seorsum priuatimque de utroque agens. Quibus autem notis inter se differant, hic satis docuit: nec minus quibus etiam uiribus discrepent. Quod tamen hic additis nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua ait. &c. Paulus Aegineta pro Nasturtio (nisi uirtutum in eo sit) Cardamomum numerat, frequenti in scriptore hoc & alijs, a Cardamo, quæ uox Nasturtium græcis significat, ad Cardamomum lapsu & mutatione.

De Scorpioide. CAP. CCV.

Scorpionides hærbula est, folijs exiguis, semine caudæ scorpionis effigie. Illita, scorpionum ictibus præsentaneo est auxilio.

BARBARI COROLL.

Scorpionides a Plinio Scorpis uocatur, ex argumento nomine accepto. Est & alia eiusdem nominis effectusque Asparagi cognomine: sed in totum spina, nullum enim folium habet, caule Asparagi, cacumine aculeato.

ἡλιότροπον τὸ
μικρὸν

B

σκορπίου

D I O S C O R I D I S

C E X M. V E R G. C O M M.

Scorpionē Plinius uocare hanc aliquot locis uidet. Non satis tñ nobis constat, an ubiq; hāc intelligat. Theophrastus em lib. 9. de plantarū historia Scorpion a radice, non seminis figura dictā aperte offendit. Verba eius sunt. *ἢ δὲ σκορπίον καλοῦσιν διὰ τὸ πλὴν ῥίζαν ἔχειν ομοίαν σκορπίῳ.* Quod est. Alij autē Scorpion uocant, quia scorpioni similem habet radicem. Hic autē seminis eam figuram dicit esse. Cogitandum itaq; quarendumq; qualis Scorpioides hāc sit.

¶ Finis LIB. Quarti.

P E D A C I I

D I O S C O R I D I S

De Medicinali materia. LIB. Quintus.

IO. R V E L L I O interprete.



V P E R I O R I B V S quatuor libris amicissime Ari, tradidimus de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, & earūdem lachrymis ac fructibus, itē animalibus, melle, lacte, adipe, frumētis, oleribus. Nec non de omni radicū, hēbarum, succorū, seminūq;

D ratione: In hoc autem totius operis Quinto differemus de uinis, & metallicis, & a Vite nostram cōmentationem auspicabimur.

¶ De uinifera Vite.

C A P. I.

ἡμπτισλὸν δινέφω-
50

F O l i a V i t i ū, & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigant, & inflā-
mationē stomachi ardorēq; cum polenta. Folia etiā per se, ut quā
refrigerēt & adstringāt, imponi solēt. Potus eorū succus dysentericis, san-
guinē excreatibus, stomachicis, & grauidarū malaciā medet. Eadem effi-
ciunt madefactū in aqua capreoli & poti. Lachryma Vitiū quā ueluti gū-
mi in caudicibus concreuit, ex uino pota calculos pellit. Illita lichenas &
pforas, leprasq; nitro prius perfrictas sanat. Eadē cum oleo sepius pilis il-
litis, psilothri effectū habet, maxieq; sanies, quā accensa sarmēta Vitiū ex
udarunt. Quā & perunciae uerrucarū in formicationes extrahunt. Cinis
sarmentorū et uinaceorum erūpentibus in sede condylomatīs & thymijs
illitus ex aceto medet. Prodest luxatis & uiperarū moribus. Contra lie-
nis inflammationē illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto.

H E R M O L A I B A R B A R I

Patricij Veneti, & Aquileiē. Patriarchae Co-
rollariorum LIB. Quintus.

V I T I S S A T I V A.



Pli. li. 14. ca. 13.

I T E M satiuam, Græci ampelon Hemeron, & Oenoen, & Oenophoron, id est,
urbanam, & uinum ferentem uocant. Item Clemarida, & Clemacem, interim &
Oenanthen: ut placet Iulio polluci. Superuacuum genera eius psequi, quia totidem Vitium
affirmantur esse, quot foli. Nasctur passim, & in alto Vitis, & propinqua littori. Durare Vi-
tem ad infinitū, resubili fecunditate perhibent, culturæ quodam genere, Theophrasto auctore,

ad Elephantinē: ut idem scribit, & Varro mutuatur. Non decidunt Viti folia, neq; circa Meri-
phin. Ad Delam quoq; Nili, fere tota uiret semper. Quod & alijs quocq; satis accedit. Capnia
uocatur unum Vitis genus, quæ uuam nigram ex candida, & candidam ex nigra sine prodig-
io ullo ferat. Infana Vites appellantur, quæ ad florem usq; perducunt. Quinetiam est ubi Plin-
ius Infanas Vites Triferas appellet: quoniam in his alię maturefcunt, alię turgescunt, alię flo-
rēt, Smyrnæ Triferam a se uisam. M. Varrone etiam prodente. Vitis candida melius reddit,
quo lætius fuit germen: quod quidē & huic, & Fico proprium. Vitibus Capreoli tribuuntur,
& Vitię: quos & Clauiculas, & Pampinos uocamus, Græci Helicas. Is est coliculus, ut Varro
inquit, Viteus, intortus ut Cincinnus, a capiēdo dictus, quoniam ad locum capiendū fur-
sum uersus serpat. Sicut Vitis dicta primo, quoniam inuitatur ad uuas pariēdas: & a parien-
do Parilema, deinde Palma, literis immutatis. Est autem Palma maior flagellus, unde nascun-
tur uuæ. Dalma, unius inuersione literæ a uenti flatu dicta: ut idem Varro inquit. Eadem Vi-
tis Caprea nominatur: quia Capreolum pareret. Vitia & pabuli genus est, a uinciēdo appel-
lata, q̄ item Capreolos habet ut Vitis, & ad scapum lupini, aliumue calamum ad quē hereat,
id solet uincire: unde Vititalia, pro pabularibus e Vitia dicuntur. Vitia tamen duplex, semina-
ris, & pabularis uocata. Recentiores Græci Biciā appellant, a non ostris (ut puto) mutuati. Con-
sistit in Vitibus lachryma largior incis, paulo ante germinatum, partior autumno: & hyemis
initio, minus fecundæ crebrioribus oculis gēmantur, solidioresq; feruntur. Ipes appellamus,
uermes in Vitibus nascentes, austrinis flatibus. Peculiaris Viti morbus Tragos, hoc est, Hir-
culus importuno uento germinibus abscessis: uel imperitia colentiū oblesis. Theodorus Arti-
culationē uocauit. Hircocere porro Vites dicuntur, cum infecundæ sunt: quoniam & Hircus
animal, ut inquit Aristoteles, sterile scit pinguedine. Vuæ ipsæ, & pampini laborant Crambo,
qui similis rubigini est, sole post humores longos insequuto uehemēti. Est & Niuatio, siue Ro-
ratio, quoties uua deflorente uixerit. Præterea Exacnatio, quā Theodorus Exuperantiā ap-
pellat. Græci citosin, quoties acinæ racemis defluunt. Sine granis interioribus uuas arte nasci,
auctores Græci posse docuerunt, Agigarton id genus uocantes. Vites arbusciue sunt, & sim-
plices. Arbusciuas Græci Anadendritidas, & Dendritidas appellant. Arbusci uero ipsa, siue
ignobiliori uoce arboreta idem Græci, Anadendradas, & Aminyxidas, & Amamaxidas, Epi-
charmus, & Sappho. Nam & Arbusculæ testudinū (instrumenti nomen id bellici est) Amaxa
podes uocantur: in quibus rotarum uersantur axiculit: ut Vitruuius Pollioni placet. Quamq;
nō defunt, qui genus Vitis Amyxidas, & Amamaxidas accipiant. Alij uuam Bumaston, aliq;
Hesperion uocatam interpretantur. Auroschas Parthenio Vitem significat: Eratoſtheni, ra-
mus eius cum racemo dicitur: Apollodoro Vitis Elinos, quo nomine Philetas, & Nicander
ramum eius, non Vitem ipsam capiunt. In Hircania, feracissimam esse Vitem, mirati sunt scri-
ptores: cum sit Aquilonibus exposita. Nam in Carmanis, & Margianis, Arianisq; crassitudo
tanta caudicis est, ut bini homines plerumq; amplecti nequeant, bicubitalibus racemis. Vitem
Boetij Thebis primum natam putant: qua & Liber pater.

EX M. VERG. COMM.

Quæ a rusticæ rei scriptoribus in conferenda uinea tam multę numerantur Vites, Ami-
næ, Plythiæ, Verrunculæ, Bumasthi, & pleræq; aliæ, omnes quocunq; colore ma-
turefcunt, uindemiamue, aut rusticā penum explent, una uiniferę appellatione a Diosco. colli-
guntur. Omnium enim in medicina eadē uis, paresq; in earum partibus ad remedia uires huic
scriptori sunt: & si posteriores aliqui in plerisq; Vitis candido colore uuam maturantis folia,
palmites, & capreolos magis probauerint. Quodq; uiniferę discrimen additum illi ab eo est,
nō aliā habet causam, q̄ ut ea nota satiuā omnis Vitis ab alijs, quæ superiore uolumine cogno-
mines illi tractatæ sunt, separetur. Hæc enim ad uindemiam, & sanitatis usum ubiq; fere conse-
ritur & excolitur: illæ sponte sua nascentes, nulla hominis cultura, medicinæ tantū inserviunt.
Hæc passim & omnibus nota, illæ medicam materiam tantum tractantibus, solaq; similitudi-
ne aliq; gentium adoptione in nomen Vitiū receptæ. De quibus dixisse tunc quæ oportebat
satis sit: quemadmodū nunc in quotidiana & notissima re nullū opæ precium laborasse fuerit.

De syluestri Vite.

CAP. II.

Syluestris Vitis duorum generum est. Alterius uua non mature-
ſcit, sed floretenus Oenanthen nominatam perducit. Altera ad fru-
gem peruenit, paruīs acinis, nigra, & adstringens. Folia, caules & cla-

φυλλοσ ἀγρία

D I O S C O R I D I S

C uiculæ, quibus repunt, uim habent cultæ Viti similem.

B A R B R A I C O R O L L.

DE Vite syluestri, superiore libro diximus.

E X M. V E R G. C O M M.

Alia est syluestris Vitis hæc ab ea, quæ superiore uolumine Ampelos agria, i. syluestris Vitis dicta etiã a Diosco. & tractata fuit. Hæc em satiuæ congener, syluestri habitu tantũ diuersa: illa sola racemosi fructus similitudine sic appellata. Eamq; ob causam illa syluestris, hæc Labrusca uitis sit. Nota ubiq; et cuius flores nunc etiã condiendis & odorandis uinis, quo tẽpore pubescit, diligẽtius leguntur. Dicimus aut pubescere, Vites florere, poëtæ nostri exẽplo: qui felici translatione a pubertate hois usus, ait, Tunc largo pubescit uinea sætu, florẽ Vitis intelligẽs: qui flauo colore lanuginosus, primæ in homine pubertatis spẽm ostendit. Græci a flore *ἔκφυσις* uocant. Quid autẽ Oenanthe græcis sit, primo uolumine in Oenanthini unguenti confectio- ne diximus, & ab hoc loco non multo post etiam dicemus.

De Vua.

C A P. III.

ἔκφυσις

Væ recentes aluum turbant, & stomachum inflant. Innocen-
tiores quæ decerpæ diu pependere: ideo, q; in eis copia hu-
moris exiccatur. Vilesq; fiunt stomacho agrisq; atq; cibi auuditatem
excitant. Vinaceis, aut uinario uase seruatæ, ori & stomacho gratæ sunt.
Aluum sistunt, sed uesticam & caput tentant. Et sanguinem excreanti-
bus conueniunt. Similesq; quæ in musto fuere. Sapa, aut musto con-
ditæ, stomachum magis infestant. At quæ solem prius passæ, in aqua
coelesti conduntur, minus uinosæ sunt, siticulosus, ardentibus, & longis
febris salubres. Reconditi uinacei, inflammatis mammis, turgentib;
bus ac præduris, cum sale illinuntur. Decoctura eorum dysentericos, coe-
liacos, & foeminas fluctione uulvæ laborantes iuuat infusa. Ad defessio-
nes ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringendi uim obtinent.
Stomacho utiles sunt. Inspargitur farina tostorum polentæ modo, dysen-
tericis & coeliacis & solutis stomacho.

B A R B A R I C O R O L L.

Vam, Græci Staphylen, a Staphylo Liberi patris filio, ut Prolomæus uoluit, appellant.
Lenida etiam poëtæ. Nam & Lenæus dicitur is Deus. Alia porro Vua eliquescit in potũ, alia
eligitur ad uestendum: hæc aut in corbulam fecernitur, ut inde addatur in ollulas: quæ in do-
lia plena uinaceorum trudentur: alia in piscinam picatis amphoris demittitur: alia in haram
Carnario suspenditur. Vuam Amineam minuscule, & maiorem, & Apiciam, commodissi-
me in ollis condi putauit Cato. Eiusdem generis in Sapa, & Musto rectissime seruantur. Du-
racinas, & Amineas, Scancianas, affirmant opportunissimas esse quæ pendeant: quod genus
omnes Conditaneas, & Condituias appellamus. Vuæ in palea seruatæ, pensilibus proximæ
dicuntur. Vuæ uehementiores nigrae. Ideoq; uinum ex ijs minus iocundum. Suauiores albæ,
quoniã aëre translucido facilius accipitur. Est & Vua Theriace uocata: q; contra morsum o-
mnium bestiarũ proficiat: cuius rationẽ ferendæ Palladius instituit. Florem Vuæ, in cibis dari
gallinaceis præcipiunt, ut præterea non attingat uuas: quod & in Labrusca diximus.

Vinaceus, Græce Stemphyton uocatur. Dicimus & Vinacea neutro genere, Palladius eti-
am foeminino Vinaceam. Hæc & Flores appellantur, sicut in Oliua Flaces, atq; Fraces. Vi-
naceos, poëtæ sunt qui Brycia, & Brytea quoq; appellant, q; & pro fratribus Oliuarum su-
muntur. Stemphyta, in Aristotelis Rhetorico, secundo, Gellius fecem ipsam e Vinaceis, &
oliuis expressam, Flores, & Fraces dici scribit.

Gel. li. ii. ca. 7.

Nuclei acinorum Vuæ, a Græcis Gigarta dicuntur, Palladius excrementa, & semina, &
grana uuæ interiora nominauit. Ab acinis, Acinaticum dici uinũ existimo Veronenfis agri: ut
scribit Cassiodorus, alumnũ, odoris, saporisq; suauissimi, colore purpureo, ineffabili dulce-
dine, tactu quoq; densum, atq; pingue: ut carneus liquor, aut potio esculenta uideri possit. Lau

dantur ex eodem agro & Rhetica ueteribus, in montanis Rhetorū, qui supra Veronam sunt, nascencia: ut inquit Strabo. Ipsos acinos, Cato acina, Catullus acinas, pronunciant.

E X M. V E R G. C O M M. Stillud ante omnia sciendum, a patientia Passis uitis, & uino nomē quondam factum fuisse, si Plinio credimus. 14. uolumine, capite primo dicenti. Quin & a patientia nomen acinis datur passis. Qualis autem ea sit, quantaq; 15. uolumine, capite. 16. docuit Columella, iubens ad passas eligi maxime albas, dulcissimi saporis, maximis acinis & raris: fieriq; id oportere Luna decrecente, sereno, & sicco coelo, circa meridiem: lectasq; uuas has in tabulis paulisper porrigi, ne inter se pressæ suo pondere collidantur: mox in aheno, aut fictili aliquo nouo amplo ex sarmentorum cinere factam lixiuiam, usq; ad feruorem calefaceret: & cum feruebit, aliquid putri & optimi olei adijcere, simulq; miscere: tum racemos uuarum pro magnitudine binos, uel ternos simul colligatos in ahenum illud feruens demittere: tam diuq; illic habere dum decolorentur, non tamen excoquantur: in qua re agenda moderatione temperamentoq; opus erit. Exemplas dein ex aheno uuas in crate disponi idem iubet, rarius q; ut altera alteram cōtingat. Singulas deinde post tres horas insolatas conuerti. Neq; ubi prius fuerant reponendas: ne relicto illic humore corrumpantur: noctibus etiam tegi, ne irrorentur, aut imbre madeant. Post aliquot postea dies cum modice aruerint, in uasa noua cōdi precipit. &c. Et hæc scriptoris eius Passæ uitæ sunt. Palladij alia ratio est: quam in Octobri mense his uerbis monstrauit, non ut Italia, sed ut Græcia conficere consueuerat. Vuam passam græcam sic facies. Melioris acini, & dulcis, & lucidi botriones in ipsa uite torquebis, & patieris sponte sua inarescere: deinde sublatos in umbra suspendis, & uuam districtam componis in uaseulis: substernis pampinos, sicco algore frigentes. &c. Diuersa hæc a Romana Passæ Vuæ confectio est: quemadmodum & eius conditura fuerunt. Quæ quoniam longius a Columella eodem capite docentur, non reddentur a nobis. Poterunt enim ab illo uolentes omnia certius audire. Interim autem nos docebimus, primum qua ratione Columella, tum qua Palladius Passum, & uterq; suum conficiant. A Columella. 17. uolumine, capite trigesimo nouo ex Magonis Africani præcepto (nam eius gentis primum Passi confectio, & maximus usus fuit) sic fieri Passum præcipitur. Vuam præcoquam, bene maturā legere oportet: acina arida, aut uitiosa reijcere: furcas mox palosue qui cannas sustineant, inter quaternos pedes figere, & perticis iugare: tum insuper cannas ponere, & in sole pandere uuas: noctibus uero regere, ne irrorentur. Cum deinde exaruerint, acina decerpere, & in dolum cōijcere. Eodem mustum q; optimum, sic ut acinis superferret, adijcere. Vbi combiberint uuæ, seq; impleuerint, sexto die in fiscellam conferre, & prælo premere, Passumq; tollere. Et hæc conficiendi Passi disciplina ueteribus fuit: & si aliæ etiam rationes ab eo eodem loco numerentur. Palladius non dissimilem huic confectionem Octobri mense sua ætate fieri docuit. Ante uindemiam enim Passum fieri iubet uniuersæ Africæ more pingue atq; iocundum. Leguntur Vuæ Passæ q; plurimæ, & in fiscellis clausæ iunco factis aliquatenus rariore contextu, uirgis primo fortiter uerberantur. Deinde ubi uuarum corpus uis cōtusionis exsoluerit, cochleæ supposita sporta comprimuntur. Hinc Passum est quicquid effluxerit, & conditum uasculo mellis modo seruatur. Brevior sane hæc ratio, sed non dissimilis priori. Siquidem quæ a Palladio Passæ Vuæ legi iubentur præcoques illæ, & sole arefactæ Columellæ sunt. Et quas ille musto implet ut succum reddant, hic uirgis flagellat, & lentescere cogit: quamq; hic cochleam, ille prælum: & quam fiscellam Columella, hic sportam uocat. Fuit quondam Passum quotidiani usus: eratq; in sanitate & ualitudine homini pro melle, sine inflationis periculo, ut diximus, quam mel præcipue facit. Exoleuerunt nostra ætate omnia huiuscemodi: ideoq; qualia hæc quondam fiebant, repetita a nobis longius fuerūt: ut cognoscant, intelligantq; omnes, quantopere in Passis Vuis, & Passo a ueterum disciplina & moribus discesserimus: multoq; magis in tam multis Vuarum condituris, quæ illis pene infinitæ fuerunt, ex Columella, alijsq; rei rusticæ scriptoribus cognoscendæ: ut certius intelligant legentes, quas hic in uinaceis, in ollis, in sapa, & multo, & in coelesti aqua seruatas dicit. Cuncta em̄ ab eo traduntur eodem operis sui uolumine, capite. 43. Nos enim tam multis obseruationibus commentationes has nostras augere nolumus. Erit etiam ex lectione scriptoris illius aliud operæ precium. Intelliget enim qui id ager, quas hic Passas antea factas Vuas in coelesti aqua componi iubet, addiditq; *ἐν ὀλίγῳ τὰς τοὺς αὐτὰς γινέσθαι ὀινώδους*, eam habere rationem quam nos locum illum uerterentes indicauimus, exiguo scilicet uino, ut uinosæ fiant, conspergi oportere. Ex Passi enim confectioe tota ea ratio fluxit, in quo iubet ille uuas in musto demergi ut uinum combibant, Necessarium enim est, ut qui sole natiuus humor in eis aruit, nouo &

D I O S C O R I D I S

Congenerem liquore aliquo iterum uescat. Idque nos præcipi a Dioscoride credimus: & si alij aliter locum interpretati sunt: quos non damnamus, sed interpretationis nostræ quam debemus causam indicamus. Quemadmodum a principio capitis huius contra quod Plinius & alij dixerint locum ipsi etiam uertimus, *πρὸς τοῦ ἀσθινύτῃς*. Quas uoces Plinius, 23. uolumine, capite, 2. uertens, ait. Innocentiores, quæ decerpæ diu pependere, qua uentilatione etiam utiles fiunt, sto- macho, ægrisque. Aegros appellans quos hic *ἀσθινύτῃς*. Plinium secuti interpretes alij, ægris p- delle & ipsi dixerunt. Nobis, quibus infirmum corpus est, magis uertere placuit: non ob aliam sane causam, quæ ut certiore intellectu res nunc pateret.

V *De Vua passa.* CAP. IIII.
sepius Vua passa alba adstringentior est. Prodest esitata caro earum tuss- si, renibus, ac uescicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis. Et decocta in paninis cum melle, admixta milij ac hordei farina & ouo, ualet ad purgandum caput. Eiusdem gratia cum pipere commandu- catur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, aut cumini farina. Fauos, epynictidas, carbunculos, enatas in articulis putre- dines, & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita, sanat. Poda- græ conuenienter cum opoponace illinitur. Mobiles ungues illita ex- trahit.

V *BARBARI COROLL.*
D Vua passa Græce Staphis, & Astaphis Hemeros, hoc est, satiua dicitur. Cæterum Apame- as inuenio celebrari passulas.

O *De Oenanthæ.* CAP. V.
breuiter Oenanthæ uocatur Vitis syluestris fructus, cum floret. Recondi- debet sicili non picato, collectaque substrato linteo in umbra sic- catur. Laudatissima in Syria, & Cilicia, & Phœnice. Vis ei adstrictoria. Quare pota, stomacho ac ciundæ urinæ utilis. Aluum sistit, ac sanguis- nis excreationes. Contra fastidia & acorem stomachi, sicca & illita ef- ficax est. Capitis doloribus tam uiridis quæ sicca ex aceto & rosaceo p- funditur. Sanguinolenta uulnera cataplasmate, & incipientes ægilopas, cicatrices in ore, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione uindicat. Pessis miscetur ad sistendū san- guinem. Contra oculorum delachrymationem, & stomachi ardores, cum polline polentæ, & uino illinitur. Crematæ carbonibus cinis fa- cit ad oculorum medicamentum. Rediuiuis, paronychia, abscedentes gingi- uas, cruentasque cum melle sanat.

*Pli. li. 12. ca. 29.
 & lib. 23. ca. 11.*

V *BARBARI COROLL.*
 Vua Oenanthæ, quam Vites syluestres, hoc est Labruscæ ferunt, laudatissima est in Syria, maxime circa Antiochiæ, & Laodiceæ montes. Item ex alba Labrusca. Sunt qui principatum in unguentis dent in Parapotamia nascenti: deinde in Antiochia: & Laodicea Syriæ. Tertiū lo- cum ex montibus Medicis, quæ & utilior medicinæ. Quidam omnibus his præferunt Cypro. Vi- tis ea quæ Massaris in Africa uocatur, nunc medicis, nunc odoribus tantum gigni Plinius af- firmat. Nascitur in Africa & Vitis quam Vbolima uocant accolæ, oliua in uites insita, utrius- que fructum arboris ferentem: hanc Græci & Eleostaphylon appellant, Vnum Oenanthium, sit duabus libris florum, in musti cado maceratis, qui post triginta dies mutantur. Oenanthem & a uitis dulce uinum ferentibus arbutiuis maxime colligi quidam præcipiunt, non syluestri tantum, Labruscam dici putant, quæ in marginibus terræ ceteri labris quibusdam fere nascatur. Vi- num Anthosmias, ab odore floris dicitur, nec idem cum Oenanthino uino est. Pro precioso sa-

ne capitur a Græcis. Eius mentio est apud Aristophanem, & Hippocratem, & alios uel promi-
sua. Hippocrates certe hoc etiam Anthinē uocauit. Aliq Anthinē, pro Anethino capiunt: ut
Galenus inquit. Nam uinum cognomento Hippocraticum, Gallijs maxime transalpinis gra-
tissimum, fictici generis est, facili ratione. Cinamomum, Saccarū, et Carpesiū teruntur in fuscū:
ex eo uinum liquatur, ut transeundo qualitates eas cōbibat. Datur hoc epulis principalibus,
cū Elcharite pane bellariorū uice, qui mos, sed in alio uino, peculiaris Atheniēsis fuisse legi-
t.

EX M. VERG. COMM.

Labruscæ uitis tantum Oenanthe medicis flos est, neq; ad medicinam ex alia uite utuntur.
Cæteris satiuæ etiam flos, & prima uitium omnium pubertas Oenanthe dicitur. Numerauit in-
ter aues etiam Plinius hoc nomine, quæ statos latebræ dies habet, exorientes surio, occultata ab
occasu eius progrediens. Sic forte dicta, quæ cum uitium prima pubertate hac prodeat. Nec ul-
tra quicq; de ea tradidit: diligens alioquin in Oenantes huius historia & medicina: quarum al-
teram. 12. uolumine, capite. 25. alteram. 23. capite. i. longius profecurus est. Ex eo multa quæ in
Diosc. non leguntur, Barbarus additioni suæ miscuit: quæ poterunt uolentes facile in eo depre-
hendere. Nobis totidem quatenus licuit & ipsam uerbis omnia reddere placuit. Eademq; fide
monemus, scribere in. 6. sue medicinæ Paulum Aeginetam, plurimū quidem ex Labrusca Oe-
nantes usum esse: quoniam egregie adstringit, stomachumq; & aluum maxime firmat: uerū
tamen traditis his idem statim subiicit. *ὁ δὲ Dioscorίδης ὑπὲρ τὴν ὑπορράφι ταύτην ἐναντίαν τὴν δύναμιν
ἔχουσαν, ὅθεν αὐτῆς φασὶ καὶ πρᾶγγουσιαν καὶ ἰσχυρὴν ἵσθαι.* Quod est. Dioscorides autem aliam de
scribit Oenanthem contrarias huic uires habentem: ideoq; secūdis, stillicidio uessicæ, & fellis sue
fusionibus eam mederi ait. Quorum nihil in capite hoc legitur: neq; in scriptore hoc alibi legi-
se me memini: & nihilominus non negligenda Aeginetæ autoritas & testimoniū est, quæ crede-
re oportet uera, & quæ aliq; legisset testari. Nobis nihil est qd adijcere aliud his ualeamus. Rem
in signauimus: ut si forte laxandi uires habere Oenanthem aliq; inuenerit, autoritate scri-
ptoris eius sciāt, aliam ab hac illam esse: alteriusq; uitis quærendum cum florebit fructum, q cō-
trarias huic uires habeat. Qualis autem ea sit, non ausim ego dicere.

De Omphacio. CAP. VI.

Omphacion succus est acerbæ uuæ, nondū maturescantis e Tha-
sia uite, aut Amminæa. Oportet autem ante canis ortum, ex-
pressam melliginem in cyprio uase linteo cōoperto insolare, usq; dum
cogatur. Semperq; quod ceruici uasis concretum hæsit, reliquo humo-
ri permiscere. Noctu sub dialibus locis auferre. Quādoquidem noctur-
ni rores ipsum concresecere non sinunt. Eligendum est flauum, friabile,
uehementer adstringens & linguā mordens. Sunt qui coquendo mel-
liginem cogant. Prodest contra tonsillas, uuam, ulcera oris, humida gin-
giuarum uitia, purulentas aureis cum melle aut passo. Item ad fistulas,
uetera ulcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis & mulieribus fluctione
uulvæ laborantibus clystere infunditur. Oculorum claritati & scabriti-
ciæ, & erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad recentem sangui-
nis excreationem, etiamsi rupta parte aliqua contingat, sed pauco & a-
quatiore est utendum. Valde siquidem exurit. Idem adstringit. Prodest
stomacho qui cibi tenax non est, aut tardius cibum concoquit. Item ijs
qui ilei dolore conflitantur. Conuenit in grauidarum malacia. Sorptū
auxiliari constat, cum populatim grassatur pestifera lues. Huiuscemodī
omphacium non nisi post annos multos bibi potest.

BARBARI COROLL.

Omphaciū, siue Omphax, idem, acor, siue acrementum uuæ, ab immatura uite dicit, quæ
Omphax a Græcis uocatur. Est & oleum Omphaciū, de quo inter unguenta diximus. E Tha-
sia, ut Dioscoridi uidetur, uuæ, e Plytia, ut Plinio, probatur acor. Cum sunt acini cicoris magni

Cc ij

ὀμφάκιον

Pli. li. 14. cā. 14

D I O S C O R I D I S

C tudine, ante canis ortum incipiente pubertate. Precium in librās sex. Solet & aliter fieri, uuam imaturam terendo in mortarijs: siccataq; in sole, postea digeritur in pastillos.

E X M. V E R G. C O M M.

N On animaduertunt Diosc. Omphacium uertentes interpretes alij, inforinē, nec reliquo corpori congruē in extremis clunibus caudam illi reliquisse: nec aliter q̄ Flaccus cecinit, qd ille fingebat monstrum, turpiter in atrum piscem desinere, ex Omphacio Omphacite uinum fecisse. Quod em̄ in extremo capite in eorum æditionibus legitur, uis succo adstrictoria, &c. uel ut alter ex eis eam incipit partem, idem adstringit, prodest stomacho qui cibi tenax nō sit: et ab his quod totum legitur usq; ad integram capitis huius clausuram, totum ex historia & medicina uinorum, quæ statim sequitur, in Omphacium irrepsit: in qua hic idem ait, ὁ δὲ καλοῦντο οὖν φασκίτιο. &c. Mox, συνετικὴν δὲ ἔχει τὴν δύναμιν καὶ τοῖς σώμασιν, καὶ κατὰ δυνάμιν καὶ τοῖς ἀνθρώποις καὶ τοῖς ζώοις τὴν δύναμιν ἀρμόδιον. Δοκίμῃ δὲ καὶ λοιμικαῖς διαθήκαις βοηθεῖν. &c. Nelongius q̄ decet tam multa reperantur, omnia, ut uidetur, duobus locis eadem, & importune ab aliquo ex uino ad Omphacium translata: qui Omphacite id uinum uocari sentiens, Omphacio coniungi debere credidit. Verumtamen longo intervallo Omphacium, ab Omphacite uino differt, ut mox in confectioe eius legentibus patebit. Debuerant hoc illi animaduertere: nec præterita tantū, sed inuenienda posthac etiam in scriptore hoc cognouisse. Calcantis enim Homericī maxima illa fuit, & omnium integra semper laus erit, Præterita meminisse, præsentia intelligere, & futura conijcere: cognitiq; his, apte omnia constituere. Nos eam reliquimus partem inutilem hoc loco, non multo post apposite tractandam. Indicaruntq; id nobis antiquioris fidei codices, in quibus nihil huiusmodi legitur, sed multo magis res ipsa suis locis docens tractanda singula: nec diuersa simul miscenda rerum genera esse: importuneq; bis aliquid nulla urgente necessitate tractari non debere. Discrepant nobis etiam cum alijs interpretibus pleraq; alia, & si forte nō multis facienda alicui uideri poterunt: quale est, quod alter eorum pro acerbis, necdum maturis uuis, quas greci notissima cunctis uoce Omphacas uocant, acidas dixit: quod priuatim ad saporem pertinet, potestq; in maturitate etiam sentiri. Neque enim acidum ὀξύς grecis simpliciter significat, sed acerbum: in quo poterit acidus, poterunt & alij sapes esse: utq; priuatim acidū dicimus qd sapore suo acescit, sic acerbis omnibus cōmunis Omphacis uox est: neq; uua magis q̄ oliuas, Lauri baccas, & innumera alia nondum matura greci ea uoce indicant: non ex sapore Omphacite oleum, sed ab imaturitate oluarum appellātes. Eamq; ob causam, cōmunem eius uocis æstimationem nos secuti, acerbam uertimus. Nec dissimili ratione, quod hic scriptor μῆλον περιφασκίτιο ait: uertitq; idem, nondum nigrescentis: nos, nondum maturescentis, diximus: cōmuniore in uuis eius uerbi significatione usi. Est enim grecis περιφασκίτιον μῆλον, id est, nigrescere: est itidem, ποικίλλασθαι, id est, uariari: est postremo περιαινεσθαι, id est, maturari, & maturitate mitius fieri. Fecimusq; id: ne quod hic non decernit, ex albis uuis fieri posse Omphacium negaremus: quod contracta ad nigredinem uuarum maturitate necessario futurum erat. Sunt quidem leuia hæc, uerumtamen non negligenda penitus, in his quæ ad artes & uitam pertinent, in quibus nulla satis fides, aut diligentia hominis unq; fuerit. Quales autem Amineæ uites, quas hic cæteris anteponit in disciplina ruris sint, copiosissime docebunt Columella quarto operia sui cōmentario capite. 2. & 14. uolumine, cap. 2. Plinius. Breuissimeq; omnium felicissime in Georgicis suis Maro, cum cecinit. Sunt & Amineæ uites, firmissima uina. Quæ una firmitatis laus causa antiquis scriptoribus tam grecis q̄ latinis fuit, ut ad medicinam ex hac uite materiā, uua, omphacium, & uinum præ cunctis alijs laudauerint semper, & amauerint. Idemq; de Thasis constituendum est, quarum idem Maro honeste itidem eodem loco meminuit. Quod deinde a Diosc. dici ἢ καλὴν ἢ ῥυτίαν, id est, rubete aeneo uase, ad genus æris pertinet, qd eo colore in hoc usu probabatur. Id Cyprium uas alter ex interpretibus uertit, relicto legētibz desyderio, ex qua materiā querendū id uas sit. Scimus qdem ante ferri cūctis alijs in medicina Cypriū æs, & in Plinio Cyprium uas, pro æneo ex ea gente intelligi aliqui oportere. Verum nō erat nostra ætate tam obscure dicendum, quod a Diosc. apertissime ostendebatur: præsertim nihil de Cyprio magis q̄ de quo uoluerit aliquis alio ære hæc docente.

De Vini natura. C A P. VII.

V Ino uetere nerui læduntur, & reliqui sensus, gustu quod suauis est. Quare cauendum ijs qui internam alicuius partis imbecillitatem sentiunt. Atramen in secunda ualitudine, paucum, aqua di

lutum, innoxie sumitur. Nouum inflat. Aegre coquitur. Insomnia parit. Et urinam ciet. Aetate medium utraq; uitia fugit. Quare ad uictus sanorum agrorumq; usurpatur. Album, tenue, stomacho utile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum uero, crassum est, & cōcoctū difficile. Carnem alit. Et ebrietatem creat. Giluum, utpote quod medium est, medias inter utrumq; uires habet. In secunda tamē & sinistra ualetudine, cum primis laudatur albū. Quin & uina qualitate distant. Siquidem dulce crassis partibus constat. Et difficiliter a corpore discutitur. Stomachū inflat. Aluum & interanea ut multū turbat, sed minus inebriat. Renibus & uesicæ aptissimū. Austerū per urinā celerius transit, sed capita dolore tentat, & temulentia gignit. Acerbum ad ciborū per membra digestionē accommodatissimū. Aluum & ceteras fluxiones cohibet. Nouū, neruos minus tentat. Vinū aqua marina factū, stomacho aduersatur. Sitim stimulat. Neruos infestat. Aluo aptū. A. ualetudine se recolligentibus inutile. Passum quod uuis sole siccatis in area, aut in sarmento adustis exprimitur, Creticum cognomine, aut Pramnion, aut Protopon, & Sapa, quæ fit musto igni decocto, Græci syrion, aut Hepsēma appellāt: quodq; Melas dicūt, aut Melampsythiū, crassa sunt, & corpora multū alunt. Candidū tenuius, & medium medias sortitur uires. Omnia tamē adstringunt, & pulsus reuocāt. Faciūt aduersus uenena, quæ exulcerando necant ex oleo pota, & uomitionibus reddita. Contra cicutas, meconiū, uenenum, toxica, & concretū lac. Item contra renū B ac uesicę pruritus, rosiones, exulcerationesq;. Inflan tamē, & stomacho aduersantur. Priuatim prodest Melampsythium, si uenter rheumatismū sentiat. Album magis ceteris emollit aluum. Gipsō conditū neruis officit, caput aggrauat & incendit, ac uesicæ aduersatur. Contra uenena ceteris aptius. Picaca, aut resinata, exallfaciūt, cōcoquūt. Sanguinē excrementibus inimica. Quæ uero Parachytra uocant, admistā Sapam recipiūt, caput implent. Temulentia gignunt. Aegrius a corpore discutuntur. Stomachū male habent. Inter Italica uina Falernū principē locū obtinet, quod inueteratū perq; facile coquitur. Languidos pulsus exuscitat. Aluum abstringit. Stomacho utile. Sed uesicę nocet. Atq; ijs qui uisus hebetudinē sentiunt, & ad potus crebros minime idoneū. Albana crassioribus constant partibus. Dulcia stomachū inflant, Ventrem emolliunt. Sed concoctionē non æque adiuuant, & neruosa minus infestāt. Vetustate eadē, austerum saporē concipiūt. Cecubū dulce est, & Albano crassius. Corpus & colorē alit. Aegre tamē coquitur. Surentinū satis austerū est. Quare intestinorū & stomachi fluxiones cohibet. Et cum tenue sit, caput minus tentat. Inueteratū suauius redditur, & stomacho utile. Adrianū, & Mamertianū in Sicilia æque crassis partibus gignuntur. Modice adstringunt, & ocysime inueterantur, minusq; ob

D I O S C O R I D I S

C suam tenuitatem nervos tentant. Paretypianum, & qd ex Adriatico si-
nu defertur, odoratū ac leuius est. Quare multus epotus fallit. Diu ser-
uat ebrietatē, et soporē adfert. Istricū Paretypiano simile ē, sed urinā ue-
hemētius pellit. Chiū tñ antedictis mollius, et aptū potui ē. Bene alit, &
minus inebriat. Fluxiones cohibet. Oculorū medicamētis utile. Lesbū
facile mēbra subit. Chio leuius, & alio idoneū. Ephesū eandē uim ha-
bet. Empygela, et Etinolo Asiae, Mesogites nomine, capitis dolores ciet,
& nervos lēdit. Cōm uero, & Clazomeniū, qm multam sibi maris a-
quam uendicāt, facile corrumpunt. Flatus mouent. Aluū turbant, ner-
uis officiunt. Vinū omne, ut reliqua in cōmune dicantur, merū, ac syn-
cerum, et sua natura austerū, excalfacit. Facile in mēbra distribuitur.
Stomachum adiuuat. Appetentiā ciborum inuitat. Vires alit, ac robur
auget. Somnum conciliat. Et cōmendat colorē. Potū liberalius, auxilio
est contra assumptā cicutam, coriandrum, pharicum, ixiā, meconium,
argenti spumā, taxum, aconita, fungosue. Contra serpentium morsus, et
omniū ictus quē refrigerando necant, aut stomachū in uomitiones ef-
fundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesq; prācordiorū, ac disten-
siones & stomachi singultum, & si uenter aut interanea rheumatismum
D sentiant. Conueniunt sudatoribus, et quibus corpus immodico sudore di-
geritur (Diaphorumenos uocant) maxime alba, uetera, & odorata. Quē
tamen uetustate dulcescunt, renibus ac uescicā accommodatiora reddū-
tur. Vlceribus, inflammationibusq; in succida lana imponuntur. Tetra
ulcera, & phagedanica, & fluxionibus obnoxia commode perfundū-
tur. Marina austera, & alba, ad sanorum uictus usurpantur. Iis prāstāt
Italica, salernum, furentinum, cecubum, signinum, & permulta Campa-
niē, & paratypianum ab Adriatico sinu, & siculum, quod mamertia-
num appellatur. Ex grecis chiū, lesbium in Phygela, & Epheso nas-
cens. Crassa uero & nigra, stomacho negocium exhibent. Inflationem
pariunt. Corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho profunt,
et minus carnes alunt. Vetera ualde tenuia, & candida, uehementius ur-
inam ciunt, & dolores capitis mouent. Nervosq; largius pota tentant.
In media etate, ut a septimo aō, potui saluberrima sunt. Modus autē
em pro etate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate uini defi-
niatur. Non sitire, & modice cibos prolui, optimum est prāceptum.
Noceat ebrietas omnis, et maxime assidua. Siquidē obsessos nervos quo-
tidie relaxat. Largiorq; potus, acutorum morborum adfert initia. Modi-
ce tñ inebriari, aliqt diebus, maxime post aquae potus, utile. Namq; ex-
purgans sensuum excrementa transfert, et per caeca corporis spiramen-
ta discutit. Sed aquam post ebrietatē bibere oportet. Namq; a cura cō-
stans temulētū quendā auxiliū modū inducit. Omphacites nomine pe-
culiariter fit in Lesbo, siccata sole acri uua, pauloātē maturitatē decerpta,

triduo, aut quatruiduo, donec racemi in rugas contrahantur. expressumque A
uinum cadis insolatur. Vim adstringendi habet. Prodest dissolutis stomacho,
& ilei dolore laborantibus. Item pręgnantium malicię, & crudis. In
pestilentia quoque sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi uina non nisi post
multos annos bibi possunt. Lora, quam Deuteriam, alij Potimon appel
lant, fieri solet, adiectis metretis tribus aquę, in uinacea, quibus triginta
uini metretę extractę fuerint: calcatis uinaceis, expressoque decocto ad ter
tias parteis, & additis in singulos congios binis salis sextarijs. Post hyemę
transfunditur in uasa. Lora post annum utendum. Etenim celeriter exole
scit. Conuenit agris quibus timemus noxam uini, coacti saepe desiderijs
eorum obtemperare. Item a longa ualitudine se recolligentibus. Fit & uiz
num quod Adynamon uocant, Lorę uires habens, hoc modo. Pares a
quę & musti mensurę coquuntur molli igne, donec absumatur aqua:
quod ubi refrixerit, elutriatum, picato uase reconditur. Alij marinę &
coelestis aquę, mellis, & musti pares miscent portiones, & quadraginta
diebus insolant, quo post annum utuntur. Vinum e syluestri uua nigrum
adstringit. Prodest alui & stomachi fluctuationibus, & ceteris quibus con
strictione & contractione opus est.

V B A R B R A I C O R O L L.
Vinum Oenos Gręce dicitur. Cratinus Maronę uocat. Philalethen puerbia: quale illud
est. Vinum, & ueritas. Item illud. Non habere uinum temones. Pittacus, ut æs frontis, ita uinum
mentis esse speculū. Aristophanes Vinum loco Veneris appellat. Poetę uinum etiam *πυλόν* di
cunt, quasi uibrare mentem faciat. Vnde Crapula inquit Phorion, dicitur *πυλόν*. Folia Vitis
priuatim Oenaria uocant a poetis, & Sarmenta Oenaridos. Ipsa porro uitis, ab Hippocrate
nominatur Oenarion. Tenuissimum est id quod celerrime inueteratur. Nam cui fumus amaritudine
accescit ætas, insaluberrimum putatur. Quo generosius uinum est, hoc magis uetustate crassescit, &
in amaritudinē corpori minime utilem cōit. Saluberrimum Campanię, quodcunque tenuissimum,
utilissimum cuique, uiribus edomitis facco. Vinum alit uires, sanguinē, colorē, sicut lactis potus,
ossa, frugū, neruos, aquę carnes. Simias & quadrupes digitatas, negant crescere assuetas uis
ni potu. Vnum de dando uino uolumē Asclepiades cōdidit, ab eo cognominatur, in quo utili
tatem eius uix Deorum potentia æquari posse pronunciauit. Vinum succus est, qui seruendo uires
emisso sibi fecerit. Mustum Gręci Gleucos, & Gleucinē uocant aliquando. Vinum omne, aut
Mustum est, aut uetus, ut in puerbio sit. Vinum medium pro aqua: quod & priandiu caninū
dicitur, apud Varronem, & Gellium. In Plauti Cassina, mendosus est senarius.

Pli. li. 27, ca. 1.

B

Adibo, caninam scæuam spero meliorem fore.
Scribendum est, non scæuam, sed cœnam caninā, hoc est, abstemiā. In Latino agro, & Cam
pano ad montē Vesuuium, qui Sumani dicitur, uires modo habentur Gręce appellatę, uino
inde presso, quod Gręci non ante dicitur, quę anno post calcatas uuas actō. Vilius, quędiu annicu
lū est: pindeque Viannū, quasi, uinum anni eius, hoc est, Ornū uulgo Tabernę predicant uidentur.

V I N I Q V A L I T A S.
De qualitate, & ætate Vini dictū mox est. Vinum porro tenerū Gręci Apalon, Cato, Lene
uocat: cui contrarium sit asperū: ut idem auctor appellat, hoc est, Scleron, siue Durum. Nam &
Muria, quę aspera esset, durā cognominabat Columellę, Celsoque. Nisi quis durā Muria, sicut
durā Picem, non pro aspera, sed p densa spissaque accipiat, & utique p Garo. Quandoquidē Celsus
eā dysentericis cōmendat, sicut Garū Dios. De uino temperando, quod Lympharū, & Dilutū
dicūt, alij alia pēcipiunt. Hesiodus tres partes aquę in unā Vini miscet. Ceteri meracius fecere,
hoc est, ut quinque in duas adderent. Vnde natū prouerbiū. *ἡ πύλη πινυται, ἡ τρία, ἡ μὴ τέτταρα*
Quod Plautus poeta festiuissimus significat, cum de cantione gręca loquitur, in Sucho.
Vide inquit, quorū cyathos hos bibimus. Tum ille. Quod digiti sunt tibi in manu.

Cc iij

D I O S C O R I D I S

C Cantio est græca, ἡ πύρα πύρα, ἡ ῥοία πύρα μὴ τέρρα. Est autē sensus: ut aut duas uini partes, ad quatuor laticis, aut unā ad tres bibere oporteat, ad quatuor non oporteat: ceu futurū sit dilutius, quā sanitatis usus exigit. Anacreon, ut Vinarius poeta, unā uini, duabus aquæ tempat. Alij aliter, p suo quisque ingenio. Vinū modice incoctū, ut Aristoteli placet, minus officit ebrietatē uitantibus. Temulētæ sunt & animatēs aliq̃t, præter hominem. Sues uinaceis, Corui & Canes herba quā Oenuttā Græci uocāt. Simia & elephātū, uino. Vinū, cui nomē Samagonio, qd tradidit Aristoteles, tribus heminis, & quidē lymphatis, qdraginta uiros inebriare dicit. Ebrietatē Plato nunq̃, nisi semel anno liberalibus pmisit in legibus. Ante decimū & octauū porro ætatis annū, uino ipandū penitus existimat: ut ne gustet quidē. Mnesitheus Atheniēsis medicus, inebriari nunq̃, sed statis tñ diebus hilarescere pmisit: qd genus Cothonismon a calicis noie uocauit: ut dilutū nihilominus, & sine bellariorū comitatu bibere. Ac prima quidē portio in cōuiuijs, qā meracā erat, cum p̃fatione ὑπαίου δαιμονος, in honorē uidelicet Liberi patris, nec tñ tota, sed quasi p̃gustādā prēbebat. Postrema uero quoniā diluta esset, & salutaris, cum p̃fatione Iouis liberatoris hauriebat. Vinū aqua misceri Staphylus Siteni filius instituit: ob id græcū uulgus non aliter uinū modo noīat q̃ Crasin, hoc est, mixtū.

P A S S U M, E T V I N U M P R O-

tropon, siue Creticum, siue Pramnon.

Pli. li. 14. ca. 16.

Passum, hoc est, Glycy, gñā habet laudatā, Plyphiū: & a colore appellatū nigro. Melampsythiū, quæ suū saporem, non uini p̃ferant. Nam in qd additū est Defrutū, Glyxis appellat Aithenæo. Sapa, quā Nonius scribit uulgo dictā suo tēpore Mellaciū, sit musto ad tertiā partē mensurā decoctō: sicut Epsēma, siue ut Hippocrates Epseron, hoc est, Defrutū, ad dimidiā: & Calenū, ad partes e tribus duas redactō, Passum probat, Ciliciū, & Africū: & in Italia, ut qd Neapolitanū uocat, a Columella redditū, prouincijsq̃ finitimis. Oīaq̃ hæc, ut Plinij uerbis utar, post Græcū. Fieri certū est ex uua, quā Græci Sticam uocāt, nos Apianā, q̃ apes cā impopulari gaudeant. Hanc sunt qui Muscarulā uulgo dictā interpretent. Item Venicula, siue ut Cāpani dicūt, Sircula: q̃ et Stacula, & Numisiana appellat, passis, & diutius in uite sole aduſis uuis, Straphidion (ut arbitror) uocatū ab Hippocrate, aut feruētē oleo. Quidā e quacūq̃ dulci, dū præcocta. Qz si, quantū uuis ex̃p̃sere, adijciāt uinaceis aquæ puteanæ, secundariū Passum facient.

D Protropos accipit etiā pro musto, qd sponte defluit anteq̃ calcent Vua, ut est apud Iulij Pollicē. Hoc protinus diffusum, lagenis suis deferuere patiunt: postea in sole quadraginta diebus torrent, ætatis secūtæ ipso canis ortu. Habetur & Protropiū inter transmarina uinū: quod Athenæus in Lesbo nasci dulce scribit, etiā Prodromon uocatū ab aliquibus. At Pramnon, siue Pramnion Hippocrates, & prior Homerus celebrauit. Premebat hoc Smyrne regio, ut Alciphron Mæandrius scriptū reliquit, Montano uico Latonæ prius dicato, postea Latorix, nomē id Amazonis. Extrahatq̃ id etiā Plinio prodente, iuxta delubrū matris Deum. Nigrū Galenus fuisse uoluit, Athenæus quoq̃: nō crassum, aut dulce, sed durū, austerūq̃: ob id eo Athenienses minime delectari scribit Aristophanes: hoc tñ non Smyrne, sed in insula primū Icaro natū putat Seuius, in petra, quo nomen Pramno. Sed & Pharmaciū dici hoc ipsum quādoq̃ tradit. Pro ueneno est Sapa, si qs ieiunus a balneis bibat eam. Polybius auctor est, Romanas mulieres nō uinū, sed Passum bibere solitas, ad restinguendā sitim. Passum uero dictū, quia ex uuis passis, siue quas in uite passis sunt aduri sole, premitt, simile Cretico, & Aegostheni uocatis. Plautus, Murrinam, inquit, Passum, Defrutum, Mellinam.

Nonius Murinulum, siue Murinulā uocat, quā alij Murrinā, nisi uitū in ex̃plari sit. Varro, mulieres inquit, natu grādiore, aut Loram, aut Garū, aut Defrutū, aut Passum bibebant, quā Murrinā Plauto appellari putat. Est & Murrina idem qd & Myratū uocant aliqui. Non utiq̃ a Myrrha, sed a Myro, qd est odoramentū: ut post docebimus. Gellius mulieres inqt Romanas Lauream, Passum, Murrinā potasse: lauream pro lora capiētem. Meminit Varro & portiois genus fuisse Miricā. Nonius duas facit Loras: alterā, quæ sit Deuteria: alterā, quæ Lora constat. Lora uinū dulce, potōis, inqt, erat cōfectū, mulieribus grādeus aptū: qd in qbusdā codicibus lotā, nōn lorā scriptū inuenio, distinctionis forte gratiā. Laudat a Græcis inter uina dulcīa Scybelites: & natū in Arcadia Thyraū. De Cilicio uino mentionē hoc capite habuimus. Forte autē hoc sit, qd e Pisidia medicinæ usu cōmendabatur Ambladeū cognomine, ab oppido: ut Strabo boni placet. Vino autē Aegostheni, de quo supra diximus, nomen datū quidem uidet ab oppido Aegosthene, qd in Attica terra est. Ceterū affirmare non ausim: quādoquidem Carystū ex Euboia quoq̃ posset existimari, Carysto ibi celebratā scriptoribus. E Laconia tantū uenit Carysto uilla id ferente, quod & Alcman poeta celebrauit, Laconicum uidetur fuisse initio: &

qd Monobasites dicit, etiam Creticū hoc nomine intelligimus, corrūpente uulgo id uocabatū & uocante Maluasium. Moueor, q locus ubi Tænarū in Laconia monstrat, Monobasia dicit hoc tempore, ditionis Venetū id oppidū est, unde in Creta directo fere cursu nauigat. Forteq Monobasites uino datū nomē fuerit, non q ibi nasceret, sed q illud primū e Creta cōportaret. Aetate nostra celeberrimū est qd Achaicū uulgo quoq dicit: fortasse id qd ex Phliunte, oppido quondā Achaia, Phliasiū ab Antiphane prædicatū est: etiam si nunc aliubi quoq seritur.

VINVM GYPSATVM.

Vinum Gypsatum, a Gypso dicitur, sicut a Calce calcatum, a marmore marmoratum.

VINVM PICATVM, SIVE RESINATVM.

A vino Resinato dicta inquit Plinius est Crapula: siue quia caput tentet, quasi lucta eius: siue q ipsa quoq resina, & flos eius crudus, qui uinis ad excitandam lenitatem additur, Crapula quoq nominari solet. Pugnacibus inquit Plinius mustis, plus Crapulæ inditur, lenibus parcius: a quo & uehementia uini, atq feritas crapulæ significatur uocabulo. Photionis de crapula interpretationem aliam superius explicui.

VINVM PARACHYTON.

Vinum Parachyton, siue ut Plinius uocat, Diachyton, si modo idē est, sit uinis in sole siccatis, loco clauso per dies septē in cratibus, totidem pedibus a terra alte noctibus a rore defensis, s. die calcatis: optimi odoris, saporisq inter dulcia. Etenim Parachyma, Græci Desfrutū qnc appellat. Vnde uinū originale, hoc est, sine fūco, & sine dulci Aparachyton, & Autiten uocat. Quamq & alia significatio Autitæ uini est: ut aliubi monuimus. Timachidas rhodius uini genus passi dulce Hypochytō in Rhodo uocari tradit. Nā uinū Autoceras hoc dicit, qd ita est exile, ut dilui nō debeat, ut iquit Pollux. Porro nostri, dulcia uina, Liberi patris Bellaria uocabant.

PHALERNV M.

Phalerum, quod Græci Phalerion uocant, nec in nouitate, nec in nimia uetustate corpori salubre. Prima eius ætas a decimo, media a quintodecimo anno incipit. A uigesimo capiti, & neruis est noxium. Duo eius genera. Austerum, cui rufus color: & dulce, quod tunc demum accedit, cum sub ipsam uindemiam austri flauerint: quo & nigrius efficitur. Athenæus, & Galenus auctores. Phalerum Statinum simile est, tantum leuius. Simile & Venaphrantum.

Albani quoq duo sunt discrimina, subacerbum, & dulce. Vfus eque a quintodecimo ætatis anno. Inter Albanum, Phalerumq Labicano gloria: quod est dulce, ac pingue gustu sentitur. A decimo placere incipiente. Buxentinum Albano simile est, utiq acerbo.

CECVBV M.

Cecubum iam non gignitur, frequens olim in Terracina, fundisq: sicut & Serina. Parum a superioribus Statana non longo fuerunt interuallo, Nam Signini nomen celebre aluo sistenda, in sexennium uetustate melius.

SVRENTINVM.

Surentinum, ueteres maxime probauerunt. Sequens ætas, Albanū, aut Phalerum. Deinde alia aliq. Virium plus Surentino, austeritatis Albano, uehementius minus Phalerio. Surentinū a. 25. anno poculentum faciūt: quoniam macilentum, & aridū cum sit, ægre cōcoquitur, nec nisi uetustate castigatū utentibus prodest, qd & Tripholino accedit. Simile est & Aequanū. Celebrantur a medicis & Rheginū, Surentino pinguius, eoq celerius ad bibendū utile. Item Priuernū Rhegino tenuius: & Phormianū Priuerni simile, dūtaxat crassius. Tiburtino tenuitas receditur: idq a decimo anno bibitur. Prænestinū Tiburtino pinguius. Gaurano pstantiam paucitas quoq ipsa facit: ualidū hoc, & pcrassum. Mariscū austerum. Austerū & Barbinū Atheno: qd Balbinum dicit, Balbiæ proueniens Plinio. E Campania, ppe Cumas, Vluanū cōmendat: quinto demum anno poculentū, leue. Iam Calienū, quod & Phalerio preferūt, ad utilitates stomachi. Fundanū plus iusto alit: ideo parcius erat cōuiuijs: q & caput, & stomachū tentabat. Sabinum leuitate pponeretur omnibus. Vsum eius a septimo ad quintumdecimū ætatis annum probabant. Nomentanū a quinto anno incipit, nec leue, nec admodum suauē. Spolitanum suauē, coloris aurei. Caulinum prope Capuam, fortasse id quod eo loco tradit Polybius Anadendritū uocari, prælatū omnibus. Circa Neapolim Trebellicum. Herbulum color niger, non multos post annos candidus: delicatū hoc, & perq leue. Tarentina, & quæcumq illo tractu habentur, tenera sunt, & dulcia, & amica stomacho: cuiusmodi Lagaria, non procul Grumento nascentia, Messalæ potu, & salute, ut Plinius retulit, insignia. Beneuenti fiebat Infumatum, quod Græce Capnias dicitur, a Platone comico, quentadmodum & uux fabrorū ferrariorum, maxime fornacibus ex Africa, præcipua Tiberi Cæsaris cura.

A

Pli. li. 9. ca. 5.

B

D I O S C O R I D I S

A D R I A N V M.

Pli. li. 14. ca. 6.
per omnia.

CAdriana optima, ex intimo sinu Adriatici maris: quæ Pucina, a loco ibi sito dicta sunt: & a Græcis Pyctana, medicamentis aptissima: quibus Liuius Augustus octuaginta duos quibus uixit annos, retulit acceptos, non aquosis. Haud procul a Timæi fonte, saxeo colle, maritimo afflatu, paucas coquente amphoras, Britannorum regi adeo grati, ut quorannis deferendū sibi curaret, Mamertinū uero, a colonis eius loci, non Messeniū, ut inquit Strabo dicitur, etiā circa Messanā in Sicilia proueniat. Hoc & Italicū quoque dicitur, etiā extra Italiā, ut Athenæus inquit, nascit. Siculū est, & Potulanū ab auctore dictū, quæ proxima est Italiæ Sicilia. In eadem prouincia & Taurominitanis honoris agenis, pro Mamertino plerumque subiectis.

P R A E T V C I V M.

Praetucia ex supero mari, sicut & Ancone nascētia, & quæ a palma uua forte enata. Palmētia appellant: ut Plinio placet. Cassiodorus, Vinū quoddā inquit Brutū appellauit, Palmētia nūm laudare cupiens antiquitas. Nos Stylin, asperū, sed gratū suauitate. Nā licet inquit, inter uina Brutia uideat extremū factum, tū est bene gñali opinione p̄cipuū. Est em̄ suauī pinguedine molliter crassum, uiuacitate firmū, nari uiolentū, candore perspicuū, qd ita redolet ore tractatū, ut merito illi a palma uideat nomē impositū. Viscere defecta cōstringit, uulnera madida desiccet, lassum pectus reficit. Præciū multo p̄cipue cōuenire dicit, sicut Apamēniū Syriæ. In ter externa Syriacū est: & qd reges Persarū bibebant, Chalyboniū uocatū: ut Straboni placet. Hoc Possidonius in Damasco Syriæ nasci tradit, eorūdem regum cura satum.

H I S T R I A N V M.

Histriano p̄ximū natione Liburnicū fuit, ex Issa insula, qd Agatharchides p̄fert oībus.

C H I V M.

Chium, & Chiothes dicitur, hoc & Thasium. E uinis trāsmaria ueteribus fuisse in summa gloria. Theophrastus Thasium, quod magistratus bibebant, antepōnit omnibus. Tertio loco habebatur Clazomeniū, postq̄ parcius mari condere cōperit, utiq̄ post homericā illā, Pramniō, & Maronites, siue, quod idem est, Maronæum, in Thraciæ maritima parte genitum, uities tantum addito aquæ miscendum Homerus censuit. Vim eius ad Plinium durasse legimus, prodentem sextarios singulos, octogenis aquæ dilui: nigrum colore, & odoratum, & uetustate pinguescens. Hinc (ut arbitor) Cratinus, uinum ipsum appellabat Maronem. Nam Monarites aliud uini genus est, Cappadociæ Melitena eius parte nascens, non postferendum nostratibus præstantia. Maronem, a Marone filio Euanthis, satum publicarumq̄, Philostratus in heroicis suis testatur. Pramniō, a uite Primna dictum uolunt, aliqui a mansuetudine: quidā a caudicis crassitudine, quasi distinguatur a Crucio uocato. Est autē Crucium e uuibz altissimis, q̄les Aricinæ sunt, acerbiusculū, & asperū. Porro Thracia putant & Ismarici a Polyluce, Biblinū ab Homero notatū: siue q̄ Biblina ea terra dicere, q̄ nūc Tifara, & Oesyma notatur: siue ut Epicharmo placet, a Biblinis Thraciæ mōtibus uocatis. Serulus Naxiū id existiat, qd Archilochus nectari cōparatū scribit a Bimblino, siue Biblio amne. Hoc i Sicilia Poliū, siue Polgem appellari, qm̄ a Polide sicyonio, siue Rhegino, qui Syraculis regnauit translātū eo sit. Quidā a uite Biblia, q̄ in Italia uideat dicat. Nā Byblos p̄y, oppidū est i Phœnice uetustissimū: ut qd a Saturno conditū putet: ubi uinū quoque medicamentolum ex herba fidicula cōfici: ut diximus. Differt a Maronæo Mareoticū in Aegypto, a Maria lacu dictū, ubi nascit, ad uetustatē quoque diffundi solitū. Nā uicinū ei Libycū appellatū, p̄sertimq̄ ad Antiphras notū: improbat uel adagio, qm̄ minus uini, q̄ maris habeat. Alexādrīa id uulgo bibūt præcrude ac Zythū: ut Strabo inquit: etiā nō Zythōn, sed Zygon interps in eo legerit, & ad pōdera uti uino eo Alexādrinos inepullissime cōuerterit: in quē errorē & Domitius Veronēsis p̄nus corrui, in Propemprico Papinij, qd incipit, Si quibus audaces amor est seruare carinas.

Oīa porro trāsmarina septē, in sex annis ad uetustatē mediā peruenire existimant. Vino Chio ueteres in oculorū uitijs uti solitos, nomen ipsum indicat Collyriorum quorundā, quæ Græci Chīaca cognōiant. Hoc uinū & Ariusīa, a loco, & optimū qd esset Aristem uocabant, Iulius Pollux auctor. Nigrū uniū in Chio primū fuisse Theopompus auctor est. Nam et uicē ferere in eadē insula, repertū putant ab Oenopione Liberi patris filio: qui & urbē in ea condidit.

Lesbium, sponte naturæ suæ mare sapit. Hoc & Protropū dicitur quotiens dulce est, itemq̄ Prodrōmon, Athenæus auctor. Querat aliquis in Viāruuio, quis sit uerborū sensus, cum dicit. Sed animaduertimus insulam Lesbō, uinum protitum, maloniā, catacecaumenen, Item Lydiā molliton. Corrupta lectio: quæ sic restituēda est. Sed animaduertimus insulam Lesbō Protropōn, Moxoniā, Catacecaumeniten; Lydiā, Tmolitē dare, De Protropo di-

etum est superius, de Tmolite statim fiet mentio, de Catacecaumene Strabo. Catacecaumene inquit regio est, quam alij Mysiam, alij Mozoniam appellant. Dictam uero ita, quod nihil in ea præter uinum gignatur: idque nobilissimum, ambusta uelut igni terra.

E P H E S I V M.

Ephesium Defruto, & mari conditur: ideo insalubre. Phygelites appellatur ab oppido propinquo, quod Phygela Plinius, Pygellam plerique noiauerunt. In nomine sunt & transmarina, & Leucadii, & Sapia, & Thasium: quibus principatum dat Hermippus in oppido Opunte: quod et Plautus in Penulo demonstrat, sumptum ab Eubulo. Item ex Euboica Sciatho, et e Peparetho insulis. Quod postremum hoc, multi sunt qui dant. Iam e Syria Phoeniciu uocatum quandoque Cycli: cuius & Xenophon in ascensu meminit. Laudatur & Magneticu, & ut alibi diximus, Meridauum. Præterea ex Acantho urbe. Nam Cirmiphii asperum continentur. Troezeni, ut ait Aristoteles, Anthedonidiu, & Hyperandiū comendant, auctores suorum nominibus, Hypero, & Anthi: quemadmodum & Althephiadiu ab Alrephio: quod ex Alphei nepotibus fuit. Apyru quoque uinum ab Alcmane poeta memoratur. Est autem Apyron, quodcumque non est coctum. Laconica sunt Penalophii a quinque collibus, ubi nascitur uocatur: item Denthiadiu, siue Denthis: & Oenuntiu, & Onoglis, & Stathiniu, a locis omnia, quæ iuxta Pytanem sunt oppidum eius terræ. Theophrastus Erythæum molle falsumque: idem Heracleoticu tradit odoratu, atque durum.

M E S S O G I T E S.

Messogites, & Tmolii, aut quod idem est Tmolites, duo sunt uini genera, nomine a montibus Lydiæ imposito, qui Tmolus, & Messogis appellantur. Messogites uero nobilissimu a loco Aromæum nomine, correpta secunda syllaba, ut Straboni placet. Tmolio per se gratia, ut uinum non est, sed cuius dulci admixto, reliquorum duricia suauitatem accipiat simul, & æratem. Ex eadem Lydia & Metropolit uinum comendant, ab oppido eius uero Metropoli uocato.

V I N V M I N C O M M V N E.

De uino Incomuni, non nihil & in mentione Annosi diximus. Nunc illud adiciō. Vinum omne in infantia dulce est, tum uidelicet cum Mustum dicitur. Vbi autem pubescit, suauius efficitur, quod dulcius. Dulcedo enim feruendo adimitur Vinis. Vinum porro, aut uetus, aut nouum est. Media ætas a medicis introducta est. Vulgo nescitur. Vnde notum prouerbum Varroni, Medium uinum, prandium caninum esse: hoc est, quia nullum tale uinum habeatur. Vt uelut asinum Aristophani, pro eo, quod nescit sit.

V I N V M O M P H A C I T E S.

Vinum Omphacites, siue Omphacinu, uidetur idem esse, quod & Bixon Græci appellauerunt: quodque marinam ei aqua largiorem misceri adiciunt. Cætero conueniunt. Medicinæ item congruunt. Vt errare uideantur, qui non Bixon, sed Bion, quasi a uita deriuatum nomen scriplerunt cum Plinius, a festinatione, quasi uiolenter fiat, uocari prodiderit.

V I N V M D E U T E R I A.

Deuterias nostri Loras, siue Loreas, ut Cato, & secundaria, & operaria uilla nominant. Lora, quod lota acina fiat, uocatur. Inter Deuterias, & Fecatum Cato appellat facibus uini expressum, quod a Columella Fecinum dici puto, a Polluce Trygephanion. Plinius Tortium inquit, nouissime expressum intelligo: quod Cato Mustis tingendi gratia, ut pigmentum aliud quod adijciendum præcipit. Græci hoc uulgo Thamnam uocant, apud quos Autites uinum, pro Deuteria sunt qui capiant. Alij pro syncero, alij pro nostrate, hoc est, non alienigena, sed patrio Galeno. Galenus in Hippocrate Autiten interpretatur, quasi autotitem, hoc est, anniculum, siue ornum. Est & Tornij uini mentio apud Hippocratem, ad pulmonum præsidia. Vitiolum uinum Græci Tropian, & Ectropian, & Oxynon dicunt. Genus uini est & quod Græci nam uocant, subasperu. Nulli ex his plusquam anno usus. Erant & quæ spurca dicebantur uina: sed apud Pontifices, hoc est, quæ sacris adhiberi uetabantur: ut Defrutu, & Dilutu: & igni tantum: sed & Mustu quoque, antequam deferuere. Vinu porro malum, Amphis græce dicitur a Soficrate, quasi dubiu: ita enim uocauimus & nos, auctore Plinio Fugacia. Præliganea uocantur & quæ ad operarios, ut Cato inquit, ex misellis uuis premuntur. Circumcidanea uero, siue ut Varro, Circumcisa uina dicimus, cum calcatis uuis scopi earu, siue scopia, ut Cato, cum folliculis prælo subiiciuntur iteru: hoc est, ubi desit fluere circumcisis extremis: non dissimile Tortino, quod Græci Bofrichitin (ut puto) uocant. Tortinu enim Columella dicit esse Mustum, quod post primam pressuram uinaceorum circumciso pede exprimitur.

V I N V M A D Y N A M O N.

Adynamon ratio facienti uaria, sed omnibus fere cognita.

A

B

C

Pli. li. 14. ca. 10.

C Discedentibus quondā ex Sicilia in Italiam Troianis, quæ uniuersæ classi & genti satis forent uina, bonus subinde cadis onerarat Acestes: Carthaginensis regina etiā, exceptis a naufragio isdem cum rege suo, centū instituerat famulas, toridemq; pares ætate ministros: qui dapi bus onerarent mensas, & pocula cunctis deinceps ponerent. Ipsa etiā cum laticum in mensam libasset honorem, Bitiæq; poculū increpitans dedisset, tanta copia diffundi uinū iussit, ut cum pleno ille se proluisset auro, post alij omnes biberent procures. Tantus præterea, & eouq; uini laudator in suo carmine Homerus quibusdam uisus est, ut una hac suspicione, uinosus facile creditus fuerit. Fuerunt & in alijs cœnarū apparatibus numerata a poetis, præsertimq; a Flacco in carminibus suis, tam multa & generosa uina, ut naturæ copiam, & hominum pro uita & uoluptatibus studium & artem merito aliquis in uino admiretur. Nullus tamen, toto orbe nascentibus uinis, & quibus tunc gentes maxime uterentur, plures, certioresq; ad salutem & noxam scriptore hoc notas assignauit: nec aliunde, ad utramq; fortunā, ex uini usu maior homini, q̃ ex eo occasio est. In cæteris enim uini, aut alterius horæ uoluptas in cœuiui quæ sita uino est: laudauitq; unusquisq; aut quod maxime apud se natū nouisset, aut quod ingenio, naturæq; suæ aptissimū sentiret: in hoc longiore historia, cunctosq; habita rōne, singulorūq; in natura decretis uiribus, nihil desiderandū legentibus relinquit: siue ad uoluptatē cœnas, siue ad honorem cœuiui & epulas, siue ad ebrietatem cōmessationes, siue in quotidiano usu pocula, siue ad medicinā remedia parasse aliquis sibi uelit. Magna sane in multiplici hoc bono, & liberalior naturæ uarietas: nō minor tamē scriptoris huius diligentia, qui obseruatis toto orbe per se nascentis, & humano artificio exculti uini potestate & uiribus: a principio statim uetustatē in eo, damnare incipiens, uariato librario: incuria sermonis ductū, dubitandū legentibus reliquit, simpliciter ne, uitanda foris & intus uetusta uina sint, his qui uitiosa & infirma interiore aliqua parte sint: an uitanda intus tantū his, qui infirma & uitiosa interiore aliqua parte sint. Dubitationi huic, & si non multifacienda sit, causam dedit, q̃ in antiquis græcis diuerso loco librarij dictiones eas pupugerunt. Sunt enim in quibus legitur, ἀσθενὲς μίρον ἰχθυῶν ἰσθίων παραπαιτιῶν, &c. Quod est. His quibus uitiosa & infirma interior aliqua pars sit, uitanda esse hæc uina. In aliquibus autem, ἀσθενὲς μίρον ἰχθυῶν ἰσθίων παραπαιτιῶν, &c. Quod est. Vitanda his intus uina hæc esse, id est, non bibenda, qui infirmā aliquam partē habent, non interiorem magis q̃ exteriorem: quasi intus damnandus, foris autē concedendus eorū usus sit. Nos in ambiguo com muniore lectionem secuti, & ex potiore, frequentioreq; uini usu, grauioreq; eius noxa rem docuimus, uitanda his uetusta uina precipientes, qui interiore aliqua parte infirma sint.

D

οἶνον μελίτιδος

Melitides datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt. Namq; aluū emollit. Urinam ciēt. Stomachum expurgat. Prodest articulario morbo, renibus, imbecillo capiti, & mulieribus abstemiis. Odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat a mulso quod sit e uino uetere, austero, & melle exiguo. Melitides autē adiecto ad quinq; con gios austeri musti, mellis congio, & salis cyatho, cortinis magnis, quo magis ad efferuescēdum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale. Cūq; efferuere desierit, in alia uasa transfunditur.

Pli. li. 14. ca. 9.

D Vlci e genere est Melitites, sed austerrum seculis. Iam fieri desisse Plinius existimat. Sit autem Melitites id, quod in Pseudulo uocat Plautus Mellinam illo uersu, Murrinam, Passum, Defrutum, Mellinam, in medio relinquimus.

D Esferat, quo tempore naturalē historiam suā Plinius cōmentabat, multoq; antea in usu esse Melitite hoc uinū: quoniā inflationes faceret, damnatū: & nihilominus confectiōe eius, et ipse docet. 14. uolumine, capite. 9. eandē huic scriptori, aut paulo diuersam, medicināq; itidem 22. capite. 24. Quo minus miretur aliquis, nunc in nullo honore esse, uixq; in medicina nomen eius audiri. Antiquiores tamen oēs, ad explendā totius uini historiā de eo cum cæteris uini ge-

neribus tradiderunt: non inuiti penitus, sed quod posset medicinā & ipsum augere, & humanæ salutis aliquando adesse: præsertimque, ut hic ait, *ὑγιαίνον ὑποποτόναις*. Quod cæteri interpretes mulieribus uini abstemijs, ex Plinio uerterunt, nos simplicius, aquā bibentibus: haud sane quia non id probemus, sed quod nescimus, an uini abstemias simpliciter mulieres hic dicat: an in fœtura uinum fastidientes, ideoque aquā bibentes. Ex quo enim hic uini huius usum ad mulieres priuatim contraxit, certā etiam priuatimque in fœminis cognoscendam causam intelligi uoluisse uidetur. Si enim simpliciter uini abstemijs dandum hoc uinū sit, non magis fœminis quam uiris dandū erit. In utroque enim sexu abstemijs uini passim uidemus. Quodque in fœminis, idem in uiris etiā hoc uinum poterit. Credimus ideo nos sic intelligi locū oportere: fastidientibusque in fœtura uinum mulieribus Melitide dandū. Eamque ob causam, quoniā latius patet abstemijs uox, bibentes aquā mulieres nos diximus. Eoque pertinere uidetur quod statim sequitur, Odoratum enim est, & nutrit. Quorum alterū pertinet ad discutienda fastidia: alterū ad uitæ nutrimentum, quod tunc maxime ad incrementū & firmitatem fœtus prægnantes indigent. Quod etiā a Dioscoridis constituitur *ὑποπότης*, id est, cum urinæ malo aliquo renum doloribus prodesse, in melioribus grecis non legitur. Nos tamē communem secuti lectionē, eam seruauimus uocem, medicis diligentius excutiendum relinquentes, quo modo huic malo prodesse Melitide hoc uinū possit. Adijcimus illud etiam, quoniā neruorum infirmitati omnes utile tradiderunt, & inter latinos Plinius, etiā non male suspicaturum aliquem, quoniā idem in grecis renum & neruorum uocis principium est, uocatque ea gens renes *νεφρός*, neruos autem *νεύρα*, potuisse eas librarum imperitia uoces commutari, & pro neruis renes scribi. Medicinæ quidem id certius responderet: in qua præcipitur, uitanda omnibus uina esse quibus uitio aliquo laborant nerui: tutoque his pro uino Melitide hoc dari. Coniecturas tamen hæc nos, non detrecta esse uolumus.

De Mulso.

CAP. IX.

Mulsum e uetere uino austeroque, & bono melle factum præfertur. Minus enim inflat, ac celeriter id genus uigore adipiscitur. Vetus corpus alit. Mediæ ætate, aluo prodest. Urinā pellit. Ab ultimo cibo sumptū nocet. Et inter initia potum implet. Dein appetendi auiditatem reuocat. Fit mulsum duabus uini metretis, ammixta una mellis. Aliqui quo celerius præberi possit, mel cum uino coquunt, & ita transfundunt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentis, unum mellis adijciunt, & ubi ferbuerit, uase recondunt. Dulce autem permanet.

BARBARI COROLL.

Oenomeli, hoc est, uinum Mulsum: quamque nostri sine uini mentione hoc intelligunt, Mulsum dicentes. Vinum hoc facillime cum melle incorporatur, quod in dulci nunquam euenit. Mulsum in Thracia primus Aristeus comperit. Multi senectam longam instinctu Mulsi tolerauere, neque alio ullo cibo. Regium morbum Varro cognominatum aquatorium tradit, quoniā curetur Mulso. Cissibiles genus uini est, in Galatia nascens, & Balincium in Sicilia, quæ saporem Mulsi, non uini præbeant. Ex musto, quod fit Mulsum, Græci Nectar uocant.

EX M. VERG. COMM.

Fuit quondam in honore & dignitate Mulsum, uulgaris res, et quotidianus homini potus: qui rusticas & urbanas cellas pariter augeret: nec aliter quam cætera uina, cum opus esset, ad usum familiæ seruarietur. Nunc mutatis moribus, & faciendæ homini medicinæ rationibus solū eius auditur nomen. Idque inmerito, modo uera sint quæ Plinius tradidit, interrogatū Pollionem Romanum Cæsaris hospitem, centesimum annum excedentē, qua nam ratione maxime uigore illius animi corporisque custodisset? Respondisse, foris oleo, intus Mulso. Egregia sane utriusque laude, sed eo Mulsi maiore quam olei, quo meliora, uitalioraque hominis intus quam foris principia & uires sunt. Quo magis demeremur, exoleuisse penitus Mulsi usum: qui multus antiquis ideo fuit, quod persuaderentur, omnē animæ asperitatem dulcioribus succis mitigari, spiritus leniri, transitū, & molliores fieri meatus, experimentaque in se ipso cuique esse. Quando omnis animi impetus cibo & potu mollescit: eoque præsertim, qui non solum corporum medicinam, sed & morum etiam habeat. In quo genere Mulsum præcipue laudauerunt ueteres. Cuncta tamen hæc bona, præfens inflationis periculū & noxa inuitia homini fecit: deseruntque uti eo homines, nocere

Dd

D I O S C O R I D I S

Cibi ea ratione sentientes: paulatimq; cum usu confectionis ratio etiam perijt. Nos tamen si cui nouisse eam gratum sit, ex Palladio qualis scribente eo erat docebimus. Qui. 12. libro in Octobri mense de Mulsi confectione sic docuit. Mustum de maioribus & egregijs uitiis post. 10. dies q; leuatum fuerit, ex lacu quantum uolueris sumis; & ei mellis non despumati optimi quintam partem prius tritam fortiter donec albescat admisces; & agitabis ex canna uehementer. Monebis autem sic per dies. 40. continuos, uel quod est melius quinquaginta: ita, ut cum moueris mundo linteo tegas, per quod facile confectio æstuanda suspiraret. Post dies ergo quinquaginta munda manu purgas quodcunq; supernabit, & in uasculo gypso diligenter includis, & ad uetustatem referuas; melius tamen si in minora & picata uascula proximo uere transfundas; & gypsata diligenter operies, & in terrena & frigida cella recondes, uel harenis fluuiatilibus, uel eodem solo uascula ex aliqua parte submergas. Hoc nulla uitiatur ætate si diligenter effeceris. Et hæc de confectione Mulsi satis modo dicta sint. Quibus in scriptore hoc addendum fuerat: quidnam, & qua ratione hic dicar simpliciter implere Mustum: nisi id medicis constituendum relinquere mus, qui ex uini mellisq; natura quid, & quo modo Mustum impleat facile intelligunt.

De Aqua mulsa. CAP. X.

μυλίσκρον

Aqua mulsa easdem quas Mustum uires possidet. Decocta utimur, cum moliri deiectionem, aut uomitionem incitare uoluimus, ut ijs qui uenena hauserunt ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illi dixere Microsphyctos, tussientibus, peripneumonicis, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Iam paratum repositumq;, quod aliqui hydromeli pprie uocant, media ætate Adynamo uino, aut Loræ correspondet, & similem uim adipiscitur. Quare inflammationibus alicuius membri plus q; Lora prodest. Intuente rati tamen usus damnatur, inflammatis, aut constrictis. Sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusue conuenit. Fit duabus pluuiæ aque ueteris ad unam mellis partem additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adijciunt, & ad tertias partis decoquunt, & ita recondunt. Nec desunt qui hydromeli appellent, qd a melle elutis aqua fauis confici soleat. Sed meracius facere conuenit. Aliqui id coquunt. Aegrotantibus noxium est: qm plurimam sibi floris cerei partem uendicat.

MELICRATON, & mixtum mel, & aqua mulsa dicitur interim, & dulcis aqua. Rationes aquæ mulsæ conficiendæ plures sunt apud rei rusticæ scriptores. Alia res est Metaceras apud Hippocratem, quæ uox egelidum, siue quod idem est, tepidum mixtum significat, hoc est, Galactodes syncrama. Iulius Pollux nescio q; recte, Melicratum inquit est, quod nunc Oenomeli uocamus. Cæteri magno hæc discrimine separauerunt. In Aethiopia Troglodytæ Melicratum e cuiusdam herbæ floribus conficiunt, proceribus bibendū uini loco, sicut dilutū Palsiuri, populo. Hydromeli, secundum Aquæ mulsæ genus est, saporem uini uetustate assequitur: nusq; magis laudatū, q; in Phrygia, ex imbre quidem puro, & melle: damnatum multis annis, q; idem uitiis quibus uinum, nec iisdem utilitatibus.

EX M. VERG. COMM.

FRequens, & nullo nō fere capite repetita μυλίσκρον, et ὀρομίδιον huic scriptori uox est, tam exiguæ rei discrimine, si substantia & usus æstimeretur, ut totam nominis, nullam autem rei differentiam fuisse antiquis in ea merito quispiam crediderit. Vtræq; enim melle, & aqua constat: & idem fere Plinio & alijs utriusq; usus sunt. Quod differre in eis uidetur, sola confectionis ratio est. Quam pleriq; non tanti faciunt, ut diuersi generis ob id eas faciant. Hic tamen, et post eū Plinius, omnesq; alij seorsum de utraq; agentes, diuersas merito constituisse creduntur. Eamq; ob causam diuersis nominibus in scriptore hæc indicatās, diuersis & nos appellationibus eas indicauimus, dulcem alteram, mulsam aquā alteram appellantes. Fuitq; nobis dulcis aquæ au-

Astor Columella, qui postremum Hydromelis genus, quod maceratis aqua fauis fieret, a Dios. proprio, & uero Hydromeli additum dulcem, 13. uolumine, capite. 11. aqua nominauit: inscrip- pro etiā de dulcis aque confectione capitis titulo: ut diuersis uocibus in opere hoc, diuersa sal- tem confectione Hydromelis ab aqua Mulsā ostenderetur. Etsi quod maxime inter eas differt, so- la ætas est: dicente Plinio, Mulsæ aque genera duo, subite, ac recentis alterū: in ueteratæ alterum. Nec Plinio tm̄, sed hoc ipso scriptore etiam: qui cum Melicratum, quam nos Mulsam aquā in- terpretati sumus, pposuisset, subitā & recentem illā Plinij intelligēs, subiecit statim, τὸ δὲ πρὸν- τὸν ἔχει ἀπὸ δέπν. Quod est, ut nos uertimus, Quæ aut maiorē apparatu inueterata seruatur. &c. In qua descriptione Hydromel, id est, dulcem aquā a nobis dictam intelligi tantū uoluit: preser- tim cum adiecit, quā priuatim quidā Hydromel uocant. Congeneres em̄, & eiusdem substan- tiæ dulcis, & Mulsā aque sunt, & sola uetustatis ratione inter se differūt. Eamq; ob causam pro- miscuum in medicina usum habuerūt: præterq; in quibus nouitas, aut uetustas eius priuatim exigeretur. Quod nos ignorantes, seruatis ubiq; scriptoris huius uocibus, isdemq; uestigijs eū secuti: ubi Hydromel erat, dulcem: ubi Melicratū, Mulsam aquā semper reddidimus: ne si hoc magis q̄ illud exigeretur genus, uocū earū uarietate, & inconstantia, grauiore periculo morbo- rum remedia miscerentur. Quotidianus, ut uidetur, cōmunisq; utriusq; huius aque quondam fuit usus. Indicantq; id rei rusticæ Romani scriptores: qui nisi ad usum familiæ confici, & serua- ri consueuisset, nunq; in ruris disciplina de cōfectione eius tam certe docuissent. In quo monu- isse illud uolumus: a Columella lib. 13. capite. 12. Mulsam appellari aquā utrumq; hoc genus: a Palladio contra in Iulio mense Hydromel: quoniā, ut diximus, facile miscebantur, quæ tan- topere inter se similia erant: præsertimq; ab his, qui non ut in medicina oportet, certū illud & ex- actum quærerent. Docuit Hydromelis confectionem Plinius lib. 14. capite. 17. uinumq; ap- pellauit, ob eam quæ mox patebit causam. Verba eius sunt. Fit uinum ex aqua ac melle tantū. Quinquennio ad hoc seruari cœlestē iubent prudentiores aliqui. Alij statim ad tertias partes decoquunt, & tertā mellis ueteris adijciunt: deinde quadraginta diebus canis ortu in sole ha- bent. Alij diffusa ita decimo die obturant. Vocatur hoc Hydromel, & uetustate saporem uini assequitur. Soporem uini uetustate assequi Hydromel Plinius ait: eamq; ob causam uinum uo- cari: cum tamen nihil uini admixtum habeat. Hic non saporem uini, sed uires asseq dixit, Lo- ræq; pares habere uires: utile instaurandis in ualitudine ægrotorum uiribus: q; apperentibus his uinum innocenter potū daretur. Diximus ex Plinio, quale Hydromel quondam fuerit: di- cemus nūc ex Columella, qualis Mulsā aqua fuerit: ut utriusq; certior ratio pateat. Verba eius sunt. Hæc aut non uno modo componitur. Nam quidam ante multos annos cœlestem aquā ualis includunt, & sub dio in sole habent. Deinde cum sæpius eam in alia uasa transfuderint, & eliquauerint (nam quotiens etiā per longum tempus diffunditur, aliquid crassamenti in imo simile feci reperitur) ueteris aquæ sextarium cum libra mellis miscent. Nonnulli tamen cum austeriorem uolunt efficere gustū, sextarium aquæ cum dodrante pondo mellis diluunt: & ea portione repletā lagenam, gypsaramq; patiuntur per caniculæ ortū in sole quadraginta diebus esse: tum deim̄ in tabulatum quod sumū accipiat reponunt. Nonnulli, quibus non fuit curæ cœlestem inueterare aquā, recentem sumunt, eamq; usq; in quartā partem decoquunt: deinde cum refrixerit, si dulciore Mulsam facere uolunt, duobus aquæ sextarijs sextarium mellis pro- miscent: si uero austeriorem, sextario aquæ dodrantē mellis adijciunt: & his portiōibus factam in lagenam diffundunt, eamq; sicut supra dixi. 40. diebus in solatam in tabularum postea quod suffumigetur reponunt. Et hæc quidem Columella: cui non dissimilia Palladius instituit quo diximus loco. Docet præterea Columella alterius dulcis aquæ confectionem, quæ maceratis aqua fauis, & fauorū ceris fieret: quā Dios. in postremo capite numerat. Eam poterunt uolen- tes in eo scriptore uidere. 11. tertij decimi uoluminis capite: quæ in medicinæ usu damnata ab eo est: quoniā stomachi, & præcordiorum inflationes faceret: confectionē tamen eius monstrauit, quoniā condituris oliuarum, aliarūq; huiusmodi rerum pro Defruto utilis esset, & cibariū saporē haberet. Prodesse Mulsam aquam, dariq; decoctā Dios. ait. τὸ μικρὸν φύντος καὶ ἀσθενῶν, quod est, ut nos uertimus, his qui pusillis uenarū pulsibus & multa corporis infirmitate sint. Plinius tamen aliter docere rem uidetur. Vigesimo em̄ secundo uolumine, capite. 24. ait. In- uenio etiā apud auctores hunc potum bibendū aliosis. Item animi humilis & præparci, quos il- li dixere Micropsychos. Videturq; Micropsychos & humilis & præparci animi eos appellare, quos hic μικροψύντος, & ἀσθενῶν uocat. Quæ omnes uoces ad corpus, non ad animū referendæ sunt. Monuisse id placuit, quoniā diuersa penitus Mulsæ aquæ tribuisse auctores hi uidentur. Nobis in scriptoris huius sententiā magis inclināt animus. Relinquamusq; peritioribus cogitandū

Dd ij

Quale sit quod a Plinio dicitur. Sunt autem pusillus uenas: pulsibus huic scriptori homines, quibus ut Galenus in diffinitionibus suis docuit, exigui uenarum pulsus sentiuntur ad minimam longitudinem, altitudinemque & latitudinem extollente se & insurgente arteria.

De Aqua. CAP. XI.

Aquam in uniuersum, propter locorum proprietates & peculiares naturas, coelum, & alia pleraque, difficile est experiri. Magna tamen ex parte optima est dulcis, syncera, nullius omnino qualitatis particeps. Et quae ne minimo quidem tempore in praecordiis commoratur. Ad haec, quae & facili uia fertur, & citra molestiam. Si nec inflatio nes creet, nec corruptioni cedat.

BARBARI COROLL.

Aqua profluens, utilior existimatur stagnante, ac pigra. Tum putealis quaerenda. Cisternarum ab alijs laudatur, argumento subtilitatis: ut quae subire in coelum, ac pendere potuerit. Ab alijs damnatur: ut quibus sordium, & limus, & animalium quoque plurimum inesse sentiatur, cunctissimumque ideo calefiat aqua pluvia, computrescatque, minime durans in nauigatione. Grandinis quidem potus, in confesso pestilentissimus. De niue, & glacie dissident sententiae: alijs subtilissimas eius elementi partes arbitrantibus, quia pendeant in sublimi: alijs crassissimus, atque iccirco insaluberrimus inde haustus, quoniam exinanitum sit quicquid tenuissimum in his erat. Liquor omnis congelatione minuitur: & rore nimio scabies fit, pruina uredines. Aqua septies putrefacta, purgataque, non putrescit amplius. Amnica non statim uulissima, sicut nec torrentium. Palustres, pluribus locis salubres. Parthorum reges & Choaspes, & Euleo amnibus unum bibunt: ea quauis in longinqua comitantur illos. Salubritatis argumentum est, anguillis scatere amnes, sicut uisum limum, & frigoris in fontibus tineas: ut quae uulgo nominatur Lampredae, quasi lampyrides, aut Lampetrae, & lambedis petris, in cibos admissae lautioris uitae: interim anguillarum amplitudine, parte plurima digiti minimi crassitudine, palmi longitudine: cetero anguillis pusillis, & murenulis simillimae: nisi quod septem habent a capite in collum foramina. Aquae ante omnia improbantur amarae, & quae scrobem statim impleant. Fontes, Graeci nymphas: & altrices Liberi patris cognominant, in sacris uinalibus, quae ipsi Leneae dicunt: quia uisum addenti, modum eius augeat: siue quia, ut Theophrastus inquit, uites piceae, aquam reddunt, & illachrymant. Est & coelestis aqua, siue potius diuina, chrymistaru: quam et Democritus, et Mercurius Trimegistus nouere, modo scythicum laticem appellantes, modo Pneuma, hoc est, spiritum ex aetheris natura, & essentia rerum quanta: unde aurum poculentum, & iustatus ille, nec dum inuentus philosophorum lapis, & fabulum constet. Hinc & arti datum nomen, Psammurgicen, & Mysticen, & Hamophysia, & sacra & maximam uocando, & eu literas quasdam seclusas habeat, & a quibus profanum uulgus arceri conueniat. Hoc genus laticis (ut arbitror) significat epigramma nuperrime in agro Parauino, iuxta oppidulum Ateste inuenitum opere lateritio, ac proinde fragili, per imprudentiamque manus rusticae proscindentis ibi terram, corrupto: cuius memoria ne pereat, uerba praetexuimus.

Plutoni sacrum munus, ne attingite fures:

Ignotum est uobis hoc, quod in orbe later.

Namque elementa graui claudit digesta labore,

Vase sub hoc modico maximus Olybius.

Adsit fecundo custos sibi copia cornu,

Ne precium tanti depereat laticis.

Abite hinc pessimi fures. Vos quid uultis cum uostreis oculis emissicis?

Abite hic uostro cum Mercurio petasato, caduceatoque.

MAXVMVS

MAXVMVM DONVM PLVTONI HOC SACRVM FACIT.

Tertium discrimen aquae mulsae, Apomeli dicitur.

EX M. VERG. COMM.

Aquae, ut graecorum uoce utamur, probatur aqua. Dico autem, & melior, quasi sequalem, id est, qualitate omni carentem: quae nihil odoris, colorisue aut saporis habet, & friger. Si enim ex terra emergens, calebit metalli aliquius, aut subterranei ignis contagio per quod transierit, medica

mentofa & infecta plerumque erit: quales diuersis locis medicinae tantum utiles inueniuntur, a medicis per tempora deinceps cognoscendae, & ex infectionis calorisque sui natura, ad sanitatis & morborum remedia transferendae. Vt quae sulphureae fuerint, nervis medeantur: quae caluminosae, sanguinis reiectionibus, & non suo tempore & ordine purgantibus se foeminis: quae nitrosae & salinae, capiti: quae ferratae, stomacho & leni profint, alijsque vitij & morbis alijs potestibus altae. In quo non tantum bonitates, viresque earum ad sanitatem, sed vitia etiam ad morbos cognouisse oportebit. Quae tota res quoniam longior est, tractari hoc loco nec debet, nec potest. Illud tantum meminisse semper oportebit: quoniam multus & quotidianus aquae homini & pecori usus est, nihil diligentius curandum homini esse: neque id tantum quod Socrates precipiebat, non agendum his locis nobis esse, in quibus nec iusticia, nec profluens aqua perennis erit, sed quae citissime & longius fugisse illinc, ubi vitio aliquo infectae aquae varios subinde faciant morbos: quales multis locis fuisse quondam audiuius, & esse adhuc quotidiana experientia cognoscimus. Pro qua re satis huic scriptori fuit monere, quale oporteat quae fuisse & probasse aquam. *ἀμύτηλον*, ut inquit, *οἱ ἀσκληποτέων ποδῆτες*. Quod est, ut nos uerimus, cuiuscunque qualitatis expertem. In quo subscribentes sibi habet posteriores omnes graecorum medicos, *ἄριστον ἴδιον* *λινόταον ἢ ἀποιόταον καὶ κατὰ γένειν καὶ κατ' ὄσμιον*, id est, probatissimam esse aquam, quae omni penitus in gustu & odore qualitate carebit. Quin etiam adiecerunt, aspectu & oculis purissimam esse oportere: haecque bibentibus utilissimam fore, & suauissimam. Licetque hic probari puram, dulcemque dicat, non tamen intelligenda aquae dulcedo est qualis in ceteris rebus dulcis sapor sentitur & est: sed quod hic ait *γλυκὴ*, quae uox in communi significationis estimatione, dulce significat, pro suauis, & in potu amabili recipiendum est. Sic enim Paulus Aegineta *ἴδιον* in hac ipsa re uocauit. Siquidem ad aquae suauitatem satis est, ut sine odore, saporeque, & aspectu pura solo frigore commendetur. Et haec dulcedo eius est, quam hic communi dulcedinis uoce indicauit. Cetera huic & alijs communia sunt. Sed longe plura ab alijs quam a Diosco. de tota ratione Aquarum dicuntur. Quae in Plinio, Vitruuio, rei rusticae scriptoribus, mille alijs graecis, latinisque auctoribus cognoscenda uolentibus relinquimus. Longior enim & numerosa uarietatis ea disciplina est. Quodque hic, quoniam multiplex erat, professoribus cognoscendum deinceps reliquit, tractari ob eandem causam a nobis non debet.

De Aqua marina.

C A P. XII.

B

Aqua maris calida est, & acris. Stomacho aduersatur. Aluum em conturbat. Pituita expellit. Si uero calida ad forus adhibeatur, elicit, & discutit. Neruorum vitij, & pernionibus ante ulcera prodest. Miscetur cataplasmatibus ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmatis. Ad mouendas deiectiones tepescit infunditur. Ad tormina calida, pforas, pruritus, impetigines, & mammas turgentes foueri utile est. Liuios suffitu discutit. Ad uenenatos ictus qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maxime scorpionum, phalangiorum, aspidumque. Etiam si quis in calidam descendat auxiliatur. Et malo habitu confectis iamdiu corporibus, neruisque, balneae ex ea utiles. Hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates feruentis uapor leuat. Syncera, & sine potabilis aquae mistione reposita, uirus deponit. Sunt qui etiam precoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per se, aut ex posca, aut cum uino, aut melle. Verum post deiectionem, dant gallinae, aut piscium iuscula, ad domandam morsus acrimoniam.

B A R B A R I C O R O L L.

Aquam maris, hoc est, hydor thalassion, probant ex alto hausta, nullaque dulcium mixtura. Haec rubiginem ferro exterit celerrime. Dulcescit enim argilla percolata. In mari expansa circa nauim uellera madesunt halitu maris: qui postea dulcis exprimit. Demisse raticulis in mari coctae & cera pile, aut uasa inania obturata, dulce intra se colligit humorem. Vetustate uirus deponit. Coddunt aquae rosae, & Rosaceae uocant, hydorrhodina, & hydrososata Graeci appellant.

Dd ij

θαλάσσιον ἴδιον

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

C P Oterunt quibus procul a mari agentibus marinam aquam, & remedia eius negauit natura, maris aquam non multo sumptu laboreq; ex ueterum disciplina sibi facere. Præceperunt hi, quatuor aque sextarijs, salis sextariū misceri: hisq; utriusq; rei portionibus, salissimi maris uim & naturam impleri. Moderatissimum tamen putari, supradictam aque mensuram octonis cyathis salis temperari: quoniam ita & neruos calefaciat, & corpus non exasperet. In quo mirum est, quantopere salutis hominis natura cauit, modo uera sint quæ illi retulerunt, si plus q̄ sextarius salis cum aque sextarijs quatuor mergatur, uinci aquam, salemq; non liquari. Intelligens enim nociturum quod nimis fuerit, certam incuriæ & ignorantiae hominum legem huiusmodi natura præscripsit. Poterunt itaq; procul a mari agentes, marina aqua morbos, uitæq; corporum suorum hac ratione curare. Quæ ut certius cognoscatur, non pigebit aliqua hoc loco signare, quæ aut mutata a nobis, aut cum alijs eadem nobis non sunt. Quorum illud primum est: dixisse nos purgare marinam aquam pituitam, & præter pituitam bilem: quoniam utraq; in uetustioribus & melioribus græcis legebatur: & Plinius lib. 31. cap. 5. dixerit, bibi non sine iniuria stomachi ad purganda corpora, bilemq; atram: alioquin in cōmuni lectione pituitam tantum purgari indicatur: & posteriores græcorum medici pituitæ utilem tantum dixerunt. Signamus nos rem, & diuersitatis nostræ causam reddimus.

De Thalassomelite. C A P. XIII.

Θαλασσομίλη

Q Uod Thalassomeli uocant, uehemēter purgare constat. Tēperat aut æqs portiōibus maris, mellis, & imbris ex alto, defecatis, et picato uase per canis æstus insolatis. Alij ad binas marinas etq; singulas mellis adijciūt, et uase cōdūt, moderatius aq̄ marina, et mitius.

E X M. V E R G. C O M M.

D Nihil certius in Plinio Thalassomellis huius confectione est. Eam, 31. uolumine, capite quinto docuit scriptor ille. Sed qui alter ex scriptoris huius interpretibus eo duce usus est, uertitq; confici Thalassomel æquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto: qui totus uerborū Plinij in hac ipsa re ductus est, quod in Dioscoride non legitur addidit, & quod a Plinio dicitur im portune, nec suo loco reddit. Quod enim Plinius ex alto dicit, non ad imbrem in eo pertinet, sed alterius membri principium est. In quo cum dixisset, melle, mari & imbre confici Thalassomel: sumpto iterum sermonis principio, ex alto, & ad hunc usum aduehi, non imbrem, sed maris aquam dixit: nec littoralem, ideoq; lutulentam, aut dulci aqua mixtam, sed ex alto, id est, longinquiore mari petendam esse: quod in celesti aqua & imbre dici non potest, qui ex altiore parte cœli repeti nequit, sed dum decidat expectandus, & cum deciderit colligendus est. Non animaduertit, pungendas in Plinio uoces eas esse, anteq̄ ex alto, & ad hunc usum aduehi iubere. Facile præterea erat meminisse in poetis, altum passim mare, non cœlum, aut aerem dici: & Columellam lib. 12. cap. 16. marinam aquam ad muricæ confectionem de alto peti iubere. Verba eius sunt. Quod si ager maritimus est, silentibus uentis de alto q̄quiescentissime mari sumenda est aqua. Pertinet hoc ad huiusmodi confectionum disciplinam. Semperq; non nisi ex alto procul a littore, ob eas quas diximus causas, petenda est maris aqua. Quod forte in scriptore hoc desyderauerit quispiam. Ideoq; a nobis longius repetitum id est.

De Aceto. C A P. XIII.

ἄξος

A Cetum refrigerat, & adstringit. Stomacho utile. Appetentiam excitat. Erumpentem undecumque sanguinem, potu incessuue sistit. Prodest alui fluctationibus coctum cum cibis. Cruentis uulneribus inflammationes arcer, in succidis lanis, aut spongia impositum. Reprimat procidentia sedis, uuluaq;. Item abscedentes gingiuas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, lepras, im petigines, prerygia, cum aliquo conuenienti efficax est. Phagedænas ulcerum, nomasq; fotu continuo cohibet. Podagricis calido fotu cū sulfure auxiliatur. Sugillationes rapit, cum melle illitum. Contra capitis

ardores cum rosaceo in succidis uelleribus, aut spongia imponitur. Ad A
 aquam intercutem, grauitatem aurium & sonitus, sibilosq; feruentis ua-
 por proficit. Instillatum quoq; aurium uermes necat. Panos coërcet te-
 pidi fatus, aut si imbuta aceto spongia admoueat. Pruritus permul-
 cet. Contra uenenatos morsus, qui refrigerando nocent, calidum com-
 mode fouetur. Et frigidum ijs, quæ exurens uirus ei aculantur. Calidū
 potum, atq; uomitionibus redditum, aduersus omnia uenena efficacē
 est, præsertim contra meconium & haustam cicutam. Conglobatum in
 uentre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiā, taxumq; cum sale.
 Haustu uoratas hirudines si sorbeatur eicit. Tussim ueterem mitigat,
 & recentem laceffit. In orthopnoea calidum commode sorbetur. Gut-
 turis fluctiones gargarizatum inhibet. Anginis, & iacenti uix conue-
 nit. Contra dentium dolorem calidum colluitur.

BARBRAI COROLL.

A Cetum, id est, Oxos, uini quidē uitium est. Sed ad luxuriam cessit hominibus: tot ad usus
 expetitū, sine quibus uita, ut inquit ille, mitior exigi non posset. Est & Vapda uitium uini, sed
 nulla ex cōmendatione. Quin probrosa quoq; res, uel hominū conuitio, quorū degenerauit
 animus. Fit aut Vappa, cum iterū sponte multa feruent. Infusum terræ acetum, spumat, saxa
 rumpit, quæ non ruperit ignis antecedens. Cibos quidē & sapores, non alius magis succus cō-
 mendat & excitat. Compescitur eius asperitas, tosto pane, aut uino, aut sale. Contra iners, ac-
 cenditur pipere, aut lasere. Acetum fit etiam non ex uino cōmentitium multis modis: sicut ui-
 num & oleum, sine uuis & oliuis. Acetum aliud non esse q̃ culpatum uinum, quis nesciat? Mē-
 xum oleo Græci Oxelaon, sicut aqua Oxycratum, nos Poscā, Puscāmue dicimus. Ipsi quoq;
 Græci Phuscām, ut Paulus & Aetius. Infubres & Ligures Padani, uinum secatum, siue Lorām
 uulgo fere Poscām nominant. Nam acetum rosaceum, Oxyrhodonon græce dicitur. Acetum
 natura frigidum comprobatur Galenus. Calidissimum Theophrastus existimauit.

EX M. VERG. COMM.

Q Vale homini uinum natura dedit ex aceto, quod uitium eius est, facillime ratio cinabitur
 aliquis. Intellet enim, omnium bonorū eius quæ tam multa numero usq; necessa-
 ria & grata homini sunt, id maximū merito esse, cuius labes & uitium, tam multas mēdico salu-
 tis, patri uero familias uitæ occasiones affert. Cibos quidē & sapores nō allus magis succus cō-
 mendat, aut excitat: nullus etiā tam efficaci remedio contra tot mala pugnat. Neq; ausim ego
 dicere, utrobi liberalior humano generi omniū parens natura fuerit. Id certe omnes sine inui-
 dia fatebimur: esse quidem multorū, quæ sponte sua uitata, bonitatē suā amiserint, in fanita-
 te & morbis aliquē usum: esse itidem, quæ uitari & corrumpi ob easdē causas a nobis cogant:
 sed nihil frequentiore opera, maioreq; diligentia, q̃ uinum in quotidianos uitæ usus ad contra-
 riam aceti fortunam transfertur. Cogiturq; deficiente aceto, acescere uinum, tantū naturæ mu-
 nus: ut omnem domesticā rem nihilo minore q̃ uinum gratia ad cibos, & ciborū condituras
 instruat. Rara, & quæ uni Diogeni inter sapientes cōtingerat laude. Vt enim ille paupertate sua in-
 ter gentes clauit, quotidianamq; ex infelicitate laudē inuenit: non dissimili ratione ex uitio
 gratia sibi acetum fecit: nec quicq; in uitiorū naturæ censu tam multos habuit semp, & adhuc
 habet usus: ex quorū numero hic tantū eos tradidit, quibus aliquando ad salutē medicīnā indi-
 get. In eis satis cetera omnia sunt, nec quicq; est quod legentes monere longius oporteat. Quod
 inter Barbarū & nos unum discrepat tantū significabimus: idq; ad uenena pertinet, quæ ille ue-
 nenata nominauit. Verba Dios. sunt, ποτὶ τῇ ἀναισθησίᾳ, quæ qualia sint ipse statim nu-
 merat: opium, cicutam, concretum in grumos sanguinem, & lac, fungos, ixiā, & taxum:
 quorum nullum rite uenenatum dicitur. Venena enim ipsa sunt, Venenata autem quæ uiuen-
 tia animalia parem uenenis illis noxam ictu, morsue illatam relinquunt. Suntq; primum in
 natura uenena, mox eiusdem malefici communicatione uenenata: ideoq; in diuerso genere
 constituenda, nec simul miscenda: præsertimq; in hoc usu in quo bibendum acetum est: tum
 uomitionibus reddendum. Quod in uenenis quotidianum est. In uenenatis autem fieri ne-

Dd iij

D I O S C O R I D I S

C quit, quæ foris nocuerunt, non hausta nocent: ideoq; uomitionibus reddi non possunt.

¶ De Aceto mulso.

C A P. XV.

οξυμελις

ACetum mulsum, quod Oxymel uocant, hoc modo temperatur. Aceti heminas quinque, salis marini pondo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinque pariter coquito, decies efferuescente cortina, atq; ubi refrigerit diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischia- dicis, comitalibus, & articulorum morbo confictatis prodesse creditur. Contra morsum eius uiperæ quam Sepa uocant, haustum meconium, ixiame, auxilio est. Anginis utiliter gargarizatur.

Pli. li. 14. ca. 17
lib. 23. cap. 3.

Oxymeli a Themisone, & Asclepiade medicis damnatum prædicant, Acetum mulsum latine dici potest. Nam mixtū cum saccharo pro melle, Oxyfachar appellantur.

B A R B A R I C O R O L L.

E X M. V E R G. C O M M.

Docuit duobus locis Aceti mulsi confectioem Plinius, primum. 14. uolumine, capite. 17. tum. 23. capite. 3. alterā simpliciter, alterā ex Dieuce antiquissimi medici auctoritate: nec eodem modo utraq;. Siquidem in alterius confectioe celestem, in alterius marinā aquā sumi iubet. Ex eo non importune suspicari aliquis possit, deesse huic scriptori in oxymellis confectioe aquæ genus. Neq; em̄ uerisimile est, qd non eodē modo a gentibus tunc fieret, incertū ab eo relictū fuisse. Locus in Plinio primū est lib. 14. cap. 17. Suntq; de Oxymelle eius hæc uerba. Quin- etiam acetū melle temperabat: adeo nihil intentatū in uita fuit. Oxymel hoc uocauerūt: mel- lis decem libris, aceti ueteris heminis quinque, salis marini libra, aquæ pluuiæ sextarijs quinque, suffruescatis decies: mox obturatis, atq; inueteratis. Et hæc prima Plinio Oxymellis confectio fuit. Alterā deinde. 23. uolumine, capite. 3. idem his uerbis tradidit. Oxymel antiqui, ut Dieu- ces tradit, hoc modo temperabant. Mellis heminas decem, aceti ueteris heminas quinque, salis marini pondo, thymbræ quadrante, aquæ marinæ sextarijs quinque pariter coquebat, decies de- feruescente cortina: atq; diffundebant, inueterabatq;. Quæ omnia præterq; in genere aquæ ea- dem huic scriptori sunt: desyderariq; ut diximus, in eo id tantū potest. Veritamen ut nos in medicinæ scriptoribus alijs, Galenoc; præsertim quarto lib. de his quæ faciunt sanitatem obser- uauimus: quemadmodū non erat una conficiendi Oxymellis ratio, sic etiā non unum, idemq; placuit diuersis eius auctoribus aquæ genus: uerū celestī aliq, marinā aliq; uis sunt, pluresq; sim- pliciter potabili. Neq; omnes antea melli & aceto mixtā inueterabant, sed in ipso usu aquā, sta- tim Oxymelli non aliter q; in uino fit, miscebant. Testis eius rei, quo diximus loco Galenus est, qui despumato præcedente coctura melli aceti tantū misceri iubet, quod gustanti nec acidum, nec dulce nimis sentiat. Cumq; duo hæc miscuerit, iterum coqui ambo simul præcipit, usq; dum diuersi liquores inuicem penitus se miscuerint, nec crudum bibentibus acetum sentiat. Ex quo tempore cum exiger usus, misceri aquā præcipit, eodem temperamēto quo ad potum uina aquis temperantur, nullo aquæ discreto genere. Quo fit, ut potabilem simpliciter intelli- gi oporteat. Et hæc pro Oxymelle dicta hæcenus satis sint.

¶ De acida Muria.

C A P. XVI.

οξυμυρα

ACIDA MURIA, quam Græci Oxalmen uocant. Contra anomias fœtu, putrida ulcera, canum morsus, & uenenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluctiones post excisos calculos sistit, si statim ca- lida in uulnus injiciatur. Prociduam sedem reprimat. Dysentericis si no- mas sentiant, infunditur. Oportet autem eam ex lacte instillare. Hirudi- nes sorbitione, aut gargarizatu necat. Furfures & manantia capitis ul- cera exterget.

B A R B A R I C O R O L L.

Oxalme dicta, qd ex aceto & sale fiat, quasi acetū salsum efficaciter, si sit recens acetū.

EX M. VERG. COMM.

Mixtis simul aceto & iuria, quemadmodū in Galla primo volumine dictum iam pridē a nobis est, Oxhalme quondam fiebat. Indicatq; id nomen etiam: quā illi ad ea excogitauerunt, in quibus sale & aceto opus esset. Præferebantq; inueteratam: quoniam recentibus aceto & sale efficacior erat. Quos aut priuatim in medicina usus quondā habuerit, hic satis docuit: eamq; ob causam ad Thymoxalme, cognatam ei rem, sermonem nostrum nos transferemus.

De Thymoxalme. CAP. XVII.

Thymoxalme uetēres utebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosue cyathos, aqua calida dilutos, in articularibus morbis, & inflationibus. Crassos humores, atrosq; trahit. Hoc modo facitatur. Thymi triti acetabulū, salis idem modus, rutæ, pulegij, polentæ, singulorum exiguæ portiones in uas coniunguntur, aquæ terni sextarij, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo sub dio madescunt.

BARBARI COROLL.

Thymoxalme, quasi thymata falsilago dicitur.

EX M. VERG. COMM.

Rara hæc in antiquis medicinae scriptoribus auditur uox: nō multi ideo fuisse usus aliquis Thymoxalme credat. Ad explendam tamen historiam, quoniam nihil interitatum uita sibi reliquit, confectionem eius hic docuit: quæ Oxalme eadem esset, nisi ex horto adiectæ illi herbæ paulo ante numeratæ fuissent, quæ ex uiribus suis in diuersis corporum nostrorum uitijs eam commendarent. Fuisseq; usum eius in ducenda per aluum pituita, testis hic ipse in Thymo herba est. Siquidem habere Thymum ait *ἀνὰ μὲν πινόμενον μετὰ ἄλυν καὶ ὄξος ἄνιν φλεγμονώδεις κατὰ κοιλίας*. Quod est, Potum cum sale & aceto pituitosa per aluum ducere. Quo genere remedij Thymoxalme hanc indicasse palam uidetur: quæ Thymo, aceto, & sale præcipue conficiebatur. Testatus in Pulegio etiā hic ipse est, multis ex ea herba remedijs efficaciter uirum societate acetū addi. Qua ratione Thymoxalme quæ inter cætera aceto etiā constat, nunc Pulegiū additur.

De Scyllino aceto. CAP. XVIII.

Scyllinum acetum hoc modo fit. Scylla quæ candida fuerit expurgata conciditur, traiectaq; lino segmenta modicis interuallis, ne se contingant, siccantur in umbra quadraginta diebus. Mina eorū in acetū boni sextarios duodecim immergitur, & uase diligenter operto, septenis diebus in sole madescit. Post eum numerū dierū Scylla eximitur, & expressa abijcitur. Defecatū acetū transfunditur & reponitur. Aliq; Scyllæ minā, quinque aceti sextarijs miscet. Alij citra exiccationē repurgantes, parē mensurā adijciunt, & senis mensibus macerari patiunt. Id multo magis humorū lēticias digerit. Gingiuas humore pregnātes collusione stringit. Et moros dentes firmat. Putredines oris, & graues halitus tollit. Durat fauces, & callosas facit. Vocē expedit, & limpidā canorū reddit. Datur stomachicis, egre cibū cōcoquētib; melancholicis, comitialibus, uertiginosis, mente captis. Itē uuluarū strangulationibus, lienis incremēto laborantibus, ischiadicisq;. Imbecillos admodū recreat. Corpus sanū reddit, & bonū colorē præstat. Oculorū aciem exacuat. Tarditatem quoq; aurium infusione purgat. In summa, ad oīa efficax. Cauēdū tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut neruorū uis

D I O S C O R I D I S

Ctjjs. Datur quotidie ieiunis sorbendū, inter initia exigūū, paulatim adaugendo ad cyathum usq;. Nonnulli binos dant cyathos, aut largius.

Pli. li. 20, ca. 9. **A** C E T U M S C I L L I T I C U M, & S C I L L I N U M, & S C I L L A T U M q u o q; d i c i t u r, & S c i l l i t e g r æ c e.

V I L G A R E M f u i s s e q u o n d ā S c y l l i t i c i a c e t i c o n f e c t i o n e, & e x e a q u o t i d i a n ū i n f a m i l i a u s u m,

qui eam docuerūt tam multi ex ueteribus indicant Plinius, Columella, Palladius, & in græcis quicūq; ad sanitatē & ualitudinem humanā rem aliquādo instruxerūt. Nouerant enim, q̄ multas utroq; tempore acetū id utilitates habet. Earumq; studio nullus nō propriæ, familiæq; suæ, saluti consulens paterfamilias, Scyllite acetū per æstatem a se confectū domi seruabat. Monstrauerūt priuatim suas confectiōes singuli: quas ne longiores simus, repetere hoc loco consilium nobis non est. Locos tantū in latinis signabimus: eritq; uolentibus hæc nouisse legendus Plinius lib. 20. capite. 9. Columella lib. 13. capite. 34. Palladius in Iulio mense, capite. 8. Hi enim omnes prædictis locis suas Scyllite acetū confectiōes docuerunt. Suntq; illis omnia eadē, aut parum diuersa: præterq; in numero dierū, quibus insolandū acetum hoc est. Plinius enim quadraginta & octo diebus id agendū esse præcipit, Palladius. 40. quod hic septem tantū diebus fieri iubet. Ex eo suspicati sumus. 40. dierum numerū, quo hic monet siccandā in umbra esse Scyllam, pertinere ad insolationem potuisse: aut septem diebus illis, quo spacio iubetur insolari acetū hoc, deesse quadraginta numeri notā: nec septem, sed quadraginta septem, aut octo diebus oportere id agi. Verba Pliniū sunt. Gypso deinde oblitus cadus ponitur sub regulis totius diei solem accipientibus: post eum numerū dierum tollitur uas. Intelligitq; numerū. 40. & 8. dierū, quem nō multo ante proposuerat, Palladij autē, Et. 40. diebus patieris esse sub sole. Obseruauimusq; nos quadragenariū hunc numerū in medicina, confectiōibusq; his ueluti decretoriū esse. Eamq; ob causā inclināt animus, ut credamus non septem, sed quadraginta & septem, octoue amplius diebus insolandū acetum hoc esse anteq; in uasa diffundatur, & seruetur. In cōmuni tamen græcorū omniū lectiōne nihil mutare ausi sumus. Quemadmodum non

D procul a fine totius capitis etiā, quo loco hic ait, In uniuersum ad omnia uim habere Scyllite acetum. Cauendū tamen in interioribus exulcerationibus, capitis doloribus, & neruorū infirmitati. Qualia illic erant, omnia seruauimus: quibus quæ ultima duo sunt, coniungi præcedentibus non possint: multoq; minus, ut in cunctis græcis leguntur, per se stare: modo uera sint quæ Plinius & alij tradiderunt. Hic enim dolorem capitis, & neruorū infirmitatem excipit: iubetq; cauere in exulceratis interaneis, dolore capitis, & neruorū infirmitatibus: Plinius autē de capitis dolore quidem nihil agit, sed neruis infirmis perq; utile ait esse. Quod intelligēs Barbarus, mutata dicendi forma, capitis doloribus, neruis infirmis quotidie ieiunis bibendū esse uertit. Nobis qua decet interpretem fide, nihil in scriptore hoc mutare placuit. Vitium tamen, aut uitiū suspiciōem saltem signauimus: monemusq; iterum, male sequacem habere, quæ eo loco sunt uoces intellectum: ideoq; medicis diligentius omnia illic expendenda esse. Credimusq; nos, deesse eo loco aliquid, quo iuberetur in capitis dolore, & infirmis neruis bibendum ieiunis Scyllite acetum esse: uerum ut diximus, nihil addi, interponiue ab interprete debuit. Fuit etiam satis nobis a principio, purgatam tantum Scyllam dicere: quoniā nihil aliud q̄ καὶ ὁ καθαῖρα in Dioscoride legeretur. Quæ autem ab alijs multa addita sunt: direptis, duris, & extrinsecus positis, &c. omnia ex Plinio huic scriptori addita fuerunt.

De uino Scyllino.

C A P. XIX.

σκυλλαρτικόν

S C Y L L I N ū u i n u m f i t h o c m o d o. D i s s e c t a m u t i d i c t ū e s t s c y l l a m, & s o l e s i c c a t a m c o n t u n d i t o: m i n a m e i u s t e n u i c r i b r o i n c e r n i t o, & l i n t e o i l l i g a t a m, i n u i c e n o s s e x t a r i o s m u s t i r e c e n t i s a c b o n i d e m e r g i t o. V b i t r i m e l t r i s p a c i o m a d u e r i t, e l u t r i a t u m u i n u m o b s t r u c t o d i l i g e n t e r u a s e r e c o n d i t o. L i c e t q u o q; s i c h u m i d a S c y l l a u t i. I n o r b i c u l o s R a p i m o d o d i s s e c t a m d u p l i c a t o p o n d e r e, q u a d r a g i n t a d i e b u s i n s o l a r i o p o r t e t, & i n u e t e r a s c e r e. A l i a p a r ā d i r a t i o. S c y l l æ d i s s e c t æ & r e p u r g a t æ t r e s m i n a s, i n I t a l i c a m m e t r e t ā m u s t i d e m i t t i t o, & s e n o s m e n s e s i n u a s e o b s t r u c t o m a c e

rari finito. Post id tempus excolatū uinum recondito. Vtile est contra **A** cruditates, & ciborū corruptiones. Item ijs qui reuomunt cibū, & si pituita in uentre, aut stomacho cōierit. Prodest lienosis, male habitis corporibus, aquae inter cutē, regio morbo, difficili urinae, torminosi, inflationibus, resolutioni neruorum, rigoribus longis, uertiginosis, & uulsis. Menfes pellit. Minime neruos infestat. Hoc uinum uetustate fit melius, Cauendus in febre usus, aut si interanea ulcus sentiant.

EX M. VERG. COMM.

Svas etiam Scyllitae uini Columella & Palladius, quibus paulo ante locis diximus, confectiones docuerunt, huic scriptori in eo, quod mox dicemus, tantopere contrarias, ut uinum in altero non suspicari, sed constituere oporteat. Dico autem alterum, quoniam concordēs sibi inuicem Columella & Palladius, alterā contrarietatis huius ambo faciunt partem. Ea huiusce modi est. Iuber ad uini huius confectionem Dios. sectam in sole siccari Scyllam, *figatur in sole*, quod est, siccato eam in sole: illi autem contra in umbra siccari praecipunt. Columellae in ea re uerba sunt. Taleolaeque sectas suspende in umbra, ut adsiccantur. Palladij, Scyllam de montanis, aut maritimis locis sub ortu caniculae procul a sole siccamus. Nec quicquam omnibus in eo quod docent certius est, tam aperto sensu a singulis conceptae uoces suae sunt: eo fit, ut nullae in contraria re partes nostrae sint, quae rem simpliciter signasse. Grauis enim scriptoris huius aestimatio, dignitas, & fides: graues etiam in re latina scriptores illi sunt, praesertimque Columella: quem ego nunquam crediderim in uulgari re, & quae quotidianum haberet usum, decipi debuisse: & nihilominus, ut uidetur, contraria huic illi docent. Relinquemus ob causam de tota hac re peritioribus censendum: illud tantum monentes, duorum fide, contra unius auctoritatem certare: certioresque habere rationem, ut in umbra potius quam in sole arescat Scylla: quoniam ui sua exsuctam, omnique humore citius exhaustam, inutilem, aut saltem minus efficacem sol faciet: quod contra in umbra fit, in qua paulatim arescens, nihil, aut parum ex uiribus suis amittet. Et praeter haec in scyllite Aceto, cuius eandem merito in ea re aliquis credat esse rationem, ab hoc ipso scriptore praecipit, in umbra siccari Scyllam: admittendamque potius eam rationem, in qua hic alij, & huic alij conueniant, quam eam in qua hic nec sibi, nec alij. Quod deinde dictum a Diosco. est, secundam raporum modo Scyllam esse, ex Columella repetendum nouisse id uolentibus est. Is enim. 13. uolumine, capite. 11. de Raporum conditura haec docuit. Raporum quae rotundissima sumito: eaque si sunt lutuosa, detergito, & summam cutem nouacula decerpito. Deinde, sicut consueuerunt salgamarij, decussatim ferramento lunato incidito: sed caueo ne usque ad imum praecidas Rapum. Salem inter incisuras Raporum, non nimium, minurum aspergito, &c. Hic incidendi Rapa modus est: quo in incidenda Scylla Diosco. uti iubet: ut posita in tabula, scilicet integra Scyllam, cultello decussatim incidas, ita tamen, ne usque ad imum praecidas. Quid autem decussare sit, & decussatim incidere, mathematici primum, tum rei rusticae auctores, & in architectura & fabrica periti facile ostendunt: qui omnes decussis, & in decussis ductas lineas appellant, quae non ad rectos angulos, sed quadam tenus transuersae cadentes, & in alias lineas incurrentes graecae literae. x. Romanae autem. X. faciunt: quae quoniam denarii numeri, quemadmodum nunc etiam est, quondam nota fuit, ab eo numero decussis, & decussare uerbum latinis fecit. Ex rusticorum salgamortum disciplina itaque, secanda duabus transuersis, & in decussis incisuris Scylla, ut nos credimus, erit.

De Vinis marinis.

CAP. XX.

Marina uarie factitantur. Aliqui enim statim quam decerpere sunt *si quidam uis* uuae aqua maris ammiscent. Alij in area uuas sole siccant: qui bus calcatis, marinam adijciunt. Alij passas prius uuas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt. Id magis Passi generibus adscribitur. Quae tamen austiore gustu temperantur, contra febrium aduentantium indicia ualent, si modo meliora non adsint. Aluum subducunt. Profunt purulenta extussentibus, aut si dura aluus exerceat.

D I O S C O R I D I S

C Quæ ex Aminæis uinis fiunt, caput tentant. Stomacho aduersantur, flatus creant. Verū quo plenior habeatur historia, ijs qui huius studio teneantur, non inutile existimamus uarias uinorum compositiones adferre. Non quod frequēs eorū, aut necessarius existat usus, sed ne quid omisisse uideremur, quod ad eorū rationem attineret. Sunt aut quædam ex ijs facticia, minoris curæ ac impendij, quæ cadunt in usus. Vti quæ ex coto-

neis malis, pyris, siliquis, item myrti baccis componuntur.

Vinum Tethalassomenon, hoc est, marina aqua factum, duo fere habet genera. Bixon, de quo dictum est. Alterum Leucoënon, aut etiā Leucochran, marina in album mustum confusa. In alijs autē gentibus Tethalassomenon, id est, mari conditum uocatur, a serui furto origine accepta, sic mensuram explentis. Habetur & Thalassites, uasis musti deiectis in mare: quo modo Cato præcipit, quadriennio Secundus, Rhodiū Coo simile est. Phorineum falsius Coo. Medicinas aliquot ex uino marina aqua facto legas, & ubi Dioscorides de qualitate uini loquitur. In hunc usum quidā ex alto peti mare iubent, seruariq; ab æquinoctio uerno, aut certe nocte solstitio, Aquilone flante. Hauriri autē circa uindemiam: si hauriatur, decoqui.

Vinum facti-
tium Incom-
mune.

Nillum uinum factitium, præterq; quæ specierum uetustate fiant, plus anno durare putant: & plura ne tricenis quidem diebus. Vinum ex siliqua, Ceratites, hoc est, siliquatium appellatur. Præstantissimum ex syriaca. Factitium uinum Græci Oenon Sceuaftion appellant. Quidam Propomata: quæ quidem ut sua quoq; sponte nascantur ex uitibus, ratio a Græcis inuenta traditur. Condebant & nitro uina. Item marmore. Item sulphure, ac cinere: quod miremur. Veteres e uitis maxime sarmentis, aut quercu.

E X M. V E R G. C O M M.

Poterant, auctore Celfo, uina omnia hæc simpliciter Salsa a nobis appellari. Is enim, s. primi uoluminis capite, inter solutæ alui remedia, negat falsum bibendū homini uinū. Habetq; id manifestā ex decretis ab hoc scriptore rationē: qui deijciendæ aluo, & his qui dura aluo erunt utilia ea esse docens, facile post se alios monuit, non esse augendā falsi uini potu alui solutionem. Sed accipit uocis eius intellectū fugientes, nolimus dubitari a legentibus, posse qualia uina hæc quondā fuerint, & an satis esset illis salem miscuisse. Diximus id, quoniā poterant alij interpretes, si erat illis animus, in titulo capitis huius a rei substantia discedere, ex Celfo honestiorem titulū uinis his præferre. Aptius enim Salsa, a sapore simpliciter, q; marina, aut græca uoce Tethalassomena dicta ab eis fuissent, præsentī legentū dubitatione, quæ nam adiectæ uocis eius causā & ratio esset. Tradiderunt præter scriptorem hunc falsi uini huius confectiōem, et si non penitus eandē, non tamen oīno dissimilē. Plinius quidē, 14. uolumine, capite. 2. quo loco ait. Salsi uini huius originē, a furto serui ortam, marina aqua explētis, quod subtractū in dies fuerat, Columella aut. 13. uolumine, capite. 22. & 6. Quos poterunt uolentes audire, & ex eorum decretis etiā falsi uini confectiōes discere. Nos interim ad reliquas uinorum confectiōes interpretationem & cōmentationem hanc nostram transferemus.

De uino Cydonite.

C A P. XXI.

κυδωνίτης
μηλίτης

CYdonites, nomine alio Melites appellatur, & ita fieri consuevit. Mala cotonea exēptis feminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarū pondō, in musti metretā triginta diebus demerguntur. Postea defæcatū uinum reponit. Alia faciendi ratio. Oportet ad singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorum tusorum, pressorumq; adijcere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit. Prodest stomacho, dysenteriae, hepaticis, renum uitij, & urinæ difficultati.

E X M. V E R G. C O M M.

Coniuuimus ex meliorū in græcis codicū lectione Cydonitē uini & mellis confectiōem. Continuata enim historia in illis duo hæc capita leguntur. Habetq; id ex uirium utriusq; similitudine rōnem. Cydonitē uini confectiōem monstrauit Palladius in Octobri mense, capite. 16.

sed tam diuersam, & scriptoris huius disciplinæ adeo contrariam, ut utilius nihil de ea egisse fuerit. Malomellis autem cōfectionem Columella. 13. uolumine, capite. 45. tam manifeste tradidit, ut cōmentationibus his nostris eam addidisse inutile non fuerit. Post traditam ab eo scriptore longius seruandorum pomorum, præsertimq; cydoneorum in melle disciplinam, huiuscemodi leguntur. Hæc ratio non solum ipsa mala custodit, sed etiam multi saporis liquorem præbet, q sine noxa possit intra annum dari febricitantibus: itq; uocatur Melomeli. Quæ omnia huic scriptori eadem sunt: præterq; q Columella intra annum uti eo cōcedit, hic post annum mitius fieri ostendit. Sed locus in hoc claudicat, & ideo uitij nota signatus est.

¶ De Melomelite. CAP. XXII.

Melomeli, quod & Cydonomeli nominant, sic fit. Cotonea mala seminibus suis castrata, in q plurimum mellis, quo demergi possint coniiciuntur. Id post annum mitescit, mulso non dissimile. Præstat eadem quæ superior compositio.

¶ De Hydromelo. CAP. XXIII.

Fit Hydromelon duabus mensuris aquæ coctæ, & sub caniculæ si-
dus insolatæ, additis ad unam Melomelitis facti ex cotoneis. Vis huius eadem est.

BARBARI COROLL.

Hydromelon, aliud est q Hydromeli, ut constat. alioquin & sine melle fingitur quandoq; ut Paulus existimat. Laudabatur in Græcia quod e Cibyra fistilibus pusillis austerum, uino sumq; solebat inuehi.

EX M. VERG. COMM.

Nvllum, quod hæcenus inuenerim, hoc nomine in latina Hydromalum est. Factū illi ex aqua & Malomelle, quibus constat, nomen est. Fuisse autem græcis usum eius quæ tradit cōficiendi disciplina, & eius gentis medici aperte ostendunt.

¶ De Omphacomelite. CAP. XXIII.

Omphacomelitis faciendi ratio hæc est. Acerbæ uuæ immaturæ & tribus diebus insolatæ exprimuntur, & ad ternas succi partes, mellis optimi despumati singulæ partes adijciuntur, & insolatum in uasa transfunditur. Vim adstringendi ac refrigerandi habet. Stomachicis, coeliacisq; conuenit. Vfus post annum est.

BARBARI COROLL.

Omphacomeli, hoc est, mel acerbum, siue acidum.

EX M. VERG. COMM.

Docet in Augusto mēse Omphacomellis etiam cōfectionem Palladius. Eaneq; omnino diuersa, nec penitus eadem huic scriptori est. Quæ potiora in ea sunt, ambobus eadem sunt. Quam hic tradit, ex antedictis nouisse facile est. Palladius suam his uerbis docet. In uuæ semiacerbæ succi sextarios sex, mellis triti fortiter duos sextarios debebis infundere: & sub solis radijs diebus quadraginta decoquere. Vocat Palladius semiacerbæ uuas, quas hic ait *μηπω πικραίνουσας*, id est, nondum integra maturitate nigrescentes. Et quod hic simpliciter iussit, insolandum esse eum succum, Palladius. 40. diebus fieri id præcipit. Cætera paulo minus q eadem ambobus sunt.

¶ De uino Apijte. CAP. XXV.

Fit e pyris perinde atq; cotoneis uinū Apijtes nomine, sed ita ut pyra non magnopere maturescant. Ex filiquis etiam, mespilis, forbis simili modo temperatur. Omnia hæc genera acerbæ sunt, & adstringunt, atq; intestinas fluxiones cohibent.

D I O S C O R I D I S

C V **BARBARI COROLL.**
inum e Pyro, Sorbo, Mespilo, Siliqua, Ceraunia. Differt porro Apjtes, ab eo quod Apia
ros etiam graece dicitur: qd illud e Pyro fit, hoc ex Apio.

EX M. VERG. COMM.
Longè aliter e pyris uinū cōfici in Februario mense Palladius p̄cipit. Et qm̄ qd ille instituit,
aliud ab hoc penitus esse credimus, nihil ex eo ad hūc scriptorē afferimus. Quaq; breuitate Plī
nius lib. 14. cap. 16. uinū ex siliqua Syriaca & e pyris, malorumq; omnibus generibus fieri do-
cuit, eadem nos in scriptore hoc uina eadem primo uertimus, & nunc cōmentamur.

De uino Oenanthino. CAP. XXVI.
ELabrusca fit, hoc est, uite syluestri, quod uocatur Oenanthinum.
Sicci flores minis duabus musti metreta macerati, post triginta di-
es mutantur, mox colatum uinum recōditur. Facit aduersus stomachi
imbecillitatem, cibi fastidia, coeliacos & dysentericos.

BARBARI COROLL.
Vinum Oenanthinum, quasi labruscatum conuertas. De hoc in Oenanthē dictum.
EX M. VERG. COMM.
Nihil ab hoc scriptore in Oenanthini uini cōfectiōe Plinius mutauit, e labrusca, i. syluestri ul-
te fieri dicens: floris eius duabus libris in musti cado maceratis, & post. 30. dies mutatis. Qualē
aut legere florē eū oporteat, ex Palladij disciplina dictū in Oenanthino unguento a nobis est.

De uino Rhōite. CAP. XXVII.
D **F**it e punicis malis maturis quod Rhōitē nominant, succo expres-
so ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, Apyrina uo-
cant, aut decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones
internas, & febrim cum alui profluuiū exortam. Stomacho utile. Ad-
stringit aluum, & urinam mouet.

BARBARI COROLL.
Rhōites, & uinum dicitur, & mel, quo punica mala condiuntur.
EX M. VERG. COMM.
In medicina quotidianus ex punicis expressi uini usus est. Certa etiam in scriptore hoc eius
cōfectio. Nihil ob eam causam de eo ultra agendum.

De uino Rhodite. CAP. I. XXVIII.
Rhodites sic fit. Rosarum siccarum tusarumq; minam linteolo
deligatam in sextarios octo musti demergito. Et post tres men-
ses, defæcatū uinum transfundens, recondito. Vtile ijs qui febris carent,
& ad stomachi cōctiones, & dolores in fine potum, & contra humiditas
aluos, & dysenterias. Fit quoq; ex succo rosarū, addito melle qd Rhō-
domeli uocant, quod arteriæ scabricijs conuenit.

BARBARI COROLL.
Rosaceum uinum est hoc, siue ut Palladius, Rosatum.
Rhodomeli, hoc est mel rosaceum, aut rosatum. A Paulo etiam Rhodostactō dicitur. Nam
Rhodomelon ex rosis & coronels malis conficitur.

EX M. VERG. COMM.
Rosatū uini genus hoc Palladius in Maio mense appellat. Cōfectionēq; eius qualis sua æta-
te erat, his uerbis docet. Quinq; libras rosę pridie purgatę, in uini ueteris decē sextarios mergis.
Post. 30. dies despumati mellis librā adjicis, & uteris. Nec multo post Rhodomel suū idem etiā
docet, quod huiuscemodi est. In succi rosę sextarijs singulis libras singulas mellis admiscēs, &
40. diebus sub sole suspendis. Docuit præterea in Octobri mense deficientibus rosis, qua ratiōe
uinum quod idem rosaceo posset, conficeretur. Ea cōfectio huiuscemodi est, Folia citri uiridia

in sporta palmea missa in musti nondum seruētis uasa deponēs, & claudes: exemptisq; his post
40. dies, addito melle ad modum rosati cum placebit uteris.

De uino Myrtite. CAP. XXIX.
MYrtites fit baccis nigris post maturitatem tuis, & organo ex-
pressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole tor-
rent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aquæ heminas adiiciunt,
& uini ueteris parem modum. Postea exprimunt et seruant. Magnopere
adstringit. Stomacho utile. Fluxionibus uētris ac stomachi prodest,
& contra intestinās ulcerationes & profluuiā. Denigrat capillos.

BARBARI COROLL.
Vinum Myrtites, hoc est, myrtatum, Cato docuit fieri e nigra: postea compertum ex alba.
Genus uini Plinio est & Myrtidanum, ab ipso nominatum, e syluestris Myrti baccis: quo & ma-
nus tingunt, Myrtidanum Dioscoridi frutex est, non uinum, ut diximus. Aliud genus uini est
Myrtatum: unde Myrata porio, non a myrrha, sed a Myro, id est, odoramento: quod & Iulius
Pollux Myriuen uinum appellauit, nostri Murinam. Quamq; inquit sunt, qui Myrinem etiam
pro dulci capiunt: quod et Plinio placet ex Lelii Senile Capitonisq; sententia. In comœdia certe
noua, Myrines, hoc est, odoratum uinum, Trimmā dicebatur. De hoc & in Lota diximus. Nā
Myrrha conditum amarissimum fit oportet: quippe quod in cruce Domino fit prebitum, non
oblectamenti, sed cruciatu propositum: idq; non tam Myrtatum, q̃ Myrrhatum scribere oportet.
Est & Myrtites pro melle myrtato acceptum quandoq;.

EX M. VERG. COMM.
MYrtitæ uini confectionem in latinis rei rusticæ scriptores omnes quam notuerant & ex-
ceperant sua tempora tradiderunt M. Cato operis sui de re rustica cap. 25. Palladius in Ianuario
mense cap. 17. Columella, 11. uolumine, cap. 38. Postq; hos omnes Plinius, 14. uolumine, cap. 16.
Omnes, excepto Catone, & Columella, simpliciter tuis myrti baccis. &c. fieri uinum hoc tra-
diderunt. Duo illi ad certum fruticis eius genus rem contraxerunt, nigræ myrti baccis fieri præ-
cipientes: & ex duobus generibus in hoc usu nigram tantum probantes. Catonis uerba sunt.
Myrtam nigram arefacito in umbra. &c. Columellæ uero. Nigri generis bacca cum sunt mātū-
ræ. &c. Eo fit, ut credamus quod a principio capitis huius legitur, *μύρτα μέλαινα παραμυσόντα δια-
βόρτα*. &c. quod est, Sumito nigras myrti baceas cum iam maturitate sua dilabuntur, non ad
nigrum in maturitate baccarum colorem simpliciter referendum esse, sed ad alterum myrti ge-
nus, quod priuatim nigrum ab antiquioribus uocatum est. Quod enim ad maturitatem perti-
nebat, in uoce *παραμυσόντα* indicabatur. Duobusq; illis autoribus redditus a nobis locus est,
& ad nigræ myrti baccas contractus. Fecimusq; id confidentius: quoniam in omni medicīne u-
su prælata candida nigra myrtus semper est. Non erit inutilis labor, antiquorum mores in his
cognouisse cupientibus, quæ a Columella longius quo diximus loco de myrtitæ huius uini cō-
fectione præcipuntur legisse. Diligens enim, & pro hominis uitā ubiq; operosus homo, diligen-
ter id etiam gentem suam & posteros docuit.

De uino Myrsinite. CAP. XXX.
MYrsinites sic temperat. Rami nigræ myrti cū suis baccis et fo-
lijs tuis, decē minarū pōdo, in tribus musti cōgijs feruescūt, do-
nec duo supersint, aut certe sesq; congius relinquat. Id uinū colatū ad u-
sus recōdit. Cōtra furfures, ulcera ī capite manātia, eruptiōes papularū,
gingiuas, tōssillas, & purulētās aureis efficax est. Sudores sistit.

EX M. VERG. COMM.
ALtera hæc ex Myrto uini confectio est. Differt a priore: q̃ illa baccis tm̃, hæc ramulis, folijs
& baccis myrti cōstat. Indicatq; in grecis manifeste utrāq; nomē. Quod em̃ myrtite ab illis dicit̃,
ex baccis quæ gens illa myrra uocat, factū est. Quod uero myrsinite, ex toto frutice quæ myrsi-
nē iudem græci appellant: eamq; ob causam alterum nos Myrtite græcorū & latinorū mō, alterū
Myrte latina tm̃ cōformatiōe diximus. Fuit ppria græcorū altera cōfectio hæc, si Plin. credimus;
Ee ij

C lib. 14. cap. 16. dicentī. Græci uero & alio mō teneris cum suis folijs in albo musto decoctis. &c.

L De uino Lētiscino, et Therebinthino. **C A P. XXXI.**
 Lētiscinū similiter ut Myrsinites temperatur. Nec secus Terebinthinum. Namq; bacciferi eorum rami sumi debent. Similes in sunt uires. Adstringunt. Stomacho accommodantur, & defluctionibus intestinorum, uescicæ, & stomachi, & sanguinis profluuiū. Vlcerā omnia fluctationibus obnoxia, forū ad cicatricem perducunt. Fluctationes uulue ac sedis, in sessione cohibent.

S **BARBARI COROLL.**
 Chininum uinū, hoc est, Lētiscinum, siue Lētiscatū dicitur. Si mastichen uero capiat, Mastichites uocabitur. Utuntur in hoc cum pice diligentiores, ut inquit Plinius, nigra mastiche, quam in Ponto similem bitumini provenire tradunt, radice Iridis, oleoq; additis.

P De uino Palmeo. **C A P. XXXII.**
 Palmulas maturas, quas uocant Chydæas, in urseolum imo per tūsum, & obstructum, picata arundine demitto: lino foramen sit obturatum, & quadragenis sextarijs ternos aquæ congios infundito. Quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinq; congios infudisse satis est. Post decem dies detracto ab arundine linteo, assumito uinū crasum & dulce, & reponito. Suaue illud quidē, sed capiti noxium. Cōtra fluctiōes ppter adstrictoriā uim efficax. Stomachicis, coeliacis, sanguinē expuentibus conuenit. Aliquī idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sextoue faciunt: quod tandem acore uitiatur.

P **BARBARI COROLL.**
 Almeo uino Parthi & Indi utuntur, & oriens totus. Phœnicites appellatur, quod ex triuāli palma constat. Id autem quod ex abiete palma sit, Spathites, & Elarites quoq; dici pōt.

T **EX M. VERG. COMM.**
 Ora, ut sic loquamur, diametro in Palmei uini confectioe distat ab hoc scriptore Plinius. Ille em. 14. uolumine, capite, 16. palmularum modio iubet aquæ tres infundi congios, hic decē modijs eam mensuram infundi pariter præcipit. Magna inter hos scriptores mensuræ eius diuersitate, & cuius causam nos ignoramus. Nisi in alterutro mensuræ illius nota eam fecerit. In grecis omnibus, quas hætenus uidere licuit, nulla est nunc numeri alicuius nota, sed integra uox *Alia*, id est, decem. Qui itidem nobis est uetustissimus, & longobardis literis scriptus latinus Diosco. decem, manifeste ostendit. Pliniani contra codices omnes eodem modo, & his uerbis leguntur. Maturarum, quas uocāt chydæas, modio in aquæ congijis tribus macerato. &c. Quod autem nos diximus, potuisse mensuræ eius notā diuersitatis huius causam facere, huiuscemodi est. Græci denarium numerum decimæ, ut illi constituerunt in aliarum ordine literæ suæ notæ, quæ iota est, indicant. Signantq; illam, ut uidere passim licet, eadem figura qua latini suum, i, Latini ediuerso unitates suas in numerorum incremento eodem illo i, signant. Concurrentq; in eandem formam græcorum denarij numeri, & latinorum unitatis notæ. Potuit ex eo diuersitas hæc fieri, & quod decem in Diosco. legendum erat, unū a Plinio intelligi, non ex græcæ, sed ex latinæ notæ illius indicatione. Credimusq; nos ueriores scriptoris huius, q; Plinij historiam esse. Exigua enim mensura modius est, nec futura satis ad transferendum in tres aquæ congios uini saporem: multoq; minus in quinq; ut hic etiam iubet.

C De Vino Catorchite. **C A P. XXXIII.**
 Catorchites aliquibus Sycites uocatur. In Cypro fit, ita ut Palmeum. Sed hoc interest, quoniam pro aqua tantundem humoris adiiciūt, in quo recenter pressa uinacea maduerint. Caricæ quæ chelidonice, aut phœnicæ appellantur, præsertim nigre, macerantur, uti di-

imus, & post decem dies humor excipitur. Atque iterum aut tertio, **A** idem modus aquæ in aqua uinacea maduerint, infunditur. Simili modo intercedente spacio, quarto aut quinto assumitur. Demaceratarum liquor non secus acorem contrahit, & aceti usum præbet. Id tenue est. Flatus gignit. Stomacho aduersatur. Fastidium parit. Aluo tamen prodest. Vrinam ciēt. Menses trahit. Lactis ubertatem facit. Vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio quam Zethon appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adijciunt. Alij muria amphoram, quod non facile uitatur, & aluo idoneum fore censent. Alij Thymum & sceniculum imo subiiciunt, & caricas superponunt, & ita uicissim, donec uas expleuerint.

BARBARI COROLL.

Sycites uinum, aliqui Palmiprunum, siue Palmiprimum uocant. Nam eius quod Sycinum appellauere, sicut & Ithacomelia, & Lectispagita, oblitterata iam ratio est.

EX M. VERG. COMM.

Sycatum non male aliquis hoc uinum dixerit. Hæc enim, & quotidiani usus in animalium iecore aliquando ea uox in latina fuit: neq; ab re. Cur enim liceat græcis Sicytæ uinum hoc a ficis, quas ea gens syca appellat, dicere: Latinis autem a ficis Ficatium dixisse turpe sit. Infelicius bonas artes profitentur, qui sic uetustatem amant, ut nihil suo tempore nouum oriri posse existiment. Nobis semper placuit quod Flaccus ait, licuisse indies, licereq; signatum presente nota producere nomen. Ideoq; titulo capitis eam nos uocem addidimus, quam placere legentibus optamus. Satis in scriptore hoc Ficatium uini per se confectio patet, nihil ideo de ea agimus. Quod desiderari a legentibus possit tantum monemus: quas hic chelidonias ad uini huius confectioem exigit, in ficorum censu ab antiquis scriptoribus inter primas numerari. Laudauit eas Athenus in tertio sui Dipnosophiste, campestribus locis conferi præcipiens. Laudauit Columella in carmine suo, Purpureq; Chelidonia. Laudauit, ut cæteros omittamus. is. uolumine, capite. is. Plinius, nouissimam sub hyeme maturari Chelidoniam dicens. Eam nos credimus a Chelidonijs in Illyrico gente dictam fuisse. Neq; ab re est, nouissimam sub hyeme maturari quæ in frigidissima regione primū, puenerit. Omnes colore eā describunt nigricantis purpure. Neq; enim Colu. aliud significauit dicēs, Purpureq; Chelidonia; et hic phœnicas. i. colore palmularum uocari, et nigras esse testatus, eodē cæteris colore describit. Facile ex his notis erit Chelidonia fici uolentibus cognoscere, colore nigricantis purpure, & postremę om̃ aliarum maturitatis.

De uino Sycomorite.

CAP. XXXIII.

Fit & e Sycomoris eodem modo uinum. Sed in acetum acre de- generat: quoniā nominata præualeat uis eorum, ut fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

BARBARI COROLL.

Vinum e fico Aegyptia, siue Alexandrina, item ex Cypria, cuius acetum Alexandrino melius est, Sycomoriten Græci uocant.

De uino Resinato.

CAP. XXXV.

Resinatum uinum populatim factitari solet. Copiosum in Galatia. quoniā uinum illic cōacescat, uua non maturescante. Ideoq; refrigerat, nisi picea resina temperetur. Resina autem cum cortice tūdatur, & amphoræ, dimidiata hemina permiscetur. Aliqui ubi effervescunt, separantes resinam. Alij relinquunt. Hæc uina uetustate dulcescunt. Omnia capitis dolorem & uertigines faciunt. Concoctionem tamen adiuuant, Vrinam ciēt. Tussientibus ac destillatione uexatis cō-

Ec iij

Cueniunt. Item coeliacis, dysentericis, mulierum mensibus, & hydropicis, & feminis fluctuone uuluae laborantibus. Altis exulcerationibus infunditur. In hoc autem genere nigricans magis albo constringit.

Pli, li, 14, ca, 16

Vinum Rhetinites, hoc est, resinatum, de quo & in Pissite, id est, Picato dictum.

BARBARICOROLL.

EX M. VERG. COMM.

Haec sunt Resinata uina illa quae Martialis in Epigramate suo dicebat, relictis Phaleris importune bibere hominem: quoniam potu illa delectarent, haec plerumque amarescerent: quo gustu nunc etiam aliquot locis in Graecia bibuntur. Neque enim conditurae eius ratio penitus exoleuit. Quondam tam communis condiendi hac ratione uina in gentibus disciplina erat, ut hic Resinatu uini nota & titulo simpliciter contentus, nec quicquam ultra hoc restatus desiderare legentes modo cogat, quo Resine genere uina haec condirentur. Barbarus ex Larice addidit: cum tamen in scriptore hoc non magis Larigna, quam quaeuis alias intelligi resina possit. Resinatum enim tunc hic ait, & nihilominus multiplex resina est. Dubitandum etiam, quam intelligi Galatiam oporteat: eam ne quae in Asia, an quae ultra Alpes ad Septentrionem est. Verum cum hic dixerit, non maturefcere illic ob gelu uiam, &c. aptius de ea quae ad Septentrionem ultra Alpes est intellexisse fuerit. Etsi nusquam legisse me memini, consueuisse Gallos resina condire sua uina.

De uino Strobilite CAP. XXXVI.

εποχιδίτης

Strobilites fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus, fractisque. Praebetque resinati effectus, si quis madefactas nuces pini musto decoquat. Potum conuenit ijs qui tabitudine conficiuntur.

BARBARICOROLL.

DHoc uinum Hippocrates Coniam uidetur dixisse, quod arbor, e qua nux pineae funduntur, Conos, & Strobilos uocetur: ut alio loco docui. Galenus Coniam, pro Pissite cepit.

EX M. VERG. COMM.

Nucleis Pineis, non nucibus condit hoc uinum Barbarus: nos contra nucibus, non nucleis. Anceps ad totam nucem, & nucleos eius in graecis uox diuersitati causam dedit. Secutus ille Plinium est lib. 14. cap. 16. dicentem. Fit nucleis Pineis: hi musto madidi exprimuntur. &c. Nos in ambiguo, quae scriptoris huius decretis responderent, potius elegimus. Primo enim uolumine, capite de pino, nucibusque & nucleis eius manifeste monuit, totas nuxes ab arbore decerpitas, contusas, in mustoque decoctas, uetustisque tussis & tabidis prodesse. Quod totum idem hoc loco auditur. Nisi forte in prima capitis huius parte de nucleis, in secunda de nucibus agi dicatur: quod tamen parum uerisimile est: cum hic dixerit recentes strobilos, & cotusos, quod nucibus magis quam nucleis congruit. Praeterea remedij tota uis in resina est, quae multa foris in nucibus, nulla in nucleis haeret.

De Vino Cedrino. CAP. XXXVII.

Cedrinum, Iuniperinum, Cupressinum, Laurinum, Pineum, aut Abiegnum simili ratione fiunt. Diuisos recenter ramos cum fructu aedunt, aut soli, aut balneo, aut igni, admouere oportet, uti desudet, congioque uini minam unam permiscere, & post duos menses transfundere. Et antequam recondantur insolare. Facticiorum uinorum uasa impleri debent. Namque non plenae uasae, uina in acorem corrumpuntur. Medicata autem uina, recte ualentibus insalubria. Omnia exalfaciunt. Vrinam citius, & substringunt. Laurinum tamen uehementius exalfacit. Fit quoque e fructu Cedri maioris uinum, congio musti, adiecta tusarum baccarum selibra. Diebus quadraginta insolari debet, & defaecatum in uasa transferri.

De uino Iuniperino. CAP. XXXVIII.

εφικυδιδίτης

Fit etiam uinum e baccis Iuniperi, non aliud quam cedrites, et ad eadem ualens.

Differt, ut uidetur, reprimi, mox nomine etiā quod ex eadem Cedro, sed non hīdem eius partibus fit uinum. Quod enim ex materia eius conficitur, Cedrinum: quod ex liquore, Cedrite ab antiquis græcis dictum est. hīdem & nos nominibus duo discreuimus genera: licetq; in pluribus græcorum, tribus capitibus seorsum hæc docerentur, nos tamen naturæ in arboribus his similitudinem, & parium coniunctionem, mox meliorum græcorum fidem secuti paulo minus q̃ congeneres plantas, & earum partes uno eodemq; capite claufimus: reddidimusq; singulis, qua licuit certitudine, quæ sua erant.

De Vino Cedrite.

CAP. XXXIX.

Cedrites hoc modo fit. Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt. Et ita musto replent. Hoc genus uini excalfacit, extenuat. Tussi utile sine febre, pectoris, laterumq; doloribus, uentris & interaneorum ulceribus, purulentis excreationibus, mulieribus uulua malo opportunis, hydropicisq;. Facit aduersus uentris tinea & rigores. Contra uenenatos ictus auxiliatur. Serpentes necat. Aurium doloribus instillatum medetur.

BARBARI COROLL.

Vinum Cedrites, a Cedrino differt: q̃ Cedrites e Cedria fit, Cedrinum ex Assulis Cedri, aut fructu.

E X M. V E R G. C O M M.

Debuerat resinato coniungi statim Picatum uinum: quoniam nihil aliud q̃ combustæ resinæ fluxus Pix est. Hic tamen plura ex arboribus his confecta ante numerauit uina, quæ aut resinam ipse ferrent: aut resinæ pares haberent uires: nec nisi post eas Picatum docuit uinum. De quo eadem huic omnia Plinius tradidit libro. 13. capite secundo, ex quo poterunt uolentes multa intelligendo huic scriptori necessaria audire.

De Vino Picato.

CAP. XL.

Picatum ex liquida Pice, & musto temperatur. Picem autem primum marina, aut muria tantisper eluere oportet, dum inalbuerit, & syncera maris aqua defluat. Mox aqua dulci proluenda. Congijs octo musti, uncia Picis una aut altera adijcitur. Vbi efferbuerit & constiterit, in uasa diffunditur. Hoc genus uini excalfacit, concoquit, purgat, abstergit. Vtile doloribus pectoris, iocineris, lienis & uulua, si sine febre sint, ueteri rheumatismo, exulcerationibus in altum recedentibus, tussi, suspicijs, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, præsertim in succida lana impositum.

BARBARI COROLL.

Diximus de Pissite, id est, Picino, aut Picato etiam superius.

De Vino Absinthite.

CAP. XLI.

Absinthite faciendi ratio euariat. Aliqui enim duodequingenta sextarijs Italicarum amphorarum, ammistam Absinthij Pontici libram decoquunt ad tertias partes, & ubi infuderint nonaginta aceti sextarios, & Absinthij selibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in uas, dumq; conquieuerit defæcant. Alij absinthij minā in amphorā demittunt, tufamq; & raro linteo deligatā, in decem congijs musti macerant, binis mensibus. Alij absinthij quadrantē, alij trientē, & Nardi Syriacæ, Cinnamomi, calia, floris iunci odorati, calami, elatæ, palmarū,

Ec iiiij

C singulos sextantes iniiciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstructo uasis spiraculo, binis ternisue mensibus dimittunt. Postea defæcatum uinum transfundunt ad usus. Alij addunt in musti cadum, celticæ Nardi drachmas quatuordecim, & Absinthij drachmas quadraginta lintheo inuolutas, & post quadragesimum diem elutriant. Alij in uiginti sextarios musti, absinthij libram, & siccæ pini resinæ sextan-tem immittunt, & post decem dies excolant, & recondunt. Vtile est sto-macho. Vrinam cit. Tardam concoctionem accelerat. Hepaticis, re-gio morbo, & renū uitij auxiliatur. Fastidia discutit. Iis prodest quibus stomachus negociū exhibet. Valet cōtra longā præcordiorū distentionē & inflatiōes, teretesq; uentris tineas, & remoratos menses. Contra hau-sta ixiæ uenena q̄ plurimū potum, & uomitionibus redditū auxiliat.

V B A R B A R I C O R O L L.
Inum Absinthites fit & alio modo circa radices uitium consisto, sicut Elleborites.

S ACRIS Romanæ gentis celebratū quondam Absinthiū est. Siquidem latinæ ferijs certanti-bus in Capitolio quadrigis, uictor Absinthiū bibebat: sanitatem, ut par est, præmio dari hono-rifice tunc existimantibus Romanis, cuius seruadæ, restituendæq; non parua merito inter olera laus Absinthio debetur: tam multiplex uis eius est, & in firmando stomacho tam efficax. Ob quod sapor eius in uina transferē. Fitq; Absinthite uinū toto hoc capite a Dioscoride longius descriptū: ne deesset gentibus tractandæ Absinthio medicinæ ratio hæc etiā: quā docuit & Co-lumella. 3. sui operis uolumine, capite. 37. his uerbis. Vinū Absinthite sic condire oportet. Pon-tici Absinthij pondo librā cum musti sextarijs. 4. decoque usq; ad quartam. Reliquū quod erit frigidū, adde in musti amminci urnā. &c. Simplex, ut uidet, Absinthite uini huius Columellæ conditura est. Dioscorides operosior: neq; una, aut altera, sed pluribus rōnibus instituta. Quæ omnes satis per se patent: tractariq; hoc tempore etiam possent, nisi quæ Absinthij, aliarumq; rerum pondera & uini mensuræ nunc in Dioscoride leguntur, suspecta nobis essent: non tam quia uarie in antiquis græcis legūtur, q̄ quia alicubi maiora, alicubi minora, q̄ rei usus exigit esse nobis uidetur. Nos nihil mutauimus, communem lectionem in cunctis secuti. Monemus tamē, sicubi conficiendi Absinthite uini studium aliquando fuerit, quod ad pondera & men-suras in eo pertinet, diligentius expendendum illi prius esse.

H YSSOPITES e Cilicio Hyssopo maximè laudatur. Fitq; similiter fo-liorum Hyssopi tusorum libra in amphorā musti coniecta. Lin-theolo raro cum quibusdam lapillis folia inuoluuntur, ut degrauius pon-dusculo fasciculus sidat. Vinum post quadraginta dies defæcatum elutri-atur. Contra pectoris, laterum & pulmonis uitia, ueterem tussim, & suspi-ria prodest. Vrinam cit. Torminibus & rigoribus febriū circūitu repen-tibus auxiliatur. Menses mouet.

V B A R B A R I C O R O L L.
Inum Hyssopites, potest & iuxta radices sato uinum fieri, ut Absinthites.

N O N est Hyssopite uini nostri orbis gentibus desperanda penitus confectio. Et si hic, Plini usq; ex Cilicia tantū Hyssopo probatissimū fieri dicunt. Columella enī quo diximus in Absin-thite loco, nulla aliunde petita Hyssopo Hyssopite suū conficit. Poterūtq; uolētes suæ regionis Hyssopo uinū condire, si non omniū aliarq; probatissima ea saltem quæ inutilis oīno non sit.

S I M I L I M O D O Chamædrytes fieri solet. Excalfacit, discutit. Con-

uulsis, regio morbo, uulua inflationibus, tardae concoctioni, incipienti A
aquae inter cutem, subuenit. Inueterascens melius redditur.

¶ De Vīno Stichadite.

CAP. XLIIII.

Stichadites non secus temperatur. Congijs sex stichadis minam ad-
dere oportet. Crassiciem, inflationes, laterum, neruorumq; crucia-
tus, & perfrictiones discutit. Comitialibus commode datur, cum Pyre-
thro & Sagapenio.

¶ De Aceto Stichadico.

CAP. XLV.

It ad eadem Acetum e Stichade herba, ut paulo ante diximus, ace-
to macerata. Quod eisdem implet effectus.

¶ De Vīno Cestrite.

CAP. XLVI.

It Vīnū e Betonica, quā Cestron psychotrophon appellant. Hæ-
bam semine maturo prægnantē, cū suis ramulis minae pondo, con-
gijs duobus musti macerant, & post septimum mensem transfundunt.
Ad multa interaneorum uitia, ut frutex ipse pollet. Et ut in uniuersum di-
catur, facticia uina, sibi misturarum uires adsciscunt. Quare non difficile
fuerit, ijs qui illarum naturas norint, uinorum uires coniectura quadam
consequi. Verumtamen uinorum usus febricitantibus abdicandus. Fit
etiamnum e Betonica Acetum ad eadem uitia utile.

¶ De Tragoriganite uino.

CAP. XLVII.

Tragoriganites fit quaternis Tragorigani drachmis, in quater-
nos musti sextarios coniectis, & post tertium mensem transfusis.
Prodest torminibus, uulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discus-
sationi, ægris concoctionibus.

¶ De Vīno Bunite.

CAP. XLVIII.

ENapis fit uinum nomine Bunites, drachmis duabus tusi Napi in
sextarios duos musti additis, & cæteris eodem modo factis. Pro-
dest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis.

EX M. VERG. COMM.

Napis inter cætera condiri uinum hic scriptor ait: prodesseq; armorum, & equitandi labo-
re defatigatis: neq; haberet a reliquoꝝ disciplina diuersum aliquid conditura eius, si esset Na-
porum contra lassitudines priuatim uis aliqua. Aut si ratiocinari liceret, cur magis laboribus
illis duobus, q̃ tot alijs cursus itineris, pilæ, remigij, saltusq; proffit. Omnium enim idem euetus
est, & ob eam causam eadem constituenda remedia sunt. Testatur tamē id Dioscorides. Fuisse
sepe id ab antiquissimis Græcis obseruatum & institutum. 21. uolumine, capite secundo Plinius
etiam confirmat: & si in græcorū ostentationem totam huiusmodi ille reiiciat rem. Eius ter-
ba sunt, Et alias modum excesserat medicorū in his ostentatio: ueluti e Napis uinum utile esse
ab armorum, equitatusue lassitudine præcipientium. &c. Nos ex tam multis hoc signauimus,
ut scrupulum legentibus inijceremus, quo cogerentur & ipsi remediū eius ex uini & Naporum
uiribus causam inuenire. Docuit præterea hic scriptor, Marrhubio notissima omnibus herba
condiri uinum. Certiorem tamen eius condituram decimotertio uolumine, capite. 32. tradidit
Columella. Ea huiusmodi est. Vinum Marrhubij multi utile putant ad omnia intestina ui-
tia, & maxie ad tussim. Cum uindemiā facies, Marrhubij caules teneros, maxie de locis incul-

D I O S C O R I D I S

Cis & macris legito; eosq; in sole siccato; deinde fasciculos facito, & tomice palmea, aut iunce ligato: & in seriam mitito, ita ut uinculum extet. In musti dulcis sextarios ducentos Marrhubij pondo libras octo adjicito, ut simul cum musto deferuescat. Postea eximito Marrhubium, & purgatum uinum diligenter oblinito.

Διταμνίτης

DICTAMNI drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit aduersus stomachi fastidia. Menses & purgamentum a partu subducit.

Πρασίτης οίνος

MArrhubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, et reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc uinum pectoris uitijis, & omnibus quibus Marrhubium.

Θυμίτης

THymi tusi & cribrati uncias duas lintheo colligatas, in amphora musti adjicito. Valet contra aegras coctiones, fastidia, dysenteriam, neruorum & praecordiorum dolores, hybernos horrores, & uenenata animalia, quorum morsum frigus insequitur, aut putrescit locus.

Θυμβρίτης

Simili modo e satyria uinum fit, quod eadem quae Thymites praestat.

Όριγανίτης

SI C quoq; Origanites ex Heracleotico Origano conficitur. Facit eadem quae Thymites.

Καλαμίνθιτης
γλυχανίτης

ECalamintha, Pulegio, Abrotono uina fiunt eodem quo Thymites modo. Profunt stomachicis, cibum fastidientibus, et regio morbo: quod urinam moueant.

Κοκύνιτης

FIt & item e Conyza uinum, contra uenenata ante alia efficax.

Αρωματίτης

ARomatites ita fit. Palmae, Aspalathi, Calami, Nardi gallici, singulorum quatuor sextarios sumito, Postquam contriueris musto subigito, coactis ingentibus offis, & in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato uase, quadraginta diebus quiescere finito. Deinde ubi face expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio. Calami uncia, Phu drachmae septem, Costi drachmae duae, Nardi Syriaci drachmae sex, casie uncia, croci drachmae quatuor, Ammomi drachmae quinq; Alari drachmae quatuor, omnia simul trita, & lintheo colligata in caddu musti demergunt. Et postquam uinum deferbuerit, transfunditur. Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores. Difficili urinae, rigoribus, retardatis mensibus, atque ijs qui per frigora iter faciunt, potum conuenit. Pituitae crassiciem extenuat, Colorem alit. Somnum conciliat. Dolorem finit. Renum & uesicae uitijis auxiliatur.

B A R B A R I C O R O L L.

V Inū Aromatites, hoc est, odoratū, parabilius, & simplicius Catoni e ferta, lunco, Palma. Athenæus auctor est, ut in Myrrite diximus, potiōis genus ex aromatis confectū, q̄ ueteres uterent, appellari Trimma, Diximus & de alio Aromatite, qd Hippocraticū recētiōes uocāt.

E X M. V E R G. C O M M.

A B Aromatis, quæ odoramēta sunt, Aromatite uino nomen grēci fecerūt. Neq̄ ab re tam multis odoramētis condit. Nota in conditura eius oia sunt, & nisi in ponderū, & mensurarum notis uitū in grēcis fuerit, qd fere suspicamur, certa in reliquis ratio erit.

De Vino e Pipere, Myrrha, & Iride. C A P. LVII.

F It & Vinum ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor in stomacho coijt, Myrrhæ duæ drachmę, Piperis candidi drachma una, Iridis drachmę sex, Anisi drachmę tres. Omnia pleniū tusa & linteolo inuoluta in sex uini sextarios coniiciuntur. Vinum post triiduum colatur, et in lagena reconditur. Datur post deambulationem meaculū cyathi unius mensura.

De Nectarite uino.

C A P. LVIII.

F It quoq̄ Nectarites ex Helenio hærbæ, quā alij Medicā, alij Symphyton, alij Idæon Phlomon, alij Orestion, alij Nectarion uocāt. Radice sicca pondo quinq̄ drachmarum linteolo colligata, & in congiōs sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pectoris uitia. Vrinam pellit.

De Vino e Syriaca Nardo celtica, & Malabathro.

C A P. LIX.

E Syriaca Nardo & celtica, Malabathroq̄ uinum faciūtur hac ratione. Singulorum selibram in binos musti congiōs mittito. Post menses duos colato. Datur cyathus unus cum tribus aquæ. Hoc Vinum efficax est contra uitia renū, hepaticos, regium morbum, & urinæ difficultatem. Prodest stomachicis, atq̄ ijs quos pallor decolorat. Alij bessēm, aut sextantem acori, & celticæ Nardi quadrantem, in musti amphoram adijciunt.

H B A R B A R I C O R O L L.
Vic uino pipere & melle addito, sunt quæ alij Condita, alij Piperata appellant. Acetum quoq̄ piperatum fieri solebat.

De Asarite uino.

C A P. LX.

A Sfarī quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. Id uini genus urinam ciet. Hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq̄ conuenit.

De Vino e syluestri Nardo.

C A P. LXI.

R Adicis syluestris Nardi recētis & trite, cribrataq̄ bessēm, in congiū musti coniicito. Duos menses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili urinæ, inflationibus, stomachicis.

De Daucitate uino.

C A P. LXII.

R Adicis Dauci contusæ drachmas sex in musti amphoram im-

D I O S C O R I D I S

Cponito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & uulvæ. Menses pellit. Ructus ciet, & urinam. Prodest tussi, ruptis, uulvisq̃.

ἐλαισθακίτης

SAluiae unciam in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mitto. Valet contra renum, uesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, uulsa, & suppressos menses.

B A R B A R I C O R O L L.

SAluiatum uinum, a Saluia dici nouimus. Saluiatum uero quo ueterinarij utuntur, positionis genus est. Poton Græci uocant ex ordeacea, aut triticea farina & sale: a quo fortasse Saluiatum. Quidam in Columella Saluiatum, aut Salinatum legere malunt. Ab eo salinare uerbum deducitur.

πανακίτης

PAnacis unciam in musti congiū mittito, & transfundito. Prodest ruptis, uulvis, fractis, orthopnceæ. Lienis crassiciem extenuat. Contra tormina, coxendicum dolores efficax est. Tardas concoctiones accelerat. Menses & partus extrahit. A quæ inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur.

ἀκορίτης

VIna ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorū uncias in senos congiōs mittere, tribus mensibus macerare, mox in uas transferre. Faciūt ad pectus & latera. Et urinā mouēt.

σελινίτης

SEminis apij recentis, maturi, & cribrati drachmæ nouem in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat. Stomachicis & difficili urinae auxiliatur. Oris halitum commendat.

μαραθρίτης καὶ ἀνιθίνος

EX Fœniculo, Anetho, & Petroselino, uina eodem modo fiunt, & ad eadem efficacia.

FIt & e flore salis uinum multo ad purgandum efficacius, q̃ uinum aqua marina temperatum. Fauces, uesicam, renes, & stomachum infestat. Quare neq̃ in secunda, neq̃ aduersa ualitudine prodest. Fit etiam uinum quod Phthorion uocant, quoniam partus necat, & abortus facit. Veratro aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta radices uitium fato. Siquidem uites sibi illorum uires adiscunt. Id uinum partus enecat. Datur ieiunis mulieribus quæ ante uomuerunt, cyathorum octo mensura dilutum.

B A R B A R I C O R O L L.

Inum e salis flore, Halosanthiten Græci appellant.

θυμιαίνης

RAmorum Thymelææ cum suis folijs, & fructu triginta dra-

chmas mittito in congios tres musti, & leui igne coquito, donec congij duo supersint, defæcatumq; recondito. Aquosa purgat excrementa, & lienem absumit.

Vinum Phthorion, aliqui Eßromaticon appellat, ex Elleboro in Thaso fit, ibi & uinū con-
di perhibent, alterū ad soporem, alterū ad uigilias. Cato Ellebori radices in pila contundi præ-
cipit, circū uitem dandas. Vile id uinum fore ad mouendam aluum, sine periculo. Theopha-
stus in Arcadiæ oppido Heræa, uinum tradit esse, cuius potu foeminae pariant: uiri mente com-
moueantur. In Achaia saltu Ceryniensi uinum & uitem nasci, quæ foeminis gustata faciant ab-
ortum, in Troezenē steriles. Idem auctor, uina quædam scribit Ethica uocari: Theodorus uer-
tit, moralia: etiā si mendose scriptū est, molaria quandoq;. Laudantur, q; celeriter purgāt se, ac
cōsistunt, quoniā tenuia sunt, & mixturæ immunia, ob id Ethica dici potuere, quasi castigata.

Vinū Phtho-
rion.

De Vīno e Chamælæa. CAP. LXX.

Chamælæa dum floret, cū folijs tusa, & cribrata decem drachma-
rum pondere, in musti congiū additur. Post duos menses
uinum in uas transfertur. Aquæ inter cutem, hepaticis, & lassitudine
confractis efficax est. Item mulieribus quæ a partu ægre purgantur.

χαμαιλαίτης

De Vīno Chamæpityīno. CAP. LXXI.

Chamæpityinum simili modo fit, ad eadem conueniens. Vri-
nam quoq; ciet.

χαμαιπυτύνιον

De Vīno Mandragorite. CAP. LXXII.

Librum radice concidito. Segmenta lino trañcito, quod felibram
laquat in musti congios decē demittito. Ibiq; esse finito ad men-
ses treis. Media potio heminae dimidium, bibitur, passo in duplum ad-
dito. Aiunt heminae uini congiō mistam, potu sapore adferre. Cyathus
unus cū sextario uini potus, enecat. Mediocris usus eius, doloris sen-
sum aufert. Fluxiones incrassat. Olfactu, instillatu, potuq; idē præstat.

μανδραγορίτης

B

De Vīno Elleborite. CAP. LXXIII.

In congiū musti aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri
ueratri triti in linteo mundo, mittito. Dumq; efferbuerit, in mari-
nae aquæ congios quatuordecim aut quindecim transfundito. Et ubi
pleniusscule fregeris, inñcito. Post aliquot dies colato, & utitor. Dato
cyathum unum ex aqua in potu ad aluum soluendam ijs qui euomue-
runt a cœna, Alia ratio. Veratri drachmas uiginti, iunci odorati uncias
duodecim, spicæ syriacæ uncias tredecim, cribratas & linteo colliga-
tas in septem uini cōi sextarios, diebus quadraginta macerandas indi-
to. Postmodum colato. Dabis in potu sesquiheminam. Aliter. Deco-
ctæ marinæ aquæ ex pelago petita sextarios duodecim, ueratri candi-
di libras sex, quadragesimo die q; madefeceris, colato, & utitor. Alia ra-
tio. Veratri drachmas duodenas, & aphronitri quaternas in senis mu-
sti sextarijs diebus quinque denis macerato, mox colato, & semestri ex-
acto, utitor. Id uini genus abortus facit, & partus necat. Aut uas in

ελλεβορίτης

Ff

D · I · O · S · C · O · R · I · D · I · S

C se se siccatas imponito in musti metretam (implet autem metreta congi-
os decem) & gypsum in uinum mittito pondo drachmarū uiginti, et bi
duo residere finito: conijcito ueratri nigri uncias triginta, iunci odorati,
calami, singulorum drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios du-
os & heminam, myrrhæ & croci singulorum drachmam, inuoluens lin-
teolo diebus quadraginta appendito: postea colato, dabis heminas treis
aut duas dilutas. Purgat a partu & abortu scēminas. Menses extrahit.
Contra strangulatus uulua efficax.

DE BARBARI COROLL.

DE altero Elleborite, dictum est in Phthorio. **CAP. LXXIII.**

SCAMMONITES sic fit. Radicis scammonia per menses ef-
fossæ, trita & linteo colligatæ drachmas quinq; in uini congiū
mittito, ad dies triginta. Aluum purgat. Bilem & pituitam extrahit.

DE BARBARI COROLL.

DE altero Scammonite legitur in Phthorio.

EX M. VERG. COMM.

Sais per se parent quæ fictitij Vini tam multa gña supiore capite collecta a nobis sunt. Ni-
hil ob eam causam ultra de eis agemus: sed festinantes ad reliqua, quæ uerēda in scriptore hoc
alia supersunt, interpretationis, cōmentationisq; nostræ laborem transferemus.

D
nadiuic

DE oibus metallicis, et primū de Cadmia. **CAP. LXXV.**
EX Cadmia generibus optima est Cypria, Botrytis nomine, den-
sa, modice grauis, et in leuitatem magis declinans, racemosa facie,
colore spodij: quæ fracta cinerulenta est, & eruginosa. Proxima habetur
foris cærulea, intus candidior, internatis segminibus, onychitæ lapidi si-
milis. Cuiusmodi sunt quæ e ueteribus metallis effodiuntur. Quædam
etiam Placodes, id est, crustosa dicitur, lineis quibusdam perinde quasi
zonis cincta: ob quod eam Zonitin appellauere. Alia Ostracitis nomi-
natur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem ha-
bet, terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis
Botrytis nomine, & Onychitis, utiles. Reliquæ ad emplastra, & farinas
quæ cicatricibus inducendis insperguntur. Ad eadem Cypria prodest.
Ex Macedonia uero, Thracia, & Hispania delatæ, improbantur. Cad-
miæ effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, exiccare, cor-
poris meatus infercire, excrecentia in carne coercere, crustas creare, &
ulcera quæ cacœthe uocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur Cad-
mia ex are in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, & lateribus ca-
merisq; fornacum applicata. Prægrandes autē ac ferreæ sunt fornaces,
ab officinis appellatæ Acestides, per summa nullo spiraculo relicto, cō-
camerate: ut quæ ab are iactantur sursum corpuscula cohæreant, & in
ibi detineant: quæ cū spissius insidēt, in corpus conerascunt, & modo
genus unum eius, modo alterū, mō omnia perficiūt. Extrahitur & Cad-
mia cremato lapide cui Pyritæ cognomē est, mōū sole supereminente.

In quo etiā quædam quasi uenæ, chalcitis, myrios, foreos, melantheriæ **A**
 cærulei, chrysocollæ, atramenti futorij, diphrygisq; inueniunt. Nec des-
 sunt qui Cadmiam in lapidū fodinis inueniri tradant: falli quadā lapi-
 dum cognatione. Reperitur & apud Cumas lapis nullā sui uim osten-
 dens. In eo deprehenduntur, q̄ sunt Cadmia leuiore, nullumq; alienū
 mandentibus sapore exhibent. Cōmanducatus aut lapis, dentes offen-
 dit, Cadmia, utpote cum cedat, esum nō respuit. Alio aut discerni pos-
 sunt argumento. Cadmia in farinā detrita, & aceto subacta, in sole se cō-
 primit. Quod in lapide nunq̄ accidit. Item tritus, & igni appositus la-
 pis, profilit, & fumū igni similem eiāculatur: Cadmia uero quieta ma-
 net, fulginemq; luteo colore, aut æreo splendentem expuit, uario zona-
 rum discursu. Insuper lapis ignē expertus, atq; refrigeratus, colorē mu-
 tabit, ac leuior multo fiet: sed Cadmia nihil euariat, nisi quis eā aliquot
 diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus cādidior, ac minus pon-
 derosa, sed uiribus nequaq; comparanda ærariæ. Vritur Cadmia super
 ior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoris
 modo bullet: mox extinguitur uino aminnæo. Sed quæ ad pforarum
 medicamenta præparatur, aceto. Alij hoc modo. Exustam cōterunt in
 uino, rursumq; sicili crudo torrent, donec pumicosa uideat. Iterumq; **B**
 tritam ex uino, urunt donec in cinerem redigatur, nihil scabriciæ reti-
 nens. Hac spodiij uice utuntur. Lauatur in mortario trita, effusa subin-
 de aqua, dum sordidū nihil emergat. Dein coacta in pastillos reponit.

BARBARA I COROLL.

Cadmiam uocant & lapidem quendam erosum, ex quo fit æs, fusuris necessarium, medici-
 næ inuile: quamq; Galenus lapidosam Cadmiam circa Solos in Cypro insula nascentē, forna-
 cariæ prelatam ætate sua meminit, inuentu raram. Possidonius quoq; lapidem Cadmiam ex
 Cyprio tantum ære fieri commemorat. Fit aut Cadmia, de qua hic loquimur, etiam in argenti
 fornacibus, candidior ac minus grauis, sed minime cōparanda ærariæ. Plinius Capnitin, hoc
 est, Fumariam appellat eam, quæ sit tenuissima, in ipso fornacium ore inuenta: qua flammæ
 eluctantur exusta, & nimia leuitate similis fauillæ. Secunda Botryitin, hoc est, Racemariam:
 quia interior sit, & cameris dependeat: cui prima dignatio tribuitur, grauior priore, leuior se-
 quentibus. Duo huius colores, cinerius, & puniceus, qui & melior. Friabilis hæc, oculorumq;
 medicamentis utilissima. Tertium genus Placitis, aut Placodes: & ipsa ex argumento, quoniā
 crusta sit uerius q̄ pumex. Ponderosissima hæc, & intus uaria. E lateribus fornacis fluunt ex
 ea duo genera, Onychitis extra pene cerulea. Intus Onychite, modo maculosa, Ostracitis tota
 nigra, & cæterarum durissima: unde nomen.

EX M. VERG. COMM.

Non poterunt metalla etiā, & si naturæ solidissimæ sunt, pares iniurias temporū, & libra-
 riorum incuriā, duas bonarū artium, & antiquorū scriptorum maximas calamitates & pestes,
 euadere. Habere em hoc etiam caput, quod suspicemur aliter quondā legi potuisse, quod in an-
 tiquis exemplaribus uariet, & quod duobus locis necessario desideretur. Quod suspicamur
 eo loco est quo legitur. Vocatur & Ostracitis, alia concretionē sua *ixvi*. Quam uocem nescio
 quomodo gracilem, nos etiā alios imitati diximus. Neq; em Cadmiæ gracilitas congruit. Si
 enim minore crassitudine describenda erat Cadmia hæc, tenuem, nō gracilem dici oportebat.
 Per latitudinem em Cadmia extenditur: potestq; tenuis, aut contra crassior concrefcere: & ni-
 hilominus *ixxv* hic dicit: quæ uox per longitudinem subtile, & gracile significat. Eapropter
 dubitauimus eum uertentes locū, non *ixxv*, quod est gracilem, sed *ixxv̄v̄*, id est, ualidam & effi-
 cacem legi potuisse: ut non ad habitum & figuram, sed ad potestatem & uires referenda ea uox

Ff ij

C fuerit. In quo non tam persuasit suspicari id, facili ob literarum & soni uicinitatem ex altera in aliteram uocem & significationem lapsus, q̄ Plinius de hac ipsa Cadmia agēs lib. 35. cap. 10. fortissimam ceterarum eam esse dicens: quasi ἰσχυράν, non ἰσχυρὴν ipse tunc legisset. Cōmunis ramentū gręcorum omnium ea lectio est. Et qui latini scriptoris huius codices circumferuntur, his uerbis eam deferibunt. Est & alia quę Ostracitis dicitur tenuis, & nigra, eadem fere tenuitatis & gracilitatis significatione: eamq; ob causam nihil nos ex cōmuni lectione mutauimus, contenti suspicionem hanc nostram legentibus indicasse. Quod deinde in scriptoris huius exemplaribus uariatur, coniunctum his statim sequitur: habentq; uetustiores gręci, & quibus nos magis deferimus, hæc uerba. γαρίδου δὲ ἢ ἰσπανίδου καὶ ἰσχυρῶν ἰσπανία, coniuncto scilicet cum superioribus sensu. Qui sit, ut nos uertimus, uocari Cadmiam aliquam testaceam, gracilem, plerumque nigram, terrestri, testaceae uel superficiei: quasi rationem & causam hic scriptor redderet, cur testacea Cadmia hæc appellaretur, quoniam terrestri, aut marinis testis simili superficiei sit. Qui uero impressi codices passim circumferuntur, alium, & qui forte a uero non discrepet his uerbis indicant sensum. γαρίδου δὲ ἢ ἰσπανίδου καὶ ἰσχυρῶν ἰσπανία, qui scilicet sit, terrestrem esse Cadmiam, quę testacea superficiei sit: ideoque in medicina minus utilem. Nos antiquiores gręcos & latinos secuti, terrestri, testaceae uel superficiei Cadmiam illam esse descripsimus. Nec eo secius audisse hoc legentes inutile penitus nō fuit. Quemadmodum contra pro comperto his esse illud oportet, perisse huic scriptori aliqua quo loco hic ait; adhærente parietibus & cameris eius fauilla. &c. Quę enim statim sequuntur, Grandes hæc, ferreæq; sunt ab ærarijs acedidas appellatę, in summis fornacium cameris compactę, &c. integro & apto sensu coniungi nequeunt. Cæteri ininterpretes nihil deesse hoc loco suspicati, ad fornaces redeutorferunt: uerteruntq; grandes, ferreæq; fornaces eas esse, & ab ærarijs acedidas uocari. Nō animaduertentes, si sic legatur, contra eius artis leges & obseruationes fieri ex metallo in eū usum fornaces: quę eodam igne candentes & ipsę fluent, aut liquefacto aeri incorporabuntur: nec ab ærarijs in eo usu tractari aliqua ratione poterunt. Quod præterea sequitur, ut rerineant, consolidantq; in eis quę ab ære sursum feruntur, ad cameras & earum conuexitatem simpliciter referri non posse: neq; fornaces a gręcis acedidas uocari: sed ex quo hic ait, ab ærarijs acedidas uocari, oportere aliud quidpiam ea uoce significatum suspicari. Quibus ueluti impedimentis nos admoniti, suspicati uitium primum sumus: mox ex antiqua scriptoris huius interpretatione id manifeste deprehendimus. Seruant enim adhuc in ea uerę lectionis exigua uestigia aliqua. Quę huiusmodi sunt. Multi uero ponunt ferreās hastas, & longas. &c. Ex quibus ratio cinaria facile est, consueuisse qui Cadmiam quærerent, ferreas uirgas ueluti axes transuerfas in summa fornacis camera in eum quem hic docet usum suspendere. Eritq; sequax hic sermonis ductus, ut cum dixerit Diosc. Fit Cadmia ex ære in fornacibus accenso, adhærente fornacium parietibus, & cameris eius fauilla: interim solere ærarios, ut aptius hæreat & consolidat Cadmia, in summa fornacis camera transuerfos axes, aut regulas componere: esseq; has grandes ferreæq; & ab ærarijs acedidas uocari. Quā uoce gręci ab Acesta Sicilię ciuitate plostelli gentis huiusmodi axibus compactum uocabant. Non longe postremo a fine necessario desiderat, quod tamen restitui facillime potest. Locus est ubi de cremanda Cadmia agitur: in quo cum in cunctis gręcis legatur, post eius cocturam, tum uino amineo restinguitur: sequaturq; statim: quę uero ad scabiem aceto. &c. necessario deesse aliquid constituendum est. Dicendi enim modus hic gręcis pariter & latinis parum congruus. Nec habet sequacem sermonis ductum aduersatiua particula illa quę sequitur, quę uero ad scabiem aceto. &c. Nisi præcesserit aliud a quo quod sequitur separaretur. Nec sane decebat hunc scriptorem, aliam restinguendi crematam Cadmiam rationem docere, priuatimq; ad scabies eius usum cōtrahere, nisi diuersam in diuerso usu restinguendi rationem antea docuisset. Habendę Plinio hoc loco ingentes gratię. Ostendit enim 34. uolumine, cap. 10. quibus additis et insertis in integrum restitui locus hic posset. Verba eius sunt, & ut nos credimus a scriptore hoc accepta. Restinguitur uino amineo, quę ad emplastrum præparatur: quę uero ad psoras, aceto. Vocauitq; ille psoras quas nos scabies cutis. f. asperitate omnes. Nihil itaq; certius hoc loco erit: respondebuntq; sibi omnia, si quis post Cadmię cocturam legat: restinguitur uino amineo, quę ad emplastrum præparatur: quę autem ad scabies, aceto. Fecit id Barbarus ex Plinio acceptum, ut diximus. Verum tamē in gręcis pars ea nō legitur: nec nos addere huic scriptori eam uoluimus, satis fore rati locum signasse. Volumus legentes in eo etiam monere, quod a principio capitis huius non est nobis cum cæteris interpretibus idem: maluisse nos rubiginosum dicere, q̄ eruginosum, quod in scriptore hoc idem est. Scimus quidem ἰν in metallicis æruginem plerumq; esse, ab ære dictam, quę metallo illo &

humoris alicuius, præsertimq; aceti habitu, quemadmodū non multo post hic describet, fiat: cuius in medicina multus est usus, uiridi semper colore. Nouimus etiam hunc scripto rem in ea significationis æstimatione hac uoce plerumq; uti. Veruntamen scientes duos in Cadmia ab antiquis græcorum medicis laudari colores, cinereum, & puniceum; nec posse æruginem quia uiridis sit, cinereo, aut puniceo colore describi ex altera græcæ illius uocis significatione, nam & rubiginem id græci aliquando dicunt, rubiginosam diximus, in qua uoce puniceus color sit. A rubore enim, rubigo dicta est, & scabries quæ igne semper fit: quorum nullum in æruginē dici poterat, quæ uiret, & humoris alicuius aspergine, non igne conficitur.

De Pompholygē.

CAP. LXXVI.

Pompholyx specie sola, non genere a Spodio distat. Siquidem Spodios nigricat, & plerumq; ponderosior est, palearum, pilorumq; plena: quasi deraſum quiddam, ac detractum ab ærariarum officinarum pauimentis, fornacibusq; uideatur. Pompholyx uero pinguis est, & candida, usq; adeo leuis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera. Vnum ad æris colorem uergens, suppingue. Alterum magnopere candidum, summamq; leuitatem nactum. Candida fit Pompholyx, quoties in perficiundo æte, fabri præstantiorem facere uolentes, detritam Cadmiam cumulatiuſ inſparſerint. Namq; tenuissima fauilla quæ effertur, in Pompholygē cōit. Cæterum Pompholyx nō ex æris modo materia & fabrilī industria facitatur, sed ex Cadmia quoq; ad gignendā ipsam eximie proſlata. Cuius faciundę ratio hæc est. In domo binis tectis operta, fornax extruitur: iuxta quam mediocris fenestra uersus tabulatum a supernis partibus pateat. Domicilij paries fornaci proximius, tenui foramine ad fornacem usq; perforetur, ad excipiendam follis narem. Ostium mediocre habeat, pro exitu ingressuq; artificis fabricatum. Domuncula altera cōiuncta sit, in qua & folles & flator suo munere fungantur. Deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex, Cadmiam particulatim fractā inſpargit, a locis supra fornacis caput extructis. Idem negociū obit artificis minister, simulq; carbonēs adiicit, usq; dum indita Cadmiæ copia prorsus absumatur. Itaq; egesta suffitu, tenuis pars & leuis materię in summā domū euolat, & parietibus tectisq; adhærescit: conflatū inde corpus, inter initia erumpentibus aquarū bullis simile prodit: postea maius incrementum capescens, elaboratis lanis simile redditur. Ponderosius autem in subiecta pedibus loca se recipit. Sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pauimento cohæret. Quod tenuiore deterius existimandū est, ideo q; multum terrę collegerit, & spurcicia in aceruatiōe referciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri Spodium arbitrantur, de qua ante dictum est. Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto odorem æris præstat, colore aliquantum piceo, sapore luti horrido: & si fraudem nō experta, flagranti carbone inferuescit, æreum colorem contrahit. Antedictis autem notis, diligenter attendendum est. Siquidem a nonnullis

Ff iij

D I O S C O R I D I S

C adulteratur taurino glutino, ouillo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus. Quod facile cognitu fuerit. Quippe nihil in ijs probandis inuenietur eorum quæ antedicta sunt. Pompholygem ita lauari oportet. Ligatam linteo mundo, modiceq; raram, aut siccam, aut aqua respersam in labellum demittito, quod imbrem contineat, & huc atq; illuc fasciculum deferens, immergito. Ita enim limosa pars eius ac dulcis effluet, et omne crassamentum in linteolo remanebit. Postea residere sinens, aquam cum cinere colis incernito, & nouam infundens, agitato, & effundito, mutata tantisper aqua & colata, dum arenosi nihil fidat. Demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij quantum maxime fieri potest siccant, et manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imitetur. Deinde linteo faucibus excepturi uasis obtento, aut laxius illigato, colant: & quo facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant; mox spumum quod traiectum est & supernatat uasi, concha excipiunt, & fictili nouo ad usus recondunt. Quod uero resedit, et sensim cribratum, in aliud uas transfundunt, relicto harenoso quod pessum ierat. Rursus lapidosa sidere patiuntur, & in uas aliud excolant. Hoc identidem faciunt, donec cinis merus & harenæ expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degrauatos, pessum ire. Pilos autem & paleas leuitate sua in sublime attolli. Cæterum cinerem medium separant, & in pilam coniectum ut Cadmiam eluunt. Quinetiam lauatur uino Chio marina aqua diluto, modis quos supra diximus. Et ita redditur adstringentior, q̃ aquis elota. Vis Pompholygis adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & aliquantum exiccare. Inter medicamenta numeratur quæ sensim cruftas obducunt. Quod si Spodium torrere libet, diligenter tritam & irrigatam aqua, colliges in pastillos: fictiliq; nouo, subiectis leuibus prunis orbiculos continuo uersabis, dum assiccati fuluescunt. Neq; ignorandum, ex auro, argento, plumbocq; fieri Spodion. Verum post Cypriam Plumbea maxime commendatur.

B A R B A R I C O R O L L.

DE Pompholyge, ac Spodio, cōmuni usu hic agitur: differentia, ut aliqui existimant, q̃ Pōpholyx paratur lorura: Spodion, siue Spodos illota est. Quidam id quod candidum sit, leuissimumq; Pompholygen dixere, & esse æris & cadmiæ fauillam, & ut nomen indicat ampullam: qualis est bullantiū aquarū. Spodiō uero nigriore, ponderosiorēq; mixtis scinillis aliqñ et carbombus. Optimā e Cyprio: p̃pterea Hippo. Melancypriō, quasi atramentū cypriū uocatā inter p̃stant aliq. Nam Posidonius e Cyprio tm̃ ære fieri Spodiō existimauit, ut Straboni placet: fieri q̃ liquescentibus Cadmiā ærario lapide leuissimā. Hęc euolās e fornacib. & testis adherescēs, a fuligine distat eādore: q̃d minus cādidū ex ea fuerit, imaturq; fornacis argumētū est, hoc qdā Pōpholygē uocat. Qd̃ uero rubicūdius ex ijs inuenit, actiore uim habet: exulceratq; adeo ut cū sauat, si attingat oculos, excēcet. Est & mellei coloris Spodos, in qua plurimū æris intelligit: sed q̃d cūq; genus lauādo fit uilius. Habet & i argēti fornacibus Spodos, quā uocat Lauriotin, forasse quā Illyriotin Hippo, nescio an corrupte. Lauriō certe locus erat in Attica, ubi Argēti fodi

ne quodā fuere, ut inquit Pausanias. Vtilissima hæc oculis, quæ fiat i aurarijs. Spodiō & explābo fit, eodē modo quo ex ære Cyprio mōstrauimus. Fit Pompholyx et ex sola quoq; Cadmia, ut Galenus testatur. Actius inuentu inquit rara est Pōpholyx, & adulterari facilis. Laudatur uero non candida, sed quæ subliuet, quæq; carbonibus insperfa, flammā ignis auream uideri faciat.

EX M. VERG. COMM.

P Ræfatus a principio statim hic scriptor, specie solam, genere nullā habere diuersitatem in metallicis Bullam & Cinerulā, promiscuum in medicina monuit utriusq; cum opus erit fore usum: simulq; ueniam dari sibi a legentibus petijt, si mutatis inuicem nominibus his confectio nem, loturamq; & usum toto hoc capite utriusq; docuisset. Quod em̄ in eis differt, color, pondus, & puritas tantum est. Substantia eadē, & uires in utraq; pares: tantūq; abest, ut rei discrimen aliquod antiquitas fecerit: ut Bullam sola lotura differre a Cinerula aliqui testati fuerint. Hic tamē certius rem docens, certas utriusq; notas reddidit. Quæ deinceps ab eo traditæ, repetendæ inutiliter a nobis modo non sunt: indicantibus præsertim earū etiam nominibus, nō rei, sed partium diuersitatem. Pompholyx em̄, quæ a nobis Bullæ nomine reddita est, Bullarum in aqua similitudine cōcrefcens, eademq; figura quasi clauso intra se spiritu, ut in offensa aqua fit, tumens, indeq; inuento nomīne ui flammæ egesta, & hærens ex materia æris, quod leuissimum purissimumq; erat secū detulit. Contra aut Spodion, quā Cinerulam uertimus, grauiore pondere, sordidiorq;, non aliter q̄ cinis extincto igne mixtis carbonum reliquijs subledit. Accessit etiam utriq; color, qui in altera ob eam causam nigricans, in altera candidus, partium itidem, nō substantiæ diuersitatem ostendit. Eoq; pertinet quod in Cinerula hic ait, esse eam ueluti fornacum purgamentū, & quasi quod scopis uerritur. Non aliter q̄ infimi, & pro re rustica stercoreis generibus græci *σπυματινὸν κάρπον* uocant, id scilicet, quod undiq; scopis in unū collectum fuerint: quale in purgandis tridinijs, totaq; domo quotidie in certum aliquem conueritur locum. *σπύρα* enim, qua uoce hic usus est, nihil indicat aliud. Quemadmodum & *σποδὸν*, siue *σποδῖον*, non simpliciter cinerem, sed sordidum, & in quo extinctorum carbonum reliquiæ supersint aliquæ. Id enim nos obseruauimus inter *σπύρα*, & *σποδὸν* græcorum discrimen. Neq; hic aliquando *σπυματινὸν* dicens aliud, q̄ feruentem cinerem eumq; in quo ardentium adhuc carbonū exiguæ reliquiæ sunt intelligi uult. Cognouerunt discrimen hoc latini etiam, si Columellæ credimus lib. 2. capite. 15. de generibus stercoreis agentī: in quorum censu prodesse etiam fati ait cinerem, & fauillam: in altero rem notam significans: in altera cineri mixtos carbonēs, & eorum quas diximus reliquias.

De Antispodo.

CAP. LXXVII.

QUONIAM Spodos sæpe numero desyderatur, necesse est ostendere, quæ simili uirtute polleant, ut in Spodij locū suffici possint, Antispoda uocant, quo q̄ modo sumi debent. Folia itaq; myrti, cum floribus & baccis immaturis, in fictili crudum coniecta, inditoq; operculo continua foramina habente uruntur fornacibus, donec figlinum percoquatur. Iterum in fictile aliud crudū transferuntur: quod ubi perassatum fuerit, exempta lauatur ad usus. Idem quoq; fit e termitē syluestris oliuæ, si habeatur: sin secus, satiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis, & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis linteolis. Item ex moris immaturis, id est, candidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, oenanthe, aut mollibus rubi folijs, uel e buxi coma, uel pseudocypereo cum flore. Alij ficus in sole antea siccatas, eodem modo parant. Alij taurinum gluten. Alij succidas lanas asperas, pice, aut melle irrigatas. Quæ omnia in Spodij uicem usurpantur.

ANTISPODION est & cinis fici, caprificiq;, ac lentisqi; e buxi quoq; coma est, pseudo Cypere, & Terebinthi, & Oenanthæ.

C

μακρυμύρον
χαλκός

De Aere usto.

CAP. LXXVIII.

AEs ustum probatur rubrum, quod contritu colore Cinnabarim imitetur. Nigrum uero plus q̄ deceat exustum est. Fit autē e classis solutarum nauium, fictili crudo compositis, subperso sulphure, cum sale pari: omnibus uicissim insparis, fictile circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen insparunt. Alij sine sulphure ac sale fictili, alia quot dies urunt. Alij sulphure solo utuntur, fuliginem tamen excutunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cū sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in aenea olla aceto resperfos, urunt, & iterum aut tertio idem efficiunt: postea recondunt. Principem locum tenet in Memphide combustum: proximum in Cypro. Adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, attrahit. Vlcera purgat, & ad cicatricem perducit. Vitia oculorum emendat. Ex crescentia in carne consumit. Nomas cohibet. Vomitus ciet, cum Hydromelite potum, aut cum melle delinctū, illitumue. Lauatur ut Cadmia, mutata quater in die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris cremētum, stercusue, quam scoriam uocant, eodem modo lauatur, & eandem uim, sed imbecilliolem habet.

BARBARICOROLL.

AEs ustum, Græci Calchon cecaumenon uocāt: Celsus uero cum Cinerem q̄ priū uocat, aut Cypriū æs, crematū, aut Spodion cypriā intelligit. Aegyptus collyrii modo teri in couculis. Fuligo æris, siue ut Aetius appellat, arariorū fabrorum, Ephestia græce dicitur.

D

Scoriam metallorum, Græci, & Scoriam, & Cibdelin uocant: ut Photioni placet.

EX M. VERG. COMM.

Plinium secutus Barbarus, colorem in cremato ære probauit, qui ad Minij speciem accederet: rubentis quidē, eodemq̄, aut non dissimili Cinnabari colore fulgentis: non tamen, ut hic paulo post docebit, re & substantia eiusdem: cum alterū ex Hispania, alterū ex Libya quondā affereret: uulgareq̄ Minium & copiosum, Cinnabari autem exigū & rarum esset: & quo tantum in uariandis lineis pictores uterent. Ex eo quoniā in consimili genere poterant Cinnabari & Minij diuerso colore esse, alterūq̄ profundiore, alterum dilutiore rubore uideri, a uocibus scriptoris huius discere longius ipsi noluimus. Et quoniā in cremato ære colorem hic probauerat, eundem nos etiā probauimus: nec aliter q̄ hic Cinnabaris colore in attritu crematū fieri descripsimus. In cuius confectioe non est quod miretur aliquis, probare hunc clauos solutarum nauū. Fuit enim æris quondā largior, q̄ ferri copia: eousq̄, ut arma etiā quibus ad bellum uterent ex hoc metallo fierent: si græcorū poetis, præsertimq̄ Homero credimus. Erat in fabrica quotidianus itidem æris usus: in qua prælatū diu ferro id est, non ob copiam tantū, quæ maior ferri aliquādo fuit, q̄ quia nulla rubigine perit æs, & in quotidiano attritu contumacius durat. Ea q̄ est causa, cur hic æreos clauos in nauigijs dixerit. Cur autē ex solutis nauibus potius, q̄ nouos quæri præceperit, aliā habet rationē: quoniā scilicet aprius in eo usu æs illud sit, quod attritu domitū, & consuetudine laboris ueluti mansuescētū erit. Multa em sunt quæ in nouitate sua minorem, q̄ in uetustate, ob nimias uires, utilitatē habent. Nec aliū de factum fuisse nos credimus, ut uetusti æris & in clauos iam pridem conformati, multoq̄ labore edomiti, ad hanc rem usus esset. Potuit etiam ex nauigijs magis, q̄ ex ædificijs quæri: quoniā ex mari, saleq̄ eius aliquid bonitatis ad hunc usum æri accreuisset: quod antiquiores illi experti, posteris sua fide recipiendū tradiderunt. Satis cætera in hoc capite patent.

De Flore Aeris.

CAP. LXXIX.

αἴθρῃ χαλκός

Flos Aeris, quem nonnulli clauorum ueterum Pseuma, quasi ramentū, noīarunt, optimus est, friabilis, in attritu fuluescens, milij

effigie, brevis, ponderosus, modice splendens, atq; constringens, qui de A
limatam aeris scobem nō recepit, qua saepe adulteratur. Sed id facile de
prehenditur cum dentiū illisū dilatantur ramenta. Fit aut, cum aes for-
nacibus fustum, in receptacula delabitur, per cola fistularū ad ea perti-
nentiū. Circa eas em occupati, sordes expurgantes, aquā clarissimam in-
fundunt, refrigerare uolentes. Itaq; repētino concretu, ac addensatione,
expuit, & scatet antedictus flos. Adstringit, & excrementia coerct.
Offusam oculis caliginem emēdat, sed magnopere mordet. Quaternū
obolorū pondere datus, crassum humorē extrahit. Carnosa narium ui-
tia absomit. Eruptiones papularum cum uino cohibet. Contra diutur-
nas aurium grauitates tritus, in eas per fistulam flatu impellit. Vuam,
consillasq; reprimat, farina eius cum melle admota.

BARBARI COROLL.

FLOS aeris, hoc est, Chalcuanthos, differt a Chalcantho, quod atramentum est futuriū. Dif-
fert & a Squama, quae ui atq; ictibus clauis & panibus aereis excutitur. Flos uero ex iisdem ca-
dit sponte. Fit aut in aeris officinis, iam fuso aere atq; percocto, additis etiamnū carbonibus,
paulatimq; accensis. Tum repente uehementiori flatu expuitur aeris Pala quaedā (ut Plinij uer-
bis utar) quod Pseuma, Floremq; uocat. Est aut Pala proprie, ut inquit Sorabo, purgatoris au-
ri gleba semilibralis: a quo translatus id nomē est & ad alia. Plinius alio loco Palacas in Hispa-
nia dici massas auri scribit, in puteis repertas, decussis pondere: quas & Palacranas uocant; si-
cut minutum quod est, Balancē. Democritij chymistae aphrodites sperma, hoc est, Veneris se-
men. Nā & ipsum aes nō alio q̄ Veneris uocabulo pnunciant. Iidem Ascion chalcō, pro aeris
flore accipiunt, hoc est, quasi exumbratū aes interpreter. Sunt qui Florē diuersum intelligāt a
Pseumate, sed ratio facienda eadem. In utroq; solū quo Pseuma excipitur, stratum esse iubent.

De Squama aeris.

CAP. LXXX.

SQVAMA aeris excussa clauis cyprio aere fabricatis, crassa quā
dem ipsa. Bona est quae Helitis nominatur. Sed ex malo aere, aut
candido, uitiosa intelligitur. Quam utpote tenuem & inualidam dam-
namus, maxime approbantes crassam, ruffam, praesertim si acetū resper-
su rubiginem contrahat. Vim habet adstrictoriam, extenuantem, res-
primentē, & erodentem. Nomas coerct. Vlcera ad cicatricē perducit.
Pota ex aqua mulsā aquam trahit. Aliqui farina subactam, dant in ca-
tapotio. Additur ad oculorum medicamenta. Genarum scabriciam ab-
sumit, & fluctiones exiccat. Lauatur hoc modo. Siccae aeris squamae ex-
purgatae selibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter contur-
batur, quousq; pessum ierit. Abijcitur quod emerit, & effusa aqua, ha-
mina coelestis hymbris adijcitur, & distenta manu, squama quasi exica-
canda sit, uehementer confricatur. Dumq; lentorem emittere coeperit,
aqua sensim ad sex heminas usq; superinfundit, terendo ualide. Squa-
ma ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur. Quo facto, expressus
humor pixide ex aere rubro facta, excipitur. Hoc est enim uelut flos
Squamae, ualens uiribus, & ad ocularia medicamenta cumprimis effi-
cax. Inutile quod superest. Lauatur, donec nullam prorsus lenticiam
excernat, & linteo opertum biduo conquiescere sinitur, effusaq; extan-

D I O S C O R I D I S

C te aqua, ubi siccatum erit, reconditur pixidicula. Alij ut Cadmiam lauant, & reponunt.

B A R B A R I C O R O L L.

SQuama, hoc est, lepis, etiam e ferro in usu est, ex acie, aut mucronibus maxime simili, sed acriore ui, q̄ rubigo. Cyprios clauos, de quibus hic habet mentio, Palladius cuprinos clauos: & cuprinū æs, pro cyprio ære appellat. Aeris inquit Celsus, duæ species sunt: alia tantū æris: alia rubri æris. Veteres ipsum æs rude impolitūq; dicebant Raudū, siue Rodū: unde porta Romæ, q̄ ærata esset Raudera, et Rauduscula, siue Raudusculana uocaret. Quid si pomi genus in cireæ, q̄d Rantiū uulgo dicit, ab æris colore quasi Raudū uocaris: hoc est, fuluū. Est em̄ fuluū æs; ut inquit Ennius. Q̄q; & a Neratio fortassis inuentore, Neratiū dici potuit. Nisi quis non Rantiū, sed Arantiū, quasi Ariantū, id est, Persicū, a gente uelit appellatū. Est enim Aria, ut inquit Hellanicus, & si recte memini, etiā Herodotus, & Plinius, & ceteri, Persica quædā regio. Quid item si malū Arantium, ab Arantia oppido Achaïæ dictū conijcias: q̄d & pomis fertile scribunt fuisse: a quo effectu, posterius Phliunta noīauere, ut inquit Stephanus: proinde Lacedæmonij mēsem, in quo terra fructibus abundat, Phliasion appellat. Accedit, q̄ Herculem mala Hesperidū, Arantiam primū tulisse credunt, auctore Pausania. Sed uereor, ne quis me alias inuidiæ obnoxii, etiam nimio iuuandi rem latinā studio, lapsus prædicet.

E X M. V E R G. C O M M.

QVæ tria ex uno eodemq; ære in medicinæ usu deinceps a scriptore hoc numerata hæcenus fuerunt, æs, ærisq; flos, & Squama, non aliter q̄ de bulla & cinerula non multo ante hic dixit, specie tantū inter se differunt, genere nullā habent differentia. Ex eadem em̄ materia, eisdem fere usus & effectus præstant. Nec aliter de his ueteres tradiderunt, q̄ ut æris partes haberi tria hæc uellent. Longius de his docuit Plinius uolumine. 14. capite. 11. Qui licet aliter a scriptore hoc de his tradere uideatur, re tamen eadem omnia docet. Nec aliud esse discrimen ostendit, q̄ q̄ Squama excutitur iustibus, flos sponte cadit: alterūq; illud Squamæ genus, quod Stomoma dicunt, subtilius esse, ex summa scilicet lanugine decussum. Est em̄ græcis Stomoma ferri acies: & uerbum illis στομόν aciem in ferro trahere significat: cum in cote ductū, reductūq; acuitur, & acuendo extertitur. A quo euentu quæ subtilissima ex ære detrita est, Squama, Stomoma dicta ab ea gente est: quasi in trahenda acie in cote detrita. Squamā æris probaui hic, quæ in Cyprijs ærarijs, &c. Damnauit contra, quæ ἐν τοῦ φαιδον χαλκοῦ ἢ ἐν τοῦ λανθῶν decussa fuisset: non ex malo ære, promiscuoue, ut alij interpretes ueterunt, sed uulgari & uili. Neq; enim malum, promiscuumue æs ea uoce indicatur, sed uulgare, quod omnibus locis inuenitur: ideoq; Cyprio comparatum, nullius, aut exiguæ dignitatis & æstimationis. Sequitur ab hoc loco statim in probatione Squamæ huius participium ἰοϋλινον. Quod alter ex interpretibus ad rubiginē retulit: cum tamen iudicio nostro ad Aeruginem, quæ propria æris est, contrahenda uox illa fuerit. Communis enim metallis omnibus rubigo est, quia ruber sic dicta. Quæ autem in ære concreuit, aceti, aut alterius etiam humoris aspergine, aut halitu, ærugo uiret. Quemadmodum in confectione eius mox dicitur.

D

De Squama ex acie decussa. C A P. LXXXI.

σπομῶν σόμματα

SQuamæ ex acie, aut mucronibus decussæ, quam uocant Stomoma, eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur. Sed ad molien-
dam alui deiectionem inefficacior est.

B A R B A R I C O R O L L.
Stomoma, genus est Squamæ subtilius, ex summa uidelicet lanugine decussum.

De Aerugine rasa. C A P. LXXXII.

ἰόν ἔρσον

AERUGO rasa fit ijs modis. Super doliolum, aut aliud consimile uas aceti q̄ acerrimi, æneum uas, præsertim concameratum, sin minus, planum uersetur: sitq; exterius, nullumq; habeat spiramentū. Exempto uase quo doliolum obturaueris, decimo quoq; die insidens Aerugo deraditur. Aut æris lamina in cadis super acetum ita suspen-

ditur, ne attingat: & totidem post dies raditur. Aut massulae aeris, aut **A** laminæ, uinaceis iam acescentibus conduntur, & simili modo uersantur. Quinetiâ ex delimata aeris scobe æruginem facere licet. Nec nō e laminis, quibus bractee auri conclusæ malleo ducuntur. Si quis eas aceto respargat, & ter aut quater uerset, donec æruginem contrahant. Tradunt æruginē in Cyprijs metallis gigni, lapidibus quibuscūq; nonnihil aeris habentibus, quibus ærugo efflorescit. Adduntq; nōnunq; per caniculæ æstus e quodā specu manare. Sed hoc exiguum, & optimū esse: illud speluncis effluens, copiosum quidē, & boni coloris, sed uitiosum, quod lapides multos collegerit. Pluribus aut modis adulterant. Alij pumice, alij marmore, alij atramentō futorio. Sed deprehēdemus pumicem, aut marmor, pollice sinistrae manus madefacto, & æruginis portæ uinculā in alterū atterente. Siquidē eam diffundi constat. Marmoris aut pumicisq; partes cōeunt non dissipatę, demumq; tractatione crebra & humoris complexu dealbescunt. Quin et dentiū appressū. Siquidē syn cera cedit: leuis, sine asperitate. Atramentū uerō futoriū, igne coarguitur. Namq; si fictile, aut lamina, adulterata æruginē illinatur, & feruenti cinere, aut carbonibus incalescat, mutabit colorem. Atramentū futorium rubescit, quod uisum suapte naturā talem sortitur colorem.

AERUGINE RASILE. **B**ARBARI COROLL.
Ærugo rasilis, quā Græci uocant Ion xystron, minus probatur e squamis. Ocyllime contrahit æruginem coronarium æs. Æruginem maxime Rhodiam adulterant marmore. Deprehendit papyro, galla prius macerato. Nigrescit em statim æruginē illita. Deprehenditur & uisu, maligne uirēs. Ærugo aeris, a Columella est ubi ænea rubigo dicta sit. A Vitruuio Eruca nominatur, eadem quæ rasilis a specie uermiculi eius, ut consilio, qualis Rhodo fingeatur. Ob id & genus alterum æruginis, ut mox liquebit, Scolex appellabatur. Nam & morbus quidam arborum, nunc Rubigo, ut Plinius, nunc Ærugo appellatus est, ut Hieronymus, quem Græci Erythron, Rhodij Erethibon uocant, a colore, ut nos Rubiginem: a quo & Robur dictū sit, quia plurimas huius coloris, quasi uenas habeat.

AERUGINE SCOLECIA. **C**AP. LXXXIII.
Æruginis quam uocant Scoleciā, duo sunt genera. Quædam fossilis est. Altera facticia. In mortario cyprii aeris dimidiam heminā aceti albi acrisq; pistillo cupreo conterito, donec strigmenti crassitudinem imitetur. Deinde aluminis rotundi, salis fossitij, translucen-
tis, aut marini q̄albissimi, solidiq; drachmam unam, aut certe cum nitri pari pondere terito in sole, æstuosissimis diebus, sub sidus caniculæ, donec colore æruginēum, & coagulmēto strigmētosum fiat. Vbi aut se in uermiculorū speciem contraxerit, recondito. Efficax & boni coloris redditur, si duas partes urinæ ueteris, cum una aceti adieceris, & alia quæ dicta sunt peregeris. Sunt qui æruginem rasilem, quæ in apparatu non respondit, gummi misto digerant in formas, & ita uendāt. Quod genus, ut uitiosum improbatur. Fit & quædam ærugo ab aurificibus, mortatio & pistillo cyprii aeris, cum urina pueri impubis, qua aurū fer-

ιδιου κωλλαντος

C ruminant. Antedicta aeruginum genera, usto ari correspondent. Sed magis effectu ualent. Sciendum fossilem Scoleciam præstantissimam esse. Derasam sequi. Postremo loco facticiam. Mordacissima tamen est, & magis adstringens. Aurificum autem Aerugo rasæ correspondet. Aerugines omnes adstringunt, extenuant, excalfaciunt. Oculorum cicatrices emendant. Lachrymas cient. Nomas sistunt. Vulnura ab inflammatione tuentur. Ulcera ex oleo, cæraq; ad cicatricem perducunt. Callos & sordida ulcera purgant, cum melle coctæ. Callum fistularum erodunt, cum ammoniaco, collyrii modo in eas adactæ. Ad gingiuarum autem excrescentias, & extuberationem utiles. Magnopere extenuant genarum crassiciem, cum melle illitæ. Verum post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est. Resina terebinthina exceptæ cum are & nitro lepras abigunt. Vritur particulatim fracta, in fictili patina, flagrantibus prunis superposita. Versaturq; donec se mutet, & colore subcinerefcatur. Postea refrigerata reponitur. Sunt qui cruda olla eam urant, uti dictum est, sed non prorsus eundem colorem cremata contrahit.

B A R B A R I C O R O L.

Scolecia Aerugo fit & per se rasa, ex ærario lapide quem Chalcithin uocant. Nominatur autem Scolecia, siue Scolex, uel quia se contrahat in uermiculos sponte, uel quia fingatur in eos arte. Aristoteles, In Cypro inquit insula, ærarij fornacibus, ubi Chalcites lapis pluribus diebus uritur, uermiculi medio igne quadrupedes, & pennati nascuntur, paulo muscis grandibus maiores, qui per ignem ambulant, & saliant quamdiu ibi sunt, uiuentes: cum euasere longius paulo, moriuntur. Pyralides, siue Pyroti nominantur, uel ut in quibusdam Plinianis codicibus, Pyraustæ.

D Aerugo aurificum, hoc est, Santerna, quæ a Græcis Ios Chrysochoon, & Chryfocolla dicitur, gluten est & ferrumen auri eius, quod argentosum uocant. Signumq; est, si addita ea, nitescit. Ediuerso ærosum contrahit se, hebetaturq; & difficile annectitur. Fit autem id glutinum præter ea quæ a Dioscoride scribuntur, etiam auro & spuma argenti additis, unaq; contritis. Vtrum uero Santerna hæc, an alterum genus intelligatur a Theophrasto, chytos argyros, hoc est, argentum fusile, quum dicat, & mortario, & pistillo æris terendo confici & aceto, nondum liquet. In Santerna certe sola, quid quidem sciam, mortarium & pistillum ex ære cyprio desyderant, sed cum urina impuberis, non aceto. Inuenio & Argentum mentitum, hoc est, Pseudargyron uocari, quod ex lapide quodam usto fiat Anderis, in Troade: itemq; in Lydia prope Tmolium: huic æs addendo mixtura prouenit, Orichalcum a quibusdam appellata, ut Straboni placet. Cæterum Chryfocolla dicitur & panificij quoddam genus, ut in Tritico docuimus. Santernam forasse dictam putæ, quasi Xanthernam: quippe cum legamus Aeruginem hanc a Græcis quædoq; dici Xanthelin, a colore flauo: qualis aureus est. Ob id & Latex diuinus ille, tingendo auro chymistis tantopere quæsitus, plerumq; Ios Xystos, & Aerugo nominatur.

Aerugo ferri, hoc est, rubigo, deraditur humido ferro, clauis ueteribus. Hac Telephum Achilles sanasse proditur: quæquid quidam ex ærea cuspidē factum interpretantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Monstrauit Vitruius suæ Architecturæ libro septimo cum de coloribus ageret, Aeruginis unam tantum confectiōem, eam scilicet quæ secunda huic scriptori est: suntq; eius post conficiendæ Cerussæ disciplinam hæc uerba. Eadem ratione lamellas areas collocantes efficiunt Aeruginem, quæ Eruca appellatur. &c. Vocatq; insecti, & uermis nomine Erucam, quæ cæteri omnes Aeruginem dixerunt. Nec nos scimus, quæ integra in eo scriptore ea uox sit. Aliqui quoniam insecti, quod Græci Campem dicunt, ea appellatio est, Vermicularem illam Aeruginem ex similitudine ab antiquis Romanis dictam eo nomine fuisse existimant: nos tamen, quoniam quam Vitruius Erucam appellari ait, a uermiculari distat, nec aliquid illi simile, aut commune habet, uerum ut diximus, secundum huic scriptori genus facit, confirmare id non audemus: dul-

bitamusq; in Vitrutio male Erucam forsitan legi: uerumq; lectionem, æneam, aut æream esse: quoniam latini scriptores aliqui æruginem nominantes, æneam, aut æream semper addiderunt: ut ex quo metallo æruginem dicerent, certius indicarent. Neq; ab re: quando ut in græcis ἰὸς κομμῆς ad æruginem & rubiginem uox est: sic forte in latinis aliquando fuerit, promiscueq; ærugo in cunctis metallis diceretur, & si priuatim in ære ea uox in usu postea esse tantum coeperit. Coniicimus hæc, non decernimus: eamq; ob causam poterunt arbitrio suo de his legentes sentire. Quo loco deinde hic scriptor ait, fieri idem æruginem ex delimata æris scobe, laminisue illis ἢ πρὸς περιχόμενα τὰ χρυσὰ πτερά λαύεται, &c. nosq; uertimus, quibus inclusa aurea coronarum folia extenduntur: adiecimus nos coronas, quæ nullæ tamē in Diosc. sunt: propterea, qd de his necessario agebatur: nec poterant aurea folia illa aliter, q̃ in coronis intelligi. Quod græci aliquot indicant de coronis agentes: breuissimeq; Plinius dicens. Ocyssime uero contrahit coronarium æs æruginem: illud intelligens, quod in extendendis ex auro bratteolis in foliorum figuram, in usu ea tempestate esset. Quod nunc alia ratione fit. Vitium non multo post signauimus, quo loco scilicet de deprehendendo rasilis æruginis adulterio agitur. Male enim sequax illic sermo est: nec satis (alioquin certa res) patet. Docet enim pumice, aut marmore adulteratam æruginem humore & attritu deprehendi: quorum altero defluit, altero albescit ærugo. Quod in sincera nō fit. Numerantur deinde inter alias uermicularis æruginis uires a Diosc. ἄδερρον ἄνιν, quod est, lachrymas ciere, trahere & ducere: idq; tam manifeste, ut in scriptore hoc intelligi aliter res nequeat. Nescimus tñ nos, q̃ integer locus ille sit: non tam quia Plinius de ærugine rasilis, cui uermicularis non adeo dissimilis est, lib. 3. cap. 11. ait. Vis eius collyrijs oculorū aptissima, & delachrymationibus mordendo pficiens: q̃ quia in oculorum medicina compescuntur, nō pritantur delachrymationes. Erit id medicis diligentius animaduertendum.

De Rubigine ferri.

CAP. LXXXIII.

Rubigo ferri restingit. Sistit sceminarum profluuiā admota. Potuq; præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perq; utilis ad scabricias genarum, paronychia digitorum, & reduuias. Condylomatīs prodest. Gingiuas firmat. Podagras illita lenit. Alopecias replet. Vinum aquaue, in qua cā dens ferrum sit restinctum, potu coeliacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur.

BARBARI COROLL.

Ferrum Græce sideros appellatur: candens hoc, nisi duretur ignibus, corrumpitur. Rubens inhabile est tundendo, neq; anteq̃ albescere incipiat aceto, & alumine illitū sit æri simile. A rubigine uindicatur Cerussa, & Gypso, et Pice liquida. Hæc est temperatura a Græcis Antipathia dicta. Ferunt quidam & religione quadam id fieri.

EX M. VERG. COMM.

Malumus in Ferro ob colorem Rubiginem, q̃ æruginem dicere, ob eas quas non multo ante tradidimus causas. Alioquin idem uitiosus in cunctis metallis euentus est, communiq; uoce a græcis omnium metallorum læuori contraria scabricies uocata est. ἰὸς enim in cunctis metallis uocant, quod uetustate, humore, cessationeue asperitatis & mali coloris illis accreuit. Habent etiam ἰρυσίν qua rubiginem indicent: sed ut nos obseruauimus, in frugibus potius q̃ in metallis. Legentes illud etiam in capite hoc monemus, uidisse nos in græcis, nec negligendæ si dei codicibus, in quibus nulla erat extrema eius pars illa, qua iubetur demergi aqua, uinoque cā dens igne ferrum: &c. Nos tamen ut erat seruauimus, ex quotidiano rei usu, & ex eo quod Celsus monuit lib. 4. capite. 9. inter lienosorum remedia: pro quibus ait, & post cibum aqua a ferrario fabro petitur, in qua candens ferrum subinde tinctum sit.

De Stercore ferri.

CAP. XXXV.

Stercus ferri, quam Scoriam uocant, eadem potest quæ rubigo, sed inefficacius. Aconito ex hydromelite potum opitulatur.

Gg

C Metallorum spurciciam ueteres græci Scoriā uocauerunt: Romani, autōre Celso, lib. 4. capite. 8. Recrementum eam dixerunt. Neq; in metallis modo, uerum in multis alijs recrementū uoce uſi ſunt: ut primo uolumine in Crocomagmate dictū a nobis etiā eſt, Græci in metallis priuatim Scoriā ſuam ſeruarunt.

De Plumbo eloto. CAP. LXXXVI.

πυλινος
μοιςολος

L Otura Plumbi ſic fit. In mortarium plumbeum aquam iniiciens, piſtillo plumbeo terito, donec nigreſcat aqua, & ſucci modo craſſeſcat, aut cœnoſa reddatur. Linteolo deinde colato, aquam infundens: quo facilius quidquid eſt reſolutum incerni poſſit. Hoc facito uſq; dum ſatis habuiſſe uidearis. Vbi confederit, priorem aquam effundens, nouamq; adiiciens, ut Cadmiā lauato, donec nulla extet nigricia. Poſtea in paſtillos cogens reponito. Quidā ſcobem mundi Plumbi lima quæſitam, mortario lapideo, piſtilloq; terunt: aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigreſcat. Mox ubi craſſamentum peſſum ierit, colligunt in paſtillos. Nam tritum uehementer, ceruſſæ ſimile redditur. Alij elimatē ſcobi modicā plumbaginē adiiciunt. Afſirmantes ita elotum Plumbum præſtantius eſſe. Poſſe refrigerare, adſtringere, obſtruere, mollire, explere caua. Siſtere oculorum fluctiones, & ulcerum excreſcentia. Sanguinem ſupprimi. Prodeſt contra ſedis ulcerā, condylomata, & hæmorrhoidas ex roſaceo. Item ad ea quæ ægrecicatricem ducunt. Et in totum ſpodij effectus præbet. Niſi q; non obducit cruſtas. Integrum Plumbum affrictu, marini ſcorpionis, draconisq; plagis auxiliatur.

E X M. V E R G. C O M M.

L Oturam Plumbi Plinius etiā inter latinos. 34. uolumine, cap. 18. adeo ſimilem huic ſcriptori docet, ut alieni decreti potius interpres q; ſui autor uideri poſſit. Niſi aliqua addidiſſet, quibus non uariari rem, ſed certius & aptius tractari aliquis credat. Quale ſtatim eſt quod in eo legitur, cœleſtem exigī aquam: quæ in plumbeum mortarium coniicienda erit, ut plumbeo piſtillo circumacta, mutuo mortarij & piſtilli attritu, plūbi ſubſtantia nigreſcat & craſſeſcat. Quod duo tantum ille dixit, non ut cæteri interpretes addiderūt, donec ſucci modo craſſeſcat, aut cœnoſa reddatur: non animaduertentes quod a Dioſcoride dicitur, unum tantum eſſe χρυδαίνω, id eſt, in limum craſſeſcat: quæ uero ſequuntur, ἢ χρυδαίνω ἢ πικρῶδιω, glosſemata & interpretationes illius fuiſſe, Dioſc. codicibus ab aliquo adiectas, dum uult certius indicare quid χρυδαίνω ſit: quæ deinde ab imperitis librarijs in Dioſc. coaluerint. Idem enim omnes ſignificant: nec Plinius ut diximus, aliud q; donec craſſeſcat, inquit. Quale etiā non multo poſt quo loco hic ait. Quidam purum plumbum lima deterentes in lapideo mortario, lapideo piſtillo reſunt, addidit ille, Thebaico, lapideo. ſ. mortario: ſed ex ea gente lapide, ex qua ad uſum medicinæ mortaria, ut idem Plinius teſtatur, præcipue probabantur. Quod & ſi non multifaciendū forte alicui uideatur, non tamen inutile penitus nouiſſe fuerit. Quemadmodum maiorem diligentiam exigit, qui ſtatim in Dioſc. ſequitur male ſequax, nec certo ſenſu locus: in quo ſpaciū, & in ſpacio uſq; nota relictū a nobis eſt. Cæteri quod uerſimile erat, & rei neceſſitatem ſecuti, locum iudicio ſuo magis q; ex uocibus quæ illic modo legantur expleuerunt. Quod poterunt græca intelligentes uidere. Nobis non uſum eſt alienis noſtra miſcere.

πικρῶδιω
μολυβδίνω

De Plumbo uſto. CAP. LXXXVII.

V Ritur Plumbum ſic. Super tenuiſſimas Plumbi laminas, ſiſtili nouo inditas, ſulphur inſpargito, additiſq; rursus laminis,

interiecto semper sulphure, usq̃dum uas expleueris, succendito. Flagra te autem Plumbo, ferrea rude uersato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilq; non ustum hæserit. Tum demum obstructis naribus, eximito. Alioquin halitus Plumbi noxius sentitur. Aut elimatam scobem in olla cum sulphure urito. Alij laminas in fictili crudo, ut dictum est, imponunt fornaci, aut foco, et circumlinentes operculum, dato exili spiramento urunt. Alij pro sulphure cerussam, aut hordeum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acri igne utuntur, & rudicula ferrea continue mouent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis huiusmodi ustio: & si uehementius uratur, contrahit spumæ argenti colorem. Magis placet nobis prima. Plumbum ustum lauatur ut cadmia, & reconditur. Eosdem effectus habet, quos plumbum elotum, sed multo acriores.

BARBARICOROLL.

Plumbi halitus combusti, canes ocysime interficit, sicut omnium metallorum muscas, & culices; q̃sobrem non sunt ea tedia in metallis. Plumbum crematum, cui cerussa sit admixta pari portione, aut hordeum, Spodio cyprio a medicis præfertur. Retosum Plumbum est, quando uocetur a chymistis Helcysina. Laminis Plumbi ad lumborum renumq; partes adaligatis, fomina Veneris inhiberi prædicant: quod & Caluus orator, & Franciscus Barbarus auus meus fecere. Athletas Galenus eo remedio uti solitos affirmat. Plumbum græci Molibdon uocant. Multum aeris in Plumbo esse argumentum est, quod in statuis aspicitur. Plumbum em qd pedes earum lapidibus ferruminat, & annectit, ita plerumq; intumescit, ut ex ijs lapidibus crystalli modo pendeant uerrucæ. Multa Plumbi genera connumerant chymistæ græci. Marinum fordet, & asperum est. Sabyesium, & Dalmatense nitet, ac molle dicitur. In Sardiniano teneritas, & ærolitas aspicitur.

Pl. li. 14. c. 3.

EX M. VERG. COMM.

Erit opere precium certior adhuc Plumbi cocturam nouisse cupientibus, Plinium. 34. uo lumine, cap. 13. audire. Multa enim quæ desiderari posse nunc uidentur, certius ab eo traduntur. Qualia sunt, cum sulphuri quod Plumbi lamellis inspergendum est, minutum adijcit: iubeatq; trito sulphure ad eam rem uti: & cum, non naribus tantum oclusis Plumbi cinerem tolli, sed spiritus foraminibus: ut os etiam complecteretur, per quod respiratione poterat eadem contrahi noxa. Et cum in fornacem coniectum fictile, in quo Plumbi delinata scobs erit, tam diu coqui uult, donec percoquatur siglinum. Et cum ferro misceri præcipit, præter ferrum, ferulaceis rudibus idem fieri etiam indicans. Nec minus cum cerussam, aut hordea pro sulphure inspergenda pari pondere cum plumbo sumi monet. Multaq; alia eodem modo docet, quibus poterit coctura Plumbi certius tractari.

De Recremento Plumbi. CAP. LXXXVIII.

Recrementum Plumbi, quod Scoriam uocant, optimum est desum, fractu contumax, cerussam plane representans, nihil plumbosi habens, quod ad mali colorem accedit, & uitri splendorem imitatur. Eadem quæ plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ luteum colorem duxit. Idq; sæpius, dum recrementum absumatur. Dein quod subsidit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos.

EX M. VERG. COMM.

Monstrante id Celsi Romani sermonis candido autore, græcorum Scoriam Recrementum diximus. Locus in eo est quinto suæ medicinæ libro capite. 18. cum ait. Plumbi recrementum Scoriam molibdu græci uocant. Quid autem in metallis scoria & recrementum sit, satis non multo ante in Ferro dictum a nobis fuit, Plinius eodem quo in coctura plumbi diximus loco

Gg ij

C de Scoria, sed angustius q̄ hic agit.

modi Coloudi
xibor

¶ De Molibdoide lapide. CAP. LXXXIX.

Molibdoides lapis a plumbi similitudine dictus. Correspondentem recremento uim habet, & eodem modo lauatur.

Lapis plumbarius, hoc est, Moliboides, differt a Molibdœna, hoc est, Plumbagine, ut statim constabit.

BARBARI COROLL.

¶ De Stibio. CAP. XC.

Stimmi optimum quod splendissimum est, modocq̄ nitedularum semicat, contractu crustosum, nihil terræ aur sordidi habens, friabile, quod Stibi appellant, alij Platyophthalmion, alij Larbason, alij Gynæcion, alij Chalcedonion. Vis eius adstringere, obstruere, refrigerare, excrementa in carne cohibere, ulcera ad cicatricem perducere, sordes et ulcera oculorum expurgare. Sistit & sanguinem e cerebri membrana profluentem. Et ut in uniuersum dicatur, uis usto plumbo similis est. Priuatim ambusta igni, in crustas erumpere non patitur, cum adipe recenti illitum. Crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cæra & exigua cerussa. Torretur adipe circumlitum & carbonibus obrutum, donec carbunculetur adeps. Exemptumq̄ restinguit mulieris lacete, quæ marem peperit, aut uetere uino. Vritur etiam carbonibus fucensis efflatum, quoad flagret. Si enim paulo magis concremetur, plumbum fit. Lauatur ut cadmia, & æs. Sunt qui ut plumbi recrementum eluant.

Pli, li, 33, ca. 6.

BARBARI COROLL.

D

Stimmi, nos Stibium, & Stibi dicimus, in argenti metallis inuenitur, spumæ lapidis candidæ nitentisq̄, non tamen translucentis. Aliqui Alabastrum uocant, Alabandum, & Alabandicum Aetius. Duo eius genera. Mas horridior, scabriorq̄, & minus ponderosus, minusq̄ radians: & arenosior foemina, quam magis probant: nitet friabilis scissurisque, non globis dehiscens: Platyophthalmion uocatur, quia dilatat oculos, Gynæcion, quia mulieribus obseruiat, cilia tinguentibus, semiorbesq̄ pingentibus. Vnde scitum illud, geometriam exercere foeminas in cilio, præsertim in Hispania. Hippocrates certe Stibium significat, ut Galeno placet: aut crustas in eo inuentas, quæ Tetragonum in medicina nominat. Democritus Stibium nisi locis distinguat, Italicum, & Chalcedonium prodendo. Quidam non adipe utuntur coquentes, sed fimo bubulo. Habetur & Stimmi cognomento Regis Alexandri: sed compositio medicamenti ea est ad oculos, Rhyadas, hoc est, qui delachrymationem arcere non possunt, quoniam per maxillas defluat.

EX M. VERG. COMM.

Stibium hoc est, quod in medicinæ usum a ueteribus inuentum, corruptis moribus paulatim ad formæ lenocinium concessit: cum natiuo decore non contentæ mulieres, ad fucum & amoris illecebras abuti eo inceperunt. Auditur pro muliebri fucō ea uox aliquando in sacris hebræorum literis, cum præcipitur, ne stibio depinxerit aliquis oculos suos. Quam uocem igno-
rantes aliqui, a stoebe, quæ huic scriptori herba est, Stibium dici & fieri crediderunt: cum tamen in Plinio, & Celso nihil aque notum sit: tradideritq̄ Plinius. 33. uolumine, cap. 6. principalem illi usum circa oculos esse: ideoq̄ Platyophthalmion uocari, quoniam eos dilatat, eorumq̄ fluctu-
ones & lippitudines inhibeat. Et quoniam in cura decoris & formæ eo mulieres utebantur, uocem istam, id est, muliebrem etiam dici: & si adiectiuo illi potuisse quondam coniungi substantiuum aliquod nomen, suspicari aliquis possit: Verbi causa, fucū, pigmentum uel, aut simile aliud quod-
piam. Possunt desiderari alia etiam, quæ multa Plinius quo diximus loco longius tradit, uocentibus in eo scriptore cognoscenda.

De Molibdena, siue Plumbagine. C A P. XCI.

Molibdena optima est flaua, argenteæ spumæ æmula, modice splendens, cum teritur ruffa. Cocta cum oleo iocineris colore trahit. Vitiosa est quæ aërem, aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quædam fossilis, iuxta Sebastiam & Corycum inuenta. Quo in genere probatur quæ lapidosa non sit, aut recementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut cremæ to plumbi similem. Vritur, lauaturq; eodem modo. Miscetur conuenientissime medicamentis, quæ Liparas uocant, atq; emplastris minime mordentibus. Carnem recreat, & ulcera ad cicatricem perducit. Glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

BARBARI COROLL.
Molibdena, hoc est, Plumbago, quam & Galenam uocamus, communis est plumbi, & argenti uena. Commendantur friabiles, & modice ponderosæ. Quæ sint fossiles, metallicas appellant. Laudatissimæ quæ in Zephyrio fiant. Sunt qui Molibdenam inter spumas argenti collocant. Fossilis Molibdena est, & ad uicum Ergasteriam uocatum, inter Cyzicum, & Pergamum octo & quinquaginta millibus a Pergamo distantem. Nominatur & Molibdena, id est, Plumbago herba Plinio, contra serpentes, etiam in aruo, folio lapathi, crassa radice, hispida: quæ cō manducata, si oculis subinde religetur, Plumbum, quod est, genus uitæ, ex oculis tollit.

EX M. VERG. COMM.
Galenam his terue trigesimo tertio & quarto suæ historiæ uoluminibus græcorum, metallicam Molybdenam Plinius uocauit: nō tam ut a Molybdena Plumbagineq; sui generis herba, quam. 25. eiusdem historiæ uolumine, cap. ii. priuatim Plumbaginem dixerat, alia appellatio ne fecerneret: quia scribente eo suam historiam, hæc erat priuatim metallicæ Plumbaginis appellatio, ab Hispaniæ Galecia, ut credimus, facta, in qua celeberrimæ quondam metallorum ferre omnium fodinæ fuerunt. Quæ quoniam nostrâ ætate nulla est, nec habet ea uox aliquā nūc significationis æstimationem, impune, & sine inuidia relicta a nobis fuit: præsertim in re quæ ex substantia suâ certius indicanda erat. Plumbago ob eam causam Molybdena hæc dicta: & ne cū herba misceretur, ex metallo nota illi adiecta est. Herbam quo diximus loco Plinius manifeste Plumbaginem uocauit: causamq; addidit: quoniam si commanducata oculis subinde religet, Plumbum quod est in ea parte uitæ genus, tollat. Metallum toto hoc capite Diosc. nihil simile communeue cum herba habens, quæ in Plumbi nomen & honorem ex usu tatum recepta est: id autem ex plumbi substantia iustius Plumbaginis nomen inuenit. Gigni hæc ex auro & argento hic scriptor ait: quale autem id sit Plinius ostender, adherescere dicens argenti & auri fornacibus. Ostender itidem plumbi uenam esse Plumbaginem: multaq; alia, quæ nos breuitati cōsulentes, relinquimus in eo scriptore nouisse ea uolentibus exposita. Fit quod nouerunt metallici, Plumbago alterius metalli, argentiq; præsertim coctura: quodq; excrementum ex his plumbosum fuerit, Plumbago ueteribus fuit. Verumtamen fossilis eadem quondam inueniebatur ad Coryci, ut nos uertimus, Sebastiam, in Asia tunc notissimam regionem: cui Corycum hic adiecit, ut a reliquis quæ diuersis regionibus Sebastię urbes & oppida tunc audiebantur, separaret. Fuit enim frequens id quondam nomen: numerabaturq; in Armenia Sebasie ciuitas, numerabatur in Iudæa, numerabantur & alijs locis aliæ: omnes in Romanorum Caesarum gratiam sic dictæ. Quas enim Augustas Germania, & Hispania nominauerunt, eas græci Sebastas, & Sebastias dixerunt. Est enim Sebastion græcis idem quod Romanis Augustum. Intelligitq; hic scriptor κατὰ τὴν ἀρχαίαν καὶ καθ' ἑκαστὴν ἐπισημομένην dicens, Coryci Cherfoneum hoc nomine quōdam in Asia sic appellatam.

De Recremento argenti. C A P. XCII.
Recrementum argenti, quod Scoriam uocant, aut Helcysina, aut Encauma, molibdenæ uim habet. Quare emplastris quæ phlegmas appellant, additur, ac medicamentis quæ cicatricem obducunt, utpote

Gg iij

C te cum adstringat, extrahatq;

E X M. V E R G. C O M M.

Coniunctum natalibus plumbagini argenti recrementū est: ideoq; paulominus q̄ cōtinuata historia a Dios. doceat. Fit enī ex argento utrūq;. In scoriis metallicisq; recrementisq; omniū genere, solum argenti recrementū priuatim Helcysma græcis dictum est. Testatur id Plinius. 33. uo lumine, cap. 6. his uerbis. Scoriā in argento græci uocant Helcysma. Testantur idem græci latiniq; omnes: nec aliunde q̄ ab extrahendi ui quam habet, factum illi nomen est.

De Spuma argenti.

C A P. XCIII.

αυθδργυρε

Spuma argenti quædam gignitur ex harena, quam Molibditin uocant, in fornacibus conflata, donec perfecte incandescat. Altera ex argento. Tertia ex Plumbo. Probatissima est Attica. Secunda Hispaniensis. Has sequitur quæ fit Dicæarchiæ, id est, Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia. Plurima enim hisce locis e flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, Chrystitis appellatur, melior cæteris. Quæ in Sicilia, Argyritis. Quæ ex argento, Calabritis, Vis autem adstringere, mollire, explere caua, excrescentia in carne reprimere, ad cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur Argenti Spuma, confractis partibus ad magnitudinem iuglandium, ita accensa folliibus. Abstergitur infidens spurcicia, & reconditur. Aliqui quater aceto, aut uino restinguentes, iterum urunt & eadem prosequunt, reponunt. Lauat ut cadmia: ut Argyritidi nominatæ, aut si desideret, alteri cador detur, ea in parteis magnitudine fabarum confracta, choenicis attice mensura, fictili nouo superfusa aqua, adiectis candidi tritici quatuor sextarijs, priuatimq; pugillo hordei, linteolo raro auribus uasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum dehiscat. Deinde omnia in nouum craterem oris ampli transfunduntur. Triticum abijcitur. Spuma argenti uehementer manibus affricando, aqua lauatur, assiccataq; in thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua, donec dissoluatur. Excolata aqua, iterum tota die teritur, & uesperis infusa calida aqua sinitur. Mane colis excernitur. Alia infunditur, atq; ter die excolatur. Id septem diebus fieri solet. Postea additis ad singulas minas Spumæ argenti, quinīs salis fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter in die teritur, & addita aqua excolatur. Cumque inalbuerit, calida infunditur, dum nullam prorsus salsedinem resipiat. Demum ardentissimo sole siccata, eiectione prius humore, reconditur. Sin minus, mina Spumæ Argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile notum conijcitur. Aqua infunditur, ita ut superemineat. Mouetur quotidie mane & uesperis, aquaq; superinfunditur, priore nequaquam effusa. Hoc fit triginta diebus. Namq; nisi moueatur, crassescit usq; in duriciē teste. Post hæc effusa leniter muria, in thebaico mortario Spuma argenti teritur: cōiectaq; in fictile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum salsedinis indicium præbeat. Deinde quod

ex argenti Spuma candidum apparet, in uas aliud transfertur, & redactum in pastillos, plumbea pixide conditur. Alij Spumam argenti in fabarum magnitudines contractam, in uentre suillo crudo ex aqua coquunt, dum uiscus eliquecat, exemptamq; cum sale pari terunt, & ut supra dictum est, lauant. Sunt qui salis libram unam, & Spumæ argenti tantundem in sole terant, aqua continue mutata, dum candor ei detur. Alia ratio. Sumito quantam uis Argenti Spumam, ubi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium, repurgatarumq; decoquito. Cumq; fabæ disruptæ fuerint, lanæq; dealbuerit, exemptam Argenti Spumam, & altera lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquæ & parem fabarum modum adiiciens. Eadem tertio quæ supra, facito. In summa, tantisper dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortacium, ad singulas salis fossicij libras adjicito octogenas Spumæ Argenti drachmas atticas, & terito, intermittensq; nitri q̄p albißimi cum aqua diuisi, drachmas quadraginta septem indito. Iterum terito, donec satis candoris contraxisse uideatur. Ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi confidere desierit, colato. Vicissim eadem prosequere, dum pura aqua dulcisq; effluat, & nullam falsedinem præ se ferat. Postremo in fictile nouum translata, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus, sub caniculæ sydus exponito, & siccata utitor. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum sceditates tollendas, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasq; & macularum plenas.

BARBARI COROLL.

Spuma argenti, hoc est, Lithargyros, distat a Scoria, quo a fæce spuma. Lithargyros, purgatissimæ materiæ uisum est, Scoria purgatæ. Tria Spumæ huius gēa nostri habent, Chrysium: quæ fit ex ipsa uena, & est optima. Secundam Argyritin ex argento. Tertiam Molibdiin, plumbi ipsius rufura, quæ fit puteolis: & plerūq; omnes hi colores, in eisdem tubulis inueniuntur. Quidam duo genera eius nouerūt, quæ uocant Stelerythida, & Peumnenen, tertium Molibdenam: de qua diximus. Omnis autē Spuma, fit ex cocta sua materia, ex superiore catino defluens in inferiorem: eo sublata uerruculis ferreis in ipsa flamma conuoluitur uerruculo, ut sit modici ponderis. Est autē, ut ex ipso nomine intelligi potest, seruescentis, & futuræ materiæ Spuma: fert Argpyrolithos a Lithargyro, ut in lapide Selenite diximus.

EX M. VERG. COMM.

Operosa græcis, ut uidetur Lithargyri sui confectio fuit: licetq; præter argentū ex plumbū etiā fieret, a meliore tamē metallo nomen seruauit. Compositaq; ex argento & lapide appellatione, ex qua præcipue fieret, substantiā græci indicauerunt, Lapidem, uenam eius metalli intelligentes: quæ conflata igne, ut in coctura omni fit, eam ueluti Spumā redderet. Latini cocturæ eius euentū, & quod ex ea fieret contemplati, eiusdem metalli seruato nomine, Spumam argenti uocauerunt. Fuitq; non Plinio tantū, sed cunctis alijs Romani sermonis primis auctoribus, in indicanda re hac propria & quotidiana ea uox. Nec dubitandum alicui est, non esse latinis argenti Spumam, quæ græcis Lithargyros est. Vnusq; satis in ostendenda re Plinius erit, qui, 3. suæ historiæ uolumine, capite, 6. omnem Spumæ huius confectionem, discrimina, appellationes, cocturam, loturamq; & usum similiter huic docuit, Argenti Spumam semper appellans. Eritq; scriptorem eum legētib; in tota hac re non parū operæ precium. Multa enim angustius ab hoc scriptore dicta certius audient: & ex his quæ aliter ab eo traduntur, suspicari in Dioscoride male forsitan legi aliqua poterunt.

C Cerussa fit hoc modo. Infuso in urseum oris lati, aut fictile labellū
 q̄acerrimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculū,
 subiectā prius arundinea tegete, firmato: superiectisq̄ uelaminibus, ne
 halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq̄ deciderit, humo-
 rem purum ad summa delatum colato. Crassamentumq̄ transfundito.
Debet quoq̄ siccare in sole, mox trusculi mola teri, alioquin tritum cri-
brari. Postea quod superest duri, in tenues partes redigendum, cribran-
 dumq̄. Vicissim eadem tertio, quartoq̄ facienda. Melior quæ primo
 cribrata est, & medicamentis oculorum assumenda. Secundum locum
 tenet sequens, & reliquæ suo ordine. Nec defunt qui ligneam rudem in
 medio uase appendant, & supra cratem plumbum imponant, ita ut ace-
 tum non contingat, inditocq̄ operculo circumlinentes dimittunt. Post
 dies aliquot, laxato obturamento uisunt. Cumq̄ resoluta materia fue-
 rit, reliqua ut supra diximus exequentur. Si autem quis in pastillos uelit
 digerere, aceto acri subacta diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Ae-
 state tamen supradictum opus obeundum est. Ita enim candida atq̄ effi-
 cax redditur. Quinetiam hyeme paratur, urseis supra furnos, balnea, aut
 fornaces impositis. Ascendēs enim calor, idem quod sol præstat. Lauda-
 tissimam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedemone. Proximā Pu-
 teolis. Torret hoc modo. Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, ma-
 xime attico, tritam Cerussam imposito, & assidue uersato. Cumq̄ cinere
 um colorē traxit, eximēs refrigerato, & utitor. Est & aliud uerendi genus.
 Trita patinis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec
 similis sandarachæ fiat. Extractaq̄ ad usus ministratur. Quæ uero ita pa-
 rata est, Sandyx a quibusdam dicitur. Lauatur Cerussa cadmiæ modo.
 Vis ei adstringere, occludere, emollire & explorare. Insuper excrecentiæ
 primere, & ad cicatricem perducere. Miscetur cæratīs & emplastris quæ
 liparæ uocantur, pastillisq̄. Est autem lætalis eius potus.

Pli. li. 74. ca. 19.

B A R B A R I C O R O L L.

C Cerussa, hoc est, Psymithion, colos est e candidis. Fuit & terra per se in Theodoti fundo
 Smyrnæ, ad nauium picturas ueteribus: de qua tamen in terra Melina differendum nobis est.
 Nunc omnis Cerussa ex plumbo & aceto fit. Sandyx uero ex Cerussa, si torreatur æqua por-
 tione rubrica admixta. Q̄q̄ Virgilius herbam uidetur intellexisse uersu illo,
 Sponte sua Sandyx, pascentes uestiet agnos.
 Si Plinio, et Seruio grāmatico credamus, qui herbā dicit esse Sandycem, ex qua Sandycinus
 color fiat. Quidam pro colore ipso acceptā a poëta Sandycem existimant. Preciū Sandycis in
 libras asses bini, & semis, hoc est, dimidiū eius quod Sandarachæ. Paulus Sandycē, et Siricon,
 & Sericon uocari scribit. Syricon Aetius, & Plinius; hinc hodieq̄ Mauritani Sarcon eam no-
 minant. Syricū inquit Plinius, facticius est colos, ex Sinopide ac Sandyce mixtis, quo Miniū
 subliniū, adulteraturq̄. Nam Scyricū, aliud genus est, ut in Ceruleo notauiimus.

E X M. V E R G. C O M M.

D Ant gentibus Cerussam plumbariæ officinæ. Conficiuntq̄ eam huic scriptori eodē mo-
 do Plinius & Vitruuius: alter historiæ naturalis, 74. uolumine, capite. 15. alter suæ architectu-
 ræ, 7. cōmentario. Laudantq̄ ambo, & cunctis alijs præferunt Rhodiam: non tamen bonita-

tis eius censum per gentes ultra faciūt. Hic diligentior, & humanæ salutis certius, & ex professo consulens, post Rhodiam Corinthiam & Lacedæmoniam, & ab his quæ Campaniæ Dicæarchia conficiebat, numerauit. Nec aliquid legentibus in Cerussæ confectione desyderandū reliquit, quæ dierum numerū, quo operculatum & circumlitū uas illud dimittendum sit. In prima si quidem confectione, donec solutū fuerit plumbum. In secundā, *ἡ μισρὸν ἀφαιρῶν*. &c. Quā partem deficienti dierū numero, post aliquot dies, nos uertimus. Poruit quidem numerus ille huic scriptori librariorum incuria perisse. Verumtamen Victruuus etiā nullo temporis certo decreto spacio (post certū enim tempus tantū ait) quæ a Dioscoride incerta relinquuntur confirmasse uidetur: esseque tempus id, cum solutū fuerit plumbū. Plinius rem certius tractans, *his uerbis rem docet. Fit & alio modo, addito in urceos aceti plumbo obturatos per decem dies*. Credimusque nos, & paulominus quæ pro comperto testamur, diebus scriptoris huius adijciendum esse denarium Plinij numerum. Inconcinnus enim, & scriptore hoc indignus sermonis ductus ille est. Neque enim *ἡ μισρὸν* aliud, quæ post dies, significat. Quæque a nobis, & ab alijs indefiniti numeri uox, aliquot, addita est, ad concinniorē sensum, & maiorem rei certitudinem addita est. Quemadmodum a principio capitis etiam, cum diximus (uentricoli id uasis genus est) græcorum Gastram certius indicantes, & uasis in medio tumentis formam ostendentes, quæ olearii urcei nostra ætate passim uidentur. Quod Plinius intelligēs, urceos in hoc ipso usu sæpe appellauit. Quā deinde hic *μακροτέρῃ πλίνθιν* imponendam uasis ori dixit, Barbarus communem eius uocis æstimationem secutus, laterem plumbeum imponi iussit. Alter aptius, laminam plumbeam. Nos tegulam, cetiore adhuc, ut credimus similitudine, & græcæ uocis seruata significatione. Si quidem *πλίνθιν* appellatione laterem quidem plerumque, aliquando tamen omnē in ædificio necessariam siglinam, lateres scilicet, imbrices, tegulas, & si qua in hoc genere alia sunt antiquiores Græci uocauerunt: & ex tegularum similitudine hic plumbeam Plinthus dixit uasi huic superponendam esse, cuius patentius os lateris unius latitudine totū tegi non poterit. Quinetiam in columnis architecti Plinthus nominauerunt, quod in earum basi spiris subiacet. Vtque in superiore capitulo Abacus, sic in inferiore basi Plinthus est, ex æquata latitudine ueluti tabula. Sunt & alia his similia in reliquo capite, quæ nobis & alijs eadem non sunt, legentium diligentia & censura relicta.

De Chrysocolle.

CAP. XCV.

B

CHRYSOCOLLA laudatissima Armeniaca, colorem Porri quæ simillime reddens. Secundum locum sibi uendicat Macedonica: & proximum Cypria. Quo in genere præfertur pura. Damnatur quæ terram, aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est. Tusam infusa aqua, mortario ex passa manu ad pilam uehementer fricato, & statim quæ confederit colato. Alteram infundens aquam, rursus terito. Hæc uicissim prosequere, donec pura, synceraque spectetur. Dein siccato in sole, & ad usus recondito. Quod si urere uolueris, ex ea terens quod satis esse uidebitur, patinis supra carbones adponito, & alia facito quæ supra diximus. Dos Chrysocolle ad purgandas cicatrices. Excrecentem carnem coercet. Adstringit, purgat, excalfacit, & modice corpus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ uomitiones concitant, & necem inferre possunt.

BARBARI COROLL.

Chrysocolle, humor est in puteorum scrobibus, per uenā auri canaliculis defluens, crassescens, limo rigoribus hybernis, usque in duriciā pumicis. Laudatiorē eandem in ærarijs metallis, & proximā in argentarijs fieri compertum est. Inuenitur & in plumbarijs, utilior etiam auraria, Macedonicam Democritus æris similem ærugini describit. In omnibus autem istis metallis fit, & cura multum infra naturalem illam, immixtis in uenam aquis leuiter hyeme tota, usque in Iunium mensem: dein siccatis Iunio, & Iulio: ut plane intelligatur nihil aliud Chrysocolle, quæ uena putris. Natiua duriciā maxime distinguit, Vuam uocant: & tamen illa quoque herba quam Luteam appellant, tingitur. Natiua est, quæ lino, lanæue ad succum bibendum tundi-

Χρυσocolλα

Pli. li. 53. cā. 5.

D I O S C O R I D I S

Cur in pila: deinde tenui cribro cernit: postea molitur. Demum tenuius sic cribratū, quicquid non transmeat, repetit in pila: & iterum molitur: pulvis semper in catinos digerit, ex aceto macerandus, ut omnis duricia soluat, ac rursus tundit, dein lauat in concis, siccaturque. Tum tingit Aluminis fissili & herba supradicta, pingiturque: antequam pingat, nisi rapiat colorem. Addunt & Scythum, & Turbysum. Ita uocantur medicamenta sorbere cogentia. Cum tinxere pictores, Turesobolē uocant, Medici Acefina, quæ non sit tincta. Duo eius genera: pictoribus luteæ, quæ seruatur in lomenta: & liquide, globulis sudore resolutis. Vtrūque in Cypro fit. Alij tribus eam generibus distinguunt. Asperam, quæ taxat in libras septem. Mediā, quæ denarijs quinq; attritam, quā & Herbaceā uocant, quæ tredecim. Luteam porro dictā putant, ab herba cognomine, a qua etiā adulteratur. Et em Ceruleo uiridius sublimata, & pro Chrysocolle inducitur, nililissimi generis, fallacissimi. Creta æstimatur festitijs in libras. Nouitius est & anularius, sed candidus, quo muliebres picturæ illuminantur ex Creta, & ipse admixtis uitreis gemis ex uulgi annulis, unde & nomen. Chrysocolle in Hispania copiosissimā haberi narrat. Sublinunt autem arenosam, priusque inducant atramentum, & paretonio. Hæc sunt tenacia eius, & colore blanda. Paretonium quoniam est natura pinguis, & propter leuorem tenacissimum, atramento inspergit: ne paretonij candor pallorem Chrysocolle afferat. Strauit Chrysocolle speculaculis circi arenā princeps Nero.

E X M. V E R G. C O M M.

Dvplex antiquis Chrysocolle fuit, si Plinio in latinis, in grecis uero eius generis medicis credendum est: Altera, quæ in cunctis fere metallis, laudatior tamē in ærarijs inueniret. Altera, quæ ut grecorum scriptores docent, rubro ære, & impubis pueri urina: ut autem Plinius monuit, Cypria æruginē, & eiusdem pueri urina addito nitro temperaretur. Hanc aurum operibus inducentes, agglutinando auro necessariam sibi uendicauerunt, ab hoc usu nominatā existimantibus cunctis. Siquidem nihil Chrysocolle uox aliud, quam auri glutinum indicat. Metallicam contra illam medicam sibi seruauerunt. Naturalem, per uenas auri defluentem, crassescente limo hybernis frigoribus usque in duriciem pumicis, de qua tantum hoc capite agitur: indeque facto nomine. Quamuis ut antiquiores omnes testantur, laudatior in ærarijs metallis fluere: proximaque illi in argentarijs: postrema autem in plumbarijs, quæ auraria priore illa uisior etiā esset: & nihilominus nomen illi ex auro factum est: ob precium, bonitatesque alias, deferentibus auro hunc etiam, ut credimus, honorem gentibus. Nihil metallicam Chrysocolle peritiores aliud esse tradiderunt, quam humorem per puteos metallorum defluentem, qui frigore, ut premonstratum est, in pumicis duriciem duret. Nec minus cura etiam fiat, sed multo infra naturalem illam, immixtis per metallorum uenas aquis leuiter tota hyeme usque in Iunij mensē: dein eo tempore siccatis, ut plane intelligatur, putrem metalli uenam esse Chrysocolle, colore uiridi: ob quam causam hic primū laudauit, τὴν χρυαὴν κατακόρως

Dπρασινοῦσαν, quod redditum a nobis est, usque ad satietatem uiuentē. Satiatē intelligētibz, quod ab undet, & ex copia facto fastidio minus placeat. Nec ultra id quicquam adiecimus, totidem huic scriptori uerbis rem ostendentes. Ceteri interpretes quæ ab eo non dicunt, plerumque addiderunt. Alter ad Porri colorem contracta re, ratus πρασινοῦ uerbum, quoniam grecis πράσινον Porri sit, eius oleis colorem tantum indicare: cum tamen omnem uiredinem eo uerbo greci indicent: hoc uno ut cetera omittamus, indicio, quod πρασινοῦ in hortis uocat ea gens, cōstitas oleribus, ideoque uiuentes areas. Alter ex Plinio longius, quam oportebat rem descripsit: qui. 33. uolumine, capite. 7. Chrysocolle huius bonitatē indicans, ait. Summa commendationis est, ut colorem herbarum segetis letæ uiuentis, quam simillime reddat. Quæ tota, τοῦ κατακόρως πρασινοῦ in scriptore hoc summa est. Potuit ille sui auctor, non alieni operis interpret, qua magis placuit ratione, quod scribebat docere. Interpretem contra auctoris sui uestigijs inherere oportuit: ne frustra cogere aliquando herbam, & uiuentem letas segetes, quæ nullæ in scriptore hoc sunt, aliquis querere. Hæc est Chrysocolle illa, qua Romanæ historiæ scriptores, stratum a Nerone circum maximum dixerunt, qua die concolori panis no aurigaturus esset. Bonitatis Chrysocolle censum per nationes aliter Plinius, quo diximus loco tradidit. Reliquit enim Cypriam: & pro ea largissimā in Hispania inueniri ait. Victruius septimo suæ architecturæ libro, pingendis parietibus, forte utiliore solā Macedonicā laudauit. Verba eius sunt. Chrysocolle apportatur a Macedonia. Foditur autem ex his locis, qui sunt proximi ærarijs metallis. Quotidianus & multus fuit quondam in pingendis tridinijs, cubiculis, & porticibus Chrysocolle usus: quoniam sylvarum, & uiuentis agri modo oculis color eius blandiret: quemadmodum nunc etiam, sed alio colore, uiridi scilicet creta, passim fieri uidemus. Quod superest, unum adhuc monebimus: contra aliorum æditiones a nobis redditum, quo loco scilicet hic ait, habere Chrysocolle δρύακιν σμυκτικόν, ut fere in cunctis legitur, δρυλόν, quæ uox cicatricū, significat. Ideoque ab illis, Valer cicatrices exterre, et ad purgandas cicatrices, locus red-

ditus est. A nobis autē, ad extergenda ulcera, cōtracta res fuit. Habuimusq; in ea diuersitate au-
ctores, ueterū primo & meliorē codicū fidem; in qbus ὑλκων, id est, ulcerū, non δολων, id est, ci-
catricū legitur. Mox Paulū Aeginetam. 6. suae medicinae libro restatū, ὑλκωσιν κακοῦσθαι ἀρμόδιον,
id est, dolosis et maleficis ulceribus accommodatam esse. Et si recipiendū sit, quod quadamtenus
simile fuerit, Pliniū etiam qui eodem loco ait. Vfus Chrysocollae, & in medicina est ad purgan-
da uulnera, non adeo dissimili ulcerum & uulnerum natura euentuq; : ut non possit hoc etiam
ueluti teste, quod dicimus confirmari. Adijciemus praeterea, ne suspiciones nostras etiam relin-
quamus : non penitus ab re forsitan fore cicatrices legi, non tamen simpliciter, sed oculorum.
Quoniam idem eodem loco Plinius dixerit, Miscetur & collyrijs ad oculos cicatrices. Quod
si recipiendum sit, perisse oculorum uocem eo loco constituendum erit. Verumtamen nulli-
bī in graecis inuentis oculorum cicatricibus aliquibus, & in probatoris fidei inuentis ulceri-
bus, accedente Pauli testimonio, in ancipiti illud elegimus.

De Armenio lapide.

CAP. XCVI.

ARME^NI^VS lapis praefertur laeuis, colore ceruleo, per-
æquabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem quae Chrysocol-
la praestat, sed inefficacius. Quinetiam usum habet ad pilos in palpe-
bris alendos.

BARBARI COROLL.

ARmenius, siue lapis Armenius, & Armeniacus, inter colores floridos uocatos deponitur.
Sunt autē Colores floridi, q̄s dominus fingenti p̄stat, Minius, Cinnabaris, Chrysocolla, Indicus,
Purpurissum. Ideo em q̄ preciosi sunt, legibus excipitur, ut a domino, non a redēptore reprae-
sentent. Ceteri austeri nominant. Armenia hūc mittit. Lapis est Chrysocollae modo infectus :
optimūq; est quod maxime uirer, cōmunicato colore cum Ceruleo, in libras tricenis quondā
numis. Nunc inuenta per Hispaniā arena, quae similem curā recipiat, ad denarios senos uilitas
redijt. Distat a Ceruleo candore modico, qui teneriorē Armenio colorem efficit. Differt sine
dubio ab Armenio, ea gleba quā Bolon armeniam uocamus, dicendam inter Cretas.

EX M. VERG. COMM.

Mittebat quondā Armenia sui nominis lapidem hūc, Chrysocollae modo is infectus erat,
colore maxime uiridi, sed cum Ceruleo cōmunicato. Idq; est qd hic ait, καὶ τὸ χρῶμα κυανὸν ἐ-
μαλόντε. Vertimusq; nos, in quo ceruleus color aliquis est, & aequaliter cōmunicato sibi eo co-
lore splendet. Meminit Armenij Vitruius etiam libro septimo, sed ut doceret tantū, quem
in architectura, & pingendis parietibus usum quondam habuerit.

De Cæruleo.

CAP. XCVII.

CAerulei origo ex ærarijs metallis in Cyp̄o. Copiosius ex ha-
rena littorali, secundum quosdam sub cauatos specus maris in-
uenitur, quod magis probatur. Eligi debet merum. Vritur ut Chalcitis.
Lauatur ut Cadmia. Vim habet reprimentem, & modice erodentem.
Crustas gignit, & exulcerat.

BARBARI COROLL.

Ceruleum, siue lapis Ceruleus, hoc est, Cyaneus a Theophrasto, Galenoq; Cyanos mal-
culino & fœminino genere pronunciat. In argenti & auri metallis fit, sicut & Sil: de quo prius
ut agatur, cōmodius est. Color Sili, ut Ochrae luteus : qui tamē cremato Sile marmoroso, ace-
toq; restincto, abit in purpureum: quod nos experti sumus, & testantur Vitruius, atq; Plini-
us. Optimū Sil, quod Atticū uocatur. Preciū in pondo libræ. 22. Proximū Marmorosum, quo
tantū utuntur ad abacos: quoniam marmor in eo resistit amaritudini calcis. Hoc subdimidio
Attici precio est. Tertium genus est pressum: quod alij Scyricum uocant, ex insula Scȳro, iam
quidem & ex Achaea, quo utunt ad picturę umbras. Cuius preciū sextertij bini, uel octoni. At
quod uocatur Lucidū, uenit e Gallia, precio Scyrici dupondijs detractis, quo & Attico utun-
tur ad lumina. Effoditur & ad uigesimalū ab urbe lapidem in montibus: quod quidem crematū
adulterū est pressi. Deprenditur amaritudine, & quoniam resolutū est in puluerem. At Ceru-
leum non limus, sed lapis, & harena est. Huius genera tria ueteribus fuerunt. Aegyptiū, quod
ad syncera, meracq; lomenta maxime probaretur, Scythicum, ad dilutiora : & enim hoc di-

ἐρμύριοι λίθοι

Pli. li. 35, ca. 6.

B

κυανός

Pli. li. 35, ca. 13.

Cui facile. Cumq; teritur, in quatuor colores mutatur, candidiorem, nigriorem, crassio rem, tenuiorem. Quod hoc Ceruleo in commune Theophrastus, non Scythico solum tribuit. Tertium quod & præferebat Scythico, Cyprium. Adulteratur autem Aegyptium, ut idem Theophrastus ait, quodam genere, idq; in gloria regis Aegyptij adscribit, qui primus tinxit. Alio loco Plinius hæc tria Cerulei, siue Cyanei fastigia, Aegyptium, Scythicum, et Cyprium, inter gemmas, nescio quod recte collocauit, ut in castigatione Pliniana indicauimus. Etenim scire oportet, Cyanon etiam gemmam esse proximam, & germanam laspidi. Ea uero, de qua hic agitur, metallicam & arrosam esse. Ea res peperit errorem scribentibus, ut utriusq; genus pro uno eum obliiti confunderent. Accellit his Puteolanum, & Hispaniense, harena similiter sibi coapta confici. Viſtruuſius Ceruleum ait fieri, harena cum nitriflore in farina cōtrita, & aeris Cyprij seobe admixta factis orbiculis: qui siccati urceō siculi condunt in fornace, ut confudent, atq; ita Ceruleū colorem præferūt. Tingitur autem omne Ceruleū, & in sua coquit herba, bibitaq; succū. Reliqua curatio eadem, quæ Chrysocolle. Ex Ceruleo fit quod uocatur Lomentum. Perficitur id lauando, terendoue. Et hoc est Ceruleo candidius. Precia eius. 2. in libras. Cerulei. 18. Vſus in Creta, calcis impatiens. Nouissimè superuenit Nestorianum, ab auctore Puteolis id curante. Fit ex Aegyptij leuissima parte. Preciū. 40. in libras. Idem & Puteolani uſus, præterq; ad fenestras. Vocant Cyllon. Est & subtilissimum genus Lomēti, quinis assibus taxatū, qd Attici uocant, hoc est, ut puro λιννα. Quod Lomentum ipsum a Theophrasto λιννα dici uideo. Cerulei sinceri experimentum, in carbone ut flagret. Fraudat uiola arida decocta in aqua, succoq; per lintheū expresso in creta erethiam. Sile primi instituere pingere Polygnotus & Mycon Attico dicitur. Hoc secuta ætas ad lumina est uſa. Ad umbras autem Scythico, & Lydio. Lydium Sardis emebat: qd nunc, ut ait Plinius, obmutuit. Difficillime terit Sil. Ab hoc, ut arbitrantur aliqui, Silatum uinum: quod & Sil uocat, & Silaceus color. Sil & Ausonius poetæ, latianis, an peregrina sit uox addubians. De uino Sil, Cornelius mentionē habet. Auctor Festus. Ob id Græci Dianestimon, & Acrastima id appellabant. Sunt qui a Sefeli, quod Tordilon & Sile dicitur, Silatum uinum deriuent. Sed auctorem nec ij ullum habent. Erat autem ientaculum, ut Athenæus tradit, buccia ex uino: quod genus barbari, a uino & pane Vippam uocant.

EX M. V E R G. C O M M.

Dolorum duplex quondam, quemadmodum & nostra ætate, ratio fuit. Nascuntur enim aliqui, & exigua aut nulla hominis opera ad temperaturam indigent. Finguntur contra aliqui, & sine hominis opera nulli sunt. Nascuntur Ochra, Minium, Chrysocolle, & pleriq; alij. Fingebantur autem quondam atramentum, ærugo, hyalos, pluresq; alij, quibus similes nostræ ætatis pictura, nunc etiam multos alios fingit. Facileq; erit uolentibus antiquorum in his temperaturas, confectionesq; omnes a Plinio & Viſtruuſio audire. Ceruleum in utroq; genere quondam fuit. Nascatur enim & fingebatur. Illud in metallorum fodinis, præsertimq; æris: in quo genere Cyprium hic ceteris anteponit: Hoc littoralis harena, nitro, æreque, ui ignis excoctis eisdem in pictura habebat uſus. Fuitq; ut fere omnium in natura rerum fortuna est, multiplex Cerulei bonitas, ex nationibus confectionisq; temperatura ab antiquioribus obseruata. Quæ omnia a duobus illis scriptoribus certius docent: ab altero naturalis historiae, uolumine, cap. 11. ab altero. 7. suæ architecturæ cōmentario. Quæ potuissent, debuissentq; a nobis repeti hoc loco, nisi iisdē uerbis cuncta illa in Corollario suo Barbarus collegisset. Nec eo secius nostra hæc legentes hortamur, historiae pigmentorumq; disciplina huius magistros sibi antiquos scriptores illos potius fecisse. Intelligent enim certius, quid nam in Ceruleo hic dixerit. Nasci in Cypro, in ærarijs fodinis, & ex littoralis harena copiosissimum fieri Ceruleum: quod in toto hoc capite præcipuum est.

De Indico.

CAP. XCVIII.

Indici duo genera. Vnum sua sponte nascitur, tanquam spuma germinatione, Indici harundinibus exiens. Alterum insectoriæ dant officinae. Et est spuma purpurea innatans cortinis, quam detractam arifices siccant. Optimū existimatur, quod Cærulei speciem præbet, succosum, & læue. Inter medicamenta est quæ uelociter adstringunt, & inflammationes, tumoresq; rumpunt. Purgat & reprimat ulcera.

BARBARI COROLL.

A

Indicum Ceruleo proximum est, ex India nō pridem, ut Plinius inquit, apportari cœptum: cuius precium in librās. 17. alibi denarios uiginti reddit, inexploratē sibi hoc inuentionis fuisse tradens, & inter Cerulei genera constituens. Ratio in pictura, ad incisuras, hoc est, umbras diuidendas ab lumine. Quod ex India inquit uehitur, harundinū spuma est, adhærescente limo, cum teritur nigrū. At in diluendo mixturā purpuræ, Ceruleiq; mirabilē præsentat. Alterū spuma est purpuræ. Adulcerant uero Indicum, stercora columbiā, uel cretā selinusiam, uel anulā riam uitro insipientes, ut Vitruius ac Plinius testantur. Probaturn carbone. Reddit em̄ sincerū flammā, excellentis purpuræ, & dū fumat, sapit mare: ob id quidā ex scopulis id colligi putāt.

EX M. VERG. COMM.

VNum tantum Indici genus ostendi nūc potest; neq; antiquum forte illud quod ab Indis in quibus nascitur nomen sibi fecit. Alterum ex quo desit tingi purpura, nullum inter gentes est. Nouerunt nunc omnes Indicum, quem nostra ætas habet, eamq; ob causam in uulgari re nihil ultra nobis laborandum.

De Ochra.

CAP. XCIX.

Ochram leuissimam, & uehementer luteam eligere oportet, meram, & aliena materia uacantem, non lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare. Excreſcentia in carne reprimi. Caua cum cæato explet. Et articulorum tofos comminuit.

BARBARI COROLL.

Ochram, Luba tradit in insula rubri maris Topazono gigni. Sed inde non peruehitur ad nos, inquit Plinius. Ochram si quis interpretari cupiat, Luteam aptissime conuerterit. Nisi Lutea ut herbae & Chrysocolle genus esset. Exoleuit inquit Attica Ochra Vitruius. Inueniebatur autem tum multis locis etiam in Italia.

EX M. VERG. COMM.

Apallore nomen Ochrae antiquitas fecit. Terra ea est quæ quondā in Attica laudatissima fodiebatur. Vtq; illi precium & honor in pictura maximus fuit, sic nostræ & uulgari multiplex & sine honore aliquo usus est. Quos habuit & habet in medicina usus hic docuit: quos autem in pictura, pictores iam pridem quotidiana tractatione nouerunt.

De Cinnabari.

CAP. C.

Hallucinantur qui Cinnabarin Minio eandem esse existimant. Minium em̄ in Hispaniis ex lapide quodam argenteæ harenæ permisto, temperari solet. Alioqui non dignoscitur. Fornacibus autē in florentissimum flagrantissimumq; colorem permutatur. In metallis uero strangulantem halitū eructat. Itaq; facies incolæ uescis obuelant, ut per illas spectent, nec respirando noxium ærem attrahant. Ea pictores ad sumptuosa parietū honestamenta utuntur. Cinnabaris, quæ ex Aphrica deferret, magno constat. Hactenus inuenitur, ut uix uersicoloribus pictorum lineis satisfaciatur. Densum, nec dilutum colorem reddit. Quare quidā sanguinē esse draconis existimauerunt. Vim habet Cinnabaris Hæmatitæ lapillo eandē, uerum efficaciorē. Conuenit ad oculorum mendicamenta. Magis em̄ adstringit, & sanguinē cohibet. Ambustis igni, & papularum eruptionibus cæato excepta medetur.

BARBARI COROLL.

Cinnabari ueteres usi sunt ad monochromata, hoc est, ad ea quæ coloribus singulis pingebantur. Adulteratur sorbis tritis, aut caprino sanguine. Preciū sinceræ nummi quinquaginta.

Hh

Pli. li. 35. c. 6.

Pli. li. 35. c. 6.

B

xiv. 6. 6. 6.

Pli. li. 35. c. 6.

D I O S C O R I D S

C Est autem Cinnabari, siue Cinnabaris, uera sanies draconis elisi, elephantorum in pugna commorientium, pondere permixto utriusque animalis cruore. Neque aliud est color qui in picturis proprie sanguinem referre possit. Pinxerunt & ephesio Minio; ubi primum id reperitum est, autore Theophrasto, ac Vitruiuo. Vtrumque omissum est, inquit Plinius: quia nimis acre existimabatur. Tum quia curatio magni operis erat, ideoque transire ad Rubricam, & Sinopidem. Minium sane inter pigmenta magnae autoritatis fuit: quando & Iouis ipsius simulachri faciem, festis diebus miniandam censores locabant. Triumphantium quoque corpora, Minio lini solita leguntur. Ideo & in unguenta triumphalis coenae addebatur. In Aethiopia & totos tingi proceres, & Deos, hoc colore moris fuit. Inuentum Theophrastus tradit, hanc multo ante se a Callia athenienese, initio sperante, aurum posse excoqui harena rubente in metallis argenti. Reperiebatur tamen inquit, iam tum in Hiberia (malo enim ita quod in Hispania conuertere, ut in castigatione Pliniana diximus) sed durum & harenosum. Item apud Colchos in rupe inaccessa, decutiendum sagittis. Sed id esse adulterum. Optimum autem supra Ephesum, Clibianis agris Iliba Minium scripsit nasci, & in Carmania & Aethiopia Harenam illam Ephesi, quam diximus Cocci colorem habuisse, praedicant. Hanc teri solitam: dein lauare, & quod subsidat, iterum lauare. Differentiam artis esse: quae alij Minium faciunt prima lotura, apud alios dilutius id esse: proptereaque Plysmadici: sequentis autem loturae optimum. Minij uenae Romam ex Hispania signatae perferebantur, ad dena milia fere pondi annua. Romaeque lauabantur, statuto lege precio, septuaginta in libras, officinis eius, inter aedem Florae & Quirini positus. Atque hoc uerum erat Minium. Quod uero Dioscorides commemorat, adulterinum ac deterius. Namque est alterum genus, in omnibus fere argentarijs, & plumbarijs metallis, quod sit exusto lapide uenis permixto, Non ex illo, cuius uomicae liquoris aeterni Argentum uiuum nominant, sed alijs simul repertis, qui steriles etiam sunt plumbi: nedum argenti. Tales cremati tunduntur in farinam: & hoc est secundarium Minium, per paucis notum, multum infra naturale illud sabulum. Hoc ergo adulteratur Minium in officinis: unde praeda societati. Item Syrico. Sublimi autem Syrico Minium, compendij ratio monstrauit, & alio modo furis opportunum erat: pictoribus plenos subinde penicillos abluentibus. Sidit enim in aqua Minium, constatque furantibus. Sincero Cocci nitor. Secundarij autem splendor in parietibus sentire debet imaginem: quamque hoc rubigo quadam metalli est. Sisapontensibus autem miniarijs in Betica, unde ad nos nec aliud fere inuehebatur, suae uenae. Harena excoquitur, sine argenteoque ea, contra quam alijs regionibus. Idque celerimum auri modo probatur ferro, & melius auro candente: fucatum quod est, nigrescit. Sincera retinet miniatum colorem. Inuenio & calce adulterari. Solis atque Lunae contactus inimicus. Vin dicatur ab hac iniuria, si parietis ficcato, cera punica cum oleo liquefacta candens, fetis inducatur. Iterumque ad motis gallae carbonibus, aduratur ad carbonem usque, postea candelis subigatur: ac deinde linteis puris, quo modo & signa nuda marmorea nitescunt: quae Loricatio graece appellatur Coniasis. Autor Vitruius. Minium in uoluminibusque scriptura usurpat, clarioreque literas, uel in auro, uel in marmore etiam in sepulchris facit. Int uenena esse Minium nemo dubitat.

E X M. V E R G. C O M M.

C Redidit Plinius contra quod hic testatur, saniem draconis elisi elephantorum morientium pondere, permixto utriusque animalis sanguine Cinnabarim esse. Nec solus credidisse id uidetur: cum hic plures idem sibi etiam persuasisse testetur. Quod ex grauiore Cinnabaris precio factum fuisse uerisimile est, dum nouitate & miraculo aliquo mercium suarum pretia augere mercatoribus conantur. Verumtamen arguendo tam impudenti eorum mendacio satis unus hic scriptor sit, qui totius naturae peritissimus, qualis uera Cinnabaris sit, optime cognouisset, & saluti humanae consulens, non id tantum monuerit, sed falso etiam existimari Minio eandem Cinnabarim esse. In quo decempro quondam fuisse, & decipi adhuc posse homines non adeo difficile fuit & erit. Rubent enim ambo, & in pictura eundem tunc habebant usum. Discrepant tamen, ut hic docet, nationibus: quod altera ex Libya, alterum ex Hispania quondam asseratur: & illa in medicinae usum, hoc inter uenena, aut ueneni saltem maleficium habentia receptum fuerat. Vtriusque seruantur nostra aetate nomina. Habetque gens nostra quo passim utitur, uerbum miniare, a Minij colore factum: quo pingi, uariarique libros, & librorum titulos eo colore dicat. Habent Cinnabaris nomen omnes in nostro orbe fere gentes: quo non rem, sed colorem illum indicet. Qui enim nunc ruber color eum habet usum, ex argento uiuo conficitur: quemadmodum ex Minio argentum uiuum. Quod totum nouerunt qui haec tractant: ideoque a nobis aliud agentibus relinquenda huiusmodi sunt. Satis enim legentibus erit, ex scriptore hoc didicisse, quale utrumque fuerit, & quare ratione inter se differant: tamque nunc ueram Cinnabarim uidisse homini

difficile esse, quod quondā Minium facile erat: cuius quotidianus usus & tractatio Romæ quondā fuit, ex Hispania per redemptores eius metalli, ut illic curaretur, allati. Relictum in Cinnabaris & Minij huius historia non procul a principio spacium a nobis est, utiq; nota signatus locus: quoniam male sequax uerborum & rei ductus illic esset: exigeretq; sibi aliquid, quod ad discernendam a Minio Cinnabarim antea dictum pertineret: a quo statim hic inferret, aliter nō posse cognosci. Siquis autē totam Minij confectiōē, temperaturam, uitia, bonitates, & usum audire optauerit, Plinium & Vitruium auctores habebit: quorū alter. 33. suæ historiæ uolumine, capite. 17. alter suæ architecturæ cōmentario. 7. longius omnia illa profecuti sunt.

De Argento uiuo.

CAP. CI.

Argentum uiuum fit ex Minio, quod abusiue Cinnabaris dicitur. Patinis fictilibus, imposita ferrea concha Cinnabarim continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt. Si quidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in Argentum uiuum cōit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum tectis, stillatim concretū. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in uitreis, aut plumbeis, aut stagnis, aut argenteis uasis. Siquidem aliam materiā omnem exedit, & defluere facit. Potum uim perniciosam habet. Suo enī pondere interna exest. Remedio est lac multū subinde potum, & uomitionibus reiectum, aut uinum cum absinthio, aut apij decoctum, aut semen ormini, aut origanum, uel hyssopum cum uino. Auri limata scobs, id est, ramentum tenuissimum epotum, mirabili est auxilio.

BARBARI COROLL.

HYDRARGYROS, siue Hydrargyron, ex Minio fit tantum secundario. Apospematissimū Draconis non desunt qui uocent in arte chymica Hydrargyrum: ut fel Draconis Hydrargyrum, quod e stanno fit, & quod ex auro Discū solis. Fit & ex marmore, ut Vitruius refert Argentumq; id uiuum nominat. Sudor calici deterfus in confectura Hydrargyri liquorem aquæ habet, argenteo colore: unde nomen Hydrargyro. Idem guttis facile diuiditur, & lubrico humore confluit. Hydrargyro quemadmodum & Argento uiuo argentum inauratur solum, nunc prope. Cum & in æra simili modo aurum duci legitimum quondam fuerit. Sed alia ratio inuenta est e uiliori materia, ut paulo post dicemus. Quæ autē hic de noxa Hydrargyri a Dioscoride scribuntur, Plinius Argento uiuo tribuit. Credo Hydrargyri genus haberi duplex. Factitium, quod proprie Hydrargyron dicatur: & Metallicum, cui sit Argenti uiui nuncupatio dicata. Est autē Argentum uiuum, argentei liquoris uomica: qui in lapide in uenis Argenti reperto, inuenitur: qui & ipse in Argentū excoquitur, & Achrosyalon priuatim uocatur a Chymistis. Quamq; & pro Scithere lapide Aphrosyalos ab ijs accipitur. Venenū rebus omnibus est Argentum uiuum. Omnia ei innatant, præter aurum. Id unum ad se trahit mere: ideo & optime purgat, ceteras eius fosdes expuens crebro iactatu fictilibus in uasis. Ita uitij eius abiectis, ut & ipsum ab auro discedat, in pelles subactas effunditur, perq; eas sudoris uice defluens, purum relinquit Aurum. Ergo & hoc cum æra inaurantur, sublitum bratteis, pertinacissime retinet: uerum pallore detegit simplices earum, aut prætenues: qua propter id furtim quærentes, oui liquore candido usum eum adulterant: mox & Hydrargyro. Inaurandum uero æs cruciatur ignibus, accensumq; restinguitur sale, aceto, alumine: postea exarenatur, an satis recoctum sit splendore deprēdente. Iterūq; exhalatur igni: ut edomitū, mixtis pumice, alumine, Argento uiuo indutas bratteas accipiat. Argentum uiuum non large inueniri solitum affirmant. Candidum id, & fugaci corpore, nec usq; consistens. Omne tamē corpus fusile recipiens atq; in se contrahens. Qui Metallicas species adulterant, & Chymistæ a fundendo appellantur, siue a succis quos herbarū maxime conquirunt, immutant rebus nomina: siue ut alijs maligne occultent, in quibus ipsi hallucinantur: siue ut præstigias suas uelut quædam mysteria uenerabiliore faciant. Argentum uiuum Hermem, hoc est, Mercurium appellant. Sed aliter quam Græci Aurum Solem, Argentum Lunam, & alia fere ad hunc modum omnia. Multos huc

Hh ij

Pli. li. 33. ca. 64.
& s.

*

D I O S C O R I D I S

C Auaricia sola compulit frustra, nondum inuento, qui non oleum et impensam perdidit: ut de his iure dici possit quod Demetrius Phalereus in eos cauillatus est, qui aurum per cauernas scrutantur, & in ea spe patrimonium suum conferunt & absumunt. *α μὴν ὑμῶν οὐκ ἔστιν, ἀλλ' ὅτι οὐκ ἐπὶ τῷ χρυῷ, ἀλλ' ἐπὶ τῇ ἐλπίδι.* hoc est, quæ capere debuerant, non cœperunt: quæ possidebant, amiserunt, ut Athenæus, et ante ipsum Strabo meminit. Argentum eos uiuū p̄cipue torquet, indignantes tam proximam argenti probi spem elabi manibus, nec spissari, aut inhiberi motum eius ullo fere modo posse. Argentū q̄dem iam tingitur tam simili colore auri, ut nec marculo, nec coticula, nec pondere, nec alio q̄ lateris & ignium argumento deprehendatur. Quæ probatio Cōmentitia & Cupellaria uocari solet: qm̄ cōmētū illud laterculis, hoc est, in cuppa uratur. Malū hoc iam late patet: nec Auaricia solū, aut Luxuria censenda, sed puerilis quēdā uanitas, & ostentatio diuitiarū ludicra, totis abacis ex hoc adulterio, uel principū epulas ornantibus. Hinc passim mōneta falsa creditur, præsertim Veneta: maiore furto, q̄a nullum sit aurū, uel argentū Veneto sincerus. Prefertur omnibus numis orbe toto Venerus. Huic crimini, Decemuiralis potestas, non aliter q̄ aut lesæ maiestatis, aut uiolatæ religionis obiecta est. Nihil fere tñ, aut graues pœnæ fontibus constitutæ, aut imensa præmia deferentibus proposita iuuere. Non erat prius cautum, ne cui liceret metalla cruciare. Monetarios tantum leges oderant, Chymistas esse patiebant. Hoc ipso anno quo hæc prodimus, Chymistas quoq̄ ipsos capitales fecere: simul ut occasionem sceleris adimerent: simul, ne quis ætatem suam tereret in follibus & ustrinis et capunculis futilibus, quæ iam conuicio desidia: Chorioliola, siue Scoridiola græce nominantur.

E X M. V E R G. C O M M.

S Tare loco nescit, micat, trematq̄, & suo pondere hac & illac facile fertur Argentum uiuum. Vnāq̄ hanc rationem in eo contemplati ueteres Romani, insensibili alioquin rei, uitæ sensum Argento huic tribuerunt, uiuum uocantes. Græci ediuerso non motum, sed fluidum & aquosum eius habitum admirati, Hydrargyron, quasi aquosum argentum nominauerunt. Omnes tñ cōmuni consensu in Argenti censu id constituerunt: uel q̄ candore suo simile argenso sit: uel quod magis uerisimile est, quoniam in argentarijs metallis cū argento inuenitur: uel q̄ priuatim & per se similem argento uenam & uomicam habet. Fuit enim hoc primum Argentum uiuum in metallis natum, & a natura gentibus datum. Quo deficiente, ut fuit semper urgente necessitate aliqua ingeniosa humana gens, fingi cœptum est, et ex alijs metallis artificiose cōfectū. In quotidianos uitæ usus pro illo concessit. Quo magis miret aliquis scriptorem hunc, a fictitio historiam Argenti uiui incēpisse, quam Plinius a naturali. *α. uolumine, cap. 6. auspiciatus fuerit his uerbis.* Est & lapis in his uenis, cuius uomica liquoris æterni Argenti uiuū appellat. &c. Et cum longius de eo egisset, fictitium ex Minio eiusdē uoluminis, cap. 8. docuerit, hic tñ artem naturæ anteposuit: nec scimus, an bonitatem, efficaciorēq̄ in fictitio q̄ in natuo uires hac ratione mōstrare uoluerit: habereq̄ in artibus & medicina fictitiū aptiorē natuo usum. Duplex ex his quæ p̄monstrata sunt Plinio Argenti uiui genus est, huic uero triplex. Fictitiū ex Minio, quod in fossura argenti inuenit. Et quod per se metallum est, perpetua liquoris uomica a Plinio fluere dictū. Est præter hæc quartū etiā genus, eodē fere quo ex Minio modo ex marmoris fragmentis & assulis quæ marmorarij disticiūt, factum. Docet id a Vitruiuo quo paulo ante diximus loco. Quæ conficiendi id ratio quoniam multiplex est, & longa rerum serie tractatur a nobis, legenda in eo scriptore uolentibus relinquatur.

μῖνιον σινωπικόν

De Rubrica, seu Minio sinopico. CAP. CII.

M inium sinopicum maxime probatur graue, densum, ad iocine ris imaginem uergens, calculorum expert, concolor, in resolutione succosum. Effoditur in Cappadocia spelūcis quibusdam, expurgatumq̄ defertur in Sinopen urbem, in qua uenditur. Vnde cognomen tum accepit. Vim habet exiccatoriam, quasi inducendo obstruentem, & adstrictoriam. Quapropter uulnerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs commisceri solet. Aluum sistit, in ouo sumptum, aut clystere infusum. Datur iocineris uitio laborantibus.

B A R B A R I C O R O L L.

R ubrica Sinopis, quam Celsus Minium Sinopicum appellat, inuenta primum in Ponto

dicat. Nascitur Rubrica & in Aegypto, & Balearibus, & Africa: sed optima in Lemno & Capadocia: ut in mentionibus duabus proximis indicabitur. Species Sinopidis, aut Sinopicae tres. Rubra. Et minus tubens. Et inter has media, quæ præfertur omnibus: quia minus adulte retur, ob id & Autarcen uocari Theophrastus eam prodidit. Preciū optimæ in libras. 12. denarij. Vfus ad penicillū, aut si lignū colorate libeat. quæ plus rubet, utilior est abacis. Idem preciū eius, quæ Pressior uocatur, & est maxime fusca. Vfus eius ad bases abacorum. In medicina quoque blandus emplastris & malagmaris, quæ dicuntur Phæa. Troianis etiā temporibus, Rubrica hoc est, Miltos in honore fuit, Homero teste: qui naues Miltoparias commendandi gratia uocauit. Alioq̃ rarus in picturis. Rubrica & in ferrarijs metallis nascitur, picturis apta. Fit & ex Ochra, ut dicemus. Quid sit apud Columellā in apum curā lutum punicum, nisi sit Rubrica, non satis uideo. Legitur sane Rubricam ex Africa uenire, quā Cicerculum uocabant, cuius precium octoni asses, Legitur & Lutum uenerū abluendis maculis quæsitum: de quo & Martialis poeta meminit. Nisi quis hanc intelligat, quam dixi Pressiorem uocari, & maxime fuscā esse.

E X M. V E R G. C O M M.

Quod in Sinopide Rubrica maxime optauerit nouisse aliquis, eadem ipsa est: ut optima, & quæ ueteribus cognita tam multis remedijs medicinam instruxit, uti ætate hac non straliceret. Cætera enim quæ de ea a Diosco. docentur, in hoc ipso, & in Plinio satis per se patent. Eamq̃ ob causam relictis omnibus alijs, illud tantum monēbimus: ob coloris similitudinem, & hanc, & Fabrilē, & Lemniā Rubricam Minium sæpe appellasse ueteres aliquos: non tamen simpliciter, sed adiecto semper gentis, aut usus cognomine aliquo: uerbi causa, Sinopicum Lemnium, & Fabrilē, Minium nominantes. Sic Celsus aliquando, sic plures alij usi sunt. Cætera quæ de omni Rubrica dici poterant, ab alijs ex antiquis scriptoribus collecta, sine legentium desiderio a nobis relinquuntur.

De Rubrica fabrilī. C A P. CIII.

Rubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia, & Carthaginensis, lapidū expers, friabilis. Gignitur in lberia quæ ad occidentē spectat, Ochra exusta, & degenerante in Rubricā.

B A R B A R I C O R O L L.

Rubrica fabrilis, hoc est, Miltos tectonice, utilissima fabris est: quæ in Aegypto nascitur & Africana: quoniam maxime sorbetur. Hæc & in Lemno fit, diuerso genere ab ea quæ Sphragis appellatur. Sicut & quæ linearij, fullonesq̃ utuntur, in lauando extergendoq̃ uiribus præcipua. Galenus auctor. Ochra excoquitur in Rubricam, ollis nouis luto circumlitis. Commentus hoc esse dicitur Cydus quidam, incensis casu officinis. Quo magis arsit in caminis, hoc melior, quia nigrior, & carboni similis efficitur. Vt cumq̃, talis Rubrica deterior q̃ natia semper, ut Theophrastus inquit.

E X M. V E R G. C O M M.

Licebit uolentibus ex Plinio fabris aptæ Rubricæ huius historiam, bonitatem, natales, temperaturā, omnemq̃ usum. 35. uoluminis, capite. 6. certius intelligere: ideoq̃ nos parato omnibus eo scriptore, nihil cōmentatiōibus his nostris in re alioq̃ nota adijciemus. Factū Rubricæ huic cognomē a fabrica est, in qua dirigendis lineis, colorandoq̃ ligno multus semper fuit eius usus.

De Lemniā terra. C A P. CIIII.

Lemniā terra, cuniculoso in specu nata e Lemno insula, palustri loco defertur, inibi electa, & caprino sanguini permixta. Quam incolæ cogunt in pastillos, & imagine capræ signant. Vnde & Sphragida appellauere. Vim antidoti habet, contra pernicioſa uenena singularem. Pota cum uiuo, & præsumpta, euomū uenena cogit. Contra ictus morsusq̃ animalium, quæ exitiale uirus ei aculantur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia utantur. Est & dysentericæ utilis.

B A R B A R I C O R O L L.

Rubrica, siue terra Lemniā, quā Celsus Minij Glebam uocat. Palmam huic dedere Mi-

Hh iij

A

μίλτος τεκτονική

B

Pli. li. 35. ca. 6.

λεμνία γῆ

Pli. li. 35. ca. 6.

D I O S C O R I D I S

C nio proximam. Hæc est antiquis multum celebrata, cum insula sua, in qua nascitur. Hæc Minium sublinuit, adulteratq; qualis & in Cappodocia effodit spelūcis: quæ faxis adhæsit, excellere existimat. Glebis suus color, extra maculosus: hac usi sunt ueteres ad splendorem. At Sphragis uocatur inquit Galenus, quoniam Dianæ signum habeat a Sacerdote impressum: nec animalium sanguinem misceri, sed triticum & hordeum piamenti gratia, illi terræ dari. Rubet ambusti modo tumulus in Lemno: ubi hæc legitur, prope oppidum Ephestiada cognominatum: quod in eum locum Vulcanus ceciderit, quo orientem spectat insula. Ibi nihil iuxta nasci, aut uirere. Sicari Lemniam, nec remollescere sub digito protinus tactam, ut Rubrica. Philo sterem fatum ea ex Hydri morsu, Philostratus scribit: ob eamq; rem nouum insulæ nomen inditum, ut pro Lemno dicere Acesa. Huius insulæ uestigia senatus populusq; Roman. concessit Atheniensibus fouendo.

E X M. V E R G. C O M M.

Non est cæteris græcor. scriptoribus, præsertimq; Galeno eadem huic scriptori Lemniæ rubricæ, seu terræ historia. Hic enim ex cuniculoso specu, palustribusq; eius insulæ locis afferri ait: illi in ea insula montem esse dixerunt, ambustorum modo rubentem, sterilem, in quem poëtæ e coelo pulsum cecidisse Vulcanum ferunt: ex quo terra hæc legitur, non procul ab Ephestiade eius insulæ oppido: signariq; Dianæ, non capræ signo a sacerdote eius hanc terram: nec sanguinem illi caprarum misceri, sed fruges alias, piamenti causa monti illi defodere incoles: pluraq; alia, quæ huic scriptori non conueniunt. Quinetiam nihil ab eis dictum est quale a Diosco, dicitur, uti ad religionem & initiationes quosdam hac terra.

De Atramento sutorio. C A P. C V.

χάλκινος

Atramentum sutorium genere quidem unum & idem est, molle & concretum, sed in specie differentias treis habet. Vnum namq; humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, concreuit. Quare ab ijs qui Cypria metalla perficiunt, Stalactis appellatur. Petrus eius ipsum Pinarion uocat, alij Stalacticon, id est, stillaticium: alij Pecton, Ephthon, Aracton, Lonchoton. Alterum simpliciter ratione fit in speluncis. Postea transfusum in excauatos scrobes, concreuit capessit. Quod Pecton, id est, Cöcreticium proprie nominatur. Tertium dicitur Coctile, & i Hispania fieri solet, sed inutile, ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi hæc est. Aqua madefactum decoquunt: mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus coalescit, in complureis formulas digestum, tesserarum speciem reddens, quæ racematim inter se cohærescunt. Optimum esse creditur, caruleum, graue, concretum, translucens. Cuiusmodi Stillaticium est. Ab alijs Lonchoton nominatum. Proximum Concreticiū. Coctile uero ad insectus & denigrationes aptius cæteris esse compertum est. Sed ad medicinæ usum inualidius esse, experimenta docet. Valet adstringere, calfacere, & crustas inducere. Latas uentris tinea necat, drachmæ pondere deuoratum, aut cum melle linctum. Vomitus ciet. Aduersus hausta fungorum uenena, ex aqua potum auxiliatur. Purgat caput aqua dilutum, & in uellere naribus instillatum. Vritur, ut paulo post in mentione chalcitis ostendemus.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 34. ca. 13

Chalcanthum, aut Chalcanthos, aut Chalcates, ut Strabo appellat, a Cornelio Celfo Atramentum sutorium fere semper conuertitur, cognationem æris græci nomine fecerunt. Fit in Hispania, e puteis stagnisq; id genus aquæ habentibus. Decoquitur ea, admixta dulci pari mensura, & in ligneas cortinas funditur. Imobilibus super has transitis dependunt resiles lapillis extrinsecus,

quibus adhærescens limus, vitreis atinīs, imaginem quandam uix reddit. Exemptum ita scatur diebus. 30. Hoc Ephthon uocāt, quod sit & salis modo flagrantissimo sole, admissas dulces aquas cogente. Color est ferrugineus, siue ceruleus, perq̃ spectabili nitore, utrumq̃ esse creditur. Diluendo fit Atramentū, tingendis corijs. Fit & pluribus modis, genere eo terræ, in scrobibus cauato: ut Dioscorides tradit. Purissimū est, qd Stalactida, siue Stalagmiā, hoc est, Stillaciū uocant. Sed ex eo candidum colore uiolam sentiente, Leucoion nominant, cetera triolacea. Fit aut̃ quod Pecton uocatur, & in saxorum catinīs pluuia aqua corruato limo gelascente: a quo & nomen habet. Factitium pallidius est q̃ fossile: quantum colore, tantū & bonitate uincitur. Maxime probant Cyprum in medicinæ usu, quod & solum Possidonius esse credit. Chalcanthum Galenus in Chalcitin lapidē mutari tempore, incipiens a superficie, testatus est. In harena Vrsorū & Leonum ora Chalcantho aspergi solita dicuntur: tantaq̃ erat uis in astringendo, ut mordere non possent. Differt Chalcanthos, id est, æris flos, a Chalcantho lauius q̃ ut monendū sit: etiam si Democritus in chymicis florem æris dicendo Chalcanthum intellexisse uideatur: ut Chalcanthū nominando, luteum oui significare uoluerit. Atramentū est & quod Melantherius Græci dicunt, explicandum suo loco. Itemq̃ Melan. Differt Calacanthum a Chalcantho: quod illud herbæ genus est, muscas, muresq̃ necans, nec aliud de ea prodium inuenio: quamq̃ Græci uulgo Calacanthum accipiunt pro Chalcantho.

EX M. VERG. COMM.

Aeri cognata res est Chalcanthum. In ærarijs em̃ metallis, ut metallici docent, plerumq̃ concreuit. Indicatq̃ id in græcis nomen: in quo q̃primum æs intelligitur. Romani, quoniam eo tingendis corijs gentes uterentur, a nigro colore quē reddebat, Atramentū: & a futrinis in quibus coria tractantur, futorium nominauerūt. Genera, confectionesq̃ eius: satis hic de curit. Nec nos parum laborauimus in restituenda capiti huic antiqua integritate. Qualis aut̃ ea sit, & quibus ablatis, mutatisue factum id a nobis fuerit, collatis cum nostra aliorum editionibus, facile uolentes intelligant. Poterunt a Plinio etiam Atramenti huius futorij easdem confectiones, genera, & nomina intelligere historiarū suarū. 34. uolumine, capite. 12. Eadem enim omnia huic & illi sunt. Quod in medicina, & remedijs monere uolumus, illud est. Quod hic Atramentum futorium contra fungos cum aqua bibi ait, non multo post cum ex professo de fungorum maleficio agetur, cum aceto bibendum in eo periculo precipitur: ut tunc certius docebitur.

De Chalcite.

CAP. CVI.

Chalcitis præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercurfantibus oblongis uenis, splendentibusq̃. Huic absterforia uis inest, ex calcaciens, & crustas ulceribus obducens. Purgat quæ oculis & eorundem angulis hærent. Ad ignem sacrum, & ulcera quæ serpunt, efficax est. Sanguinem e uulua & naribus erumpentem, cum succo porri sistit. Carunculā gingiuis enatam, depascentia ulcera, tonsillāsq̃, eius farina compescit. Vsta, & cum melle trita, oculorū medicamentis longe utilior redditur. Callum genarum & scabriciam absumit, abstergitq̃. Fistulas tollit, collyrij modo in eas adacta.

BARBARI COROLL.

Chalcitis, hoc est, lapis ærarius, ita dicitur, quoniam ex ipso Aes coquitur. Distat a Cadmia fossili, quod illa ex subdialibus perris ceditur, hic ex obrutis. Item q̃ Chalchitis friat se statim, natura mollis, ut uideatur lanugo concreta. Est & alia distinctio: q̃ Chalchitis tria præter se genera complectitur, Aes, Misy, & Sory. Habet aut̃ æris uenas oblongas. Probat mellei coloris, gracili uenarum discursu. Putant & recentem meliorem esse, quoniam uetustate Sory fiat, Maceratur aut̃ in fistilibus ex aceto circumlitis fimo diebus. 40. & colorem Croci trahit. Chalchitis inueterata, ut Galenus inquit, etiam in Misy transit, a summa cute incipiens.

EX M. VERG. COMM.

Chalchitim uocant metallici lapidem ex quo æs coquitur. Habet is plures, ut illi uocant, distinctiones, nō repetendas hoc loco: quoniam ex Plinio cunctas alij suis Corollaris inseruerint. Et si uetustiores aliquis amet auctores, tō tam unus Plinius rem lib. 34, capite. 12, docebit.

Hh iij

A

B

B

χαλκίτης

Pli. li. 34. ca. 12

ψορικόν

Flt ex ea medicamentum, quod Psoricon uocant, duabus Chalcitis partibus, cum una Cadmiæ additis, & ex aceto tritis. Oportet autem in fictili obruere fimo, diebus quadraginta per caniculæ ardore: sicut enim fit acius. Idem quod Chalcitis potest. Alij pares utriusque portiones in uino terunt. Vritur Chalcitis fictili nouo, uiuis carbonibus superposito. Modus autem uestionis in humidioribus est, dum ipsa Chalcitis bullas excitare desierit, & perfecte inaruerit. In reliquis uero, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguineum, aut miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est. Insidens autem spurcicia statu expellenda. Mox reponenda. Torretur etiamnum perfatis carbonibus, usque dum luteo colore palleat. Aut fictili subditis candentibus prunis, subinde uersata, donec conflagret, & colorem mutet.

E X M. V E R G. C O M M.

Coniuixerunt Chalcitidi Psoricon hoc aliqui: nec sine causa penitus. Ex ea enim, ut præmonstratum est, fingitur. fictitium enim, non natuum: nec simplex, sed compositum est. Nos tamen ueterum græcorum rationem secuti, qui seorsum a Chalcitide de Psorico egerunt, diuisa historia, & alio capite a Chalcitide, statim Psoricum prosecuti sumus. Medicamentum id est, sic dictum, quoniam contra scabries & asperitates cutis, quas Græci Psoras, dicunt uim & usum quondam haberet. Quæ autem sit huic scriptori eius confectio, satis ex eo patet. Cæteri tantum græcorum medici ad confectioem eius non Cadmiæ, sed Spuma argenti usi sunt: neque ex uiribus eius minus aptam forte uim contra cutis asperitates Psoricum habebit. Cætera huic, & alijs omnia eadem sunt: qui fimo obrui, & 40. diebus sub sole habendum omnes præceperunt: quoniam ea ratione maiores in siccando uires acquireret: ipsum magis extenuaretur, & in erodendo mitius Chalcitide fieret. Est illud in medio capite certius cognoscendum: in cocturæ spacio, et quid uel coqui metallici aliquid oporteat, quæ nam hic πρὸς ψορικόν id est, humore abundantia, quorum cocturæ finis sit, cum bullas agere desierint, & aruerint, dicat: & quæ reliqua intelligi ibidem oporteat, quorum cocturæ finis sit in speciosiore colorem mutatio: in uno ne Psorico confutuendum id sit, an in cunctis metallicis: decreueritque hic, & appellauerit humore abundantia Psorica, quæ copioso aceto, aut uino temperata fuerint, reliqua uero quæ aridiora: an simpliciter de cunctis metallicis, omniumque coctura intelligere id oporteat. In quam partem inclinat animus nobis, non tam ex conceptis illic uerbis, quæ in hunc sensum facile legentes ducunt, quæ quia non uidetur, quo referenda reliqua illa sint, cum de uno tantum Psorico agatur. Eamque rationem nos secuti, de cunctisque præcipi eo loco opinati, ad omniū metallicorum cocturam rem contraximus. Plinius. 34. uolumine, capite. 12. de eodem Psorico hoc, sed non eodem penitus huic modo egit. Prius enim fimo in sole obruit, quæ Cadmiæ illi misceat. Cætera huic & illi eadem fere omnia sunt.

D

De Misy.

CAP. CVIII.

μίσυ

Misy assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet, & uestionem cum Chalcitide eandem, citra Psorici compositionem, excessu defectuque differens. Aegyptium autem cæteris præstat, ut pote quod efficacius habeat. Sed ad ocularia medicamenta multo supradicto inferius.

Pli. li. 34. ca. 12

B A R B A R I C O R O L L.

Misy, quidam putauere fieri exusto lapide, in scrobibus, flore eius luteo, miscente se ligni pinea fauilla. Re uera autem ex Chalciti fit lapide, concretum natura, discretumque, optimū cum teritur: arenosa qualitas, siue terrea, similis Chalcitidi. Hoc miscet, aurum purgant. Lapidiosius est quæ Sory.

Deprehenderunt metallici in Chalcitide lapide, ex quo diximus excoqui æs, tria contine-
ri. Aes primū: mox Misy hoc de quo nunc agitur: & tertium Sory, de quo non multo post age-
tur: non tanq̃ eiusdem substantiæ partes, sed diuersi generis cōcreta simul, discretæq̃ quasi me-
talla aliqua, quæ cōdura deinde, rationibusq̃ alijs separata in usum uitæ traherentur. Quale
aut̃ hoc Misy sit, satis hic, satis etiam Plinius quo diximus loco docuerunt. Hic breuissime me-
dicinam, & remedia eius numerauit, æquale uiribus Chalcitidi faciens. Plinius tamen longio-
re certioreq̃ historia multa addidit, quæ uidisse in eo operæ precium fuerit. Docentur aut̃ ab
eo quo diximus paulo ante capite & libro. Cæteri etiam græcorum medici in genere exulceran-
tium medicamentorum cum ualidiorē adstrictione Misy hoc numerauerunt: minus tamen q̃
Chalcitis erodere, quia tenuius ea sit, Addidit præterea Galenus Chalcitum: & quod nō multo
post dicitur Sory, uetustate in Misy hoc mutari a superficie incipiente statim mutatione.

De Melanteria.

CAP. CIX.

Melanteria geminæ est originis. Quædam in faucibus cuniculo
rum quibus æs eruitur, salis modo cōcreuit. Alia uero in sum-
ma facie supradictorum locorū cōit, quæ terrena est. Quinetiam inue-
nitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus fossilis quædā. Præstat
quæ sulphuris colorem trahit, læuis, pura, æquabilis & quæ contactu
aquæ confestim nigrescit. Vim causticam obtinet Misy similem.

μελαντηρία

MELANTERIA, ex nomine quidem ipso atramentum significat: quemadmodum & Melani
de quo post dicemus. Differt: q̃ Melan factitium & librarium, siue scriptorium atramentum
est: Melanteria uero terra.

EX M. VERG. COMM.

Fecit Melanteriæ nomē color, qui in metallica natiui, sin fossili contactu aque illi accedens,
semperq̃ & in omni niger est: nō male a latinis Atramentum metallicum dicta aliquando est.
Græcis tamen uocibus in hoc Romana medicina plerumq̃ usa est: uocaruntq̃ latini nō minus
q̃ græci Melanteriam metallicum hoc atramentum, in ærarijs fodinis concretescens, & ut ueri-
simile est, æris naturæ. Veteres græcorū medici in genere efficacissime astringentium eam no-
minauerunt: facilem ex historia huius in ærarijs metallis inuentu.

B

De Sory.

CAP. CX.

Sory existimarunt aliqui Melanteriam esse, aberrantes. Siquidem
sui generis est Sory, ei non absimile. Verum Sory uirus inest gra-
ue, & nauseam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibus-
dam regionibus, ut in Libya, Hispania, & Cipro. Præfertur Aegyptiū,
quodq̃ frianti nigrius apparet, spongiosum, suppingue, insup adstrin-
gens, & olfactu, deuorationeq̃ magnum uirus olens, ita ut stomachus
in uomitiones effundatur. Quod autem friatum scintillas Misyos mo-
do non emittit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est.
Vim & uestionem supradictis similem habet. Dolori dentium, cauernis
inditum medetur. Labantes firmat dentes. Ischiadicis ex uino infusum
auxiliatur. Illitum cum aqua uaros extinguit. Medicamentis ammisce-
tur, quæ capillos denigrant. Hæc autem fere omnia quæ uestionem ex-
perta non sunt, perustis ualidiora esse existimantur, præter salem & ui-
ni fecem, nitrum, calcē, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Com-
busta enim uiribus efficaciora redduntur.

sōρυ

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

C Sory Cyprium oculis utilius, cætero superatur ab Aegypto: alterius nationis Sory, q̄ Aegyptium. Si teratur, splendet. Sory crassius est q̄ Misy. Chalchitis mediā inter ea qualitatē habet. Galenus auctor. Describitur Sory a Democrito, ceruleum, scabrum, semper inueniri solitum in ipso Misy, uocatum ab aliquibus Calchanthum uiride.

E X M. V E R G. C O M M.

Hoc est Sory illud nō, multo ante dictū a nobis in Chalchithite cōtineri. Quodq̄ ea iūctura fieri etiā Plinius ait, satis ab hoc & ab eo descriptū, ideoq̄ non dicendū a nobis iterū, neq̄ ex scriptoribus antiquis repetēda ad Soreos huius historiā modo quæ in illis, præsertimq̄ Plinio parata oibus, & exposita sunt. Docet em̄ ille longius genera, bonitates, ususq̄ eius oēs.

De Diphryge.

C A P. CXL.

Diphrygis tria genera esse credūtur. Quoddam enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur. Lutosum namq̄ desertur, ex luto cuiusdam inibi regionis, postea delatum, sole siccatur, mox circumpositis sarmentis uritur. Diphryges ideo uocatum est, q̄ & a sole, & a sarmentis uratur, arefcatur, & ferme torreatur. Alterū perfecti aeris, quasi subfidens fex est. Siquidem post frigida aquæ offusione, ut supra retulimus, cum de flore aeris differeremus, sublato ære fornacū ima parte cohærēs id genus inuenitur, & adstrictionem, & gustum aeris habens. Tertium sic fit. Lapidem Pyriten, ut calcem cremant, in camini aliquot diebus, cumq̄ colorem rubricæ contraxerit, eximētes recondūt. Quidam tradunt ex sola materia lapidē aeris gignente fieri, quoties in dictis areis assata, & in scrobibus translata peruratur. Tunc enim ambientem scrobis locū comprehendit, & exemptis lapidibus æquale nihil inuenitur. Præfertur quod saporem aeris reddit, rubiginosum, adstringens, & linguam uehementer excicans. Quod sibi exusta ochra non uendicat, quæ cremata Diphrygis uice uenit. Vis eius adstringere, perpurgare, ex crescentia consumere, ulceras serpentina, & quæ cacoethe uocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes terebinthina, aut carato exæptum discutit.

Pli. li. 34. ca. 17.

B A R B A R I C O R O L L.

Quatuor habent, qui Aes perficiunt, Aes, Scoriam, Florem, Diphryga. Aes ipsum in catino defluit, Scoria extra fornaces, Flos supernat, Diphryges remanet, auctor Plinius. Quidam perhibent in fornacibus globos lapidis qui coquantur, ferruminari: circa hunc Aes feruere: ipsum uero non percoqui, nisi translatum in alias fornaces: & esse nodum quendam materiae, id quod relinquitur ex cocto, Diphryga uocari.

E X M. V E R G. C O M M.

EAdem huic scriptori Diphrygis Plinio undiq̄ historia est, nec quicq̄ ab eo felicius simul & breuius ex hoc scriptore redditū aliquādo fuit. Locus est. 34. uolumine, capite. 17. Diphryges em̄ uocari ab eo, q̄ bis torreatur, inquit. Triplicem eius originē esse. Fieri ex Pyrite primū lapide in fornacibus cremato, donec in rubricā excoquatur. Fieri itidem in Cypro ex luto cuiusdam antri arefacto prius, mox paulatim circumdati sarmentis excocto. Fieri postremo in fornacibus subsidente aeris face. Differentiam esse: q̄ Aes in catino defluit, Scoria extra fornaces, Flos supernat, Diphryges remanet. Addidit præterea, tradi a quibusdam ferruminari globos lapidis, qui in fornacibus coquuntur: circa eos feruere æs, ipsos uero non percoqui, nisi in alias fornaces translatos, & esse nodū quendam materiae: idq̄ quod excocto superfit, Diphryga uocari. Ex quibus ratiocinari facile est, quatuor ærarijs in coctura aeris redire res, æs, scoriam, florem, & diphryga: quos quemadmodum non dissimiles, sic non penitus æquales uires in medicina sunt. Nosq̄ ex antiquo scriptore hīsdem uerbis commentationibus nostris illa adiecimus: ut scirent primum legentes, recepta a latinis scriptoris huius decreta fuisse, mox ha-

berent uolentes inueniendi & colligendi Diphrygis a Plinio tradita certiore ratione.

A

¶ De Auripigmento. CAP. CXII.

Auripigmentum in eisdem metallis, quibus Sandaracha gignitur. Optimū existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materiae permixtum, fissile. Quale Mysiae & Hellesponto nascitur. Huius duo genera fluxerunt. Vnum supra dictum est. Alterum glandis effigie, pallidum, & colore Sandaracham imitans, glebosum. Ex Ponto & Cappadocia defertur. Secundum locum tenet, has nactus dotes. Torretur in testa noua, uiuis carbonibus subiectis. Assiduoq; uersat, donec igne flagret, & mutet colorem. Deinde refrigeratum, tritumq; reconditur. Vim habet adstrictoria & erodentem. Crustas cum uehementi punctione excitat. Reprimit quae excrecunt, & capillos euellit.

B A R B A R I C O R O L L.

Arsenicum, siue Arrenici tria genera. Coloris in auro excellentis. Alterum pallidius, & Sandarachae similius: quod sit deterius. Tertiū quo miscetur aureus color Sandarachae, quasi ex prioribus duobus iunctum. Vtraq; haec squamosa: illud uero siccum, purumq; gracili uenarum discursu fissile. Arsenicum nos, & Auripigmentū uocamus: ut Paulo, & Vitruuio, & Plinio, & Celso placet, Democriti Chymistae Androdamanta quandoq; hoc appellant. In Carmania duos haberi montes Onesicritus tradit, alterum Arsenici, alterum Salis.

E X M. V E R G. C O M M.

Auripigmentū in pingendo adhuc usus aliquis est, ex quo Romani quondam illi nomen fecerunt, utunturq; eo nunc passim in pingendis librorum frontibus bibliopolae. Accessit nostra aetate etiam, qui antiquioribus, ut credimus, nullus erat alius Auripigmenti usus. Tritū enim, pediculosos accipitres suos aucupes inspergunt, praesentia contra eā labem remedio. Duplex eius genus hic fecit. Alterum quod fulgore auri splendet. Alterum quod *σανδαριχία* uocauit. Significatq; ea uox, ut omnes uertimus, quod glandis formam & speciem habet. Non tamen respondere his quae sequuntur id uidetur. Qui enim potest aliquid glandis figura esse, quod glebosum paulopost dicitur. Ob eam causam suspicati sumus, ad colorem posse eam pertinere uocem: & eum quidem puniceum, qualis non in glandibus simpliciter, sed qualis in maturis palmulis est: quas graeci cōmuni aliarum glandium nomine Balanos aliquando uocant: ut primo cōmentario in Palmulis & Balanis testati sumus. Vbiq; enim & passim coloris hoc discrimen in Auripigmento uidetur, praecipueq; in pingendo apparet: quo tempore dilutum humore aliquo ad eam rem necessario puniceum illum quem diximus colorem representat. Facitq; ad hoc quod coniunctum illi statim est *σανδαριχία*, id est, colore Sandarachae, cuius color flammeus & rubens describitur. In hanc partem diu inclinauit animus nobis, & adhuc propensiores sumus. Nihil tamen contra aliorum interpretum aeditiones mutare in re non satis certa uoluimus.

B

¶ De Sandaracha. CAP. CXIII.

Sandaracha probatur ruffa, & aliena materia uacans, friabilis, Cinabaris colore, sulphuris uirus redolens. Dos eadē & uestio, quae Auripigmento. Explet alopecias, resina excepta. Scabros ungues eximit. Contra phthiriasin ex aceto efficax est. Tubercula cum adipe discutit. Prodest ad narium orisq; ulcera, & ceteras papularum eruptiones cum rosaceo. Item condylomata. Datur ex mulso purulenta ex tussientibus. Sufficit quoq; cum resina, aduersus ueterem tussim, rapto per fistulam nidore. Vocem expedit, cum melle delincta. Suspiciosus cum resina in catapotio, optime datur.

σανδαριχία

D I O S C O R I D I S

C B A R B A R I C O R O L L.

C Sandaracha inuenitur & in insula rubri maris Topazono: ut Ochra. Sed inde ad nos importari negant. Inuenitur autem & in aurarijs, & argentarijs metallis: ut in Paphlagonia Pimolifeno tractu, urbe Pompeiopoli. Sed & in Scythia proxime flumen Hypanin optima. Fit & adulterina ex Psimythio, in fornace cocto: idque incendio facto ex casu repertum est. Colos esse debet flammeus, precium in libras asses quini. Vitruuius multo meliorem usum praestari ex ficticia, quam ex fossili Sandaracha pictoribus existimat.

E X M. V E R G. C O M M.

D Vplex quondam graecis & latinis scriptoribus cunctis Sandaracha fuit. Metallica pluribus locis fossilis, ut testati Plinius, Vitruuius, pluresque alij sunt: qui ad Hispanim Scythiae fluiui optimam omnium inueniri tradiderunt. Ficticia deinde & adulterina, quae ex cocta cerussa fieret. Illa apud medicos, hac pictores felicius usi sunt. Auripigmento aequalem in censu remedium uitae graecorum medici eam fecerunt, discutiuntibus & repurgantibus medicamentis eam miscentes. Cerussae substantia Sandaracha est: indicatque id Vitruuius septimo suae architecturae commentario, dicens. Cerussa uero cum in fornace coquitur, mutato colore ad ignem incendij Sandaracha fit. Id autem incendio facto ex casu didicerunt homines, & ea meliorem usum praestat, quam quae de metallis per se nata foditur. Et haec Vitruuius. Plinius addidit, flammeum debere in ea esse colorem: & si haec ipsa torreatur, aqua parte admixta rubrica, Sandycem fieri: qui ueteribus poetis, praesertimque Maroni color notissimus est. Et si crediderunt aliqui herbam Maroni Sandycem esse cum cecinit, Sponte sua Sandyx pascentes uestiet agnos. cum tamen id nullam eius intellectus necessitatem habeat. Quod enim ab eo dicitur est, fore eam tunc felicitatem, ut sponte sua colores in ouium uelleribus nascantur, & inter pasendum agni colorentur: neque id pastu Sandycis futurum, sed quod nos credimus, colorem Sandycis contrahendum simpliciter ab eo dici.

De Alumine.

C A P. CXIII.

59718/12

O Mne Aluminis genus fere in Aegypto, & eisdem metallis inuenitur. Est enim scissile quoddam, quasi flos sudorue eiectionis terrae. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardoniam, Hierapoli Phrygiae, Aphrica, Armenia, & plarisque alijs regionibus, Rubricae modo. Plurimae eius species, uerum ad medendi usum scissile, rotundum & liquidum expetuntur. Optimum est scissile, praesertim recens, candidissimum, gustu perque adstringens. Calculorum expers, nec glebulose, aut assulose compactum, sed sigillatim in capillamenta quaedam canescentia dehiscens. Quale est quod Trichitis, quasi capillare nominatur, in Aegypto natum, Reperitur quoque lapis huic Alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, quod non adstringat. Damnat in rotundi genere, quod manu confectum est. Sed ex figura deprehenditur. Assumendum aut suapte natura rotundum, bullis turgens, alio propius, atque ualidius adstringens. Praeterea non nihil palloris cum quadam pinguedine praeseferens, sine harenis, friabile, natione Aegyptium, aut ex insula Melo. Liquidum probatio, ut sit lymphidum, lacteum, aequale, & semper succo madens, sine lapidibus, atque quendam caloris igniculum expirans. Vim habent ex calfaciendi, stringendi, sanandi, & expurgandi, quae caliginem pupillis oculorum offundunt. Genarum carnem, caeterasque excrescentias extenuant. Scissile rotundo efficacius intelligitur. Vri & torreris Chalcidis modo debent. Putrescentia ulcera coepescunt. Sanguinis fluctiones inhibent. Gingiuas humore praegnaes comprimunt. Motus dentium cum

aceto et melle firmant. Profunt cum melle ulceribus oris, eruptionibus papularum, & fluctionibus aurium, cum sanguinalis hærbae succo. Lepis conueniunt cum brassicae folijs, aut melle cocta. Item pruritui & unguium scabrie, pterigijs & pernionibus, aspersa cum aqua. Valent cum aceto, faece & galla, pari pondere cremata, ad phagedænas ulcerum, & cum salis duabus partibus, ad uicia quæ pascunt. Fursures cum eruo & pice illita abstergunt. Ad lendes, pediculos, ambusta, cum aquæ illita auxilio sunt. Contra tumores, et graue alarum inguinumque uirus, illinuntur. Ex melo autem aduectum, mulieribus præstat ne concipiât, ante coitum ori uulua inditum. Partus quoque extrahit. Gingiuis si caro excreuit, uua, ac tonsillis accommodantur. Auribus & uerendis cum melle illinitur.

BARBARI COROLL.

Alumen Græcis ab astringendo Stypteria dicitur. Qui uolunt hoc exprimere, salsuginem terræ finiunt. In Cypro candidum, & nigrum, exigua coloris differentia, cum sit usus magni: quoniam inficiendis claro colore lanis, pellibusque, candidum liquidumque utilissimum est, contra fuscis, atque obscuris nigrum: ob id Byrsodepicon utrumque cognominatur. Et aurum nigro purgatur. Fit autem omne ex aqua limoque, hoc est, terræ exudantis natura, corruat hyme. Solibus æstiuis maturatur. Quod fuerit ex eo præcox, candidum efficitur. Laudatissimum in Aegypto Alumen: proximum in Melo. Quamquam in medicina Aegyptio prælatum. Nascitur & in Hispania, & Ponto, & Strongyle insula. Phorimon uocatur liquidum, cui notæ optimi respondere. Quod an sit adulteratum, deprehendit succo punici mali. Sincerum enim mixtura eius nigrescit. Est & genus alterum, quod Paraphoron uocant, pallidæ, & scabrae naturæ, & quod inficitur galla. Concreti uero Aluminis genus id quod Trichitim appellauere: fieri arbitrantur ex lapide, propterea & Chalcitim uocant, quem Hippocrates Meliada, quia sit e Melo, nominat: ut sit sudor quidam eius lapidis, in spumam coagulati. Strongyle duas habet species. Fungosum, atque omnium ore dilui facile: quod in totum reijcitur. Melius pumicosum: & foraminum fistulis simile spongiae: nec inficiens nigritia. Optimum ex omnibus rotundis, Melinon. Aluminis, ut breui comprehendam, sex habentur Galeno summa genera. Scissum, siue scissile. Rotundum, Astragalites, hoc est, talare. Hygron, id est, liquidum. Placitis, & Plinthitis, hoc est, crustarium. Et Latercularium. Alumine prælita non incenduntur: id quod & obfusione Athenarum sub, L. Sylla Quadrigarius compertum scribit.

EX M. VERG. COMM.

Quæ sit uniuerso Aluminis præcipua dos & uis, nomen indicat. Ab astringendo enim quæ multam & egregiam potestatem habet, græci Stypteriam uocauerunt. Longe plura quam hic discrimina eius & genera Galenus & Græcorum medici alij numerauerunt: monstrante, ut par est, quotidie nouum aliquid natura, & adijciente antiquorum inuentis experientia quod ab illis nondum inuentum, aut obseruatum fuerit. Ea nos in scriptoribus illis cognoscenda relinquimus. Scriptori huic tantum inferuientes, qui a principio statim dicens esse Alumen scissile, *ἰσχυρὸν τὸν βολιδιδὸς ἄνθος*. Quod ab alijs, nobisque pariter ueluti glebosi flos uersum est, non leuè suspicionem nobis iniecit, potuisse quodam aliter legi: quoniam in toto Aluminum censu nulum Bolitidis nomine indicatur. Præterea glebæ *βῶλον* græci dicunt, & *ω*, littera scribunt. In cunctis autem, quos hactenus uidere licuit, scriptoris huius græcos codices, *o*, paruo uox illa legitur. Accessit his Plinius etiam lib. 35. cap. 14. de scissili Alumine hoc his uerbis agens. Concreti Aluminis unum genus Schiston, id est, scissile græci appellant, in capillamenta quædam canescentia dehiscens. Vnde quidam Trichitim potius appellauere. Hocque fit ex lapide: ex quo & id Chalcitim uocant: ut sit sudor quidam eius lapidis in spumam coagulati. Hæc nescio quomodo historiae & uocibus scriptoris huius respondere omnia uidentur. Id quidem in confesso est, de eodem scissilis Aluminis genere ambos agere. Potuitque hic florem, quem ille sudorem nominat, dicere. Et si id sit, non sine ratione dubitauerit aliquis, Bolitidē scriptoris huius in Chalcitim Plinii mutandam esse: qui Chalcitim uocari alumen etiam hoc ait, & ex lapide fieri sitque.

D I O S C O R I D I S

C ueluti sudor quidam eius lapidis in spumam coagulati. Hoc nos monemus, eruscandæ ueræ lectionis & inueniendæ rei non contemnendam occasionem hanc legentibus porrigentes.

De Sulphure. CAP. CXV.

Sulphur optimum existimatur uiuum, quod Apyron uocant, niter dulæ modo splendidum, perlucens, minime lapidosum. Probatum in genere Sulphuris ignem non experti, quod uiret ac præpingue spectatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur. Supradictum Sulphur calfacit, discutit, & celeriter concoquit. Prodest tussibus, suspiriosis, purulentis extussientibus, in ouo sumptum, aut suffitum. Præterea partus, uisti nidore extrahit. Lichenas, scabros ungues, cum resina terebinthina mistum, aufert. Cum aceto autem illitum, ad lepras efficax est. Vitiligines tollit. Scorpionis ictibus addita resina medetur. Cum aceto uero, draconis marini, scorpionisq; plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpentes, cum nitro detersum sedat. Regium morbum emendat, insparsum fructi cochlearis mensura, aut in sorbili ouo sumptum. Facit ad grauedinē, & destillationes. Sudores quoq; conspersum inhibet. Podagricis cum aqua & nitro illitum, conducit. Grauitatē auditus, suffiti nidore raptim per fistulam hausto, sanat. Lethargicos suffitu excitat. Erumpentē undecūq; sanguinem sistit. Fractis auribus cum uino & myrrha illitum medetur.

BARBARICOROLL.

Pli. li. 35. ca. 14.

Sulphur Græce Thion, nascitur in insulis Acolijs, inter Siciliam, & Italiam, quas ardere cernimus. Nobilissimum in Melo. Sed & Neapolitano, Campanoq; agro collibus: qui uocantur Leucogæi. Libyæ cuniculis effossum, curatur igni. Genera quatuor. Viuum, hoc est, Apyron, siue ignes non expertum: gignitur solidum, id est, glebosum, eoq; uno ex omnibus generibus medici utuntur: cetera liquore constant, & perficiuntur oleo incocta. Viuum effoditur, transfluitq; ac uiret. Alterum genus appellant Bolon. Quidam pro Sulfure tantum crudo Bolō capiunt. Tertium uocat Egnia, cuius unus dūtaxat usus, ad suffiendas lanas fullonū officinis, quoniam candorem mollicieq; confert. Quarto utuntur ad Ellychnia maxime conficienda: ex eo Cautō uocant. Ceterum tanta ei uis est, ut morbum fonticum deprehendat nidore. Lusit & Anaxilaus eo, condens in calice nouo, prunæq; subdita circūferens, exardescens percussit, pallorē dirit, uelut defunctos effundente conuiuis. Harpacticon, siue Harpax appellat in medicamentis, a celeritate uel lendi. Habet & in religionibus locum, ad expiandas suffitu domos. Sentitur uis eius & in aquis feruentibus. Neq; alia res facilius accenditur. Fulmina quidem, & fulgura Sulfuris odorē habent. ac lux ipsa eorum sulfurea est. Porro sulfur in uenis terræ ceu decoctus quidā adeps est, tam ualida & firma confusione partium, ut oleū eius arte nulla separari possit in rebus ceteris. Propterea cum oleacea, & ignea, non sulfurea sit eius natura, haud facile diluitur. In spiritum, siue nebulam facit. Sunt hæc chymistis notissima, non aliud magis in conficiendo auro commendatibus, quæ Sulphur: quippe quod splendorē, & colorē metallis afferat: ut corpus, & materiā hydrargyros: proindeq; sit maris uice Sulphur, Hydrargyros uero, id est, Argentum uiuum foemina: ut Democritus propterea omnis generis metallici spumam esse Argentum uiuum prodiderit. Duobus igitur, phar-macum illud famigeratum potius quæ compertum etiam, Philosophici lapidis nomenclatura nobile. Conficitur ab Osthane, Mercurio, Chane, Zosimo, Agathodæmone, Democrito. Quamq; & alij scripserunt de miris, ne dicā figmentis huius peritis, Orus, chrysorychites, Pebichius, Comerius, Ioannes, Apuleius, Petasius, Pelagius, Africanus, Theophilus, Synesius Olympiodorus Alexandrinus: recentiores igitur Stephanus ad Heracleum Cæsare, Heliiodorus ad Theodosium. Iam foemina. Cleopatra uirgo, Taphnutia, quæ minus probat, & Iudeæ gentis Maria, quæ plurimi sequuntur. Auctores igitur, occultæ rei gratia, nihil fere suis nominibus appellat: ut ipsam Sulphuris, & Hydrargyri, fuliginē Argyrion nama, hoc est, Argenteum fontē dicant, Alsemon uero, fuliginis eius ferruginē.

EX M. VERG. COMM.

Fecerunt Sulphuris quatuor alij genera, quæ ut græcos omittamus, a Plinio. 35. suæ historiæ commentario cap. 14. suis nominibus, notisq; priuatim indicantur & numerantur: hic duo tantum: alterum ignem non expertum, quod uiuum nominant: alterum uero quod igne confectum fuerit. Diuersitatibusq; eius non alia fuit causa, q̃ q̃ cæteri pluribus locis & multiplex nascens Sulphur, quale in plerisq; artibus & uitæ necessitatibus aliquot quæsiisse id oporteat, docet: hic medicinam tantum tractans, ex omnibus generibus uiuo, & ignem non experto illo præcipue indigebat. Eo enim medici plerumque utuntur: quoniam natua, & sua uis efficacior illi quam cæteris est. Eamq; ob causam in uniuerso Sulphure una illa differentia merito usus est. Græci *ἀπυρον* uiuum illud uocant, non alia uocis indicatione q̃ q̃ igne careat. Celsus libro 8. to, cap. 18. altera nota idem indicauit, Sulphuris ignem non experti quod *Apyron* uocatur, dicens. Maro contra Georgicorum suorum. 3. commentario, in pecoris medicina uiua Sulphura appellauit. Contrarium uero illi alterum genus idem græci *πυρροῦλεν* uocant, igne incoctum intelligentes. Quotidianus, & numerosus inter homines Sulphuris usus est. Indiget em̃ eo plærq; artes. Indiget & ad quotidiana igniaria, expiationesq; domus: sed nullibi utilius q̃ in morbis, quibus numero multis, & periculo grauib; medet. Quæ omnis ratio ab hoc scriptore, & quo paulo ante diximus loco, a Plinio copiosissime tractata, reperti a nobis inutiliter non debet.

De Pumice. CAP. CXVI.

Pumicis probatio, ut magnopere leuis, spongiosus, teri facilis, nec harenosus, item fragilis, & candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus, et ubi canduerint, extractus, uino restinguitur odorato. Iterumq; incensus extinguitur: & tertia uestione exemptus, & per se refrigeratus, ad usum conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere. Purgat cum calfactione, quæ caliginem pupillis offundunt. Explet ulcera, & ad cicatricem perducit. Excrescentia cohibet. Fit ex farina eius dentifricium. Corpori crustam obducit. Auellendis capillis aptus. Theophrastus autor est, si quisq; in bullientem urseum uini Pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

BARBARI COROLL.

Pumicis farinam, potores in certamine bibendi præsumere, sed nisi uniuerso potu impleantur, periclitari Theophrastus autor est: qui & Eudemum pharmacopolam, in uigilias secundas uices durasse scribat. Ingressumq; balneas, nihil omnino reiecit: sed quasi non bibisse, ita coenitasse, Pumice uidelicet, ab septima statim potione hausto, primum ex aceto aspero, mox ex uino. Ut errauerint qui locum eum in Theophrasto de uiginti duabus Ellebori portionibus acceperunt, cum ex Plinio id facile deprehendi possit. Pumice in musti cados addito, non ad præsens modo, sed in totum feruere uina desinunt ui sicifica. Pumicis duo significatus. Alter notus omnibus. Altero dicuntur ita & cætera saxa erosa annis, qualia in ædificiis, ut Plinius inquit, Musæa uocant dependentia, ad imaginem specus natiui arte reddendam. Nunc inde Musæica uulgo nominantur, preciosissimis dicata templis. Inuentum id Agrippæ quidam referunt accepit. Huiusmodi operis artifices Musæarios Cassiodorus, & Iustiniani leges uocant, etiã si musæarios corrupte multi lætent. Amianus Marcellinus, Musiciū opus nominat. In uitis cæsari, quas ab Adriano Iulius Capitolinus, & alij complures scripsere, pictura de Musæo nominat, etiã si mendose legebatur, de musco. Laudatissimi Pumices sunt in Melo, Scyro, Æolijsq; insulis. Probantur teri faciles. Poliendis libris accommodatur: unde Repumicatos appellamus. Pumex græce Cisseris uocat: qd nomen aliud nihil significat, q̃ erosum. Etem uermiculus triticarius, et ordearius Cîs dicit, ut ips cornicularius, Trips lignarius, Sis uestiarius, Ix nitarius, si Photiōi grāmatico fides habenda est. Pumicem ueteres etiã spongiā uocabant. Nā & e maris quoq; spuma coalescit aliqñ: itemq; ex arena littorali: ut in insula Cyclade Nisyro. Vitruuius, quæ nūc inquit, sub Vesuuio monte Spongia, siue Pumex Pompeianus uocatur, ex cocto alio genere lapidis, in hac redactus uidetur generis qualitatē. Talis autē Pumex inquit, & circū AEmant gignitur, & collibus Myliæ, qui catacecaumenos a græcis, hoc est, deustus appellatur. Talis &

A

uicarij

B

Pl. li. 36. ca. 16

li ij

D I O S C O R I D I S

C Lipareus est, ut inquit Theophrastus: alioquin anteq̃ uratur, niger, leuis, atq; factus. In Meso quoq; insula, idem autor est, Pumices quandoq; in altero gigni lapide: ponderosum, & nigrū esse Siculum: qui & cæteris præfertur.

E X M. V E R G. C O M M.

C Redimus scriptoris huius Pumici ab aliquo, qui omnem eius historiam eodem loco habere uoluerit, accreuille quod in extremo capite ex Theophrasti. 9. de plantarum historia acceptū legitur. In uetustioribus enim græcis nulla est ea pars, neq; in medicina necessitatem aliquam habet. Nec Dioscoridis etiam historię, decretisq; omni ea reiecta parte nocuerit aliquis. Retulit id Theophrastus quo diximus loco: acceptamq; ab eo rem eam omnem Plinius etiam docuit, 36. uolumine, cap. 16. quo loco tractata itidem omnium Pumicum historia & medicina, scriptoris huius decretis omnibus subscribit: additisq; aliquibus, cōstitutæ, usuiq; Pumicum non parum profuisse uidebitur. Nos breuitati consulentes, ea relinquimus: monemus tamen omnes, non fore inutilem eadem hæc in eo scriptore legentibus operam. Aut si Plinium audire noluerint, Barbarum saltem uisere, in quo omnia ex Plinio h̄isdem uerbis tradita leguntur. Notissimus nunc etiam omnibus Pumex, a græcis Cissaris, ob fistulosas concauitates quas habet, nominatus. Cis enim ab eis dicitur, qui in tritico & hordeo cum referbuerunt, nascitur uermis. Cui natura est, semina illa cuspidē potius, q̃ ore quam habet exiguis foraminibus terebrare: quibus foraminibus quoniam similis sit fistulosus ille Pumicum habitus, quasi ab his uermibus perforatus fuerit, Cissaris Pumex dictus est.

De Sale. C A P. C X V I I.

S Al fossilis efficacior est, communiter si est candidus, calculis uacās, & perspicuus, densus, æquali compage. Peculiariter Amōniacum genere laudatur, si modo findi facile possit, rectisq; segminibus diduci. In marino Sale eligendus est cādidus, æqualis. Probatissimus in Cypro fit, & Salamīne Cypri, & Megaris, in Sicilia & Aphrica. Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur: sed multo ualidissimus est Phrygius, nomine tapeus, ut tritæus, aut gantæus. Salis natura, in commune p̃ q̃ utilis est. Adstringit, abstergit, expurgat, dissipat, reprimit, extenuat, & crustas inducit. Sed hoc interest, q̃ alius alio sit præstantior. Quin & a putredine uindicat. Ammiscetur medicamentis p̃foras abstergentibus. Excrecentia in oculis reprimit, & pterygia cōsumit. Cæterasq; carnis extuberationes tollit. Clysteribus infunditur. Discutit lassitudines ex oleo illitus. Contra hydropicorum tumores auxiliatur. Dolores in saccis fotu mitigat. Et pruritus sedat, ex oleo & aceto infrictus, donec ad ignem sudent. Item lichenas, lepras, p̃forasq; Anginam ex melle, aceto, & oleo illitus leuat. Tonsillis, uuaq; cum melle tostus, ulceribus in ore manantibus, gingiuis quas humor uexat, & phagedænis ulcerum cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus cum lini semine. Contra serpentium morsus cum origano, melle, hyssopo. Aduersus ceraſten cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur. Contra scolopendrę morsus cum melle & aceto. Aduersus uesparū ictus, & crabrones, albidasq; capitis pustulas, thymos, & tubercula cum seuo uitulino. Furunculos cum uua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumores cum origano & fermento maturius concoquit. Crocodilorum morſibus auxiliatur, tritus in linteolo & intinctus aceto, ita ut uinculis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in fa-

cie, ex melle. Contra haustum opium & fungos, cū aceto mulso bibit. **A**
Luxatis imponit cum farina & melle. Ambustis igni cum oleo impositus, pustulas erumpere non patit. Podagricis iidem imponitur, & aurium doloribus cum aceto. Ignēs sacros & ulcera quæ serpunt cum aceto, aut hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter opertus, conditusque prunis, usque dum efferuescat. Aliqui fossilem subacto polline, obliniunt, & carbonibus subijciunt, usque dum pollen exuratur. Solet & sal communis eodem modo uri. Sed aqua semel abluitur & siccatus in ollam cooper tam mittitur, subdito igne, moueturque donec iam non exiliat.

BARBARI COROLL.

SAL omnis, græci halas uocant, Panaceam Lucretius, a remediorum multitudine. Aut fit, ut palustris, & maritimus: aut gignitur, ut fossilius: utrumque pluribus modis, sed causa gemina. Coacto humore, aut siccato, siccatur in lacu Tarentino. Item lacu Cocanico, in Sicilia, & alio iuxta Gelan, & Pachynum, tanti splendoris, ut sentiat imaginem. Item in Phrygia, Cappadocia Aspendi, ubi tantum noctu subuenit, quantum in rerdiu auferas. Omnis est alius Sal minutus, atque non gleba. Lacus duo in Baetris sale æstuat. In Cypro, Cittieum, ab oppido id nomen. Extrahit & Memphi, e stagno: dein sole siccant. Apud Caspias portas, quæ Salis flumina appellantur, superficie densantur in salem, amne reliquo fluente uelut sub gelu. Itē circa Mardos, & Armenios, & in Baetris amnes Ochus, & Oxus, ex appositis montibus deferunt Salis ramēta. Lacus in Africa, & quidem turbidi, salem ferunt. Calidi quoque fontes, sicut Pegase, Oromenus, salis mons natus est apud Indos, in quo ceditur renascens, magno uetigali Regū. Caris Arabiæ oppido muros, domosque massis salis faciunt, aqua ferruminantes. Inuentus & iuxta Pelusium, inter Aegyptum quoque & Arabiam etiam per Africæ squalētia detractis harenis, usque ad Hammonis oraculum, qualis crescere affirmatur cum luna noctibus. Hammoniacus tractu Cyrenaico celeberrimus, sub harenis, unde nomen, similis est colore alumini fissili, longis glebis, neque per lucidis, ingratus sapore, sed medicinæ utilis, leuissimus, intra specus suos in lucē uniuersam prolatus, uix credibili pondere ingrauescens. Adulteratur cocanico & cyprio, mirē simili. In Hispania citeriore Egelesse, ceditur glebis pene translucentibus, cui sampridem palma a plerisque medicis tributa. In Medis Atropatena regione, stagno cui Spautā est nomen, sal coit, pruritus & dolorem tactu ciens. Remedium, oleo inungere. Omnis locus in quo reperitur sal, sterilis est. Vulgaris plurimus in salinis, mari affuso, non sine aqua dulci, sed imbre maxime ut uante, ac super omnia sole multo. Africa circa Vīcam, construit acervos salis ad collium speciem: & in agro Rauēnati, Ceruia: ob id, ita ut puto, nominata, quali Aceruia: qui sole & luna indurati, nullo humore diluuntur, uix ut ferro cedi possint. Fit tñ & in Creta, sine riguis aquæ dulcis, & in Aegypto. Fit & puteis in salinas ingestis. Prima densatio Babylonie, in bitumē liquidum cōgit oleo simile, quo et in lucernis utunt. Detracto subest sal. Et in Cappadocię puteis, ac fonte quem in salinas ingerunt, ubi & specularium modo lapidum effodit, magno glebarum pondere: quas uulgo Micas uocat. In Chaonia excoquunt aquā ex fonte, refrigerandoque salē faciunt inertem, nec candidū. Galliæ, Germaniæque aquam salfam lignis ardentibus infundunt. Hispaniæ quadam sui parte puteis hauriūt falsuginem, Muria appellant. Quercus ad id optima, alibi Corylus laudat. Carbo etiā in salē uertit. Quicūque ligno conficit sal, niger est. Umbri harundinū, & iunctorum cinerem excoquūt aqua, donec exiguum super sit humoris. Quin & muria falsamentorum recoquit ad naturam suam consumpto rediens liquore, uulgo e menis iocundissimis. E stagnis maxime laudat Phrygius, Tattæi cognomento: et Tarentinus, quē antiq ad medicinæ usum uehementer probant. Tattæus e Cappadocia, magna Phrygię parte stagno. Tatta Morimenorum gente nascit. Nam q fossilis in Cappadocia sal est, in laterculis affertur. Colopeno et Camiseno tractu multus, ut Straboni placet, sceminis gratissimus, quia cutis nitore faciat. Magis tamen extendit Cittieus. Salissimum Salem putant, q sit sicissimus. Suauissimū esse Tarentinū, eundemque candidissimum. Fragilis quicūque candidus, pluuia dulcescit ois. Suauiorē rores faciunt, copiosum aglones. In igni nec exilit, nec crepitat Acathius, ab oppido ubi nascit uocatus. Nec Tragaseus, ppe Smynthiū in Troade, ab aqs, quę Tragasa dicunt, appellatus: siue ut Iulius Pollux, a Trageo, cui Neptunus agros in Salē uerterit, Licebat hūc omnibus

Pli. li. 3. ca. 7.
& 9.

B

C gratuito colligere. Vectigalem fecit Lyſimachus, obaruit: vectigalibus remiſſis, denuo erupit. Sed nec ullius ſpiritu crepitat in igne, nec rametum, aut tenuis Sal. Agrigeninus, ignis paties, ex aqua crepitu exilit. Rubens Memphi, croceus in Cappadocia, idemq; odoratiſſimus. In Baſtris ruſſus circa Oxum Ceturupis, et in Aetna purpureus, & in Luſitania, ut inq; Strabo, purpureus albet. Iumentorū, & boū oculis Tragafeus, & Beticus pſerf. Ad obſoniū, & cibū utilior quiſq; facile liqueſcit. Item humidior. minus em amari ſunt, ut Atticus, & Euboicus. Seruadis caribus aptior Megaricus: qm acer, & ficcus eſt. Condit Sal odoribus, quo & pulmentarij uice uſi ueteres. Adeoq; neceſſariū elementū eſt, ut tranſierit intellectus ad uoluptates animi q; . Nam ita, ut inq; Plinius, Sales appellant. Hinc dicta falſa, & uia ſalaria: qm ea ſal ad populos portari conſueuiſſet. Ancus Martius ſalinas primus inſtituit, & populo congiarium e Sale dedit. Sine Sale, hoc eſt, mola falſa, nullū ſacrū fiebat. Caunites efficax i collyria, Tebaicus ad prurum. Laudat & a Sodomis Galeno. Sal, uitrū, atq; nitrū, ſulfuri cōcōtū, in lapidē uertit. Cornea piſcatō corpora dicunt, qā ſole, & ſale obduruerūt. De Agrico ſale mentionē in Columella inuenias: niſi p gñe nitrī capiat, qd Agrion uocari docebimus: haud ſcio pterea qualis ſit.

¶ De Spuma ſalis. CAP. CXVIII.

ἁλὺν ἀχνη

Halos achne ſpumofis ſalis ramentum, in exilibus petris inuentum, cui uis eadem quæ ſali.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 31. ca. 7.

Halofachne ſalis genus, & hoc ſponte natum, ſpuma ex aquis maris in extremis littoribus ac ſcopulis reſicta. Hæc enim omnis rore denſatur, & eſt acrior quæ in ſcopulis inuenitur. In igni nec crepitat, nec exilit. Ad omnia in quæ ſales, probatur: ſpuma iocundior & utilior, Haloſachnen uocant, & unum e quinq; Alcyoniū generibus.

EX M. VERG. COMM.

Satis ſciſpam ſolo nomine cōcreſcens in littoralibus petris, & in mari ſcopulis, fluctuū aſpergine, ſalis lanugo potius q̃ ſpuma indicat. Plinius Spumam. 31. uolumine, cap. 7. appellat, ex propria achnes in græcis ſignificatione. Hic tamen ἁλὺν ἀχνη eam eſſe dicens, lanuginem magis, cum iam in ſaxis concreuit, deſcribere uidetur, ſacilem cognitu & inuentu rem.

¶ De Muria. CAP. CXIX.

ἁλὺς

DMuria effectus ſalis præbet. Abſtergitq; . Dyſentericis infunditur, etiāſi nome inteſtina corripit. Iſchiadicis ueteribus ad ſorſus, aquæ marinæ uſum præſtat.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 31. ca. 8.

Salſugo, id eſt, Halme, iteq; Muria uocari pōt, q̃q; & aliud genus Murig inter ſales diximus. A Garo differt Halme, etiāſi utrūq; ad piſces Galeno teſte p̃tinet. Garus eſt ſanies inteſtinorum ipſa, ut diximus ſecundo libro. Halme uero muries & ſalſilago piſciū inueteratoz, hoc ē, ius ſalſum in q̃ ſeruant, quā mulieres noſtræ uulgo Salimuriā appellant. Hæc a ueteribus & Salſugo thafia uocari ſolita eſt: ita condebant, inueterabantq; piſces ij, q̃cūq; in pruna et craticula cōmodo coq poſſent. Ob id eos Ariſtophan. Anthracidas, hoc ē, prunarios & carbonarios uocauit. Nos ut arbitror Aleculas. Huiusmodi ſunt Smarides, & Menç. Itē Chalcides, quas & Chalcidicas, & Sardas, & Sardinias q̃q; appellāt. Nā Chalceus. i. Saber, alius piſcis ē orbiculari ſpecie, Cyzici frequēs. Carbonarij ſunt & Trichides, quas & Trichias uocāt. Nā Trichiades ab Ariſtot. dicunt quē Thyñides ſint: quas tñ ipſas, ut Athenęus, qnto de partib. animalū uolumine Trichidas nominat. Eiufdē ſortis arbitror Epſetos, a coquēdo nominatos, q̃s Artemidorus etiā Pleſtos uocauit. Sed in Ariſtot. Theodo. Naricas interpretatus eſt, neſcio q̃ uere. Piſcis certe minutus ē Narica, ut Feſtus inq; . Plautus muriaticā Naricā i uafiſ ſtagneis apportat i comœdia. Illud in tranſcurſu dixerim, Sardinias ab Ariſtot. intelligi nōnunq; eos, q̃ a nōnullis Eritimi uocant. Differūt porro Eritimi, ab Erythinis. Nā Eritimos, ut dixi, ſarda ē, uel ſardē ſimilis. Erythinus autē iſ ē, q̃ a noſtris uocat Rubellio. His gñibus pxime ſunt & Thyſſe, quas Gaza noſter, et ante Gazā Georgius tiphernas, in Strabōe Aloſas, cōi piſciū cū mugili & delphinis Nilo. Sed ita cur uocēt, nondū cōpi. A qbus diſtāt, q̃ Thraſſe ſiue Thraſſe nominant, et a qbusdā Thetæ. Piſciculus et hic puſillus ac uerſicolor. De Aloſis ē qd dubitē, ſint hē q̃s Romanū uulguſ Latinas appellat, Aloſas Gallia & Germania, Culpeas Venetia, in imenſum platīs, quē Tiberino amne capiant; an genus aliud, Athenæus qdem Laton piſcem cōmēmorat, quem Archeſtratus

poëta præstantissimū in Italia nasci cecinit, præsertimq; freto siculo. Hunc in Nilo grandissimū euadere ducentas excedentē quandoq; libras. Esse autē candidissimū, & suauissimū, oibus modis paratū, similem glandi uocato, qui amne Istro capiat. Ex aceto & muria fit, qd oxalme dicitur. Sicut apud Cratinū ex alio & muria Scorodalmē. Qui iocularē quæstionē, siue gryphum in cōuiuio propositū non soluissent, multabantur haustu muria, sed ita, ut in uino paulatim, & cum interpiratione biberet. Apud alios uictis meracū, uictoribus osculū dabatur.

EX M. VERG. COMM.

Pro comperto nobis est, deesse huic capiti uires, potestatesq; illas oēs, quas salū hic idē scriptor paulo ante assignauit. Neq; em̄ uerisimile est, ex tā multis, unā tantū exterēdi scilicet dictā ab eo fuisse. Persuadetq; id non tā antiqua scriptoris huius interpretatio, in qua deinceps multæ aliæ numerantur, q̄ Plinius. 31. uoluminis, cap. 8. plures & ipse numerās, spissare, mordere, extenuare, siccare, & quæcūq; alia hic scriptor toto hoc capite docet; a quo ipsē uerbis oīa reddita sunt. Credimus nos factū id ab aliquo, cui satis esset, in sale ea audisse, laboriq; in scribendo iterū quæ semel scripta fuissent parcens, eas neglexerit. Repetēda itaq; et in hoc caput reuocanda ex sale oēs illę erūt. Barbarus græcorū Halmen Salfuginē uocauit, latioris forte ambitus, q̄ græcorū Halme certa res exigeret, uoce usus. Nos Muria auctoribus Columella, Plinio, Romanisq; scriptoribus alijs appellauimus: qui in medicina, & domestica re Muria semp uocauerūt. Ea duplex ueteribus fuit. Altera, qua in cōditura uini uterent; cuius cōfectionē & usum Columella docuit. 13. uolumine, capite. 26. Altera, quæ dura ab illis uocabatur: cuius cōfectionē & usum idē scriptor eodē uolumine, sed capite. 6. & 7. tractauit: qua in condituris olerū, radicū, pomorū, salgamorūq; omnīū usa antiquitas est. Solūq; hoc genus Halmē Dioscorides uocat: quoniam altera illa admixto sibi melle, nullū nisi in uindemia habebat usum. Eius cōfectio a Columella his uerbis docet. Dolium q̄ patentissimi oris, locato in ea parte uillæ quæ plurimū solis accipit. Id doliū aqua coelesti impleto, ea est em̄ huic rei aptissima: uel si non fuerit pluuialis, fontana dulcissimi saporis sit. Tum indito sportā iunceam, uel sparceā, quæ replenda est sale candido, ut candida Muria fiat. Cum salē per aliq̄ dies uidebis liquefcere, & ex eo intelligis nondū esse Muriam maturā, alium subinde salē tandiu ingeres, donec in sporta permaneat in teger sal, nec minuat. Quod cum aniaduueris, scias habere Muria maturitatē suam. Et si meliorē adhuc uoueris, in uasa bene picata diffundes, & opertā in sole habebis. Omnē enim mureorē uis solis aufert, & odorē bonū præbet. Est illud etiā maturæ Muria experimentū, ubi dulcem caseum in eam dimiseris: si pessum ibit, scias esse adhuc crudā: si innabit, maturā. Et hæc cura antiquorū Muria fuit, qua in condituris salgamorū uillici & patresfamilias utebant. Medicina autē in plerisq; morbis, præsertimq; interaneorū exulcerationibus, & coxædiciis doloribus eadem rōne, qua secundo uolumine in Garo idem hic scriptor monuit: ut exulcerata ad cicatricem perduceret, & quæ exulcerata non essent, ad ducendum ulcus proritaret.

De Flore salis.

CAP. CXX.

Flos salis flumine Nilo defluit. Lacubus tamē quibusdam innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu Gari. Interdum longe magis uirus olet, gustuq; mordacior, & pinguius lentus. Fuscatus autē rubrica, aut scrupulosus, improbatur. Præterea syncærus nō nisi oleo resoluitur. Adulteratur nōnulla ex parte, etiā aqua diluente facticiū colorem. Ad ulcera quæ cacoëthe uocant, & phagedænas, genitaliū nomas, & purulentas aureis efficax est. Oculorū hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. Emplastris, unguentisq; coloris caussa, ut rosaceo, miscetur. Sudorem cit. Aluū turbat in uino, aut aqua sumptus. Stomachū male habet. Additur acopis & smegmatis, quæ albandi capilli gratia componuntur. Et in uniuersum, acris est, & feruentis naturæ, ut sal.

BARBARI COROLL.

Flos salis, id est, Halofanthos, siue Halyanthion, non fit, nisi aquilonibus. Est autē fauilla salis, quæ leuissima: ex eo est & candidissima, in totūq; diuersa res a sale, humidiorisq; naturæ, & crocei coloris, aut rufi. Si fæces imæ concutiant in uasis, uelut rubigo salis

ἄλως ἄνθος

Pli. li. 31. ca. 7.

li. iij

D I O S C O R I D I S

C adulteratur, & testa trita. Florem Salis Cato uocat, qui e populari Sale candidus arte factus sit. Propterea & Alabaſter a Democrito quandoq; dicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Peregrina, nec ſatis certa res Italiae quondā ſalis hic Flos fuit. In Aegypto inueniri ab hoc, & ab alijs dictus, paludibusq; & fontibus quibuſdam innatare. Quo minus demiretur aliquis, nūc in medicina parum cognoſci, & nullum eius eſſe uſum. Salis ueluti rubigo quaedam ab alijs dictus ſalis Flos eſt, quoniam colore ruſſo ſit. Commendabatur tunc, qui olei pinguitudinem quandam redderet. Quod ſane miretur aliquis, ab olei pinguitudine diuerſo penitus ſale. Certiſſime de eo Plinius. 31. uolumine, capite ſeptimo egit: nihilq; nō ab hoc ſcriptore traditum, iſſdem reddidit uerbis. Ob quam cauſam longius de eo non agimus, in ſcriptore eo cognoscenda relinquentes, ſi qua nouiſſe alia de eo aliquis optauerit.

De Nitro.

C A P. C X X I.

νίτρον

Praefertur Nitru laeue, roſeo colore, aut candido, in foramina dehiſcens, perinde quaſi ſpongioſum quiddā. Quale ex Illyrico aſſertur, a Bunioru ciuitate. Humores transfert qui alicubi concreuerunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 31. ca. 10.

Nitrum, Graeci & Litron, uocāt attice. Veteres hoc ignorauere medici. Non multū a Sale diſtat, nec quiſq; Theophrasto diligētius de eo prodidit. Exiguū fuit apud Medos, caneſcentibus ſiccitate conuallibus, uocabant Halmirhaga, minus etiā in Thracia, iuxta Philippos. Sordidum terra, quod appellant Agrion. Omiſſum eſt e quercu cremata fieri, propter impendia. Nitroſae uero aquae, multis locis repta, ſicut & ſulphuroſae, aluminosaeq; ſed ſine uiribus denſandi. Optimū, copioſumq; in Clitis Macedoniae, qd uocant Chalaeſtrici, quo in pane utitur pro ſale: cui & proximū eſt natura, purū & candidū, nitroſo ibi lacu exiliente, e medio dulcis aquae fonte: quo ſemp emicante, nec auget tamen, nec effluit. Ibi ſit Nitru Canis ortu, nouenis diebus. Si fuere imbres, falſius, per aquilones deterius: totidēq; ceſſat, ac ruſus inatat, ac dein de ceſſat. In Aegypto non naſcitur, ſed conficitur fuſcū, lapidoſumq; nitrarijs Nilo inuſo. Siccant excedente eo, decedente madet. Succo Nitri. 40. diebus cōtinuis, non ut in Macedonia ſtans, protinusq; ut denſari eſt coeptū, rapitur: ne liqueſcat. Conditū in aceruis durat in lacu Aſanio, & quibuſdā circa Chalcidem fontibus. Sūmas aquas dulces, et poculentas tradunt: inferiores nitroſas. In Nitro optimū quod tenuiſſimū, & ideo Spuma melior, Aphronitru uocata. Sordidum tantū probat ad inſciendas purpuras, tinturasq; oēs. Nitrariae circa Memphim peiores, ubi & circa Naucratin dūtaxat ſolebant eſſe in Aegypto, nunc multis in eadem prouincia locis egregie uiſunt. Lapidescit circa Memphim, multis ibi tumulis ex eo ſaxeis. Faciunt ex ijs uafa. Liquatū cum ſulphure coquētes, carbonibus ferrumināt in lapidem. Ruſſum ibi exit a colore terrae. Adulterat calce, quod & pungit guſtu, odoremq; reddit uehementē. Synceru uero facile reſoluit. Inueterant ibi Nitro res pro ſale. Igni non exilit Nitrum, niſi e teſta: nihilq; gignit, aut alit. Cum in ſalinis herbae, in mari tantū algae tot anialia naſcant. Nitrariae calciamēta protinus conſumūt. Vlcerā allata, eo celerrime ſanant. Ibi facta tarde. In Nitrarijs, non lippiunt. Aegyptiū teneriores facit Rhaphanos, ſed obſonia alba, & olera uiridiora. Salnitru uocabulo uulgi dicit, pulueri conſiciendo neceſſariū: quo ad bellica tormēta utunt, nouitia, poenitendaq; ac peſſimo publico inuenta. Diuerſum a Nitri generibus exiſtimo, indiētūq; ueteribus, etiamſi locus in Plinio eſt, ubi de hoc gñe loqui uideat. Sed eum nos mendofum credimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Ferunt quondam Nitri pluribus locis non aliter, q̄ aliorū metalloꝝ nitrariae fodinae: aliquibus etiam ſiccatis ſole nitroſis aquis & paludibus fiebat. Et ne longiores ſimus, nullū quale noſtra aetate eſt, ficticiū Nitrum tūc erat: nec eum quem noſtra aetate uſum, in miſſilibus igne tormētis habet, in antiqua militia habuit. Vtebatur eo medicina tantū. Nihilq; Apyſyro in ueterinaria medicina frequētius eſt. Quoniā ſalis modo auiditate cibi morboſo pecori excitaret. Simulq; quā habet pellendi ui purgaret. Vtebat & ganea, in qua periti eius obſeruauerāt, teneſcere Nitro multa, praefertimq; herbae radices, candore obſonia contrahere, & olera uiridiora fieri. Ex quo uſu Martialis etiā recinit. Ne tibi pallentes moueant faſtidia caules, Nitrata uiriſis braſſica fiat aqua. Quod totū legentes monuiſſe placuit, ne quis ab hoc, et ab alijs de Nitro dicta, de Nitro noſtrae aetatis, quē Salem Nitrum oēs paſſim noiant, dici exiſtimet. Laudauit antiquitas Nitru ob diuerſos uſus, diuerſis locis naſcens. Hic ex bunis ſpongioſum alijs an te-

posuit: non satis certa loci indicatione. Omittimus quæ Plinius, 31. uolumine, capite. 10. retulit, optimū, copiosumq; in Clitis Macedonia nasci. Nihil enim quod ille ait ad scriptoris huius Bunos pertinet. Qui si hoc loco colles simpliciter significant, fossile & ex montanis erutū cæteris uidetur Dioscorides anteposuisse: sin contra, non colles ea uoce, sed certū aliquem significauit locū: in ambiguo tunc res est. Plures em diuersis regionibus urbes, & oppida hoc nomine in antiqua Geographia audiuntur: quia in collibus adificatæ habitarentur sic nominatæ. Bunos enim Græci cespitibus erectas aras & tumulos uocant. Siquidem in Illyrico, in Epīro, nec procul ab Antycira eodem nomine Buni urbes & oppida fuerunt: ut testati Stephanus Bizantijs, Plutarchus, pluresq; alij sunt. Nobis inclināt animus in eam quæ non procul ab Antycira a Plutarcho describitur, in commentariolo, cui titulus est, utrobi, in terrestribus, an in aquatilibus brutis maior sit prudentia.

De Spuma Nitri.

CAP. CXXII.

Spuma Nitri optima esse putatur leuissima, glebosa, friabilis, colore pene purpureo, aut spumosa, & mordens. Qualis ex Philadelphia Lydiæ defertur. Secunda est Aegyptia. Quin & in Magnesia Cariæ gignitur. Vim & uisionem salis habet tam Nitrum, q̃ Spuma eius. Præterea Nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus quæ inflationes discutere possunt, uti Ruta, uel Anetho. Febribus circumitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accessionem. Miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutiunt, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua autē calida, aut uino infusa, inflationes, purulentas aureis, & sonitus earundem sanat. Sordes expurgat cum aceto instillata. Canum morsibus ex asinino adipe, aut suillo medetur. Resinæ admista furunculos aperit. Aquæ inter cutem cum fico illinitur, opisthotonisq; iam remissioribus, & luxatis cum cerato. In resolutione lina guæ pani cōmode permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus urūt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

B A R B A R I C O R O L L.

Aphronitrum, siue Aphrolitron maxime laudatur, quia sit Nitri pars tenuissima. Hoc ueteres negabant fieri, nisi cum ros cecidisset prægnatibus nitrarijs, sed nondū parientibus: itaq; non fieri incitatis: etiā si caderet. Alij operimētor, aceruorūq; fermento gigni existimauere. Proxima ætas in Asia colligi tradit, in speluncis distillans molibus: specusq; eos Colycas uocant. dein siccat sole. Lydiū in pastillis affert. Aegyptiū in uasis picatis, ne lique scat. Vasa quoq; ea sole inarescentia perficiunt. Differt Aphronitru, ab Aphonitro. Id qd Spuma sit, ritum esse in pollinē affirmat. Candidū, & triticæ farinæ simile. Aphonitru uero, siue Apholitru congelati specie coit: eoq; in balneis quotidie, ut Galenus inquit, ad extendas sordes utimur.

E X M. V E R G. C O M M.

Nec eadem, nec diuersa Nitro penitus nitri Spuma antiquis fuit: isdem locis cum Nitro nascens, & æquali illi potestate: aspectu tamen alia, quo tenuior Nitro, eo etiā melior. Discrimen in nascendo potius q̃ substantiæ eius erat. Prægnatibus enim, sed nondū parientibus nitrarijs, ut Plinius ait, Spuma colligebatur. Eratq; ob tenuitatem suam Nitri Spuma præuius, & in summū emergens, simulq; concrefcens humor. Sunt tamē in græcis, qui testentur fieri Nitri Spumā, a ceruore nitri, ueluti fermento quodam, ex quibus referuētibus hæc ueluti Spuma emergeret. Quod in multis alijs sit, seruire suo se purgātibus. Addiderūt ali, in priore illa colligende nitri Spumæ rōne, non concerni eā in nitrarijs, nisi nocturni accesserint rores. Quocūq; autem modo ferres habuerit, qd tenuissimū ex Nitro se proferebat, id nitri Spumā quondā dicebatur: multi, ut uidet in medicina usus, a Nitro sola bonitate diuersa. Ob quā causam, & si forte uno, eodēq; capite continuata historia de utroq; traditū quondā a Dioscoride fuerit, nos tamē aliorū omniū rationem secuti, seorsum de utroq; egimus. Neq; est quod ultra moneamus, q̃ fuisse quondā pro sale aliquibus locis Nitri huius usum: tanta illi similitudo coloris, saporis, & co-

A

apud virgum

B

Pli. li. 31. ca. 102

D I O S C O R I D I S

C tius substantiæ est. Possæq; adhuc inueniri, & in eodẽ usu gentibus aliquibus esse: id tamen pro comperto nobis nõ est. Quemadmodũ sine controuersia a cunctis recipit, nullũ fuisse usum, nec confectiõẽ aliquam eius, qđ nunc decocta terra ad usus belloꝝ fingit, & Salem Nitru uocant. Magna cum illo similitudine, & naturæ id generantis imitatione excogitatũ.

¶ De Fæce.

C A P. CXXIII.

E Ligenda Fæx maxime a uino uetere, Italico: sin minus, ab alio con simili. Fæx aceti uiribus longe acrior est. Crematur ut alcyonium, ante diligenter siccata. Sunt qui noua testa igni largo urant, usquedum penitus incandescat. Alij uiuis carbonibus Fæcis glebam obruunt, & idem opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ ustionis, ut aërio nitore inalbescat, linguamq; tactu urere uideatur. Eadem urendæ Fæcis aceti ratio. Visei supra modum urens, & abstergens. Vlcerata ad cicatrĩ cem perducit. Vehemẽter exest, siccataq;. Sed recenti utendum est, quoz niam celeriter exanimatur, aperta, & nullo uase condita. Lauat ut Pom pholyx. Quæ ustionem experta non est, tumores & per sese, & cum myrto cohibet. Ventrĩs, stomachiq; fluctiones illita sistit. Muliebre pro fluxum, imo uentrĩ, aut genitalibus imposita, mitigat. Panos discutit, nondum exulceratos, & tubercula. Turgentibus mammis suiq; lactis im patientes, cum aceto peruncta extinguit. Cum resina uero ambusta, & scabros unguines aufert. Addito lentiscino oleo illita nocte tota, ruffat capillum. Elota, oculorum medicamentis, ut spodos adijcitur. Cicatrices, & eorum caligines eadem abstergit.

B A R B A R I C O R O L L.

V ini Fæx, græce Tryx uocatur, utiq; nõ usta, sicut usta Sphecle, quasi fæcula, interim Sphe dem pro fæce cruda quoq; Græci capiunt, ut Paulus. Fæci tanta uis est, ut descendentes in cupas enecet. Experimentũ dimissa præbet lucerna, qđ diu extinguatur descensionis periculũ denuncians. Siccata recipit ignes, ac sine alimẽto perflagrat, cuius uis & natura quæ Nitro. Fæx cum expirauerit, lauandis corporibus, & uestibus est utilis. Fæx aceti pro materia acrior sit oportet. Vtriq; multum adijcit uirium crematio. Habet & suam sapa fæcem. Cratinus poëta comicus, hoc est, Tryga, pro uino quoq; accipit aliquando. Apud nos quoq; Fæculam, qui dixerit, pro uino meminisse uideor.

E X M. V E R G. C O M M.

S edimentũ uini, cum in dolio deferbuit, Fæx est: nota omnibus, & nisi in medicina uires ali quas habeat, homini penitus inutilis. Crude pariter & coctæ usus quondam fuit. Vocauit Fæ cem posterior græcoꝝ medicina etiam Pheclam. Copiosaq; in græcoꝝ medicis ea uox est, qua crematã priuatim significant. Eius non meminit Dioscorides, quoniã sua ætate nullũ erat forte adhuc id nomen. Illud humaniores literas profitentes nouisse, & obseruasse uolumus, quod a nobis dictum est. Vtendum recente est: ciuillime em efflata ui languet: eamq; ob causam dili gentissime operculanda; nec nisi uase aliquo clausa seruanda est: a Plinio breuius & apertius di ci, Celeriter exanimatur, non incluso condita. In quo exanimandi uerbo usus, animam ad o mnem halitum, & ut Græci dicunt, ἀποψήλαιν, contrahit.

¶ De Calce.

C A P. CXXIII.

C A L X H O C modo fit. Marinorum buccinorum testas igni condito, aut feruenti clibano nocte dimittito: postera die si can didissima fuerit, extrahito. Sin aliter, iterum urito, usquedum uehe menter inalbuerit. Dein ubi in aquam frigidam immersa fuerit, in fictile nouum conficito, & exacte pannis operiens, noctem unam conquiesce

refinito. Mane eam extrahens, si ad intentum finem perducta est, recon-
dito. Fit & e glebis lapidum crematis, necnon e uili marmore: quæ ceteris præfertur. Vis omni Calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens. Quibusdam alijs immista ut adipi, oleo, concoquendi uim assumit, & dissipat. Vlcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

B A R B A R I C O R O L L.

Calx usua, id est, Asbestos. Differt ab ea Calce, quâ Græci Titanon appellant, ut spēs a genere: item a Maltha, quæ sit ex Calce recenti. Vino restinguit, mox tundit cum adipe suillo, et sicu duplici linamēto: quæ res omniū tenacissima, & duriciā lapidis antecedens. Quod malthatur, oleo perficitur ante. Galenus in Hippocrite, Maltham pro cera capit.

E X M. V E R G. C O M M.

Titanos inter uenena ab hoc ipso scriptore sequenti commentario nominatur, quæ hoc loco Asbestos ab eodem dicta est: specie tantū, ut aliqui crediderunt, diuersa: ut nos autē in græcis obseruauimus, solo architectorum usu: qui Titanon intellexisse uidentur, eam qua parietibus tectoria inducerentur. Et quoniam Gypso id aliquando fieret, Gypsum sæpenumero ea uox græcis etiam significat. Quinetiam *τιτανία θάψι* uerbum illis inter cætera, Gypso inducto tegere & oblinire est. Verumtamen sola Calx utraq; appellatione illa indicatur. Quæ potuit ex diuersa materia, ut hic ait, facta, in architectura diuersos habere usus. In medicina tamen contrarij in ueneni maleficio, utrumq; enim Calx præstat, nullum huiusmodi discrimen a natura accepit. Omnis enim Calx sine generis discrimine nocet, & prodest.

De Gypso.

CAP. CXXV.

GYPSVM VIM habet adstringendi, obstruendi. Sanguinis eruptiones, sudoresq; cohibet. Sed potum strangulat, quodam suffocationis modo.

B A R B A R I C O R O L L.

Gypsum, siue Gypsus, siue Spygos, ut Theophrastus quoq; noiat, plura habet gñā. Nam & coquitur e lapide, ut in Syria, & Phœnice, ac Thurijs. Et terra sedit, & quidē summa eius curre, ut in Cypro. Copiosa itē Aetolia, circa Perœbiā, atq; Tymphem: a quo & Tymphaciū, siue Tympheticū uocatur. Qui coquitur lapis, non dissimilis Alabastritæ esse debet, aut marmorifero. In Syria durissimos ad id eligūt, coquūtq; fimo bubulo, ut celerius urant. Optimū fieri comperit ex speculari lapide: qui & Diapahnes uocat, squamam uitalem habente. Gypso madido utendū est, quoniam celerrime coit. Inepa sit operi duricies: tamē rursus tundi, & in farinā resolui patitur. Natura Gypsi caloris in terendo tanti, ut rudiculis non manibus tractari possit. Tenacissimus ob id usus eius in albarijs sigillis ædificiorū & coronis gratissimus, & ad uaporaria conclauis apud nos, quæ Mappas ex nostra consuetudine uocamus. Græci pro Cymolia, uestibus poliendis, Tymphacio utebant Gypso, Theophrasti ætate. Hinc Gypsari uenatio: pedes, ut in Cymolia diceb. Est & in Gypso qd flos appellat, ueteres Chymistæ, Argentum uiuū, gelu astrictum, hoc est, spissatum, iam addensatumq;, Gypson uocabant.

E X M. V E R G. C O M M.

Cognata calci res Gypsum est. Plura numerantur eius genera, priuatimq; a Plinio libro 36. capite. 24. Poterunt uolentes ab eo singillatim omnia audire. Posteriores græcorū medici de uiribus eius certius docuerūt, siccare, & opplere Gypsum dicentes, & in compescendis sanguinis profluuijs cum farinæ polline, & oui albo usum eius esse. Cremari ut cætera Gypsum etiam, crematumq; opplendi uim amittere, sed in siccando efficacius fieri.

De Sarmenticio Cinere.

CAP. CXXVI.

Sarmentorum Cinis urendi uim habet. Cum axungia autē, uel aceto illitus, fractis neruis, articulorum collisionibus, & neruorum nodis prodest. Cum nitro & aceto excrescentias carnis in scroto reprimat. Serpentiū canumq; moribus illitus ex aceto medetur. Crustas obdu-

A

Pli. li. 36. ca. 24.

B

Pli. li. 36. ca. 24.

τίσσει ἀσπιδίαν

D I O S C O R I D I S

Centibus medicamentis ammiscetur. Fit ex eo lixiuium contra præcipitationes, & fungorum uenena, cum aceto, sale, & melle.

Pli. li. 17, ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.
Cinīs, Græce Conis, & Spodion, & Tephra dicitur, & Coloscertos poetice. Sed lixiuium Conia. Apud nos Lix: unde Lixiuū, & Lixiua, & ut Columella uocat Lixiua. Cinis foci uocatur: dictus forte, quia luxatis in potu proffit. Vnde Gladiatores cum delussissent, hac iuari portione uidebantur. Cineri omni uim astrictoriam inesse, Dioscorides uoluit. Negat id Galenus: utiq; siculneo. Ipsum quoq; uinum, quod anteq; prælo pressum sit, aut nimium calcatae uix in lacum musti fluxerit, Lixiuum, aut Lixiuum mustum appellatur, a Græcis uero Prochyma. Nam & Protofactum inuenio apud Paulum. Sed pro cinere Lixiuo, qui primus distillauerit, ut coniectura capio. Calidum cinerem Hippocrates Marilem appellauit.

De Alcyonio.

C A P. CXXVII.

Ἀλκυονίδων

Alcyoni quinq; esse genera, compertum est. Vnum enim spissum, acerbis saporis, spongiosa facie. Item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plerūq; in littoribus inuenitur. Alterū pinnulae oculorū, aut spongiæ simile, fistulosum, & læue, odorē algæ referens. Tertium uermiculi forma, & colore, magis purpureum, quod Milesium uocant. Quartum succidis uelleribus non dissimile, spongiosum, læue. Quintū figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris læue, acre. Quod plurimum in Propontide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur. Patrio nomine Halos achnen uocāt.

Duo priora, in sceminarū smegmata assumuntur. Contra lentigines, lepras, uirilignes, nigricias, & maculas in facie reliquoq; corpore. Tertium ijs qui difficili urina uexantur, aut harenulas in uesica colligūt, idoneum est. Item renibus affectis, aquæ inter cutem, leni. Vstum autem, & ex uino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est. In alia absterforia, psilotrachæ assumitur cum sale mistum. Si quisquam Alcyonium cremare uelit, in crudum fictile mittat: & oblinens uasis spiraculum luto, ita fornaci mandet: & cum figlinum percoquetur: extrahens ad usum recondat. Lauatur ut Cadmia.

Pli. li. 32, ca. 5.

B A R B A R I C O R O L L.
Fit in mari Alcyonium ex nidis, ut aliqui existimāt Cæcium & Alcyonium: quas nostri Alcedonas uocant, quasi Algedonas, ab Algore, ut alij, e sordibus Spumarum crassescitibus, alij e limo, uel quadam maris lanugine. Quo candidius, hoc minus probabile. Dioscorides quinq; genera dinumerat. Plinius quatuor. Primum quale Dioscorides. Secundum molle, lenius, odore fere algæ. Tertium candidioris uermiculi. Quartū pumici & spongiæ putri simile, pene purpureum: quod optimum; hoc & Milesium uocatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Non ausim ego nunc censere, an quæ in antiquis græcorū & latinorum poetis, discendentibus a se mari, aut eodem elemento ad se reuersuris coniugibus, & amoribus suis Halcyonios precabantur dies amicæ & uxores, bona fide pro salute eorū uota, precesq; conciperent: An utliceret illis per brumam septem diebus, tranquillo mari, ad nitorem læuorēq; cutis Halcyonium tuto expiscari. Mala enim mulieris mens, & ad nouas uoluptates sedulus animus, conciliandis nouis amoribus continue studet: gaudetq; aliud agere credita, quibus subinde placeat formæ suæ lenocinio quærere. Id certe uerisimile est, & facile credat aliquis: Halcyonium, quo quotidie ad uultus decorem uterentur, certius q̃ Halcyonios dies nouisse forminas: relictaq; uiris tota maris & nauigationis obseruatione, unde speciem suam augerent diligentius curasse; neq; ex fabulosa Ceycis, & Halcyones historia aliud, q̃ Halcyonium nouisse lenocinio for-

ma nascens in mari rem: siue ex Halcyonum nidis reliquiae, siue crassescens spumanti for-
des, siue limus & maris lanugo quaedam id sit, Nomen illi Halcyones marinae aues fecerunt,
haud sane quia ex earum nidis Halcyonium mari innatet, sed quia ex eo mari innatanti & flui-
tanti Halcyones aues nidos sibi ad foeturam faciant. Prius enim Halcyonum nidis spuma &
lanugo illa maris est: tum ex ea Halcyonum nidi: & quoniam Halcyonibus ad foeturam infer-
uiat, Halcyonium dictum est. Discrepat in generum numero ab hoc scriptore Plinius: ille qua-
tuor, hic quinque genera eius facit, nec iisdem notis ambo quocumque ea sint indicant. Quodque
a Plinio non numeratur, quintum illud nobis uidetur fungorum figura, sine odore, & asperum.
Poterunt id certius uolentes in Plinio uidere lib. 32, capite. 5.

De Adarce.

CAP. CXXVIII.

FIt in Cappadocia quod Adarces appellatur. Est autem concreta sal-
silago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & harun-
dinibus ac haeribus agglutinata, colore flori lapidis Asiatici similis, &
omni forma molli Alcyonio, & aliquantum cauo proxima, tanquam lacu-
stre Alcyonium esset. Ad euellendas lepras, lentigenes, lichenas, & ui-
cia cutis in facie accomodatur. Et in summa, uis ei acris. Humorē euo-
cat, qui in aliqua parte concreuit & ischiadicis prodest.

BARBRAI COROLL.

ADarca, & Adarcion, & Adarces, & Adarcos dicitur. Item Calamochnus, id est, calami
lanugo. Plinius latinum Adarcæ nomen putauit, in Italia nascentis circa tenues harundines,
hoc est, in cortice calamorum, sub ipsa coma, e spuma aquae dulcis ac marinae, ubi se miscent.

Pli. li. 16. ca. 37

EX M. VERG. COMM.

Calamochnum, id est, harundinum lanuginem Adarcem hunc in graecis aliqui nominaue-
runt: factum, quia in harundinibus concreta lanuginis modo inuenitur, illi hoc nomine. Credi-
musque nos, non excusandi lapsus Plinio occasione eam dedisse uocem. Is enim quod ante nos
alij etiam deprehenderunt, lib. 16. capite. 37. inter harundines Adarcem his uerbis numerat.
Est & in Italia nascentis Adarca nomine palustris, &c. Tum cum tota fere naturam percurrisset,
ageretque de aquatilibus. 32. capite. 6. inquit. Inter aquatilia dici debet & Calamochnus, latine
Adarca appellata. Nascitur circa harundines tenues, spuma aquae dulcis, & marinae, ubi se mis-
cent. Plura sunt duobus his locis eius scriptoris errata. Primum, quod plantam cum haerente & ad-
nata illi spuma miscet, confunditque rei intellectum: tum quod Adarcem latinam uocem esse affirmat,
cum graeci passim pro sua ante latinos usi ea fuerint: mox in Italia nasci, contra Dioscoridis, &
aliorum omnium decreta. Barbarus etiam hoc capite quod Diosco. περι πικρύνθου καλάρμου καὶ
χερταρίου ait, monetque condescere Adarcem in harundinibus, & herbarum cremis, farragine
dixit, contra rei rusticae auctores omnes, farraginis uoce in ea re usus. Habet enim farrago cer-
ta rei in pecoris pabulo significationem: ut certius illi docuerunt.

B

De Spongijs.

CAP. CXXIX.

Spongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas, quarum
duriores Tragos nominarunt. Foeminas autem, quae contrari-
as dotes habent. Vruntur eae ut Alcyonium. Recentes sine pinguitu-
dine uulnerariae sunt, & tumores reprimunt. Recentia uulnera ex aqua
poscaue conglutinant. Veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vete-
stae autem inutiles. Aridae & ligatae lino, si penicilli modo adigantur,
occlusa ulcera, callosque laxant. Recentes & uacuae senilia ulcera, & quae
fluctatione laborant, aut cuniculatum exedunt, imposito siccant. Sanguis-
nis profluuium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridae lippitudini
auxiliatur. Et ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius,

πρόγγοι

KK

D I O S C O R I D I S

C in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profluentem sanguinem sistit. Candidæ cura fiunt, e molli-
lissimis recentes, per æstus tinctæ salis spuma, quæ petris coheret. Inso-
lantur inuersæ, hoc est, parte caua sursum spectante: et qua adhæsere, de
orsum. Si uero æstiuâ serenitate ad lunam sternantur, persusæ salis spu-
ma, aut maris aqua, maximum candorem referent.

Pli. li. 9. ca. 35
lib. 11. cap. 11.

B A R B A R I C O R O L L.

Spongia, græce spongos appellatur, itemq; Spongia, ut dicunt Attice. Inter Zoöphyta, hoc
est, quæ nec animalium, nec fruticum naturam, sed tertiam ex utroq; sortiantur. Nascuntur oēs
in petris. Aluntur conchis, pisce, limo. Vbi autulforem sensere, contrahunt se, ac multo diffi-
lius uelluntur, exprimentes abundantiam humoris, abscessu uero sanie emittentes. Circa Toro-
nem, ut inquit Aristoteles, uelci conchis minutis intra eas repetitis cōstitit, auulsasq; aiunt, & ex
relictis radicibus recrescere. In petris cruoris quoq; inhæret color, Africis picipue, quæ generant
in syrtibus. Maximæ fiunt Mauca, sed mollissimi circa Lyciam penicilli: in pfundo autem nec
uentofo molliores, unde ablatae sint spongiæ. In Hellesponto circa Maleam uero aspe ac densæ,
putrescunt in apricis: ideo optime in gurgitibus. Viuētes, madetescq;, ac illotæ, nigricant. Adhæ-
rent nec parte, nec toro. Interfunt em fistulæ quædam inanes, quaternæ fere, aut quinæ, per quas
pasci existimantur. Item aliæ, sed superne concretæ: & subelle membrana quædam radicibus earū
intelligitur. Viuunt longo tempore. Pessimæ sunt Aplysæ, quia erui nō possunt, in qbus maxi-
mæ sunt fistulæ, & reliqua densitas spissa. Ceterū aliter discreuere genera. Earum qdam tria faciē-
do, Spissum ac predurū & asperū, qd Tragos, idest, Hirculus uocetur. Alterum spissum & mol-
lius, quod Imauos. Tertium tenue, densumq; Achilleū, inuentu rarū. Hoc galeis & ocreis infe-
ritur, ne strepitum gestatu cieant. Ex eo peniculi fiunt. Medici inscitia, ad duo eas genera rede-
gere. Africanas, quartū firmitus sit robur. Rhodiacas, quæ ad fouendū molliores. Nunc aut mol-
lissimæ circa Lyciæ urbis Anipheili muros inueniuntur. Mares quæ dicuntur perforbent, tingū-
turq; in delicijs aliquando & purpura. Forminis fistulæ maiores, ac perpetuæ: Tragis tenuissimæ
ac densissimæ. Ab aquilone genitas ceteris præferunt. Nec usq; diutius durare spiritum medici,
q; in Spongijs affirmant. Sic & prodesse corporibus, quia nostro suum misceant. Hoc genus re
medij Apopsongismō Archigenes, & secuti eū medici appellant. Quia uero de peniculis dixi-
mus, scire oportet, nō Spongias mō, sed & e codis q;q; fetas, Penicillos a ueteribus esse nomina-
tos, quibus calciamenta tergebant: ob id & Tergenteas uocabant eas aliq; nos uulgo Setulas.
Est em penis, idem qd cauda. Vnde Penita ossa, obsemen carnis porcine cū coda significat.

E X M. V E R G. C O M M.

Tertium habet in natura Spongiæ ordinem nec frutices, nec animalia, sed inter utrūq; hoc
genus medium quiddam, in quo mixta simul animalis, & plantæ natura est, Zoöphyta græci
omnia appellant. Pluribus locis in mari nascentes, diuersisq; nominibus ab antiquis distinctæ:
quoniam non una sit earum forma, bonitas, & usus. Hic quod ad faciendam ex eis homini me-
dicinam pertineat, satis hoc capite tradidit. Quod autem ad historiam, certius Aristoteles libro
quinto de animalium historia, a quo accepta omnia Plinius lib. 9. primum capite. 35. tum. 31. ca-
pite undecimo isdem retulit uerbis. Quæ a Barbaro in Corollario suo etiam collecta, sine desy-
derio legentium a nobis relinquuntur. Quomodo autem uulnerariæ Spongiæ sint, manifeste
docuit eodem loco Plinius, dicens. Fracturæ, & uulnera spongijs utilissime fouent. Sanguis ra-
pitur in secando, ut curatio perspicui possit: & ipsæ uulnerum inflammationibus imponuntur.
Multaq; alia, quæ idem scriptor & aliq; in uulnerum curationibus tradiderunt. Quod dictum a
nobis est: ut scirent legentes aliter uulnerarias esse Spongias, q; plura alia sint quæ toto hoc ope-
re a Dioscoride τραυματικά, id est, uulneraria dicuntur.

καρδαμύνη

De Corallio. C A P. CXXX.

Corallium, quod aliqui Lithodendron appellarunt, marinum ef-
se fruticem constat, qui imo extractus duratur statim, atq; emer-
git, tanq; offuso ære protinus concrescat. Plurimum inuenitur Syracu-
lis, in promontorio cui Pachino nomen est. Laudatissimum rubens, co-

lore Hastulæ regię, aut Sandycis meri, nec secus terenti facile cedens, A
æquabili usquequaq; cōcremento, rursus algæ, aut fuci marini odore,
q̄ramo sissimum, cinnamomi æmulum, forma fruticis. Quod autem
in lapidis duriciam cōit, scrupulosum, inane, & lacunosum, uitiosum
existimatur. Adstringit & mediocriter refrigerat. Excrescentia cōercet.
Oculorū cicatrices abstergit. Vlcera caua, & cicatrices explet. Con-
tra sanguinis reiectiones magnopere efficax est. Vrinæ difficultati au-
xiliatur. Quin & potum ex aqua lienem absumit.

BARBARI COROLL.

Q Vantum apud nos Indicis margaritis precium, tantum apud Indos Corallio. Gignitur
& in rubro mari. Sed nigrius. Item in Persico uocatur lace. Laudatissimum in Galli
eo sinu circa Orchadas: & in Siculo circa Heliam, & Drepanum. Nasctur & apud Grauiscas
in Italia, & ante Corniculum, & Neapolin Campaniæ, maximeq; tubensis: sed molle, & ideo ui-
lissimum Erythris. Color sub aqua uiridis. Baccæ eius candidæ ac molles. Extra rubescunt,
induranturq; ceu corna satiuæ magnitudine ac specie. Aiunt tactu protinus lapidescere si ui-
uat. Itaq; occupari, euelliq; retibus, aut acri ferramento præcidi, a quo & Corallio, quasi cu-
rallio ἀντὶ τοῦ κορυλλίου nomen inditum: nec aliter sane Theophrastus, q̄ Curallium appellat, a ra-
dendo scilicet: ob id & Gorgonia quoq; dictum putatur: itemq; Dendritin, hoc est arboreum.
Probant q̄maxime rubens, & q̄ramo sissimū. Damnant inane, aut concauū. Auctoritas Bac-
carum Indis, utroq; sexu preciosa. Religiosum etiā id gestamen Haruspices eorū, uatesq; in pri-
mis habent, priusq; hæc notescerent. Galli gladios, scuta, galeas adornabant Corallio: postea
Indis Vniones suas pro Corallio mutantibus, in penuria esse cepit. Surculi eius infantie ad
alligati, tutelam habere creduntur. Ignibus diu repugnant. Est & lapis Corallius, uel ut qdam
scribunt Colaris, multū a Corallio diuersus, Pyrites s quibusdam appellatus: quoniā sit pluri-
mus ignis illi. Sed est alius etiamnum Pyrites, in mentionē suam seruandus. Qualis porro la-
pis Erythros, hoc est, rubens, ab Hippocrate significetur, quo mulieres inquit explorantur, an
sint prægnantes, nisi aut Corallium sit, aut Pyrites, aut etiā Hæmatites, affirmare nihil habeo.

Pli. li. 32. ca. 1.

EX M. VERG. COMM.

C Rescit arboris modo, & in duriciem lapidis duratur in mari Corallium. Nota nunc res
omnibus, sed in nullo fere honore, si antiqua repetatur eius gratia, qua preciosissimis in natura
gemis prælatum in gentibus aliquibus diu fuit. Sicandi, & mediocriter repurgandi uim illi
ueteres græcorum medici tribuerunt: ideoq; cruentis sputis, ut illi etiam tradiderunt, utile.

De Antipathe. CAP. CXXXI.

Q Vod Antipathes uocāt, Corallium esse arbitrantur, specie tan-
tum distans. Est autem colore nigro, arboris figura, ramosum
magis. Vires supradicti habet.

ἀντιπαθής

BARBARI COROLL.

A Ntipathes, pro genere Corallij, quale sit in Plinio, haud facile docuerim: nisi quis intelli-
gat fruticem circa Troglodytarum insulas, nascentē in alto, quē Isidos Plocamon uocari tra-
dit, Corallio similem, sine folijs sentiri eum, se capi, durariq; colore in nigrum, cum cadat fran-
gi, Theophrastus Corallij duo uidetur statuere fastigia. Vnum quod rubens, rotundumq; est,
ut Radicula in mari nascens. Alterum huic nō multū dissimile: quod Calamus inquit uocatur
Indicus: qui duratur in silicem. Plinius inter gēmas enumerat Corallida, minio similē: quæ in
India, Syeneq; gignatur. Fortasse per Theophrasti tēpora, minus erat Corallij uulgatus usus.

Pli. li. 37. ca. 10

De Phrygio lapide. CAP. CXXXII.

P Hrygius lapis quo infectores in Phrygia utuntur, a qua nomen
accepit. Nasctur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus,
modice grauis, inæquali compage corporis, intercedentibus albis seg-
mentis, ut in Cadmia. Vritur autem uino optimo perfrusus, uiuiscq; car-

λίθος φρυγίου

KK ἦ

D I O S C O R I D I S

C bonibus obrutus perflatur assidue follibus, donec mutato colore ruffescat. Rursus eodem uino restinguitur. Hoc iterum & tertio faciendum. Attendendum tamen, ne minutim confringatur, et in fuliginem euanescat. Vis crudo uisq; adstrictoria, expurgans. Vlcerebus crustas quadamte nus inducit. Ambustis cum cerato medetur. Lauatur ut Cadmia.

BARBARI COROLL.
Pli. li. 36. ca. 19 **L**apis Phrygius, gleba est pumicosa, Plinius medicinæ utilem negauit.
EX M. VERG. COMM.

Gentis nomen habet Phrygius lapis, pumicosa, ut Plinius ait, gleba: Italiae semper peregrinus, nunc autem nulli cognitus: & ex eo, quod præcipuum habere fertur, in nullo nostra ætate ulu.

De Asio lapide. CAP. CXXXIII.

Asio lapis

Asius lapis assumi debet pumicosus, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles uenas melini coloris ad imum actas habens. Eius flos, falsugo subflaua est, summo lapide insidens, compagine tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum uergens. Ad mortus linguæ aliquantum mordet. Vim habet uterq; adstrictoriam, et modice erodentem. Ammistus liquidæ pici, aut terebinthinæ, tubercula discutit. Longe ualidior flos existimatur. Cæterum siccatus flos, uetera ulcera et cicatrici repugnantia sanat. Excrecentia cohibet. Tetra ulcera & fungis similia, cum melle expurgat. Vlcerebus caua explet, depascentiaq; cum cerato sistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomento, & lieno sis ex aceto & calce. Prodest phthysicis linctu. Podagrici iuuantur pedibus in folio, ex eo lapide excauato inditis. Fiunt quoq; oculi, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporum crassiciem absumunt, uice nitri in balneo. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

BARBARI COROLL.
Pli. li. 36. ca. 17 **A**sius, et Asia petra dicitur. Est et Assius per duplex, scilicet ab Asio Troadis, ut inquit Plinius. Sed ab Asio diuersus. Ille Sarcophagos quoq; nominatur, ab effectu: qualis & in Lycia, & in Oriente habetur. Et in Mysia quoq; inueniri eum Stephanus affirmat. At nos hic per simplex, scilicet fere scribitur ab autoribus, gustu falsus. Corpora defunctorum condita Sarcophago, consumi intra .40. diem, sed illata quoq; mortuis, lapidea fieri traduntur. In Oriente adalligata uiuentibus erodunt ea.

EX M. VERG. COMM.

Longe breuius quam hic cæteri graecorum medici lapidis Asii, floriscq; eius uires tradiderunt: ex tenuare quidem, sed sine erosione dicentes. Eamq; ob causam humentes & flaccidas carnes absumere una πλάσσειν σαρκῶν uoce complexi, quæ tam multa singillatim a Dioscoridis numerantur.

De Pyrite lapide. CAP. CXXXIII.

Pyrite lapis

Pyrites lapidis genus est, a quo æs extrahitur. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas ædens. Vritur sic. Melle irrigatus molli pruna continuo flatur follibus, donec ruffescat. Alij in carbonibus igni candentes, lapidem melle perfusum desiciunt, & ubi ad fuluum colorem uergere coeperit, extrahunt. Efflatoq; cinere, rursus madefactum cremant, donec æquabili tenore afficcatus, friabilis reddatur. Siquidem sæpe facies summa solum uritur. Ita crematus, siccatusq; reconditur. Si ex toto opus sit, lauari debet ut cadmia. Tam crudi, quam usti uis est excalfa-

cere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duricias conco- **A**
 quere, & concoctas discutere. Resina exceptus excrescentia in carne
 cohibet, sed calorem quandam & adstrictionem parit. Ita ustum non
 nulli Diphryges appellant.

P **B A R B A R I C O R O L L.**
 Yriten, sunt qui & Sideriten uocent, & Androdamanta, & Bostrychiten. In Cypro repe-
 riri uolunt, & in metallis, quæ sunt circa Acamaniam. Vnum argenteo colore, qui & Argyri-
 tis a Democrito cognominatus uidetur. Alterum aureo. Aliqui tertium genus faciunt, quod
 plurimum ignis habeat, ponderosissimumq; sit: quos & uiuos appellamus. Hi exploratori-
 bus castrorum maxime necessarij: quia clauo, alteroue lapide percussis, excutiantur scintillæ,
 quæ sulphure exceptæ, aut fungis aridis, aut folijs celerrime ignem trahunt. Pyrites & gemma
 est, nec scio an diuersa ab hac. Nigram esse inuenio, & attritu digitos urentem. Pro Pyrite, in
 medicinas uenit Mylios, siue Mylitis, Cochlas appellatus, hoc est, molarius, insula Nisyro plu-
 rimus, ab Hippocrate Lapis niger, ut Galeno placet. Mylias ab Theophrasto & Heliano, ex
 Aethna monte fluens, luti nigri modo in Sicilia, post durefcens colore custodito. Fluunt & Py-
 romachi dicti, ut idem Theophrastus ait.

Pli. li. 36. ca. 19.

I **E X M. V E R G. C O M M.**
 Gniarium fuit quondam, quemadmodum & nunc etiam est Pyrites lapis. Factumq; illi ab
 igne nomen, haud sane quia caleat, aut ignis modo fulgeat, sed q; inuicē attritus, aut ferramen-
 to aliquo percussus, ignis modo igneas scintillas ex se mittit. Dico aut igniarium, quodcunq;
 ad instaurandum nouum ignem homines excogitarunt. Semina siquando hesternæ male con-
 dita flammæ, Vt prima sub luce soler cinesfacta, perissent. Habent, præstantq; id uulgares lapi-
 des omnes, sed omnium maxime qui durissimi & metallici sunt: qualis Pyrites hic est, cuius ab
 hac potestate bonitas probatur. Anteposuit enim hic cæteris eum qui concolor æri est, & qui
 facillime, & quantum uoluerit aliquis leui pulsu scintillas ignis aget. Quod ideo adiectum illi
 a Diosco. est, quoniā plura ad instaurandum nouum ignem lapidis huius genera & bonitates
 sunt. Quæ ex eadem ignis potestate & natura eodem nomine omnia tunc censebantur. Egit
 de his Plinius libro. 36. capite. 19. plures & ipse Pyrites numerans lapides: & inter eos genus
 unum faciens plurimum habentium ignem, quos uiuos tunc uocabant, ponderosissimos: qui
 bus exploratores in castris uterentur: quoniam clauo, uel altero lapide percussis, scintillas sta-
 tim ederent: quæ sulphure exceptæ, aut fungis aridis, uel folijs, dicto celerius ignem traherēt.
 Quos Maro etiam felicissime in primo suæ Aeneidos descripsit dicens. Ac primū silicis scintil-
 lam excudit Achates, Succipitq; ignem folijs, atq; arida circum Nutrimenta dedit, rapuitq; in
 fomite flammam. Validissimum in discutiendis tumoribus, concretionibusq; Pyritem lapi-
 dem hunc ueteres græcorum medici dixerunt. Contra duricies, quas Scirros ea gens uocat
 utentes, cremato primum, mox acerrimo aceto restincto. Nec minus contra concretum in gru-
 mos puerperarum lac.

B

H **De Hæmatide lapide. CAP. CXXXV.**
 Hæmatites optimus habetur friabilis, puro colore niger, durus
 in se, & æqualis, nulla sorde ammixta, nullocq; zonarum discursu. Vim habet adstringentem, & exsalfactoriam aliquantum. Oculorū
 cicatrices & scabriciam cum melle purgat. Cum lacte aut muliebri, lip-
 pitudini, collisionibus, & oculis cruore suffusis conuenit. Bibitur con-
 tra difficultatē urinæ, & fluxiones mulierū in uino, & ab ijs qui san-
 guinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo cotes & colly-
 ria oculorū uitij apta. Vritur ut Phrygius, uino tantū subtractio. Mo-
 dus ustionis est, ut modice leuis fiat, & bullis quibusdam inturgescat.
 Sunt qui Hæmatiten ita adulterant. Densam glebā rotundamq; schisti
 lapidis, cuiusmodi sunt quæ radices uocantur, uase figlini operis, quod

hæmatites

D I O S C O R I D I S

C feruentem cinerem contineat, condūt, paucaq; interiecta mora eximūt, experiunturq; si trita ad cotem Hæmatitæ colorem reddat: q; si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterū obruūt, & subinde conspiciētes per iculum faciunt. Siquidem in cinere diu dimissus, colore mutato dissipatur. Coarguitur male confictus, scissilibus uenis. Quippe in rectos uenarum discursus refringitur, & longe secus se in colore habet. Namq; floridū reddit, Hæmatites uero sanguineum atq; Cinnabarin imitantem, inuenitur in sinopico minio. Fit & e magnete lapide, uehementer ambusto. In Aegypto sponte naturæ cum metallis enascitur.

B A R B A R I C O R O L L

Pl. li. 36. ca. 20

Hæmatites reperitur in metallis. Vitis Minij colorem imitatur. Adulterant Schisto: sed distinguūt uenæ rubentes. Est & Magnetis genus unum Hæmatites appellatum. Præter hoc q; genera Hæmatitarum traduntur. Aethiopicum, cui & principatus datur. Alterum Androdamanta uocant, colore nigro, pondere ac duricia insignem: & inde nomen, præcipueq; in Africa. Trahere autem in se argentum, æs, ferrum. Experimentum eius esse, in cote ex lapide Basanite. Reddere enim succum sanguineum. Tertium genus Arabici, uix reddentis succum sanguineum. Tertium genus Arabici, uix reddentis succum ad cotem aquariam, aliquando croco similem, pari duricia cum secundo. Quarti generis Helatites uocatur, q̄diu crudus sit. Coctus uero Milites, aut etiam Militēs, ad omnia utilior q̄ Rubrica. Quartum ijs adijciunt Schistos, de quo prius mox agitur.

E X M V E R G C O M M.

Cruento sanguinis colore cōspicitur Hæmatites: & inde illi nomē. Plura eius gñā numerat Plinius li. 36. ca. 20. oia Italiæ peregrina, ut ex eorū nominibus cōjicere licet. Idem bonitatis oim notas eodē loco docet: multaq; alia, quæ uidisse in eo inutile nō fuerit. Vtilis medicinæ & inter uitæ remedia q̄dam lapis hic fuit: medebaturq; inter cætera oculis. In quorum usum fiebat ex eo collyria, ut hic ait, & Aconia: quæ a cotibus, quas græci aconas dicunt, dicta in Hebeno p̄mo uolumine certius descripta a nobis fuerunt.

D

xi. 50. 1100

De Schisto lapide. C A P. CXXXVI.

Schistos lapis in Iberia Hispaniæ contermina gignitur. Probatur maxime, qui croci colorem æmulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & serie cohærentium uenarum, Ammoniaco sali similis. Vim exhibet Hæmatitæ, sed ad omnia infirmiore. Quin & caua replet, muliebri lacte perfusus. Ad procidentia, rupta, item genarū crassiciem, & uuas oculorum, magnopere efficax est.

B A R B A R I C O R O L L.

Pl. li. 36. ca. 20

Lapis Schistos cognationē cum Hæmatite habet, sed peculiare in Schisto, q; splendet. Est & Schistos alterius omnino generis q̄ Hæmatites, quem cognominant Anthracitū, nasci tradentes in Africa nigrū: qui attritus reddat aquarijs cotibus ab ea parte quæ fuerit ab radice, nigrum colorē, ab altera parte croci. Sunt & gemmæ plures hoc nomine carbunculi: quarum alie præciosæ sunt, alie uiliores, ut quæ nascuntur in Græcia: Theophrastus auctor, ac Plinius.

E X M V E R G C O M M.

Qualis habitu, concretioneq; sua lapis hic sit, nomen, sed longe certius hic scriptor ostendit. Illud a scissili crustarum eius diuisione factum est: hic Hammoniaco sali comparans, certissima nota totam speciem eius indicauit. Plures in græcis Hæmatitæ congenerem Schistum hunc lapidem fecerunt. Soracus tamen ex antiquissimis scriptoribus, alterius generis tradidit. Plinius duplicem colorē illi tribuit, ab altera parte nigrum, ab altera croceum. Vocariq; a carbonum nigro colore Anthracitem: hic tamen simpliciter *ἡ ποσειδωνία*, id est, croci colore esse dixit. Nosq; ad certiorē coloris eius intellectū, luteū addidimus. Vtilē oculorū medicamentū tm Plin. Schistū lapidē hūc testatus ē. Ideoq; nos credimus, quæ multa numerata a Diosc. mala hoc capite sunt, cōcaua, rupta, p̄cidētia, crassas palpebras, & uuas, oia ad oculos p̄tinere.

De Gagate lapide.

CAP. CXXXVII.

IN Gagatarum lapidum genere præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit. Niger est cõmuni ex parte, squalidus, crustosus, perçq̃ leuis. Vis ei molliendi & discutiendi. Deprehendit fonticum morbum suffitus. Recreatq̃ uulua strangulationes. Fugat serpentes nidore. Podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qui influens amnis in mare effunditur, proxime oppidum quod Plagiopolis dicitur. Vocatur autem & locus & amnis Gagas, in cuius faucibus n̄ lapides inueniuntur.

Gagatē aiunt & in Leuco Pamphylia (ut arbitror) promontorio, aut Lycia, ppe Cyprū insulā, expelli mari, atq̃ infra duodecim stadia colligi. Solinus & in Britania Gagatē gigni tradidit. Planus est, pumicosusq̃, nō multum a ligno differens, fragilis odore, si teratur grauis. Ficilia ex eo inscripta nō delentur. Accenditur aqua, oleo restinguitur. Deprehendere dicitur uirgines suffitu. Hoc & magi utunt̃ in ea quā a securis argumento uocant Axinomanciam: peruri eū negantes, si euenturū sit, quod quisq̃ optet. Dictum a fluuio in Lycia cognominē, Diosco, affirmat. Nullum se Galenus in Lycia cõperisse tradit amnē, qui Gages, aut Gagates uocetur. Photion grāmaticus, oppidū in Lycia fuisse Gagas a Rhodis conditū scribit. Plinius Rhodiopolin a Gagis diuersam facit. Stephanus Gagas oppidū in Lycia fuisse, qd̃ Paleontichos ante diceret. Crustaceos uero lapides, atq̃ nigros, & q̃ in ignē additi exilem flāmam ederent, bituminis odore in Syria Coele inuētos sibi meminit, in collibus mari mortuo circūdatis ad orientē solē spectantibus: ubi & Bitumē q̃q̃ nascit̃: utilissimos tumoribus in genu diuturnis.

EX M. VERG. COM M.

Qui Gagatem statim sequitur Thracius lapis, a Diosco. & ab alijs dictus Gagate eadem oia posse, miscendi simul utriusq̃ noras & euentus Plinio causam dedit, tradendiq̃ libro. 35. capite. 19. Accendi aqua, oleoq̃ restingui: qd̃ non Gagatē, sed Thracio lapidi Nicander in Theriacis suis, & hic in lapidum historia aperte tribuerunt. Nicandri de utroq̃ uersiculi sunt, primumq̃ de Gagate. ἄλλοτε δ' ἀσάλην καὶ ὡν ὑγροῖς πύρρον, ἢ ὅν δὲ μάλοιο πυρρὸς περικαὶ νύται ὀρμύ. Quorū sensus est. Aliquando aut̃ Gagatem siccū lapidē urens, quē ualidi ignis impetus non domat. Accendi quidē igne Gagatem Nicander ait: non tamē ut cetera eo absūmī, sed in urendo bituminis odorem tantum sentiri. Paulo deinde post de Thracio agens, inquit. ἡ ἰσὺν θρηάσαν ἐν φλέγῃ πυρὶ λαὸν ἢ θ' ἰσάται βρεχθεῖσα σιλάται ἰσάται ἂν τὴν τυτθὸν ὅτ' ἰσάταιται ἐπὶ γαυθίντος ἰσάτου, τὴν ἀπὸ θρηάκου νοκίς ποταμοῖς φέρονται, ὅν πόντον καλῶνσι. Quorū sensus est. Aut Threiciū in igne lapidē urens, qui aqua resperfus flāmas agit. Extinguitur aut̃ exiguo insperso oleo. Lapidē hunc a Thracio flumine pastores quē Pontum nominant afferunt: quē tota est in scriptore hoc Thraci, non Gagatē lapidis historia. Plinius aut̃ quo diximus loco de Gagatē inquit. Mirumq̃ accenditur aqua, restinguitur oleo. Quod, ut præmonstrauimus, in Nicandro, & ut mox in scriptore hoc in Thracio lapide patebit, nō Gagatē, sed Thracio cõperit. Diximus nos comitales suffitu deprehendere Gagatē, quos hic πιδυπτικὸς palā nominauit. Ceteri interpres accepta ex Plinio uocē, fonticū morbū dephendi eo dixerunt: cõiere mali illius indicatione q̃ nunc forte oporteat usi. Alter etiā comunem secutus lectiōnē, in Cilicia nasci Gagatem ait: cum ex Geographis, Plinio, melioribusq̃ græcis in Lycia uertendum fuerit.

De lapide Thracia.

CAP. CXXXVIII.

Lapis Thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythia, cui Ponto nomen est. Vis ei Gagatē. Traditur aqua accendi, & oleo restringui. Quod in bitumine accidit.

It lapis Thracias, qui exemplaribus Plinij quibusdam Meiulla dicitur, trium generum, uiri dis, pallidē, sanguineis guttis. Non habeo certum proferre. Nomen gentis sug habet, ut cecinit Nicander: quemadmodum & Cappadoces in Argæo Cappadocię nascentes, simili cum prioribus natura, qui & in lacteum cremorē soluātur, ut Galenus & Paulus ægineta scribūt: qui & Ageroton lapidem cõmemorant, astrictoriam, & discussoriam uim habentem, & gutturis inflammationibus auxiliare: quo sutores uti soleant ad dandum calceis nitorem. Præter-

KK iij

A

γὰγὰτῶν

Pli. li. 36. ca. 19

B

θρακίας

Pli. li. 37. ca. 10

D I O S C O R I D I S

Cea & Hieracitin, ut Diogenes scriptū reliquit, subuicidem ex atro coloribus itē alijs respersum, quē qui gestet, mulsæ non infestent. Hunc literis quibusdā inscriptis, contra sanguinis eruptio- nes ualere perhibent. Addiderūt ijs & Indicū, subruiffum colore, attrituq; succo purpureo ma- nantē, nec ualido, nec denso corpore. Inuenio & Perdicitin, siue Perdiciatin, et aliū a sorbi simi- litudine, ut uirū cognomēto Scythicū, ad oēs duricias pollentes, in compositionē illam quāsi- tas quæ Pamphlethes, & Diacinnabareos uocat ab Aegineta Paulo. Vitem ad oculos quoq; suffusiones cōmendat, cum felle aspidis acantiæ uocatæ, mirabili effectū, post quintum diem representata curatione. Id fel, in serpentis eius dorso, iocinori annectitur, ut Actio placet.

μαγνίτης

Pli. li. 36. ca. 16

Magnes lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cæ- ruleum uergente, nec admodum grauis. Datur cum aqua mul- sa, trium obolorū pondere, ut crassos humores eliciat. Sunt qui Magnē- tem crematum pro Hæmatite. uendant.

Lapis Magnes, quē & Magnitin Græci dicunt. Itē Sideriū & Heractiū, id est, Herculeū. Magnes ab inuēto- re uidet appellatus. In India nunc, & passim inuenit in Hispania quoq;. Re- pertus autē scribitur clauis crepidarū, & baculi cuspidē ferrata harentibus, cum armenta pasce- ret. Quinq; genera eius ferunt. Aethiopico principatū dant, argentoq; rependit. Inuenit in Ae- thiopia Smiri. Ita uocat regio harenosa, lbi & sanguinei coloris, sanguinēq; reddēs, si teratur. Sed & crocum, Hæmatites cognomine, in trahendo ferrū, non eadē natura, quæ cæteri Magne- tes, Aethiopici argumentū est, q; Magnetem quoq; aliū ad se trahit. Secundū genus Magnesia cum, & Magnesia, & contermina ei Macedonia, a Bebonea locatum petentibus dextra. Tales russi, nigriq; sunt. Tertiū in Echio Boëtiæ, russi coloris plus habens q; nigri. Quartū circa Ale- xandriā Troadem, nigrū, & fæminei sexus, ideoq; sine uiribus. Quintū in Magnesia Asiæ, de- terimū (nam & candidus est) neq; attrahit ferrum, similis pumici. In eadem Aethiopia mons haud procul gignit lapidē Theamedem, cui contraria Magneti natura, ferrum omne abigens respuensq;. Trahitur ad Magnetem ferrum, quia sola fere materia ea, uires ab eo lapide concæ- ptas diu retinet. Aliud apprehendens ferrū, ut annulorū catena uideatur: quod quidem impe- ritum uulgus appellat, ferrum uiuū, uulneraq; ex tali asperiora fiunt. Lapis hic & in Cantabria eruitur. Non ille Magnes uerus, caute continua, sed sparsa, Bubbatone (ita appellant) nescio, an uitro fundendo perinde utilis: nondū enim expertus est quisq;. Auctor Plinius. Ferri utiq; inficit aciem, ut Magnes. Dinocrates architectus Alexandriæ templū Arfinoēs concamerare cœ- perat Magnete lapide. Intercessit mors, & ipsius, & Ptolomæi regis, qui id sorori suæ fieri cupie- rat, ut simulacrū eius e ferro pendere in aëre uideret: quod genus præstigia, ad superstitionem suam Arabes cōmentū dicunt in eo feretro, ubi auctor eius lectæ conditus existimatur. Dioge- nianus Magnetem uerum argento scribit esse tam similem, ut decipiat, Nechunc lapidē, qui ferrum ad se trahat, Magnetem, sed Heracleoten appellandum esse.

ἄραβος λίθος

γαλακτίτης

Arabus lapis elephantī maculæ similis. Is tritus illitu Hæmor- rhoidas exiccat. Eius cinis dentifricio optimus.

Galactites appellatur, q; lacteum reddat. Cinerei tamen est co- lor, ac gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones conuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pixide plumbea recondere, propter uim glutini, quod obhæret.

Galactites, ait Plinius, ex uno colore lactis est, succo quoq; eius & sapore, a quo nomē: de hac intelligat, an diuersa, dubium: quando cineris colore traditur a Dioscoride, non lactis. Est & Galaxia, quam aliqui Galactitem uocant, intercurrentibus sanguineis, aut candidis ue- nis. Nam Chalaxia, grandinū & colorem, & figuram habet, unde appellata est, adamantinaq; duricie. Narrant etiam in ignem additæ, manere suum frigus. Ergo Pliniana Galactites, quam

aliqui & Leucogageam, & Sinephyten, & Leucographin appellant, uidetur ei proprior. Quæ & Morochthos, & Leucographis, & Galaxia Dioscoridi & Galeno dicit, ut paulo post liquebit. Vtuncq; infantium adalligata collo, saluam facere dicitur. In ore aut liquefcere: memori am adimere uel iniuriarum. Mittit eam Nilus, & Achelous quoq; amnis. Sunt qui & Smaragdum, albis uenis circumligatū, Galactiten inquit uocent. Est & gemma Galaicos, distans ab hac, Argyrodamanti similis, paulo sordidior. Inueniuntur aut bina, aut senæ.

A

De Melitide.

CAP. CXLII.

Melitites omnia Galactitæ similis. Hoc tantum interest, q̄ dulciorem succum remittit. Eiusdem ut Galactites effectus.

melitites

BARBARI COROLL.

Melitites lapis dictus, quia succū tonsus melleum emittat. Differt ab hoc Melichrus: cuius plura sunt genera. Melleus colore. Differt & Melitis a malo, cuius imitatur colorē appellatus.

De Morochtho lapide.

CAP. CXLIII.

Morochthus lapis, quem aliqui Galaxiam, aut Leucographida uocauerunt, in Aegypto nascitur: quo utpote molli, & facile liquefcente, linteones dealbandis uestibus utuntur. Spiracula corporis obstruere uidetur, conueniens ijs qui sanguinem expuunt, coeliacis, & uelicæ doloribus, cum aqua potus. Idem fluctationibus uulvæ, impostus uelleri. Mollibus oculorum collyrijs miscetur. Explet enim caua, atq; delachrymationes sistit. Idem cærato exceptus, ulcera quæ fiunt in teneris partibus corporis, ad cicatricem perducit.

Morochthos

BARBARI COROLL.

Lapis Molochthus, aut Morochthus, siue ut Galenus & Paulus uocauit, Moroxus, & Graphis, haud uideo eundem cum eo esse, qui Molochitis, a colore malvæ dicitur, spissius uirens: nec translucida, reddendis laudata signis, & infantium custodiæ. Sit autē Morochthus, quem Plinius in ore ait liquefcere, de quo in Galactite diximus, ex collatione Dioscoridis subodorari potest aliquid, dicentis mollē eum esse, diluiq; facilem, ut uel idem cum Pliniano, uel si milis esse uideri possit. Nominatur & Morochthos Plinio, sed inter gemmas, lacte sudans porraceo. Idem auctor & Leucographin inter herbas collocat: nec qualis ea sit, reperisse unq; fateatur, eosdem ei effectus reddens, quos hoc loco Dioscorides, Galenus, cæteri, ut propterea non desint, qui Plinio quasi pro herba lapidem acceperit, increpitent. Sed auctor grauissimus, aliorum sententiam, non suam operē toto recitat.

B

De Alabastrite lapide.

CAP. CXLIIII.

Alabastrites uocatus Onyx, crematus, resina aut pice assumpta duricias discutit. Stomachi dolores cum cærato lauat. Gingiua compressit.

Alabastrites

BARBARI COROLL.

Alabastrites, siue Onyx in Alabastro Aegypti, circa Thebas nascitur: quem in aedificiorū quoq; ornamentis includunt. Nascitur in Syriæ Damasco, candore intercincto, uarijs coloribus. Cæteris omnibus candidior. Probatissimus in Carmania: mox India. Iam quidem & in Syria, Asiaq; Viliissimus, & sine ullo nitore in Cappadocia. Probatur maxime mellei coloris, in uertice maculosi, atq; non translucidi. Vitia in ijs corneus color, atq; candidus, & quicquid uitro simile est. Alabastrites, ad unguentorū fidem laudatissimus: unde uas, id est, Onycem unguentarium uocamus, quod & Alabastrum, & Alabastrū quoq; dicitur, etiā e uitro interm. Est & Onyx inter ostrea, ut uolumine secundo patuit. Habet & Onyx gēma: in qua unguis humani similitudine candorē esse dicūt. Alabastrites porro, & in Arabiæ montibus, & Germania quoq; reperit, ex quo & uasa potoria, & pedes lectorū, & selle delictijs faciūt. Itē amphoræ, & urcei cadorū magnitudine. Iā columnæ, 10. duos pedes longæ. Sunt q̄ hac amplitudine, nō Onycem, sed Onychitin uocēt. Differt ab Alabastrite Alabandicus, siue Alabandicus; & eū ueroq;

D I O S C O R I D I S

C modo legitur. Color Alabandico subnigrat ex ruffo. Perspicuus est, ut ignis, & quibusdā qua si rimulis uenisq; dehiscit. Capillos albos, attritus inficit. Dicitur Alabastrus Democrito, & sal omnis, & calx uiua: quæ de putaminibus ouorum conficitur. Hæc ipsa Encephalos quoq; dicitur a chymicis, & marmor Thebaicum, & Claudianum.

De Thyite lapillo.

CAP. CXLV.

λίθος θυίτης

Lapis nomine Thyites, in Aethiopia gignitur, subuiridi colore, la spidem imitatus. Liquefcens tamen lacteum succum reddit. Vehe menter mordet. Tenebras quæ pupillis obuersione expurgat.

BARBARI COROLL.

Lapis Thyites, a Plinio Mortarium uocatur, quoniam Thya mortarium significet: etiam Acone dictum Hippocrati, ut Galeno placet.

De Iudaico lapide.

CAP. CXLVI.

ιουδαϊκός λίθος

Iudaicus lapis in Iudæa nascitur, glandis effigie, candidus, scita admodum configuratione, discurrentibus lineis quasi industria detornatis. Solutus nullam qualitatem manifestam gustui repræsen tat. Potest ciceris magnitudine tritus ad cotem, ut collyrium, cum cas lidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati urinæ auxiliari, & calculos in uesica comminuere.

BARBARI COROLL.

Hic & Tocolithos uocari coeptus, quia calculos absumat: qd a Galeno falsum existimat.

De Amianto.

CAP. CXLVII.

λίθος ἀμιάντος

Amiantus lapis in Cypro nascitur, scisso Alumini similis, quo ut pote flexili, pannos tantum ostentationis gratia texunt, qui ad ignes coniecti ardent quidē, sed flammis inuicti splendoriores exeunt.

BARBARI COROLL.

D Lapis Amiantus, ueneficijs resistit omnibus, præsertim magorum. Hoc qd de lapide A diantho dicitur. Texi ex eo uela, quorum ignis uelut aqua sordes eluat. De lapide quodam na scente in Carystho Euboææ, Strabo retulit.

De Sapphiro.

CAP. CXLVIII.

σάπφειρος

Sapphirus lapis, percussis a scorpione potu prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Excrescentia in oculis, uasq; & pustulas inhihet, & ruptas membranas cogit.

BARBARI COROLL.

Sapphiri aureis punctis collucet, ceruleæ, rarosq; cum purpura. Opimæ apud Medos, nusquam tamen perlucidæ. Præterea inutiles sculpturæ, interuenientibus cristallinis centris. Sapphirum gemmarij inter Iaspides collocant.

De Memphite.

CAP. CXLIX.

μεμφίτης

Memphites in Aegypto iuxta Memphin inuenitur, calculorū ma gnitudine, uersicolor. Tradunt trito & illito, quæ urenda, aut se canda sunt, sine periculo obstupescere, ita ut non sentiant cruciatū.

BARBARI COROLL.

Lapis Memphites, gemmantis est naturæ.

De Selenite lapide.

CAP. CL.

σελενίτης

Selenites lapis, quem aliqui Aphroselenon appellarunt, quoniā no cto plenus, crescente luna reperiatur. Nascitur in Arabiā, candidus, translucens, læuis. Huius ramēta comitialibus in potu dari iubent. Eo ad

amuleta mulieres utuntur. Arbores adalligato eodē frugifere reddunt. A

B A R B A R I C O R O L L.

Selenites, fulgore melleo pspicius nomine accepto, quia imaginem Lunæ reddat in dies singulos augescens, minuentiq; numero. Hunc semper Galenus Aphroselenon appellat, Chymistæ Aphroselenon, etiam Comarin, & a leuitate ponderis Cupholithon, & Argyrolithon quandoq; uocitant. Habetur & Comaris apud eos Scythica, pro Arsenico & sulphure. Itemq; pro lapide philosophico, toties a nobis indicato, coarguendi potius & irridendi proposito, qm monstrandi. Seleniten Eustathius alium quoq; lapidem intelligit, qui & Asterius, & Lychnites uocetur, nascens in Thracia Pallenis litoribus, auctore Dionysio. Plinius Lychniten ab Asterio diuidit, itemq; Selenite. Sed ut herbarum, sic & lapidum uocabula confundimus.

De Iaspide lapide.

CAP. CLI.

Iaspidium quædam Smaragdum imitatura. Alia Chrystallū, similis pituitæ. Alia nō dissimilis æri: ob id uocatur Aërizoufa. Alia ueluti fumo infecta, quæ Capnias ex argumento uocatur. Quædā lineis albis & resplendentibus præcingit, Assyrios appellata. Alia Terebinthinæ similis, quæ Terebinthizusa dicitur. Alia colore Calaida gemmā æmulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum femoribus appensæ.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapis sepe traslucet ac uiret. Smaragdo similis Indica est. Cypria, colore glauco & pingui. Perlica, similis æri: quæ ob id Aërizusa uocatur. Thermodontiaca, cerulea; & Scythica inter ceruleas omnes optima. Phrygia purpurea. Cappadox ex purpureo cerulea, atq; non effulgens. Thracia Indicæ similis. Chalcidica turbida, præfertur omnibus, quæ purpureæ quicq; habet: secunda quæ rosæ: tertia quæ Smaragdi: quarta cælo autumnali matutino similis: quæ Boëa appellat, & Aërizusa. Similis est & Sardæ, imitata & uiolas. Non minus multæ species reliquæ: sed omnes in uitro ceruleæ, aut chrystallo similes, aut pituitæ, atq; mucosæ, siue ut Plinius, Myxis. Item Resinæ Teberinthi, quæ & Terebinthi Zufam uocant, inter ceruleas & ipsam maris existimantes. Nam quæ Iaspachares appellatur, ex Iaspide Smaragdo simili, et Achate proprietatem suam habet. Prestantiores Sphendone, id est, funda cludis solent, id est, parentes, nec præterq; margines auro amplectente. Vitium est & breuis nitor, & longesplendens, & sal & omnia, quæ in cæteris gemis nitro adulterata coarguitur, extra fulgorē spargendo, atq; nō continendo in se, nec in diuersa. Quæ Sphragides uocantur, quoniam optimæ omnium signent: ea quæ Smaragdo similis pertransuersum linea candida præcingitur. Orienti familiarissima, pro Amuleto Garāmātis uocat, quæ pluribus Polygramos. Est & Onychi puncta, quæ Iasponyx dicitur, & nubē complexa, & niues imitata, quæ stellata rutilis punctis est, & salī megarico similis, & fumida, Capnias, siue Capnitis appellata. Magnitudinē Iaspidis, undecim unciarū uidit antiquitas, effigie Neronis thoracata. Inter ceruleas, post Scythicā Cypria: post quā Aegyptia. Adulterat maxime tinctura. Idq; in gloriā Regū Aegypti ascribitur ei, q primus tinxit. Inest aliquando ceruleis aureus puluis: nō ut in Saphiris puncta. Galenus Iaspide medicinæ utilis, Chloron Iaspin, hoc est, uiridem cognominat. Inscribi iussit in Iaspide draconem radios habentē Necepsos Rex, ad stomachi futurā. Sed idem pfectus est, in torque suspensio eo rudi, ita ut os stomachi attingat.

De Aëride lapide.

CAP. CLII.

Aetides lapis est ueluti prægnans, cum quatitur alio in utero sonante. Grauidis continet partus, cum lubricæ sunt uulvæ & parū tenaces, sinistro brachio adalligatus. Sed parturientibus e brachio amoueatur, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditū offerat. Fur enim mansum deuorare nō poterit. Quinetiam concoctus, furem coarguit. Quippe decocta cū eo, deuorare non poterit. Tritus & cærato exceptus, cyprino, aut gleua

D I O S C O R I D I S

Cino, aut alio excalfaciente, comitiales magnifice iuuat.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapis Aëtites, quem aliqui Gagiten dixere, Strabo Gangiten, in Armenia reperit scribit: quo serpentes fugant: hunc, an alium accipiat, nondū liquet. Inadificatur nido aquilae, non tamen omnium, nihil igne deperdens: sed uis eius medica, non nisi nido direpti. Aiunt binos in ueniri, marem, & foeminam: nec sine his parere Aquilas, & ideo binos tantū. Genera eius quatuor feruntur. In Africa pusillus & mollis, ac uelut in aluo habens argillam suauem, candidam. Ipse friabilis: quem foeminam existimant. In Arabia mas durus, & similis gallae, aut subrudius: in utero continens lapidem durū. Tertius in Cypro, colore Africani, amplior tamen atque dilatus. Caeteris enim globosa facies. Habet in aluo harenam iocundam, & lapillos. Ipse tam mollis, ut etiam digitis fricetur. Quarti generis Taphiusius uocatur, nascens iuxta Leucadem in Taphiusa: qui locus est dextra nauigantibus ex hac ad Leucaden: inueniturque in fluminibus candidus ac roridus. Huic est in aluo lapis, qui uocatur Callimus: nec quicquam tenerius. Nam Calais, aliud genus est lapidis, a quo & Calainus color, pro Veneto, si Photioni credendum est. Ego etiam sordidū colorem, Plinius secutus, Calaini appellatione possum capere. Amplius dicitur inquit conspicua, sed fistulosa & sordidū plena est Calais. Hic & Augites a multis dicitur. Quae uero Calaina ostraca nominat Aëtius, pilos extenuantia, considerantibus relinquo. Apud chymistas uiuae calcis aquam inuencio Calaiou uocari. De Calaino etiam colore, Dioscorides in lapide supra mox commemorat, idem Aëtien pro Chrysolitho, & Porphyrite, & Chrysochromo cognomine Macedonico, & Polychromo accipiunt.

De Ophite lapide.

C A P. CLIII.

οφίτης

Ophitae genera multa. Quidam grauis est odoris, niger. Alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus. Tertius lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omnes contra capitis dolores, & ferpentium ictus profunt. Feruntur qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari.

D

B A R B A R I C O R O L L.

Ophites, marmor est serpentium maculis simile: a quo nomen. Duo eius genera: molle candidum: nigricans durū. Ex Ophite, columnae nisi paruae admodū inueniuntur. Inter Ophitas existimari fere possunt, propter colorem, quod Augusteum uocant & Tiberiū. In Aegypto utriusque principis temporibus reperta. Differunt, quia maculas diuerso modo colligunt. Augusteum undatim crispatur in uertices: Tiberium sparsum, conuoluta canicie spectatur. Theophrastus lapidem Chium uocando, uidetur Ophitem intellexisse. In Aegypto inquit, nascitur lapis niger, translucidus, Chio similis. Quem locū Plinius ita uertit, Theophrastus inquit auarior est, translucidos lapides in Aegypto inueniri, quos Ophitae similes ait. Fortasse, quia uersicolores illas maculas, ut ait Plinius, primae Chiorum lapidicina ostenderunt.

De Lapidibus Spongiarum

C A P. CLIIII.

LAPIDES in Spongijs inueniuntur, qui uesicae calculos rum-punt, in uino poti.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapides, qui nascuntur in Spongijs, & ipsi uocantur Spongiae, quidam eos Cystolithos uocant: quia uesicae medeantur. Sunt & Pumicum in genere, quos Spongas uocant: ut in Pumice docuimus.

De Lithocolla.

C A P. CLV.

λιθοκόλλα

Lithocolla glutinum, quo lapides coniunguntur. Fit autē ex marmore, lapide pario, & taurino glutino. Potest candente specillo admotum, incommodos oculis pilos replicare.

B A R B A R I C O R O L L.

Lithocolla nomine, significat glutinum ex lapidibus.

De Ostracite.

CAP. CLVI.

Ostracites testæ similitudinem habet, glebosus, & in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice utuntur. Menses drachmæ pondere potus ex uino sistit. Si quattuor diebus a coitu bibatur sicilici pondere, foeminis prestat ne concipiant, Cum melle autem impositus, manarum inflammationes lenit, & nomas cohibet.

BARBARI COROLL.

Ostracites a testa nomen habet. Transilit & ad gemmas. Si quidem, ut Plinio placuit, Ostracites, siue Ostracites, altera est testacea & durior, altera Achate similis. Nisi quod Achates politura pinguescit, Duriori tanta uis inest, ut aliæ gemmæ scalpantur fragmentis eius. Habetur & Ostracides, cui Ostrea nomen, & similitudinem dedere.

De Smyride.

CAP. CLVII.

Smyris lapis est, quo annularij scalptores lapides expurgant, ad erodendum, et urendum utilis. Gingiuis quas humor uexat, prodest. Dentifricio commendatur.

BARBARI COROLL.

Nota uulgo Smyris, uel ipso nomine, quanquā Smyrium potius quā Smyrin officinæ appellant: cuius fragmentis gemmæ aliæ scalpantur: quo usu Plinius secundus non Smyrin, sed Ostraciten uocauit, ut superius proxime notauimus.

De Harena.

CAP. CLVIII.

Harena e littoribus sole seruesacta, hydropicorum tumores exugit, si capite tenus in ea obruatur. Torreretur ad aridos fortis, pro milio, aut sale.

BARBARI COROLL.

Harena littorum, græce Plammos, & Hammos Aegialitis uocatur. Quæ porro calculosa lapidiosaque est, Acholax poetis dicitur. Harena secantur marmora premente eam serra, in præ-tenuilinea uersando, tractuque ipso diuidente. Aethiopica ad hoc maxime probatur. Proxima Indica, & scabrior: qua combusta poliunt marmora. Scabra est & Naxia, & a Coptis quæ uocatur Aegyptia. Postea inuenta est, non minus probanda, ex quodam Adriatici maris uado festu nudante, obseruatione non facili. Fraus deinde secandi, quacunquæ harena fluuiatili, quæ quod crassior est laxioribus segmentis teritur, ita sectæ attenuantur crustæ. Polituris accommodant Thebaica, et quæ sit e pumice, aut Porro lapide, hoc est, Tofo. De Sabulo puteolano, Capanoue, ite de Etrusco, quod proprie Carbunculus uocatur, nihil dicturus sum, nisi quod Campanum ex usta terra, Carbunculus ex cocta materia efficitur. Autor Vitruius, Romæ uulgo Puteolana dicitur harena quocunquæ loco fossilis, modo quæ in calcem conueniat.

De Cote.

CAP. CLIX.

Ecote Naxia, quod exacuendo ferro detetitur, illitum alopecias ad pilum reducit. Virginum mammas cohibet, nec increfcere patitur. Potum ex aceto lienem absumit.

BARBARI COROLL.

Cotes, siue lapis Naxius, id est, Acone, sicut olearis Cotes, Elæa cone. Diu placuit Cotes, e marmore Naxio, ut & simpliciter Naxium dicatur. Ita uocant in insula Cypro genitas, Vicere postea ex Armenia. Differre putant Cotem a lapide Cotica: uon solitum inueniri, nisi in flumine Timolo, siue Tmolo (nam utroque modo recte dicitur) a mōte, ut arbitror, cognomine in terra Lydia. Nunc uero passim quæ alij Heracium, & Lydium appellant. Sunt autem leues, & calculis similes, quaternas uncias longitudinis, binasque latitudinis non excedentes: siue ut Theophrastus inquit, calculi amplissimi, dupla magnitudine, pererea specielata, non rotunda: quod a sole fuit in his melius, quod a terra. Sed & caloribus immodicis deterius respondet. Fiunt enim aspergi

LI

Cne quadā ex alto reuocata, quasi lubricę, ut idē Theophrastus ait, his Coticulis periti cū uenā siue nūmo lima rapuerint, experimentum protinus dicunt, quantum auri, quantum argenti aut aeris habeant scrupulari differēda, nuncq; fallente ratiōe: incipientibus a minimis notis, hoc erat granū, post colybus, tū duo chalchī, dein quatuor moria, ut Theophrasti uerbis agā. Lapis & Chrylīus, & Balanos chrysochoice, hoc est, index aurarius uocat, quo, ut gręci aiunt, aurū explorat, obryzū sit, atq; probū, an improbū uiciosumq;. Quanc; Balanistes & p mortario qnq; accipit. Porro dicitur Obryzū, quasi abryzū, hoc est, delicatū sincerūq;. Vt Photionis etymo utar. Vocat aut Obryzū, q̄ciens simili colore rubet ignis, ut inq; Plinius, & aurū qd apyrō appellat, purum est: idq; habet nomen, q̄a igne nō egeat: quale arabicum esse Dioscorus tradit: qd inter Abileos, Galandosq; foditur, De arabico Auro & literę sacre meminere.

De Lapide Geode. CAP. CLX.

ἀπό γινώσκου

Geodes lapis, adstringit, siccāt. Caligines oculorum discutit. Illit-
tus autem ex aqua, testium manarumq; inflammationes sedat.

EX M. VERG. COMM.

Geden ex argento appellant, quoniam amplexus est terram.

EX M. VERG. COMM.

Repetemus & id quidem q̄ breuissime licebit, ex gręcorum decretis, quas uniuerso lapidū generi uires, priuatimq; singulis, & his præferim quos deinceps ex toto eorum genere hic scri-
ptor numerauit, naturam dedisse antiquiores deprehenderunt. Quę huiusmodi sunt. Siccā non aliter q̄ Terra omnis lapides omnes. Priuatim tamen Magnes, quem & Heracleum lapidē uocant. Hæmatitæ æquales habere uires dictus est. Notus ubiq; hic lapis, mirabili naturę euer-
tu, ex interuallo ferrum ad se trahens: & quasi sensus, manusq; illi sint, omnium rerum domiti-
uibus Herculis traduntur. Ob quam causam ab Hercule Heracleum credidere aliqui dictū fu-
isse. Verum tamen non desunt qui non ab Hercule, sed ab Heraclia Magnetiæ dictum uident. Et
quemadmodum a Magnesia Magnes, sic Heraclius ab Heraclia dictus fuerit. Sic Lucretius li-
bro, s. creditur dicēs. Quod superest agere incipiam, quo fœdere fiat Naturę lapis hic ut ferrum
ducere possit. Quem Magneta uocant, patrio de nomine Grai, Magnetum quia sit patrijs in si-
nibus ortum. Et si Plinius autore Nicandro, a Magnete inuentore nominatum testetur. Euripi-
des non hunc Magnetem in carmine suo uidetur uocasse, sed Indicem, quo argentarij utuntur.
Verficulus eius est. τὰς βρωτὸν γινώσκου σκοπὸν ἄντ μαγνήτις λίθος. Quod est, Hominū mentes uel-
uti Magnes lapis probans. Arabicus Ebori similis, siccandi repurgandiq; uires habet. Lactari-
us scissili eadem omnia, sed minore efficacia potest. Melitites a sapore mellis nominatus quadā
tenus calefacit. Morochthos, quem a candore lactis Galaxiam, & Leucographida uocari Dio-
scorides ait: quo prædictis omnibus mitior est, quia nullas habet efficaciores uires, eo magis si-
ne dolore curat. Eamq; ob causam, in mollibus corporū partibus ad inducendas cicatrices usa
eo antiquitas est. Plinius tertiam lapidis huius appellationem inter herbas numerauit lib. 27, no-
minis uicināte cum leuce deceptus. Poterunt uidere id uolentes. Nos enim festinantes hæc tm̄
ueteribus bibendum dederunt cibum in stomacho non continentibus. Hunc primo Onychē,
ab humani unguis similitudine ueteres gręci nominauerunt: quemadmodum secundo uolu-
mine in Indico Onyce diximus. Nunc eo loco dictis adiciendum est, gręcos præter Onychem
Alabastritem etiam uocasse, ab usu. s. qm̄ ad Alabastra unguentoꝝ usus eius esset. Fuerunt aut
gręcis Alabastra lapideæ pixides, in quibus ob frigiditatem suam diuissime & felicissime odo-
res seruarent: sic dicta, quoniā ob læuorem suam e manibus laberentur. Et qm̄ ex Onyche hoc
alabastra illa fierent, ideo Alabastrites lapis dictus est: priusq; Onyx fuit: tum facta ex Onyche
alabastra Alabastritē uocari lapidē fecerunt. AEqui uoca in gręcis, ut uidetur, ad unguem & la-
pidem Onycis uox est: poteritq; aliquando ubi parum certa res sit, legētes fallere: quemadmo-
dum primo uolumine in Bdellio dubitari potest, lapidi ne, an ungui id Diosc. comparauerit.
Simpliciter enim βρωχί λίθος esse ait. Nos nihil illi aliud adiectum inuenientes, unguem uerti-
mus: id enim tutius uisum est, & si Alabastritæ huic lapidi simile forte Bdellium ille fecerit. Qd
tunc relictum monuisse nunc satis sit. Quemadmodum a mortuorum usu Thyitem eum qui
statim sequitur dici intellexisse. De quo præter tradita a Diosc. nihil certum in antiquis gręcis in-
uenimus. Dissicere renum calculos dictus ab illis Iudaicus est. Ob easq; uires posteriores gręco
sum medicū Tecolithon, id est, calculos absumentem eum uocauerunt. Sapphirū cōtra scorpiō

num ictus bibi utiliter, idem græci dixerunt. Lunarem comitialibus utilem. Iaspidem, qui uiri di colore sit, alligatum, & in anulo gestatum, cibum in stomacho non continentibus prodesse. Qui autem subuiri di, qm̄ efficacior sit, oculorum cicatrices & pterygia extenuare. Ophitē ad alligatum, contra uiperarum morsus prodesse. Calculos in uescicis frangere, in spongij inuentos lapides. Ostracitem, & Geodem, id est, terram intra se complexum, efficaci ad siccandum ui esse: ideoq; inflammatis tumoribus egregie prodesse. Smyrim repurgandi uim habere: ideoq; dentifricis accōmodo datum esse. Refrigerandi uim habere etiam crediderunt ueteres græci, quod ex Naxia cōte confricato ferramento detritum fuerit: eaq; ui crescentibus uirginum mamis, & puerorum testibus utile. Quod uero ex olearia Cote detritum pariter fuisset, capilli defluuia, quas alopecias dicunt, exple. Plures alios etiam medicinae utiles lapides numerauerunt post hunc scriptorem posteriores græci: uerum ab eo relictos, nos etiam relinquimus: in re quæ iam pridem desijctin honore esse, legentes monuisse hactenus contenti.

¶ De Terra. CAP. CLXI.

OMnis terra ad medendi usum recepta, sumam & primam uim habet occludendi. Sed specie distant, cum alia adiunctis quibusdam, ad alia sit utilis.

BARBARI COROLL.

Terra, hoc est Ge, omnis sicca est in medicina ui, præsertim appellata Georgumene, hoc est, agricolaris. Nam terra Aegyptia, e luto eius sit. Sunt qui Aegyptiam, pro singulari terra interpretentur. In nomine est & Cretica, minus pollens, & plus habens aeris q̄ ceteræ: usus ad extirpandas sordes argenteis uasis celebratissimus. Et Armeniæ glebæ locus, siue lapis ea, siue ut Galenus mauult terra nominetur: quia madescat aqua interius, non summa tñ cute, ut lapides. Vulgato eius usu, contra pestilentiam, quæ Galeni ætate fuit, & contra deploratos phthisicos: ob id in Africâ & Alexandria nauigare solitos, ex Armenia Cappadociæ cōtermina inuehit: ui maxime siccifica, luteo colore, aut pallido, teri facilis, usti mō lapidis: minimū tñ harenosa lapido faue, sed Samio Asteri leuore similis, uerū pōderosior ac densior. Syri eā Zazinacha appellat, ut Aetius inq̄t, urbē in cuius mōte nascit Vagauanaga uocari: agrū in q̄ mōs ille sit Agaraces uulgo dici, cui similis ē effectus, quæ Alanæ cognominat. Est & Carasenia ex oppido Tauricorū peninsulæ, qua uulnera oīa sanant. Quod aut genus Cretæ sit, quā Hippocrates Schediada nominauit, duorum discriminū, haud plane scio: quemadmodū nec illam quam Conchylū Xenophon, alij Cenchylū uocant lapidem, ut inq̄t Pollux. Agricolaris duæ sumæ differentie, in finitīs inter eas medij. Nigra, quæ & pinguis est. Alba, quā græci uocant Argilon, hoc est, Argillā, Sabuloni similē, ac ieiunā, sordidā, famelicā. Sunt & alia duo Terrę gñā. Pharmacitis, hoc est, medicata: cuius species Eretrias, & Samia, & Rubrica, & Lemniā, & quæ sequuntur ceterę, Metallicū: in quo lapides, & fere quæcūq; supra diximus, orsi a Cadmiā.

¶ De Eretriade. CAP. CLXII.

Eretriæ duæ sunt, una uehementer alba est, altera cinericiā. Optima habetur ad cinereum colorem uergens, perq̄ mollis, quæ si per æramenta tractim ducatur, lineam uiolaceam refert. Lauatur ut Cerasa, aut hunc in modum. Teritur ex aqua, & ubi pessum ierit, humor leuiter excolatur. Siccata solibus iterum teritur, interdū adiecta aqua, ut uespere confidat. Antelucanis colo excernitur, & demum in sole trita, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desyderetur, pastilli magnitudine Ciceris in fictile perforatū conijciuntur, oreq; uasis diligenter obturato, supra carbones continenter follibus persilantur. Vbi uero cinis in fauillas se conuertit, aut æreum colorem contraxit, exempti reconduntur. Vim habet adstringentem & refrigeratōriam, leuiter mollientem. Caua explet, & sanguinolenta conglutinat.

BARBARI COROLL.

Eretria, & Eretrias terræ suæ nomen habet. Hac Nicomachus & Parafius usi.

Pli. de terrę generibus lib. 17 capite. s.

B

D I O S C O R I D I S

C
γῆ σαμία

¶ De Terra Samia. CAP. CLXIII.

Samia præfertur candida, levis, tangenti linguæ glutinosa, mollis, succosa, friabilis. Cuiusmodi est quam aliqui Collyrion, & uocant & uocant. Duæ enim species eius. Vnam ante diximus. Altera Aster appellatur, crustacea, & cotis modo prædēsa. Vritur ac lauatur ut Eretria. Vimq; consimilem habet. Sanguinis reiectiones sistit. Fœminis fluctione uulū laborantibus, cum flore syluestris punici datur. Testiū & mammarū inflammationes illita ex rosaceo & aqua refrigerat. Sudores arcet. Contra serpentiū morsus et uenena pota ex aqua auxiliat.

B A R B A R I C O R O L L.

Terra samia, genus est candidi coloris, quemadmodum & Melinon, de quo in Creamelina disseritur. Porro Samia quæ Aster uocatur, globosior est q̃ species eius altera Collyrion, utraq; tamē candida. Nascitur & in Samo quoq; Melinum, sed pictiores eo quod sit e Samo nō utebantur, propter nimiam pinguitudinem, sed eo quod e Melo. Accubantes effodiunt tibi, hoc est, nō stantes, sed aut in obliquum, aut supini uenas scrutantur in faxis, autore Theophrasto: quæ ut Iulius Pollux inquit, Geophania uocantur, Aster, non nisi quarta demum aggreffione proditur.

λίθος σαμίας

¶ De Samio lapide. CAP. CLXIII.

Samius lapis, in Samia terra inuenitur, quo aurifices utuntur poliendo auro, ut resplendeat. Probatur candore & duricia. Vis ei adstrictoria, et refrigerans. Prodest stomachicis potus. Sensus hebetat. Verum ad lachrymationes oculorum & ulcera cum lacte efficax est. Partus, ut tradunt, adligatus accelerat, & conceptus fœminarum custodit.

D
χία γῆ

¶ De Chia terra. CAP. CLXV.

Chia eligi debet candida, uergens ad cinereum, Samiæ similis. Est autem glebosa, albaq; sed ficticijs formis differens. Vis eadem quæ & Samiæ. Extendit faciem, & erugat, atq; splendidam reddit. Colorem in facie & corpore toto commendat. In balneis pro nitro deterget.

σέληνusia γῆ

¶ De Selinusia terra. CAP. CLXVI.

Eadem præstat Selinusia. Maxime laudatur quæ uehementer resplendet, candida, friabilis & aqua dilui celerrima.

B A R B A R I C O R O L L.

Selinusia, lactei coloris est, eadēq; lacte diluta, renouandis albarijs tectoriorū probatur.

κίμωλία

¶ De Cimolia. CAP. CLXVII.

Cimoliæ duo genera, candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur quæ innatam habet pinguitudinem, tactuq; frigida sentitur. Vtraq; aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit. Ambusta igni si statim Cimolia oblinantur, pustulas non sentient. Testium duricias, & totius corporis collectiones cohibet. Igni sacro imponitur. In summa, utraq; multum in medicina commendatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur.

BARBARI COROLL.

Terra Cimolia, siue ut Hippocrates & Pollux & Nicocharis appellant, terra Mectis, siue Smectis, ab exterfu a Cimolo quidem, una Cycladiū. Sed tñ laudatur maxime Thessalica. Nascitur & in Lycia, circa Bubonem oppidum. Est & alius usus Cimoliæ in uestibus. Nam Sarda, quæ affertur de Sardinia, candidis tantum probatur, inutilis uersicoloribus: & est utilissima omnium Cimoliæ generū. Preciosior Vmblica, & quam uocant Saxū. Proprietas Saxi, q̄ crescit in macerando, atq̄ pōdere emittit: Illa uero mensura, Vmblicā nō nisi poliendis uestibus assumebant. Primū igit̄ uestibus abluebat Cimolia Sarda, dein sulphure suffiebat: mox desquamaf Cimolia, quæ est coloris ueri. Fucatus enim nigrescit, & effundit sulfure: ueros aut̄ & p̄ciosos colores emollit Cimolia, & quodā nitore exhilarat contristatos sulfure. Candidis uestibus Saxū utilius a sulfure, inimicū coloribus. Græcis uicem Cimoliæ Gypsum tymphaicum implebat.

De Pnigite terra. CAP. CLXVIII.

Quæ Pnigitis dicitur, colore Eretriæ similis est, grandioribus tantum glebis. Manum si quis admoueat, refrigerabit. Tactu linguae usq̄ adeo glutinosa, ut pensilis hæreat. Cui effectus idem qui Cimoliæ, paulo tamen infirmior. Hanc aliqui pro Eretriæ de uendunt.

BARBARI COROLL.

Pnigitis, nigra est, ut Ampelitis, glutinosior quandoq̄ q̄ Samia.

De Testis. CAP. CLXIX.

Fornaceæ Teste, uehementer tostæ, crustas ulceribus obducunt. Quare prurigini, & pabularum eruptionibus medentur. Podagricis prosunt, Strumas discutiunt, cærato exceptæ.

BARBARI COROLL.

Testas, Ostrea uocant græci.

De Terra fornacum. CAP. CLXX.

Fornacum terra, quæ retorrda fuluescit, eiusdem cum Testa effectus.

BARBARI COROLL.

Terra usta, siue tosta, itemq̄ ruffa, quæ a græcis Catopos & Caminitis atque Pyrra dicit̄, nō eadem est cū ea, de qua Plinius ita meminit. Usta casu primū repta in cēdio, Pyrræ cerussa in orcis cremata, quam primus Nicias tabulis inusserit. Optima nunc Asiatica habetur usta, quæ & Purpurea inquit uocatur. Preciū eius in libras æris quinq̄. Fit & Romæ usta cremato silice mar moroso, restinctu aceti, purpureo colore, ut inquit Vitruius. Sine usta non fiunt umbræ.

De Melia terra. CAP. CXXI.

Melia colore cineream Erethriam imitantur, aspera tactu. Ea dicit̄ friata, derafi pumicis modo crepitat. Vim habet alumino sam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur. Modice linguā siccatur, purum corpus reddit, & colorem cōmendat. Pilos extenuat. Viti ligines & lepras abstergit. Pictoribus usum præbet, ut colores diutius perennent. Emplastris quæ Chlore dicit̄, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra, & omni alia in uniuersum, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit facile resoluatur.

BARBARI COROLL.

Colores, præter Cerussam, candidi erant antiquitus duo. Melinum, ab insula Cycladiū Melio dictum: quod & in Samo quoq̄ nascitur, ut diximus. Linguam tactu siccatur omne Melinum. Taxatur in libras, singulis sextertis, Melinum porro, a terra Melina, siue ut græci appellant, Me

Cliade, atq; Melia nihil distat. Alterum candidi genus, Paretonium uocatur. Nomen loci habens ex Aegypto. Spumam maris esse dicunt, sordidatam cum limo, propterea & minutas in eo spectari conchulas. Fit & in Creta insula, & Cyrenis. Adulteratur Cimolia decocta, cōspissataq; . Preciū optimo in pōdo sex librarum. E candidis coloribus pinguisimo, & ppter leuorē tenacissimo rectorijs. Fuit & Smyrnæ terra, Theodorios ita nominata, quia Theodoti fundus is erat, in quo id genus Cretæ primo sit inuentum. Hanc Plinius inter candidas enumerat, quæ ueteres inquit, ad nauium picturas utebantur. Victruius inter uirides, optimā credi uoluit.

De Ampelide terra. CAP. CLXXII.
EX Ampelide terra, quæ Pharmacitis nomine, in Seleucia iuxta Syriam nascitur, laudatur imprimis nigra, piceæ carbones referēs, affulosa, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet. Ad calliblephara additur, tinguendis capillis idonea. Vfus ad illinendas uites sub germinatione tempus. Vipote cum innascentes uermiculos enecet.

BARBARI COROLL.
Ampelitis, bitumini est similissima. Vocatur ita, quoniam uitibus, quæ gemant illitis, arcere creditur uermes Ipsas, siue Senipas a grecis appellatos, a nobis Voluoces, & Conuoluolos: etiam si Voluocem alij dumtaxat intelligunt, qui præodat pubescētes uuas. Theophrastus hæc in Cilicia coqui tradit, atq; ita lentescere, uitesq; obungere. Hæc & Pharmacitis dicitur, etiam si nomen hoc medicis omnibus commune est, ut inquit Galenus.

EX M. VERG. COMM.
Quod ad omnem terram cōmuniter priuatimq; hanc, aut illam a grecis traditum pertinet, sic se habet. Siccatur omnis terra: & nisi mixtam, coniunctamq; sibi aliam habuerint qualitatem, nullam habet erodendi uim. Sin autem feruida illi qualitas aliqua accesserit, eā omnem lotura amittit. Primumq; a ueteribus grecorum medicis efficacissime adstringere Eretia dicta est. Crematamq; & lotam sine erosione siccare, & in toto eius genere probat & anteponi cunctis alijs quæ cinereo colore est. Samiam, quoniam glutinosa lentore sit, utilem omnibus quæ leniri oporteat. Omnesq; sanguinis eruptiones, quacūq; parte erumpant, compescere. Chiam & Selinusiā maiore & efficaciore repurgandi ui esse: ideoq; mulieribus ad nitorem & lauiorem cutis usum eius fuisse. Quinetiam carnibus ulcera explere, & ad cicatricem perducere, præsertimq; ambusta. Cimoliam, quam a Cimolo insula nominauerunt, mixtas refrigerandi discutiediq; habere uires: & hoc simplicē, nec lotā: lotā uero magis refrigerare, & ambustis ex posca mederi. Pnigitim deinde pares Cimoliz uires habere. Hanc nigro colore esse tradiderunt ueteres greci. Ampelidem a uineis appellatam ferunt: q; contra innascentes uitibus uermes, gemmasq; earum erodentes, usus quondam eius esset: siccandi discutiediq; egregias habere non sine erosione uires. Numerauerunt & alias aliquot reliq̃as ab hoc scriptore posteriores greci. Aegyptiam, cuius luto contra incipientes cutem subire aquas, & duratos lienes uteretur. Creticam, quam sine erosione similem Ampeliti constituerunt. Alanam, quam Armeniæ glebæ æqualem fecerunt. Omniumq; postremam Armeniam glebam, quam adhuc Armenium Bolum uocant. Cuius multiplex fuit & est in medicina usus. Numerabantur ab eis etiam in Terræ celsu Lemnia, Sphragis, Sinopis, Rubrica, & Fabrilis. De quibus quoniam nō multo ante priuatim actum ab hoc ipso scriptore, & a nobis est, nihil ultra hoc loco agetur.

De Fuligine pictoria. CAP. CLXXIII.
Fvligo qua pictores utuntur, ex uitrarijs officinis colligi solet. Si quidem ei palma tribuitur. Vis ei ad adstringendum & erodendum efficax. Fracta cum rosaceo carato, ad cicatricem perducit.

Pli. li. 35. ca. 6

BARBARI COROLL.
Fvligo hæc a grecis Asbolon, & Asbole uocari solet. Inuenti sunt pictores, qui esepulchris carbones infectos effoderent ad attramentū rectorium, siue quod idem est, Pictorium. Sed cōmodius tū sit ex fuligine, resina exusta, aur pice: propter quod officinas & laconica etiam ædifi-

cauere, fumo excipiendo. Fit ex farmentis, sed laudatissimum e tædarum Schedijs, ita enim uocat assulas Vitruius. Igitur Fuligo quæ parieti & cameræ curuaturis adhærescit collecta, partim componitur ex gummi subactio ad usum atramenti librarij, partim tectores glutino ad mixto in parietibus utuntur. Adulteratur fornacium, balnearumq; Fuligine, quo ad uolumina scribenda utuntur. Sunt qui & uini facem arefactam excoquant: quæ si ex bono uino fuerit, Indici speciem imitari uideatur. Polygnotus & Mycon e uinaceis fecere, Tryganon uocatum. Apelles commentus est, ex ebore combusto, quod Elephantium uocant. Fit & e tædis ligno combusto, tritisq; in morario carbonibus. Mira in hoc Sepiarum natura: sed ex ijs non fit. Omne autem Atramentum sole perficitur, librarium, & tectorium, glutino admixto: quod autem aceto liquefactum est, ægre eluitur.

EX M. VERG. COMM.

Facilis cognitu pictoriæ Fuliginis huius in Vitruiuo confectio est. Eam longius scriptor ille septimo suæ architecturæ libro tractauit. Poterunt uolentes ab eo non eius tantum, sed librarij Atramenti etiam, quod statim sequitur, certam audire rationem: ideoq; nos nihil ultra de his agimus. Monemus tamen, quod in hoc capite a Barbaro uersum est, fracturas perducere ad sanitatem Fuliginem hanc, assumpta cera Rhodia, longissime a Dioscoridæ sensu ab esse. Neq; enim quod hic ait, *ονν ποδιον κρηται* ad gentem & insulam Rhodum pertinet, sed ad ceratum, quod rosaceo unguento coactum fuerit. Notior res, & toto hoc opere totiens repetita, ut ostendi a nobis aliter non debuerit.

De Atramento librario. CAP. LXXIII.

Atramētum quo scribimus, Fuligine e tædis coacta colligitur. In singulas libras gummis, ternæ Fuliginis uncia adijciuntur. Fit etiam e Relinæ fumo, & pictoria Fuligine, de qua paulo ante diximus. Assumitur autem Fuliginis mina, Gonus sesquilibra, Glutinis taurini, Atramenti futorij, singulorum sesquuncia. Additur conuenienter erodentibus medicamentis. Ambustis ex aqua commode illinitur. Sed non ante soluatur q̃ cicatricem iuduxerit. Sanatis siquidem ulceribus, sua sponte decedit. Cæterum habes amicissime Ari abunde, quæ tradenda duximus, non pro operis modo, quem destinaueramus, sed pro materiæ & auxiliorum medicinalium copia.

BARBARI COROLL.

DE Atramento scriptorio, quod & librarium uocatur, & græce melan graphicon, dictum est in Fuligine pictoria, Chalcantho, Melanteria.

LI III

Finis LIB. Quinti.

C
PEDACII

D O S C O R I D I S

De Medicinali materia, LIB. Sextus.

IO. RVELLIO interprete.



VPERIORIBVS amicissime Ari libris, tradidimus de aromatibus, oleis, unguētis, arboribus, & eorundem fructibus, lachrymisq; Item animalibus, melle, lacte, seuo, frumentis, oleribus, hærbus, radicibus, liquamentis, uinis, metallisq;. In hoc uero totius operis ultimo, facultates eorum recensebimus, quæ prodesse nobis, aut officere possunt. Vitantes itaq; nomenclationis tædia, ad institutum reuertemur. Huiusmodi autem Tractatus, cum bifariam distributus sit, in partem uenena præcauentem, ita ut ne fallant sumentes: aut siquando per imprudentiam dentur, ut tum quoq; innoxia fiant, irritaq;. Et in partem auxiliatricem. Primum disseram de præcauendi modo: quem esse difficillimum plerique Maiorum arbitrantur, & dantes clam uenena, ita insidias temperant, ut peritissimum quemq; decipiant. Siquidem uenena sua amaritudine, permixtis dulcibus spoliant, & graue odoris uirus mistura odoramentorum eximunt. Aut medicamenta immiscent, quæ leuandæ ualetudinis gratia dari solent, & præsertim quæ infirmioribus, ut Absinthium, Tragoriganum, Cusnilam, aut Hyssopum. Quinetiam Thymum, Irim, Origanum, Castorium, aut si quid medicamenti cognatum habere saporem uideatur. Aut potionibus inserunt, aut uinis, aut iuribus, aut passo, aut mulsæ aquæ, musto, succis, lentis, polentis, aut medicaminibus. Aut concinnantes ipsi, eduljis admiscunt. Quare qui in ea suspicione sunt, condita edulia uitare debent, omniq; intensa saporis qualitate, dulcium, aut salisforum, aut acrium abstinere, nec sitibundi affatim bibere, aut esurientes uoraciter comesse, semperq; ad saporem esitatorum diligenter attendere: præsertimq; bibentes, frigidam aquam præsumere. Satiato enim appetitu, qualitates ægerrime concoquuntur. In infirmis quidem facile uitare possumus potionum auxilij gratia dari solitas, quas offerunt improbi, qui beneficia moliuntur. Itaque ob id laborantes morbo, non perinde audentium iniurijs patent. Et hæc quidem, ne facile seducti homines, capiantur dolis ueneficorum, occasio est & facultas. Sed alia expeditior, ut suspitiosi aliqua præsumant, quæ uenenorum uires hebetent, & inefficaces irritasq; reddant. cuiusmodi Caricæ sunt cum Iuglandiū nucibus manducatæ, & quæ Cedromela uocant, id est, Citria, leni-

nis Napi drachma cum uino. Item folia Calaminthæ, aut terra quæ Le- **A**
mnia sphragis appellatur, pondere pari cum uino. Aut Rutæ folia, & nu-
cis luglandis nucleum, aut Caricas duas, & salis callum ieiunii sumant, &
nullo ueneni genere ledentur, Antidota ex uino sumpta eundem effectum
præbent. Inter quæ intelligitur magnum metridatium, quod scinco &
sanguine temperatur. Quin & sæpe uenenis obsistunt peculiares affectus
in corporibus, certo quodam modo constitutis, & quadam cibi potusque
qualitate, aut uini copia ita temperatis, ut cum uenenis dissentiant. Siqui-
dem ingesti ueneni uires frangunt, atque iam priore alimento farts, præ-
clusisque meatibus, obstant ne membratim per digestionem insinuetur.
Verumenimvero quoniam fortunæ temeritas interdum similia discrimi-
na, peregre agentibus affert, absque ullis insidijs hominum, non nihil disse-
rendum mihi de hac re necessariū duco. Iamprimū igitur culinam appa-
rare loco sub diali conuenit, cibosque & potus in huiusmodi loco strue-
re. Si id fieri cōmode nequit, secunda erit conditio hæc, apparandi, appo-
nendique sub tecto. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda. Fre-
quenter enim a superioribus contabulamentis animalia decidunt, exigua
quidem, sed quæ non modicam perniciem moliantur, ut phalangia, stel-
liones, & alia quædam reptilia. Porro uinaria uasa diligenter intueri oportet.
Namque reptilia odore uini illiciuntur, quæ interdum sorbentia, no- **B**
xium uirus eructant: interdum uero delapsa, immerseque moriuntur, &
exitij causas haurientibus afferunt. Sed hæc hæcenus dicta sunt, cauti &
prouidi, insidijs ne pateant. Quod si qui sua sponte, aut ex quorundam
insidijs sumpserunt, auxiliari primo quoque tempore oportebit. Siquidem
dum comites singulorum uenenorum notæ expectantur, immedicabile
fit uenenum, & paulisper neglectum, medicamentis ægre cedit. Quare si
qui compotes mentis, se uirus sumpsisse fateantur, aut eorum qui aderant
testimonio constet, protinus ad idonea remedia transeuntes, facile pecu-
liari nativæque constitutioni restituemus. Neque enim ijs assentimur, qui
prorsus auxilia in huiusmodi frustra adhiberi contendunt. Quo enim
modo uitia, quorum causæ corporibus insident, medicinam admittunt,
& quæ forinsecus incurrunt uenena, medendi rationem aspernantur?
Æque uero omnes morbi pro causarum ingruentium magnitudine,
aut pristinis affectionibus, qualitibusque, quibus sit opportunum cor-
pus, uel medicabiles sunt, uel nullis cedunt medicamentis. Quod si qui
forsan obmutescentes, aut temulenti, aut nolentes alioqui uenenum egeri,
nullam nobis eius cognitionem præbeant, tum protinus accedendum ad
ea quæ communiter epotis quibuscunque uenenis opitulari consueuerunt.
Atqui nullum magis in omnia ualens auxilium dari potest, quam ut
proximo loco uirus foras exhauriatur, priusquam inualescat. Quare si-
ne mora, calidum oleum ex aqua, aut seorsum, ut uomitare cogantur, da-

D I O S C O R I D I S

Cri conuenit. Aut si oleum natura loci negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut trago, urtica, scenogracœ, aut halicæ decocto uicem eius exhibebit. Hæc enim non modo uomitionibus exigent uel illa sua laxatrice, aut nausæa ciente, sed aluum quoq; subducent, & corporum inanitione ita aduersabuntur, ut acrimonias eorum hebetent. Id quod euidenter huiusmodi argumēto deprehendere licet. Esto ut quisquam uiua calce, uel uini facæ, aut cantharidibus, aut alio quouis acri corpus exulcerare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationē non accipiet. Atqui neq; uehementer adstringi corpus, neq; refrigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiam uomitus non ob id modo quæcuiet, & noxium humorem excernat, iuuamentū adfert, sed quod assumptum uirus nonnuncq; odore, coagulatis globulis, aut colore, prædat. Quippe cum odore & amaritudine meconium, colore cerusam gypsumue, globulis lac, aut sanguinem animalis recens iugulati ostendat. Nam grauis odor regestorum, leporis marini, aut rubetæ ueneficia deprehendit: ita ut nonnulla ab ijs remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia transeuntibus. Oleo, maluæ decoctum ammiscetur, aut glaucium, aut ædeps anserinus, aut pinguiū carniū iura, lixiuium lignorum cinere factum. Vbi uero uomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in uentre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquiæ clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum, & cum hydromelite sumptum. Vina uetera liberalius epotata, gallinacea iura, præpingues pisces, uetustæ carnes, pinguesq; & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Aluum namq; subducunt, uti diximus, & stomachum resoluentia, prouocant ipsum ad uomitionem reddunt. Et uenenorum acrimonias hebetant, atq; meatus obstruentia, celerem uirium penetrationem inhihent. Quinetiam medicamēta dantur, quæ cōmuni dote profunt, ut Lemniæ terra, Agaricum, Abrotonū, Irio, radix Eringij, semen Pastinacæ & Calaminthæ, Nardum gallicum, Castoriū, Ferulæ uirentis medula, flos Rhododendri, succus Marrubij, Laser aut Laserpitium, Sagapeniū, Peucedani succus, aut Panacis, & radix quæ Magudarim appellatur, Aristolochia longa, syluestris Rutæ semen, & Beronicæ (quæ Cestron noiant) folia. Singula cū uino drachmæ pondosumi debent. Effectum præbet Polij decoctū, & Sefeli, & liquida Pix linctæ. Magnifice ferūt opem, antidota quæ in calce operis scripta reliquimus. Cōmunis ratio præstandi auxiliij, ita se habet. Ceterū ab ijs quæ conueuerūt euenire, cōmunia remedia sumptuari possunt. Ferē enim uirēs uenenorum quam plurimorū, in affectus consimiles, corpus tandem redigunt. Quam ob causam plerisq; cōmunia conducūt auxilia. Permulta etenim uenenorum genera, cōmunes tamen, nec multi iisdem affectus oriuntur. Neq; fieri potest, ut omnia quæ contingere solita sunt, unū uenenum sequantur. Alioquin superuacaneus esset uenenorū tractatus, si

gillatim remedijs ab authoribus traditis. Neq; uero in uno eodemq; **A**
promptum est inuenire, ut stomachi, iecoris, renum & uesicæ dolore ue-
hemēter crucietur, ut singultuat, erodatur, contremiscat, refrigeretur, ob-
mutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, ueterno prematur, caligent sen-
sus, stranguletur, sitiat, sanguis erumpat, febre confluetur, ægre lotium
reddat, torminibus uexetur, crebro uomitet, nausea prematur, rubescat,
liuore suggilletur, palleat, desipiat, stertat, uiribus deficiatur, & pleraq;
alia eueniant. Vnumquodq; uenenū in generales affectus diducitur: ut
pauca numero & communia demonstrantur, quæ enenire consueuerūt.
Quare in singulis quæ supra diximus, non facile fuerit deuoratum uirus
cognoscere. Nam stomachi & linguae erosio, uentris ac renum inflamma-
tio, uehemens urinæ difficultas, & interdum cruoris exitus, laceratio, &
in plurimis partibus quiddam adustionis sensus, non in Cantharidibus
modo potis reperiuntur, sed in Eruca quoq; pinorum, & Bupreste, &
Salamandra. Porro eos qui Meconium hauserunt, non modo ueterno,
aut sopore premi, stertere, liuore, suggillari, torpere, refrigerari, stupe-
re, sensu priuari constat, sed eos etiam qui Mandragorā, aut Cicutam de-
uorauerunt. Delirium non Hyoschamus tantū infert, uerū etiam quæ To-
xica appellantur. Idem aconitum, & mel quod in Heraclea pontica gi-
gnitur. Strangulatio non minus in fungis, q̃ in sanguine taurino, lacte,
aconito, cerusa, gypso conspicitur. In summa, difficile unum uni ueneno **B**
propriū inuenire signum, quod haustum uirus prodere possit. Maxi-
me, q̃ hæc cæterorum etiam uitiorum, quæ in corpore exoriuntur, com-
munia sequi solent. Cæterum in his, quæ celeriter enecant, adnotari for-
tasse, quod inspectum fuerit, licet, ut postea trademus. Sed ijs qui ad lon-
gas agritudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, dumtaxat,
quod pertineat ad indicia noxæ, utpote cum uenena statim atq; præsentia
neam uim illam perdiderunt, transmutata in longos affectus communia
reliquorum uitiorum remedia, compositionesq; flagitent: cum uenefica
proprietas non amplius insit. Si uero longa sit affectio, in aliquod diu-
tiorum morborum genus recidet, a quibus facile fuerit medendi ra-
tionem assumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, hætenus.
Consequenter quæ priuatim singulis profunt, scriptis mandabimus: si
prius simul exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem, aut maz-
leficam uim sortiunt: ut medicinae studiosi, intra obseruationē cauti, qui-
busdam eorū medicamentorū misturis utant, quæ memoriæ literarū tra-
dita sunt, & ab authoribus descripta. Imprudentia em̃ magnas adfert no-
xas, & sæpe continuo usu eorū, homo in perniciem agitur. Proinde an-
malia quæ exitiosam uim habent, hæc sunt. Cantharides, Buprestis, Sa-
lamandra, pinorum Eruca, Lepus marinus, Rubeta, & Rana palustris
muta, deuoratę Hirudines. Semina sunt, Hyoschamus, Coriandrū, Cicu

Cta, Gith, Mandragora, Psyllion, Liqumēta, Meconium, Opocarpafon, Thapsiæ succus, Elaterium. Radices quas mittit chamaeleo, aconitum, thapsia, ueratrum, ixia, agaricum nigrum, ephemerum, quod aliqui colchicum uocant, q̄ in Colchide nascatur. Herbae oleraq̄, Smilax, quam aliqui thymion appellant, Romani Taxum: Solanum manicum, quod et doricium dicitur: Sardonia herba, quæ ranunculi genus est: corniculatum Papauer, Phtharicum, Toxicum, Ruta siluestris, Fungi. Ab animalibus taurinus sanguis recens, coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitum, Metalla, gypsum, cerusa, calx, auripigmentum, duo Sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum uiuum dicitur. E uitibus uinum abunde post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

De Cantharidibus.

CAP. I.

Quibus datae sunt Cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad uesicam usq̄ cuncta erodi sentiuntur. Picem, aut simile quiddam Cedriæ resipiunt. Dextra præcordia inflammantur. Vrinam ægre reddunt. Et subinde cum lotio sanguinem emittunt. Strigmenta non secus atq̄ dysentericis, aluo deferuntur. Fastidia urgent. Animo linquuntur. Obortaq̄ uertigine concidunt. Postremo mente abalienantur. Ergo anteaq̄ tale non nihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, uomere cogantur. Mox ubi uomitione plurima reiecerunt, halicæ aut oryzæ, tragi aut pisanæ cremor, aut decoctum maluæ, aut seminis lini, aut fœnigræci, aut radicum altheæ, quam latinus sermo Ebiscum appellat, clystere infundatur. Præterea Nitrum eisdem dandum, ex hydromelite: ut quæ stomacho adhuc, aut intestinis adhærent, lingendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi intercidentur, ingesta ex Nitro aqua mulsa uacuari debent. Detur deinde uinum, aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquefactus, inflammatae aut partes hordei farina aut mulsa perunganter. Ab initio admodum cataplasmata nocent: q̄ citatus ab eis calor, illapsum uirus ita remoratur, ut in principes se parteis insinuet. Ipsa tamen interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulantur. Vtpote quæ dolores & permulceant & leniant. Quo tempore corpus calfaciente oleo, quo facilius introeat, eluere par est. Cæterum omnibus medicina, ut noxium uirus per summa corporis excernatur. Deiectiones multariam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capeffat. Galinaceis carnibus, & hædinis, aut suillis, catulis, maxime pinguibus, & tenerrimis uesci debent. Siquidem aluum cient, atq̄ uenenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest Thuris cortex, & Samia terra, quæ Aster appellatur: si quaternæ singulorum

drachmæ cum passo sumantur. Item Pulegium, ex aqua tritum. Irinum aut rosaceum cum rutæ decocto, recentes uitis ramuli, cum passo detriti. Longe omnium potentissime antidota auxiliantur, in quatuor drachmis aquæ mulsæ pota.

EX M. VERG. COMM.

In fames quotidianis experimentis, & in interiori usu a cunctis damnatæ Cantharides semper tuere. Quales autem hæ sint, satis. i. uolumine a scriptore hoc, & a nobis dictum est. Tractataque tunc omni earum medicina & historia, nihil nisi maleficium, in quo diligentiores esse hominem oporteat, relictum modo est. Quale autem id sit, satis in scriptore hoc patet: Patent & remedia, quæ ab eo deinceps tradita sunt. Idque tam certe & diligenter factum est, ut nihil monuisse legentes nos oporteat: & si plurima in nobis aliorum æditionibus contraria, aut diuersa saltè legantur. Quæ diligentius, & exactius prosequi posthac nobis animus non est. Festinamus enim longiore quæ a principio credidimus, opere hoc defatigati. Cupimus tamen pro nobis in eo legentes laborare: collatisque aliorum in hac parte æditionibus, scriptori huic, & in eo humane salutis opem ferre. Ipsi interim in Cantharidibus his non tacebimus, discrepare alterius interpretationis æditionem a nostra, quo loco Diosc. negat inflammationibus potu Cantharidum factis, imponenda a principio ex hordeacea farina fomenta: causam afferens, *διὰ τὸ ὑπὸ τῶν γινόμενων διὰ καύσης κατὰ χυλὸν τὸ δὲ διὰ τοῦτον τὸν τόπον ὄντας καύσεις*. Quod uerum ab eo est. Quia ex calfactis corporibus remedia contineantur, quæ muniendis & defendendis illata uitalibus fuere. Nos autem contrarium concipientes sensum, diximus. Propterea quæ accedente calore retinetur quod datum fuerit, uenenum uitalioribus partibus inhærens. Retulit illi *τὸ δὲ διὰ*, id est, quod datum est ad remedia: in quo rei, & sibi ipsi, ni fallimur, aduersari uideat. Negat hic ob calorem a principio fomentis utendum esse: reddiditque causam, quoniam. s. retineatur. &c. Manifesto argumentum sumpta a contrario ratione, uelle conarique Dioscoridem, pelli & excludi pro hominis salute quæ intra eum sunt. At in remedijs optandum querendumque id non est. Quæ quo diutius intra hominem fuerint, eo certius medebuntur. Idque nos cogitantes, de ueneno intelligi oportere in eo participio credidimus: eamque rationem secuti, locum ut in æditione nostra legitur uertimus. Dicit forte aliquis, de remedio intelligendum ob eam causam esse: quoniam nisi descendat, egrediaturque uomitione, aut alui defectione sumptum id remedium, uenenum una non educet, simulque cessans nullam afferet in hoc periculo opem. Non spernendum penitus id esset, nisi hic subiecisset, retineri quod datum fuerit uitalioribus partibus inhærens: quod si de ueneno apte intelligi non potest: & si intellexisse hoc modo etiam id oporteat, ad uenenum & unde mali principium est tota reuertitur res. Non conuenit etiam nobis cum cæteris interpretibus quo loco hic scriptor ait, dandas contra Cantharidum maleficium animalium pingues carnes, καὶ ἀπαλώματα. Eam uocem cæteri ex cōmuni eius æstimatione uerterunt, tenerrimas: nos autem, longiore coctura flaccescentes. Fecimusque id autoribus græcorum medicis, qui in scriptore locum hunc signantes, *ταυρῶν* in hoc usu carnes exigunt. Significat autem id quod diximus, longiore coctura, & eousque tenerescētes, ut diminutæ primum a sua quantitate, omnem etiam amiserint duriciem. Suntque coctura, non ætate tenerrimæ hoc loco intelligendæ carnes. Idem etiam dulcis aquæ balneis in hoc periculo uti iubent.

De Pinorum Eruca. CAP. II.

Is qui Erucas Pinorum hauserunt, ilico dolor in ore & palato exoritur. Vehemens alui, linguæ ac stomachi inflammatio torquet. Intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire uideantur. Corpus totum exæstuat, fastidium urget. Quibus est succurrendum, remedijs quæ deuoratis Cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici Oleo et Irino, Melinum quod e cotoneis pomis & oleo temperat, accipiemus.

EX M. VERG. COMM.

Satis secundo uolumine de Erucis dictum a nobis est. Nunc legentes monuisse aliud non oportet, quæ tunc de olerum, nunc priuatim de Picæarum Erucis agi: simili quidem, & natura congenere infecto, uiribus tamen & maleficio dissimili. Siquid quæ in picæis nascunt, præsentem mortis habent causam, ab oibus passim dānari: priuatique a scriptore hoc, quæ salutis humane cōsulēs, notas

Mm

D I O S C O R I D I S

C uenient earū et remedia breuit qdē, sed certissime tradidit. Meminisse illud nō legēs uolumus, quē cognomines his in mari nascunt, Erucq; adhuc passim aliq; gentibus uocant, nullū habere ueneni maleficium, sed mare incolentibus gentibus in mensarum precio & honore esse.

De Bupreste. C A P. III.

Βούπρεστις

Q Vi Buprestin biberunt, non dissimile Nitro uirus sapitunt. Stomachi, uentrisq; uehemens dolor insequitur. Tam ueter q; stomachus mirum in modum ut in aqua intercutem diffusus, inturgescit. Vniuersa corporis facies contendit. Urina supprimit. Quibus eadem quæ potis Cantharidibus auxiliantur. Priuatim post uomitus & uacuationes, quas clysteribus molimur, aridæ ficus psumunt. Itē earum decoctū ex uino. Vbi uero iam fere pericula inclinantur, thebaicarū Palmularū cibo, aut eārdem tritarum in mulso, aut lactis potu iuuantur. Pyrorū etiamnū omne genus esse, & lac humanū bibere, cōuenit.

E X M V E R G. C O M M.

P Estis acerba boū Buprestis est: & inde illi a græcis nomē. Rarū in Italia animal, antiq; autores aliqui hoc tradiderunt. Nunc frequētius q; agrestis fortuna & res patiatur, interempro quod tidie boue, ruris colono, inueniri agricolæ lamentantur. Scarabeo lōgipedi simillimum tradit. Fallit inter herbas, bouēq; maxime: haustumq; ita inflammat, ut rumpat. Vniuerso qdem pecori nocet, sed in maiore bouis q; aliarum quadrupedum iactura: ab eius noxa priuatim nominatū est. Cecinit in Alexipharmacis suis notissimos de eo uersiculos Nicander: nihilq; non ab hoc, & ab alijs dictum & ipse etiam in notis & remedijs monuit. Addidit tamen, colorari labra eius qui Buprestidem hauserit. Versiculus eius est. ἰδὲ ἢ τοι λίτρω μὲν ἰππικῶν οὐκ ἔστιν ἀλάττω. Ex quo in lecta nobis suspicio est, quod nitrum in scriptore hoc legitur, in Nicandro autem λίτρω, potuisse quondam forte aliter legi: nec maleficij Buprestidis notam in uiroso tantum odore nitri esse, sed in putris corruptiq; tabi colore simul & odore. In cōmuni tamen græcorum omnium lectione nihil mutauimus. Relinquimusq; in bubus saltem diligentioribus obseruandam rem. Quos etiam monere uolumus. 22. uolumine eiusdem numeri capite, Buprestim Plinio herbam esse, quā tamen ille non describit: & si Græcos, magna inconstantia, in ciborum laudibus eam habuisse dicat: eosdemq; remedia tanq; contra uenenum prodidisse, boumq; uenenum esse ipso nomine indicari, quos dissilire degustata fatentur. Quod quale in eo sit, legentes uiderint. Nobis enim constituisse sibi græci uidentur, nec nisi in uenenorum censu Buprestim constituisse.

D

De Salamandra. C A P. IIII.

σαλαμάνδρα

S I Salamandram hauserunt, linguæ inflammatio consequitur, mens sprapeditur. Tremor cum torpore, aut horror quodam ac exolutione accedit. Partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaq; suggillantur. Sæpeq; diutius immorante ueneno, putrescentes defluunt. Quibus præstabimus cuncta quæ potis Cantharidibus. Peculiaria uero remedia, resina, pinus, aut galbanum ex melle linctum, & trifaginis decoctum, in quo nuclei pinei conterantur, urticæ quoq; folia, cum lilij & oleo decocta. Profunt etiam oua testudinis marine, aut terrestres, cocta. Item ranarum ius, cum quibus eringij radix incocta sit.

E X M V E R G. C O M M.

D Escribitur a ueteribus Salamandra Lacerti figura, stellato corpore, nunq; nisi magnis & continuis imbris proueniens: tanta natui & intra se congeniti gelu ui, ut ignes non aliter q; glacies extinguat. Retulerunt idem, sanie, quæ lactea ore eius euomitur, quacūq; hominis parte contracta, defluere pilos: quodq; contactum fuerit, natium colorem in uiriliginem mutare. Addiderunt alij, inter quos & Plinius est. 19. uolumine, capite, 4. inter omnia uenenata maximum Salamandræ scelus & maleficium esse. Siquidem aliorum uenenis singuli, nec plures pa-

riter intereunt: Salamandra improvidos necare totos populos potest. Nam si arbori irrepsit, omnia poma ueneno inficit: & eos qui ederint, frigidissima ui enecat. Idem familiæ periculū est, si contacto ab ea ligno panis incoquatur. Vel si in puteum deciderit. Habet tamē talis, & tanti mali uis remedia aliquot, quæ capite hoc a Diosc. docentur. In quibus a principio statim non est cum alijs idem nobis, quod ad notas haustam Salamandram sequentes pertinet. Illi enim quod nunc in Diosc. legitur καὶ διανοία ἰμπεδισμός, significatq; usus mentis impedimentū, ut in eo legebatur uerterunt. Nos autem ad sermonis impedimentum, auctoribus græcorum medicis eam transfulimus rem. Siquidem Paulus Aegineta de Salamandræ maleficio agens, καὶ λαλῶν ἰμπεδισμός ait: significatq; illi, nō mentis, sed linguæ ad sermonē impedimentum: quod alijs eius mali notis magis cōgruit, linguæ inflammationi, resolutioni, tremoriquē, quæ omnia sermonis potius q̄ mentis usui officere uidentur. Accessit his etiam in Alexipharmacis suis utriusq; sane euentus testis Nicander, sed in eo quod nos dicimus, certior. Versiculi eius sunt. αἰ-φα μὴ ὑπὸ πρὸς τὴν γλῶσσαν βατὸς, ἀλλ' ὑπομάλλουσ' ἀμύματα, ἰμπαρῶν δὲ κακὸς τρόμος ἄ-φρα δύνει· οἱ δὲ πρὶοφαλίοντες ἀτερίφωρ ἱρπνύουσι τετραπόδους, νοεραὶ γὰρ ἀπὸ φρενὸς ἀμείλνυνται. Eorū sensus est. Statimq; incenditur lingua: & torpore contrahitur. Vrgensq; malus tremor, membra soluit. Illi uero aberrantes, ueluti infantes quadrupedes repunt. Mens enim illis hebetatur. Vtrāq; a Nicandro ueneni Salamandræ nota numeratur, & linguæ, & mentis impedimentum. Sed nos magis amauimus, quod Aeginetam & Nicandriū testes & auctores habet: præsertim dicentē hoc impedimentū, quod linguæ & sermoni aptius q̄ menti tribui uidef. Persuasitq; id etiā quod Nicander ait, inflammari linguam, & torpore contrahi. Quo loco aduerbio ἔ-φ usus est, quod retro significat: & μάλλιν uoce, quæ in contractione ex gelu facta apte dicitur. Est enim ut græcorum grammatici docent, μαλκύν, frigore contrahi manus & torpere: quod suo gelu Salamandra in lingua facit: torpenteq; ea impeditur eius usus. At Nicander ait, hebetari eis mentem. Fatemur id quidem, nec multo ante diximus, probasse nos hoc magis q̄ illud, quia plures id testarentur: & q̄ aptior hic sermonis ductus nobis uideretur. Nunc autem illud addimus, non aduersari huic sententiæ Nicandrum, sed hanc ultra alias notam mali huius eum ostendere. Nos sic sentimus, & nihilominus poterūt uolentes quod magis probauerint sequi. Nobis grauius testis Paulus Aegineta est, toto huius scriptoris capite hoc in cōmentarijs suis exscripto. Testati cæteri omnes sunt, nō tam qui ex professo hæc docuerunt, sed qui obiter Salamandræ meminerunt poetæ, scriptoresq; alijs, ueneno eius defluere humani corporis pilos omnes. Sic Martialis mulieri imprecabatur. Hoc Salamandra caput, uel sæua nouacula nudet. &c. Et nihilominus a scriptore hoc, alioquin diligentissimo, nihil huiuscemodi traditur. Non tamē negligentia, ignorantiaue eius aliquis id adscripserit. Qui cum bifariam nocere, foris scilicet contactu, & intus haustu Salamandram sciret, alterumq; illud malum leuius esse, nec nisi de honestamentū decoris facere, alterum in quo de uita ageretur diligentius obijt. Quam rationem secutus Plinius. 10. uolumine, capite. 67. quomodo cōtractu foris Salamandra homini nocet, breuius docuit. Ait enim. Sanie eius quæ lactea ore uomitur, cōtactas hominis partes totum amittere pilum, idq; quod contactum fuerit colorem in uittignem mutare. Reliquo deinde opere, multis locis intra hominem insecti huius maleficiū hoc, aut illo remedio curari præcepit: hic autē, ut diximus, τοῖς σαλαμάνδραν λαβοῦσιν id est, his qui Salamandram hauserint, remedia instituit. Crediderunt aliqui etiam, male in hoc capite legi, remedium illud quod ad Vrticæ folia cum Lilij decocta pertinet: asserētes, auctore Appollodoro, ut Plinius testatur, non cum Lilij, sed cum testudine legi oportere. Plinij uerba sunt lib. 22. capite. 13. Appollodorus & Salamandris cum iure decoctæ testudinis. Ratiocinatioq; in eo sunt, ἀπὸ τῶν χελωνῶν, quæ uox testudines significat, facile κρίναν, id est, Liliorum fieri potuisse. Verumtamen in cunctis græcis eadem lectio est, & Paulus Aegineta inquit, ἡ κνίδος φύλλα συνεικθύντα κρίνοισι. Quod est, Vrticæ folia cum Lilij decocta.

De Ephemero. CAP. V.

Sympto Ephemero, quod aliqui Colchicon, aut syluestrem Bulbū ἰφίμερον appellant, pruritus in toto corpore excitatur, nō secus atq; ijs qui urtica, aut scylla laceffuntur. Interna rosionem sentiunt, Stomachus cum ingenti grauitate exæstuat. Cæterum inualecente morbo, cruor strigmentis amixtus, per aluum exigitur. Quibus ut ijs qui Salaman-

Mm ij

D I O S C O R I D I S

C dra hauserunt, uomitione, aut clysteribus auxiliari conueniet. Sed ante q̄ uenenum inualeſcat, dandum eſt decoctum frondium Quercus, aut glandium, aut florum mali granatae. Lac bibere prodeſt, in quo ſerpyllum ſit decoctum. Itē ſuccum ſanguinalis haerbae, aut ramoru uitis, aut rubi, aut medullę recētis ferulae, aut myrti. Baccae autem myrti tuſae tritaeq; & aqua maceratae, ut liquor inde ſumatur, opem ferunt. Medius ſardoniarum glandium liber, ſimile effectum prebet, ſi crudus in alio quo ſupradictorum ſucco ſumptitur. Origanum quoq; cum lixiuio epotum. Eximie iuuantur aſinini lactis, aut bubuli potu, etiamſi in ore cōtineant. Ita, ut quibus copia lactis huius adſit, nō aliud deſyderetur.

E X M. V E R G. C O M M.

Q Vale Ephemerum hoc ſit, & quibus locis frequens naſci quondam diceretur, ſatis dictū quarto uolumine ab hoc ſcriptore, & a nobis eſt. Potuit, quia ſumptum ad unam diem uitam proroger, ſic a græcis nominari. Non aliter q̄ multa alia, quę ob hanc ipſam cauſam Ephemera, ab eadem gente appellantur. Obſeruatum in hoc capite illud a nobis eſt: uomitiones, & clysteribus inteſtinorum inundationes, quas hic ex Salamandra ad Ephemerum remedia repeti iubet, nullas in ea legi. Oportereq; ob eam cauſam ſuſpicari, aut in Salamandra remedium eorum rationem deeſſe, aut (in quam partem nobis inclinatur animus) quoniam Cantharidū modo curatur Salamandra; in ea em̄ hic ait, cū fecerimus omnia quę in Cantharidibus iuſſa ſunt, &c. non ex Salamandra, ſed ex Cantharidibus uomitiones, clysteribusq; exinanitiones illas repetendas eſſe. Vtriq; enim pariter competunt, & ex utriq; pariter imperari poſſunt. Licetq; non legantur in ea; quia tamen ſiunt, non male id fieri percipitur. Eſt illud etiam animaduertendum, quam Dioſ. ait caſtanearum mediam tuniculam, &c. eam intelligi oportere, quae inter corium & carnem eius ferrugineo colore eſt. Et præter id, quemadmodum primo uolumine in Caſtaneis hic monuit, non tuniculam eam tantum, ſed carnem ipſam etiam contra Ephemerum uim habere: efficaciorē tamen tuniculam hanc eſſe. Quod & Nicander in Alexipharmacis ſuis etiam teſtatur.

ſtophantibus

De Dorycnio.

C A P. VI.

Dorycnion, quod & aliqui Manicon Solanū appellant, epotum, lactis ſaporē in guſtu refert. Vehementes ſingultus ciet. Humor linguā uexat. Sanguis ſubinde reſcitur. Strigmentofa quēdā perinde quaſi dyſentericis, aluo egeruntur. Itaq; anteq̄ aliquid ex ijs eueniat, auxilio ſunt antedicta, uomitus, clyſter, & quęcunq; potum uenenum expellere poſſunt. Priuatim ijs opitulatur aqua mulſa, lac caprillum, aut aſininum, dulce uinum, quod tepidum cum aniſo bibatur, nuces amarę, gallinacea pectora decocta. Quinetiam conchylia omnia tam cruda quam toſta eſſe ſalutare eſt. Conueniunt & locuſtae marinae, & gammari, & pota eorundem iuſcula.

E X M. V E R G. C O M M.

Poteſt, nec male quidem, falſouē Dorycnium uocari quodcunq; tela, cuſpides, & ut Poeta cecinit, ferrumq; poteſt armare ueneno. A ferratis enim lancearum cuſpidibus, quas græci dorata uocant, factum illi nomen eſt. Præſtiterunt id, & adhuc præſtant multa. Antiquitas tamē, ſi Plinio credimus, ſurioſi Solani ſucco ad eam rem primatim uſa eſt: uocauitq; ob id Dorycnium. Verba Plinij ſunt. 21. uolumine, capite. 11. Hoc eſt uenenum, quod innocentiffimi auctores ſimpliciter Dorycnion appellauerunt, ab eo, q̄ cuſpides in prælijs tingerentur illo paſſim naſcente. Eſſeq; Dorycnium ſurioſo Solano idem, hic primum teſtatur, dicens: Dorycnium, quod quidam ſurioſum Solanum dicunt. Teſtatur Plinius quo diximus loco certius: teſtatur græcorum medici & herbarij omnes. Vtq; ab hoc ipſo ſcriptore. 4. uolumine lætale ſim-

Apliciter dictum Dorycnium est, sic certius, & ex professo nunc notæ & remedia eius docetur. In quibus duo tantum, ex Nicandro alterum, alterum ex Paulo Aegineta monebimus. Sequi haustum Dorycnium hic ait, *ωσπερ γάλακτος ποιότης ἐν τῇ γένει*. Quæ uoces nihil significant aliud, quæ lactis in gustu qualitatem, quæ nulla alia quæ sapor est. Pertinet enim ad gustum ea tantum qualitas. Nicander tamen in Alexipharmacis de hoc ipso Dorycniio agens, inquit, *ἀλλὰ ἀγέδῃ φράσειο δρυκνιον οὔτε γάλακτι ὥπῃ τι θρώσει τι περὶ σωματικῶν ἵκται*. Quod est. Sed age Dorycnium etiā cōtemplare. Cuius circa os lacti similis est aspectus & cibus. *ὥπῃ* enim ille uocat, quod uidetur, & oculis sentitur: id autē color est: *βρώσει* uero quod estur: & ex eo saporem, dualisq; notas has numerat colorem & saporem, & utrunq; lacti similem. Hic tamen solum saporem indicasse uidei. Nisi aliquis in cōmuni illa qualitatis uoce qua usus est, colorem etiā intelligi uoluit: uerumtū eam qualitatem ad gustū hic tū contraxit. Alterū quod ex Paulo Aegineta monemus, ad remedia pertinet. Quod enim hic ait, cum aniso repidum passum, ab eo cum exiguo aniso dari præcipitur. Potuit ea uox scriptori huic perijisse. Ea quæ ob causam ignorā legentibus esse nolimus.

De Aconito. CAP. VII.

Aconitum statim in lingua inter bibendum, cum adstrictione ἀκόνιτον quadam dulcescit, gustantibusq; maxime cum exurgere conatur, uertigines offundit. Lachrymas ciet. Grauitatem pectori & præcordijs adfert. Simulq; crebri spiritus deflantur. Quare uenenum uomitione abigi, aut clystere per aluū egeri opus est. Viūmur inter arcētes potus origano, ruta, marrubio, uel absinthij decocto, cum uino absinthite, uel semperuiuo, uel abrotono, uel chamælaea, aut trisagine. Prodest etiā annuum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castorio, pipere, & ruta, æquis ponderibus ex uino. Coagulum hædi, leporis, aut hini nuli cum aceto. Ferri quoq; stercus. Item uinum in quo aurum, ferrū, argentumue candens restinguatur potum. Lixiuiaq; cum gallina & uino decocta, aut carniū præpinguium iura cum uino sumpta. Fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire.

EX M. VERG. COMM.

Atestibus contra testes, ut in iudicijs quotidie fit, pro Aconito agendum nobis est: & unus contra multorum fidem audiendus, haud sane quale Aconitum sit dicentibus: letale enim oēs esse affirmant: sed unde factio nomine in poetis, scriptoribusq; alijs tantopere infamis sit. Grammatici siquidem, poëte, & qui plantarum historiam aliquando scripserūt, a cotibus & petris, in quibus nasci fertur dictum esse uolunt. Naso in Transformationibus suis lib. 7. notissimos cecinit uersus. Quæ quia nascuntur dura uiuacia caute, Agrestes Aconita uocant. Plinius. 27. uolunt mine, cap. 3. eosdem natales illi tribuens, ait. Nascitur in nudis cauitibus, quas Aconas uocant: & ideo Aconitum aliqui dixere, nullō iusto ne puluere quidem nutrire. Secuti hos plures alij, idem tradiderunt. Tamq; a grammaticis id receptum est, ut non facile sit decreta eorum conuellere. Conabimur tū, ueritati consulentes: unusq; cunctis his uelut in acie obijciatur Theophrastus. Qui lib. 9. de plantarum historia nasci quidem petrosi locis Aconitum tradit: nō tamen a petris nominari, sed a Periandynorum uico, quem Aconas uocabant: ad quem copiosum & efficacissimū nasceretur. Verba eius sunt. *φύεται δὲ πανταχοῦ καὶ οὐκ ἐν ταῖς ἀκόναις μόνον ἀφ' ὧν ἔχῃ τὴν προσηγορίαν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς περὶ τὰν περιανδύνων, φιλίῃ δὲ μέγιστα τὰς πετρώδεις τόπους*. Quorum sensus est. Nascitur autem ubiq; Aconitum, non in Aconis tantum, a quibus appellatōnem habet. Vicus autem Periandynorum Aconæ sunt. Amat præcipue petrosa loca. Aequiuoca loci & cotis appellatio, diuersitati huic causam dedit: multoq; magis i petris natales eius. Viris autem magis credendum sit grammatici censebunt. Est enim omnium grauis, nec dānanda fides. Theophrasti tamen auctoritatem poetis, Plinio, grammaticisq; nunq; ego ex æquo contulerim. Anceps in hoc capite etiā locus est: illic scilicet ubi contra Aconitū remedia docentur. Dubitari enim potest: iubeat ne Dioscorides sumi cum uino Lixiuia, & elixos gallinaceos: an potius contra Aconitum prodesse lixiuiam, in qua una cum uino elixati gallinacei fue-

D I O S C O R I D I S

C rint. Nos in ambiguo id elegimus quod ab alijs græcorum medicis confirmatur.

μελι εν το υρα -
κλινικα

¶ De ueneno Heraclicæ melle. C A P. VIII.

MEl Heraclicæ in Ponto, ubi aconitum gigni solet, Athenis Ionia, Euboicæ Siderites nominatur: quod qui edunt, bibuntue, non secus affliguntur, q̃p̃ qui Aconitum ebiberunt. Iis eadem quæ po- to Aconito conueniunt. Adiuuantur in primis cōtinuo uini mulsi po- tu, cui rutæ folia sint adiecta.

κοριαν

¶ De Coriandro. C A P. IX.

Coriandrum ob odorem latere non potest. Epotum autem, densam uocem facit. Infaniam adfert, a temulentis non aber- rantem. Qui sumpsert, pudenda dictu blaterant, totiusq̃ corporis o- dore uenenum fatentur. Quibus post uomitionem irino oleo concis- tatam, uti retulimus. Merum & per sese, & ex absinthio potum auxilia- tur. Item oleum. Nec secus oua in eodem exinanita, si liquefacta in mu- ria forbeantur, & epota muria, & ius falsum ex gallina & anserē. Passū quoq̃ cum lixiuā sumptum.

E X M. V E R G. C O M M I

FAmosa in Carmine suo Coriandra appellans Columella, ancipiti uoce usus, cogitandū pō- fteris reliquit, quotidianum ne eorum usum laudauerit: an magis in ueneni maleficio, q̃d ha- bent, monere legentes ea ratione uoluerit. Vtrumq̃ enim nouisse hominem uerisimile est, præ- cepisseq̃ eorum inter hortensia constitutionem: & nihilominus quoniam homini nocerent, una illa uocē, nimium, ut hic in Coriandro ait, usum eorum damnassee. Quod ab hoc ipso, uolu- mine factum est, cum monuit, maiore copia sumptum Coriandrum graui periculo mentem cō- mouere: ideoq̃ nimium, & continuum uitandum eius usum. Factum & ab alijs græcorum me- dicis & herbarijs omnibus, inter quos & Nicader poeta est. Cuius antiquissimus interpres, syl- uestri Coriandro, non fatiūo ueneni maleficio assignat. Nos tamen in plantarum, & medicæ materię historia, syluestre in hoc genere hætenus non inuenimus. Et quoniam omnes Corian- drum simpliciter nominant, unum tantum genus eius credendum. Plura q̃ Diof. numerauit remedia contra Coriandri furorem a Nicandro traditū. Nolumus nos ea docere. In eo em̃ scriptore parata omnibus sunt. Quod autem nobis cum alijs nō conuenit, ex eo, et Paulo Aeg- inetæ confirmandum est. Id scilicet quod hic ait ὡς τε κινωθίντα ἢ τὸ αὐτὸ καὶ διαθίντα ἐν ἄλμυ ἢ φούδῳ. Qui locus quomodo ab alijs & a nobis redditus fuerit, facile erit uolentibus cognosce- re. Quod autem cum altero eorum nobis non conuenit, remedij huius ratio & usus est. Ille em̃ quæ Diofcorides ὡς κινωθίντα, id est, oua omni intrinseco humore uacua appellat, nec ultra q̃- q̃ illis adjicit, Oua in patinam depleta & subacta cum falsugine, uertit. Remedijq̃ instituire uidetur, quasi deplere oua oporteat: & quod ex eis depletum est, subigendum esse, & cum falsu- gine sorbendum. Nobis contra uisum est non quod in ouo clauditur querendum esse, sed de- pletis omni suo humore ouis, eorum putamina. Vtūmque ad hanc sententiam rationibus his: q̃ in cōstituendo ouorum usu, huic & alijs, semper satis fuit ouis uti præcepisse. Quod enim in illis usum plarumq̃ habet, interior liquor est: & si hac magis q̃ illa parte uti oporteat, tunc ui- tellum aut albumen seorsum imperari. Idq̃ tam late in hoc scriptore & alijs patet, ut certius o- stendi non sit opus. Hoc autem loco cum iubeat hic scriptor, depletis, id est, uacuis ouis contra Coriandrum uti, putamina eorum tantum imperari opinati sumus. In eamq̃ sententiā nos pri- mum traxit Paulus Aegineta, qui ὡς κινωθίντα ἐπὶ τὸ αὐτὸ διαθίντα, in hac ipsa re itidem dixit, id est, euacuata oua, & in seip̃a, id est, nullo alio in loco trita & infracta. Traxit & Nicader, qui in Alexipharmacis suis inquit, πολλὰ χυδὶ ὀρεαλίων ἀπαλὴν ὡδινὰ κινώσας, ἀφρόν ἱππεύσασαι. &c. Qd̃ est. Sæpiusq̃ gallinarum mollem partem euacuans, spumam superinfundens. Manifeste iubet is, gallinarum oua deplenda esse: depletisq̃ue his nihil superest quod intelligi possit, quam puta- mina. Accedit his communis deinde sensus, in quo auditis depletis ouis, nihil quāu putamen

Intelligi relinquitur.

¶ De Psyllio.

CAP. X.

A

PSYLLION epotum, corpori toti frigus & torporem cum exolutione & mœrore quodam affert. Cui omnia quæ exhausto Coriano auxiliantur.

EX M. VERG. COMM.

Refrigerat Psyllion, quæ Pulicaris herba est. 4. uolumine a Dioscoride tractata: suoque frigore uitæ noxias perfrictiones & algores facit. Et præter algores corporis resolutiones, & mentis tristitiam. Qualis ea sit, & quomodo uenenî maleficiû hominî uitæ afferat, ex historia eius facile legentibus patebit.

¶ De Cicuta.

CAP. XI.

Cicuta pota, uertiginem excitat, oculisque caliginem offundit, ita ut eminus non cernatur. Singultus ciet. Mentem turbat. Extremi artus gelantur. Denique conuulsi suppresso arteriæ spiritu, strangulantur. Quare inter initia, uti in reliquis, Cicutam uomitu excutiemus. Postmodum deiectionem moliemur: ut quod ad intestina prolapsum sit, excernamus. Tum demum in meracam potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus, dantes non nihil intermissionis. In qua proderit lac bubulum potui datum: aut absinthium cum pipere, & uino castorio, ruta, mētha cum uino: aut amomi, cardamomi, aut styracis uncia: aut piperis cum semine urticæ & uino: aut lauri folia. Item laser ex oleo & passo. Passum per sese largius potum proficit.

EX M. VERG. COMM.

Sunt scriptori huic, & græcorum medicis in Cicutæ remedijs omnia eadem: pleraque tamen illi adiiciunt, quibus tota certius tractetur res. Quale uerbi causa est, quo loco hic Piper simpliciter instituit, illi commune addiderunt: utendumque communi Pipere iubent, ut longum & album ab hoc usu excluderent. Quale itidem cum Lauri folijs teneritudinem adiiciunt, tenerisque eius arboris folijs uti præcipiunt, summos ut nos credimus coliculos eius intelligentes. Quale etiam cum decernente hoc Amomi, Cardamomi, aut Styracis drachmam, illi unciam constituunt. Similiaque his pleraque alia, quæ uolentes diligentioribus in hoc studio rum genere relinquimus.

¶ De Taxo.

CAP. XII.

Smilax a quibusdam Thymion, a Latinis Taxus appellatur. Frigiditatem uniuerso corpori, strangulatus & celerem interitum infert, cui eadem quæ Cicutæ conueniunt.

EX M. VERG. COMM.

Ista a nobis quarto uolumine de Taxo arbore fuerunt, quæ satis tunc fore credidimus. Nihil nunc monuisse aliud legentes oportet, quæ ex eo loco repetendam eius historiam: cognoscendamque arborem, quam ueteres græci non Smilax tantum, sed Thymion etiam uocauerint. Hæc enim altera eius appellatio quondam fuit, & si uarie in antiquis exemplaribus legitur: solaque umbra, non succo tantum hominî lætalem: non tamen semper, sed ut Plutarchus Symposij sui tertio commentario monuit, quo tempore prægnas flores profert. Ex quo quod in historia scriptoris huius, quo diximus loco legitur, lætalem umbram hominî Taxum esse, non nisi cum floret, intelligendum est. Nec caret ratione aliorum quorundam florum exemplo, quorum halitu hominî sæpenumero nocetur.

Mm iij

D I O S C O R I D I S

C De Carpasi succo. CAP. XIII.
E Potus Carpasi succus, soporem, citamq; strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedijs.

E X M. V E R G. C O M M.
 Carpellā quinto suæ medicinæ cōmentario uocat Paulus Aegineta, cuius liquorē oēs homini letalē faciunt. Meminit eius aliquādo Plinius. Nobis de gñe herbę nō satis cōstat. Verūtā tāmē frigore noxiā intelligere oportet, ex quo ijsdem Cicutæ remedijs illi succurritur.

S Sardonia hærba. CAP. XIII.
SARDONIA Ranunculi herbæ generi assignatur, quæ uescens
 stibus mentem adimit, & quadam neruorum distentione labia in
 rictum contrahit, ut risus speciem præbeant. A qua quidem affectio-
 ne, de Sardonio Rifu adagium in uulgus aperte manauit. Post uomit-
 tum peculiariter conuenit aqua mulsa liberalius epota, lac, irrigatio,
 peruncioq; a pinguib; totum corpus excafcacinentibus. In calidam
 aquam, oleumq; descendant. Sed tum multum perfricare & inungere
 expedit. Et in summa, curam omnem quæ conuulsioni neruorum ad-
 hibetur, exequi oportet.

E X M. V E R G. C O M M.
 Nouerunt nostræ ætatis herbarij Sardoniam herbam, Rifu Apium appellantes. Apulei-
 us in cōmentario illo de herbis, Sceleratam herbam nominat, manifesta a maleficio eius no-
 minis rōne. Nos longius de ea secundo uolumine in Ranunculo herbæ egimus: quodq; tunc
 factum est, inutiliter agi iterum hoc loco non debet. Poterunt uolentes ex cōmentationibus
 illis nostris quæcūq; opus erunt in hunc locum reuocare.

D De Hyosciamo. CAP. XV.
HYOSCIAMUM potum, aut comestum similem ebrij; ab alienationem
 mouet. Sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa eo-
 piose data, lacq; præsertim asininum, si id desyderatur, caprillum, uel bu-
 bulum, uel aridarum ficuū decoctum. Faciunt ad id etiā nuclei pinei, aut
 cucumis semen ex passo sumptum, & uinum salsum cum adipe suilla re-
 centi passoq; itidem urticæ semen, aut nitrum ex aqua, & intubus errati-
 cus, & sinapis, & nasturcium, radix cepæ, & allium. Et hæc singula cum
 uino sumantur: post conquiescant, ut uinum concoquantur.

E X M. V E R G. C O M M.
 Quæ cognoscendæ Apollinari herbæ necessaria erant, quarto uolumine in historia eius
 dicta iam pridem ab hoc, & a nobis fuerunt. Quo loco, cum dictum a Dioscoride
 fuerit *μανιόλη καὶ καρπικόν* esse Hyosciamum. Quarum uocum altera insaniam, altera soporem
 significat, dubitandum, quærendumq; legentibus reliquit, an desit hoc loco, an abundet illic
 altera illa soporis uox. Ex his sane quæ hoc capite traduntur, abundare illic uidetur. Ex quo
 inquit imperandam esse quietem, ut potum ebriorum modo uinum concoquant. Quæ impe-
 randa non erat, si *καρπικόν*, id est, soporem Hyosciamus faceret. In maleficio eius præterea a græ-
 corū medicis nihil aliud, q̃ ebrietati similis amentia numeratur. In angusto uersatur res, ut aut
 ex Hyosciami historia eam expunxisse uocem oporteat, aut quod illic *καρπικόν* est, contra cō-
 munem uocis eius æstimationem ad capitis affectionem aliam transferendum sit. Omnia toto
 hoc capite, omnibus eadem sunt: præterq; in extremo calce, in quo aliter uoces suas concipit
 Paulus Aegineta: monetq; imperandā esse quietem, ut non aliter q̃ ebrj; potum somno con-
 coquit uinū. Sic etiā quiete sua qui Hyosciamū hauserint, ueneni eius uim pariter concoquāt,
 Nihil em̃ in re alioquin haud multifacienda mutauimus, satis imperatā quietē fore opinati.

¶ De Mandragora.

CAP. XVI.

A

Mandragora si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ad uchemens ueternum, nihil temere distans a lethargo. Cui antequam aliquid ex his accidat, uomitus ex aqua mulsa proderit. Postea nitrum, & absinthium, ex uino dulci aut passo fumantur. Caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio & motus corporis, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorei & rutæ, tritorum in aceto, & liquidæ piscis, & odor e lucernarum extinctu. Quod si agre si reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs uti conueniet.

μικτόρημα

EX M. VERG. COMM.

Sopor quæ primum malo somno hominem Mandragoras. Idque non tantum hoc loco Dioscorides sed in historia. 4. uolumine longius ab eo traditum est. Remedia nunc tam noxiæ quietis traduntur. Primumque locum uomitiones, & mulsa aqua sibi uendicauerunt. In quibus non conuenit nobis cum alijs interpretibus. Illi enim uomitiones, & aqua mulsam coniunxerunt, uomitus ex aqua mulsa prodesse, & uomitiones moueri, & aqua mulsam dari dicentes. Nos ex Græcorum medicorum disciplina, conferre quidem uomitiones diximus, sed a uomitionibus statim mulsam dari aquam. Habuimusque in eo auctorem Paulum Aeginetam, qui scriptoris huius caput hoc exscribens ait, ἡρμῆς δὲ πρὶν τούτων τὴν συμμίχην ὅτι ἔμειθε, καὶ μετὰ τούτων μολιπράτον. Quod est. Prodest priusque quicquid horum fiat uomitus, & post hunc aqua mulsa. Cogitauimus etiam, quoniam ab eodem scriptore inter Mandragoræ remedia non numeratur Eupatorium, multoque magis, quoniam nihil quod ad hoc faciat in decretis Eupatorii a Dioscoride traditur, aut abunde dare eam uocē, aut pro quapiā alia male eam illic legi. Quod signasse tantum uoluimus.

¶ De Meconio.

CAP. XVII.

B

EPoto Papaueris succo, quem Meconion uocant, consequitur ueternum, cum perfrictione & pruritu uehementi: ita ut sæpe in ualescente ueneno tanta erumpat prurigo, ut hominem exciter. Corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo uomitionem, acres clysteres auxiliantur, acetumque mulsam cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido, merum cum Absinthio aut Cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetum, nitrum ex aqua, & origanum cum lixiuā, aut passo, & rutæ syluestris semen cum pipere, uino & panace, piperque cum castorio & aceto mulso, uel cum satureia, aut origani decocto cum uino. Si olfactibus excitandi. Ob enatam pruriginem in balneas descendat, & foueantur. Post lauacrum prodest iurium pinguium usus, cum uino, aut passo. Medulla etiam ex oleo pota.

μῆκος

EX M. VERG. COMM.

Numerant a Nicandro in Opij potu, præ perfrictiones, soporē, languorem, pruriginē, & toto corpore Opij odorē, notæ aliæ plures: pallida facies, labrorum igneus color, exigua & frigida respiratio, liuescentes ungues, distortæ nares, & concaui oculi. Addidit illud etiā, odorem quæ Dioscorides ait toto corpore reddi una cum sudore, ueluti ex labore euaporari.

¶ De Corniculato Papauere.

CAP. XVIII.

Papauer quod Corniculatū appellat, & potu, & cibo eadē inferre consuevit quæ Papaueris succus. Nec alijs expugnat auxilijs.

μικτόρημα

¶ De Pharico.

CAP. XIX.

PHARICON, quod uocant, sapore syluestre Nardum imitatur.

φαρίκος

D I O S C O R I D I S

C tatur. Resolutionem neruorum potum adfert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post uacuationes uinum Absinthiten potui dare, cum Cinnamomo, aut Myrrha, aut Nardo gallico, quod Serinē aliqui uocauerunt, aut Spicæ nardi duas drachmas, & myrrhæ totidem obolos, cum passo, iri, & rosis ex uino. Derasumq; caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

E X M. V E R G. C O M M.

Q uid, qualeq; fuerit Pharicum, non satis inter antiquos scriptores constat: simplex alijs, alijs contra compositū tradentibus: & quod hætenus legisse me meminerim, nullo eorū, siue simplex, siue compositū fuerit genus eius, & substantiā indicante. Incerta posterioribus græcis ratio nominis etiā fuit, & si a gentibus & locis aliquot Græciæ dictum oēs testent. Quidam em̄ a Pharis in Arcadia: quidā a Pheris in Thessalia: quidā postremo a Pharide in Laconia, cuius meminit Homerus, Pharicū dictum uoluerūt. Nec desunt, qui ab inuēto sic uocatū putent. Athæneus in tertio sui Dipnosophistæ, quo loco de Cotoneis malis agit, nisi uitiū in eo sit, non Pharicum, sed Phariacum noiauit. Verba eius sunt, το γούν φαρικόν φάριακον. &c. Nec ipse etiā, alioquin in huiusmodi multus & diligens, quicq; de nomine, aut substantia ueneni huius docet. Refert tamē, quod miretur aliquis, in cæteris non legi, neq; inter remedia a quocq; numerari, infringere ueneni huius uires mala Cotonea: & ex Philarcho in. 6. hystoriarū suarum narrat, Cotonea hæc mala odoris sui bonitate letalium uenenorū uires hebetare: Pharicumq; hoc uenenū, Cotoneis malis mixtū, amissa nocendi potestate euanescere: deprehensumq; id fuisse, dato homini Pharico qd inter Cotonea mala fuisset, nullo mortis, aut ueneni malefici secuto euentu. Cæteri itidem oēs proposito Pharico, descriptisq; notis, & traditis remedijs nihil ultra de eo docuerunt. Quo fit, ut credamus, tam notum tunc oibus fuisse Pharicum, q̄ nunc nobis incognitū est: & ut in re nota sit, tacuisse cætera omnes qui de eo agerent. Ne descripta re, male & scelerate agere, & ueneni uti discerent homines.

D
τοξικόν

De Toxico.

C A P. XX.

T Oxicum ex eo nominari uidetur, q̄ barbarorum sagittæ eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & linguæ inflatione torquentur. Incoercitus furor uarias ipsius imagines obuersat. Quare uix medicinæ locus est, raroq; qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendis, ut uinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur. Rapi semen bibendum. Priuatim ipsius conuenit quinquesolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus. Roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus. Malaq; cotonea trita esse, aut cum pulegio & aqua bibere, conueniet. Amomum & balsami semen ex uino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt: & ubi surrexere, stupidi reliquum uitæ tempus degunt.

E X M. V E R G. C O M M.

P Linius. 16. uolumine, cap. 11. de Taxo arbore agens, his uerbis Toxica descripsit. Hanc Scitius Smilacem a Græcis uocari dixit, & esse in Arcadia tam pſentis ueneni, ut si qui dormiāt sub ea, cibūue capiant, moriant. Sunt qui & Taxica hinc appellata dicāt uenena, quæ nūc Toxica dicimus: quibus sagittæ tingunt. Sunt, ut uidet Plinio, Toxica ex Taxi arboris succo confecta uenena. Huic autē agere credat alijs, idem Plinij Toxicis hoc esse. Siquidē non multo ante priuatim de Smilace. i. Taxo arbore egit, perfrictionesq; & strangulationes suo frigore facere dixerat: ideoq; non credendū aliter, & iterū de ea ab eodē nunc agi: pſertim non congruētibus, nec ipsē in utroq; ueneno notis. Relinquit ob eā causam, ut credamus a sagittis Toxicū noiatū fuisse, certi quondā gñis uenenū, qd ex quidiano frequentioreq; usu antiquas sic appellauerit: scilicet tunc oēs uenenū, & ueneni propriū genus. Nunc autē in multiplici ad tingēdas sagittas, cuspidēsq; alias ueneno, quo passim uti, nisi obstarent leges, liceret, non facilem habet intellectum, nec discerni ex eo usu, & ab alijs potest, quæ multis cōmunem & eundem habet.

De Ixia.

CAP. XXI.

IXIA quæ Vlophonon appellatur, inter potandum aliquid Ocimo simile redolet. Vehementem linguæ inflammationem excitat. Mentem mouet. Omnes excrementorum exitus supprimit. Strepitum cum animi deliquio ciēt. Iis intestina latrant, nec secedit quicq̃. Post uomitionem, aluumq̃ resolutam, auxilium præstat, aqua in qua Absinthiū maderit, ex uino largiore, aut aceto mulso pota. Rutæq̃ syluestris semen, aut laseris radix. Item Tragorigani decoctum, cum aliquo supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpicio, quorum singuli oboli conueniunt. Quin & nuces iuglandes, cum resina, castorio, & ruta tritæ, ita ut singula drachmæ pondus æquent. Idem Chamelææ, aut Thapsiæ, aut Absinthij succi sicilicum cum aqua mulsa, & acetum calidum potum.

EX M. VERG. COMM.

Viscum pluribus locis Plinius græcorū Ixiam hunc uocauit: duo diuersi generis in plantarum historia, nulla discriminis adiecta nota, eadem appellatione indicans. Quod an uicinitate nominis in græcis deceptus fecerit (Ixon enim illi arborum Viscum, Ixiam uero quod nunc tractamus uocāt) an sciens, uolensq̃, negata sibi in latina re appellatione, qua Visco penitus si milem rem indicaret, non est propositū nobis modo ostendere. Fecimus enim id in Chamæleonē: & ante nos certius, longiusq̃ non multo ante hæc tēpora Leoniceus diligentissimæ lectionis, & egregiæ eruditionis homo, in Epistola ad Menocium Lucensem medicū idem etiā fecerat. In qua multa breuitate, summaq̃ diligentia ueterū & posteriorū scriptorū, de tota hac re dicta collegit. Quorū summa est, aliud ab Ixia hoc Viscum esse: hoc in multarū arborū ramis nasci, nec ueneni maleficiū habere: illum ad radices Chamæleonis, albi spinæ noxiū adnasci, pluribusq̃ alijs inter se notis & uiribus distinguī: patetq̃ id in græcis, quibus Viscum *ixos* sit, non *ixos*: quæ uox a Visco quidem facta fuerit, non tamē Viscum significet, sed quod paulo ante diximus, Chamæleonē album: cui, quemadmodū hic tertio uolumine tradidit, aliquibus locis Viscum adnascitur: quo pro Mastiche ad nitore cutis mulieres quondā utebantur. Et hūc non in arboribus natū, illud inter uenena numeratū quondā est: ideoq̃ Vlophonos dictū: quoniam, ut in historia utriusq̃ Chamæleonis hic docuit, canes, fues, quadrupedesq̃ altas in cibo enecet. Non debuerat, ut uidet, cū Visco misceri Ixias, qui Viscarius potius adlectiua forma, q̃ Viscum a Græcis noiatus fuisse uideri potest: ideoq̃ nos, ne simul æquiuoca uoce duo diuersa miscerent, alterum Viscum, alterū uoce græca Ixiam noiauimus. Barbarus Pliniū secutus, masculino gñe græcorū exēplo Viscum Ixiā hunc uocauit: qd in dispescenda re non semper satis est. Illud uolumus legētes monere hoc loco, cū proponeret a principio uoluminis huius Diosco. quæ in rota natura ueneni maleficiū habent, inter radices Chamæleonē, non Ixiā numerasse: in reddendis deinde notis & remedijs, Ixiā, non Chamæleonē noiassē. Nec dubitandum alicui erat, hoc, aut illo loco uitū esse. Idem em Ixias, & Chamæleon est: nisi Paulus Aegineta quinto suæ medicinæ, uolumine hsdem oibus uerbis scriptorē hunc cōmentarijs suis miscens, Ixiæ & Chamæleonis duo seorsum capita legētibz cognoscenda reliquisset. In quorū altero albi, in altero nigri Chamæleonis maleficia traderet notis & remedijs penitus diuersa. Respondetq̃ id duorū Chamæleonū historia. Vterq̃ enim Vlophonos aqua nocendi potestate noiatur. Eamq̃ rōnem, ut credimus, secutus Paulus Aegineta, seorsum de utroq̃ inter uenena etiā docuit. Quod si easdē notas ambo haberent, hsdēq̃ remedijs curarent, credere ego hunc scriptorē breuitati consulente, uno eodēq̃ capite de utroq̃ egisse. Sed cū diuersa in eis oia sint, uitū suspicari oēs cogimur: relictūq̃ in uenenorū censu Ixiā, in notis deinde & remedijs Chamæleonē. Necq̃ em uerisimile est, reliquisse hunc, qd alij cōmentaria eius exscribentes, tradiderunt. Irrepissēq̃ id uitū uerisimile est, ab aliquo, qui medicæ materiæ, & plantarū historiæ parum peritus, bis repetitū idem esse ratus: tanq̃ superuacaneam utrobiz alteram reliquerit uocem. Persuademur nos hoc facile, ex eoq̃ præsertim, qd in censu uenenorum propositus Chamæleon, in remedijs deinde redditus Ixias est. Quod futurum non erat, nisi proposit-

Ctus a principio Ixias cum Chamæleone fuisset. Nec proponendus Chamæleon, si reddendum aliquid in eo postea non erat. Ixiæ tota res in scriptore hoc patet: nec repetere quæ præmonstra-
ta sunt, opus est. Quid autem in Chamæleone desiderari possit, id nos ex Paulo Aegineta repe-
temus: qui ut cætera ab hoc scriptore accepta cōmentarijs suis inseruit, sic Chamæleonē etiā
exscripsisse credendus est. Verba de Chamæleone nigro eius hæc sunt. Haustum Chamæleo-
nem nigrū erosio, dolorq; ingens sequitur: & cum stomachi euerfione totius corporis tremor.
Accedit mox & conuulsio, biliosiq; & spumosi uomitus. Sunt etiā quibus singultus cum pri-
uatione uocis, distortiq; uultus fiunt. Confert triticeæ farinæ cremor pinguis calidusq;. Tum
uomitus & lactis potus. Prodest clysteribus etiā infundi quod lenē sit. Prostant & fomenta em-
plastri modo imposita. Verū contra strangulationes, liuoresq; facientē Chamæleonē, prode-
rit potum Absinthiū, nigrumue cum aceto mulso, aut Raphanis. Proderunt & præcordijs im-
posita fomenta. Sunt hæc nigri Chamæleonis ex Paulo Aegineta notæ & remedia. Quæ ob
eas, quas paulo ante diximus causas, ne quid huic operi deesset, addere placuit.

De Cerusa.

CAP. XXII.

φρυμίδιον

Cerusa suo colore proditur. Quippe palatum, gingiua, lin-
gua, & commissuræ dentiū, candamore quodam inficiuntur.
Singultus, tussim ac linguæ ariditatem excitat. Iis extrema frigescunt.
Mens labat. Membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mul-
sam, aut ficuum, aut malua decoctum, aut lac calidum, aut Sesamam
ex uino tritam, uel lixiuiam ex sarmentis factam. Amaracinum oleum,
aut Irinum, Persicorum ossa cum Lilij decocto. Columbina oua cum
thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi quod ulmus plora-
uit, aut humore quem ulmea folia reddiderunt, cum tepida aqua. Sed
tum quoq; uo nant. Conuenit etiā Thapsiæ succus, aut Scammonia
cum aqua multa potus.

EX M. VERG. COMM.

Sunt toto hoc capite plura, quæ alijs interpretibus, & nobis eadē non sunt. Diuersitatisq;
nostræ una est causa, qd impressum scriptoris huius illi codicem securi, alios eiusdem rei aucto-
res non consuluerūt, nec quæ aptius & uerius dici poterant, cogitauerūt: ideoq; qualia se oīa
obtulerūt, talia etiā reddita ab eis sunt. Nos contra auctore Nicandro, & antiquis græcorū me-
dicis, qd in scriptore hoc erat, & Persicorū ossa cum Liliorū decocto, cum hordei decocto uer-
timus. Illi enim non σὺν κρίνῳ ἀφελήματα, quod est, cum Lilij, sed σὺν κριθῶν, quod est, hordei de-
cocto dixerūt. Eadem rōne quod legebatur, ἡ κοκκινύλαος, significatq;, cum prunis, cum pru-
norum gūmi uertimus. Quicq; folijs ulmi cōtineri humor dicebatur, folliculis eius arboris con-
tineri diximus. Illis enim, non folijs continetur. Pluraq; alia mutauimus, quæ monētib; illis
naturæ rerum, & ueneni huius remedijs male respondebant. Quæ poterunt uolentes per se
certius uidere. Cogitabunt etiā, in Persicorum ossibus, quæ Cerussæ aduersari hic ait, an
tritæ ossium eorum putamina, an interiores nucleos intellexisse oporteat. Nicander sane in Ale-
xipharmacis suis putamina intellexisse uidetur. Versiculi eius sunt. καὶ τε κατατριβέντα μετ' ἄρ-
χιοντος ἐλαίου σκληρὰ ἀπὸ περισίτου κάρνα βλάπτει διὸν ἔρυσιν. Quod est. Quinetiam tritæ cum splenden-
te oleo duræ Persicæ arboris nuces malum egregie dissoluiunt.

De Fungis.

CAP. XXIII.

μύκητες

Fungorum alijs genere, alijs copia lædunt. Omnes tamen strangu-
latus suspendio similes concitant. Quibus confestim succurren-
dum. Communiter ex oleo uomere cogendi. Mirifice iuuat lixiuia ex
sarmentis, aut pyrastris furculis, epota cum sale, posca, & nitro. Pyra, aut
folia pyrastris cum fungis decocta, strangulantem illam uim auferunt,
mansaq; eisdem auxiliantur. Aduersus Fungos gallinacea oua cum po-

ica proficiunt, adiecta aristolochiæ drachma. Item absinthium cum uino mellecq; sumptum, & ex aqua potum. Apiastrum ex nitro, Panacis radix in uino, Fax uini cremata cum aqua, Aeris flos ex aceto, Radix sinapis & nasturtium esu profunt.

EX M. VERG. COMM.

Nascuntur ab æstiuo & autumnali imbre statim euocante sole Fungi omnes. Nec minus q̃ tonitrua tubera, optabiles Fungi pluuias eo tempore hominibus faciunt: haud sane omnibus, sed his qui, ut Hesiodus cecinit, infelicitatem suam & malum amantes, naturæ potius monstros & uenenis q̃ melioribus & tutioribus cibis uesci gaudent. Male, exceptis prætensibus, autore Flacco, alijs creditur Fungis. Male etiam, autoribus græcorum & latinorum medicis, in cibos receptis uescimur. Omnes enim, ut hic a principio statim monuit, uel genere, uel copia nocent. Eamq; ob causam debueramus tam male tuto cibo abstinere omnes. Verum quoniam nouitate potius q̃ suauitate eius illecti, presenti uitæ periculo æstiuas & autumnales cœnas hoc cibo etiam instruimus, debuerant cæteri interpretes in docendis factarum a Fungis strangulationum remedijs, diligentiores esse: meminisseq; ambo, non præcipere Diosco. contra Fungos bibendum ex aceto æris florem, sed atramentum sutorij. Nec si etiam χαλκοῦ κνέου passim in scriptore hoc legatur, pluris librariorum incuriam, q̃ scriptoris huius decreta facere: in quo cum responderant prius ultima, & sibi inuicem omnia, facile erat ex Atrameto sutorio, quod Chalcanthum græci uocant, locum emendare. Quæ enim ipse hic scriptor pro Fungorum maleficio illic monet, huiusmodi sunt. καὶ μάλιστα λαβοῦσι θανάτου. Quod est, Et his qui Fungos hauserint opem fert. Priuatim inter ceteras quas habet Atramentum sutorium uires, Fungis opem ferre a Diosco. dicitur. Quod Flori æris neq; ab hoc, neq; ab alijs tribuitur. Oportebat etiam alterum eorum non coniungere, copulareq; simul, salem, & nitrum, sed hoc, aut illud præcipere. Hic enim alterutro uti monet. Habetq; res certam ex natura rationem: quando similis, aut non adeo diuersæ naturæ sunt nitrum & sal. Sunt etiā pleraq; alia, quæ non sunt nobis cum illis eadem, sed leuiora, & ob eam causam relicta. Monemus illud etiam, quod a legentibus forsan desiderari poterit. Quæ hic iubet simpliciter, gallinarum oua cum posca bibi, non uideri nobis integrum. Siquidem græcorum medici ἀφ' ἐκείνης τῆς ἐνυμνήτου sumi iubent. Quod est, in posca elixa. Quin etiam quod hic ait, μέλι ἐν τοῖς ἐσθίουσι, id est, mel in cibo, illi ἐν λειχιδίῳ, id est, in eclegmate dicunt. Et quam hic Panacis radicem tantum, illi radicem & semen. Addiderunt præterea, quoniam in Fungis a uenenatis corrosi aliqui non tantum strangulant, sed ex diuersa alterius ueneni ui intestina exulcerant, dandum in eo periculo copiosum absinthium, caricarumq; & origani decoctum: nulla aqua cogendos ad uomitum qui in periculo sunt: calida lauari aqua: imponendaq; præcordijs emplastri modo farinam hordeaceam, hydrelco maceratam. Relictum hoc ut credimus a Diosco. est: quoniam ad aliud ueneni genus pertineret. Quod ex suis notis cognitum suis remedijs etiam curandum esset. Hoc enim capite de Fungis, eorumq; maleficio, non uenenatorum uenenis agebat. Monuerunt isdem græcorum medicis nos etiam, ut in extremo capite contra q̃ alter ex interpretibus fecit, non Cardamomum, sed Nasturtium uerteremus. Illi enim manifeste καὶ ἐν τοῖς ἐσθίουσι, id est, in cibo Nasturtia Fungorum maleficio aduersari testati sunt.

De Gypso.

CAP. XXIII.

Lapidescens Gypsum strangulationem creat. Quare eadem proferenda sunt, quæ mansis Fungis auxilia. Inter quæ habetur maluæ decoctum, quod etiam olei uicem pensat. Vtpote cum pingue sit, euomendocq; lubricitatem inducens, deradi corpora non sinit. Quod ubi duratur in lapidem, efficit. Quinetiam prodest oleum ex aqua mulsa, aut ficorum decocto. Lixiuiua e ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum uino copiosiore pota. Origanum, aut thymum cum lixiuiua, aut aceto, aut passo. Loca decocto maluæ proluenda.

EX M. VERG. COMM.

Non est quod in Gypso legentes moneamus, præterq̃ autoribus isdem græcorum medicis passim dysenteribus infundi, nō cū origano, aut thymo, lixiuiuaq; & aceto bibi a nobis in ex-

Q tremo capite dictum fuisse. Illi enim remedium sic docent: uisumque est rationem habere, quod male uidentur similiter coniungi posse, & alternari diuersarum uirium acetum, & passum. Poterunt tamen legentes quod magis probauerint sequi.

αἷμα ταύρου

T De sanguine Tauri. C A P. XXV.
Tauri recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem strangulatamque concitat. Faucium meatus cum neruorum distentione praecludit. Lingua rubescit. Cruore dentes inficiuntur. Quaedam concreti sanguinis uestigia, inter eorum commissuras restant. Quare uomitum uitabimus. Sanguinis enim globi per extractionem eleuati, magis stomacho inculcantur. Dari ergo opus est quae concretum sanguinem discutiant, aluum subducunt. Grossi lacteo succo turgentibus ex posca, & nitrum per sese auxiliantur. Nec secus coagulum omne, cum aceto & laserpitij radice, aut lasere. Item & brassicae semen, cinisque ficulneus. Conyzæ folia, cum pipere, & rubi succus ex aceto. Alius resoluta. Seruatis fluida per sedem ingeri consueuerunt. Stomachum, aluumque hordeacea farina ex aqua mulsa perungere oportet.

E X M. V E R G. C O M M.
Sunt hominis & brutorum sanguinis notae, uires, & euentus uarij. Quemadmodum. i. uolumine longius dictum in sanguinibus a nobis est. Nunc unius tantum describenda malefica uis, & in tota sanguinis historia dammandus Tauri nunc iugulati: quoniam celerissime coit atque durefcit, ideoque pestifer homini, praesertimque potus. Veneni maleficio infamis, miserabili genere mortis graecorum historias & poetas implet. Deprehenderunt id in diuina re mortales, cum iugulatis ad sacrificium tauris, quae aderant superstitiosiores calentem adhuc biberent: noua & indigna deo ratione hac sanctitate incolumitateque sua augere se existimantes. Nullus tamen clarius hoc genus mortis quam Themistocles fecit, qui post pulsum e graecia Xerxes, exul a patria, accepto ab Artaxerxe exercitu, siue nolens, siue desperans quae illi contra graecos pollicitus fuerat praestare: in Ioniae Magnesia decempro cultuario ipse taurum in sacrificio tenens, exceptum poculo sanguinem repente hausit: ut esset eo tempore anteposita uitae mors, perpetuum uoluntatis honorisque sui testimonium, quod semper ciues sui meminissent. Caneretque pro se in Helena Sophocles *καὶ δὲ λαὸν αἷμα ταύρου γ' ὑπὸ πύλιν. καὶ μὴν πύλιν τῶν δ' ἔχοντες αἷμα ταύρου πῖν. ὁ θύμιος κλέος γὰρ ὁδύνας ἀπερὶ τῆρας.* Et Aristophanes in equibus suis, *βλῆττον ἢ μὴ αἷμα ταύρου πῖν. ὁ θύμιος κλέος γὰρ ὁδύνας ἀπερὶ τῆρας.*

ῥάλα κμην
ταύρου

E De Coagulato lacte. C A P. XXVI.
Eos qui coagulatum lac hauserunt, frequens strangulatio inuadit, quae in globulos quosdam lac coalescat. Quibus pro antidoto iuuandis, coagulum ex aceto damus. Et bibere saepius cogimus. Damus & calaminthæ folia arida, item succum. Aut laserpitij radicem, aut laser cum posca. Thymumque ex uino, & lixiuiâ. Sed nulla falsilago obijciat: quoniam magis lac coiret, & in caseum densaret. Neque illos uomere conuenit. Siquidem concretum lac sese in stomachi angustias insinuans, strangulat.

E X M. V E R G. C O M M.
Non habet ueneni maleficium Lac simpliciter coagulatum, alioquin nullus esset in cibo eius usus: sed quod antequam concreuerit admixto illi coagulo aliquis biberit. Coit enim in stomacho, & coaguli uis, quod illi admixtum est, concrefcit in grumos: concretionemque illa interiores obstruit meatus: obstruuntque his, strangulationes facit. Plinius mali periculi huius genus diuersis locis diuersis uocibus indicat. Nos ex re, & ex graeci nominis uis, lac propositum quod admixtum habebit coagulum. Id enim *καυτηναρθῆν* participium indicat. Ceteri interpretes coagulatum simpliciter lac uerterunt. Nobis placuit certiore illam rei indicationem sequi. Placuit etiam inter remedia nihil potius quam quod ignoraremus asserere, quo loco, si, relictum inane spacium non pro

cul a fine capitis est. Quem alter interpretum dissimulauit, alter lutum simpliciter dixit. Diodoridis uerba sunt, καὶ τὴν πλοποικτικὴν κοίαν. Pertinetq; id ad lixiuā genus aliquod: quale autem, non satis nobis constat, nisi forte hic preceperit utendum lixiuā quæ non per cinerem, sed terram traiecta fuerit, πλὸν enim lutum & aqua dilutam terrā græci uocant. Sed nihil in ea re cōperitū aliqñ nobis est. Potuit forte etiā ea imperari lixiuā, quæ non traiecta per cinerē aqua, sed uino facta esset, πλὸν enim antiquissimi uinum etiā uocauerunt. Et in hanc partem inclinat nobis animus. Nihil tñ constituimus, integram rem peritioribus seruantes.

¶ De Argenti Spuma. CAP. XXVII.

Spuma Argenti pota, stomacho, uentri, & interaneis grauitatem cum magnis torminibus adfert. Et nonnunq; pōdere suo intestina uulnerat. Vrinam suppressit. Corpus intumet, plumbeamq; deformitatem cōcipit. Quibus subuenit secundum uomitionem, potum syluestris hormini semen, myrrhæ drachmæ septem. Absinthium, hyssopum, apij semen, aut piper, aut ligustri flos ex uino. Aridum palumbis simum, cū nardo & uino.

EX M. VERG. COMM.

VNa tantum litera Cypros, quæ latinis Ligustrū est, a Cypero, q̄ quadratus odoratus luncus ipsdē dicitur, differt. Ideo facile fuit in antiquis exemplaribus scriptoris huius alteram uocem pro altera scribi. Diuq; nos anxij, cum uariarent in his antiqui etiā græcorum medici, Nicandrum testem secuti, Ligustrum uertimus. In eo em̄ carminis necessitas non aliter q̄ ligustrū legi posse & debere ostendit. Versiculus eius est, κύπρον τε βλαστὰ νιανθία. Quod est. Et Ligustri nuper florentes germinationes.

¶ De Argento uiuo. CAP. XXVIII.

Argentum uiuum potum, eadem quæ Spuma Argenti infert. Eisdemq; utendum auxilijs. Lac copiose potum auxiliari constat, sed postea euomant qui hauserunt.

¶ De Calce, Sādaracha, & Auripigmēto. CAP. XXIX.

CAlx, Sandaracha, & Auripigmentum, pota, aluum et intestina cum uehementi erosione excruciant. Præbenda cuncta quæ suffrenare & soluere possunt, & facilem lubricamq; aluum reddunt. Cuiusmodi maluæ succus est. Dandum decoctum seminis lini, uel fructus Tragi hærbae, uel Orizæ, lacq; cum aqua mulsa copiosum, iura pingua, & boni succi.

¶ De Lepore marino. CAP. XXX.

Qui Leporem marinum biberunt, piscium uirus olēt. Intercedēte aliquo tempore, aluus dolore afficitur. Vrina sistit. Et si quando eam reddere contingat, purpureum colorem referet. Omne piscis genus auersantur, & odio habent, Foetido ac graui sudore manant. Biliosus uomitus, interdum sanguini promiscuus subsequitur. His dandū lac asininū, uel passum cōtinue, aut radices maluæ, foliorūq; decoctū, aut trita cyclamini radix cum uino, aut ueratri nigri, aut scamonij drachma cū aqua mulsa, puniciq; mali acinis. Cedria cōtrita cū uino efficax ē. Anserinus sanguis ut tepebit potus. Sed cū pisces oēs respuant, aspernenturq; solis fluuiatilibus cancris uesci possūt, bibuntq; eos admisto uino, adiutiq; præcoquunt. Cumq; comesset pisces cœpe-

Nn ij

D I O S C O R I D I S

Crint, suae salutis indicium est.

¶ De Rubeta.

C A P. XXXI.

opre

Rubeta, aut Rana palustris assumpta tumores ciet. Pallor corporis uehemēter decolorat, ut plane buxum spectetur. Spirandi difficultas torquet, & grauis halitus oris, singultusq;. Inuita genitura profusio consequitur. Adiuuantur secundum uomitionem multo meri potu, & harundinis radices binis drachmis, aut cyperi. Breuiter cogendiunt, ut exercitationi & cursui se credant, ob torporē quo corripuntur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

¶ De Hirudine

C A P. XXXII.

βελιδα

Deuoratae cum aqua Hirudines, si ori uētri adherent, tractione partium, nonnullam suctionis imaginem praebent. Eo enim argumento hausta Hirudo deprehenditur. Has muria sorbitione excutit, & syrenicus succus, aut laserpitij folia, aut betae, cum aceto, aut pota niuis glebula, cum posca. Nitru ex aqua gargarizetur, aut atramentum futorium aceto dilutum. Si faucibus haereant, iniecta lupinorum farina, aqua frigida ore contineatur, et ad eam Hirudines exilient. Prouidendum etiam ijs, quae & si ferendi auxilij gratia tradantur, non minora tamen caeteris uenenis pericula saepius adferunt. Qualia sunt album Veratrum, Tapsia, Elaterium, Agaricum nigrum. Siquidem ea strangulatus concitat. Aut immodicas deiectiones mouent. Quibus ea medentur quae in Fungorum mentione & similibus retulimus. Nimirum os autem deiectionum impetus, medicamentis quae excrementa suppressunt coercebimus. Neque negligenda quae gliscente sensim nocumēto, pericula ingerunt. Quo in numero sunt syluestris Ruta, Gith, et nouae Glacies.

E X M. V E R G. C O M M.

Plura & certiora pro haustis Hirudinibus docent graecorum medici. Primumque inter notas numerant quae nullae in hoc scriptore sunt, floridi, ut illi aiunt, id est, uiui sanguinis excretae. In remedijs etiam lupinorum farinam addunt. Ex eorumque disciplina, ut uidetur, nouissimorum alter interpretum scriptori huic remedium illud addidit, quod alioquin in scriptoris huius codicibus inuentum a nobis haecenus non est. Causam etiam afferunt, cur frigidae aquae sensu, quae ore contineatur, proflant faucibus haerentes Hirudines. Ea est, quod frigidae aquae appetentes, ad eam festinant. Adijciunt & illud, Cimices dedisse aliquos: quod hic ipse secundo uolumine in Cimicibus praecipit. Nec male suspicetur aliquis, deesse huic scriptori hoc loco inter remedia, quod alibi in historia cognitum, imperatumque fuerat. Galenus priuatim Alijs usum se fuisse testatus est, nec alio indiguisse remedio.

¶ De Axe.

C A P. XXXIII.

αξος

Axos flos est sping eiusdem nominis. Eos qui uescantur, sola uomitio recreat.

¶ De Aqua frigida.

C A P. XXXIIII.

ψυχρὴ ὕδωρ

Aqua frigida habunde pota, aut meracū uinum liberalius potum, aut passum, praesertim a balneo, aut cursu, aut uehementi

exercitatione, strangulatus, & dolores infert. Vbi sanguinis missio pro
tinus, & uacuatio imminentiā soluūt pericula. Sed de notis ueneficio-
rum remedijs, & cauendi modo, hactenus dicta sint. Subiungeremus
etiā antidota necessaria quæ præclare auxiliantur, quibus utimur, quæ
le metridatium est, præsertim quod sanguine & scinco temperatur: ue-
rum quoniam alijs in locis diligentissime scripta sunt, hic ab eorum de-
scriptione superfedemus.

MONENDI hoc loco legentes sunt, quas hic scriptor Antidotos tam sæpe laudauit, & quas
subiecturum se commentarijs his in fine pollicetur, nullas ætate hac nostra in eius exemplari-
bus, quæ uidere hactenus licuit, inueniri, ideoque non expectandas a nobis.

¶ Finis LIB. Sexti.

PEDACII

DIOSCORIDIS

De Venenatis animalibus, & rabio-
so Cane, LIB. Septimus.

IO. RVELIO interprete.



DE BESTIIS quæ uirus eiulantur, & exitiali
bus uenenis, ut circūitus medicinalis ad umbili-
cum perueniat, sermonem facere proposuimus,
& quidem cæteris non minus necessarium, ijs qui medicinæ artem ex-
ercent. Vtpote cum adminiculo eorū quæ in eo traduntur, doloribus,
periculis, & cruciatibus, homines liberari conueniat. Hic Tractatus in
summas parteis duas, sicuti ab initio relatū est, distribuitur. Nam qui
de feris uirus inspuentibus differit, Theriacus dici solet. Qui uero de
amoliendis ueneficijs, Alexipharmacus: de quo cōmentabimur, simul
quæ sequi consueuerunt, quæque nonnihil auxiliij ferunt, explicabimus.
Omnia in promptu & ad manū artificem habere oportet, propter ur-
gentem sæpenumero uecessitatem. Siquidem pauca e uenenis & uiru-
lentis animantibus, tarda & grassantia sensim pericula cient, ita ut dila-
tionē admittant. Pleraque uero presentaneam perniciem afferunt. Ho-
minum aut partim male alteris cogitantes, ingenita prauitate maleficiū
ita temperare statuerūt, ut spacium curanti liberū non relinquant: par-
tim tristi aliquo euentu oppressi, hausto sponte ueneno, mortem sibi
cōciscere conantur: qui postea deprehensi, aut resipientes, & uitæ cu-
pidi, presentaneā opem poscunt. Non desunt qui hostiles sagittas illi-
nentes, aut fontes, aquasque puteanas hac labe poluentes, citam aduersa

Nit iij

Crijs perniciē moliunt. In quibus ipsis maleficiū nō subito, sed aliquāto post respōdere natura sua cōparatū est, tū nisi primo quoq; tēpore cōerceat, & remedijs subide excipiat ueneficiū, frustra postea succurrit, occupatis iā corporibus exitiali ui ueneni. Proinde nō uulgari industria diligētiq; in ea re utendū est: ut quod in alijs incōmodis ars cōsueuit, in his quoq; salutē mortalibus praebeat. Quin & apud priscos modus hic unus existimabat eius partis. Sed recētiore ipsū discreuerūt, nō minātes praeuentionē & modū praeuētē, salubris sanātisq; mediū statuēt. Qui parua & leui supra modū persuasione freti, magno in errore uersant. Siquidē treis in humanis corporibus cōstitutiōes esse cōtēdūt. Vnā, qua sani degimus. Alterā, qua sinistra ualitudine corpora laborāt. Tertiā, mediū inter utrāq; locū sibi uēdicat. In qua positi, sanitatē specie mētiunt, facileq; in morbos & pericula cōcidūt, ppter mortiferā ui quā in eorū corpus incūbit. Quēadmodū in ijs uidere licet, quos excādescēs rabie canis momorderit, necdū tamē aquā horrēt: in ijs quoq; qui cātharidas hauserūt, sed nōdū urinae tormēto cruciantur. Tripartito igit artē digeri, tripliciq; cōstitutiōi respondere tradūt. Salubrē partē esse uolūt, quē sanitatē tuet. Præuētē, eandēq; phibentē, quē obstat q̄ minus in morbos incidant. Et in sanitatē, qua uitia discutiunt. Quibus ita respōderi pōt. Qd̄ primū p̄ illud additāmētū nō treis corporis tñ, sed quatuor haberi cōstitutiōes fatendū esset. Quippe ut aliqui sunt, q̄ necdū morbo laborāt, morbo tñ maxime ob impendentē causam sunt obnoxij: ita sunt q̄ iā priore morbo defuncti, nondū tñ secūde ualitudini restituti sūt. Id qd̄ a morbo pximo sese recolligētib. cerne re licet, q̄ uiriū rēcreationē et robur desyderāt. Sed quēadmodū agrotātū cura ad partē medicāmētariā p̄tinet, ita qd̄ morbos amolīt, eīdē subijci par ē. Ad arcēdas em̄ ualitudines uehemētib. utimur auxilijs, altiorē scarificatu, uisionibus, amputatiōe, derodētibus epithematis, potionibus p̄niciēi occurrentibus, et plerisq; alijs. Verū enīmuero sunt usq; eo rudes nōnulli, ut ne remedia qdē appellent, quā morbos arceāt. Cuius sentētię inire rationē haud p̄mptū est. Etenī cū uerbū ipsū, p̄cauere, tū opus p̄cauētis, modū omnino auxiliārē remediariūq; p̄ferūt. Mirū uero, nisi etiā sua illa distributione partiū, eos cōplectunt q̄ in pestilentis cœli statu morbo nondū correpti sunt, pesti tñ ppter obuersantis aeris occasionē, opportuni, & in morbum proni reddunt. Dicere forsitan q̄s possēt, salubris institutionis alimētaria p̄cepta nō aliud esse, q̄ arcēdorum morborum rationē. Quippe cum firma reddere corpora, et minus uitij obnoxia nitamur, ut inoffensa ualitudine degāt, nec morbis conflētentur. Necq; id silentio prætereundum, quod peculiariter ad rē pertinet: non oportere medicinā partium distributionē, totidē corporis cōstitutiōibus respōdere, sed naturas peculiarib. uniuscuiusq; notis

conſecere: ut ſuis locis oſtendimus. Cum iſs igitur, non pluribus agens **A**
dum. Illud magis adnotare cōuenit, affectus qui à uirulentis animalibus,
ueneniſq; contrahuntur, cecos uocari. Quin & ea quæ eiſdem auxiliantur,
nulli ſunt addicta cauſſæ. Quapropter queſtionibus obſeruatoriæ ar
tis, quæ ratione fulciatur, annumerari ſolent. Neq; ex ſe uerū deprehendi
tur, affectus huiuſmodi cecos eſſe. Nam quod ſemper ſe protrahit, & nul
lum in quibuſdam neceſſarijs uſum exhibet, non facili coniectura colligi
potest. Et ſi ſecundū proprietates proriſus cecos eos affectus concedimus,
qui ab exitiſalibus uenenis, & animantibus quæ uirulento morſu ſæuiunt,
contrahuntur, non tamē quod ad opus nonnullū uſum præbet, datq; me
dendi occaſionem, aut imperceptibile, aut cecum, nulliue cauſſæ obnoxi
um reputatur, ſed magis ab ipſo quis impuſſus, fidem quam habet & o
pinionem de abditorū cognitione confirmare poterit. Nam etſi ſæpe mi
nora ſunt, q̃ ut ſenſibus percipiantur, euidenter tamē ex alijs correſpon
dentibus deprehenduntur. Diocles autem in eo commentario, quem Plī
ſtarcho dicauit, ſatis modos perſtrinxit, ad hanc uerborū ſententiam ſcri
bens. Noſſe quis hoc poteſt, cum in alijs non paucis, tum in uiperis &
ſcorpionibus, & reliquis id genus, ſecum animo reputans: ut quamuis
exiguo ſint corpore, uixq; conſpectui ſubiſciantur, magnorum tamen **B**
diſcriminum ac dolorum cauſſas inferunt. In quibus nihil præter quan
dam corporis exiguitatem, uehementiamq; præ cæteris animantibus da
tam illis, facile fuerit ſpectare. Quanta enim ſcorpij magnitudo, aut cor
poris moles exiſtimari poteſt, ſi ad eiſ iſcium comparauerimus, aut reli
quorum id genus carne perimentium, Quorum aliqua uehementes cru
ciatus excitant. Alia erodunt, & putredines cient. Nec deſunt quæ præ
ſentaneam perniciem moliantur. Nonne quod a phalangij morſu uirus
ingeritur, uniuerſum corpus excruciat? At neq; quis uehementiam ipſo
rum a mole deprehendere poſſet, cum proriſus exiguo corpore cōſtent.
Ergo q̃ hæc ad affectus referantur, conſtitit inter omnes. Verum q̃ exa
cte deprehenſum ſit, uim quandam ipſis ineſſe mortiferam, quæ permi
ſta corporibus moleſtiarum quæ exoriuntur, cauſſa ſit, in conſeſſo eſt, &
omnium conſenſu defenditur. Nec quisq; offendi poſſet uſque adeo con
tentionis ſtudio flagrans, qui aliunde exoriri moleſtias aſſeueraret, q̃
a materia moriſera partem corporis attingente. Porro id fuit quod in
ter utilia artis opera dicere cogit, nos nihil proriſus lædi ab incompre
henſione per proprietatem communis cauſſæ, cum euidenter, tum in
dicari poſſit, cum deprehenſa eſt. Ideo Eraſiſtratus empiricorum per
tinaciam graui cauillatione inceſſens, cæcis affectibus cauſſas aſſignauit,
inſiciatus, communem cauſſam, quæ morbis acceſſit, eſſe incomprehen
ſibilem. Et hanc in eo quē de cauſſis ſcripſit commentario aptiſſime
prodidit, Neq; ferendos eos eſſe cenſuit, qui ſe dicant in quibuſdam, ut

D I O S C O R I D I S

C in uenenis, serpentium ictibus, & cæteris id genus trita medendi ratione contentos esse. Obseruatio igitur comprehensionis caussarum, nobis perfecte diuidentibus satisfaciet. Primum enim per genus comprehendendi non possunt. Quod autem sit lætifera uis, corporaq; permutans, ita ut perimat, ex ijs quæ per genus, non per speciem uagantur, medellam subscribit, quæ hæc hebetare, & prorsus expugnare liceat. Quando subiunxit. Ad aquam dulcem, & potui idoneam uenit quis, & ante obseruationem in uomitū, propter ferientis uehementiam, & demorsæ partis fracturam, Cucurbitulas adfixit: urentia medicamēta, aut ea quæ uim eandem adipiscuntur admouit: postremo partem amputauit. Secum reputauit medicamina, quæ ad summa cutis adijciuntur, immisissæ ad intima perniciiei repugnare. Hæc itaq; quæ proposuit Erasistratus, ueritati consentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam uim corporibus illapsam, negociorum, quæ ipsa faceffit, esse causam diffiteantur. Verū rudiuscule nomini attendūt. Nam apud ipsos palam immisa uis φθροποιός, id est, mortifera nominatur, φθροποιόν autem aliquid esse uolunt, quod nullius rei sit causa. Aiunt hæc nomina μάστιγος, & ἀνακαλίντιον, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro uirtute, sed nuda prolatione comprehenduntur. Enim uero quemadmodum in his uocibus μάστιγος, & ἀνακαλίντιον, partes uernaculos & præcedentes non retinent significatus, sic in hoc uerbo φθροποιόν partes productionis gratia non pro uirtute coaluerunt. Hinc ad caussarum differentias transeunt. Affirmantq; caussarum aliquas euidentes esse, quæ dum aduersam ualeitudinem crearūt, separantur, cuiusmodi sunt frigus, labor, insolatio, æstus, & similia. Quasdam continentes, quæ permanent postq; morbum excitarunt, hoc est, cum præsentibus sunt, & effectus eorū adsunt: cum increfcunt, effectus augentur: cum decrefcunt, minuitur: & cum desinunt, finiuntur. Quin per se prodeuntes effectus, aliquid cuius finis gratia esse possunt. Tales quidem probatissimæ sunt caussarū differentię, quarū nulli phthoropceon subijci potest. Euidens enī causa non est, quoniā morbus ipse permanet, nec corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hæc adsit. Quemadmodum accidit ijs qui a rabioso cane sunt demorfi. Quod si neq; euidens causa, neq; continens fuerit: neq; ad finem coadiuuantē causam referri potest. Si uero a nulla caussarū differentia phthoropceon deducere possumus, causam non esse fatebimur. Quod autem asserunt, nomina quædam in se non habere parteis rerum significatiuas, sed nuda & simplici prolatione ficta esse: fateri necesse est. Verū non omnia, sed per pauca talem nancisci conditionem existimandum est. Namq; ποιν, in hoc nomine φθροποιός, perinde atq; adsumpta profertur: sed peculiarissimam usurpat significationem, Quemadmodum enim φθορά, id est, corruptionis nomen

mutationem in peius significat, sic hoc uerbum *πορνειν* sumi debet, ut nihil
 in dictione *πορνειν* sortiri se declaret, neq; prorsus id significat, quod omnes
 audiunt: & hinc simile redditur, *μαρδιδ' εχεν δι' ο*. Si dant a corruptione sa-
 lubrem fieri morbu, concedunt utiq; ui huiusce uerbi *πορνειν*, nisi quid cor-
 ruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per sin-
 gulas causas, quæ corporibus subijciuntur, præsertim in immissis uene-
 nis. Verum non nihil subiacere causarum differentijs produnt. Quinetiam
 aberrarunt, non exactam diuisionem assumentes. Qui uero se dogmatiz-
 cos profitentur, causam esse partim præparantem, partim continentem
 asserunt, ut inguinum ulcus, & inguinariam febrim, quod effectui tum
 assistant, tum etiam separentur, ut a fractis præcipitatio. In summa, quo-
 ties quidpiam suapte natura causa fuerit, nec ulla diuisione comprehen-
 ditur, uitiosum est, neq; causæ adscribitur eorū quæ idem genus sortiun-
 tur. Sed quod phthoropœon, id est, mortiferū causa sit, nomen ipsum ar-
 gumento est, & in ijs quæ contingunt apertius ostenditur. Quid aliud
 causæ arbitrant esse post impressum a serpentibus ictum, q̃ ex animan-
 te uim & illapsum in corpora uirus. Neq; enim frigus, neq; æstus, neq;
 cruditas, neq; aliud quicq; causari possunt. Verum quoniam causas
 rum differentijs gaudent, & aliquas continentes, alias euidentes appel-
 lant: ipsis dicendum, altero istorū modorum euidentem dici causam, q̃
 effectum præcedit, & corporis compagem occupat: continentem uero,
 q̃ morbis præsentibus adest: qua separata recedunt, quæ cum ipsa eue-
 nerant. Sed de ijs hæcenus. Fatendum itaq; mortiferam uim intrinsecus
 manifestissimam esse causam. Ipsamq; principem facere scopum oportet.
 Et anteq; morbis confluentur, uarijs modis est certandū, donec uis
 tota corporibus excutiat. Modo in loco præsertim principatum non
 obtinente, ante coërceatur, q̃ alius irrepens uiscera tangat: aut eius per-
 nicies eluatur: aut iam membratim peruagatura suffrænatur. Itaq; uene-
 na si hausta sunt, crebris uomitionibus: si morsu impressa, scarificatio-
 ne, affixis cucurbitulis, exuctu, carnis circumscriptione, nonnunq; am-
 putatione extremæ partis, euocantur: clysteribus, & imposito medica-
 mentorū acrimia cohibentur. Hæc simul utiq; arcere uirus & eluere pos-
 sunt. Restinguuntur meratione potu, aut passo nulla aqua diluto, uel con-
 trariorum esu, quæ acrimonia sint prædita. Postremo deiectio alui, euo-
 catus sudor, & alia quædam in commune, quæ membratim demonstra-
 bimus, auxiliantur. Verumenim uero non lætiferam modo materiam,
 sed & magnitudinem, & tempus efficere scopum & propositum oportet.
 Etenim ab ijs remedia q̃ plurimum discrimen capeunt. A magni-
 tudine quidem, cum nonnulla ex uenenis, & uirosis animalibus pericu-
 la minantur. Alia putredines altas, aut exteriores excitant. Alia uehe-
 mentissimos dolores, aut cæcos cient. Alia uix medicamenti cedunt,

D I O S C O R I D I S

C & magis minusue molestias excitant. Oportet aut ea quę pericula ferunt euincētibz auxilijs expugnari, & minus infesta mitioribus. Quippe abz furdū fuerit, in maioribus tardiore medicamentorū usu homines in discrimen afferre: in minoribus uero, uehementiū auxiliorū iniuria laceffere. Finitio a tēporibus in promptu est. Aut em subito in pericula & præsentes molestias adducit, aut sensim & dilatas in tempus. Itaq; præsētibz multa simul auxilia repræsētari oportet: reliquis paulatim. Hęc quadā artis formula breuiter definita sint. Iam membratim procedamus.

¶ Signa rabiosi Canis & demorsorū ab eo. C A P. I.

DE rabiosi Canis morfu sermonem alijs prapofuimus, q; id aniz mal domesticum ac frequens esse consueuit, & rabie sapius corripitur, ac perit, ab eoq; cauēri difficile. Inde periculum inēuitabile hominem manet, nisi multis utatur auxilijs. Canis plerumq; flagrantissimis aestibus in rabiem effertur. Interdum quoties frigora incesferunt. Rabiosus autem, potum & escam auerfatur. Largam spumantemq; pituitam naribus & ore proijcit. Torue, et solito tristius intuetur. In omnes passim sine latratu irruit. Aequē feras, hominesq; tam familiares, q; ignotos mordet. Nec protinus infestum quicq; infligit, nisi ut uulnus dolorem. Exinde morbus ille, qui ab aquę metu Hydrophobicus graia est uoce appellatus, contrahitur. Euenit autē cum distentione neruorū, totiusq; corporis rubore, præsētim faciei, cum sudore & languore quodam. Aliqui aurę splendorē fugiunt. Alij sine ulla doloris intercapedine uexant. Sunt etiā qui canū more latratus ædant, interuenientesq; morfu adoriūtur, ac mordentes simili uitio labefaciunt. Nisi forsitan narratione unū, aut alterum euasisse audiamus. Siquidem Eudemus superasse quendā affirmat. Themisonem aliqui demorsum in idem uitium incidisse, & euasisse fatentur. Alij amico aquam expauescenti, morem gerentem, & officium exhibentem, quadam naturarum concordia similem subisse affectum: sed post multos tandem cruciatus, seruatum extitisse. Molestissimum itaq; genus morbi, a quo multos anteq; ipsum experirentur, uindicauimus. Et complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

E X M. V E R G. C O M M.

N Vmerātur ab antiquis græcorū medicis, præter dictas ab hoc scriptore plures alię rabidi Canis notę. Sitire scilicet tunc eos, non tamē bibaces esse. Quod Celsus libro. s. etiam in timente iam aquā homine testatur. Anhelos præterea, suspiriososq; & languidis flaccidisq; auribus uideri. Quinetiā, quod hic ait, sine latratu omnibus pariter insilire, copiosius illi explicat, docentq; muros tunc penitus, & ueluti insanos fieri: eosq; ut nec domesticos etiam noscant. Quod licet a Dioscoride constitutū etiam fuerit, cum inquit, sine latratu omnibus pariter insilire, bestijs, hominibusq; contubernales, & alienos mordere: nescio tamē, quomodo certius illud est. Occasionem sane obtulit, ut quod male inter notas timētis iam aquā hominis in Dioscoride legebatur *ἡ ἀπύρσις*, quā uocem alter interpretū, cum languore, alter, cū fastidio uertit, ad ignorantia huiusmodi nos transferremus: & quasi *ἀπύρσις* legi oporteret, cum sui, domesticorūq; ignorantia, uerteremus. Inter cætera enim quę docent græcorum grāmatici, significare aporian, *ἀγνορία*, id est, cognitionis priuatio est. Aniaaduertimus etiā, quo loco inane spa-

rium relictū, & uitij nota adiecta a nobis est, in male sequacis sermōis ductu deesse aliquid. Ab
 exceptione em̄ quod sequitur statim membrū principium habet: non ineleganti tantū, sed in-
 firmo penitus sensu. Oportuit enim prius constitui aliquid, unde quod sequitur, exciperetur.
 Quale autē id quondam fuerit, manifeste Paulus Aegineta indicauit, qui h̄sdem huic scriptori
 uer his eadem docens, cum eo produxisset rem, moneretq; iam & ipse accurrentes mordere ra-
 bientes homines, morsuq; suo suā in alios affectionem transferre, subiecit statim pleraq; alia,
 & inter cetera, τῶν δὲ κυνιδίων ὡς τὸ πάθος ἐνδύειν ἴσμεν περιεσφίγναι, καὶν ἔξ ἰσφίγας ἔχειν ἂν ἴδω. Quo-
 rum sensus est. Omnium uero qui in hanc affectionem deuenerint, nullum nos seruatum scimus,
 præterq; ex historia unum, duosue. Quæ si scriptori huic inferantur, apte spacium id totum ex-
 plebunt. Nos ea signamus, ut habeant uolentes, unde locum instaurare possint. Docent præ-
 terea idem græcorū medici, aliorū quidem accidentiū manifestam esse causam, occupatis scilicet
 ueneno illo partibus cunctis. Metum uero aquæ fieri aliqui eorū dixerunt, ex nimia siccita-
 te: quasi in contrariū habitum mutata penitus humida eorū substantia. Verū tamen Ruffus an-
 tiquæ medicinæ grauis auctor, insanīe ex atra bili genus id esse, testatus est, magna ueneni eius
 cum humore illo similitudine: nec secus q; atra bile insanīes scimus alios alia timere. Idq; sen-
 tire etiā uidentur, qui dicunt, Canis qui momorderit imaginem in aquis, opinari eos se uidere;
 eoq; metu territō aquā fugere, & auersari. Monent etiā, quoniam non statim rabidi Canis mor-
 sum sequitur metus aquæ, sed circa quadragesimā fere a morsu diem adest, & aliquando serius,
 opinātes aliquando homines non rabire Canem qui momorderit, festinata morsus cicatrice
 causam affectioni huic dedisse. Id ne fiat, docuerūt qua indicatione usus aliquis rabire, aut non
 rabire Canē intelligat. Iuglandis concidi nuces, diligenterq; his uulnus obstruere &
 circūligare. Mox sequenti die solutas & ablatas, gallinaceis in cibo apponi: & si his a princi-
 pio non pascantur, fame ad uescendū cogi: futurū enim superstitēs uiuāt, si nō rabierit Canis.
 Sin cōtra, postera die peribunt. Tuncq; ad uulneris dilataciōem festinandū. Iterumq; post pau-
 cos dies eadem indicatione utendū: & si non perierint gallinacei, tunc a periculo tutū uulnus
 ad cicatricem perducendū. Creditur indicationis huius auctor quondā fuisse Oribasius. No-
 lumus illud etiā relinquere, uideri nobis, quod hic ait, nullum a metu aquæ seruatum sciri. & c.
 credidisse aliquos de his intelligendum esse, qui non a rabido Cane, sed rabiente & aquā iam
 gimentē hominē mori fuerint. Hic tamē simpliciter tradidisse id uidetur.

Remedia demorsorum a Cane rabioso. CAP. II.
 Ratio medēdi duplex. Vna cōmunis, qua utendū in omnes mor-
 sus, quos uirulentæ animātes impresserunt. Alia peculiaris pri-
 uataq; eorum dumtaxat, quos rabiosi Canes momorderint. Quæ nōnul-
 lis quidem summā opem ferrē confueuit. Alijs uero inutilis, maxime qui
 ex multo iam tempore icū accēperunt. Quæ ad hanc pertinent, primū
 exponemus. Deinde cursim perstringemus, quæ ad cōmunem medendi
 rationē pertinent. Cancros itaq; fluuiatiles, cum sarmentis albæ uitis cre-
 mare oportet, & cinerem eorum q̄minutissime tritum habere reconditū.
 Itidem gentianæ radicem tusam, cribratamq; reponere. Quoties aut Ca-
 nis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos uini bina cineris can-
 crorum cochlearia, unumq; gentianæ consiciantur. Hæc in polentæ ma-
 defactæ modū subacta, quatrīduo bibantur. Inter principia medicamen-
 tum hoc modo detur. Atqui si ab illato morsu duo, aut tres dies fluxerit,
 curationem auspicabimur a triplicato pondere, supra id quod ab initio
 retulimus. Optimū hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium, quod
 & multis unum satisfecit, eoq; cum fiducia uti licet. Sed ut alijs etiam
 num auxilijs contra ineuitabile periculum muniamur, nihil ceteris uti
 prohibet. Satiū autem multo fuerit, medicamentorum sæuitiam tole-
 rare, q̄ propter negligentiam in discrimen adduci. Nec ita in demorsis

D I O S C O R I D I S

Ca rabioso animali maiora uulnera uereri oportet, uti minora, & ulcusculis cutis similia. Quippe maiori uulnere copiosus sanguis emanans, potest nonnihil uirulenti liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit. Quia a maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scapelli circumscribere, & præhensam hamo carnē amputare oportet. In utrisq; circumstantia loca altioribus ulcusculis scarificanda: ut sanguinis uacuatio resistat, ne uenenū membratim insinuetur. Cucurbitulæ cū multa flāma agglutinatæ id iuuamenti præstant, ut ueneni uis extrahatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Quos hiciubet, Vitis albæ sarmentis crematos simpliciter seruari fluuiales cancores, nec qua ratione seruandus per se eorum sit cinis monet: græcorum medici cremari quidem præcipue, sed in æneo cyprio uase, ut purus, & per se colligi cancorū cinis possit. Et quia forte ex eo ære medica uis aliqua contra canis rabiem esset. Ex ea enim insula in omnes medicinæ usus æs laudabatur. Relinquimus hoc capite etiam cogitandum, quod in eo instituitur remedium cancorum cineris cochlearia duo, gentianæ uero unum, meraci uini cyathis quatuor mixta a prima die usq; ad quartam bibenda esse: quotidie ne hac mensura bibenda ea sint: an ex quo quatuor cyathi uini sunt singulis diebus usq; ad quartā, bibendus cyathus unus tantū sit. Nobis in priorem illam rationem inclinatur animus. Credimusq; singulis diebus totam esse illam bibendam mensuram. Arbitrarium tamen legentibus id relinquimus.

De Vstione.

C A P. III.

Contra uirulentos ictus, Vstio expeditissimum est auxilium, utpote cum ignis cætera uiribus præster. Simul quod uirus domet, & ferri penitus non patitur: simul q; pars ignem experta, deinceps non uilem, nec indecoram loci instaurationem efficiat, manente diutius exulceratione. Animaduertendū ex eo tempore cum crustæ decident, ne ulcers oræ coalescant, & cicatrice induantur: sed si fieri potest, ad præfinitū tempus ulcerationes, & sordidas adhuc, & inflammationē minantes, pro rogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentū optime præstabit, & syluestre allium detritū. Item cape, succusq; præsertim cyrenaicus, aut qui medicus, aut parthicus appellatur. Tritici grana tam mansa, q; non mansa imponantur, siquidem subacta pistaue, ob perfusionem uulnera dilatant. Sunt qui a mandentium ieiunio sibi aliquid asserere arbitrentur, quod suapte natura resistat. Verumtamen id non constat. Cæterum tempestiue his utendum. Si uero, quod persæpe accidit, ante dies præfinitos cicatrices coirent, committerenturq; manum postulabunt. Namq; eas diducere, carnemq; scapello circinare, aut iterum inurere expediet. Vbi uero propositum tempus præterijt, ulcus ad cicatricem ducendum, & emplastro quod e salibus conficitur, locus comprehendendus. Nec multo post sinapismo utendum.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ de Aduisione toto hoc capite a Dioscoride præcipiuntur, a Nicandro longe prius instituta pariter fuerant. Versiculi eius in theriacis sunt, ἢ ῥαπόδιον ἢ ἀσπερίτην ῥαπόδιον, ἢ ῥαπόδιον καυκρῶς θαλάσσιαν ὑπὸ σφραγίδι καμίνων. Iubet & Columella septimo rei rusticæ suæ uolumine, capite undecimo contra rabidi Canis morsum uetere salsamento uti. Nihilq; non idem omnibus in eodem periculo remedium est.

Q De Ratiōe uictus in morſu rabioſi Canis. C A P. III. **A**
 Væ ad partem iſtam pertinent præſidia, ita ſe habent. Cæterū
 uictus rationē ex ijs quæ ueneno aduerſantur, coniectura quæ
 dam colligere oportet: ſimul ut ueneni uires hebetet, reſti
 guatq; ſimul ut arceat, quominus ad intima pernicies illabatur. Etenim
 aſſumpta, pernicioſarū uirium penetrationi reſiſtunt. Quorū utrumq;
 præſtare poteſt uini meracioris paſſi, & lactis potus. Quippe qui hæc
 oīa capiunt ad curā, non nihil ueneno obijciunt, quod omnē eiꝯ acris
 moniā obtundat. Simili modo alliorū, porrorū, caparumq; cibis: q; ea
 difficulter cōficiantur & aboleantur. Nam multos dies huiꝯ cibi quā
 litates remanent: quo tempore nec euincuntur, nec permutant a mortū
 fera ui. Cōtrariꝯ illa uis expugnatur. Cui rei antidotorū uſus accōmo
 datur, & theriaces, metridatij, & eiꝯ quod eupatorio temperat, deniq;
 omniū quæ magnā aromatum partē ſibi uendicant. Quippe aromata
 omnia uiribus & ſubſtantia ægre permutantur. Quare in corporibus
 euincunt. Victus ratio hoc modo ſe habet. Noſſe conuenit, pauorem
 aquæ nō ſtato, definitoq; tempore exoriri. Plurimū tamē ad quadrage
 ſimū uſq; diem neglectis deferri cōſueuit. Poſt ſemestre etiā nonnullos
 inuadit. Quendā poſt annū aquā horruiffe, nobis præſertim cōpertū
 eſt. Narrant & aliquos poſt ſeptenniū aquæ metu fuiſſe tentatos. Inter **B**
 principia demorſorū a Cane rabioſo curandi ratio talis eſt. Verūenim
 uero ſi ea quæ retulimus auxilia primis diebus prætermiſſa fuerint, nec
 ſcalpro carnē circūare, nec uſtionē experiri operæ precii eſt. Non em̄
 quod iam p̄tranſit ſatis euocare poſſent. Nulla utiq; adiectionis utili
 tas, ſed in caſſum corpora doloribus ſternentur. Alter uero curationis
 modus accedat. Deiection magnū præbet iuuamentū: utpote cū mouen
 do, corporis habitū traſmutet. Et quæ colocynthidē recipit hiera, item
 lac ſciſtum quod ſimul deiectionē moueat, & uenenum domare poſſit.
 Cibi acres, & meraculi potus, quibus uis ueneni uehementer retundit
 tur, quotidie ſumi debent. Cæterū ſudores ante cibos, & poſt etiā cien
 di. Dropaciſimi, ſinapiſmiq; particulatim per corpus totum adijciendi.
 Sed longe omniū efficaciffimum auxilium, Elleboriſmus cognoscitur,
 quo cum fiducia nō ſemel atq; iterū, ſed frequentius ante quadageſi
 mum, uel poſt hoc tempus uti licet. Tantam em̄ uehementiā hoc auxi
 lium habere fertur, ut quidā qui iam aquæ metū ſentirent, ſumpto El
 leboro, ſimulac primum morbi impetum experirentur, fuerint ſeruati.
 Nam & iam uitio tentatos neq; parū adiuuare poteſt. Itaq; primū cu
 ram contra rabioſi Canis morſus, breui ſermone expoſuiſimus. Iam ad
 alia quæ uenenatis morſibus ſauire conſueuerunt, tranſeundum. No
 tas uno prætextu, deinde cōmunem medendi modū, qui omnibus con
 uenire poſſit, explicabimus. Curſim poſtremo ſubiungemus ea, quæ
 Oo

D I O S C O R I D I S

C sua proprietate nonnullis auxilium præstare possunt. Subnectemus etiam uenenata quæ nullis cedunt remedijs.

¶ Finis LIB. Septimi.

P E D A C I I

D I O S C O R I D I S

De notis eorum qui a uenenatis de-
morſi sunt, LIB. Octauus,
IO. R V E L L I O interprete.

¶ De Phalangijs. CAP. I.



φαλαγγίη

Emorſis a Phalangijs, locus quidē ipſe, quaſi ab
impacto aculeo rubet, non intumeſcens, nec p am
bitum calidus, ſed mediocriter ſubrubens. Vbi uero contrariorum oc-
curſu refrixit, cōſequit corpore toto tremor, diſtentiones circa poplites et
inguina, cōuulſionib. nō diſſimiles. In lūbis collectio exoritur. Perpetua
D urinæ libido laceſſit, multaq; reddēdis excremētis colluctatio. Vniuerſa
cute frigidus ſudor emanat. Collachrymāt oculi, offuſiſq; nebulis caligāt

¶ De Scolopendra. CAP. II.

σκολοπένδρα

SI Scolopēdra, aut dicta Ophioctene morſum intulit, locus per am
bitū liuore ſugillat & cōputreſcit, interdumq; licet raro, ſeculētus
atq; ruber cernit. A morſu ipſo exulcerari locus incipit. Vlcus id negoci-
um exhibet, ſere remedijs inuictū. Præterea toto corpore prurigo ſenti-
tur.

EX M. V E R G. C O M M.

Habet mare Scolopendras: de quibus ſecundo uolumine ab hoc, & a nobis longius actū
eſt. Habet & terra: uerum multiplices, nec eiufdem formæ, maleficiq; omnes. Eam ob cauſam
hic inter uenenata tantum numerat. Quæ quondam ab enecandis anguib. Ophioctene priua-
tim dicebatur. Notū omnibus Scolopendarum genus: priuatim tamen incognita nobis Ophi-
oetene, quam unam in eo genere ueneni maleficium habere hic oſtendere uidetur. Etſi poſterio-
res græci marinæ etiam huiufcemodi uim aliquam assignarint, diſcreuerintq; utriuſq; morſus
notas: a marinæ dicentes tumorem aliquando fieri pellucidum, & aque ſimilem: a terreſtri ue-
ro rubentem: quam hic tñ propoſuiſſe credi debet, nec niſi de terreſtri monuiſſe. Addiderūt ue-
teres græci aliqd, nec tñ morſus eius liueſcere, ſed tumere, & extolli etiā locū tradiderunt.

¶ De Scorpione. CAP. III.

σκόρπιον

SCorpionis morſu inflammari ſtatim incipit locus, & indureſcit, ac
intentus rubet, uiciſſimq; dolore premitur. Modo ſiquidem exæ-
ſtuat, modo frigore occupatur, labor repente fatigat: aliquando melius-
cule habet, aliquando recrudescit. Conſequitur ſudor, horro-
ris ſenſus, & tremor. Extremæ corporis partes refrigeſcunt. Inguina extolluntur.
Tubercula in ſede proſiliunt. Capilli eriguntur. Pallor membra decolo-
rat. Dolor tanq; ex pungente acu, per uniuerſam cutem ſentitur.

De Pastinaca marina.

CAP. IIII.

A

Si marina Pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assiduæ conuulsiones, labor, & imbecillitas. Mens percussis labat. Postea obmutescunt. Oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum uicinis partibus denigratur, & ita obstupefcit, ut tangentem non sentiat. Hunc si quis premat, atra sanies, crassa & male olens excernitur.

EX M. VERG. COMM.

Non adeo uenenæ maleficio infamæ marina Pastinaca est, ut non eadem naturæ & morbis aliquando utilis, suas ab hoc ipso scriptore laudes secundo uolumine inuenerit. Eas, omnemque eius historiam poterunt uolentes illinc, & ab alijs de natura animalium scriptoribus facile audire. Græcorum medici nullas ex morfu eius notas descripserunt: quoniam non posset piscis quod possunt uenenata alia latere, sed ex morfu eius statim mali causa omnis pateret.

De Mure araneo.

CAP. V.

AMure araneo percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraq; pustula diluta sanie turgens exurgit. Proximæ partes liuent. Rupta pustula, deuorans ulcus, non ei dissimile quod serpit occupat. Intestinorum quoque tormina, difficultas urinæ, et humoris offusio consequuntur.

EX M. VERG. COMM.

Addiderunt ueteres græcorum medici Muris aranei morfibz, quæ ab hoc scriptore non dicuntur has etiam notas. Dolores, qui pulsuum modo per interualla pulsant: & in singulis dentium eius animalis ictibus rubores: disruptam præterea pustulam illam candidum ostendere ulcus: nec solum propinqua depasci loca, sed corruptas etiam decidere ex his locis partes. Erant de araneo Mure dicenda multa quæ ueteres tradiderunt, nisi quæ satis esse possint secundo uolumine dicta a nobis iam pridem fuissent.

De Vipera.

CAP. VI.

Si Vipera momordit, corpus intumet, uehementer arefcit, subalbuginis dumque colorem concipit. Sanies a uulnere profunditur, suppurat, mox cruenta. Pustulæ adustis similes erumpunt, & antea depascens ulcus, quod in proxima repens non summa modo corporis, sed intima quoque corripit. Gingiuæ ipsæ cruore suffunduntur. Inflammatio circa iecur erumpit. Tormina & biliosi uomitus sequuntur. Sopor, & urinæ difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur.

EX M. VERG. COMM.

Fieri in Vipere morfu præter numerata a Dioscoridis, græcorum medici hæc etiam dixerunt. Dolores a principio in morfu ipso: mox toto corpore etiam: uiderique in morfu exiguo spacio inter se distantia exigua duo foramina: fluereque primum ex his sanguinem, & aquosum humorem: tum oleosum tantum humorem: postremo uiridi æruginis colore, quod Viperae uenenum aliquem se crediderunt. Tumoribus præterea, quos hic numerat, liuores illi addiderunt: rubores itidem, oculorum uertigines, stomachi resolutiones, & animæ defectus. Cuncta hæc tamen illi πρὸς ἰχθυὶν, & ἰχθυὶν tradiderunt, non satis certa nobis indicatione, duo ne illi serpentium genera, an unum tantum duobus nominibus indicent. Nobis, quatenus obseruauimus in scriptoribus alijs, non uidentur differre Echis, & Echidna: duplexque unius animalis potius nomen quam duorum duo esse uidentur. Paulus Aegineta duo manifeste genera constituit. Inquit enim, αἰνιδνῶσις ἢ δολοῦς ἢ ἀπαλλᾶτις ἢ ἀνχίντις ὑπὸ ἰχθυὶν ἢ ἰχθυῶν. Quod est. Minore autem periculo euadere creduntur qui ab Echidna, quam qui ab Echi morfu fuerint, Ceteri tamen, ut diximus, duo hæc genera

Oo

D I O S C O R I D I S

C miscent, præsertimque latini, Viperam utriusque appellantes: tanta est similitudo, tamque in cunctis con-
gener earum natura. Barbarus inter pestis huius notas, *καρπον* ab hoc scriptore fieri dictum, ca-
pitis grauitatem interpretatus est. Cum tamen ad soporem, ut sæpe alias testati sumus, ea uox
tantum in grecis pertineat. Alter ne bis de uomitu ageret, tremores reliquit; nesciens *καρπον* cor-
ruptam illic uocem, *τρομον* legi oportere: quod meliores greci omnes indicant.

στυτάλη
ἀμφισβῆνα

De Amphisbæna. CAP. VII.

C onsimilia eueniunt ijs qui ab Scytala nomine, aut Amphisbæ-
na demorsi sunt. Eademque fere auxiliantur. Quare hoc uenenū
priuatam descriptionem sortitum non est, quæ non eidem generi as-
signandum sit.

EX M. VERG. COMM.

D iuersa duo hæc animalia sunt. Indicant id Lucanus poeta in. 9. omnesque alij. Eapropter cum
male in scriptore hoc locus hic legere, coniungerentque simul Scytale, & Amphisbæna, quasi
duplex unius tantum nomen esset, hos & rei ipsius, & aliorum scriptorū auxilio, locum in in-
tegrum restituiimus.

ἀφρίνο

De Druino. CAP. VIII.

A druino morsis pustulæ, molestique dolores incidunt, præsertim
qua dilutæ saniei emissarium subest. Quinetiam erosio, tormi-
naque consequuntur.

EX M. VERG. COMM.

L ibet ex Paulo Aegineta addere quæ cum maleficio suo hanc pestem certius aperiant. Eius
de Dryino uerba hæc sunt. In radicibus Quercus, a qua arbore nomen inuenit, uitam Dryinus
agit: tam malefica, parataque ad nocendum ui, ut calcatus tantum cute nudos hominis pedes re-
linquat, totisque cruribus tumorem faciat. Ferunt præterea, quod magis mirentur omnes, nuda-
ri cute manus pariter eorum, qui curationem eius tractauerint: & si quis interfecerit, male olere
bestiolam, suoque illo odore omnium aliorum odorū sensum auferre. Inter notas morsus eius,
numerauit idem Paulus, etiam cum rubore circa morsus locum tumore fieri. Desyderauimus
& nos Dryini morsus notas uertentes, qua parte corporis erosiones illæ fiant: uerbi causa, sto-
machi, aut alterius cuiuspiam in homine partis. Nobis in stomachum inclinat animus: sed in
nullo grecorum ea uox inuenta a nobis est.

ἡμorrhόος

De Hæmorrhoo. CAP. IX.

A B Hæmorrhoo ictus uehementes cruciatus accidunt, qui breuē
strigofamque prorsus raritatē ex continuo dolore præbent. Ex
plaga copiosus cruor effluit. Et si qua cicatrix corpore nonnullo adfue-
rit, frangetur, & sanguine manabit. Excrementa per aluum cruenta eij-
ciuntur. Profluensque sanguis in globos coit. A pulmone sanguinem ex-
tussunt, & nullo denique remedio euomunt.

EX M. VERG. COMM.

F oeminino genere nono sui carminis uolumine Lucanus serpentem hanc Hæmorrhoidem
dixit: descripsi: longissime cunctis eius euentibus, miserabile omnibus Romani militis mor-
tem fecit. Nos præterea in alijs de Hæmorrhoo hoc tradidimus. Eamque ob causam reliqua nunc
omni eius historia, quæ etiam ex eo poeta repeti potest, monemus, uideri nobis in hoc capite
male legi locum cui uicij notam adiecimus, & in quo discrepant a nobis reliqui interpretes: ide-
oque relinquere peritioribus instaurandum quod in eo uarie legitur, ex dolorum continuitate
breuia, angustaque reddi corpora. Alij enim id totū aliter reddiderunt. Nos cōmuniorem secuti
lectionem eo quo legitur modo uertimus. Et quem reliquit Barbarus sanguinem, quoniam in
Dioscoride non legerat, ex alijs grecorum scriptoribus reddidimus. Ille enim e loco ictus mul-
tum externi liquorem tantum ait, nulla eius liquoris indicatione: cum tamen sanguinis ea sit,
& sic in melioribus adhuc legatur.

¶ De Dipsade. CAP. X.

QVos Dipsas percussit, intolerabilis ardor premit, Sitisq; usq; A
 eo pertinax, ut satiari non possit, ac sine ulla intercapedine ex-
 cruciet. Et si potum affatim trahant, ilico in eandem sitim re-
 labuntur. Iis uero qui per initia potum nō hauserunt, simile quiddam
 prorsus accidit. Quare propter cōtinuam sitim, & Prester, & Causon,
 aut Psas appellatur.

¶ De Hydro. CAP. XI.

AB Hydro demorsis ulcus dilatatur, & liuidum ac ingens eua-
 dit. Sanies ex eo multa & atra & male olens, non secus atq; ijs
 quæ serpunt ulceribus expuitur.

EX M. VERG. COMM.

AB aquis græci Hydron, Romani a natatu, qui tutus in eō elemento terrestrium animalium
 mōtus est, Natricem nominauerunt. Pulcherrimum hoc anguim genus, qd in aqua uiuit nul-
 lis serpētū ueneno inferius aut ignauius. Ex quo Romanus Cæsar, turpis & malefici ingenij ho-
 minem, Natricem se Populo Romano nominis & imperij sui hæredem alere lamentabatur.

¶ De Cenchro. CAP. XII.

Cenchri morsum, qui uiperino ictui similis est, putridū ulcus se-
 quitur. Carnes antea ut in aqua inter cutem prætumide, deflu-
 unt. Letargo corripuntur, et ueterno pressi, somnos captant. Erasistra-
 tus eos iocinere, uesica, colocq; conflictari autor est. Quippe dissectis i-
 psis, omnes fere partes corruptæ reperiantur.

EX M. VERG. COMM.

Puribus hic maculis uariata tingit aluū, ut Lucanus cecinit. Quæ qm Milij seminibus simi-
 les sunt, quam frugem græci cenchron uocant, nomen serpenti hoc fecerunt. Plura quo dixi-
 mus loco poeta ille de serpente hac egit, quæ poterunt uolentes ab eo audire.

¶ De Ceraſte. CAP. XIII.

ACeraſte percussis locus attollitur, cum duricia pustulosus. E pla-
 ga sanies profluit, modo atra, modo pallidior, sed circa concre-
 mentum totum rutileſcit, genitale intenditur, mens labat, oculorum ca-
 ligo exoritur, deniq; rigore neruorum distenti commoriuntur.

EX M. VERG. COMM.

Habet Ceraſtes hic cornu figura callosam in fronte carunculam, unde illi nomen factū est.
 Cornu enim ceras, græci uocant. Diuerſus hic ab his uermibus est quos Plinius in Coſſorum
 genere in arboribus naſci tradit: & Ceraſtas pariter appellat. Sunt Dioſco. & græcorum medi-
 cis, præſertimq; Paulo Aegmetæ de Ceraſte hoc omnia eadem: præterq; ubi hic *uipoides* fieri, et c.
 quod interpretes aliq ad colorem ſimpliciter contraxerunt, rutileſcere & ruſſeſcere dicētes. Nos
uipoides in alijs legentes, eorum ſententiam potius ſecuti, uaricum mōdo timere totum cor-
 pus his diximus. Id enim magis placuit, cæteris notis magis congruere uiſum. Tument enī
 uarices, quam in hac peſte præcipuam notam hic numerauit.

¶ De Aſpide. CAP. XIII.

AB Aſpide ictis, uulnus exiguum prorsus, quaſi ab adaſta acu ci-
 tra eleuationē conſpicit̃. Sanguis exiguus ille qdem, ſed ater de-
 ſtillat. Caligo uelox oculos obnubit. Labor in totū corpus multiplex,
 omnino leuis, & nō ſine uoluptate cōſequit̃. Ideo Nicāder perpulchre
 cecinit. At uir perit abſq; labore, diſcolor, atq; uirēs. Aliquātulus cordis

D I O S C O R I D I S

Cæstus afficit. Frons ppetuo reuellitur. Genæ cōtemiscūt, quasi sine sensu in somno uacillent. Hos mors tollit ad diei trientē non dilata.

EX M. VERG. COMM.

Tria Galenus Aspidum genera esse testatur: numeratq; primum eius quam Chersæam uocant; mox eam quæ Chelidonia dicta est; tertiam postremo quam Ptyada nominauerunt. In omnium nominibus naturæ earum indicatio & nota aliqua est: sed nulla certior, & quam solam cognouisse nunc satis sit Ptyade illa, quæ omnium perniciosissima est. Siquidem erecto in anteriorem partem collo, ex intervallo quod satis ea fore coniecerit, uenenum in hominem iaculatur, eoq; nihil aliquando huiusmodi timentem, & incautum conspuens perimit. Et quoniam græcis ptyin, expuere sit, ideo Ptyada eam nominauerunt. Ex hoc genere ferunt Aegypti reginam Cleopatram, cum deuicto Antonio Augustum uictorem timeret, sinistræ mammæ admouisse, morsuq; eius seruitutem, & uictoris triumphalem pompam euasisse.

De Basilisco. CAP. XV.

Erasistratus in libro quem de medicaminibus & uenenis condidit, de uocato Basilisco scite ita refert. Cum Basiliscus momorderit, uulnus ad auri colorem exflauescit. Itaq; in plurimis quæ uirus eiā culantur, comites notæ ita se habent. Transeuntes utiq; ad medendi rationem, primum, ut fieri poterit, de communibus differemus.

EX M. VERG. COMM.

DAro, ut græcorum scriptores retulerunt, uidetur Basiliscus: totius ideo historiæ eius fidē penes autores hic esse uoluit. Eo enim pertinet quod Diosc. inquit in cōmentario de uenenis & remedijs, Erasistratum de Basilisco testatum fuisse: cum momorderit, sufflauo, & quasi aureo colore plagam fieri. &c. Vidisse tamen eum eos oportuit, qui traiectam per caput eius diadematis figura, candidam lineam contemplati, Regulum ob eam causam nominauerunt. Lucanus nihil de Basilisco aliud inquit, q̃ Sibilaq; effundens cunctas terrentia pestes, Ante uenena nocens late sibi summo uet omne Vulgus, & in media regnat Basiliscus harena. Quod Plinius 29. uolumine, cap. 3. cōfirmauit dicens. Basilisci, quē etiā serpentes ipsi fugiunt, alios olfactu necantē: qui hominē uel si aspiciat tātum dicē interimere. &c. Veneni eius penetrālē per oīa uim, non multo post idem poeta descripsit. Quod totum poterunt uolentes in eo uidere.

Cōmunis curatio in oēs ictus uirulentos. CAP. XVI.

ADuersus quidem omnem animalis ictum, quod uenenum uibrat, oris succio conuenit. Sugentem uero oportet ieiunum nō esse, sed & cibum sumpsisse, & uino os abluisse. Postea exiguum olei in ore continens ictum exugat. Locus ipse spongia fouendus. Deinde scarificandus. Sed ulcuscula altius imprimere expedit: quo uirosa materies profundo euocetur. Circinatio autē carnis, & sectio, scarificatione longe potentius opitulant. Namq; ab ijs duo peculiaria p̃sidia fiunt. Vnū, q̃ uirus e loco tollitur. Alterum, q̃ ante occurrens q̃ interna subeat, cū sanguine copioso excernit. Quod si locus carnis circūscriptionē nō admittat, cucurbitulæ cum largiori flāmā adfigendę sunt. Sed iā de uisitatione supra in rabiosorum morfu differuimus. Si uero icta pars, utpote extrema, sectionē cōmode nō respuat, p̃sertim in omnibus serpētibus, ut aspide, cerasse, & similibus, p̃culdubio amputanda est. Conuenientiora supradictis auxilia sunt quę Epithemata uocant. Imponat sarmēticius cinis, aut ficulnus, cum lixiuio, subacta stacte, garo, & acri salsamento. Porri, cepe, & allia mō minutissime cōtrita illinunt, mō cremata uul-

neribus inſciunt. Quinetiā difſecti gallinarū pulli cū maxime tepent, **A**
 percuffo loco conuoluunt. Nec defunt q̄ hiſce tanq̄ diſcordia quadam
 naturali pugnantibus utant. Verū huius rationē inire facillimū fuerit.
 Gallinē em̄ calida natura p̄dita ſunt: argumēto, q̄ deuorati inſigne ui-
 rus eliquēt, & aridiſſima quęq̄ ſemina conſumāt. Itē nōnunq̄ harenas,
 lapilloſq̄, q̄s faucibus inſinuarint, diſſoluunt. Itaq̄ animātis calore, ſpūs
 ic̄te partis impetū capēſcēs, uenenū exigit. Nec me fugit, qd̄ i aegypto fi-
 eri ſoleat. Cū ſpicas Aegyptij metūt, ollā picis paratā habent, et appen-
 ſam faciā. Tunc em̄ maxime ſerpentiū iniurias expaueſcūt, tum p̄pter
 ſpicilegij tempus, tū q̄ opacis ſimul abdite ſpeluncis, & cauernis, denſo
 q̄ aruorum cespite deliteſcunt. Moleſtiora em̄ animalia, et uirus eructā-
 tia Aegyptus in campis ferre conſueuit. Vbi ergo aut in pedē, aut par-
 tem aliā morſum intulerunt, aſſidentes, faciā in ollam picis conijciūt,
 & ſemel, aut iterum brachiū, aut crus paulum ſupra uulnus obligāt, &
 arctiſſime duo e p̄ſentibus diſtringūt: locūq̄ ſecantes qua circūactus
 eſt laqueus, picē inſtillant. Cūq̄ ſatis uulnus excepiſſe uidet, laqueū re-
 ſoluunt, et cepiſ, aliſq̄ ſupra memoratis illiniunt. P̄terea pix liq̄da cū
 ſale trito et ſeruēte illita, p̄ſentanco eſt auxilio, ſi iugiter innouet. Con-
 uenit et cedrus, & fimū caprarū ex uino decoctū. Locū aceto calido, **B**
 lamintha in lotio, maris aqua, aut acida muria decocta, foueri ſalutare
 eſt. Quinetiā nō defunt emplaſtra uehementiſſima, & calidiſſima, quæ
 uenenum elicere, expugnare & diſcutere poſſunt. Cuiuſmodi ſunt quę
 ex ſale, aut nitro, ſinapi, & ſemine roriſmarini componuntur. De qui-
 bus conſequenter erit tractandum. Eraſiſtratus aut nō iniuſta reprehē-
 ſione eos inceſſit, q̄ incognitas ad hunc uſum facultates conſcripſerūt:
 ut elephanti fel, teſtudinis ſanguinē, aut crocodili oua, & cōſimilia. Nā
 cū iuuantia quēdā literis tradidiſſe uident, plane in hęc ſola incidenti-
 bus impoſuerunt. Quare talia deuitanda ſunt: cū difficile, niſi regia fa-
 cultate, perueſtigari poſſint: neq̄ quo noſtra fides n̄s obſtringatur, fre-
 quēti obſeruatiōe ſufficiēs expimentū p̄ſtiterint. Quæ aut ad cōmunē
 omniū uſum p̄tinēt, quęq̄ facile ſuppeditari, & omnibus a ſerpente p̄-
 cuſſis auxiliū ferre queūt, ſubiungēda uident. Intubus itaq̄, & Erica, &
 Aſtragalus cū aceto potus, contra oēs ſerpentiū morſus auxiliant. Itē Bi-
 tumē, et uirētes Platani pillulę in uino diluto coctę, & Paliuri decoctū,
 radix Ariſtolochie, et Eringij. Decoctę etiam Lauri bacę, et deuoratę,
 Piperę largius eſtatū, Ruta, Anetū, et Cyclaminus. Coma porrorū pri-
 uatū ex panē, aut allii, aut cepe, ſaſamētacę q̄ acerrima, origani decoctū
 cū uino potū, ſoeniculi, pulegij, calamithę porrorūq̄ ſuccus cū melle de-
 ſorptus. Hęc qdē a plātis congrunt. Ab animātibus uero quēdā cōmo-
 de peti ſolēt. Gallinaceorū cerebella in cibo, leporinū coagulū cū uino,
 Itidē caſtorij ſextās. Teſtes marinę teſtudinis ſumpti, multū p̄deſſe tra-

C dunt. Mustella sale inueterata inter auxiliaria medicamenta est. Inuenitur etiam prius exenterata, saleq; siccescens inueteratur: ex aqua binas drachmas cum uino bibisse satis est. Sed de simplicibus quæ dari solent hæcenus. Percussis a serpente prodest alui deiection, diffuens sudor, urina copiose reddita. Composita etiã quædam recenter remedia polliceri traduntur. Vtopij, & myrrhæ singuli oboli, piperis quicunx. Ea melle excipiuntur, & instar ægyptiæ fabæ dantur. Itidem syluestris rutæ seminis, gith, cumini æthiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum pares portiones tritæ, & cum cruce succo subactæ, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquent. Dantur ex ijs terni cyathi cum uino. Hæc habui de cõmunibus auxilijs quæ dicerem. De peculiaribus remedijs cõtra bestias quæ uenena uiibrant, consequenter est dicendum.

EX M. VERG. COMM.

C Opiofiores, certioresq; in cõmunibus his contra uenenata remedijs posteriores græcorum medici fuerunt. Neq; iñmerito, accrescentibus arti quotidie nouis eorum experientijs. Quas deinceps obseruantes, qui salutis humanæ diligentius consulere, monuerunt, non esse cucurbitulis simpliciter utendum, sed anteq; uulneri admoveantur, propinquas confodiendas esse partes: ut pluribus quasi canalibus una cum sanguine & spiritu uenenum foras trahatur. Addiderunt præterea, in repleto hominis corpore, secta uena mittendum esse sanguinem: quod nullibi a scriptore hoc præcipitur. Et in aduocandis moribus, aut ictibus uenenatorum, dissectis galinaceis, cæteris omnibus mares anteposuerunt. Deficientibusq; his, ne quid ad faciendam homini medicinam deesset, dissecta eodem modo, & ad mota animalia alia in eum usum receperunt. Aliam a Dioscoride causam reddentes: q; scilicet uenenum in se trahunt, & dolores leuāt. Quinetiam uri locum, & ignis crusta uulneri induci iusserūt. Quod in scriptore hoc tm signat, cū de adustione dictū a se fuisse ait. Pluraq; alia, quæ longius poterunt uolentes ab eis audire.

¶ Finis. LIB. Octauus.

PEDACII

D I O S C O R I D I S



Cõtra Venenatos morsus LIB. Nonus,
IO. RVELLIO interprete.

N I H I L inter ferientium uenenatorū notas de Vespis, et Apibus articulatum digessimus: q; conspicuū omnibus forēt, & nihil excellens, aut notatu dignū in his obseruaretur: inter remedia tam earum meminisse non fuit alienum.

A ¶ De Remedijs cõtra Vespārū, Apūq; ictus. CAP. I.
Duersus Apū, Vespārūq; ictus, prodest illita malua, & hordeacea farina cū aceto, ficulneum lac in uulnus instillatum, a muria, aut maris aqua forus.

EX M. VERG. COMM.

Q Væneglexit Diosc. Apū & Vespārū ictus, notas & signa posteriores exceperunt. Ab Apis ictu dicētes statim sentiri dolorē, rubere locū, tumere, ppinquas & incescere partes, spi

cultūq; in uulnere relinqui. In Vespis deinde eadem, sed intensiora omnia: nec relinqui spiculū. Addiderūtq; in remedijs, lutū, & bubulum finū, quibus illeuisse ictus utile sit: & pter hæc con-
cisa, & posita mori arboris folia. Relinqui aut ab Apibus in ictu spiculū Aristoteles, i. de anima
liū historia, & Nicander in Theriacis suis testant: suoq; illo telo castratas perire.

De ictu a Phalangio.

CAP. II.

Phalangiorū ictibus ficulneū cinerem, adiecto sale trito & uino im-
ponere oportet, aut radicem sylvestris punici tēnuissime tritā,
aut aristolochiā hordei farina & aceto subactam. Vlcera aqua maris pro-
luenda, aut apiastri decocto. Folia eiusdem illinenda. Lauacris perpetim
utendū, & potionibus quæ hæc medicamēta recipiant, abrotoni semen,
anifum, aristolochiam, cicer sylvestre, cuminū æthiopicum, cedrides tri-
as, platani corticem, & trifoliæ hærbæ semen. Priuatim aut singulorum
ex ijs binas drachmas dare cum uini hemina conuenit. Item myricæ fru-
ctus, & chamæpityos, & uiridiū cupressi pillularū decoctum, ammisto ui-
no. Sunt qui fluuiatilem cancrū in succum redactū, cum aqua, aut lacte,
assumpto apij semine confestim molestijs liberare prodant.

EX M. VERG. COMM.

Sunt in græcis nec reprobandæ fidei codices, in quibus non Aniso, sed Anetho contra Pha-
langiorum morsus pugnatur. Nos tamen eiusdem scriptoris huius decreta in Aniso secuti,
quod utile his quæ uenenum ictu, aut morsu relinquunt, ab eo dictum est, Anifum, ut in com-
muni lectione erat, reddidimus.

De morfu Scolopendræ.

CAP. III.

Si Scolopendra morsum infixit, sal tēnuissime tritus ex aceto uulne-
ri inspargendus, aut ruta sylvestris superponenda. Locus acida mu-
ria perluendus. Danda in potu aristolochia cum uino, aut serpillum, aut
calamintha, aut ruta sylvestris.

EX M. VERG. COMM.

Adicerunt remedijs his ueteres græcorum medici pleraq; alia. Cinerem aceto macera-
tum, aut scyllam uulneri iubentes imponi. Quodq; hic iubet, oxhalmi fotiendum esse locum,
auctore Archigene antiquissimo medico, calido oleo fieri aliqui instituerūt. In potionibus eti-
am asphodeli radice usi sunt.

Remedia ad Scorpionis ictum.

CAP. IIII.

Percussis a Scorpione, præsentis est auxilio ficulnum lac in uulnus
instillatum. Scorpis ipse qui ictum uibrauit, tritus, & percusso
loco impositus, suæ plagæ remedium est: ob quandam, ut constat discor-
diam. Præterea tritus, & impositus cum sale, lini semine, & althæa conue-
nit. Sulphur ignem non expertum, resina terebinthina exceptum, & em-
plastri modo adiectum, auxiliatur. Eidem galbanum ad splenij formam
ductum, & calamintha, quæ trita illinatur. Et farina hordei in uino para-
ta, in decocto rutæ. Semen trifoliæ hærbæ tritum, & uulneri iniectum, o-
pitulatur. Hæc ad affectum locū pertinent. Post hæc tēnuissimis po-
tionibus utendum: cuiusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis binæ
drachmæ cum uino. Tusa gentiana, & pulegiū decoctum, & bacca lauri
paucō numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua magnopere disco-
qui debet. Cupressus cum uino, & ruta. Nec secus ficulneum lac, la serpi-

D I O S C O R I D I S

C tium si adsit: sin defyderetur, peucedani succo utendum. Efficax est potus trifolij succus, & ocimi semē. Omnibus autem ijs perpetuus lauacri usus, euocatus sudor, & diluta uini potiones regifstrum.

E X M. V E R G. C O M M.

Non poterat sine græcorū latinorumq; scriptorū aliquot ope integra huic scriptori Scorpionū morsus curatio nunc esse: tam longe ab antiquæ lectionis ueritate deuia, parum diligentes græcorū librarij tam fecerant: pro parthico lasere, peucedanū: & pro cyperide, cupressum modo nobis ostendentes. Id cæteri interpretes, aut in extremo opere festinantes, aut scorpionum iniurias parū timentes, qualia in impresso scriptoris huius codice omnia legebātur, talia etiam uerterūt. Cum tamē utriq; facillimū fuisset; & si græcorū medicos, præsertimq; Paulum Aeginetam nunq; antea legissent, ex Plinio locum emendare: qui, in uolumine, capite, is. de Cypero agens, inquit, Cypero uis in medicina, &c. pauloq; post. Radix aduersus serpentium ictus, & scorpionum præsertim remedio est. Aut si ex Plinio id etiam agere noluisse, in scriptore hoc saltem meminisse debuerāt, contra scorpionum ictus Cyperi radicem præcipue lau dari. Sed omnium aliorum certissimus instaurandi eius loci auctor Paulus Aegineta illis fuisse, Cyperide contra scorpionum ictus manifeste utens. Debuerat & illud homines monere, nihil huiuscemodi cupressu, aut ab hoc, aut ab alijs tribui. Eodemq; modo pro Peucedano, cui nulla contra scorpiones uis est, parthicum laserpiciū mutare. Quod hic ipse scriptor contra uenena omnia in Silphio laudauit, id alter ex eis melioris codicis, quem ipsi etiam uidimus, ope adiutus, animaduertit, & felicius uertit. Sed certius totam & ipse scorpionum rem absol uisset, si eundem Paulum Aeginetam libro, s. de his agentem diligentius audisset. Sunt enim in reliquo capite pleraq; alia, quæ ab eo, & ab altero parum apte uersa fuerunt: quæ nos bre uitati consulentes, relinquimus. Multoq; magis, ut quæ addiderunt, mutaueruntue in his po sterioribus græcorum medici, breuiter dicamus: quæ huiuscemodi sunt. Althea, quæ hibiscus est, simpliciter hic uti iubet. Respondetq; hoc decretis ab eo in ea herba: in qua testatus est, Al theæ folia uenenatorum moribus, & ambustis mederi. Illi autem semini has tribuerunt uires. Et quas hic iubet sumi pauciores lauri baccas, illi decem tantū decernunt. Quinetiam, argenti laminā uulnere impositam, egregie prodesse testantur. Bibendum præterea Sulphur uiuum in uino additis piperis granis octo. Laseric liquorem cum tritis cancris, Nigellæ, & Aethiopici Cymini, & Vitis semen, cunctaq; æquali pondere cum uino iubent.

D

Aduersus marinæ Pastinacæ, Scorpj marini, & Draconis ictus. C A P. V.

El qui a marina Pastinaca icitur, omnia quæ de Viperarū morsu paulo post referemus, simili modo conueniunt. Peculiariter autem ictus a marino Scorpione, & Dracone inferuntur, qui molestos cruciatus ci ent. Interdum autem, sed raro nomas excitant. Quibus absinthij, saluicæ, aut sulfuris ex aceto triti potio subuenit. Pastinaca diuulsa, & uulnere imposita, sui ictus medela est.

E X M. V E R G. C O M M.

Venenis ex mari addidit hoc loco Dioscorides Draconem, & Scorpionem, nullis tamen de scriptis antea eorum maleficijs notis & signis. Quod quare factum ab eo sit, non facile est conij cere. Nisi forte, quia alia piscium q̃ terrestrium ratio sit: possuntq; terrestria fallere incautos, marina autem nisi in aperto nocere homini nequeunt, ideo relicta a scriptore hoc illa fuerint. Si quidem posteriores græcorum medici, & ipsi nihil huiuscemodi addiderunt. In remedijs ta men copiosiores præter ab hoc scriptore dicta præceperunt, plumbo confricandum esse ma rini Draconis ictum, Triti serpilli, aut elixa lente, aut uiuo sulphure obstruendum locum: eundemq; hois urina fouendū. Et absinthiū in diluta uini portione dandū: dandum & ficulne orum succulorū in dulci uino dilutum. Contra Scorpj uero ictus, nullum piscem dissecum imponi iubent. Quod miretur aliquis a scriptore hoc relicum fuisse: cum secundo uolumi ne de Mullo pisce agens, inter cætera uim hanc illi tribuerit. Nisi satis fore credidit, semel quo cunq; loco de eo traditum fuisse. Adijciunt præterea, uiuo sulphure confricandum esse locum, bibendasq; tritas lauri baccas numero tres.

De morfu Muris aranei.

CAP. VI.

A

SI Mus araneus momorderit, auxiliatur ex galbano splenium per se. Uulneri exterius impositum, aut medicamenti modo aceto tritum, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quinetiam Mus ipse, qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus sui ueneficia luit. Resistunt quoque acini dulcis punici decocti, & illiti. Item porri, & allia contrita, nec non aquæ calidæ fots. Sed hæc ad locum pertinent. Prodest potum abrotoni decoctum, maxime si in uino detur. Præterea serpyllum, & galbanum, & eruca uino madefacta, recentes cupressi pillulæ cum aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrum cum uino, & chamælaonis hærbæ radix. Nec desunt qui literarum monumentis tradiderunt, tritum Murem araneum contra suos ictus cōmode bibi. Quam historiam apud alios inuentam, dignam dumtaxat censuimus, quæ annotaretur. Alij asseuerant, demorsum non alias exulcerari, nisi extrinsecus Mus araneus astiterit, tum quoque auxiliari referunt.

EX M. V E R G. C O M M.

Multa sunt quæ alia, & aliter pro Muris aranei morsu ueteres græcorū medici docent. Primumque inter ea quæ emplastri modo imponuntur, non dulcis punice acinos, ut cōmunis ferele etio habet, sed Malicoriū imponi iubent, aptiore remedij genere quæ si quis acinos dixerit. Numerant mox agrestem maluam, & ex aceto tritum sinapis semen. Cumque & ipsi calida aqua, uerumtamen marina (quam uocem deesse huic scriptori suspicamus) locum foueri præceperint, adiiciunt statim, cremata hordea ex aceto imponenda esse. In portionibus deinde, non numerata ab hoc scriptore, adiiciunt sisymbrium, saluiam, hedinum agninumue coagulum, gentianæ radicem, aut uerbenacam, cunctaque cum uino. Quinetiam cum uino bibendum tritum Murem araneum dicunt. Facere ad hoc ueneni genus myrrham pondere semissis drachmæ, & aristolochiæ corticis drachmas quatuor. Sunt & alia ab eis in huiusmodi malo obseruata & tradita remedia, sed efficacissima, & præcipua hæc sunt. Post quæ erat dicendum nobis, cur in extremo capite uitij nota æditioni huic nostræ addita sit. Sed tam aperta erit græca intelligentibus eius consilij ratio, ut nihil iacturæ sit eam non tradidisse, præsertim in extremo opere ad ea quæ supersunt festinantibus.

B

Ad morsum Viperæ remedia.

CAP. VII.

SI Viperæ morsum impressit, finum caprinum cum uino impositum sopitatur. Item laurus & abrotonum & galbanum splenij loco superiectum. Origanum uiride inditum. Pulli gallinarū discerpti, & confestim admoti. Erui farina, aceto mulso subacta. Radicis cortex usque eo tusus, ut in puluerem solutus abeat, & scylla tosta detritum chamæmelum, hordeaceum cataplasma in aceto mulso præparatum: sed locus ante calida foueatur. Hæc loco imponuntur. Contra uiperinos ictus rubus cum uino prodest. Aliqui anchusam tenui folio constantem auxiliari prouident. Leporini coaguli in uino terni oboli bibuntur, & porracei succi hemina in mero, & foliorum apiastris succus, & syluestris ruta. Hæc in uino potari debent. Merum continuo bibendum, allia mandenda, & cepe, & porri recentes, salsamenta acerrima, & opipara. Simplicia hæc sunt. Percussis a serpente præclare auxiliatur medicamentum quod myrrhæ, piperis, castorij, floris portulacæ seminisque, dimidio acetabulo constat.

D I O S C O R I D I S

C Hæc omnia in cretico passo teruntur, aut in alio probato uino. Erasistratus in eo libro, qui *περί λυδίων*, id est, de uiribus inscribitur, pleraque alia tradidit, quæ ictus ab Vipera auxilium ferre possunt. Inter quæ talia maxime laudantur, gallinacea cerebella cum uino pota, semen satiuæ brassicæ tritum, & acetabuli mensura cum uino potum. Quinetiam bonum est digitum in liquidâ picem intingere, deinde uinum, quo digitus fuerit elutus bibere. Hæc sunt quæ contra Serpentium ictus auxiliantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Sunt toto hoc capite a scriptore hoc decreta, quæ contra Viperas imponi, comedi & bibi oporteat. Quæ item simplicia, & quæ composita eius mali remedia sunt. Adiecerunt his alij græcorum medici plura alia. Elixas in cibo ranas: in poculis meraci uini portiones, tam presentis remedio, ut si quis remedio eo utatur, nullo alio opus sit: Marina testudinis, cum agrestis cimini succum, sanguinemque: Leporis, inulue tribolari pondere coagulum: Siccati ceruini genitalis drachmam: Panacis cum uino radicem: Agarici drachmâ: Luniperi baccas: Asphodeli radicem: Concisa pistacia: Viticis semen: inueteratæ mustelæ drachmas duas: Fluuiales marinosue cancrôs per se, & cum pediculari herba, quam Staphidagrium uocant, saleque & polio: Aristolochiæ, cum myrrha radicem: Gentianæ, baccarumque lauri parem mensurâ melle exceptam. Oribasius præterea priuatim, quam alij Aristolochiæ radicem, radice ille corticem sumi iubet. Addit & castorium, & opium: iubetque, habita uirium ratione, in diluta uini portione dari. Lycus Sandaracam & Anethum adijciebat. Archigenes Lauri folia in oleo decocta imponi iubebat. Tamque in toto hoc genere remediorum abundant græci, ut multum illis merito secuta tempora debeant: qui dum salutis humanæ consulunt, nihil intentatum reliquerunt. Poterant plura alia etiam numerari, sed ex multis satis hæc fore opinati sumus. Poterunt enim uolentes a Paulo Aegineta & hæc & plura alia certius audire.

D **De Amphisbænæ morfu.** CAP. VIII.
DE Amphisbæna mentionem hoc loco fecimus, quoniam ferere medijs ad Viperas scriptis, percussis ab ea, adiuuari soleant.

E X M. V E R G. C O M M.

Breue quidem, non leuiter tamen corruptum in cunctis fere græcis, quos hæcenus uidimus, hoc caput erat. Id aliorum scriptorum, & eius qui mihi omnium uetustissimus & probatissimus græcus codex est ope, & ex hoc ipso scriptore in eam quæ legitur in æditione nostra formam restitutum est.

Contra Druini ictus remedia. CAP. IX.

ADruino ictus conuenit aristolochia cum uino pota, trifoliū hæuba, radix hastulæ regiæ similiter assumpta, & fructus ex omni quercus genere. Tusæ ilicis radices, & illitæ parti ictæ auxiliantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Quas hic dolorem lenire tantum Illicis radices tusas, & loco impositas ait, cæteri remedio esse dixerunt. Hic *παρηγορητικόν*, quod ad leniendum dolorem pertinet, inquit, illi *ἁπλοῦς*, quod ad opem remediumque & salutem.

De Hæmorrhoidis, & Dipfadis ictu. CAP. X.

HÆMORRHOIDIS, Dipfadisque morfus, uelut immedicabiles a plerisque maiorum deplorati relinquebantur. Quare si peculiaribus contra Dipfadem medijs egeamus, communia experiri operæ precium erit. Protinus aut scarificatione uti, uisionem facere, & si locus patiat, amputatio opus erit. Consequenter præcerrima cataplasmata ad mouere, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fugit, acres cibos maxime a salisam

tis utiles esse. Meracæ potiones, & lauacra profunt, quæ subinde interie- **A**
cto breui spacio assumenda sunt, priusq; morbi genus emerferit: quo se-
mel erumpente, opem ferre non potest ulla medici opera. In ictu Hæmor-
rhoi eadem profunt. Insuper quæ in commune opitulantur, ut scarificati-
ones, uisiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in Diplade definiui-
mus. Quinetiam decocta uitis folia, & cum melle trita.

EX M. VERG. COMM.

Inuenisse se ab antiquioribus tradita Paulus Aegineta, quæ præter supra dicta uulnere impo-
nerentur, hæc etiam inquit. In Dipladis morfu concisa portulacæ folia ex aceto: Polentam iti-
dem: Rubicq; concisa cum melle folia. Plantaginem præterea, Hyssopum, Allium, Elaphobo-
scum, Porrum, Rutamq; & Vrticam. In Hæmorrhoi autem hæc ipsa, & præter hæc elixa uitis
folia cum melle concisa. Nec minus Hæmorrhoi ipsius crematum caput in portione datum:
aut cum Irino oleo Scordion herbam: comedendasq; in periculo hoc passas uuas. Non con-
uenit deinde nobis in hoc capite cum alijs, quo loco hic scriptor ait, ἡ δὲ τοῦ Δρύμυφας χάρις χραιμύειν
καὶ μάλιστα τὰς ἀπὸ τῶν τριχῶν. Illi enim Drimyphagias frequentem in hoc scriptore uocem,
ad acres tantum cibos contraxerunt. Nos ut est communis & propria uocis in medicina
æstimatio, ad eas uomitiones retulimus quæ accremento ciborum quærentur. De quibus a-
ctum longius secundo uolumine a nobis in Omotharicho est.

De morfu Hydri.

CAP. XI.

Si morfum Hydrus adegit, prodest origanum tritum, & aqua suba- **B**
ctum, lixiuia cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut quærna
radix minutim contrita, & hordei farina cum aqua & melle colliquato. **B**
Bibuntur etiam binæ aristolochiæ drachmæ in diluto uino, aut poscæ
cyathis duobus: deinceps marrubij succus, uel decoctum utriusq; cum
uino. Fauus recens datur in aceto.

EX M. VERG. COMM.

Non satis certa in hoc capite omnia in græcis sunt. Pluribus enim locis a reliquis græco-
rum disciplina uariant, quæ hic scriptor pro Natricis morfu constituit: non tam adeo diuersa
nobis uisa sunt, ut mutare aliquid, aut addere placuerit. Illud tantum monemus, quod Barbarus
ait, bibendū porri succum. &c. nos Marrubij dixisse, concordi in hanc uocem græcorum alio
rum medicorū præcepto: qui prasi, id est, marrubij, non prasi, id est, porri succo uti iubent.
Potuit ille suorum codicum fidem sequi: nos cōmunem lectionem, & ueterum auctoritatem
magis amauimus. Addiderunt græcorū medici remedijs ab hoc scriptore numeratis Nastur-
cium, Asphodeli semen, floremq; & cum uino feniculi semen.

De morfu Cenchridij.

CAP. XII.

Moris a Cenchridio auxiliatur lactucæ fructus cum lini semi-
ne illitus, & satureia trita, & syluestris ruta, & serpyllum cum
duodecim hastulæ regiæ drachmis, & tribus uini cyathis, aut aristolo-
chiæ radix. Item cardamomum, & gentiana.

EX M. VERG. COMM.

Corruptū, maleq; habitum a librarijs aliquot locis caput hoc est. Licetq; Pauli Aeginetæ
auxilio totum restitui posset, satis tamen nobis fuit pro Cardamomo, quod passim in eo lege-
batur, Cardamon, id est, Nasturcium uertere. Factumq; id est, non tam quia ut diximus Carda-
mo græcus ille scriptor manifeste uitur, q; quia hic ipse scriptor in Nasturcio dixerat, ἡ δὲ τοῦ
τὸ ἐν ἀντιφάρμακον πινόμενον. Quod est, Porum serpentibus remediū est. At Cardamomū etiam
id præstat. Scimus id quidem: sed utenibus ad hanc rem Nasturcio alijs in ambiguo, id potius
elegimus, qd græci alicuius scriptoris auctoritate defendi posset. Vitium suspicari sumus illic etiā
esse, quo loco non integræ lectionis notā adiecimus. Credimus em̄ legi quondam potuisse ali-

D I O S C O R I D I S

Cter cum locū, καὶ ἱππιδος συν ἀσφιδέλῳ λελαωμένον, ποτισάμενα δὲ παραχρῆμα κενταυρίου τῆς ῥίζης δρασμά διό συν οἶνω κνέθουσ γ. Quorū sensus est. Et Serpillū cum Asphodelo tritum. Potiones aut statim Centaurij radices drachmæ duæ cum uini cyathis tribus. Nihil nos tamen mutauimus, locum legentibus signasse contenti. Sumusq; ad hoc Pauli Aeginetæ disciplina, & præceptis usi: qui totum scriptoris huius caput iisdem uerbis commentarijs suis adscribens & miscens, quo diximus modo totam hanc rem docet.

¶ De percussis a Ceraсте.

C A P. XIII.

Si Cerastes, aut Aspis percusserit, cita partis amputatio suffragatur, Quare sine mora istam partem amputare, aut scalpro confestim circumcidere, & ijs similia prosequi oportet. Vrentia insuper admouenda, Siquidem uirus hoc ueneno Basilici simile est.

¶ De morsu Aspidis.

C A P. XIII.

Is qui ab Aspide feriuntur, quæ de Ceraсте scripta sunt auxilia dari debent. Nam uenenum hoc quemadmodum Basilisci, aut sanguis bubulus, celerrime in arterijs sanguinem cogit

E X M. V E R G. C O M M.

Seorsum, duobusq; capitibus de Ceraсте hic scriptor & Aspide egit, contra q̄ in Græcis alijs omnes fecerunt: qui simul de utroq; docuerunt, certius remedia hæc etiam tradentes. Dico autem certius, non quia plura, aut alia, sed quia expositis remedijs illorum causis & tractationibus, certior legentibus totā hanc rem fecisse uidentur. Nos eam relinquimus, non tam breuitati consulentesq; q̄ quia nihil huic scriptori contrarium, aut aliud in eis est.

¶ De Basilisci morsu.

C A P. XV.

D Basilisci morsum, ut Erasistratus author est, auxiliatur castorij drachma in uino pota. Item papaueris succus.

¶ Ictuum remedia ita se habent.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ ab Erasistrato contra Basilici morsum instituta quondam fuisse Diosco. ait, ueteres græcorum medici incerta sibi esse tradiderunt: propterea, q̄ eorū periculum nunq̄, aut rarissime ab aliquo factum fuerit. Et hæc quidem hætenus. Nobis sane longe plura, & maiore q̄ a principio cogitauimus operis incremento aucta. Dioscoridi uero, & legentium desyderio (tam late rota hæc res patuit, & nos tam multa, quod iam pridem sentimus, parum certe diximus) nunq̄ satis futura: nisi uoluntatem nostram magis q̄ officium manes eius amauerint: & qua solent humanitate bonarum artium; & humanitatis professores nostra hæc excæperint: nec quatenus aliquid præstitimus, sed quid conati fuerimus, in honoris & officij censu nobis numerauerint. Relinquimus nos in extremo hoc opere quæ ab interpretibus alijs importune, & contra suam etiam iudicium addita huic scriptori fuerunt. Pro comperto enim nobis est, non esse eius, quæ tam leuiter, superstitioseq; in eis docentur. Relinquimus & quæ ali quando polliciti sumus in ultimo opere, addituros nos esse, Colorū proprias cum suis discriminationibus uoces: & antiquorum ponderum, mensurarumq; omnium antiquas rationes; præsertimq; quibus græcorum mensuris & ponderibus antiqua Romanorum, & nostrorum temporum pondera & mensuræ respondeant. Non tamen auferetur, quod nunc non datur. Cogitamus enim ueterum quorundam exemplo, & ex Theophrasti disciplina, de floribus commentarium, in quo certior Colorum omnium, in natura sumptis ab ea exemplaribus, ratio & historia tradet. Adhucieturq; illi quod ad pondera illa, & mensuras pertinet. Nunc enim ampliore uolumine librariorum & legentes defatigare, uisum non est.

¶ Finis L I B. Noni.

QVAE SEQUUNTUR, NON VIDENTUR
esse Dioscoridis.

¶ De Rhamno.

Rhamnū, si quis eruat silente luna, & secū ferat, contra uenena, & improbos hoīes proderit. Pecoribus iuuādis appendit. Nauigīs circūponi solet. Valet cōtra capitis dolores, & laruas.

ῥάμνος

¶ De Artemisia.

Artemisiā hārbam, si quis teneat dum iter facit, lassitudinem discutiet: & si in pedibus ferat, bestias, & lemures abiget. Si sanguis circa artus cōaluerit, ramulos ex rosaceo in olla ferue facito, & locum totum oblinito, cum somno indulgendum est. Strangulatuū uuluæ mirum in modum auxiliatur. Vrinæ siccicia, & opisthotonum leuat.

ἀρτεμισία

¶ De Pentadactylo.

Pentadactylū, si qs circū corpus portet, nullo dolore afficiet. Oculos, strumas, callosos tōn- fillas, tumores, uuā, articulos sub lingua, neruorū dolores, & dentes, pforā perniciali fame cō- tractā iuuat. Remoratos a partu mēses ejicit. Infusa manibus ex aqua tepida cōtra terrores, sā- fciniū, & laruas mirū in modum cōmēdatur. Vellito hārbam cum luna crescit oriente sole.

πενταδάκτυλος

¶ De Verbenaca.

Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appensa, doloribus oculorū au- xiliat. Contra hebetudines eorundē & capitis dolorē efficac est. Trita ex aceto, lassitudinē refi- cit. Surmas, callosos fauciuū tumores statim discutit. Febriliū horrores sanat, si qs solū ex aduer- so stans ramulos tenuerit.

ῥερίσφι

¶ De Dictamno.

Dictamnū siccātū manibus terito, & redigens in farinā adiecta uini stilla corpus tangito. Si quidē contra oēs serpentiuū iniurias auxiliatur. Vlcerā, & putrescentes nomias prāpurgans ex- plet. Adactis corpori aculeis obliniū, ut p̄senti sit auxilio. Ad liencē, et in abditis locis uicia inflā- matione turgentia, redactū in farinā illinito. Hārbā uere, magnis aestibus, autūnoq; eruito.

δίκταμνος

¶ De Saluia.

Saluia singultū, tussimq; discutit. Omnibus malis ulceribus cum cæra & rosaceo sumpta au- xiliat. Lienis dolorē, dysenteriaq; pota cū uino albo pari modo sanat. Sanguinē excreantibus, potu medet. Ad extrahenda uuluæ onera efficac est. Pessimæ mulieres pessum ex ea subiiciūt, ut partus excutiant.

ἐλισβεφάκος

¶ De Cupressō.

Cupressus hērba cōtra raucedines auriculāsq; pdest. Induratos tōsillāz tumores, aquā inē- cutē, & coxendiciū cruciatus p̄sanat.

κυπάρισις

¶ De Centaurio.

Centauriū contra inflāmata uicia, & pulsantes ictus ualeat. Foeminis uuluæ malo laboranti- bus auxiliat. Sicciciū urinae, calculorūq; tormēta leuat. Hārbam uere oriente sole legito.

κιντάριος

¶ De Buphthalo.

Buphthalmū crescente luna legere oportet. Facit autē contra pauores, laruas, & malā medi- camēta, fascinationes, ut pote cū eas auertat. Radicē si quis mandat, dentē expuet, fluctionēq; cōfestim sistens auxiliat. Quin & uentrē resoluit.

βούφθαλμος

¶ De Pæonia.

Pæonia hārba per aestus caniculæ ante solis ortū uellit, appensaq; cōtra uenena, fasciniū, pa- uores & laruas pdest. Itē contra febrē cū horrōre uenientē, diurnā nocturnāue, & aduersus ter- rianā. Prodit lemures a mōte in q̄ nascebat fugallē.

παιονία

¶ De Moly hārba.

Moly hārba si secta radice feratur, ueneficiorum & fascinationis amuletum est.

μῶλος

¶ De Marina quærcu.

Marinā quærcū, cū rosaceo & oleo misceto, & faciē illinito cū ad negocia te cōferes. Vegeti- ores reddit pueros imo uentri appensa, & ad arcēdos pauores nocturnos manu teneto. Cōtra fasciniū, & oīa maleficia pdest. Corpus tuef. Cum enī fascinātes recedūt, arefcētē ramulū oc- cludit: & cū ppius accedūt, aperit.

¶ De Chrysanthemo.

Chrysanthemō, si terra ante solis ortū eruat, & collo appendat, ueneficas mulieres, oēsq; fascinātes amoliū.

¶ De Erysimō.

Erysimon cū uino tritū, aduersus uentris dolorē bibiū. Si qs grana septē domū ingesserit, ri- xa & iurgia concitabunt.

¶ De Elleborine.

Elleborine aliquibus Epipactis, alijs Borion dicit. Frutex est exiguus, minimis folijs constans. Bibiū contra omne uenenū, & iocineris uida.

7b. 9.

ARGENT. APVD IOANNEM SCHOT-
tum librariū, 18. Augusti, Anno Christ. M. D. XXIX.

Chartarū numerus, præter Indicem, 183.

Joh. Georgius Hermer.
1829.

INDEX VOCVM

ferè omnium quæ passim in COROL-
LARIIS Hermolai Barbari, Anno-
tationibus M. VERG. ipsiusq;
DIOSCORIDIS
Simplicium descriptione continentur.



Georgius Monner.
Die xx Octobris.

INDEX

VOCAM

hic omniaque per hunc in oron

l. A. R. I. S. H. e. m. e. n. t. i. b. u. s.

monibus in. v. e. r. g. i. b. u. s.

DIOSCORIDIS

Similiam delphicam continetur.

3

Io. Schottus Librarius
Lectori. S. D.

Polliciti sumus Lector candi-
de, idq; ab ipso Operis nostri fron-
tispicio, binos Indices, quod in ge-
nue quidem faremur. Verum ut
est sapientis, pro tempore mutare
consilia, longe melius compendi-
um in animum subiit, ut duos, in
unum contraheremus: nō tam ut
tibi uestiganti singula quæq; obui-
am, & ob oculos essent, q̄ ut pen-
si quoq; nostri finem felicius adse-
queremur. Id ut boni consulas,
rogamus. Vale.

¶ Litera A.

ABACVS

Alabandicus 335 c
Abies duplex 62 c
Abietarij 62 c
abrotonum ibi. d. 162 a
ablinthium 162 a b
ablinthij genera eo. c
ablinthium marinum eo. b c d
ablinthium Santonicum eo. c d
Acacalis 49 b c
acacia 55 c
acanthos ibi. 158 c d
acantha 92 a 158 c d
Acani 115 d
Acantha leuce 159 b
acanthica mastiche 224 a
acanthium 158 b
acanus seminalis 224 a
acarna 190 b
Accipenser 103 c
Acesa insula 321 c
acellis 317 c
acetabulum 142 d. 235 b
aceraria 142 d
acetum 297 d. 298 a b
acetum mulsum eo. b c
acetum scyllinum 299 b c
acetum stychadicum 299 a
Acherois 45 d
Acherusion ibi.
achillea 223 a
achrosyalos 320 b
achudon 68 d
Achy 7 b. 69 d
achyra 68 d
acida muria 298 d

acinea
acini
acinoē
acinos
acis
Acocion
aconia
Aconitum 239 d. 240 a b
aconitum alterum 240 b c
aconos 169 d
acorma 190 b
acorus. um. 2 a b
Acridophagi
acris
acrodrya
Acra
Acylon 59 c. 71 c
Adamas 104 a
adarce 331 a
Adeps 100 d. 102 b c
adantos 258 c d
adanti miracula ibi.
adanti genera eo. b
Adipion 68 c
adipos 61 c
Adnata 139 b
Ador 110 a
adoreia ibi.
adoreum ibi.
Adorei quatuor discrimina ibi.
Adrachne 71 b c
Aduftio 314 d
Aedon 89 d
Aera 113 d
aeromel 16 a c
aerizusa 336 a
Agallochum 7 c d
ægis 35 c
ægidion 64 b
ægylos 207 c
ægylops 260 a b c d
ægoethros 106 b
æmalea 104 a
æmation ibi.
æris coctura quatuor parit 323 d
æris flos 310 d
æris species 311 c
ærugeo rafa 311 d. 312 b
ærugeo scolecia 312 b c d
ærugeo aurificij eo. d
ærugeo ferri ibi.
ærugeo uermicularis ibi.
ærinauratum 310 b
æus ustum 310 c d

æthyopis 169 d
æsculus 64 b
æsculetum 169 d
æthal 161
æther 64 b
ærites 95 b
æritis genera 333 d
Agaricum 251 b. d
ageroton 231 a
agne 36 b
agneltra 37 d
agnos 56 b. 49 d
agonos 56 c
agria 44 b
ægriandrys 58 d
Agricofal 327 c
agrifolium 75 c
Aiuga 212 a b
aiuga altera 210 a
aizoon 244 c d
aizoon genera ibi. & 245 b
Alabandicus 335 c
alabaster 328 c
alabastrum 335 b
alabastrus ibi.
alabastrites ibi.
alapathron 120 c
alarea 72 a
alaria ibi.
albuscus 243 b. 50 b
alburna 102 c
Alcea 309 d. 210 a
Alcyonium 330 c d
Alæ 339 b
alec 86 c
Alecula 87 c 86 c
Alectorolophos 231 d
Alex 87 c
Alga maris 247
Aliata 109 d
alicacabus 237 d
alicaia 239 a
alima 21 c
alipenon 58 c
alipites 24 c
alipaston 102 b
alison 189 c
alifum 219 d 211 a
Allectoris 91 a
allectryenæ ibi.
allectryon ibi.
allium 235 b d
Alemani 23 b
almytis 50 a
aloe 160 b
aloidarium 63 a. 160 d
A ij

I N D E X

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| aloemon | 21 c | anchusæ genera | 220 a c | apimelis | 71 b |
| alopeca | 89 b | anchusa alia | 220 b c | apinthium | 161 b |
| Alphita | 108 G. | anchusa tertia | eo. c | apludæ | 109 d |
| Alpine | 244 b | Andrachne | 71 b | Apöthyma | 40 b |
| althea | 121 c. 209 | androsace | 205 b c | apocynon | 86 242 b |
| Alumeg | 324 c d. | Androsfemon | 211 c | apocrypha Dioscoridi annexa. | |
| alumen scissile | 325 b | androsfemon duplex | ibi. | folio ult. | |
| aluminis genera | ibi. | andrachon | 239 a | apollinaris | 235 c. & seq. |
| alus | 215 d | andraclon | ibi. | apollo myriceus | 49 a |
| alosus | 327 | andracelon | ibi. | apospematismus | 320 b |
| alutarij | 90 c | androdamas | 324 a | Appendix spina | 158 d |
| alutamentum | ibi. | Anemo | 146 b | appherema | 109 d |
| Alysson | 189 b c | anectos | 108 c | Apum ictus cura | 558 d |
| Alypon | 281 b c | anethum | 176 b | apospingifmos | 33 d |
| Amala | 96 d | anifum | 177 d | Apraginos | 64 c |
| amaracus | 26 d. | Anguium senectus | 82 d | Apteros | 92 b |
| amaracinum duplex | ibi. | Anonis | 259 a | Apuas | 87 c |
| amara | 46 b c | anosteos | 78 d | apulas | ibi. |
| amarice | 48 c | Anthalion | 206 b | Apyrena | 61 d |
| amamelides | 71 b | Anthemis | eo. b d. | apyrenon | ibi. |
| amaracus | 168 c d | anthemidis genera | eo. d | Aqua | 198 c d |
| amaranthus | ibi. | anthemea | ibi. | aquarum discrimina | ibi. |
| Ambrosia | 197 d. | antheles | 48 a | aqua marina | 297 b c |
| ambra | 46 b d. | antherices | 108 a | aqua multa | 295 c d |
| Amellum | 23 a b | anthracidæ pisces | 327 c | item folio | 296 b |
| amentum | 60 d | anthyllis | 106 b | aqua frigida | 300 d |
| Amiantus lapis | 335 c | anthias | 102 c | aquifolium, ia. | 302 d. |
| Ammi | 176 d. | anthrenæ | 106 b | item folio | 59 d |
| amilla | 23 b | antinoius | 271 d | aquiceli | 36 b |
| ammium | ibi. | antispodos | 310 b | Arabis | 337 b |
| ammoniacum | 187 a b | antiora | 192 b | arabus lapis | 374 d |
| Amomis | 9 d | antirrhinum | 257 d | aracus | 115 d |
| amomum | eo c d | antitaura | 192 b | arachnion | 57 d |
| amorgis | 56 a | Apalos panis | 108 b | araneus | 91 a |
| amorgynæ | ibi. | aparathe | 71 c | ara neorum genera | ibi. |
| Amurca | 55 d | aparine | 189 a | Arbores resinam ferentes sex | |
| Ampeloprasum | 134 d | Aper | 90 b | folio | 35 d |
| amphibia | 160 d | Aphenum | 7 c d | arbutus | 71 a |
| amphicaustis | 109 d | aphroditarium | 17 d | arbuti genera | ibi. |
| ampelitis | 339 c | apharca | 63 a | Archemora | 57 d |
| amphisbenæ ictus | 356 c | aphritis | 71 b c d | arction | 249 b |
| Cura eius | 360 d | aphros | 87 c | arcton | ibi. & c |
| Amygdalus | 71 c | aphrya | ibi. | Arenga | 86 c |
| amygdalæ | ibi. | aphryæ | ibi. | Argemone | 146 c d |
| amylum | 113 d. | aphyæ | ibi. | argemone altera | 147 a |
| Anabasis | 227 b | aphyæ | ibi. | argentum uiuum | 150 b |
| anagallis | 147 a b c d | aphaca | 133 d. | item folio | 310 a b c d |
| anacacabea | 69 c | aphia | 134 a | argenti uiui genera | 320 d |
| anacabos | ibi. | aphonitrum | 134 a | Argyrion nama Chymistarum | |
| anacollia | 177 c | aphroniteum | 328 c. | folio | 325 d |
| anatis | 104 a | aphroselenon | 329 b | Aria | 44 b. |
| anatum differentia | ibi. | aphurca | 335 d | arinca | 111 c |
| anagyris | 210 b c | Apium | 71 c | aris | 142 c |
| anagnostis | 272 d | apia | 366. 178 a b | arifarum | 142 c |
| anarrhion | 457 d | apios | 68 c | aristæ | 108 a |
| anchusa | 219 d. | apiastrum | ibi. 230 a b | | |
| | 220 a b | | 145 d. 193 d | | |

N O D E F X

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|----------|---------------------|-------------|
| Arifolochia rotunda | 161 d, | Atriples | 111 e d, | Berberi | 79 e |
| item folio | 163 a | Atharrathion | 111 c | berberion | ibi. |
| aristolochia longa | 163 d | atramentum librarium | 340 a b | bellis | 366 e |
| aristolochiæ genera | eo. a | Aureon | 50 a | bellio | ibi. |
| Armamentarij | 47 c | auricula muris | 149 d | Beta | 113 b c |
| armenius lapis | 118 b | auricula muris altera | 150 a b | betæ genera | ibi. |
| armillini | 97 a | Auena | 260 a b | beta fylueftris | 318 b |
| Aron | 143 b. | auripigmentum | 324 a, | betonica | 111 d. |
| Arfacus | 142 b c | item folio | 350 a, | berylus | 213 a |
| arsenicum | 44 c | Axinomandia | 354 a | Bia | 108 a |
| Artemisia | 324 a | axos | 350 d | Biblos | 48 b c |
| artemisia tenuior | 207 b | | | Bilis | 103 c |
| artemidorus | eo. d | | | bilis duplex | ibi. |
| artheredones | 250 c | | | bilis flauæ genera | ibi. |
| Aruina | 106 b | | | Bitumen | 40 c |
| Asarum | 102 c | | | bitumen exfulmine | 40 d |
| asarus | 5 d. | | | Blachnon | 134 b |
| Ascion chalcon | 6 a b | | | Blastus muselitis | 7 c |
| asclepias | 142 c | | | Blatta piftrina | 88 d |
| afcyroides | 311 a | | | blattarum genera | ibi. |
| afcyrum | 189 c | | | blattaria | 248 d |
| afcyrum | 211 c | | | Blechron | 164 a |
| Alfius lapis | eo. b c | | | blechrum | 234 e |
| Asphalatus | 332 c d | | | Bliton | 121 a b |
| asphalatus | 12 c | | | blitomama | ibi. |
| asphaltites | 40 c | | | Boacæ | 86 d |
| asphodelus | ibi. | | | boacæ | ibi. |
| asparagus | 143 a b | | | boletus | 243 a |
| asparagus | 124 b c d | | | bolbiton | ibi. |
| aspidum genera | 271 c | | | bolita | 316 c d |
| aspidis ictus | 81 d. | | | Borrage | 112 b |
| Cura eius | 357 c | | | Bosmorus | 126 d |
| asphenium | 317 b | | | Botis | 198 b |
| aspris | 361 c | | | botrys | 78 d |
| Asfulæ | 205 c d. | | | Brabyfa | 112 a b c d |
| Aftacia | 2 a b | | | Brallica | eo. b c |
| astaphus | 59 c | | | brallica genera | 123 a |
| astaphylinum | 11 a | | | brallica fylueftris | eo. h |
| afterius | 72 a | | | brallica marina | 93 c |
| after | 267 c d | | | Bredon | 138 b |
| astorgion | 174 b | | | Bria | 213 b |
| astragalus | 95 b | | | Brômus | 48 c |
| Attacos | 255 c d | | | Bruchus | 161 a |
| attaga | 95 b | | | bruscandula | 92 b |
| attagenus | 241 a | | | brutia | 124 d |
| athea | 92 a | | | Brenthiæ | 39 b |
| attega | 103 d | | | bryon | 350 b |
| attelabis | ibi. | | | bryon marimum | 59 c |
| Athera | 121 c | | | bryonia | 247 b |
| ateramnon | 133 c | | | bryton | 232 d. |
| ateramna | 92 b | | | Bubleton | 110 b |
| atinia | 211 c d | | | bubonios | 121 b |
| Attractilis | 116 c | | | Buceras | 355 a b |
| atramentum futorium | ibi. | | | buchides | 114 d |
| d. item folio | 46 b | | | | 201 a |
| Et differentia eius | 190 a b | | | | |
| atramentum metallicum | 321 c | | | | |
| | 322 a | | | | |
| | ibi. | | | | |
| | 323 a | | | | |

| I | N | D | E | X |
|------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|
| Buccina | 78 c | canchryæ | 110 a | caros sylvestre 1 d |
| Buffo | 86 a | canchry | 181 d, 182 a | Carpalium 162 d |
| Buglossa, os. | 256 a b | Candidum oui | 91 c | carpasi succus 346 c |
| bulbina | 143 d | candaulos | 111 c | carpesium 262 d |
| bulbus uomitorius | 143 b, 269 c | candylos | ibi. | carpæ 58 d |
| bulbus cibarius | 143 c | Canicæ | 103 c | Carpinum 38 c |
| bulborum genera eo. d. | 144 a | canis ponticus | 85 b | carpatinæ 217 d |
| Bumelia | 45 b | canis marinus | ibi. | carpisculus ibi. |
| Bunias | 119 a | carnis rabiosi signa | 353 c d, | carpophyllos 263 a |
| buni | 329 a | item folio | 354 a | carphos 114 d |
| bunion 120 d, 131 a, 255 a b | | Contra canis rabiosi morsum re- | 354 b c | carpum ibi. |
| Buprestis | 94 c, 343 c | media | | Carthamus 39 d |
| bupthalmus | 207 b c | Cura uictus idem in morfu canis | | Carubum 78 d |
| Butomus | 207 c | rabiosi | 355 a b | carubulum ibi. |
| butyrum | 98 d, 99 a | canirubus | 51 a | carus, um. 178 a |
| Byrsodepsicon | 325 a | Canna | 47 c | Caryon 72 b c |
| byssos | 203 d, 209 a | cannabis sylvestris | 210 a | caryophyllos 138 c, 170 c |
| | | cannabis sativa | eo. b | caryotidum genera 61 d |
| | | cannabus | ibi. | Cafeus 92 b |
| | | Cantharus | 94 c | caseorum genera eo. c |
| | | cantharides eo. b c, | 342 d | caseorum differentia eo. d |
| | | item folio | 343 a b | Cassia 7 b, 8 b, 48 b |
| | | cantharidum genera | ibi. | castia fistula 8 b |
| | | cantharis | 108 a | castia cathartice ibi. |
| | | cantherij equi | 89 b | castia myrrha ibi. |
| | | canthelij | ibi. | castia siliqua ibi. c |
| | | canthelei | ibi. c | castia lignea ibi. |
| | | canthonæ | ibi. c | castia genera 277 d |
| | | Caper | 90 b | Castanea 59 a, 60 a b |
| | | capis | 44 b | castanearum genera eo. b |
| | | capnos | 250 b c, | castor 14 c, 85 a b |
| | | Capra | 90 b | castoreum 85 c |
| | | caprificatio | 75 c | Catacharce 258 a |
| | | caprificus | 85 c, | catacecaumene 259 a |
| | | Capparis | 144 d, 145 a b | cattyma 90 c |
| | | & eius genera | ibi. | Caucalis 14 a, 131 c |
| | | capparoculæ | 79 b | caulias 134 d |
| | | Cara | 176 a | Cedrelion 43 d |
| | | Carbasa | 217 d | cedria 39 b, 43 b d |
| | | Carbasinus color | 217 d | cedrus 43 a |
| | | carbatinæ | ibi. | cedri genera ibi. |
| | | Carcinos | 80 c | cedrelate ibi. & d |
| | | Carchesium poculum | 37 c | cedris eo. b |
| | | Cardamon | 9 a | cedromelon 68 b |
| | | cardamomum | 3 c d | cedrula ibi. |
| | | cardamomi genera | eo. d | cedrium eo. d |
| | | cardia | 4 d | cedrea ibi. |
| | | carduus | 155 d, 117 b | cedrites ibi. |
| | | Carea | 72 b | cedrinus liquor ibi. |
| | | Carides | 239 d | Celester 51 d |
| | | caries lignorum | 46 c | celtica spica 5 b |
| | | carion myristicon | 46 a | celtis 69 c |
| | | Carmafinus colo | 217 d | Cenchridae 113 a |
| | | carmes | ibi. | cenchri morsus 357 a |
| | | Caro | 10 c, 176 a | Cura eius 361 b |
| | | caron | ibi. | centaurium magnum 154 a b |

¶ Litera C

| | | | | |
|------------------|--------------------|--|--|--|
| Cacabis | 101 d | | | |
| Cacabos | ibi. | | | |
| cacalia | 14 a, 254 d, 255 a | | | |
| Cadmia | 307 d, 308 a b c d | | | |
| cachrys | 46 b, 60 d | | | |
| cadmiæ colores | 308 b | | | |
| caddiscus | 217 b | | | |
| cactos | 241 d | | | |
| Calais | 336 c | | | |
| calainus color | ibi. | | | |
| calamintha | 166 a b | | | |
| calamites | 86 a b | | | |
| calamochnus | 331 a b | | | |
| calamus odoratus | 10 c d | | | |
| calamus | 47 b | | | |
| calamus Indicus | 332 b | | | |
| calcifraga | 281 d | | | |
| calistephanos | 58 d | | | |
| callielea | 58 s | | | |
| callichthys | 103 c | | | |
| callimus | 336 c | | | |
| calx | 330 b, 328 d | | | |
| Camarias | 108 a | | | |
| cammaria | 44 b | | | |
| cammatida | ibi. | | | |
| caminari | 87 c | | | |
| Campe | 94 a | | | |
| campæ | ibi. | | | |
| campanæ | 40 a | | | |
| camphora | 21 c | | | |
| camptauli | 47 d | | | |
| Cancanus | 14 a | | | |
| cancanum | 13 d | | | |
| cancer | 80 d | | | |

| I | | N | | D | | E | | X |
|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------|------------------------------|-----------------|---------|
| Centaurium minus | 154 d | Chamæ Platani | | | 45 a | chymistarum uanitas | | 320 c |
| item folio. | 155 a | chamgla | | 19 d 277 c d. | | chymia scriptores | | 325 d |
| ccentaurea | 154 a b | item folio | | | 278 a b | Chytlon | | 16 d |
| centipedes | 81 b | chamæleon albus | | | 155 b | Ciboris | | 87 c |
| Centuculus | 199 a. 215 b | chamæleon niger | | eo. d. | 156 a | ciborium | | 116 d |
| Cepa | 134 d. 135 b | chamæcerasi | | | 65 a | Cinnamomis | | 9 c |
| ceparum genera | 135 b | chamerhaphanus | | | 119 d | cinnamomum | | 3 c |
| cepa | 210 c d | chamædryas | | | 191 c | cinnamomi genera | eo. d. | 9 b |
| cephalo | 61 d | chamæleuce | | 197 a. | 255 c | cinnamomū mosylicū | s d. | 9 a |
| Cera | 107 a | chamæzeleo | | | 225 d | cinnabaris | | 319 b c |
| cera confectio | eo. b | chamæryphes | | | 241 d | cinera | | 157 a |
| cerana | 70 c | chamæcillus | | | 255 c | Cimbalaris | | 245 c |
| ceranthemos | 193 b | chamædaphne | | | 263 d. | Cimices lectularij, & planta | | |
| ceras | 93 d | item folio | | | 264 a | rum | | 88 b |
| cerasbolon | 116 c | chamæmalum | | | 206 d | Cimolia | 333 d. | 339 a |
| cerastes | 75 b | chamæsyce | | | 276 c | cinerula | | 310 a |
| ceratophyllax | 218 c | chamæzolon | | | 62 b | Cinis foci | | 330 c |
| cerastē morfus | 157 b | chamæpytis | | | 212 b | cinis sarmentitius | | ibi. |
| Cura eius | 367 c | Characias | 273 b c. | 275 a b | | cinaura | | 102 b |
| cerasia | 64 d. 65 a | charadrans | | | 227 b | Cicadæ | | 92 a |
| cerasus | ibi. | charites | | | 41 d | cicer | | 115 b c |
| cerasorum genera | ibi. | charma | | | 193 a | ciceris genera | | eo. c |
| cerasa amarasia | ibi. | charmi | | | 217 d | cicerula, um. | ibi. | 321 a |
| ceratia | eo. b c | Cheiri | | | 254 b | Cices | | 62 b |
| ceratonia | eo. b c | chelidonia | | | 148 d | cici | | 272 c d |
| Cercis | 210 a | chelidonia minor | | | 149 a | cica | | ibi. |
| Cerea | 5 d | chelidonium lapis | | | 93 b | cicatrix | | 14 a |
| cereia | 60 b | chelones piscēs | | | 88 c | cicuta | 346 a b. 240 d. | 141 a b |
| cerebellum gallinaceum | 90 d | chelon | | | 140 c | cicutæ genera | | 241 b |
| cereum | 107 c | chenes | | | 102 d | cicum | | 63 b |
| Ceribia | 108 c | chenoboscion | | | ibi. | cicures | | ibi. |
| cerinthe | 193 c | chelidonia phragmites | | | 250 b | cicuri | | ibi. |
| cerinthus | eo. b c | chenopus | | | 170 a | cicerbita | | 127 b c |
| Ceroma | 17 d | Cichria | | | 109 b | cichorium | | 128 b |
| ceromata | 21 c | chidros | | | ibi. | citreoli | | 129 d |
| ceronia | 65 b | chironias | | | 55 a | cicutaria | | 198 c d |
| Ceruleus lapis | 138 b c d | Chole | | | 103 c | Cion | 272 c d. | 78 d |
| cerulei genera | eo. b c | chondros | | 112 a c d | | cionion | | 78 d |
| cernas | 93 c | choridiola | | | 320 c | Ciphilion | | 241 d |
| ceruiocellus | 179 d | chorus Aphrodisias | | | 2 a | Circaea | | 199 c d |
| cerusa | 348 c d | choroni | | | 64 b | Cirri | | 285 b |
| cerussa | 316 c d. 317 a | Chrima | | | 21 c | Cis | 272 d. | 326 b c |
| Ceryx | 78 c | Chrisma | | | ibi. | Cistus | | 32 a b |
| Cesypium | 52 d | Chroma | | | 26 d | cistos | | eo. d |
| cestrum | 213 b | chromastus color | | | ibi. | cistaros | | ibi. |
| Chalaxia | 334 d | chryfocollæ genera | | | 317 d | cissus, os. | ibi. & d. | 148 c |
| chalcan | 207 c | Chryfocolla | 150 b c. 312 d | 85 d | | cissanthemon | | 140 c |
| chalcis | 96 b | item folio | | | 317 b | cissophyllon | | ibi. |
| chalcidica | ibi. | chryfobalanus | | | 61 c | cisseris | | 126 b |
| chalcanthos | 312 a. 311 a | chryfocorallium | | | 79 d | cissybon | | 148 c |
| chalcanthum | ibi. | chryfocome | | | 239 c d | Citon | | 7 c |
| chalcanthum uiride | 323 c | Chrysanthemos | | | 230 c d | citrus | | 67 d |
| chalcitis | 322 b. 325 b | chryfagonon | | 229 d. | 230 a | citromela | | ibi. |
| chalcus piscis | 327 d | chryfomela | | | 66 c | citrium pomum | | ibi. |
| Chamæ | 29 c d | Chydræ | | | 64 b | citrea mala | | eo. c d |
| chamarum genera | ibi. | Chymistæ | | | 320 b | citrago | | 194 a |

| I | N | D | E | X |
|----------------------|--------------|----------------------|----------|-------------------------|
| Citynus | 63 b | colybista | ibi. | corydalis 92 d |
| citynum | ibi. | Comaros | 71 a | ibi. |
| Cleonia | 15 c | comaron | ibi. | corymbia 183 a |
| Clinopodium | 190 d | Comites | 47 b | corymbus ibi. |
| Clematis 214 d. | 215 a, 282 a | comaris | 335 d | corythalion 57 d |
| clematis altera | 215 a b | Conchis | 116 c | Colimofandalos 64 b, |
| Clymenos | 216 d. | conchylium | 79 d | item folio 232 c |
| Cnacron | 286 | Condylus | eo. d | Costus 9 d |
| Cnicus 19 d. | 285 a | condrilla | 123 c d | costus trifarius ibi. |
| cnipes | 46 c | Congros | 57 c | costi tria genera 10 a |
| cneoros | 277 d. | Conia | 76 a, | Cottabis 34 b |
| cneftron | ibi. | coniasis | 319 d | cottabus ibi. |
| Coagulum | 100 b c | coniate chrisia | 20 c | cottabica ibi. |
| Cocalia | 80 c | conis | 17 d | Cothon 115 b |
| Coccalus | 36 b | conifalton | 17 d | Cotinos 57 b. |
| coccalus | 157 d | coniferium | ibi. | cotonea 66 b |
| cochleæ | 80 b c | Conos | 36 b | Cotes 337 b |
| cochleis | eo. c | conum | 33 d. | cotricula ibi. |
| cochlax | ibi. | connarus | 50 c | cotula 107 a. |
| cochlia | ibi. | consecratrix | 1 a c d | Cotyledon 245 c |
| cochlearum genera | ibi. | confiligo | 111 b | Courmi 110 a |
| cochleare | 142 a | conspersio | 102 b | Crada 75 b |
| coccinea uestis | 218 a | conuoluolus | 215 b | Crambe 122 b. |
| coccomelea | 70 c | Conyza magna | 200 a | crambalea 122 b |
| coccomelos | ibi. | conyza parua | eo. b | crambus 127 a |
| coccus | 275 c | conyza tertia | ibi. | Cranius 70 a |
| coccus | 227 b c | Coptica fidelia | 33 d | Crataegonum 102 c |
| Codia | 225 b | Corallium | 331 d. | crategos ibi. |
| Codymalon | 66 b c | item folio | 147 c | crategona ibi. |
| Cole | 10 b | corallius | ibi. | Creocaccabos 104 a |
| Coggigrya | 70 c | coralis | ibi. | Crepis 169 b |
| Coicina | 227 d | coralij fastigia duo | 332 b | crepula ibi. |
| coix | ibi. | Corchorus | 147 c | Cremes 14 a |
| Colchicon | 243 c d | Cordylon | 175 c | Cretura 108 c |
| colocynthis | 28 c d | cordumeni | 3 d | Cremor lactis 97 c |
| collection | 58 c | Corianum | 177 a b | Cribana 108 d |
| Colocalia | 116 d | coriandrum | ibi. | crithanias 109 c |
| Colorum ratio duplex | 318 d | corion | 345 c d | Crina 24 c |
| color melinus | 339 b c | coris | ibi. | Crimnon 110 d. |
| color paretanius | eo. c | Corma | 211 d. | Crinonia 193 a |
| colores floridi | 318 a | Cornea | 64 c | Crision 253 b |
| colores austeri | ibi. | cornocerasium | 65 a | Crithmum 116 c d |
| color sanguineus | 319 | cornus | 70 a | crispina 50 d |
| coloftra | 97 c | cornus indica | ibi. | Crocum 14 c d |
| coloftrati | ibi. | cornopæ | 92 b | Croci genera eo. d |
| coloftratus mons | ibi. | cornu ceruinum | 93 c. | crocotula 170 c |
| coloftrum, a. | ibi. | Coroneola | 54 b | crocus farracenus 286 a |
| coloffinus | 140 c d | coronarum genera | 64 b | erocomagma 15 b c |
| Columnarum genera | 104 d | corona | eo. c | crocodilos 156 b. |
| columbaris | 251 b | corolla | ibi. | crocodileæ 105 a |
| colluthra | 116 a | Coroneola | 51 a | crocodilina ibi. |
| colymbades oliuæ | 58 a b | coronopus | 127 a b. | crocodilitis ibi. |
| columbarium | 78 d | corruda | 124 d | Crorones 18 d |
| columnarium | ibi. | Corfion | 251 d. | croton 57 c |
| colythra | 75 a | Cortex thuris | 33 d | Crymodes 111 a |
| Colybus | 115 d | Corylus | 73 a | Crucialis herba 189 c |

| I | N | D | E | X | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| Crucialis herba | 189 c | Damalis | 102 d | Droxanus | 188 c |
| Cyaneus | 318 | Damalior | ibi. | Druini morsus | 356 d |
| Cyanios | 116 b | Daphnitis | 7 b c. 8 a | Curacius | 360 d |
| Cyanus | 201 d. 318 d | daphnois | 7 c | Drunculi | 241 |
| Cydyomalon | 66 c | Daphnides | 44 d | Druppa | 16 d. 20 c |
| Cyclaminus | 240 a b c | daphnoides | ibi. 265 c d | Dryos | 58 d |
| cyclaminus altera | 60. c d | daphnococci | ibi. | dryopetes | 86 a |
| item folio | 141 a | Darcas | 7 c | dryopteris | 285 c d |
| Cyllastis | 108 c | Dalispodion | 83 d | Duracina | 90 d |
| Cyma | 122 c | Daucus, um. | 171 c d. 174 b | E Litera E. | |
| cymbium | 148 c | c d. item folio | 180 c | E Benus | 33 b c |
| Cynocrambe | 242 c. 286 c | Daucorum genera plura | ibi. c | Ebeni | 38 c |
| cynoctonos | ibi. | item folio | 180 d | Ebur 93 b. | Ebulus 279 b c |
| Cynopa | 120 d | Delphax | 89 b | Ecidion | 85 d |
| Cynomaron | 156 a | delphinum | 180 b | Echis | 81 d |
| cynomoros | 242 c | delphinum alterum | 181 a | echidnae | ibi. |
| cynomorphos | 14 c | Demos | 102 b | echios | 220 d. 221 a b |
| cynorhodos | 51 d | Dendroides | 274 b | echios genera | 221 a b |
| cynorhoda | 54 b | dendrolibanus | 33 d | Echinus marinus | 27 b |
| cynomyæ | 272 d | dens caninus | 90 c | echinorum genera | ibi. |
| Cynoglossos | 256 d | Derceumenos | 83 d | echinometrae | ibi. |
| Cynosbates | 256 d | Detis | 135 d | echneis | ibi. |
| Cyparissias | 274 a | Dialptarion | 51 d | Elaphoboscus | 279 d |
| Cyperus | 3 a. 10 b | Diacheron | 12 d | elaphon | 93 c |
| Cyperus indica | ibi. b | dialeucon | 15 a | elanæ | 60 a |
| Cyperis | ibi. | diaphanes | 330 b | elata palma | 22 c |
| cyperida | ibi. | diaporphyron | 13 a | elaterium | 226 d. 227 a b |
| Cypirus | 2 d. 3 a c | diaxylon | 12 c d. 13 a | elatine | 224 d. 225 a |
| cyphi | 14 b c | dictamus | 164 a b c d | Electrum | 46 d |
| cypsellæ | 17 d | dictamus Cretica | ibi. | Electri genera | ibi. |
| cyprus | 51 c | diglaucion | 187 d | elegia | 47 c |
| Cyribia | 108 c | Didalis | 110 a | Eleomel | 16 a b |
| Cystoolithos | 336 d | Diphryges | 523 c d | Eleos | 57 d |
| Cytinos | 52 c | Diosbalanos | 72 d | eleoselinum | 178 c |
| cytisus, um. | 251 b | diopsyros | 208 b. 64 d | eleothrepton | ibi. |
| Cubebe | 262 d. Cuci 272 c | Dipfas | 81 d | eleisphacus | 165 b |
| Cucurbita | 129 a b | dipfacum | 156 b c d. 12 d | Elleborum album | 264 b c d |
| Cucumer fatiui eo. c d. | 267 b | dipsadis morsus | 357 c | elleborum nigrum ibi. & 265 a b | |
| cucumer sylvestre | 366 c | Curacius | 360 d | eleogaron | 87 d |
| Cucurbitula | 380 c d | Discus Solis | 320 b | Elephas | 93 c |
| eucumis | ibi. c | Dolichus | 117 d. 262 a | elephantus | ibi. |
| Culmus | 108 a | domiporta | 80 d | Elymaus | 31 d |
| Cuminum satium | 276 b c | dorcis | 13 b | elymaei | ibi. |
| cuminum sylvestre | 60. c d | dorcidium | ibi. | elydrion | 286 a |
| Cuniculus | 83 d | dorx | 93 d | Embafis | 47 d |
| cunila | 267 b c | dorcas | ibi. | Embrion | 46 c |
| cunila gallinacea | 165 a | doryon | 238 a | empetron | 281 d |
| item folio | 267 b c | dorycnion | ibi. & b. 344 | Encardios | 61 d |
| cunila genera | 200 b c d | & sequenti. | | Encephalos | 60. d |
| item folio | 201 a b | dossuriae pelles | 97 a | enorchos | ibi. |
| Cunilaginis genera | 200 a | draba | 137 b | Enula campana | 15 c |
| Cupressus | 41 b c d | Draco marinus | 81 a | enoplion | 47 d |
| Curallium | 332 a | dracuuculus | 141 a b c d | enthæmon | 58 c |
| D Litera D. | | dracunculus parvus | 60. c d | Epalelima | 21 c |
| Dama | 93 c | item folio | 142 a | epargos | 38 c |
| Damale | 102 d | Dropax | 136 c | Epatica | 229 b |

| I | N | D | E | X |
|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| Epecla | 44 b | F Litera F | Foeniculum | 180 a b |
| ephemeron | 244 a b, 344 b | Olium sylvestre | Foeniculum erraticum | ibi. |
| ephemeron duplex | 243 c d | Flos achaicus | Ferula | 182 d 181 a |
| Ephialtion | 208 a | Flos syriacus | Ferulae genera | 183 a |
| Ephthion | 312 a | Flomus | Ferulago | ibi. |
| Epidormismata | 44 b | Fuligo | Furfugium | 197 a |
| epidiphnides | ibi. | fumus | farfaria | ibi. |
| Epimelis | 69 b | fuliginis compositio | flammea | 201 a |
| epimelon | 71 b | fuligo Resinae | flammearij | ibi. |
| epimelida | ibi. | fuligo picis liquidæ | fungi | 242 d 243 a b |
| epimedium | 218 d | fraxinus | fungorum genera | ibi. |
| epimietron | 169 d, 170 a | fraxini genera | fucus marinus | 247 c d |
| epipactis | 250 a | fraxinula | fuci genera | ibi. |
| epispastron orchomenium | 48 a | fraxinago | fumaria | 250 b c |
| epipetron | 169 d, 170 a | februa | fidicula | 259 c |
| epithymbrium | 167 b | fagus | Filix | 253 d 254 a b |
| epithymbiton | 92 d | fragi duo genera | Filicones | 254 a |
| epithymum | 98 c, 166 d | fagus Scissima | Filix foemina | 254 a |
| item folio | 281 a b | ficus Aegyptia | Filicula | 255 a b |
| epityum | 58 b | fabagrica | fuligo pictoria | 339 d 340 a |
| Equisetum | 226 d, 227 a | fabas Syriaca | fungi | 343 d 340 a b |
| equisetum alterum | 227 b | fraga montana | ferrum | 343 b |
| eranthemon | 206 d | ficus Cypria | flos aeris | 310 d 311 a |
| erentia terra | 338 b c | Ficus | flos salis | 328 b |
| Eresios | 57 d | Ficorum genera | Fex uini | 329 c d |
| Ergasima myrrha | 29 d | ficorum nomina | Fex aceti | ibi. d |
| Erica | 49 a | Frugilega | Fecula | ibi. d |
| ericeum mel | ibi. | Fiber | Flos gypsi | 330 b |
| erinaceus terrestris | 77 c | fibrini testes | Litera G | |
| erinos | 221 d | felis | Ladiola Iris | 1 a d |
| eritimus | 327 d | Fulica | GGeu | 1 d |
| erichinus | ibi. | Ficedula | Gallica Nardus | 5 b |
| erigeron | 246 d, 247 a | Fel | Gizer | 7 c |
| eruca | 131 d, 94 a | Fimus | Gazella | 13 b |
| eruca pinorum | 343 b | fimi differentiae | Glocon | 17 d |
| Eruilia | 118 a | Frumentum | Galbanum, Metopum | 19 a b |
| eruum | 117 d, 118 a | Frit | gabirea myrrha | 29 d |
| Erisisceptron | 12 c | Fertini | galbuli | 41 d |
| erythacus | 44 c | farinae nomina | galbae | ibi. 75 c |
| erythros | 61 b | furfures | gingros | 47 b 48 a |
| erysimon | 137 b c d | farris quatuor discrimina | gera cefyma | 56 c |
| eryngion | 159 d, 160 a | fabula | gerandryon | 58 d |
| eryngiatum | ibi. | fabulus albus | glans | ibi. |
| erythrodanum | 208 d | farrago | glans Iouis | 19 a b |
| Elcharule | 106 d | farraginaria | garbion | 60 a |
| Eufragia | 213 a | foenugrecum | galla | 60 b c |
| eupatorium | 225 a | foenigræci farina | gallæ genera | ibi. c |
| euphorbium | 186 b c | fabula | grossi | 75 d 76 a |
| euphorbia | ibi. | fabulum | grossuli | 76 a |
| eumphalos | 53 d | fabulica | Galeos | 85 b |
| eupteros | 359 d | fabago | Gefentera | 86 d |
| exhalme | 60 d | fabagryptia | Gobius | 87 b c d |
| exalipes | 21 c | Freium | Garrum | ibi. & c |
| exalburnare | 102 c | Fel terræ | Garus, um | 87 c |
| exalburnatum robur | ibi. | item folio | Galecula | |
| Excantare | 132 b | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------|----------------|-----|---------------------|----------------------|
| Manna thuris | 34 a b | Memecylon | ibi. | & d | Marciatum unguentum | ibi. |
| Manna | ibi. | Moraciae | 71 c | | Marci pastilli | ibi. |
| Maza | 34 c | moracillae | ibi. | | Mydas | 108 a 116 e |
| Mastiche | 46 d. 37 a. | mollusca | ibi. | | Mola falsa | 109 b |
| mastiche, Silphium | 44 b | morus | 73 a b | | Maza | 110 a |
| mastichis duo genera | ibi. | maratha | eo. b | | milium | 111 d 118 a |
| maltha | 41 b | moreos | eo. c | | miliarium uas | 113 a |
| mustax | 44 a | morofycos | ibi. d | | miliariidae aues | ibi. |
| mustacea | ibi. | metrae | 77 b | | mel frugum | ibi. |
| mustiæ | ibi. b | myaces | 79 a | | malua | 121 b e |
| magides | ibi. | myes | ibi. | | metacharon | 126 d |
| male | ibi. | Myiscæ | ibi. | | medica | 133 d |
| magis | ibi. | musce | ibi. | | molyra | 135 d |
| Mileca | 45 b | musculus | ibi. | | malum terræ | 140 b |
| Melea | ibi. | mytulus | ibi. & b | | myfota, tis | 146 d. & seq. |
| milon, Taxus | ibi. | myxa | 80 c | | Murtiolum | 157 e |
| inacer | 45 d. | marali | 81 d | | Murtius campis | ibi. |
| magadis tibia | 47 d | marfanguis | ibi. | | Murtea Venus | ibi. |
| Myrica | 48 c | milus piscis | 84 b. | | myrtus | ibi. |
| mices | 57 d | muftella | 85 c d | | myrtus | ibi. |
| morfa | eo. d | mutili | 86 a | | myrtella | ibi. |
| Melandryon | 50 d | maris | eo. c | | melitis | 163 a |
| myrobalanus | 61 c | maruda | ibi. | | mentha | 165 c d |
| malum punicum | 63 c d | maenæ | ibi. | | minttha | eo. c |
| malorum punicorum genera | ibi. d | inelandrys | 87 b | | menthastrum | eo. d. 166 a |
| Malicorium | 61 c | muria | eo. d | | melilotos | 169 b |
| myrtus, a. | ibi. | muries | ibi. | | marum | eo. b c. maru ibi. c |
| murta | ibi. | millepeda | 88 c d | | magnesia | eo. c |
| murratum | ibi. | matalis | 89 b | | Moly | 171 d. 172 a |
| murtatulum | ibi. | Mæfones | 92 a | | Molon | eo. |
| myrtatum opsonium | ibi. | Mæfonia | ibi. | | melanthium | 183 d. 184 a |
| Myrsine | ibi. | mæfon | ibi. | | melanthemon | 184 a |
| Myrti genera | ibi. | mastace | 92 b | | melandryum | ibi. |
| myrta coniugalis | ibi. | mouluris | eo. b | | magydaris | 189 a b c |
| myrtæ | ibi. | malleolus | 93 b | | malpeton | 185 b |
| melilotini | 64 b | mulus | eo. d | | Myxa | 188 d Myxaria ibi. |
| myrtidanum | eo. c d | myrmecion | 95 b | | marrubium nigrum | 193 c d |
| myrtida | ibi. | muscarius | ibi. c | | marrubium | 194 b c |
| Malus, um. | 65 d. | mus araneus | ibi. & 96 d | | marrubium duplex | ibi. c |
| Mala urena | ibi. | mygale | 96 d. 97 a | | mithridation | 196 c |
| malorum genera | ibi. | Mus | 97 a | | malanthemon | 196 d |
| melea | 66 a | marmotæ | ibi. | | Muralium | 197 a |
| mustea | eo. c d | molce | 100 c | | Matricaria | eo. b |
| mala dulcia | eo. d | melandryon | 102 c | | malua | 209 d |
| Melimela | ibi. | moschos | eo. d. 103 a | | maluæ genera | ibi. |
| Mala orbiculata | ibi. 67 a | moscheuma | ibi. | | medion | 218 c d |
| mala syluestria | ibi. a | medulla | eo. d. 103 a | | inatherionion | 219 a |
| mala persica | eo. b | Myma | 104 a | | macheronij pastilli | ibi. & b |
| mala præcocia | eo. c | Mel | 105 d. 106 a b | | macherion | ibi. b |
| malum Medicum | eo. c d | mel Sardoum | eo. c | | millefolia | 223 b |
| malum Hespericum | ibi. d | mel Ponticum | ibi. | | mercurialis | 224 b c d |
| Mespilus, um. | 69 a | mel Hereacleoticum | ibi. | | mamiras | 226 d |
| Mespilorum genera | ibi. | mel Manicum | 106 c | | Melancranis | 228 d |
| mespilum trigranum | eo. b | mel Menomenon | ibi. | | Meconium | 234 b |
| myxa | 70 d | Mazapanis | 106 c | | Mandragora | 238 a b c d |
| triadrya | ibi. | Marcipanis | ibi. | | item folio | 239 a b c |

B ij

| I | | N | | D | | E | | X | |
|-------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------|---|--|---|--|
| * Limax | 80 c | Lactuca | 190 a b c | Laurus Alexandrina | 269 a b | | | | |
| Lepus marinus | 83 b | Lactuca genera | eo. b | Licium | 270 c | | | | |
| Lepus terrestris | ibi. c | Lactuca sylvestris | eo. c d | Lappago | 271 c d | | | | |
| Leporum genus triplex | ibi. d | & eius genera | ibi. | Lactuca | 274 c | | | | |
| Loligo | 84 a | lanaria herba | 139 c d | Lactaria | eo. b c | | | | |
| Lolliguncula | ibi. | lepidium | 145 b | Lactaria genera | eo. d | | | | |
| Lutra | 85 a | lepidij genera | ibi. | Lachryis | 275 c d | | | | |
| Lytra | ibi. | lutea | 150 b c | Labrusca | 282 a b | | | | |
| Liquiminiarij | 87 c | lepton | 155 a | Linzoftis | 286 b | | | | |
| Lupus piscis | ibi. | labrum Veneris | 156 b c | Lora | 288 a | | | | |
| Liquor fociorum | ibi. | luma | eo. d | Lapidum aliquot vires | 337 c d. | | | | |
| Lagonoponos | 89 b | lumefta | ibi. | item folio | 338 a | | | | |
| Lactes | ibi. | Lumarie falces | ibi. | Lapis Samius | 338 c | | | | |
| Larinæ | larini eo. b | Leucacantha | 159 b | Lac coagulum | 343 d | | | | |
| Lcrini | ibi. | ligusticum | 173 c d | Lepus marinus | 350 b | | | | |
| Lebias | 89 c | libanotidis genera | 182 a b | Lutea | 357 b c | | | | |
| Lichenes equorum | 90 a | lafer | 184 b d. | Lomentum | 358 c | | | | |
| Lyflon | eo c | laferpitium | ibi. | Lutum Venetum | 361 a | | | | |
| Locustæ | 92 a b | leucoporon | 188 a | libri repumicati | 366 b | | | | |
| Loba | 92 b | leucophæon | ibi. | latos piscis | 368 a | | | | |
| Lacerta uenenaria | 94 d | Lithocolla | ibi. | lixium mustum | 370 a | | | | |
| Lupus araneus | 95 c | Lappa | 189 b | Lapis Iudaicus | 375 c | | | | |
| Lacerta, um. | 95 d. | leontopodalon | 191 a | lapides spongiarum | 376 d | | | | |
| Lumbrici | 96 c | leucas | 191 d. | Lathocolla | ibi. | | | | |
| Lactis ufus | 97 b | leuca genera | 192 a | | | | | | |
| Lactarium opus | eo. c | lychnis | eo. a b | | | | | | |
| Lac muliebre | 98 a b | lucemula | ibi. b | | | | | | |
| Lanarum medicina | 99 b | lychnis fylueftris | eo. c d | | | | | | |
| Lanæ fuccidæ | ibi. c | Lilium | 192 d. | | | | | | |
| Lanæ uftæ | ibi. | Liliq genera | 193 b | | | | | | |
| Lana, Erion | ibi. c | lomentum | 198 d. | | | | | | |
| Lanarum discrimina | 99 c | lilium fylueftræ | 201 b c | | | | | | |
| Lipos | 102 b | ligustrum candidum | 201 d | | | | | | |
| Laridum | eo. c | lutearum genera | 202 a | | | | | | |
| Lotium | 105 c | lithoferma | 208 b | | | | | | |
| Lyncurium | ibi. | Lonchitis | 209 a b | | | | | | |
| Lynx | ibi. | Lonchitis altera | eo. b | | | | | | |
| Libum | 109 b. | Lyfimachia | 213 d | | | | | | |
| Lutum Vulcani | 109 c | limonium | 218 a b | | | | | | |
| Lepyria | 111 a | lagopus | 218 b c | | | | | | |
| Lellus | 113 a | lagopyros | eo. c | | | | | | |
| Lolium | eo. c d | lycoplis | 220 d | | | | | | |
| Linum | 115 a | Lichen | 229 a b | | | | | | |
| Lecithos | 115 d. | Lycocftonos | 240 c | | | | | | |
| Lcithopolæ mulieres | 116 a | lens paluftris | 244 b c | | | | | | |
| legumẽ omne tribus modis man- | | lactoris | 248 a | | | | | | |
| ditur. | ibi. | lychnitis | eo. d | | | | | | |
| Lenticula | ibi. | lotus urbana | 250 d | | | | | | |
| Lens | 117 b c | Lorophagi | ibi. | | | | | | |
| Lupinus | 118 a b | Lotus fylueftris | 250 d. | | | | | | |
| Lapathum | 120 a b | item folio | 251 a | | | | | | |
| Lampfana | eo. d | lotus Aegyptia | 251 c d. | | | | | | |
| Lupulus | 124 d | lotometra | eo. d | | | | | | |
| Lupus falictarius | ibi. | Leontopodion | 257 a b | | | | | | |
| Lupus reptitius | ibi. | Lappa minor | 259 d | | | | | | |
| Lauer | 125 d. | Lapparum genera | 260 a | | | | | | |

¶ Litera M.

M Artia radix. Iris
Meon. Meu.
Meu duo genera
Melligera
Malabathrum
Malabathri genera
Mortodes
moselytis blastos
myrrha cassia
muscus
moschus odoratus
muscilion
magma
medica
Manna
Melligo
Meropium
Melanthemon
moschata
moschomyra
moscholea
myra
myracopa
myrrha
myrrha troglodytica
Myrrha Caulalis
Myrrha genera
Myrrha probatio
Myrrha Bceotica

| I | N | D | E | X |
|----------------------------------|---------|---------------------|------------|---------------------------|
| Helxine 123 d. | 224 a b | Iasne | 29 c | Ia |
| Helxine duplex 224 | a b c | Iaron | ibi. | Ianthina uestis |
| Hippuris 227 b | | Iesiminum | ibi. | Impia |
| helichrysos 230 a b | | Iasmes tria genera | ibi. c d | Ixia |
| hyacinthus 232 b c | | Iuniperus parua | 42 b | Indicus color |
| hyacinthinus color | ibi. | Iuniperi duo genera | ibi. | item folio |
| hyssginus color 232 c | | Iuniperus magna | eo. d | Ips |
| hyssginobaphes | ibi. | Irefio | 57 d | Ix |
| Hypecöon 235 b c | | Ilex | 59 c d. | Igniarium |
| Hyoscyamus eo. c d. | 236 a | Iuglans | 60 b. | Iaspis |
| Hippomanes 242 b | | Iscia | 72 c | ¶ Litera L. |
| hyophthalmos 253 d | | Iscades | 74 c | |
| Hippoglossos, Ila; | 257 c | Iberis | 76 c | L Auendula |
| Hippoglossis eo. c | | Ionia | 78 d | Lacta |
| Hypopion 268 c | | Intestina terræ | 85 c | Lada |
| Hippophæes 271 c d | | Iuli | eo. | Lethargus |
| Hippophæston 272 a b | | Ixia | ibi. 155 c | Lycium |
| Helioscopium 274 a | | Ixon | ibi. | Lacaphon |
| heliotropium magnum 286 d | | Iscia | 87 d | Lacca |
| item folio 287 a | | Ius piscium | 88 a | Lenis |
| Heliotropium paruum 287 b | | Iulus | eo. c | Lirium |
| Hirculus uitis 288 a | | Ilia | 89 b | Labyzos |
| hydromeli 296 d. | 296 a b | Ila | ibi. | Libanos |
| harena 335 b | | Ina | ibi. | libanotos |
| hyoscyamus 346 d | | Ileos | ibi. | larimnum |
| hirudo 350 c d | | Iecur asininum | 89 c | Iatax |
| hemorrhoidis 356 d | | Iecur caprinum | 90 b | Iatagæ |
| Cura eius 360 d | | Iecur aprinum | ibi. | lychnis |
| Hydri morfus 357 a | | Iecur caninum | eo. c | Iulion |
| Cura eius 361 a b | | Iecur Mergi | 90 d | Iarix |
| Hydromeli 301 a | | Inulus | 93 d | Ientiscus |
| Hydromeli ibi. | | Innus | ibi. | Iama |
| Heleysma 314 a. | 315 c | Inis | ibi. | Iarigna |
| Hydrargyrum 320 b | | Intestina terræ | 96 c | Iauris |
| harpax 325 d | | Iulus | ibi. | Iauri genera |
| harpaction ibi. | | Italos | 102 c | Iaurus tripes |
| halosachne 327 c | | Italia | ibi. | Iaurea |
| halcyones 331 a | | Ius nigrum | 104 a | Iorea |
| halcyonium 331 a | | Ius dulce | ibi. | Iaureoli |
| hæmatites 333 c | | Iuris genera | ibi. | Iora |
| Hæmatis genera ibi. | | Infruncus | 117 c | Iex arborum furtim cæsarū |
| hieracites 334 b | | Intubus | 127 d. | Iebys |
| hieracleos lapis eo. d | | Irion | 128 a b | Ieucocantha |
| ¶ Litera I. | | Istatis | 137 c | Iigustrum |
| Iris 1 a b c | | Istatis sylvestris | 150 b | Iedon |
| Iris Illyrica ibi. & c | | Ichthyocolla | 150 c d | Iadanum |
| Iridis illiricæ duo genera eo. c | | Iouis flos | 188 a b | Iadi & d |
| Iridis pifidicæ fossura ibi. | | Iris sylvestris | 202 a | Iada |
| Iris Troglodytica ibi. | | Idæa radix | 219 c d | Iycium |
| Iuncus triangulus 3 b | | Iuncus palustris | 226 b c | Iygon |
| Ioscinnamon 7 c | | Iecoraria | 228 c d | Iygean |
| Iuncus odoratus 10 a | | Inguinalis | 229 b | Iigella |
| Iuncus rotundus ibi. b | | Ilopyron | 253 c d | Iopas |
| Iuncus quadratus ibi. c | | Ilfion | 254 a | Iachrymæ oleæ æthiopica |
| Ipnon 13 a | | Ion | ibi. | Iophiæ |
| Inula 15 c. | 16 a | Ionía | 254 b | Lorus 69 b c. |
| | | | ibi. b | Lifatia |
| | | | | * fequitur fupra. |
| | | | | B ii |

| I | N | D | E | X |
|------------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------------|
| Gonos Thalassios | 37 c | Gramen Cilicium | ibi, c | Hippomani testes 34 c d |
| Gallaria piscis | 38 c | granum tinctorium | 227 c | Hyrca 37 b |
| Genitale Cerui | 39 d | Galiopsis | 246 b c | Hyfca ibi. |
| Gallina | 90 d | galion | eo, c d | Hyn ibi. |
| Gigleria | 91 a | glauz | 261 a b | Hyccara ibi. |
| Gallinarum tria genera | ibi. | genista | 269 a b | hyena eo, c |
| Gallinaria | ibi. | Glans unguentaria | 269 d | halme 37 d |
| Galerita | 92 d | item folio | 270 a | halos achne ibi. |
| Ginni | 93 d | geodes | 337 c d | hepar 39 c |
| Gygenij | ib. | gypsum | 349 b | hepatus ibi. |
| Gaphagæ | 96 c | item folio | 350 a b | hippomanes 90 a |
| Grassos | 102 b | Gypsi genera | ibi. | hippi 91 a |
| Grasson | ibi. | galena | 315 a b | herodius 92 c |
| grassonia | ibi. | gastra | 317 a | hirundo 92 a |
| grason | ibi, 108 a | garus | 327 d | hirundinum genera ibi. |
| gerania | 109 d | gorgonia | 332 a | Hinnus 93 d |
| grastis | 111 b | gagates | 334 a | Hinnulus ibi. |
| gossampinus | 115 b | gagis | ibi. | Holcos araneus 95 d |
| gossipion | ibi. | Galactites lapis | eo, d | Hippace 98 d |
| Githon | ibi. | item folio | 335 a | Hippace ibi. |
| gry | 116 c | Galaxia | 334 d | Hordæ 101 c |
| Gongylæ, lis. | 118 d | Galaicos | 335 a | hordicalia festa ibi. |
| Gingidium | 130 d, 131 a | H Litera H | | hellops 103 c |
| gedyum | 134 c | | 1 b | hypotrimna 104 a |
| gingiber | 138 d | Hierida, Iris. | 4 c, 5 a | hyposphagma ibi. |
| glastum | 150 b | Hirculus | 10 b | hordeum 109 c |
| Glastum syluestre | eo, c d | Helis | 21 d | hordei genera ibi, d |
| Gentiana | 152 b | Hieracunta | 13 c | halica 112 c |
| glycyrrhiza | 153 c d | Haormia | 14 b | halix ibi. |
| glycis ancon | 162 a | Heliacón | 15 c, 16 b | helymos 113 a |
| gordylon | 175 c | Helenius | 16 d | Hium 116 c |
| gordylon | 184 a | Hydrleon | 19 a | Halisparton 108 c |
| gith | 184 a | Halmon, oleū. | 21 c | Hippolapathum 110 c |
| Girago | 186 c d | Hygromyza | 22 a | humulus 114 d |
| galbanum | ibi, d | Hydrorofara | 34 c | hydropiper 119 a |
| galbeum | 187 d | Hemisomata | 43 a | hastula regia 142 d |
| glaucium | 188 a | Herba | 47 a b | item folio 143 a |
| Glutinum | ibi. | Harundo | 48 a | Hedera 147 d, 148 b c |
| Gluten | ibi. | Harundinum genera | eo, c | Hederæ genera ibi. |
| glutinum genera | eo, a | harūdo obliqua | 48 c | Hyssopus, um 162 b |
| gluten atticum | ibi. | halimus | 49 d, 50 a | Hedyosmos 165 c |
| gluten piscium | 198 b | halimi genera | 50 a | harmela 171 d |
| geranion | 198 c | Hemicyprus | 51 c | hieracia 177 b c d |
| geranion alterum | 199 a | hypocistis | 52 b | hieracia parua ibi, c d |
| gruina | 199 d | hebenus | 53 b | Hippofelinum 179 a |
| gnaphalium | ibi. | hebeni genera | ibi, c | Hippomarathrum 180 b c |
| gnapheus | ibi. | Halmades oliuæ | 73 a b | Hippophanes 198 d |
| gnaphos | 199 a | hala | ibi. | hemerocallis 201 c |
| gnaphalus | 208 a | hemeris | eo, d | horminum 204 a b |
| gnaphalides | 209 a b | haliphlocos | 59 c | hedyfaron eo, a b |
| glycyfis | ibi, b | hypothymis | 64 b | hemionion 205 d, 206 a |
| gladiola | 211 d, 212 a | hypomelides | 71 b | hemionitis ibi. |
| gladiolus | ibi. | homomelis | eo, b | heluron 207 c |
| gramen | ibi. | hegeteria | 74 c | Helurios ibi. |
| graminis genera | eo, b | Halicacabus | 76 d | Hypericum 211 b |
| gramen harundinaceum | ibi, b c | Hippocampus, | 78 a | Holosticon 216 b |
| Gramen Parnali | | | | |

| N | | D | | E | | X | |
|--------------------|--------------|---------------------------|----------------|------------------------|---------------|---|--|
| Mala infana | 239 a b | Nardi species nouem | 4 b | Nitrum | 328 c d | | |
| Myctonos | 239 d | Nardus Syriaca duplex | eo. c | Nittaria | eo. d | | |
| mycophonos | ibi. | Nardus Indica | ibi. | ¶ Litera | O. | | |
| margyllios | 241 d | nardus Celtica | 4 d. 5 a | O Zis | 7 c | | |
| margarides | ibi. | nardum montanum | 5 b | Oxyschœnos | 10 b | | |
| millefolium | 252 b | niris | 5 b | Olofchœnos | ibi. | | |
| myriophyllum | ibi. | nardum syluestre | eo. d | Opobalsamum | 11 c | | |
| myrrhis | eo. c | nardum rusticum | ibi. 170 b | Orestium | 15 c | | |
| myla | eo. c | nardum syluestre | 6 c | Opithais | 16 c | | |
| Myagros | eo. d | nardum Creticum | ibi. | Oleum omphacinum | ibi. & d | | |
| Melampyros | ibi. | Ner | 13 b | & fit duobus modis | eo. d 17 a | | |
| myrtus syluestris | 262 c d | Narcaphthum | 13 d | Omotribes | 16 d | | |
| myrobalanos | 269 d | nectarion | 15 c | omphacium | ibi. | | |
| mollugo | 271 c | nenuphar | 16 c | omphax | ibi. 17 a | | |
| myrsinite | 273 d | nigella | 20 a | omphaciomet | ibi. | | |
| meconium | 276 a | nux Indica | 21 c | oleum Druppæ | ibi. & | | |
| Mercurialis | 286 b | nuces pinæ | 36 b | proba eius | ibi. | | |
| Mulfum | 295 a b | nucum pinearum. 4. genera | ibi. | oleum syluestris oliuæ | 17 a b | | |
| melicraron | ibi. d | nux Sapinea | ibi. | oleum Candidum | ibi. | | |
| muria acida | 98 d | naphtha | 41 a b | omotribes | ibi. b | | |
| mel Heracleæ | 345 c | neurospastus | 31 a | oliuitates uariæ | ibi. b | | |
| mandragora | 347 a | neruus passus | ibi. | oleum Sicyonium | 17 c | | |
| Meconium | eo. b | Naucus | 57 c | Oleum Cicorum | 18 c d | | |
| Muris aranei ictus | 356 a | Nacæ | ibi. | Oleum Amygdalinum | 19 a | | |
| Cura eius | 360 a | Netrindes oliuæ | 58 a | Oleum Balaninum | eo. b c | | |
| melomeli | 301 a | naueratites | 64 a | Oleum Sefaminum | ibi. | | |
| molibdoïdes | 314 c | nux | 66 b | oleum Carinum | ibi. | | |
| molibdena | 315 a b | nucipruna | 70 d | oleum Hyosciaminum | eo. c | | |
| Minium | 319 c d | nelia | 71 a | oleum Cnidium | ibi. | | |
| miniare | eo. d | nux regia | 72 b c | oleum Cnicinum | 19 d | | |
| minium Sinopici | 320 d. 321 a | nux persica | ibi. c d | oleum Rhaphaninum | ibi. | | |
| mitos | 321 a b | nux Auellana | eo. d | oleum Melanthini | ibi. & 20 a | | |
| Miltopariæ naues | ibi. | narce | 81 b c | oleum Myrteum | 20 b | | |
| Misy | 322 d. 323 a | napunculum | 91 b | oleum Laurinum | ibi. c | | |
| melan | 323 a | Nebron | 93 c | oleum Lentiscinum | eo. d | | |
| melanteria | ibi. | Notiæos | 103 a | Oleum Mastichinum | 21 a | | |
| musæa | 326 b | Nectâ | 104 a | Oleum Rosacium | eo. d 21 a | | |
| musæarij | ibi. | Nastôs | 108 d. 114 c | Oleum Elatinum | 22 c | | |
| Musicium opus | ibi. | nelinos | 113 a | Oleum Melinum | ibi. | | |
| Muria | 327 d. 328 a | nasturtium | 136 c | oleum Oenanthinum | ibi. d | | |
| Muria duplex | 328 a | nycteris | 147 c | oleum Anthinum | ibi. | | |
| Maltha | 330 a | nycteritis | ibi. | oleum Telinum | 23 a | | |
| Milios | 333 a | nepita, eta | 156 b | oleum Sampsuchinum | eo. b | | |
| militis | ibi. | nephastum | 178 b | oleum Ociminum | eo. c d | | |
| magnes | 334 c d | Narthea | 183 a | oleum Abrotoninum | ibi. | | |
| magnetis genera | ibi. | nigella | 184 b | oleum Narcissinum | 24 d | | |
| melitites | 335 a | Nymphæa | 204 d. 205 a b | oleum Crocinum | 25 a | | |
| Morochthus | ibi. a b | nymphæa altera | 205 b | Oleum Gleucinum | 26 b c | | |
| Molochitis | ibi. b | nautea | 210 c | Oleum Aegyptium | 28 b | | |
| Memphites | 335 d | neuras | 229 b | Orobia | 31 a | | |
| | | nerion | 242 c d | oleum Picinum | 39 d | | |
| ¶ Litera N | | Nux odorata | 270 a | oxycedrus | 43 a b | | |
| N Ar. Iris. | 1 a | Narcissus | 270 a b c. | oriptelea | 46 b | | |
| Nardus, dum. | 3 d. 4 a | item folio | 271 a b | oxycantha | 50 d. | | |
| Nardi genera | ibi. & seq. | Nummus uenerus | 320 c | Olea syluestris | 57 a | | |
| | | Narica | 327 d | Oleaster | ibi. & b 58 a | | |

| I | N | D | E | X |
|--------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Oleatellum | eo. c | Ofchos. | eo. d | onyx 335 b |
| olea cilibraca | ibi. | Ocae | ibi. | Onychipuncta 336 b |
| olea medulla | ibi. | omphalos | 106 b | Ophites. 336 c d |
| ossarij | ibi. | oxylepes | 108 d | Ostracite 337 a |
| olea Arabica | ibi. | offa | 110 a | ¶ Litera P |
| olea uita longissima | ibi. | olyra | 111 b | Parallelæ 337 a |
| olea Orchitis | eo. d | oryza | 112 b | Piper aqueum 337 b |
| ostracifinus | 33 a | Onobleton | 111 b | piperapium 337 b |
| oliuæ Colymbades | eo. a | olus | 112 d | pseudocypirus 337 b |
| oliuæ uariæ | ibi. | olla | ibi. | pison 337 b |
| oliuæ cibariæ | ibi. b | ocimum | 131 d, 132 a b | pyritis 337 c |
| oleum syluestris oliuæ | eo. b | ocymum | 132 a | perpensa 337 c d |
| olea Aethiopica lachryma | 33 c | orobanche | eo. c | perpensa 337 c d |
| Onicicidæ | 60 c | ornithogalum | 133 a | Phu 337 c |
| oxyphoenicæ | 62 b | Oxybaphon | 141 d, 142 a | phyllon unguentum 337 a |
| oporothea | 66 b | Omoconitidis | 143 d | pseudocafia 337 a b |
| opora | ibi. | Othonna | 149 b c | pseudocinnamon 337 b |
| oxymala | 67 d | ononis | 159 a | Pyxacantha 337 c |
| Oen | 70 b | origanum | 162 d | Porrigio 337 c |
| Oien | ibi. | origani nomina | 163 a | Phalaganon 337 c |
| Oa | ibi. | onitis | 163 b | piperella 337 c |
| onomalidæ | 71 b | Origanum syluestre | eo. b | perlica 337 c |
| Opisthocarpion | 75 a | Ocimastrum | 169 d | puluisculus 337 d |
| olynthos | 76 a | Oreofelinum | 173 c | patos 337 d |
| Odynolyon | 77 b | olufatrum | 179 a | phafelus Romanus 337 d |
| Ostrum | 78 b | opos | 185 a | pæderos 337 b |
| ostrea | ibi. 79 c | omphacocarpon | 189 a | plaste 337 b |
| onyx | 79 d, 80 a | oenanthe | 199 d | pediasmos myrrha 337 d |
| ostracon | eo. d | organorum notæ | 200 c d | plastinx 337 b |
| ostracium | ibi. | orchis Serapias | 203 c | pinus 34 d, 35 a d |
| Ophloctena | 81 b | Onofina | 204 d | picea 35 a d |
| omotarichos | 87 a b | oxofina | ibi. | paniculæ 35 a |
| oxalme | 87 d | Onobrychis | 211 a b | Piceaster 35 a |
| oxygarum | ibi. | ocimastrum | 221 b c d | Pix 35 a, 39 a, 43 d |
| oxyporum | ibi. | ocimoides | ibi. | pinus germinatio terna 35 b |
| oxyliparon | ibi. | oxyfa | 226 c | peuce 35 b |
| onos | 88 c | oxys | ibi. d | pinus duo genera 35 b |
| oniscos | ibi. | ophrys | ibi. d | peda 35 b |
| orthagoriscus | 89 a | Oxyfchoenos | 228 d | pityida 35 b |
| Opla | 89 d | Opium | 234 b | pinæ nuces 35 b |
| Ouorum natura | 91 c | Oenagra | 253 a | Pitynon physema 35 c |
| oui Candidum | ibi. | ofyris | 261 c | Pix liquida 35 c |
| ouorum differentia | 91 c | opocarpasum | 262 d | Picis confectio 35 a b |
| oua pnieta | ibi. d | oleatellum | 277 d, 278 a | picis uitia, & experimentum 35 b |
| oua chista | ibi. | olea cilibraca | ibi. | picis genera 35 b |
| ouum | 91 c d | Oenanthe | 289 d, 290 a | Pix, & Resina quo differant 35 c |
| onos | 92 b | Omphacium | 290 b c | pissaleon 35 c |
| ossifragus | 92 c | omphax | eo. d | pix sicca 35 c |
| ossifraga | ibi. | oxycratum | 298 a | palimpissa 35 b |
| Ophion | 93 d | oxyrhodon | eo. b | pissaphaltos 35 d |
| Oogala | 97 c | oxymeli | ibi. c | Panduna 35 b |
| Oxygala | 98 b, 99 a | oxalme | eo. d, 299 a | Psesta 35 b |
| Oelypira | 99 c | ostracites | 337 a | Platanus 35 c |
| Oelypus, um. | eo. d, 100 a | obryzum | eo. c | plataniflos 35 a |
| Oes | 100 a | omphacomeli | 301 b | platanio 35 a |
| oxyngion | 102 c | ochra | 318 b, 319 a | platanos 35 b |

N^o 45 12